



Ex Libris

No. 448

SIR WILLIAM CROOKES, D.Sc., F.R.S..

vols 1-29 (1890-1918)

28 vols. H. Morocco,

£18.18.0.

Puss 885
Vol 1 at P.C.

REVUE GÉNÉRALE

DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

TOME PREMIER

REVUE GÉNÉRALE

DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

PARAISANT LE 15 ET LE 30 DE CHAQUE MOIS

Directeur : Louis OLIVIER, Docteur en Sciences

TOME PREMIER

1890

AVEC 337 FIGURES ORIGINALES DANS LE TEXTE

PARIS

Octave DOIN, Éditeur

8 - PLACE DE L'ODÉON - 8

1890

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

PARAISANT LE 13 ET LE 30 DE CHAQUE MOIS

DIRECTEUR : **Louis OLIVIER**, DOCTEUR ÈS SCIENCES

TOME PREMIER

1890

AVEC 337 FIGURES ORIGINALES DANS LE TEXTE

PARIS

Octave DOIN, Éditeur

8 — PLACE DE L'ODÉON — 8

—
1890

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME I DE LA REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

(DU 15 JANVIER AU 30 DÉCEMBRE 1890)

I. — ARTICLES ORIGINAUX

Astronomie et Météorologie

BIGOURDAN (G.). — Etudes récentes sur les Comètes et les Étoiles filantes.....	65
— Revue annuelle d'Astronomie.....	172
— L'équatorial coudé de M. Léwy : le nouvel équatorial de l'Observatoire de Paris.....	762
CASPARI (E.). — L'unification des longitudes et l'heure universelle.....	321
FAYE (H.). — Sur les tourbillons artificiels.....	197
GUILLEMIN (A.). — La rotation de Mercure, d'après M. Schiaparelli.....	603
WEYHER (Ch.). — Sur les Cyclones.....	480

Botanique

GUIGNARD (L.). — Les phénomènes morphologiques de la fécondation chez les plantes phanérogames.....	403
LECOMTE (H.). — La Ranie.....	11
LUBBOCK (Sir John). — Les feuilles et les lois de leurs formes.....	535
MANGIN (L.). — Structure et fonctions des stomates.....	190
— Revue annuelle de Botanique.....	236
VUILLEMIN (P.). — Les Mycorhizes.....	326

Chimie

BOUCHERON (H.). — Revue annuelle de Chimie appliquée (La grande Industrie).....	112
CHARRY (G.). — Les travaux de la Commission du grisou. — Un nouveau type de composé chimique : le nickel tétracarbonylé.....	510
DEMARÇAY (E.). — Les terres rares.....	657
ETARD (A.). — Nouvelle théorie de la fabrication de l'acide sulfurique.....	396
— La Constitution des solutions étendues et la pression osmotique.....	41
— Revue annuelle de Chimie pure.....	193
GUYE (Ph. A.). — Revue annuelle de Chimie appliquée (Les matières colorantes).....	444
— Les matières colorantes.....	115
LE CHATELIER (H.). — Le Grisou et ses accidents.....	630
MAQUENNE (L.). — La Synthèse des Sucres.....	165
MOISSAN (H.). — Nouvelles recherches sur le Fluor.....	336
LE PETIT (P.). — Les récents travaux sur l'Amidon et les Diastases.....	733

Chirurgie

CASTEX (A.). — La trépanation du Crâne.....	516
HARTMANN (H.). — Revue annuelle de Chirurgie.....	512
LANNELONGUE (D.). — De la Craniectomie dans la Microcéphalie.....	393
LE DENTU (A.). — La chirurgie des Reins et des Uréters.....	689

Enseignement des Sciences

GAUTIER (A.). — La reconstitution des Universités françaises et les réformes dans l'Enseignement supérieur, en particulier dans les Facultés de Médecine.....	353
---	-----

Géologie, Paléontologie et Occéanographie

CAREZ (L.). — Revue annuelle de Géologie.....	576
FILHOL (H.). — Le Dryopithèque et l'origine de l'Homme.....	161
GAUDRY (A.). — Les progrès de la Paléontologie.....	465
LAPPARENT (A. de). — Une nouvelle cause de mobilité de l'écorce terrestre.....	267
MARGUERIE (Emm. de). — Les deux nouvelles cartes géologiques de la France.....	43
— La Géologie de l'Andalousie et le tremblement de terre du 25 décembre 1884, d'après le récent rapport de la mission française.....	696
THOULET (J.). — Les principes scientifiques des grandes pêches.....	137
— Les eaux abyssales.....	500

Histoire des Sciences

BERTRAND (Joseph). — Eloge historique de Louis Poincaré.....	733
— Notice académique sur Ernest Cesson.....	760
DEHLÉRAIN (P. P.). — Gay-Lussac.....	477
GAUTIER (A.). — Les problèmes de la Chimie moderne. (A propos du discours prononcé par M. Victor Meyer au XLII ^e congrès des Naturalistes et Médecins allemands).....	225
GRIMAUD (E.). — Une lettre inédite de Scheele à Lavoisier.....	1
OLIVIER (Louis). — Lavoisier, d'après M. Berthelot.....	372
ROSIÈRES (R.). — La découverte de la cycloïde.....	431
TANNERY (J.). — Lagrange et d'Alembert d'après leur correspondance.....	529

Mathématiques

APPELL (P.). — Le problème des déblais et des remblais.....	97
LÉVY (Maurice). — La théorie mathématique de l'Electricité.....	33
— L'Hydrodynamique moderne et l'hypothèse des actions à distance.....	721
LIÉVILLE (R.). — La vitesse de propagation des mouvements dans un fluide indéfini.....	209
LONGCHAMPS (G. de). — Les fonctions hyper-Bernoulliennes et la fonction p''	371
PICARD (E.). — Revue annuelle d'Analyse.....	702

Mécanique appliquée

DWELSHAUVERS-DERY (V.). — Les machines à vapeur et leurs progrès.....	129
LÉAUTÉ (H.). — La machine à vapeur. — Historique. — Questions pendantes. — Rôle de la Thermodynamique.....	289
— Sur la théorie des Régulateurs.....	625
— Même sujet.....	663
SINGAGLIA (F.). — La « Central Valve Engine » de M. Willans.....	263
WITZ (Aimé). — Théorie des machines thermiques.....	2
— La Thermodynamique d'après MM. J. Bertrand, R. Clausius et G. von Zeuner.....	670

Médecine et Hygiène

BUDIN (P.). — Les sages-femmes et l'antisepsie.....	406
CHARRIN (A.). — Le choléra en Espagne et les mesures prophylactiques.....	411
DE LAVARENNE (E.). — Tuberculose et Auscultation ...	47
— Les Polydévrites.....	211
— Revue annuelle de Médecine.....	773
RAILLIET (A.). L'Anémie pernicleuse d'origine parasitaire.....	294
ROCHARD (J.). — Revue annuelle d'Hygiène.....	47
— La prophylaxie internationale du Choléra.....	257
WURTZ (R.). — Les observations récentes de M. Klein sur l'étiologie de la diphtérie.....	338

Microbiologie

ARLOING (S.). — Evolution des idées sur la nature et le mécanisme de la virulence.....	561
BORDAS (F.). — Recherches sur le bacille typhique et la transmission de la fièvre typhoïde par l'air.....	143
BORCHARD (De Ch.). — Essai d'une théorie de l'infection. Maladie, Guérison, Immunité, Virus, Vaccin.....	466
METCHNIKOFF (E.). — Recherches nouvelles sur la Phagocytose.....	425
VINCENT (D' H.). — Les Tubercules et le bacille de la Tuberculose.....	659
VUILLEMIN (P.). — Les maladies microbiennes des plantes.....	728

Physiologie

DUBOIS (R.). Nouvelle théorie du mécanisme des sensations lumineuses.....	498
FRÉDÉRICQ (L.). — Revue annuelle de Physiologie.....	636
MAGNUS BLIX. — Une nouvelle théorie sur le vol à voile des Oiseaux.....	737
OLIVIER (Louis). — La Synthèse de la matière organique sans chlorophylle ni lumière.....	299
WEISS (G.). — Expériences sur l'Electrolyse des muscles. — La contraction des muscles striés.....	82 234

Physique

BRILLOUIN (M.). — Sur les expériences de M. Hertz....	141
FRIBOURG (G.). — Les piles chlorochromiques du Commandant Renard.....	568
GABRIEL (C. M.). — Revue annuelle de Physique.....	302

GUILLAUME (Ch. Ed.). — La cause probable des phénomènes actino-électriques.....	695
GUYE (Ph. A.). — L'équation fondamentale des fluides.....	365
LUMIÈRE (A. et L.). — Etude expérimentale du Halo en photographie.....	568
MACÉ DE LÉPINAY J. J. — La visibilité des anneaux de Newton.....	770
MINCHIN (George M.). — Une pile photo-électrique.....	339
POINCARÉ (Lucien). — La viscosité et la rigidité des liquides.....	76
— Les nouvelles expériences de M. O. Lodge sur les radiations électriques.....	272
RECHNIEWSKI (C.). — La théorie des machines dynamo-électriques.....	607

Zoologie

BEAUREGARD (H.). — Les Insectes vésicants.....	70
— Revue annuelle de Zoologie.....	370
BERNARD (F.). — Les récents travaux sur les Spongiaires.....	668
JOHNIN (L.). — Les Brachiopodes : leur structure et leur parenté.....	767
PRENANT (A.). — La Métamérie céphalique, sa place dans l'histoire de l'évolution des Vertébrés.....	593
VIGIER (C.). — La Faune pélagique.....	433
— Même sujet.....	482

Revue annuelle

BEAUREGARD (H.). — Revue annuelle de Zoologie.....	370
BIGOURDAN (G.). — Revue annuelle d'Astronomie.....	172
BOUCHERON (H.). — Revue annuelle de Chimie appliquée. La grande Industrie.....	112
CAREZ (L.). — Revue annuelle de Géologie.....	576
DE LAVARENNE (E.). — Revue annuelle de médecine.....	773
ETARD (A.). Revue annuelle de Chimie pure.....	444
FRÉDÉRICQ (L.). — Revue annuelle de Physiologie.....	636
GABRIEL (C. M.). — Revue annuelle de Physique.....	302
GUYE (Ph. A.). — Revue annuelle de Chimie appliquée. Les matières colorantes.....	145
HARTMANN (H.). — Revue annuelle de Chirurgie.....	512
MANGIN (L.). — Revue annuelle de Botanique.....	236
PICARD (E.). — Revue annuelle d'Analyse.....	702
ROCHARD (J.). — Revue annuelle d'Hygiène.....	47

II. — BIBLIOGRAPHIE**1° Sciences mathématiques.****Mathématiques**

APPELL (P.). — Sur les invariants de quelques équations différentielles.....	180
BÉRTRAND (Joseph). — Calcul des probabilités.....	85
BLUTEL (E.). — Recherches sur les surfaces qui sont, en même temps, lieux de coniques et enveloppes de cônes du second degré.....	519
BÜSSINESQ (J.). — Cours d'Analyse infinitésimale à l'usage des personnes qui étudient cette science en vue de ses applications mécaniques et physiques.....	613
CARVALLO. — Résolution numérique des équations algébriques transcendentes.....	245
COMBEROUSSE (Ch. de). — Cours d'Algèbre supérieure.....	411
HENRY (Ch.). — Applications de nouveaux instruments de précision à l'Archéologie.....	147
LONGCHAMPS (G. de). — Les fonctions pseudo-et hyper-Bernoulliennes et leurs premières applications. Contribution élémentaire à l'intégration des équations différentielles.....	146 245
— Essai sur la géométrie de la règle et de l'équerre.....	245
LYON (L.). — Sur les Courbes à torsion constante.....	885
MALEYX (L.). — Leçons d'arithmétique.....	782
MARIE (Léon). — Traité mathématique et pratique des opérations financières.....	451

MARSHALL (Alfred). — Principles of Economics.....	647
PICARD (E.). — Mémoire sur la théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes.....	310
POINCARÉ (H.). — Cours de Physique Mathématique. (Théorie mathématique de la lumière. Cours de 1887-1888. — Electricité et optique. Les théories de Maxwell et la théorie électro-magnétique de la lumière. Cours de 1888-1889).....	675
RIVEREAU (P.). — Sur les invariants de certaines classes d'équations différentielles homogènes par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées.....	739
SALMON (G.). — Leçons d'algèbre supérieure.....	379
TEIXEIRA (Gomes). — Curso de analyse infinitesimal 1 ^{re} parte (calcul integral).....	379
VILLÉ (E.). — Compositions d'analyse, mécanique et astronomie.....	491
ZAREMKA. — Sur un problème concernant l'état calorifique d'un corps solide homogène indéfini.....	51

Astronomie

ANNALES DE L'OBSERVATOIRE DE NICE.....	739
BUREAU DES LONGITUDES. — Connaissance des temps. Extrait à l'usage des écoles d'hydrographie et des marins du commerce pour l'an 1890.....	451
EASTMAN. — Assumption and facts in the theories of solar and stellar proper motions.....	674

EPPING (J.). — Astronomisches aus Babylon	21
FOLIE (F.). — La nutation diurne	117
HOUEAU et LANCASTER (A.). — Bibliographie générale de l'astronomie	310
LANGLEY (S. P.). — La température de la Lune	782
MOUCHEZ (Amiral). — Rapport annuel sur l'état de l'Ob- servatoire de Paris pour l'année 1889	519
TISSERAND (F.). — Traité de Mécanique céleste; t. I. Perturbations des planètes	271
VOGEL et SCHEINER. — Des intermittences périodiques de l'éclat d'Algol	214

Hydraulique

DURAND-CLAYE (Alfred). — Hydraulique agricole et Gé- nie rural	146
MASONI (U.). — Corso di Idraulica teoretica e pratica	340
RONNA (A.). — Les Irrigations	614

Mécanique générale et Mécanique appliquée

ANDRADE (J.). — Sur le mouvement d'un corps soumis à l'attraction newtonienne de deux corps fixes, et sur l'extension d'une propriété des mouvements képle- riens	709
BARRÉ DE SAINT-VENANT. — Courbes représentatives des lois du choc longitudinal et du choc transversal d'une barre prismatique	379
HICKS (W.M.). — Elementary dynamics of particles and solids	146
LABOURET (Ch. M. de). — Emploi et fonctionnement du diapason dans les appareils balistiques enregis- treurs	214
LAURENT (H.). — Traité de Mécanique rationnelle	310
LEAUTÉ (H.). — Sur une condition de bon fonctionne- ment des installations mécaniques comportant des transmissions par liens rigides ou flexibles	274
LONERIDGE (James Atkinson). — Internal Ballistics	340
MATHIEU (Emile). — Théorie de l'élasticité des corps solides	340
PETROLLO. — De l'influence d'un vent parallèle au plan de tir sur les portées des projectiles	379
RESAL (H.). — Traité de Mécanique générale	310
THURSTON (R. H.). — The problem of air navigation	613
— On the permanent effects of strain in metals; on their self-registration and mutual interactions	782
— A handbook of Engine and Boiler trials and of the indicator and Prony brake for Engineers and tech- nical schools	739
TISSANDIER (G.). — Souvenirs et récits d'un aérostier militaire de l'armée de la Loire; 1870-71	782
WEYHER (Ch.). — Sur les tourbillons, trombes, tempêtes et sphères tournantes. Etudes et expériences	54

Thermodynamique

DEMOULIN (M.). — Les machines à vapeur à triple et quadruple expansion	782
DWELSHAUVERS-DERY (W.). — Exposition universelle de 1889. — La machine à vapeur	54
— Sur le frottement dans les machines à vapeur	491
HIRSCH (J.). — Expériences sur les coups de feu des chaudières à vapeur	180
MADAMET (A.). — La thermodynamique et ses applica- tions aux machines à vapeur	83
SINGAGLIA. — Le Macchine a vapore	54
— Appendice al trattato la Macchine a vapore. — Re- gulatori di velocità a forza centrifuga	54
— Traité des Machines à vapeur	350
THURSTON (R. H.). — Reflections on the motive power of heat and on Machines fitted to develop that Power	379
— Théorie expérimentale et analytique de Hirn et Dwelschauvers sur la machine à vapeur	411
WITZ (Aimé). — Etude théorique et expérimentale sur les machines à vapeur à détentes successives	585

2^e Sciences physiques.

Physique

ARSONVAL (d'). — Sur un spectrophotomètre différentiel sans polarisation	586
BARUS (Carl). — Mesure des températures élevées	276
BOUTY (E.). — Sur les condensateurs en mica. — Sur le résidu des condensateurs	614
CARVALLO (E.). — Influence du terme de dispersion de Briot sur les lois de la double réfraction	275
CHASSY (A.). — Sur un nouveau transport électrique des sels dissous	111
COLLECTION DE MÉMOIRES RELATIFS À LA PHYSIQUE. — Mémoires sur le pendule	21
COLSON (R.). — L'Energie et ses transformations	147
COUETTE (Maurice). — Etude sur le frottement des li- quides	491
FEUSSNER (Dr K.). — Etalonnage des instruments de mesure électrique en Allemagne	648
GÉRARD (Eric). — Leçons sur l'électricité, professées à l'Institut electro-technique de Montefiore, annexé à l'Université de Liège. Tome I	342
— do — Tome II	676
GOSART (M. E.). — Mesure des tensions superficielles dans les liquides en calcéfaction	54
GUILLAUME (Ch. Ed.). — Traité pratique de thermométrie de précision	86
HIMSTEDT (G.). — Sur l'action électromagnétique de la convection électrique	147
HOSPITALIER (E.). — Traité élémentaire de l'énergie électrique	413
JANET (Paul). — Etude théorique et expérimentale sur l'aimantation transversale des conducteurs magné- tiques	380
JOUBERT (J.). — Traité élémentaire d'Electricité	520
KUNT ANGSTROM. — Beobachtungen über die Strahlung der Sonne. — Beiträge zur Kenntniss der Absorp- tion der Wiernstrahlen durch die verschiedenen Bestandtheile der Atmosphäre	783
LACOUTURE (Ch.). — Répertoire chromatique, solution raisonnée et pratique des problèmes les plus usuels dans l'étude et l'emploi des couleurs	781
LEFÈVRE (J.). — Dictionnaire d'Electricité et de magné- tisme	741
MASCART. — Sur la mesure du champ magnétique ter- restre	342
MATHIAS (E.). — Sur la chaleur latente de vaporisation des gaz liquéfiés	245
MELANDER (G.). — De la dilatation des gaz à des pres- sions inférieures à la pression atmosphérique	710
MELDOLA. — The photographic image	586
MESLIN (G.). — Sur la polarisation elliptique des rayons réfléchis et transmis par les lames métalliques minces	311
NICHOLS (E.) et FRANKLIN (W.). — Expérience sur la question de la direction et de la vitesse du courant électrique	380
PELLAT (H.). — Leçons sur l'Electricité	118
POINCARÉ (Lucien). — Recherches sur les Electrolytes fondus	412
PRESTON (Thomas). — The theory of Light	709
ROSA (Edw. B.). — Détermination de ϵ , rapport des unités electro-magnétiques aux unités electro-stati- ques	341
SALET (G.). — Traité élémentaire de Spectroscopie	117
SARASIN (Ed.) et DE LA RIVE (L.). — Sur la résonance multiple des onduations électriques de M. Hertz se propagant le long de fils conducteurs	451
SEYMONS (G. J.). — Le brontomètre	710
TOMASI (Donato). — Traité des piles électriques	246
VIOLLE et VAUTHIER. — Sur la propagation du son à l'intérieur d'un tuyau cylindrique	181
VOGT. — Sur le rapport des deux coefficients d'élasticité des corps isotropes	552

- WARBURG (E.). — Sur la théorie des éléments voltaïques et la polarisation galvanique..... 180
WITZ (Aimé). — Exercices de physique et applications préparatoires à la licence..... 86

Chimie

- AUGER (Victor). — Sur les chlorures d'acides bibasiques..... 520
BARILLOT (Ernest). — Manuel de l'analyse des vins..... 342
BILTZ (H.) et MEYER (V.). — Détermination, à la température du rouge blanc, des densités de vapeur de quelques corps simples et composés..... 147
BOIDIX. — Note sur la filtration des moûts de malt vert et de maïs à travers le filtre Chamberland..... 676
BRÄUNER. — Recherches expérimentales sur la loi périodique..... 118
CAMPEBON (L.). — L'acier; historique, fabrication, emploi..... 676
COLSON (A.). — Sur quelques applications de la thermochimie à l'étude de la constitution des alcalis organiques..... 381
CONFÉRENCES FAITES AU LABORATOIRE DE M. CH. FRIEDEL, par MM. Bouvalet, Maquenne, Arnaud, Béhal, Saint-Pierre, Fanconnier, Etard..... 587
DÉMAR. — Phosphorescence et Ozone..... 86
FLIMM (W.). — Synthèse de l'indigotine..... 182
GALITZINE. — Sur le rayon d'activité des forces moléculaires..... 214
GAUTIER (A.) et MOURGUES. — Les Alcaloïdes de l'huile de foie de morue..... 276
GÉVE (Ph. A.). — A propos du covolume de l'équation des fluides. — Le coefficient critique et le point moléculaire des corps au point critique..... 785
HAUGHTON (S.). — Illustration géométrique de la loi périodique des poids atomiques..... 23
HÄRSCHEL (A. S.). — Le spectre du sous-chlorure de cuivre..... 311
JÄGER (Erich) et KRÜSS (Gerhard). — Recherches sur le chrome..... 148
JAGNAUX (Raoul). — Aide-mémoire de chimiste..... 618
KLOBUKOW. — Influence de la capillarité et de la diffusion sur l'énergie dissolvante des liquides..... 452
KNAB (Louis). — Traité de métallurgie des métaux autres que le fer: cuivre, plomb, argent, or, platine, mercure, zinc, cadmium, étain, arsenic, antimoine, bismuth, cobalt, nickel, aluminium..... 784
KRONBERG. — La Méthylsaccharine, nouvelle matière sucrée..... 587
KRÜSS (G.) et SCHMIDT (F. W.). — Recherches sur le cobalt et le nickel..... 56
LOTHAR MEYER. — Les théories modernes de la chimie et leur application à la Mécanique chimique..... 311
MATTHEY (Edward). — La liquation des alliages d'or et de platine..... 615
MENDELÉEFF. — La loi périodique des éléments chimiques..... 22
— Dissociation des substances en dissolution..... 648
— Osnovy Khimii (Les principes de la chimie)..... 785
NICKEL (Emil). — Les réactions colorées des composés du carbone..... 710
OCHSNER DE CONINCK. — Nouvelles recherches sur les bases de la série pyridique et de la série quinoïque..... 413
PEIRMAN (E.). — Températures d'ébullition du sodium et du potassium..... 87
PROST (Aimé). — La préparation et les propriétés du ciment de laitier..... 343
RAOULT (F. M.). — Sur les progrès de la Cryoscopie..... 181
RENAULT (A.). — Traité de Chimie appliquée à l'industrie..... 492
ROBERTS-AUSTEN (Chandler). — Les Alliages..... 215
SANSONE (Antonio). — L'impression des tissus de coton, du blanchiment, impression, teinture..... 148
SPRING (W.). — Influence de la capillarité et de la diffusion sur l'énergie dissolvante des liquides..... 552

- VILLIERS (A.). — Tableaux d'analyse qualitative des sels par voie humide..... 452
VOGT (Georges). — Composition des porcelaines kaoliniques..... 676
WALTER, DOUMER, BARBER et ROUX. — Indices de réfraction des solutions salines..... 552
WELLM et HANRIOT. — Traité de chimie minérale et organique..... 741

3^e Sciences naturelles.

Géologie

- BERGERON (Jules). — Etude géologique du massif ancien situé au sud du Plateau Central..... 648
BERGHAUS. — Physikalischer Atlas..... 452
BERTHAUD (Eugène). — Les Poroxylons, végétaux fossiles de l'époque houillère..... 382
BIGOT (A.). — L'Archéen et le Cambrien dans le nord du massif breton et leurs équivalents dans le nord du pays de Galles..... 785
GIRARD (Jules). — Recherches sur les tremblements de terre..... 312
HÉBERT (Edmond). — Discours prononcés aux funérailles et à l'inauguration du médaillon déposé sur la tombe de M. Edmond Hébert..... 493
KLOS (Dr J. H.). — Entstehung und Bau der Gebirge erläutert am geologischen Bau des Harzes..... 521
LEPSIUS (Dr Richard). — Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten..... 246
MARTEL (E. A.). — Les Cévennes et la région des Causses..... 616
RIVA PALAZZI (G.). — La Geologia e gli studi geographici..... 343
ROTHPLETZ (A.). — Das Karwendelgebirge..... 553
SEUNES (J.). — Recherches géologiques sur les terrains secondaires et l'Eocène inférieur de la région sous-pyrénéenne du sud-ouest de la France..... 463
VERRI (A.). — Geologia e topografia..... 343
WAGNER (Hermann). — Geographisches Jahrbuch..... 615
WELSH (Jules). — Les terrains secondaires des environs de Tiaré et de Freneda..... 492
ZUJOWICZ (J.-M.). — Annales géologiques de la Péninsule balkanique..... 24

Botanique

- BAILLON (H.). — Les herborisations parisiennes..... 710
BOHM (J.). — Sur la cause de l'ascension de la sève..... 312
BOIRET (H.). — Sur le traitement de la Carie..... 649
BORNET et FLAHAULT. — Sur quelques plantes vivantes dans le test calcaire des Mollusques..... 215
BRÉAL (E.). — Expériences sur la culture des Légumineuses..... 149
CARPENTIER (Paul). — Les Textiles..... 616
DAGHILLON (Aug.). — Recherches morphologiques sur les feuilles des Conifères..... 521
DELFINO (F.). — Singolare fenomeno d'irritabilità nello specie di Lactuca..... 587
FLAHAULT (Ch.). — L'Institut botanique de Montpellier..... 786
FLOT (Léon). — Recherches sur la structure comparée de la tige des arbres..... 742
GIRARD (Aimé). — Recherches sur la culture de la pomme de terre industrielle et fourragère..... 786
HAMILTON ACTON. — L'assimilation du carbone par les plantes vertes en partant de certains composés organiques..... 414
LALANNE (G.). — Recherches sur les caractères anatomiques des feuilles persistantes..... 553
LECHARTIER (G.). — Sur l'incinération des matières végétales..... 277
LESAGE. — Influence du bord de la mer sur la structure des feuilles..... 677
LIGNIER (O.). — Recherches sur l'anatomie des organes végétatifs des Lycopodiées..... 382
LEVINI (G.). — Application de l'électricité à l'Agriculture..... 677

VILLE (Georges). — La production végétale et les engrais chimiques.....	786
ZACHARIAS (R.). — Sur les cellules des Cyanophycées.....	454

Zoologie, Anatomie et Physiologie de l'Homme et des Animaux

ARGUTINSKY (P.). — Travail musculaire et échanges azotés.....	118
BEAUNIS (H.). — Les Sensations internes.....	56
— L'Évolution du système nerveux.....	382
BEAUREGARD (H.). — Les Insectes vésicants.....	88
BOSCHETTI (F.). — L'Anatomia del Cavallo, presentata in Tavole sinottiche.....	88
— La legge dell'eriderarula con nuove ipotesi fisiologiche.....	522
BOUVIER (L.). — Les Cétacés souterrains.....	182
— Système nerveux des Crustacés Décapodes.....	182
CERTES (A.). — Mission scientifique du Cap Horn, 1882-1883. Protozoaires.....	588
CHEVREL (René). — Sur l'Anatomie du système nerveux grand sympathique des Elasmobranches et des Poissons osseux.....	277
DASTRE (A.). — Les Anesthésiques; physiologie et applications chirurgicales.....	313
DEBOIS (D ^r R.). — Travaux du Laboratoire de Physiologie générale de la Faculté des Sciences de Lyon.....	617
DUPUY (D ^r E.). — De la transmission héréditaire des lésions acquises.....	711
FRANCK (François). — Etude du pouls total des extrémités.....	588
GABRITCHEWSKY (G.). — Sur les propriétés chimiotactiques des Leucocytes.....	414
GRÉHANT (H.). — Les poisons de l'air.....	314
— Recherches physiologiques sur l'acide cyanhydrique.....	678
GUITEL (F.). — Recherches sur les Lepidogasters.....	24
HARMONVILLE (P.). — La Vie des Oiseaux.....	182
HEYMANS (F.). — Exposé de l'état actuel de nos connaissances et observations personnelles sur la terminaison des nerfs dans les muscles lisses de la Sangue.....	551
JOURDAN (E.). — Les sens chez les animaux inférieurs.....	343
KOWALEWSKY. — Organes excréteurs des animaux inférieurs. (Biolog. Centralblatt.).....	149
LEIDY (J.). — Notice of some fossil human bones. — Description of mammalian remains from a rock crevice in Florida. — Description of vertebrate remains from Peace Creek, Florida. — Notice of some mammalian remains from the salt mine of Petite Anse, Louisiana.....	381
LOCARD (A.). — Les Huitres et les Mollusques comestibles.....	383
MALAGE (R.). — Anatomie descriptive du Sympathique chez les Oiseaux.....	56
MONÉZ (R.). — La Faune souterraine.....	149
MOUSSU. — De l'innervation des glandes parotides chez les animaux domestiques.....	522
PERRIER (Edmond). — Traité de zoologie.....	787
PERRIER (Rémy). — Recherches sur l'anatomie et l'histologie du rein des Gastéropodes prosobranches.....	246
RICHET (Charles). — De l'influence du chloral sur les combustions respiratoires chez le chien.....	493
— Mesure des combustions respiratoires chez le chien.....	554
— Cours de physiologie. Programme sommaire.....	743
RIVIÈRE (E.). — Grotte de la Combe ou des Deux Goules.....	414
ROUX (E.). — Bactérie charbonneuse asporogène.....	87
SAINT-RÉMY (G.). — Contribution à l'étude du cerveau chez les Arthropodes trachéotés.....	742
TESTUT (L.). — Recherches anthropologiques sur le squelette quaternaire de Chancelade.....	588
TROUSSART (E.-L.). — La géographie zoologique.....	382
VOGT et YUNG. — Traité pratique d'anatomie comparée.....	313
WERTHEIMER. — Contribution à l'étude de la respiration périodique et du phénomène de Cheyne-Stokes.....	711

WIEDERSHEIM (R.). — Manuel d'Anatomie comparée des Vertébrés.....	216
YUNG (E.). — Propos scientifiques.....	522

4^e Sciences médicales.

Chirurgie

BAZY. — Du traitement chirurgical des tumeurs de la vessie.....	314
BERGER (P.). — Considération sur l'origine, le mode de développement et le traitement de certaines encéphalocèles.....	344
BOULIY. — Des résultats éloignés de l'ablation des annexes de l'utérus.....	678
CHAUVEL et NIMIER. — Traité pratique de la chirurgie d'armée.....	119
HARTMANN et GUNDELACH. — Contribution à l'étude de la valeur sémiologique de l'hypoazoturie au point de vue du diagnostic et du pronostic des affections chirurgicales.....	182
HEIDENHAIN (L.). — Sur les causes des récidives cancéreuses locales après l'amputation de la mamelle.....	183
LE FORT (L.). — De l'exophthalmos pulsatile, à propos d'une opération de ligature des deux carotides primitives pour exophthalmos pulsatile.....	589
OTT (Dmitri de). — Extirpation totale de l'utérus par la voie vaginale, indications modernes de la cure radicale des tumeurs malignes utérines.....	149
PÉAN. — Leçons de clinique chirurgicale.....	415
RECLUS et NOGÈS (P.). — Traitement des perforations traumatiques de l'estomac et de l'intestin.....	454
ROUTIER. — Cancer du rectum. Résection par la voie sacrée.....	216
SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE. — Le traitement du prolapsus du rectum devant la Société de Chirurgie.....	25
TERRIER (F.). — Remarques cliniques sur un cas d'obstruction du canal cholédoque. Cholédestentérostomie.....	183
— Remarques cliniques et anatomiques sur deux tumeurs vasculaires du cuir chevelu.....	278

Médecine, Hygiène et Microbiologie médicale

ASTLEY GRESWELL (D ^r). — Contribution à l'histoire de la scarlatine d'après les observations prises pendant l'épidémie de Londres (1887-88).....	788
BARD et CURTILLET. — Contribution à l'étude de la Physiologie pathologique de la maladie bleue. Forme tardive de cette affection.....	26
BARTHÉLEMY (T.). — Syphilis et santé publique.....	150
BERTILLON (J.). — De la mortalité à Paris pendant le mois de décembre 1889.....	26
BOSCHETTI (F.). — Sulle principali cause diffusione della tubercolosa.....	344
BOULOUÏE. — Manuel du Candidat aux divers grades et emplois de médecin et de pharmacien de la réserve et de l'armée territoriale.....	555
BUMM. — De l'étiologie de la péritonite septique.....	183
CABADÉ (D ^r). — Leçons sur les maladies microbiennes.....	493
CHARRIN et ROGER. — Contribution à l'étude expérimentale du surmenage, son influence sur l'infection.....	618
COOPER CURTICE. — Les parasites animaux du mouton.....	649
CORNIL et BABÈS. — Les Bactéries et leur rôle dans l'étiologie, l'anatomie et l'histologie pathologique des maladies infectieuses.....	523
COPARD et SAINT-HILAIRE. — Contribution à l'étude des céphalalgies, névralgies et migraines d'origine nasale.....	474
DELBEIT (P.). — Recherches expérimentales sur le lavage du péritoine.....	56
FAUVEL et SAINT-HILAIRE. — État du larynx dans la grippe.....	523
FAZIO (D ^r E.). — Les microbes des eaux minérales.....	678
FOURNIER (Alfred). — Syphilis et mariage.....	713

GAMALEIA (N.). — Sur l'exaltation de la virulence du bacille morveux.....	216	WÜRTZ et BOURGES (H.). — Recherches bactériologiques sur l'angine pseudo-diphtérique de la scarlatine!!!	618
GEORGE (Hector). — Leçons élémentaires d'hygiène....	450		
GUYON (F.). — Diagnostic précoce des tumeurs du rein.....	415		
— Cystalgies symptomatiques de lésions rénales et pyonéphroses consécutives à des lésions vésicales. Influence du traitement de la vessie sur les urétro-pyélices.....	617		
HARLEY (Georges). — Traité des maladies du foie.....	743		
HAFKINE. — Maladies infectieuses des Paramécies.....	247		
HALLOPEAU (D ^r H.). — Traité élémentaire de pathologie générale.....	788		
HAYEM (G.). — Les Médications.....	354		
KELSCH et VAILLARD. — Tumeurs lymphadéniques multiples avec leucémie. Constataction d'un microbe dans le sang pendant la vie, et dans les tumeurs enlevées aussitôt après la mort.....	415		
KLEIN (E.). — The Bacteria in Asiatic cholera.....	383		
LAORANGE (F.). — L'hygiène de l'exercice chez les enfants et les jeunes gens.....	216		
LAYER (A.). — Traité pratique de la vaccination animale.....	26		
LÉPINE. — Une page d'histoire de la médecine : la thérapeutique sous les premiers Césars.....	183		
LOMBROSO (C.). — L'antropologie criminelle et ses récents progrès.....	711		
LUXS (J.). — Leçons cliniques sur les principaux phénomènes de l'hypnotisme dans leurs rapports avec la pathologie mentale.....	150		
— Hypnotisme expérimental. — Les émotions dans l'état d'hypnotisme et l'action à distance des substances médicamenteuses ou toxiques.....	150		
METCHNIKOFF (Elic). — Le charbon des pigeons.....	216		
— Etudes sur l'immunité : Le charbon des rats blancs.			
MOTT (Fred. W.). — Un cas d'anémie pernicieuse.....	419		
NÉLATON (Ch.). — Contribution à l'étude du pied-bot invétéré.....	344		
NICOLAS (A.). — Le brouillard.....	454		
ORTH. — Experimentelles über Peritonitis.....	183		
PALMBERG (A.). — Traité d'hygiène publique.....	712		
PERRONCITO. — Le micro-organisme du typhus du cheval.....	649		
PHILALIX (C.). — Contribution à la pathologie de l'embryon humain.....	589		
POLIN et LABIT. — Etude sur les empoisonnements alimentaires.....	617		
ROUVIER (J.). — Identité de la dengue et de la grippe-influenza.....	618		
ROUX (D ^r). — Formulaire aide-mémoire de la Faculté de Médecine et des Médecins des Hôpitaux de Paris.....	344		
ROUX et NOCARD. — A quel moment le virus rabique apparaît-il dans la bave des animaux enragés?.....	278		
SAEGER. — La blennorrhagie chez la femme.....	314		
SAJOSZ (Charles-E.). — Annual of the universal medical Sciences.....	617		
SCHAFFER. — Nouvelle contribution à la pathologie et à l'histologie de la rage humaine.....	88		
SOLOWJEFF (A.). — Zur frage der Etiologie der akuten Peritonitis.....	183		
TARNIER et VIGNAL. — Recherches expérimentales sur l'action de quelques antiseptiques sur le Streptococcus et le Staphylococcus pyogenes aureus.....	788		
TRIPIER (D ^r R.). — Note sur un fait contribuant à établir l'existence de l'endocardite tuberculeuse.....	743		
VERNEUIL (A.). — Propriétés pathogènes des microbes enfermés dans les tumeurs malignes.....	88		
VILLAIN et BASSOU. — Manuel de l'inspecteur des viandes.....	314		
VINCENT (H.). — Sur la présence d'éléments semblables aux Psorospermies dans l'Epithelioma pavimenteux.....	247		
WATERHOUSE (H.-J.). — Experimentelle Untersuchung über Peritonitis.....	183		
WICKAM (L.). — Anatomie pathologique et nature de la « Maladie de Pajet du Manelon. ».....	88		
WORMS (J.). — Etude clinique sur le diabète sucré.....	450		
		THÈSES POUR LE DOCTORAT ÈS-SCIENCES, PRÉSENTÉES A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS (1889-1890) ET ANALYSÉES DANS LA REVUE EN 1890.	
		1^o Sciences mathématiques.	
		ANDRADE (J.). — Sur le mouvement d'un corps soumis à l'attraction newtonienne de deux corps fixes, et sur l'extension d'une propriété des mouvements képlériens.....	709
		BLUTEL (E.). — Recherches sur les surfaces qui sont en même temps lieux de coniques et enveloppes de cônes du second degré.....	519
		CARVALLO. — Résolution numérique des équations algébriques transcendentes.....	245
		LYON (L.). — Sur les courbes à torsion constante.....	585
		RIVIEREAU (F.). — Sur les invariants de certaines classes d'équations différentielles homogènes par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées.....	739
		ZAREMBA. — Sur un problème concernant l'état calorifique d'un corps solide homogène indéfini.....	54
		2^o Sciences physiques (Physique et Chimie).	
		AUGER (Victor). — Sur les chlorures d'acides bibasiques.....	520
		CARVALLO. — Influence du terme de dispersion de Briot sur les lois de la double réfraction.....	275
		CHASSY (A.). — Sur un nouveau transport électrique des sels dissous.....	414
		COUETTE (Maurice). — Etude sur le frottement des liquides.....	491
		GOSART (M.-E.). — Mesure des tensions superficielles dans les liquides en calcéfaction.....	54
		JANET (Paul). — Etude théorique et expérimentale sur l'aimantation transversale des conducteurs magnétiques.....	380
		MATHIAS (E.). — Sur la chaleur latente de vaporisation des gaz liquéfiés.....	245
		MESLIN (G.). — Sur la polarisation elliptique des rayons réfléchis et transmis par les lames métalliques minces.....	311
		POINCARÉ (Lucien). — Recherches sur les Electrolytes fondus.....	412
		3^o Sciences naturelles.	
		BERGERON (Jules). — Etude géologique du massif ancien situé au sud du Plateau Central.....	648
		BIGOT (A.). — L'Archéen et le Cambrien dans le nord du massif Breton et leurs équivalents dans le nord du Pays de Galles.....	785
		CHEVREL (René). — Sur l'anatomie du système nerveux grand sympathique des Elasmobranches et des Poissons osseux.....	277
		DAQUILLON (Aug.). — Recherches morphologiques sur les feuilles des Conifères.....	521
		FLOT (Léon). — Recherches sur la structure comparée de la tige des arbres.....	712
		GUILLET (F.). — Recherches sur les Lepadogasters.....	24
		LALANNE (G.). — Recherches sur les caractères anatomiques des feuilles persistantes.....	553
		LESAGE. — Influence du bord de la mer sur la structure des feuilles.....	677
		PERRIER (Rémy). — Recherches sur l'anatomie et l'histologie du rein des Gastéropodes prosobranches.....	246
		SAINT-RÉMY (G.). — Contribution à l'étude du cerveau chez les Arthropodes trachéates.....	712
		SEUNES (J.). — Recherches géologiques sur les terrains secondaires et l'Eocène inférieur de la région sous-pyrénéenne du sud-ouest de la France.....	453
		WELSCH (Jules). — Les terrains secondaires des environs de Tiaret et de Frenda.....	492

III. — ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

Académie des Sciences de Paris

Séances des	6	13-20	janvier	1890	27
—	13-20	—	—	—	57
—	27	—	—	—	89
—	3	février	—	—	89
—	10-17	—	—	—	120
—	24	—	—	—	151
—	3	mars	—	—	151
—	10-17	—	—	—	184
—	24	—	—	—	217
—	31	—	—	—	218
—	8-14	avril	—	—	218
—	21-28	—	—	—	279
—	5-12	mai	—	—	315
—	19-27	—	—	—	315
—	2-9	juin	—	—	384
—	16	—	—	—	385
—	23-30	—	—	—	416
—	7	juillet	—	—	455
—	15	—	—	—	456
—	21	—	—	—	494
—	28	—	—	—	524
—	4	août	—	—	524
—	11-18	—	—	—	525
—	25	—	—	—	556
—	1	septembre	—	—	556
—	8-15	—	—	—	590
—	22-29	—	—	—	619
—	6-13	octobre	—	—	650
—	20	—	—	—	651
—	27	—	—	—	679
—	3	novembre	—	—	679
—	10-17	—	—	—	713
—	24	—	—	—	744
—	1	décembre	—	—	744
—	8-15	—	—	—	789
—	22	—	—	—	790

Académie de Médecine

Séances des	7	14-21	janvier	1890	27
—	14-21	—	—	—	58
—	28	—	—	—	90
—	4	février	—	—	90
—	11-18	—	—	—	121
—	25	—	—	—	152
—	2	mars	—	—	152
—	18-25	—	—	—	185
—	2-8	avril	—	—	218
—	15-22	—	—	—	219
—	29	—	—	—	280
—	6	mai	—	—	280
—	13-20	—	—	—	316
—	3	juin	—	—	316
—	10	—	—	—	385
—	17	—	—	—	386
—	24	—	—	—	417
—	1	juillet	—	—	417
—	15-22	—	—	—	456
—	29	—	—	—	494
—	12	août	—	—	525
—	19-26	—	—	—	557
—	2	septembre	—	—	557
—	9-16	—	—	—	591
—	23-30	—	—	—	620
—	7-14	octobre	—	—	631
—	21-28	—	—	—	680
—	4	novembre	—	—	680
—	11-18	—	—	—	714
—	2	décembre	—	—	745
—	9	—	—	—	790

Société de Biologie

Séances des	4-11	18-25	janvier	1890	28
—	18-25	—	—	—	59
—	1	février	—	—	90
—	8	—	—	—	91
—	15	—	—	—	132
—	22	—	—	—	153
—	1er	mars	—	—	153
—	8-15-22	—	—	—	185
—	29	—	—	—	219
—	19	avril	—	—	249
—	26	—	—	—	280
—	3	mai	—	—	281
—	10-17	—	—	—	316
—	24-31	—	—	—	346
—	7	juin	—	—	346
—	14-21	—	—	—	386
—	28	—	—	—	417
—	5	juillet	—	—	418
—	12-19	—	—	—	457
—	26	—	—	—	495
—	11-18	octobre	—	—	652
—	25	—	—	—	680
—	8	novembre	—	—	680
—	15	—	—	—	714
—	22	—	—	—	715
—	29	—	—	—	745
—	6	décembre	—	—	745
—	13	—	—	—	790
—	20	—	—	—	791

Société française de Physique

Séances des	19	7	janvier	1890	59
—	7	—	février	—	91
—	21	—	—	—	122
—	7	mars	—	—	153
—	21	—	—	—	186
—	18	avril	—	—	249
—	2	mai	—	—	281
—	16	—	—	—	316
—	6	juin	—	—	347
—	20	—	—	—	386
—	4	juillet	—	—	418
—	18	—	—	—	457
—	21	novembre	—	—	715
—	6	décembre	—	—	746
—	19	—	—	—	791

Société chimique de Paris

Séances des	24	7-14-28	janvier	1890	186
—	7-14-28	février	—	—	186
—	7-14	mars	—	—	186
—	28	—	—	—	281
—	11-25	avril	—	—	281
—	3	mai	—	—	281
—	8-23	—	—	—	347
—	14-28	novembre	—	—	746
—	3	décembre	—	—	746
—	12	—	—	—	791

Association technique maritime

Séances des	26	27	juin	1890	526
—	27	—	—	—	591

Société royale de Londres

Séances des	19	9-16	décembre	1889	28
—	9-16	janvier	1890	—	60
—	23-30	—	—	—	92

Séances des 6	février	—	92	Séances des 13	mars	—	488
— 13-20	—	—	454	— 20	—	221 et	283
— 6	mars	—	455	— 27	—	—	283
— 13	—	—	186	— 10	avril	—	283
— 27	—	219 et	250	— 17-24	—	—	318
— 17	avril	—	250	— 8-22	mai	—	388
— 24	—	—	281	— 5	juin	—	389
— 1	mai	—	282	— 12	—	—	420
— 8	—	—	317	Communications reçues pendant les vacances	—	—	682
— 22	—	—	347	Séances des 13	novembre	1890	748
— 5	juin	—	387	— 10-27	—	—	794
— 12	—	—	418	— 4	décembre	—	795
— 19	—	—	458				
— 20	novembre	—	715				
— 27	—	—	716				
— 11	décembre	—	792				
Société de Physique de Londres				Société de Physique de Berlin			
Séances des 17	janvier	1890	60	Séances des 20	décembre	1889	30
— 7	février	—	123	— 7	février	1890	94
— 21	—	—	156	— 21	—	—	126
— 7	mars	—	187	— 7	mars	—	157
— 21	—	—	219	— 20	—	—	189
— 18	avril	—	283	— 18	avril	—	284
— 2	mai	—	317	— 16	mai	—	319
— 16	—	—	318	— 30	—	—	349
— 6	juin	—	387	— 13	juin	—	389
— 20	—	—	419	— 24	octobre	—	683
— 15	novembre	—	716	— 7-21	novembre	—	717
— 28	—	—	792	— 5	décembre	—	748
— 12	décembre	—	793				
Société de Chimie de Londres				Société de Physiologie de Berlin			
Séances des 16	janvier	1890	61	Séances des 14	mars	1890	189
— 6	février	—	122	— 28	—	—	221
— 20	—	—	157	— 25	avril	—	284
— 6	mars	—	187	— 9-23	mai	—	319
— 27	(banquet)	—	222	— 6	juin	—	389
— 20	—	—	251	— 31	octobre	—	718
— 3	avril	—	251	— 14-28	novembre	—	748
— 17	—	—	283				
— 1	mai	—	318				
— 15	—	318 et	388				
— 5	juin	—	420				
Communications reçues pendant les vacances	—	—	681				
Séances des 6	novembre	1890	716				
— 1	décembre	—	793				
Société royale d'Edimbourg				Académie des Sciences de Saint-Petersbourg			
Séance du 1 ^{er}	décembre	1890	747	Séances des 28	janvier	1890	93
— 15	—	—	793	— 12	février	—	123
Académie royale de Belgique				— 25	—	—	187
Séances des 17	décembre	1889	30	— 11	mars	—	220
— 4	janvier	1890	91	— 25	—	—	221
— 4	février	—	124	— 22	avril	—	319
— 4	mars	—	220 et	— 6	mai	—	319
— 4	avril	—	252	Communications reçues pendant les vacances	—	—	683
— 3	mai	—	319	Séances des 23	septembre	1890	681
— 7	juin	—	420	— 9	octobre	—	717
— 5	juillet	—	459	— 4-18	novembre	—	719
Communications reçues pendant les vacances	—	—	681	— 2	décembre	—	795
Séances des 11	octobre	1890	682				
— 8	novembre	—	747				
Académie des Sciences de Berlin				Sociétés savantes d'Odessa			
Séances des 12	décembre	1889	30	Séances de	janvier-février	1890	188
— 19	—	—	61	—	mars-avril	—	253
— 9	janvier	1890	61	—	mai-juin	—	319 et
— 16-30	—	—	157	—	octobre	—	685
— 6-13	février	—	157				
— 20-27	—	—	188				
				Académie des Sciences de Vienne			
				Séances des 9	janvier	1890	29
				— 16	—	—	61
				— 23	—	—	91
				— 6	février	—	126
				— 13	—	—	153
				— 6	mars	—	189
				— 13	—	—	190
				— 20	—	—	221
				— 17	avril	—	284
				— 24	—	—	320
				— 8	mai	—	320
				— 16	—	—	350
				— 6-12	juin	—	390
				— 19	—	—	421
				— 3-10	juillet	—	460
				— 17	—	—	495

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

9

Séances des 9	octobre	—	685
— 16-23	—	—	686
— 6	novembre	—	718
— 13	—	—	719
— 20	—	—	796
— 4-11	décembre	—	796

Académie des Sciences de Turin

Séances des 29	décembre 1889	32
— 12	janvier 1890	61

Académie de Médecine vétérinaire de Turin

Séances des 23	décembre 1889	32
— 12	janvier 1890	62
— 8-23	février	158

Académie des Sciences de Naples

Séances des 5-11	janvier 1890	191
— 1	février	191

Séances des 8	—	—	222
— 1	mars	—	222

Académie royale des Lincei

Séances des 4-8-15	décembre 1889	31
— 49	janvier 1890	61
— 2	février	95
— 16	—	127
— 2	mars	158
— 16	—	190
— 13-20	avril	254
— 4	mai	286
— 18	—	350
— 1	juin	390
— 15	—	391
— 6	juillet	422
Communications faites	pendant les vacances	750
Séance du 7 décembre	1890	751

IV. — COURRIERS

Courriers de Genève	191 et	357
— Berlin	—	286
— Naples	—	422

Courrier d'Amsterdam	—	526
— Rome	—	620

V. — CHRONIQUES

BERGET (Alph.). — La pile-bloc à liquide immobilisé...	652
DEBÉRATIN (Henri). — Les voyages d'étudiants à propos du sixième centenaire de l'Université de Montpellier.	351
DELAGE (Yves). — Sur le mode d'action de la lymphé de Koch.	797
L. O. (Louis Olivier). — L'observation des éléments histologiques à la température normale de la vie.	423

— La composition des eaux de drainage.	496
— Dynamomètre universel à lecture directe du travail.	527
— L'assistance médicale par les dispensaires dans les campagnes.	686
— L'Eloge académique d'Ed. Phillips.	718
GARRIGOU (D ^r F.). — Le gisement de Brushite de la grotte de Minerve (Aude).	359
X... — Les nouveaux torpilleurs chauffés au pétrole.	623

VI. — CONGRÈS

Association française pour l'avancement des Sciences. Congrès de Limoges, 7-14 août 1890.	463
---	-----

GARRIGOU (D ^r F.). — Le premier congrès de l'Association pyrénéenne à Narbonne.	624
--	-----

VII. — CORRESPONDANCE

a Conférence télégraphique internationale et l'heure universelle. (Lettres de MM. Tondini de Quarenghi et E. Caspari.)	461
--	-----

Sur les Cyclones (Lettres de MM. Ch. Weyher et H. Faye).	559
Sur la biographie de Hirn (Lettre de M. Dwelshauvers-Dery)	653

VIII. — NOTICES NÉCROLOGIQUES

BERGERON (J.). — Hébert (Edmond)	223
CASTEX (A.). — Trélat (Ulysse)	255
CHARRIN (D ^r). — Toussaint (H.)	651
FLOQUET (G.). — Mathieu (Emile)	687
HAUG (E.). — Neumayr (Melchior)	159

— Grad (Charles)	421
OLIVIER (Louis) [L. O.] — Pélégot (Eugène)	256
— Soret (Louis)	352
WITZ (Aimé). — Hien (G. A.)	62

IX. — NOUVELLES

BICOURDAN (G.) [G. B.]. — L'éclipse totale de Soleil du 22 décembre 1889.....	22	MATHIAS (E.). — La transmission instantanée des images par l'électricité.....	798
— Découverte d'une planète entre Mars et Jupiter....	160	MUYDEN (G. Van). — L'éclairage électrique à Berlin....	424
— Découverte de deux planètes et d'une Comète.....	192	OLIVIER (Louis) [L. O.]. — Expériences de M. O. Lodge sur la résonance électrique.....	127
— Découverte de deux planètes (291) et (135).....	320	— Propriétés magnétiques et électriques du fer et de ses alliages. (Travaux du D ^r J. Hopkinson et de M. H. Le Chatelier).....	159
— Comètes.....	424	— L'éclipse solaire du 17 juin 1890.....	392
— Deux nouvelles Comètes.....	528	— La découverte du Biophène.....	462
DURAND-FARDEL (D ^r Ray.). — La lèpre dans les colonies anglaises.....	96	— Le discours de M. A. Cornu au congrès de Liège.....	496
GUILLAUME (Ch. Ed.). — La discussion récente des expériences de M. Hertz.....	63	— Les observations spectroscopiques de M. J. Janssen au sommet du Mont-Blanc.....	560
GUYE (Ph. A.). — La synthèse des fluorures de carbone. — Synthèses de la néphéline, l'amphigène et la sodalite.....	95	— Le fluor libre dans la Nature.....	688
— L'équation des fluides.....	288	— Les expériences de M. Robert Koch sur la guérison de la Tuberculose.....	719
— Un nouveau gaz : L'acide azothydrique.....	656	— La vaccination contre le tétanos et la diphtérie....	752
HEUDE (P. M.). — Hyracodontotherium et Prosytherium	800	POINCARÉ (L.). — Les perturbations de Mercure et les lois électrodynamiques de Gauss.....	127
HOPKINSON (D ^r J.). — Propriétés magnétiques et électriques du fer et de ses alliages.....	139	— Production d'un champ électrique par un phénomène optique.....	687
MAQUENNE (L.). — Synthèse de l'acide gluconique et de la dextrose.....	224	SAUVAGEAU (C.). — Une nouvelle plante reviviscente...	128
— Nouvelles recherches sur les Sucres.....	592		

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS ¹

A

Abadie, 714.
Abbé (d'Iéna), 489.
Abel (John), 189.
Abels, 93, 683.
Abraham (D^r), 96, 619, 679, 713, 715.
Achalmé, 386.
Achiard, 184, 346.
Acqua, 392.
Adamkiewicz, 390, 749, 796.
Adie, 61.
Adler (August), 685, 718.
Adler (G.), 94, 460.
Agamennone, 31, 234, 391.
Agerton, 220.
Aignan (A.), 385.
Airoldi, 62.
Airy, 322, 737.
Albini, 191.
Albin-Mennier, 52.
Alcantara (Dom Pedro d'), 650, 790.
Albert (d'), 22.
Alharracin (D^r), 426.
Amagat (E.), 385, 711, 789.
Amat (L.), 89, 280, 713.
Ampère, 38, 226, 230.
Anderlini, 158.
Andrade Corvo (de), 730.
Andrade (J.), 709.
Andral, 18.
André (de Lyon), 279.
André, 315, 455, 570.
André (Ch.), 789.
Andrews (Thomas), 387.
Angeli, 286.
Angelitti, 222.
Angot (Alfred), 384, 715.
Angström, 783.
Ankersmit, 791.
Annales de l'Observatoire de Nice, 739.
Anotta, 714.
Antoine (Ch.), 57, 120, 217, 384, 385.
Apostoli, 280.
Appell (Paul), 27, 89, **97 à 99**, 180, 345, 679, 709, 739.
Arachequesne (G.), 217.
Argutinsky (P.), 118.
Argyropoulos (F.), 630.
Aristote, 65.
Arloing (S.), 315, **567**.
Armstrong, 122, 348, 388, 420, 681.
Arnaud, 71.
Arons, 682.
Arrhénius (Swante), 197, 198, 232, 495.
Arsonval (d'), 234, 249, 386, 586, 791.
Arthaud, 28, 59, 91.
Arthur, 730.
Asaph Hall, 175.
Ascoli, 350, 391.
Assafry, 93.
Assmann (D^r), 30.
Asten (von), 66.

Astley Gresweel, 788.
Astre, 184, 351.
Aubin, 186.
Auer von Welsbach, 401.
Augé (E.), 381.
Auger (V.), 89, 186, 520.
Auscher, 495.
Autonne (Léon), 585.
Auwers, 173.
Avogadro, 226.
Ayrton, 60, 423, 792, 798.

B

Babès (V.), 249, 258, 315, 316, 426, 523.
Backlund (O.), 30, 66, 93, 123, 188, 221, 319, 685, 749, 795.
Bacon, 226.
Beckel (J.), 280, 316.
Baes, 62.
Baeyer, 166, 226, 229, 450.
Bailey, 157.
Baillaud, 650.
Baillo (J.-B.), 302.
Baillon (H.), 710.
Baily, 22.
Balfour, 596.
Ball, 249, 391.
Ballance (A.), 282.
Balland, 789.
Bamberg (van), 190.
Bamberger (Narc), 421.
Banks, 104.
Bar (D^r), 106.
Barbier (Ph.), 152, 184, 345, 494, 534, 552.
Bard (D^r L.), 26.
Bardleben, 376.
Bardy (Ch.), 343.
Barillot (Ernest), 432.
Barlux North, 748.
Barnard, 67, 650.
Baroncelli, 192.
Barral, 416.
Barré, 789.
Barré de Saint-Venant, 80, 82, 379.
Barrois, 43.
Bartet (E.), 385.
Barthe (L.), 525.
Barthélemy (D^r), 150.
Barthes, 557.
Barus (Carl), 276.
Bary (de), 335.
Bascon (V.), 314.
Basset (A.-B.), 28, 631.
Bassi, 296.
Bassini, 232.
Bastit (E.), 745.
Bataillon (E.), 185, 385.
Battelli, 350.
Baudon, 651.
Baume-Plavin (de la), 120, 416, 321.
Baumgarten, 19.
Bannis, 56.
Bayle, 20.
Baynes, 369.
Bayrac, 121.

Bazin, 95, 120.
Bazy (D^r), 314, 417.
Beard, 373, 374.
Beauegy, 120.
Beaulard, 345, 494.
Beaumont (Elie de), 43, 45.
Beaunis (H.), 56, 382.
Beauregard (H.), **70 à 76**, 88, 218, 246, **370 à 378**, 589, 681.
Bech, 187.
Béchamp, 347.
Becke, 126.
Becker, 226.
Bequerel (H.), 151, 688, 713.
Beddard, 747.
Beever (C.), 158.
Beevor (G.), 419.
Behal (A.), 89, 186, 281, 385, 716.
Behrend, 229.
Behring, 752.
Beilstein, 93.
Beketof, 683.
Beketow, 488.
Béketoß, 93.
Beltrami (E.), 315.
Bénédict, 421.
Bérard, 274.
Berchem (P. van), 57.
Berg, 93, 279, 455, 679, 795.
Berger, 58, 314, 651.
Bergeron (D^r), 90.
Bergeron (J.), 43, 224, 312, 493, 618, 700.
Berget (Alph.), 57, 586, 633.
Berghaus, 452.
Bergman, 1, 795.
Berliner (Emile), 286.
Bernard (Félix), **668**, 787.
Bernard (Claude), 299.
Bernouilli, 77, 195, 226, 366.
Bert (Paul), 128, 198.
Bertacchi, 32, 62.
Berthelot (Marcellin), 30, 57, 58, 95, 165, 184, 185, 217, 218, 226, 227, 229, 231, 233, 279, 313, 338, 345, 384, 385, 455, 494, 525, 572, 619, 688, 713, 714, 790.
Berthelot (Daniel), 218.
Bertillon (D^r J.), 26.
Bertin, 79.
Bertrand (Joseph), 5, 9, 10, 11, 33 à 40, 85, 127, 174, 431, 670, **753 à 760**, **760 à 762**.
Bertrand (D^r), 44, 152, 280, 382, 493, 672.
Berzélius, 227.
Bessel, 22, 66, 68.
Besson, 57, 89, 184, 385, 790.
Bevan, 157.
Beynstein, 457.
Bézier, 590.
Bezold (de), 283, 795.
Bianchi, 254, 285, 350, 391.
Bichat, 307.
Bichner, 684.
Bidet (André), 455, 716.
Bidschof, 796.
Biéla, 67.
Bigiavi, 254.

¹ Les noms imprimés en caractères gras sont ceux des auteurs des articles originaux. Les chiffres gras reportent à ces articles.

- Bigot, 186, 619, 785.
Bigourdan (G.), 21, 32, **65 à 70**, 118, **172 à 179**, 218, 311, 528, 556, 590, 650, 675, 714.
 Billing, 562.
 Billy (de), 51, 550.
 Biltz, 147.
 Binder, 320.
 Bioche, 184.
 Biolopolski, 749.
 Biot, 38.
 Bla Kesley, 283, 793.
 Black, 419.
 Blaise, 93.
 Blackley, 318.
 Blake (J.), 455.
 Blanc Louis, 521.
 Blanchard (Emile), 151, 248.
 Blanchard (Raphaël), 120, 382, 417, 418, 456, 588, 620.
 Blaserna, 31.
 Blatti, 306.
 Bleicher, 385.
Blix (Magnus), **737**.
 Bloch (Salvator R.), 744.
 Blocq, 133, 418.
 Blondlot, 307.
 Blutel, 519.
 Bohlyer, 93.
 Bohm (J.), 312.
 Boggio-Lera, 158.
 Bohr (Ch.), 89, 494, 521.
 Boidin, 676.
 Boinet (R.), 59.
 Boiret, 649.
 Bois (du), 682.
 Boisseau du Rocher, 790.
 Boisselier, 44.
 Bonadorff, 93.
 Bonnier (Gaston), 121, 556.
 Bonnier (J.), 790.
 Bonuzzi, 621, 622.
 Boquet, 789.
 Borda (de), 21.
Bordas, 89, **143 à 145**, 525.
 Bordiga, 31.
 Bordoni-Uffreduzzi, 752.
 Borgman, 89, 279, 308.
 Bornet, 215.
 Borrel (A.), 59, 457.
 Bortkevitch, 220.
 Bose, 347, 386, 791.
 Boschetti (Dr F.), 32, 61, 62, 88, 158, 344, 522.
 Boscowitch (le P.), 230.
 Botey (R.), 493.
 Bossut, 66.
 Bouasse, 456, 791.
Bouchard (Dr), 18, 20, 90, 217, 279, 384, **466**, 619.
 Boucheron (Dr), 52, 495.
Boucheron (Henri), **412**, 456.
 Boudier, 328.
 Bouguer, 22.
 Bouilly, 449.
 Boule (Marcellin), 456.
 Boulouch, 679.
 Bouloumié (Dr), 453.
 Bourgeat, 346, 556, 590.
 Bourgeois, 184, 186.
 Bourguet, 386.
 Boussinesq (J.), 80, 384, 385, 416, 494, 613.
 Boussingault, 102, 103, 233, 299.
 Boutigny, 54.
 Boutlerow, 169.
 Bouteroux (L.), 494.
 Bouty, 82, 123, 153, 279, 316, 416, 457, 614.
 Bouveault, 636, 651.
 Bouvier (E.-L.), 151, 182, 385, 491.
 Boyer, 315, 494.
 Boys, 123, 156, 282, 318, 388, 419.
 Brandza (Marcel), 385, 529.
 Branly, 248, 279, 744.
 Branquet, 348.
 Brauer, 73.
 Braun (F.), 394.
 Brauner, 118, 495, 686, 793.
 Bréal (E.), 149.
 Breda de Haan J.), 527.
 Bredichin, 68.
 Brédikhin, 684.
 Breunand, 792.
 Bretonneau, 70.
 Breunor (Adalbert), 685.
 Brewster, 229.
 Briart (Alphonse), 30.
Brillouin (Marcel), 22, **141 à 143**, 309, 710.
 Brioschi, 422, 750.
 Briscoe, 419.
 Brissaud, 212, 495.
 Broca, 547.
 Brodhun, 189, 683.
 Brongniart, 71.
 Brooks, 66, 67, 192.
 Brouardel, 58, 90, 106, 121, 259, 714.
 Brouncker, 793.
 Broussais, 18, 258.
 Broussilowsky (Dr), 121.
 Brouvier, 49.
 Brown (Bum), 747.
 Brown (Horace), 251.
 Brown-Séguard (Dr), 28, 316, 386, 417, 791.
 Bruchietti, 750.
 Brulli, 790.
 Bruhns, 349.
 Brunhes (Bernard), 80, 147, 181, 342, 380, 413, 494, 552, 782.
 Bruns, 389.
 Brusaferrro, 158.
 Bryan (G.-R.), 219.
 Buat (du), 22.
 Buchanan, 438, 747.
 Buchet (Gaston), 28.
 Buchner, 123.
 Budde (E.), 94.
Budin (Dr), 90, **406 à 411**, 121, 183, 385.
 Budistheano, 186.
 Bukowski (Dr), 390, 461, 685.
 Bunn, 183.
 Bunsen, 472, 529.
 Burch, 347, 747.
 Burckhardt, 68.
 Burdon Sanderson, 282, 347.
 Bureau, 41, 121, 128.
 Burrill (Thomas), 731.
 Bursault (Henri), 218.
 Butte, 28, 59, 91.
 Buys Ballot, 252.
 C
 C. E., 451.
 Cabadé (Dr), 493.
 Cadacé, 52, 59, 296, 632.
 Cademat, 650.
 Cadet (G. Le), 279.
 Cadet de Gassicourt, 316.
 Cadot, 652.
 Cailletet, 791.
 Calderon, 590, 746.
 Caligny (de), 416, 420, 459.
 Callandrea, 217, 275, 315, 455, 679, 789.
 Cambemale, 316.
 Campbell, 122.
 Campredon (L.), 676.
 Canéani, 31.
 Cantone, 95, 214.
 Cantor (Mathias), 495.
 Canu, 744, 789.
 Capellini, 95, 158.
 Caralp (J.), 185.
Caracé, 43, 463, **576**.
 Carità, 298.
 Carl Barus, 276.
 Carlet (G.), 121.
 Carnelley (Thomas), 388.
 Carnot (Sadi), 4, 130.
 Carnot (Ad.), 50, 281, 494, 789.
 Carnoy, 242.
 Carpentier, 577.
 Cartier, 50.
 Carus-Wilson (A.), 250, 317.
 Carvallo, 151, 186, 243, 275.
Caspari (E.), **321 à 325**, 461, 462, 521, 791.
 Cassedebat, 248, 386.
 Cassini, 21.
Castex (Dr), 255, 314, **516**.
 Cathelineau, 249, 281, 791.
 Cauchy, 78, 721.
 Cavalli, 31, 254.
 Cayeux, 120.
 Cayley (A.), 89, 619, 790.
 Cazal (du), 152.
 Cazeneuve, 218, 248, 315, 713.
 Cellérier, 315.
 Celli, 295.
 Cels, 789.
 Céraski, 178.
 Cérésolo, 116.
 Certes, 588.
 Cesáro, 31, 384, 751.
 Chabot, 524.
 Chabré (C.), 58, 95, 96, 120, 152, 186, 385, 714.
 Chabry, 495.
 Chamberland, 47, 87.
 Chambon, 790, 791.
 Chancourtois, 22, 219.
 Chandler, 66.
 Chaney (H.), 458.
 Chantelesse, 143.
 Chapel, 556.
 Chaperon, 317, 317.
 Chaput, 122, 745.
 Charcot, 211.
 Chardin, 746.
 Chardonnet (de), 114.
 Charlois, 192, 248, 320, 416, 524, 556.
 Charpentier, 121, 281, 316, 346, 616, 652.
 Charpeaut, 716.
Charpy (Georges), 23, 24, 87, 89, 118, 182, 215, 276, 343, 414, 452, 456, **540**, 553, 615, 630, 648, **657**, 676, 679, 710, 785.
Charrin (Dr), 59, 249, 280, 316, 346, 347, 384, 418, **441**, 457, 495, 554, 618, 652, 656, 681, 791.
 Chassagny, 619, 679, 713, 745.
 Chassy (A.), 347, 411.
 Chatin (Ad.), 451, 152, 790.
 Chatin (J.), 28, 151, 745, 789.
 Chauveau, 50, 95, 455, 456, 494, 563, 790.
 Chauvel, 58, 119, 185, 651.
 Chavanon, 205.
 Chave, 495.
 Chêne, 32.
 Chesneau, 521.
 Chevalier, 218.

- Chevrel, 277.
 Chézeaux (de), 66.
 Chklar, 220.
 Choay, 385, 716.
 Chrée, 29.
 Chwolson, 319.
 Ciamician, 285, 350, 391.
 Ciani, 285, 391.
 Clarke, 40, 130.
 Claudel (Louis), 120.
 Claus, 221.
 Clausius, 5, 9, 195, 226, 293, 366, 370, 670.
 Cloez (Ch.), 132, 185, 186, 281.
 Cobes, 557.
 Coggia, 491, 523, 731.
 Colas (Et.), 59.
 Colladon, 619.
 Collaud, 557.
 Collie, 681.
 Colley, 218.
 Collilanzi, 62.
 Colin, 121, 218, 521, 715.
 Collot, 44.
 Colson (A.), 381, 456, 524, 789, 791.
 Colson (R.), 147.
 Combemale, 249, 457, 524.
 Comberousse, 111.
 Combes (A.), 186, 524, 590.
 Combes (Ch.), 27.
 Commenge (D^r), 27.
 Condamine (La), 21.
 Contarino, 191.
 Contejean (Ch.), 249, 556, 679, 715.
 Cooper Curtrice, 619.
 Coppola, 254.
 Cornet (de Berlin), 27.
 Cornil (D^r), 18, 51, 150, 258, 316, 417, 523.
 Cornu (A.), 57, 61, 70, 178, 184, 249, 304, 345, 496, 790.
 Cosserrat, 279, 384, 524.
 Cosson (Ernest), 760 à 762.
 Costa, 285, 750.
 Cotteau, 247.
 Couette (Maurice), 79, 80, 491.
 Coulomb, 36, 79.
 Couper, 227.
 Coupard, 454.
 Courmont, 249, 316, 680, 713, 715.
 Courty, 248, 345, 416, 524, 590, 619, 631, 789.
 Couturier, 281.
 Cowper, 376.
 Crafts, 230.
 Créquy, 121.
 Cristiani (D^r), 192, 558.
 Crivelli, 316.
 Crookes (William), 23, 229, 230, 401.
 Crookshank, 295.
 Cross, 457.
 Crozat, 15.
 Cuboni, 422.
 Cuénot, 248, 385, 745.
 Cuiziniér, 526.
 Curtel, 650.
 Cartillet (D^r), 26.
 Curtius, 656.
 Czermak (D^r), 390.
- D**
- Daguillon (Aug.), 521.
 Damien (P.), 96.
 Dangeard (P.), 90, 557.
 Daniel, 345.
 Danion, 152.
 Darboux, 95, 99, 279, 493.
 Darenberg, 346.
 Daresté, 384, 457.
 Dastre (A.), 313, 417, 514.
 Daubrée, 27, 316, 345, 680, 744, 789.
 Dautherville, 789.
 Dautsches (Victor de), 61.
 Davaine, 106.
 Davison (Ch.), 458.
 Debove, 20.
 Debray, 457.
 Decharme (C.), 315, 345, 525.
 Dechevrens (Marc.), 345, 384.
 Decœur (P.), 315.
 Decrais, 262.
 Decroix, 651.
 Degagny, 525, 714.
 Delcraïn (P.P.), 89, 352, **177**, 196, 525.
 Delcraïn (Henri), 351.
 Deinda, 94.
 Déjérine, 91, 185, 211, 418, 457.
 Déjérine-Klumpke (Mme), 211, 212.
 Delachanal, 455, 592.
 Delacroix, 494.
 Delafond, 44.
 Delafontaine, 400.
 Delage (Yves), 217, 797.
 Delauney (C), 23.
 De Lavarenne (D^r E.), **17** à **20**, 26, 27, 59, 83, 90, 122, 150, 152, 183, 185, **211** à **213**, 219, 280, 316, 346, 386, 417, 454, 457, 523, 526, 652, 680, 714, 743, 745, **773** à **781**, 790.
 Delbet, 56.
 Delbœuf, 552.
 Delbos (J.), 46.
 Delebecque, 790.
 Delens (D^r), 25.
 Delpino (F.), 587.
 Del Re, 95, 254, 750.
 Delthil, 651.
 Demarçay (E.), 447, 311, **596**, 710.
 Demastres, 120.
 Dennoy, 743.
 Demoulin, 782.
 Denigès (G.), 345, 744.
 Deniker (J.), 382, 411, 588.
 Denning, 528.
 Denza, 590, 682, 790.
 Depasse, 557.
 Depéret, 44, 280, 789.
 Deprez (Marcel), 39, 40, 673.
 Déry, 306.
 Descartes, 226.
 Deschamps, 144.
 Descsquelle, 153.
 Deslandres (H.), 248, 651.
 Desnos, 651.
 Despeignes, 121.
 Dettweiler (D^r), 20.
 Devaurieux (Léon), 279.
 Devillers, 90.
 Dewar, 86, 87, 715.
 Diday, 218.
 Dierckx (G.), 184.
 Dieulafoy, 790.
 Dines (W.), 458.
 Dirichlet, 35.
 Ditte, 184, 248, 416.
 Dixon, 187.
 Doblin (Léonard), 420.
 Dohrn, 375.
 Doignon, 590.
 Doléris, 249.
 Dolter (C.), 320.
 Donath (Ed.), 29.
 Dor (Louis), 346, 680, 713, 715.
 Douglas-Maclagan, 747.
 Douliot, 236, 237, 238, 239.
 Doumer (E.), 27, 57, 345, 346, 552.
 Doumet-Adanson, 744.
 Doxford, 623.
 Doxon, 157.
 Doyen, 152.
 Drobrzynski, 685.
 Dronin (René), 745.
 Drygalski (Erich de), 269, 270, 271.
 Dubief (D^r), 88, 216, 217, 278, 383, 415, 555, 618, 678, 788.
 Dubini, 297.
 Dubiquet, 249.
 Dubois, 475.
Dubois (Raphaël), 121, 152, **198** à **208**, 455, 494, 523, 556, 617, 619, 680.
 Du Bois-Reymond, 30, 61, 126.
 Dubosq (Ch.), 186.
 Dubourg, 279.
 Duchartre (P.), 27.
 Duchenne (de Boulogne), 214.
 Duclaux, 78.
 Dufet, 457, 791.
 Dufourt, 185.
 Dufrenoy, 43, 45.
 Dufon, 717.
 Du Jardin-Beaumont (D^r), 51, 121, 152, 316, 346, 495, 391, 680.
 Dukynsky, 686.
 Dulong, 226.
 Dumas, 22, 227, 229, 233.
 Duménil, 89, 211, 791.
 Duméril, 70.
 Dumontpallier, 316.
 Dumoulin, 390.
 Duncan, 420.
 Dunstan, 187.
 Dupin, 97.
 Duplony, 417.
 Dupuy, 153, 386, 711.
 Durand-Claye, 49, 446.
 Durand-Fardel (D^r Ray.), 96, 119.
 Durégné, 790.
 Dutarte (Abel), 89, 679.
 Duval (Mathias), 316, 680, 681, 791.
 Du villier (E.), 217.
Dwelschauvers-Bery, 51, 63, **120** à **136**, 293, 491, 552, 614, 653, 739.
 Dyar, 112.
 Dyerim, 347.
 Dynamid, 318.
- E**
- Easterfield, 717.
 Eastman, 674.
 Ebermayer, 334.
 Eberth, 143.
 Ebner (von V.), 94.
 Eclude (A. de l'), 525.
 Edelmann, 186.
 Eder (J.), 320.
 Edison, 303.
 Elfront, 736.
 Eginitis (D.), 27, 57.
 Ehrmann, 281.
 Eisenhor (de Hambourg), 212.
 Elie, 79.
 Elliot, 217.
 Elster (J.), 320, 796.
 Emery, 254.
 Empereur, 279.
 Encke, 66.
 Engel, 184, 248.
 Enriquez, 391.
 Epping (J.), 21.
 Eeb, 211.
 Eich, 269.

Erikson, 4, 5, 239.
 Erenmeyer, 160.
 Ermengen (D^r), 239.
 Espine (D^r), 191.
 Espinasses (D^r), 220.
Etard (A.), 41 à 43, 89, 151, 193 à 198, 414.
 Eternod, 557.
 Ettinghausen, 686.
 Euler, 66, 77, 246.
 Evans, 290.
 Evans (D^r Griffith), 295.
 Ewart (D^r), 156.
 Ewers de Swerin, 19.
 Ewing, 29, 794.
 Exner (Franz), 160.
 Exner (Karl), 160.

F

Fabre (J.-H.), 44, 72, 74, 75.
 Fabre-Domergue, 59, 386, 715.
 Fabris, 391.
 Fabry (Ch.), 152, 279, 315, 679, 744.
 Facini, 258.
 Falk (F.), 349.
 Falke, 91.
 Famintzin, 123, 684.
 Faraday, 37, 63, 230.
 Fauchs, 495.
 Faurot, 27, 90.
 Fauvel, 523.
 Favero, 190.
 Favier, 15.
Faye, 66, 68, 70, 121, 271, 315, 322, 345, 354, 416, 456, 481, 197, 356, 359, 650, 744.
 Fazio (D^r), 678.
 Fedorof, 795.
 Fernbach, 52.
 Fengi (J.), 631, 713.
 Feoktissov, 123.
 Fénel, 249, 280, 281, 316, 316, 493, 632, 680, 715, 745.
 Féréol, 386.
 Fergola, 222.
 Ferran (D^r), 259.
 Ferranini (Andréa), 385.
 Ferraris (de), 306.
 Ferratini, 286, 350.
 Ferreira da Silva, 525.
 Ferrini, 190.
 Ferry (Ch.), 152.
 Ferry de la Bellone, 328.
 Feussner (D^r), 648.
 F. F. (Voir Folie).

Fihol (D^r), 161 à 164, 371.
 Finzi, 390.
 Firtsch (G.), 495.
 Fisch, 328.
 Fischel, 109.
 Fischer (Em.), 167, 168, 169, 170, 171, 224, 229.
 Fischer (P.), 151, 494, 521, 592.
 Fischer (Ph.), 268.
 Fitzgerald, 29, 123.
 Fizeau, 176.
 Flahault, 175, 239, 786.
 Fleischmann, 221.
 Fleming (J. A.), 59.
 Fleming (Sandford), 321.
 Fleury (L.), 525.
 Flinn (W.), 182.
 Floquet, 687.
 Flot (Léon), 712.
 Flourens (G.), 385.
 Flower, 371.

F. N., 118.
 Fogli, 181, 218, 494.
 Fol (H.), 345, 385, 433.
 Folie (F.), 91, 147, 121, 125, 220, 252, 253, 319, 345, 420, 459, 460, 653, 682, 617.
 Folin (de), 185.
 Fontannes, 44.
 Fonvielle (de), 315.
 Fonviolant (de), 218.
 Forbes, 793.
 Forecrand (de), 279, 280.
 Forné, 280.
 Fort (J.), 316, 651.
 Fortini, 556.
 Foscock, 495.
 Foster, 526.
 Foucault, 229.
 Fouqué, 44, 493, 697.
 Fournet (G.), 248, 279.
 Fournier (Dr Alfred), 90, 743.
 Fournioux, 117.
 Fowler, 154.
 Fraenkel (N.), 160.
 François, 316, 457, 521.
 Franck (François), 417, 588.
 Franck, 327, 747.
 Frank, 242, 326 à 331.
 Frankel, 48, 49.
 Frankland (C. Grace), 166.
 Frankland (C. Percy), 186.
 Franklin, 1, 380.
 Frauenhofer, 229.
Fredericq, 636.
 Fredholm, 217.
 Frémy, 15, 42, 245, 713.
 Freund (Aug.), 796.
 Freund (E.), 637.
 Freycinet (de), 53.
Fribourg (G.), 508.
 Friedel (C.), 96, 230, 288, 347, 385, 521.
 Friedel (G.), 288, 347, 385, 718.
 Friedreich, 189, 683.
 Friedlander, 153.
 Frew (W.), 388.
 Fröhner, 295.
 Fromager, 185.
 Froment, 390.
 Froschauer, 749.
 Frossard (Ch.), 316.
 Fuchs, 61, 388.
 Fulton, 290.
 Fumouze, 71.
 Fusari, 391, 422.

G

Gabriel (S.), 795.
 Gabritchewsky (D^r), 415.
 Gad, 319, 748.
 Gaffky, 143.
 Gager (Gustave), 686.
 Gadolin, 93, 187, 319.
 Gaillet (A.), 651.
 Galawine, 123.
 Galezowski, 316.
 Galippe, 153.
 Galitzine, 214.
 Galtier, 153.
 Galton Francis, 716.
 Gamaleia, 246, 247, 259, 260, 316, 381, 418, 790.
 Gangl (V. Ehrenwerth), 718.
 Ganzino, 61.
 Garbini, 422.
 Garetti, 158.
 Garibaldi, 31, 251.

Gariel (C.-M.), 302 à 309, 676.
 Garnier, 744.
 Garreau, 102, 299.
 Garrigou (D^r), 560, 624.
 Gaskell, 374.
 Gasser, 437.
Gaudry (A.), 30, 151, 152, 162, 465, 493, 556.
 Gaudry (L.), 162.
 Gaulard, 306.
 Gauss, 35, 38, 324.
 Gauthier (L.), 391.
Gautier (Armand), 90, 171, 225 à 231, 276, 288, 354 à 365, 450, 539, 567.
 Gautier (G.), 219, 539.
 Gautier (Henri), 56, 87, 89, 148, 182, 312, 381, 413, 452, 679.
 Gay-Lussac, 41, 196, 226, 477.
 Gayon, 279.
 Gebler, 76.
 Gegenbauer, 190, 350, 495, 685.
 Geisenheimer, 184, 279, 315, 416, 455.
 Geitel (H.), 320, 796.
 Gellé, 680.
 Genreau, 41.
 Genresse, 281.
 George (Hector), 150, 347.
 Georgesco, 186.
 Gérard (Eric), 342, 525, 676.
 Germain, 632.
 Germonprez, 249.
 Gernez, 91, 181, 416, 714.
 Gerosa, 390.
 Gerson (de), 525.
 Gessard, 151.
 Giacomelli, 750.
 Giana, 796.
 Giard (A.), 57.
 Giard (Jules), 249, 312.
 Gibelli, 328, 332.
 Gibbs, 306.
 Gibson (Jhon), 717.
 Giffard, 292.
 Gilbert (J. H.), 60, 281, 652, 680.
 Gilles de la Tourette, 249, 281, 791.
 Girard (Aimé), 57, 89, 345, 744, 786.
 Gladstone, 229, 420, 716, 792.
 Glénard, 249.
 Gley, 153, 316, 386, 417, 457, 521, 652.
 Glücksmann (C.), 421.
 Gnezda (D^r), 155.
 Goldberg, 220.
 Goldscheider, 189, 221, 748.
 Gombault, 211.
 Gomes Teixeira (F.), 379.
 Gonnard, 790.
 Gonnat, 446.
 Gorgon (A.), 90, 186, 279, 315, 317, 381.
 Gorgue, 281.
 Gossart, 54, 305.
 Gosselot, 44.
 Gothe, 796.
 Gouilly, 586, 782.
 Gouré de Villemontée, 418.
 Goursat (E.), 180.
 Gouy, 384, 385, 455, 789.
 Graber, 498.
 Grablovitz, 31, 254.
 Grad (Charles), 424.
 Graham, 104, 227.
 Gramme, 40.
 Grammont (de), 453.
 Grancher (D^r), 18, 20, 48, 144, 346, 525.
 Graud'Eury, 30.
 Grandis, 751.
 Grant, 157.
 Grassi, 297, 422.

Grebe, 47.
 Green (Dr J. W. Eldridge), 92.
 Green (J.-R.), 92.
 Grégoire (Richard), 29, 60, 92, 156, 187, 219, 231, 282, 317, 348, 387, 419, 459, 520, 716, 747, 792.
 Gréhan, 91, 121, 153, 280, 314, 678, 680.
 Grésnevsky, 93.
 Gressly, 421.
 Grew (N.), 100.
 Griffiths, 151, 458.
 Griglio, 62.
Grimaux (E.), 1, 132, 167, 171, 313, 347.
 Grobben, 686, 796.
 Gröbe, 229.
 Grothuss, 791.
 Gros, 315.
 Groslik, 335.
 Grosseteste, 63.
 Grossouvre (de), 44, 89.
 Grünvald, 285, 683.
 Guéde (H.), 523.
 Guenez (D.), 184, 186, 713.
 Guéniot, 121, 219, 417, 494.
 Guérin, 456, 591.
 Guernonprez (de), 557, 591, 620.
 Guettard, 100.
 Guglielmo, 750.
 Guichard (C.), 57, 315.
Guignard (L.), 28, 90, 152, 153, 187, 218, 241, **403**, 495, 524, 789.
 Guilbert (G.), 456.
Guillaume (Ch. Ed.), 61, 86, 153, 317, 413, **695**, 741, 783.
Guillemin (A.), **603**.
 Guinard, 790.
 Guinochet (E.), 27, 121.
 Gütel (F.), 24, 27, 416, 650, 714.
 Gulland, 791.
 Gundelach, 182.
 Günther, 377.
 Guntz, 337, 416.
Guye (Ph.-A.), 57, 91, 96, **115**, 218, 288, 347, **365** à **370**, 381, 656, 713, 746, 785.
 Guyon (F.), 151, 415, 677.
 Guyton de Morveau, 1.

II

Haaf (Carl), 685.
 Haberlandt (G.), 320, 390.
 Hache (Maurice), 456, 537, 715.
 Hafkine, 247.
 Hagemann, 389.
 Hallauer, 6, 7, 63, 293.
 Haller (A.), 58, 151, 185, 453, 679, 713.
 Hallier, 565.
 Hallopeau, 745, 788.
 Halphen (G.-H.), 181.
 Hamilton Acton, 411.
 Hamy (M.), 57, 120.
 Hancock, 290.
 Hankin (E.), 348.
 Hann, 190, 285, 796.
 Hanot, 680.
 Harriot (Dr), 186, 281, 347, 711, 716, 791.
 Hardy (Dr), 18, 714.
 Harkup (Richard), 126, 686.
 Harley, 743.
 Harmonville (baron d'), 182.
 Hartig, 327, 332, 334, 335, 730.
Hartmann (Dr), 26, 56, 88, 419, 150, 182, 183, 216, 278, 314, 344, 415, 434, **512**, 589, 617, 678, 743.
 Hasley (Victor), 419.

Hasselberg, 68.
 Batt, 345.
 Hattensaur (E.), 29, 56.
 Hatschek, 376.
 Haudü (Edgard), 181, 587, 615.
 Haug (Emile), 159, 421, 454.
 Haughton (S.), 23.
 Hauser, 347, 391.
 Hausner (Dr), 188, 253, 320, 421, 685.
 Hautefeuille (Pabbé), s, 289.
 Hautefeuille (P.), 120, 345.
 Hauteux, 138.
 Hautzsch, 187.
 Hawes, 156.
 Hayem, 491, 495, 551.
 Hébert (A.), 149, 312, 315, 587, 619, 677, 786.
 Hébert (Ed.), 223.
 Heckel, 37, 218, 280, 385.
 Heen (de), 253.
 Hédou, 680.
 Hedwig, 100.
 Heidenhain (L.), 183.
 Heinriche, 126.
 Heinz, 731.
 Held (A.), 679, 713.
 Helmholz (de), 30, 226, 229, 389, 682, 717, 721.
 Hemming, 112.
 Henderson, 122.
 Henneguy (Félix), 344, 383, 436, 437, 554, 714.
 Hénocque, 680.
 Henrot, 152, 745.
 Henry (Ch.), 91, 147, 524.
 Henry (Louis), 30, 218, 451.
 Henry (Paul), 248.
 Henry (Prosper), 248, 315.
 Henschel, 357.
 Hensen, 188.
 Hepperger (von J.), 93.
 Hérard (Dr), 18.
 Herbert Tomlinson, 219.
 Hergott, 386.
 Héricourt (J.), 317, 385, 714, 790.
 Herzig, 495.
 Hermann-Munk, 457.
 Hermann Wagner, 615.
 Hermite, 30.
 Héron, 289, 292.
 Herschel (A.), 69.
 Herschel (A. S.), 311, 318.
 Herschel (W.), 173.
 Hertz, 57, 61, 63, 64, 141, 307, 308, 309, 620, 695.
 Hertzig (J.), 460.
 Hervieux, 185, 316, 620.
 Herzstein, 123, 681.
 Heude, 800.
 Heudes, 385.
 Heycock (M.), 251.
 Heymans (J.-F.), 189, 221, 284, 318, 319, 349, 350, 389, 554, 718.
 H. H., 182.
 Hibbert, 420, 792.
 Hicks (W.), 146.
 Hillairet, 386.
 Himstedt (G.), 147.
 Hinschcron, 796.
 Hirsch (J.), 180.
 Hirn, 2, 5 à 9, 11, 62, 63, 252, 291, 293, 653.
 H. L. (Voir Léant H.), 86, 180.
 Hoerdli (de), 66.
 Hoffmeister, 243, 244.
 Hofmann (von), 188, 226, 795.
 Hohnel, 320.
 Holl, 461.

Hollande, 44.
 Holetschek (S.), 460.
 Holt (Ernest), 155.
 Hönen (Th.), 153.
 Hooke, 76.
 Hopkins, 157.
 Hopkinson, 92, 159, 160, 282, 716.
 Horant, 791.
 Horbaczewski, 229.
 Hori (E.), 716.
 Horkay (L.), 390.
 Horsley (Victor), 458, 519.
 Hospitalier, 412.
 Houlevigne (L.), 217.
 Houssay (F.), 374, 417.
 Houzeau (J.-C.), 310.
 Howes, 377.
 Hrabak, 10.
 Hubert (H.), 411.
 Huggins, 179, 416, 418.
 Hughes, 251, 388.
 Hugoniot, 209.
 Humbert (G.), 790.
 Hurion, 381.
 Hutchinson (Jonathan), 96.
 Huggins (M. et Mme), 792.
 Huyghens, 8, 226, 289.

I

Igenhous, 299.
 Ilie (P.), 24.
 Imchenetsky, 93, 221.
 Isherwood, 130.
 Issel (A.), 151.
 Istrati, 186.
 Ivory, 35.
 Iwan, 229.
 Iwanowsky, 731.

J

Jaboulay, 316.
 Jaccoud, 121, 145.
 Jacquemin (G.), 384, 455.
 Jacquet, 28, 219.
 Jacquot, 44, 46.
 Jäger (Erich), 418.
 Jagnaux (Raoul), 618.
 Jahn (Dr Hans), 30, 61, 94, 126, 157, 188, 189, 281, 318, 319, 349, 389, 421, 685, 717, 748, 795.
 Jamet (V.), 179.
 Jammes (L.), 455.
 Janczewski, 137.
 Janet (Paul), 220, 452, 281, 380.
 Janosic, 285.
 Janssen, 322, 315, 392, 416, 560, 619.
 Japp, 187, 318.
 Jaquet (de Bâle), 219.
 Javal, 456, 591, 620, 714.
 Jean, 281, 746.
 Jeannel (Dr), 25, 790.
 Jeffery Parker (J.), 250.
 Jesse, 683.
 Joannis, 57, 89.
 Jofé, 192.
 Joffroy, 212.
 Johnny (G.), 495.
 John (Abel), 189.
 John, 49.
 Johow, 327, 329, 331.
 Joly (J.), 29.
 July, 217, 384, 790.
 Jonathan (Hutchinson), 96.
 Jones (J.-V.), 715.
 Jonquières (de), 57, 89, 420, 218.

Joubert, 64, 369.

Joubin (L.), 25, **767 à 770**.

Joubin (P.), 27, 89.

Jouffroy (marquis de), 290.

Joule, 38, 77, 130, 226, 293.

Jourdan (E.), 343, 745.

Judd (G.), 234.

Julien, 218.

Julme, 745.

Jungfleisch, 224, 248.

Jusari, 255.

K

Kalischer, 747.

Kamiński, 253, 326, 333.

Kaminsky, 93.

Kanrin (Dr de la Jamaïque), 96.

Kapp, 793.

Karlinski (Dr Justin), 49.

Karpinski, 795.

Kater (de), 22.

Kaudon, 192.

Kaufmann, 522.

Kayser, 389.

Keen, 549.

Kékulé, 226.

Keller, 123, 391, 686.

Kelsch, 415.

Kerry (Richard), 460.

Kersnovsky (B.), 683.

Khawkine, 372.

Khrouchtchoff, 749.

Kierwonsky, 93.

Kiewicz (Adam), 320.

Kilian (W.), 44, 701, 702.

Kiliani, 168, 229.

Kilngemann, 187.

Kipping, 457, 283, 681.

Kirchhof, 472, 220.

Kirchoff, 38.

Kirkwood, 68.

Kirschhoff, 61.

Kitasato, 752.

Klauber (Alfred), 460.

Klebs, 143.

Klein, 283, 338, 339, 347, 383, 731.

Klemencie (J.), 495, 685.

Klingemann, 716.

Klobb, 281.

Kloos (Dr), 521.

Klumpke (Mlle), 451, 248, 524, 556, 744.

Klobukow, 452.

Knab, 784.

Kobald, 686.

Kobb, 713.

Koch (Robert), 17, 258, 565, 659, 719, 720, 797.

Koch (L.), 333.

Kochler, 192.

Koenig, 348.

Kohn (Gustave), 460.

Konkoly, 28.

Kopsel, 319, 748.

Kowalewsky, 449, 685.

Kozloff, 494.

Krauss, 495.

Kreutz, 66.

Krogus, 457.

Kronberg, 587.

Kronecker, 157, 283, 388, 389, 682, 683, 794.

Kruss (Gerhard), 56, 448, 402.

Kummer (P.), 326.

Kundt, 80, 339.

Künckel d'Herculais, 185, 217, 248, 378.

Kunstler, 713.

L

Labbé, 456.

Labit, 617.

Laborde, 28, 52, 53, 59, 90, 121, 452, 453,

219, 383, 386, 417, 457, 714, 715, 745, 791.

Laboulbène, 121, 184, 455, 456, 494.

Labouret (de), 214.

Lacassagne, 316.

Lacaze-Duthiers (de), 372, 373, 416, 417.

Lachaud (A.), 345.

Lacouture, 784.

La Condamine, 21.

Lacroix (A.), 27, 120, 315, 384, 416, 417, 456, 744, 790.

Ladenburg, 229.

Laënnec, 17, 18.

Lagerheim, 218, 327.

Lagneau, 58, 417, 456, 620, 680, 790.

Lagrange (Dr), 216, 252, 529, 531, 533.

Laguesse, 219, 346, 386, 418, 437.

Lagumina, 427.

La Hire, 66.

Lajoux, 152.

Lala, 744.

Lalande, 22.

Lalanne (G.), 553.

Lallemand (Ch.), 416.

Lamarck, 371.

La Maestra, 744.

Lamery (dom), 713.

Lampa (Anton), 285.

Lancereaux, 51, 211.

Landerer (J.-J.), 494.

Langral, 748.

Landolt, 794.

Landouzy (Dr), 49, 212.

Landrin (Ed.), 452.

Lang (von), 718.

Langer, 681.

Langley, 219, 782.

Langlois (P.), 346.

Lannelongue, 181, 185, 346, 386, **393**, 417.

Lapicque (L.), 27, 28, 58, 59, 90, 91,

119, 121, 452, 453, 185, 216, 218, 219, 249, 281, 316, 347, 385, 386, 417, 418,

456, 457, 494, 495, 525, 591, 620, 651, 632, 680, 714, 715, 745, 716, 790, 791.

Laplace, 66, 67.

Lapparent (de), 45, **267 à 272**, 651, 680.

Laquerrière, 280, 680.

Larrey, 591.

Lartet (E.), 161.

Lasne (Henri), 417, 456, 714.

Lataste, 652.

Laulanié, 347.

Launay (de), 44, 58.

Laurent (H.), 227, 310, 714.

Laussedat, 713.

Lauth (Ch.), 789 à 791.

La Vallée Poussin (de), 425.

Laveran, 295, 347, 386, 418.

Lavoisier, 1, 223, 227, 233, 572.

Lavrovsky, 423.

Lawes, (Sir J.-B.), 60.

Laycock, 717.

Layet (A.), 26.

Leauté (H.), 86, 180, 274, 280, **289 à 293**, 491, 550, **625**, **663**, 174.

Lebeau (P.), 151, 181.

Lebel, 791.

Le Bel (J.-A.), 58, 186, 224 à 232, 416.

Lebesconte (G.), 556.

Lee Dickinson, 219.

Lechartier, 277.

Le Chatelier, 150, 151, 160, 218, 342,

456, 541, 542, 619, **630**.

Lecher (Ernest), 320, 350.

Lecomte (H.), **41 à 47**, 239 à 241, 428,

522, 553, 617, 786.

Lecoq de Boisboudran, 27, 57, 229, 368, 401, 590, 619.

Lecornu, 44, 590.

Le Denta (Dr), 280, 316, 526, **G 49**.

Leduc, 10, 11, 217.

Ledouble, 417.

Leduc, 57, 524, 713, 756.

Leenhardt, 789.

Lefèvre (C.), 451, 171, 455.

Lefèvre (J.), 744.

Le Fort, 589, 591, 680.

Légay, 790.

Legendre, 35.

Léger, 347, 456, 745.

Legge (H.), 750, 751.

Legrain, 457.

Leidié (E.), 456.

Leidy (J.), 381.

Lejars, 679.

Lelièvre (Maurice), 310, 671.

Leloir (Dr), 96, 213.

Leloutre, 6, 63.

Lemaire, 237.

Leman, 349.

Lemoine (V.), 452.

Le Mout, 679.

Lénard, 696.

Lenoir, 8, 681.

Leone, 31.

Léotard (J.), 455.

Lepierre (C.), 345.

Lépine, 145, 183, 248, 416.

Lepsius, 46, 246.

Leroy (E.), 448.

Lesage, 219, 677, 800.

Lescarbault (Dr), 174.

Lescour, 420.

Lespiau, 281.

Lesseppe (F. de), 325.

Lettellier (Aug.), 525.

Leteur (F.), 184.

Letulle, 453, 185, 213.

Levasseur, 452, 789.

Leveau (G.), 57, 492.

Le Verrier, 68, 69, 172, 174, 179.

Le Verrier (de Marseille), 44.

Lévy (Louis), 462.

Lévy (Lucien), 417.

Lévy (Maurice), **33 à 40**, 80, 181, 248,

307, 385, **721**.

Lewkowsitch, 318, 388.

Lexell, 68.

Leyst, 93, 188.

Lezé, 217.

Liagre, 424.

Liais, 67.

Liebreich, 794.

Lichtenstein (de Montpellier), 73, 75.

Lichtenstein (prince de), 190.

Licopoli, 222.

Liddlecker, 800.

Liebermann, 229.

Liebig, 226, 562.

Lignier (O.), 382.

Lindemann, 749.

Lindet, 186, 218, 524, 746.

Linder, 44, 251.

Lincharger, 791.

Ling (Arthur), 187.

Link, 400.

Linossier (Georges), 121, 279.

- Liouville**, 209, 679.
 Lippick, 195.
 Lippmann, 59, 61, 151, 153.
 Lipschütz, 389, 191.
 Lister, 106.
 Livinge, 725.
 Livon (Ch.), 316.
 Liznar, 796.
 Lloyd, 61.
L. O. (Voir Olivier Louis).
 Locard (Armand), 32, 383.
 Lockyer (Sir J. Norman), 28, 29, 60, 151, 178, 479.
 Lodge (J.), 127, 273, 419, 420.
 Lowy (M.), 218, 279, 381, 762 à 767.
 Lévy (J.), 319.
 Loew, 169, 224.
 Lohers (H.), 319.
Longchamps (de), 146, 245, 519, **571**.
 Longridge (James), 310.
 Loria (Gino), 32, 750.
 Lortet, 121.
 Lory, 41.
 Loschmidt, 61.
 Lubbock (Sir John), 198.
 Lucas-Championnière, 121, 516, 519.
 Lucas (Edouard), 319.
 Lucas (Félix), 790.
 Lucet, 715.
 Lude (Alais), 190.
 Ludwig-Mondt, 681, 730.
 Lucksch, 685.
Lumière, A. et L., **568**.
 Lummer, 683.
 Luther (M. W.), 160.
 Luvini (G.), 677.
 Luys (J.), 150, 185, 681.
 Lyon (L.), 585.
- M**
- Macé, 52, 729.
Macé de Lépinay, 279, 315, **770** à **773**.
 Macaulay, 791.
 MacLaurin, 35.
 Mac-Mahon, 92.
 Macret, 386.
 Madamet (A.), 85.
 Mahler (Ed.), 719.
 Magalhães (Pedro de), 280.
 Magini, 286, 422.
 Magnan, 52, 219, 591.
 Magnanini, 158, 251, 285, 350.
 Magnin (Ant.), 280, 381.
 Magnus, 327.
 Mairet, 317, 791.
 Makensie, 681.
 Malaquin, 790.
 Malard (A. E.), 56, 119, 182, 247, 315, 511, 512.
 Malassez, 28, 91.
 Malbec, 457.
 Mallot, 650, 679.
 Maleyx, 782.
 Mallard (E.), 89, 151, 790.
 Mallet (J.), 156.
 Mallevre, 715.
 Malpighi, 100.
 Malvoz, 19.
 Maly (Richard), 461.
 Mancini, 32, 61, 95, 127, 158, 191, 253, 286, 350, 392, 422, 623, 752.
 Mandl (Z.), 390.
Mangin, **100** à **106**, 120, 217, **236** à **241**, 456, 789.
 Man Mandl, 421.
 Mannheim, 89, 120, 151, 679, 711.
Maquenne, 57, **165** à **172**, 186, 221, 277, 456, 521, 592, 713, 716.
 Marage, 56.
 Marangoni, 31.
 Marcano, 218.
 Marchal (Paul), 90, 619, 651.
 Marchand, 149, 173, 218.
 Marchiafava, 295.
 Marcolongo, 31, 285.
 Marcy, 259, 521, 679, 737.
Margerie (Emm. de), 21, **43** à **47**, 216, 343, 453, 521, 553, 616, **696**.
 Marguerite Delacharianny, 521.
 Margule (Dr.), 190.
 Marie (Léon), 151.
 Marignac, 191, 401.
 Marillier (L.), 712.
 Marinescu, 153.
 Marino-Zuco, 391.
 Marion (A.), 280, 315, 416.
 Marjolin, 652.
 Markow, 187.
 Markownikoff, 152.
 Marloth, 329.
 Marshall, 596, 617, 681.
 Marshall (Milnes), 371.
 Martel (E.), 616.
 Martin (H.), 19, 525, 591.
 Martini, 718.
 Mascarel, 281.
 Mascart, 122, 217, 312, 386, 456, 525, 650, 789.
 Masoni (U.), 310.
 Massa, 62.
 Massignon, 716.
 Massol, 218, 521.
 Masson, 229.
 Mather (T.), 60, 123, 220.
 Mathias (E.), 215, 281, 452, 798.
 Mathias-Duval, 316, 680, 681, 791.
 Mathieu (Emile), 310, 680, 687, 711, 715.
 Mathieu-Plessy, 556, 590.
 Matignon (C.), 385, 455.
 Matthæy (Edward), 151, 615.
 Mattiolo, 328, 333.
 Maupas, 372, 525, 650.
 Maurel, 20, 652.
 Maurice Lévy (V. Lévy Maurice).
 Mauro, 31.
 Mauthner (D.), 495.
 Maximovitch, 93.
 Maximovitch, 123.
 Maxwell, 37, 63, 80, 230.
 Mayer, 130.
 Mayer (Daniel), 215, 731.
 Mayer (Robert), 226.
 Mayet, 152.
 Mayo Robson, 60.
 Mazzarelli, 191.
 Meillère, 790.
 Meisel, 177.
 Mégnin (P.), 153, 185, 249.
 Melander, 710.
 Meldola, 251, 388, 586.
 Ménard, 790, 791.
 Mendelejeff, 22, 229, 417, 618, 781.
 Mendoza, 316, 791.
 Mentchutkin, 319.
 Mer, 731.
 Merget, 102.
 Mermere, 381.
 Mertens (F.), 320, 719.
 Meschinelli, 222.
 Meslans, 186, 218, 789.
 Meslin (G.), 311.
 Mesnet, 185.
 Messier, 65, 68, 179.
Metchnikoff (Elié), 145, 216, 383, **425**, 659, 660.
 Metz (de), 80, 81.
 Meunier (J.), 185, 455, 592, 652.
 Meunier Stanislas, 90, 151, 185, 279, 315, 650, 680.
 Meyer, 143.
 Meyer (V.), 117, 225, 417.
 Meyer Lothar, 229, 311.
 Mialhe, 561.
 Michaud, 385.
 Michelle (J.-H.), 60.
 Michel-Lévy, 44, 52, 217, 315, 700, 713, 714.
 Miesler Jules, 160.
 Mikulicz, 25.
 Mill (R.), 110.
 Miller, 793.
 Millosovich, 31, 251, 285.
 Milne-Edwards, 151, 161, 790.
 Minary, 70.
 Minchin (George-M.), 339, 793.
 Minet (Adolphe), 120, 381, 679.
 Mingazzini, 31.
 Minguin, 151.
 Miquel, 590, 650.
 Mittag-Leffler, 217.
 Mödler, 177.
 Möller, 66.
 Mohl (H.), 104.
 Mohler (Ed.), 191.
 Mohr (H.), 139.
 Mohr, 91.
Moissan (H.), 59, 95, 120, 152, 315, **336** à **338**, 651, 688, 713, 790.
 Mojsisovich, 21.
 Moldenhawer, 104.
 Mollière (H.), 563.
 Monaco (Prince de), 377.
 Monge, 97, 98.
 Moniez (R.), 149, 296, 717.
 Monnet, 116, 281.
 Montani, 791.
 Montemartini Dr Clemente, 32, 750.
 Monti, 621.
 Morat, 639.
 Morel, 28.
 Moroggia, 391.
 Morine, 319.
 Morley (F.), 716.
 Mörpurg, 95.
 Morris (Harris), 251.
 Moser (James), 29, 126, 151, 217.
 Mosny, 121.
 Mossé (D'), 519.
 Motais, 185, 790.
 Mott (D'), 119.
 Mouchez, 120, 519, 650, 789.
 Mouillard, 737.
 Moureaux (Th.), 27, 491.
 Moutet, 41.
 Mourgues (L.), 90, 276, 456.
 Moutier, 181.
 Moussu, 522.
 Moynier de Villepoix, 491.
 Müller, 101.
 Müller (P. E.), 328.
 Müller (J.), 93, 185, 681.
 Mulsant, 70.
 Munck (J.), 221.
 Munier-Chalmas, 217, 493.
 Musculus, 171.
 Musset (Ch.), 89.
 Muntz (A.), 300, 315, 385, 417, 718.
 Munzer (E.), 350.
 Muyden (van), 214, 288.

N

Nabias (de), 217.
 Nageli, 240.
 Nagy, 750.
 Nalepa (Dr Alf.), 29, 153, 686.
 Nasini, 158, 190, 750.
 Nassakin, 684.
 Natterer (Conrad), 685.
 Naud C., 146, 383, 587, 614.
 Navier, 5, 77.
 Nélaton (Dr), 25, 314.
 Nencki, 121.
 Nentien, 44.
 Nerville (de), 309, 520, 618.
 Netchoghin, 220.
 Netter, 185, 347, 595, 680.
 Neumann, 495.
 Neumayr, 159.
 Neve (Dr E.), 96.
 Neville, 251.
 Newcomb, 179, 322.
 Newcomen, 8, 289.
 Newlands, 22, 229.
 Newmann (F.), 10.
 Newton, 21, 65, 77.
 Neyreuf, 303, 455.
 Nicati, 28, 59, 91.
 Nichols (Edward), 380.
 Nickel (Emil), 710.
 Nicolas (Dr), 454, 711.
 Nicolas (M.), 790.
 Niedzwiedzki, 258.
 Niemelowicz, 221.
 Nilson, 402.
 Ninier, 119.
 Nipkow, 799.
 Niven, 792.
 Noack, 243, 329.
 Nocard, 258, 278.
 Nodon, 308.
 Nogués, 454, 647, 679.
 Noir (Dr), 52.
 Nolting, 746.
 Nordenskiöld, 152, 476, 231.
 Norman Collie, 793.
 Norman Lockyer (V. Lockyer).
 Normand (J.), 526.
 Nurène, 749.

O

Obernayer (Albert), 77, 285.
 Obrecht, 478.
 Oddone, 285.
 Ochsner de Coninck, 413, 416.
 Öhlert, 44, 524.
 Öhmans, 30.
 Olsziannikoff, 123.
 Ogier (J.), 144.
 Ogliastro, 222.
 Ohm, 38.
 Olbers, 68.
 Oldfield (Thomas), 60.
 Ollivier (Aug.), 90.
 Ollivier (Em.), 345, 385.
Olivier (Louis), 26, 54, 56, 86, 88, 146, 149, 160, 182, 214, 245, 247, 256, **299**, 310, 314, 340, 344, 352, 379, 380, 392, 411, 415, 423, 451, 454, 462, 491, 493, 496, 522, 523, 528, 554, 560, **572**, 589, 613, 617, 649, 652, 678, 686, 688, 711, 712, 719, 720, 742, 743, 752, 782, 784, 797, 800.
 Oltramare, 192.
 Onanoff, 281, 418.
 Onimus, 650.

Oppenheim (Dr), 281.
 Oppert (J.), 21, 713.
 Oppolzer, 66.
 Orth, 183.
 Osborn (B. H.), 371.
 Osborne Reynolds, 80.
 Oser (J.), 685.
 Osmond (F.), 89, 121, 160, 283.
 Ossipoff, 185.
 Otakar Zecak, 189.
 Ott (Dmitri de), 149.
 Otto, 8.
 Otto Ohnesorge, 98.
 Otto Stolz, 350.
 Orvido (Dr), 32.
 Ouvrard (L.), 416, 494.

P

Padé (H.), 713.
 Padova, 422, 750.
 Pagnoul, 152, 280, 650.
 Painlevé (P.), 27, 89, 279, 315.
 Paladino, 191.
 Palisa, 192, 320.
 Palmberg, 712.
 Panard, 386, 680.
 Pambour (de), 5, 9, 130.
 Panas, 121, 417.
 Panasu, 255.
 Pantic (Josif), 21.
 Pannelli, 350.
 Niedzwiedzki, 258.
 Paolis, 391.
 Papin (Denis), 8, 289.
 Pappel, 681.
 Parenty, 345.
 Parinaud (H.), 249.
 Parisot, 316.
 Parker, 376.
 Parona C., 297.
 Pascal (Blaise), 77.
 Paschke (H.), 285.
 Pasquiere (E.), 7.
 Passmore, 392.
 Pasteur, 18, 48, 62, 87, 171, 233, 299, 566.
 Paterno, 751.
 Patterson (Dr), 282.
 Paul, 248.
 Péan, 58, 415.
 Péano, 95, 751.
 Péchard (E.), 248.
 Péchard (P.), 435.
 Péchiney, 112.
 Peddie (W.), 747, 794.
 Pedler (A.), 283.
 Pechelaring, 526.
 Pelham-Dale, 716.
 Peligot, 256, 379.
 Pellat (H.), 118, 122, 342, 676.
 Pellet (E.), 248.
 Pellin, 715.
 Pelsener, 377.
 Pelsener (Paul), 58, 345, 524, 651.
 Penck, 268, 269, 270.
 Peratonner, 751.
 Percy (W.), 377.
 Pérez (J.), 390.
 Périer, 25, 90, 121, 246, 280, 651, 745.
 Perkins, 388, 681, 716.
 Permann (E.), 87, 317.
 Péron (A.), 493.
 Perrey (A.), 120, 345.
 Perrier (E.), 345, 371, 375, 384, 593, 787.
 Perrier (Remy), 246.
 Perrin, 120.
 Perroncito, 32, 62, 158, 297, 619.
 Perronet, 337.

Perrot (F.-L.), 790.
 Perrotin, 175, 179, 416, 679.
 Perry (P.), 32.
 Perry, 318, 388, 420, 716, 798.
 Peterman, 747.
Petit (P.), 57, **733**.
 Peticol, 379.
 Petot, 120, 650.
 Petricou, 186.
 Phannensiel (de Breslau), 107.
 Pfeffer, 193, 194, 197, 330.
 Pfeiffer (Th.), 244.
 Philippe (Dr), 96.
 Phillips, 718.
 Phisalix, 281, 316, 373, 386, 589, 745.
 Piazzi (Smith), 322.
 Pic, 791.
 Picard (l'abbé), 21.
Picard (Emile), 57, 181, 279, 310, 650, **702**.
 Picart (L.), 218, 248, 416, 524, 590, 619, 651, 789.
 Piccini, 391.
 Pickering, 122, 477, 487, 792.
 Pictet (A.), 791.
 Pictou, 251.
 Piélet (A.), 457.
 Pierpaoli, 31.
 Pierre, 55.
 Pigeon, 57, 557.
 Pignol, 28.
 Pigovini, 127, 190.
 Pilliet, 346, 680, 790.
 Pincherle, 158, 190.
 Pirotta, 392.
 Pisan, 347.
 Pisati, 95, 158, 391.
 Pitres, 213.
 Pixii, 40.
 Planck, 126, 284.
 Plainer, 242.
 Plocke, 123.
 Pleske, 123.
 Pohl, 320.
 Poincaré (Dr), 49, 52, 279, 525, 675.
 Poincaré (H.), 175, 279.
Poincaré (Lucien), 56, 59, **76 à 82**, 91, 120, 122, 127, 153, 186, 216, 246, 249, **272**, 276, 281, 311, 315, 317, 347, 380, 386, 412, 418, 437, 492, 688, 710, 715, 746, 791.
 Poinsot (Louis), 733 à 760.
 Poiseuille, 78.
 Poirrier, 116.
 Poisson, 22, 37, 38, 80, 721.
 Polailon, 449, 280, 591.
 Polin, 617.
 Pollack (Ch.), 184, 619.
 Pomet (A.), 384.
 Poncet, 9.
 Poncet, 281.
 Potain, 145.
 Potier, 44.
 Potter, 290.
 Pouchet (Gabriel), 10, 277.
 Pouchet (Georges), 91, 190, 218, 289, 377.
 Poulet (J.), 54, 146, 344, 676, 782, 784.
 Pozzi, 449.
 Prazmowski, 733.
Prenant (Dr), **593**.
 Preston, 709.
 Priestley, 4, 299.
 Prillieux, 494, 679, 129, 790.
 Pringsheim, 126, 349.
 Prony (de), 22.
 Prost (Aimé), 343.
 Prouho, 416, 453, 744.

Proust, 48, 90, 225.

Prudent (Ct), 43.

Prud'homme, 454.

Prunet (A.), 185.

Pruvot (Georges), 278, 313, 455, 713, 713.

Puisieux, 288, 279, 384.

Puittti, 232.

Pullinger, 681.

Pulug (J.), 190.

Pum (G.), 495.

Q

Quénol, 186.

Quénu, 679.

Quet, 55.

Quinke, 681.

Quinquaud (Dr Ch. E.), 59, 185, 386, 417.

Quinquet, 525.

R

Rabl, 603.

Rabourdin, 650.

Radau (R.), 651.

Radovanović (S.), 24.

Raffeneau-Delille, 102.

Raffy, 89.

Railliet (A.), 294 à 299, 619, 715.

Rainbert, 218.

Rambaud, 27, 384, 524, 714.

Rammelsberg, 421.

Ramsay, 122, 186.

Rankine, 5, 293.

Ranvier (L.), 89, 184, 217, 218, 254, 218.

123, 789, 796.

Raoult, 151, 181, 197, 230, 316.

Raschig, 42.

Raspail, 563.

Raus, 30.

Raulin, 17, 120.

Ravaz (R.), 391.

Rayet (G.), 218, 248, 345, 416, 455, 590.

619, 631.

Rayleigh (Lord), 155, 250, 318, 348, 387.

Raymond, 680.

Rebourgeon, 457.

Rechniewski, 607.

Reclus, 149, 434, 515.

Recoura (A.), 151, 248, 345, 384.

Reess, 243, 328.

Reggiani, 95.

Regnard, 346.

Regnault (F. de Toulouse), 162.

Regnault, 4.

Regnier, 149.

Reichl (C.), 320, 348.

Reina, 458, 190, 222, 750.

Reinach (Salomon), 57.

Reinke, 237.

Reinold (A.), 250.

Reiss, 244.

Remak, 211.

Rémoud, 714, 715.

Remy-Saint-Loup, 153.

Renard (abbé), 220, 750.

Renard (Adolphe), 455, 492, 508.

Renard (commandant), 746.

Renault (B.), 249.

Renaut (de Lyon), 59, 121, 208.

Renoux, 27, 384, 744.

René (A.), 457.

Renou (E.), 279, 384, 651.

Requin, 18.

Resal (H.), 310, 384, 651.

Retterrr, 28, 90, 346, 652, 681, 715.

Reusch (Hans), 796.

Reynaud, 38.

Reynier, 514.

Rhazès, 561.

Rhymer, 681.

Ribalquière, 93.

Riban (J.), 384, 651.

Ribot, 56.

Ricco, 31, 279.

Richard, 48, 130.

Richard-Harkup, 126.

Richard (J.), 456.

Richardière (D^r), 445.

Richardon (Arthur), 716.

Richards, 130.

Richetot (G.), 149, 394.

Richer, 22.

Richet, 346, 385, 493, 554, 714, 713, 790.

Richmond, 681.

Rifat (D^r), 620.

Righi, 61, 158, 620, 621.

Riley, 73, 74, 459.

Rilliet (Alb.), 37.

Rinne, 747.

Risbwon Wettstein, 796.

Ritter, 157.

Riva Palazzi G., 343.

Rive (L. de la), 57, 64, 309, 451.

Rivereau, 739.

Rivière Charles, 12, 86, 147.

Rivière (E.), 152, 414.

Robert, 249.

Roberts-Austen, 215.

Roberts-Isaac, 92.

Robertson, 792.

Robiquet, 70.

Robson (W.), 387.

Rocheard (Dr Jules), 17 à 53, 183,

249, 257 à 263, 347, 651.

Rodet, 153, 219.

Rodler (Alfred), 460.

Roetgen, 80.

Roger, 59, 249, 281, 346, 618, 672, 680.

715.

Rohon, 123.

Rolland, 112, 218, 790.

Rollett, 796.

Romieux, 790.

Romiguières, 113.

Rommier (A.), 484, 345, 416.

Rondeau, 715.

Ronkar, 252, 420.

Ronna (A.), 614.

Roozeboom (H. W. Bakhuys), 57.

Rosa (Edward), 341.

Rosenberg (S.), 221, 349.

Rosenstiel, 446.

Rosenthal d'Erlangen, 318.

Rosières (Raoul), 434.

Rosini (E.), 222.

Rostaik (W.), 30.

Rostan, 18.

Roth, 188.

Rothpletz (A.), 553.

Rouché (Eugène), 85, 184.

Roule (Louis), 373, 384, 417.

Rousseau (G.), 345, 385, 455.

Roussel, 790.

Routier (Dr), 25, 149, 216, 344, 346.

Roux (E.), 87, 258, 278.

Roux (Gabriel), 421, 279.

Roux (L.), 152, 184, 345, 494, 524, 552.

Rowland, 127.

Royer, 43.

Rubanovitch, 784.

Rubens, 457, 717.

Rückert (A.), 60, 250, 283.

Ruhemann, 251, 717.

Rumford, 130.

Runge, 389.

Rusanow, 93.

Russow, 239.

Rydberg (J.), 451.

S

Sabatier, 744.

Sabine, 22.

Sachs, 102.

Saenger, 314.

Sainte-Claire Deville (Ch.), 231.

Saint-Germain (A. de), 98, 384.

Saint-Hilaire, 123, 454, 523.

Saint-Moulin (de), 110.

Saint-Rémy, 742.

Saint-Venant (Voir Barré de Saint-Venant).

Sajous, 617.

Salet, 129, 147, 337.

Salkowsky (E.), 221.

Salmon (G.), 379.

Salomon de Caus, 289.

Sambson, 792.

Sanaglia (Dr), 62.

Sanchez-Toledo, 49.

Sang, 793.

Sansone (Antonio), 148.

Saporita (de G.), 316, 746.

Sarasin (Ed.), 57, 64, 309, 433, 451.

Sarrau, 279, 188, 366, 370.

Saussure (de), 100, 299.

Sauvageau C., 128, 216, 382, 545, 588.

741, 742.

Sauveur (Jules), 30.

Savart, 38.

Savary, 8.

Savastano, 729, 731.

Savelief, 89.

Savery, 289.

Sayn (G.), 417.

Scacchi (E.), 222.

Searle, 250.

Schaffer (Dr), 88, 190, 461.

Schardinger, 796.

Scheele, 1.

Scheiner, 457, 244.

Schelling, 232.

Schenrock, 683.

Schimper, 734.

Schiaparelli, 31, 69, 173, 175, 176, 603.

605, 606, 607.

Schiff (Félix), 495.

Schimper, 330.

Schipiloff, 191.

Schlicht, 242, 327.

Schlossing, 112, 152, 184, 185, 217, 300.

744.

Schmuthausen, 123.

Schmid, 796.

Schmidt (F. W.), 56, 126, 386, 448, 652.

745.

Schmidt (Th.), 220.

Schneider (Léopold), 350.

Schmitter, 187.

Schoosing, 456, 682.

Schönrock, 93.

Schoute (H.), 650.

Schraub (A.), 320.

Schraud (A.), 460.

Schryver, 681.

Schulhof, 68.

Schulten de (A.), 89, 789.

Schuster, 387.

Schützenberger, 171, 185, 218, 279, 455.

590, 744.

Schwartz (Dr), 25, 149.

Schwédoff (d'Odessas), 77, 80, 81, 306.
 Schwendener, 104.
 Schwinburne, 156, 283.
 Scott, 250.
 Sée (D^r Germain), 27, 51, 89, 249, 280, 316, 457, 494, 537.
 Segond (D^r), 25.
 Segre, 32, 61.
 Séguin, 226.
 Semmola, 494.
 Sempier, 375.
 Senlecq, 798.
 Senneber, 299.
 Sénéchal, 591.
 Serullas, 391.
 Seunes (J.), 453, 745.
 Seydler, 120.
 Shattock (S.), 282.
 Shaw, 281.
 Sheldon (Samuel), 688.
 Shelford Bidwell, 29, 219, 281, 793, 798.
 Sheridan (Delephine), 153.
 Sheridan (D^r A.), 154.
 Sherrington (D^r), 92.
 Shore (Th.), 374.
 Sidney (Martin), 419.
 Siegfried, 47.
 Siemens (de), 420.
 Sigmund, 460.
 Silber, 285, 350.
 Silvestri (de), 62.
 Simon (Félix), 419.
 Simony, 790.
 Singer (J.), 350.
Smigaglia, 54, 191, 222, **263 à 267**, 350.
 Siredey, 107.
 Sitken (Thon), 747.
 Skraup (H.), 493.
 Slaby (de Berlin), 9.
 Smeaton, 290.
 Smitu (A.), 285.
 Smith (G.), 387, 420.
 Smolka (A.), 189, 350.
 Soldé, 782.
 Solcs, 185.
 Solowjoff (Athanasius), 183.
 Solvay, 112.
 Sorauer, 729.
 Soret, 57, 352, 538.
 Soupronnenko (D^r), 221.
 Sparro (de), 650.
 Spencer, 458.
 Spitta, 178.
 Spitzer, 460.
 Spöerer, 173, 218.
 Srpek, 495.
 Spring, 30, 452.
 Stahl, 226.
 Stanley, 157, 681.
 Stanley (W.), 174.
 Stefan, 61, 94, 221.
 Steiner, 61.
 Stéphan (J.), 29, 320, 390, 524.
 Stephenson (George), 290.
 Stetting, 93.
 Stevens, 290.
 Stieltjes, 120, 345.
 Stirling, 8.
 Stokes, 22.
 Stoletoew, 308, 457.
 Stransky (S.), 685.
 Strasburger, 241, 242.
 Strassmayer, 21.
 Strauch, 717.
 Straus, 258, 790, 791.
 Stroobant, 174.

Stroud (W.), 458.
 Struever, 32.
 Struve, 93, 684.
 Struiver, 95.
 Stuckenberg, 795.
 Stutzer (D^r de Bône), 52.
 Sucharda, 320.
 Sud'Borough, 793.
 Suess, 24, 320, 796.
 Suida, 495.
 Sullivan, 681.
 Sulzer (E.), 184.
 Sumpner (W. E.), 60, 123.
 Sutton, 800.
 Svante Arrhénius (Voir Arrhénius).
 Svitsch (G.), 30.
 Swinburne, 123, 792.
 Swirsky, 188.
 Swohoda, 495.
 Sy, 524, 619.
 Sylvester, 744, 789.
 Symens, 317.
 Symons, 710.
 Syndey (Martin), 347.

T

Tacchini, 31, 89, 95, 248, 254, 285, 315, 350, 391, 524, 590, 751.
 Tafel, 167.
 Tainter (C. S.), 303.
 Taii, 793.
 Talbot, 229.
 Tall (de), 123.
 Talon, 557.
 Tanatar, 188, 253.
Tannery, 493, **529**.
 Tanret, 57.
 Tarnier, 90, 106, 110, 111, 185, 357, 788.
 Tassel (Emile), 385.
 Tata (de Bombay), 249.
 Tatchanovsky, 123.
 Taylor (Albert), 32.
 Tchebycheff, 93, 319, 717.
 Tchistovitch (D^r), 145.
 Teisserenc de Bert, 556.
 Thélohan, 347, 385, 681, 713.
 Terby, 30, 91, 178, 454, 682.
 Ternier, 218.
 Terriel (A.), 456.
 Terrier (F.), 149, 183, 278, 316, 513, 516, 620.
 Terrillon, 58, 515, 526, 745.
 Testut (L.), 588.
 Tessier, 18.
 Théokistof (D^r), 684.
 Thévard, 385.
 Thierry (E.), 652.
 Thiesen, 682.
 Thomas (A.), 419.
 Thompson (D^r S. P.), 60, 187, 220, 792, 793.
 Thompson (C.), 317.
 Thomsen, 226, 231.
 Thomson (J.-J.), 250, 368.
 Thomson (Elihu), 306.
 Thomson (Sir W.), 29, 34, 64, 229, 250, 252, 293, 325, 348, 793.
 Thorpe (E.), 348.
 Thorpe (G.), 250, 283.
Thoulet (J.), 27, 120, **137 à 140**, 247, 416, **500**, 679.
 Thuillier, 44, 258.
 Thumas, 457.
 Thurston (R.), 132, 379, 414, 613, 739, 782.
 Tictine, 188, 253.
 Tilden, 187.

Tillaux, 149, 391.
 Tillo (A. de), 90, 789.
 Tilly (de), 252.
 Timicizeff (C.), 416.
 Tingle (Bistrop), 420.
 Tioumiantzeff, 717.
 Tirelli, 422.
 Tissandier (G.), 782.
 Tisserand, 68, 89, 120, 127, 179, 274, 307.
 Tissier, 186, 791.
 Todaro, 31.
 Toison, 185.
 Toledo (Sanchez), 19.
 Tollens, 170.
 Tomasi (Donato), 246.
 Tomlinson (Charles), 458.
 Tomlinson (H.), 219, 387, 793.
 Tomson (W.), 419.
 Tonelli, 127.
 Tondini de Quarenghi, (Cés.), 322, 462, 679.
 Topinard, 164, 371.
 Topient, 789.
 Toula, 24, 94, 320, 350.
 Tournoux, 91, 153.
 Troussaint (H.), 654.
 Trabut (L.), 152.
 Trasbot, 297.
 Traube, 193.
 Trecul (A.), 525, 651.
 Tredgold, 5, 9.
 Treille (Alcide), 345, 794.
 Trélat (D^r), 25, 27, 106, 121, 149, 255.
 Tromblay (du), 292.
 Trépiéd (Ch.), 27, 384, 416, 650, 744.
 Tresh (J. C.), 61.
 Trevithick, 290.
 Tripier (Raymond), 280, 713.
 Trotter, 156.
 Trouessart (E.), 382, 789.
 Trouvé (G.), 416, 418, 525, 527, 556, 619, 789.
 Trouvclot, 479, 416, 619.
 Tschermak, 285.
 Tschersky, 93.
 Tubeuf (von), 335.
 Tudor Candall, 157.
 Tuffier, 185, 386, 418.
 Tuillant (A.), 457.
 Tutton, 283.
 Tyndall, 230, 232.

U

Unterweger (J.), 495.
 Urbain, 15.

V

Vagel, 389.
 Vaguer, 453.
 Vahrlich, 329.
 Vaillant, (Léon), 57, 377, 714, 745.
 Vaillard, 415, 213, 415.
 Valcourt (de), 580.
 Vallin, 714.
 Valude, 121.
 Van Beneden (P.), 91, 242, 460.
 Van der Mensbrugghe, 125, 459, 494.
 Van Muyden (G.), 288, 424.
 Vanni, 350, 391.
 Van't Hoff, 494, 495, 497, 224, 226, 232.
 Van Tieghem, 236, 237, 238, 239.
 Van Wijhe, 374.
 Varet (Raoul), 58, 680, 713.
 Vasilin, 491.
 Vasseur (G.), 43, 345, 385.

Vauthier, 89, 181, 304, 305.

Vayssière (A.), 57.

Véillon (A.), 652.

Vélain (Ch.), 44, 493, 783.

Véley (V. H.), 746, 747.

Venukoff, 152, 790.

Verdin, 219, 281, 681.

Vernadsky (W.), 417.

Verneuil (D'), 25, 26, 51, 88, 151, 149, 218, 280, 346, 417, 492, 557, 679, 713.

Vernon, 251.

Vernon Harcourt (L. F.), 92.

Veronesse, 750.

Verri (A.), 343.

Verweco (van), 46.

Véry, 782.

Vêzes, 248.

Vial, 45.

Viala (Pierre), 58.

Viallanes, 745.

Vialleton, 590.

Viault, 789.

Vibert, 525.

Vicille, 619, 713.

Vignal, 28, 91, 788.

Viennet (E.), 248.

Vignard (D'), 48.

Vignon (Léo), 120, 184, 279.

Viguier (Camille), **433, 482.**

Villain (L.), 314.

Villard, 152, 494, 525.

Villari, 29.

Ville (G.), 786.

Ville (J.), 421, 494.

Villemin, 47.

Villemin (Dr), 51.

Villié (E.), 491.

Villiers (A.), 452.

Villon, 281.

Wilsing, 172.

Vincent (C.), 280, 455, 592, 715, 743.

Vincent (Dr H.), 91, 153, 247, 383, **659.**

Vinogradsky (Sergius), 300, 301.

Violle, 89, 181, 304.

Viollette (C.), 523.

Virchow, 258.

Viré (A.), 680.

Vivet (L.), 526, 591.

Vogel, 45, 214, 388.

Vogt (Georges), 27, 313, 385, 552, 676.

Voisin, 79.

Volante, 32.

Volterra, 95, 127, 750.

Vonhöhne, 237.

Vries (de), 195.

Vuillemin (Paul), **326 à 335, 728.**

W

Waal (van der), 366, 369.

Wadsworth, 318.

Wahl (Dr von), 96.

Währlich, 329.

Wakker, 730.

Waldeyer (W.), 388.

Walker, 387.

Walker (Dr S.), 154, 747.

Walter, 218, 390, 458, 552.

Walther-Mennier, 267.

Wanklyn, 166.

Warburg, 80, 180.

Wargentin, 1.

Warpachovsky, 123.

Warren, 269.

Watel, 746.

Waterhouse H. J.), 183.

Watson, 419.

Watt, 5, 129, 290, 292.

Weber, 39, 51, 324.

Wedensky, 123, 790.

Wegscheider (Rudolphe), 718.

Weidel, 686.

Weiller (Lazare), 799.

Weiss (de Vienne), 453, 281, 796.

Weiss (Dr Georges), **82 à 84, 234, 284.**

Weissmann, 372.

Weith, 503.

Weldon, 112.

Welsch (Jules), 492.

Wemyss Fulton, 140.

Werner, 187.

Wertheimer, 714.

Wettstein (V.), 749.

Weyer, 186.

Weyher (Charles), 54, 302, **480, 497, 498, 559.**

Weyr (Emil), 29, 61, 94, 126, 127, 153, 186,

190, 221, 285, 320, 350, 390, 421, 461,

495, 686, 718, 749, 796.

Whetham (Dampier), 458.

Whipple, 283, 388.

Wickam, 88.

Wict, 590.

Widal (Dr), 27, 143.

Wiedeman, 81, 82.

Wiedersheim (R.), 246.

Wiesner, 14, 390.

Williot, 744.

Winckler (A.), 390, 448, 718.

Wild, 93, 123, 319, 525, 683, 795.

Weldon (R.), 250.

Willey (Arthur), 348.

Willans, 263.

Williams (Dawson), 419.

William Henry Preece, 317.

William Russel, 385.

Williamson (C.), 186, 227.

Wilm, 741.

Wilsing, 172.

Winnecke, 66.

Vinogradsky (S.), 300, 316.

Winter, 219.

Wirtinger, 718.

Wislicenus, 445.

With-Schmidt, 791.

Witz (Aimé), **2 à 44, 63, 86, 315, 317, 524, 585, 670.**

Wladesco, 281.

Wolf (Rud.), 21, 55, 57, 696, 718.

Wood, 5.

Wolf, 7, 11.

Wollaston, 229.

Worms (Dr), 150.

Woronin, 327, 329.

Worthington, 419, 420.

Wright (Alder), 317.

Wullner, 30.

Wurtz (Adolphe), 166, 167, 226.

Wurtz (Dr R.), 28, **338, 493, 618, 788.**

Wyhe (vau), 596.

Wyndham Dunstan, 318.

Wynne, 122, 348, 388, 681.

X. Y. Z

Yung (E.), 313, 522.

Zachariades, 346.

Zacharias, 454.

Zacgert, 94.

Zagadka, 123.

Zager, 796.

Zanetti, 391.

Zaremba, 54, 57, 696, 748.

Zatti, 286, 350.

Zeisel (S.), 460, 495.

Zenger (Ch.), 89, 307, 494, 590, 679.

Zeuner, 5, 6, 7, 10, 11, 293, 670, 671, 672.

Zipernowsky, 306.

Zlaturski (G. N.), 320.

Zolles, 685.

Zschokke, 295.

Zujović (J. M.), 24.

Zulkowski, 390.

Zune, 281, 746.

Zuntz, 349, 389.

Zürcher, 44.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LES ARTICLES ORIGINAUX, LA BIBLIOGRAPHIE, LES CHRONIQUES
ET LES NOUVELLES¹

A

ABDOMEN — Chirurgie de l' —	514
ABYSSALES. — Les eaux —	500
ACADÉMIES. — (Voir la table analytique des matières. 7 à 9)	
ACIDE GLUCONIQUE. — Synthèse de l' —	224
— SULFURIQUE. — Nouvelle théorie de la fabrication de l' —	41
— AZOTHYDRIQUE. — Un nouveau gaz : l'acide —	656
— CYANHYDRIQUE. — Recherches physiologiques sur l' —	678
ACIER. — L' —. Historique, fabrication, emploi.	976
ACTINO-ÉLECTRIQUES. — Etude des effets —	307
— La cause probable des phénomènes —	695
AVROSTIER. — Souvenirs et récits d'un — militaire de l'armée de la Loire 1870-1871.	782
AGRICULTURE. — Application de l'électricité à l' —	677
— AIMANTATION. — Etude théorique et expérimentale sur l' — transversale des conducteurs magnétiques.	380
AIMANTS. — Les —	38
ALCALOÏDES. — Les — de l'huile de foie de morue.	276
ALEMBERT (d'). — Lagrange et d' — d'après leur correspondance.	529
ALGÈBRE. — Leçons d' — supérieure.	379
— Cours d' — supérieure.	411
ALGOL. — Des intermittences périodiques de l'éclat d' —.	214
ALLIAGES. — Les —	215
— La liqumtion des — d'or et de platine.	615
AMIDON. — Les récents travaux sur l' — et les diastases.	733
AMPHIGÈNE. — Synthèse de l' —	298
ANALYSE. — Curso de — infinitésimal, 1 ^{re} partie calcul intégral.	379
— Compositions d' —, Mécanique et Astronomie.	491
— Cours d' — infinitésimale à l'usage des personnes qui étudient cette science en vue de ses applications mécaniques et physiques.	613
— Revue annuelle d' —.	702
ANATOMIE. — L' — du cheval.	88
— Mannel d' — comparée des Vertébrés.	246
— Traité pratique d' — comparée.	313
ANDALOUSIE. — La géologie de l' — et le tremblement de terre du 25 décembre 1884, d'après le récent rapport de la mission française.	696
ANÉMIE. — Un cas d' — pernicieuse.	419
— L' — pernicieuse d'origine parasitaire.	294
ANESTHÉSIEQUES. — Les —; physiologie et applications chirurgicales.	313
ANGINE. — Recherches bactériologiques sur l' — pseudo-diphthérique de la scarlatine.	618
ANNALES. — — géologiques de la péninsule balkanique.	21
ANNEAU DE NEWTON. — La visibilité des —.	770
ANTHROPOLOGIE. — L' — criminelle et ses récents progrès.	711
ANTISEPSIE. — Les sages-femmes et l' —	106
ANTISTÉPTIQUES. — Recherches expérimentales sur l'action de quelques — sur le Streptocoque et le Staphylococcus pyogenes aureus.	788
APPAREIL URINAIRE. — Chirurgie de l' —	517
ARCHÉEN. — L' — et le Cambrien dans le nord du massif Breton et leurs équivalents dans le nord du pays de Galles.	785

ARCHÉOLOGIE. — Application de nouveaux instruments de précision à l' —	147
ARITHMÉTIQUE. — Leçons d' —	782
ARTHROPODES. — Contribution à l'étude du cerveau chez les — trachéates.	742
ASSAINISSEMENT. — — des villes.	48
ASTRONOMIE. — Revue annuelle d' —	172
— Bibliographie générale de l' —	310
ATLAS. — Physikalischer —	452
ATTRACTION. — — des sphères.	33
— Sur le mouvement d'un corps soumis à l' — newtonienne de deux corps fixes, et sur l'extension d'une propriété des mouvements képlériens.	709
AUSCULTATION. — La tuberculeuse et l' —	17

B

BABYLON. — Astronomisches aus —	21
BACILLE. — Recherches sur le — typhique.	143
— Sur l'exaltation de la virulence du — morveux.	216
BACTÉRIE. — — charbonneuse asporogène.	87
BACTÉRIES. — Les — et leur rôle dans l'étiologie, l'anatomie et l'histologie pathologiques des maladies infectieuses.	523
BALLISTICS. — Internal —	340
BIOPHÈNE. — La découverte du —	462
BLENNORRAGIE. — La — chez la femme.	314
BOTANIQUE. — Revue annuelle de —	236
BRACHIOPODES. — Les —, leur structure et leur parenté.	767
BRONTOMÈTRE. — Le —	710
BRUSHITE. — Le gisement de — de la grotte de Minerve (Aude).	555

C

CALÉFACATION. — Mesures des tensions superficielles dans les liquides en —	34 et 309
CAMBRIEN. — (Voir Archéen).	785
CAPILLARITÉ. — Influence de la — et de la diffusion sur l'énergie dissolvante des liquides.	452
CARBONE. — L'assimilation du — par les plantes vertes en partant de certains composés organiques.	414
— Les réactions colorées des composés du —	710
CARIE. — Sur le traitement de la —	649
CARTES. — Les deux nouvelles — géologiques de la France.	43
CAUSSES. — Les Cévennes et la région des —	616
CELLULOSE. — Variétés de —	243
CENTRABILLAT. — Biologie.	149
CÉPHALALGIES. — Contribution à l'étude des —, névralgies et migraines d'origine nasale.	454
CERVEAU. — Contribution à l'étude du — chez les Arthropodes trachéates.	712
CÉTACÉS. — Les — souffleurs.	182
CÉVENNES. — Les — et la région des Causses.	616
CHALEUR. — Sur la — latente de vaporisation des gaz liquéfiés.	245
CHAMP ÉLECTRIQUE. — Production d'un — par un phénomène optique.	687
CHAMP. — Sur la mesure magnétique.	342
CHARBON. — Le — des pigeons.	216
— Le — des rats blancs.	383

¹ Les chiffres gras renvoient aux articles originaux.

CHEYNE-STOKES. — Contribution à l'étude de la respiration périodique et du phénomène de	711	CYCLONES. — Sur les	480 et 559
CHIMIE. — Revue annuelle de — appliquée	112	CRYSTALLOGES. — — symptomatiques des lésions rénales et pyonéphroses consécutives à des lésions vésicales	617
— Les problèmes de la — moderne	225		
— Les théories modernes de la — et leur application à la mécanique chimique	311	D	
— Revue annuelle de — pure	444	DÉBLAIS. — Le problème des — et des remblais	97
— Traité de — appliquée à l'industrie	492	DENSITÉS. — Détermination à la température du rouge blanc, des — de vapeur de quelques corps simples et composés	117
— Traité de — minérale et organique	741	DEXTROSE. — Synthèse de la —	224
— Les principes de la —	784	DIAPASON. — Emploi et fonctionnement du — dans les appareils balistiques enregistreurs	214
CHIRURGIE. — Traité pratique de la — d'armée	119	DIPHTÉRIE. — Les observations récentes de M. Klein sur l'étiologie de la —	338
— Revue annuelle de —	512	DISCOURS. — Le — de M. A. Cornu au congrès de Limoges	496
— La — des reins et des urtères	689	DISPENSAIRES. — L'assistance médicale par les — dans les campagnes	686
CHLORAL. — De l'influence du — sur les combustions respiratoires chez le chien	493	DISSOCIATION. — — des Substances en dissolution	648
CHLORE. — L'industrie du —	112	DRAINAGE. — La composition des eaux de —	496
CHLOROPHYLLE. — La synthèse de la matière organique sans — ni lumière	299	DRYOPTHÈQUE. — Le — et l'origine de l'homme	161
CHLORURES. — Sur les — d'acides bibasiques	520	DYNAMIQUE. — Elementary dynamics	146
CHOC. — Courbes représentatives des lois du — longitudinal et du — transversal d'une barre prismatique	379	DYNAMO-ÉLECTRIQUE. — La théorie des machines —	607
CHOLÉDOQUE. — Remarques cliniques sur un cas d'obstruction du canal	183	DYNAMOMÈTRE. — — universel à lecture directe du travail	527
CHOLÉDYLSTENTÉROSTOMIE. —	183		
CHOLÉRA. — La prophylaxie internationale du —	257	E	
— The bacteria in asiatic	383	Eaux d'égout. — La question des — et de l'épandage ..	49
— Le — en Espagne et les mesures prophylactiques	441	Eaux potables. — Bactériologie des —	48
CHROME. — Recherches sur le —	148	ÉBULLITION. — Températures d' — du sodium et du potassium	87
CIRCULATION. — La — des matières colorantes nutritives dans les plantes vasculaires	239	ECLAIRAGE. — L' — électrique à Berlin	424
CLINIQUE. — Leçons de — chirurgicale	415	— L' — électrique à l'Exposition universelle de 1889 ..	306
COBALT. — Recherches sur le — et le nickel	56	ECLIPSE. — — totale de soleil du 22 décembre 1889 ..	32
COMBUSTIONS RESPIRATOIRES. — Mesure des — chez le chien	554	— L' — du 17 juin 1890	392
COMÈTES. — Etudes récentes sur les — et les étoiles filantes	65	ECONOMICS. — Principles of	647
— Découverte de deux planètes et d'une — (Brooks) ..	492	ELASMOBRANCHES. — Sur l'anatomie du système nerveux grand sympathique des — et des Poissons osseux ..	277
— périodiques de Brorsen et de d'Arrest	424	ELASTICITÉ. — Théorie de l' — des corps solides	310
— Deux nouvelles — (Coggia-Denning)	528	— Sur le rapport de deux coefficients d' — des corps isotropes	552
CONDENSATEURS. — Sur les — en mica. — Sur le résultat des —	614	ELECTRICITÉ. — La théorie mathématique de l' —	33
CONFÉRENCES. — — faites au laboratoire de M. Friedel ..	587	— Leçons sur l' —	118
CONGRÈS. — — de Limoges, 7-14 août 1890	463	— Leçons sur l' — professées à l'Institut électro-technique de Montefiore, 1 ^{re} partie	312 et 676
— Le premier — de l'Association pyrénéenne à Narbonne ..	624	— Traité élémentaire d' —	520
CONFÈRES. — Recherches morphologiques sur les feuilles des —	521	— Application de l' — à l'agriculture	677
CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS. — Chaires nouvelles au —	496	— Dictionnaire d' — et de magnétisme	741
CONVECTION. — Sur l'action électro-magnétique de la — électrique	147	ELECTRO-DYNAMIQUES. — Les perturbations de Mercure et les lois — de Gauss	127
CORPS ISOTROPES. — Sur le rapport de deux coefficients d'élasticité des —	552	— Expériences de répulsion	306
COSSON (Ernest). — Notice académique sur —	760	ELECTROLYSE. — Expériences sur l' — des muscles	82
COTON. — L'impression des tissus de —	148	ELECTROLYTES. — Recherches sur les — fondus	412
COULEURS. — Répertoire chromatique, solution raisonnée et pratique des problèmes les plus usuels dans l'étude et l'emploi des couleurs	784	ELECTRO-MAGNÉTIQUE. — Les actions —	38
COUPS DE FEU. — Expériences sur les — des chaudières à vapeur	180	— Machines —	40
COURANTS. — Les —	38	— Sur l'action — de la convection électrique	147
— Expérience sur la question de la direction et de la vitesse du — électrique	380	— Détermination de v , rapport des unités — aux unités électro-statiques	341
COURBES. — Sur les — à torsion constante	585	— Les théories de Maxwell et la théorie — de la lumière	675
COURRIER. — — de Genève	491 et 557	ELECTROSTATIQUE. — —	36
— — de Berlin	286	ÉLÉMENTS HISTOLOGIQUES. — L'observation des — à la température normale de la vie	423
— — de Naples	422	ÉLÉMENTS VOLTAIQUES. — Sur la théorie des — et la polarisation galvanique	180
— — d'Amsterdam	526	EMBRYON. — Contribution à la pathologie de l' — humain	589
— — de Rome	620	EMPOISONNEMENTS. — Etude sur les — alimentaires ..	617
COVOLUME. — A propos du — de l'équation des fluides ..	785	ENCÉPHALOCÈLES. — Considération sur l'origine, le mode de développement et le traitement de certaines — ..	344
CRANECTOMIE. — De la — dans la Microcéphalie	393	ENDOCARDITE. — Note sur un fait contribuant à établir l'existence de l' — tuberculeuse	743
CRIQUETES. — Invasion des — Microcéphalic	378	ENDOGÈNE. — Sur les membres —	236
CRUSTACÉS. — Système nerveux des —	182		
CRYSCOPIE. — Sur les progrès de la —	181		
CUIVRE. — Le spectre du sous-chlorure de —	311		
CYANOPHYCÉES. — Sur les cellules des —	454		
CYCLOÏDE. — La découverte de la —	431		

ENERGIE — L' — et ses transformations.....	117
— Traité élémentaire de l' — électrique.....	413
ENGINE. — A handbook of — and Boiler trials and of the indicator and Prony brake for Engineers and technical schools.....	739
ESGRAIS. — La production végétale et les — chimiques.....	786
EOCÈNE. — Recherches géologiques sur les terrains secondaire et l' — inférieur de la région sous-pyrénéenne du Sud-Ouest de la France.....	453
EPITHELIOMA. — Sur la présence d'éléments semblables aux psorospermies dans l' — pavimenteux.....	217
EQUATION. — Contribution élémentaire à l'intégration des — différentielles.....	146
— Sur les invariants de quelques — différentielles.....	180
— Résolution numérique des — algébriques transcendantes.....	245
— L' — des fluides.....	288
— L' — fondamentale des fluides.....	365
— Sur les invariants de certaines classes d' — différentielles homogènes par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées.....	739
— A propos du covolume de l' — des fluides.....	783
EQUATORIAL. — L' — conté de M. Loewy.....	762
ETALONNAGE. — des instruments de mesure électrique en Allemagne.....	618
ETAT CALORIFIQUE. — Sur un problème concernant l' — d'un corps solide homogène indéfini.....	51
ETIOLOGIE. — Les observations récentes de M. Klein sur l' — de la diphtérie.....	338
ETOILES FILANTES. — Etudes récentes sur les Comètes et les —.....	65
EVOLUTION. — Interprétation des lois de l' —.....	371
EXCRÉTEURS. — Organes — des animaux inférieurs.....	149
EXOPHTHALMOS. — De l' — pulsatile, à propos d'une opération de ligature des deux carotides primitives pour — pulsatile.....	589
F	
FAUNE. — La — souterraine.....	149
— La — pélagique.....	433 et 482
FÉCONDATION. — Les phénomènes morphologiques de la — chez les plantes phanérogames.....	403
FER. — Propriétés magnétiques et électriques du — et de ses alliages.....	159
FEUILLES. — Recherches morphologiques sur les — des Conifères.....	521
— Les — et les lois de leurs formes.....	535
— Recherches sur les caractères anatomiques des — persistantes.....	553
— Influence du bord de la mer sur la structure des —.....	677
FIXATION. — d'organes déplacés.....	516
FLUIDES. — L'équation des —.....	288
— L'équation fondamentale des —.....	365
— La vitesse de propagation des mouvements dans un — indéfini.....	209
FLUOR. — Nouvelles recherches sur le —.....	336
— Le — libre dans la Nature.....	688
FLUORURES. — La synthèse des — de carbone.....	95
FOIE. — Traité des maladies du —.....	713
FONCTIONS. — Les — pseudo- et hyper-Bernoulliennes et leurs premières applications.....	146
FONCTIONS. — Mémoire sur la théorie des — algébriques de deux variables indépendantes.....	310
FONCTIONS. — Les hyper-Bernoulliennes et la — p. (u).....	571
FORCES MOLECULAIRES. — Sur le rayon d'activité des —.....	211
FOSSES SECONDAIRES. — Etude des —.....	582
FROTTEMENT. — Etude sur le — des liquides.....	491
— Sur le — dans les machines à vapeur.....	591
G	
GASTÉROPODES. — Recherches sur l'anatomie et l'histologie du rein des — Prosobranches.....	216
GAY-LUSSAC. —.....	477
GAZ. — Sur la chaleur latente de vaporisation des — liquifiés.....	245

— Ecoulement des — à travers un long tuyau.....	302
— De la dilatation des — à des pressions inférieures — à la pression atmosphérique.....	740
GÉOGRAPHIE. — La — zoologique.....	382
GÉOGRAPHISCHES. — — Jahrbuch.....	615
GÉOLOGIE. — — von Deutschland.....	246
— La — et les études géographiques.....	313
— et topographie.....	313
— Revue annuelle de —.....	576
— La — de l'Andalousie et le tremblement de terre du 25 décembre 1884, d'après le récent rapport de la mission française.....	696
GÉOMÉTRIE. — Essai sur la — de la règle et de l'équerre.....	245
GRAD (Charles). — Notice nécrologique de —.....	421
GRAMMOPHONE. — Le —.....	286
GRISOU. — Les travaux de la Commission du —.....	540
— Le — et ses accidents.....	630
GROTTE. — de la Combe ou des deux Goules.....	414
GYNÉCOLOGIE. — Les progrès de la —.....	516

H

HALO. — Recherches sur le — photographique.....	304
— Etude expérimentale du — en photographie.....	568
HARMONICA. — Recherches sur l' — chimique.....	303
HARZES. — Entstehung und bau der Gebirge erläutert am geologischen Bau des —.....	521
HÉBERT (Edmond). — Notice nécrologique de —.....	223
HERBORISATION. — Les — parisiennes.....	710
HÉRÉDITÉ. — Les lois de l' — avec de nouvelles hypothèses physio-embryologiques (Le leggi dell' eredità con nuove ipotesi fisio-embriologico).....	522
HERTZ. — Sur les expériences de M. —.....	141
— La discussion récente des expériences de M. —.....	63
HEURE. — L'unification des longitudes et l' — universelle.....	321
— La conférence télégraphique internationale et l' — universelle.....	461
HIRM. — Sur la biographie de —.....	633
— Notice nécrologique de —.....	62
HISTOLOGIE. — Nouvelle contribution à la pathologie et à l' — de la rage humaine.....	88
HORN. — Mission scientifique du Cap —, 1882-83. Protégés.....	588
HOUILLE. — Mode de formation de la —.....	578
HOULLER. — Découverte du terrain — à Shakespeare Cliff, près de Bouvres.....	577
HUMUS. — Utilisation de l' — par les végétaux.....	242
HYDRAULIQUE. — — agricole et génie rural.....	146
— Corso di — teoretica e pratica.....	340
HYDRODYNAMIQUE. — L' — moderne et l'hypothèse des actions à distance.....	721
HYGIÈNE. — Revue annuelle d' —.....	47
— Leçons élémentaires d' —.....	150
— L' — de l'exercice chez les enfants et les jeunes gens.....	216
— — de l'habitation.....	51
— — urbaine.....	52
— — militaire.....	53
— Traité d' — publique.....	712
HYPOXANTHIE. — Contribution à l'étude de la valeur sémiologique de l' — au point de vue du diagnostic et du pronostic des affections chirurgicales.....	182

I J K

IMPRESSION. — L' — des tissus de coton.....	148
INCINÉRATION. — Sur l' — des matières végétales.....	277
INDICES DE RÉFRACTION. — des solutions salines.....	552
INDIGOTINE. — Synthèse de l' —.....	182
INDUCTION. — Théorie de l' —.....	40
INDUSTRIE. — La grande —.....	112
INFECTION. — Essai d'une théorie de l' —.....	466
INSECTES. — Les — vésicants.....	70
INSPECTEUR. — Manuel de l' — des viandes.....	314
INSTALLATIONS MÉCANIQUES. — Sur une condition de bon fonctionnement des — comportant des transmissions par liens rigides ou flexibles.....	374

INSTITUT BOTANIQUE. — L' — de Montpellier.....	781
INVARIANTS. — Sur les — de quelques équations diffé-	
rentielles.....	180
— Sur les — de certaines classes d'équations diffé-	
rentielles homogènes par rapport à la fonction in-	
connue et à ses dérivées.....	739
INJECTIONS. — Les —.....	614
JUPITER. —.....	178
KARWENDELCHIRURG. — Das —.....	353

L

LACTÉA. — Singulière phénomène d'irritabilité nelle spe-	
cie di.....	587
LAGRANGE. — — et d'Alembert, d'après leur corres-	
pondance.....	529
LAITIÈRE. — La préparation et les propriétés du ciment	
de.....	343
LARYNX. — Etat du — dans la grippe.....	523
LAVOISIER. — —, d'après M. Berthelot.....	572
LÉCYTHIDACÉES. — Recherches sur l'anatomie des or-	
ganes végétatifs des —.....	382
LÉGUMINEUSES. — Expériences sur la culture des —.....	149
LÉPADOGASTERS. — Recherches sur les —.....	24
LÈPRE. — La — dans les colonies anglaises.....	96
LÉSIONS. — De la transmission héréditaire des — ac-	
quisies.....	711
LETTRE. — — inédite de Scheele à Lavoisier.....	1
LEUCOCYTES. — Sur les propriétés chimiotactiques	
des —.....	414
LIGHT. — (Voir Lumière).....	709
LIGNES. — — de force.....	36
LIGATION. — La — des alliages d'or et de platine.....	615
LIQUIDES. — La viscosité et la rigidité des —.....	76
— Vitesse d'écoulement d'un — à travers un orifice en	
mince paroi.....	305
— Etude sur le frottement des —.....	191
LOI PÉRIODIQUE. — La — des éléments chimiques.....	22
— Illustrations géométriques de la — des poids ato-	
miques.....	23
— Recherches expérimentales sur la —.....	418
LONGITUDES. — L'unification des — et l'heure univer-	
selle.....	321
LUMIÈRE. — Théorie mathématique de la —.....	675
— The theory of light.....	709
LUNE. — La température de la —.....	782
LYMPHE. — Sur le mode d'action de la — de Koch.....	797

M

MACHINES. — Théorie des — thermiques.....	2
— Reflections on the motive power of heat and on —	
fitted to develop that power.....	379
— La théorie des — dynamo-électriques.....	607
MACHINES A VAPEUR. — La —.....	54
— Le machine a vapore.....	54
— Appendice al trattato le machine a vapore.....	54
— La thermodynamique et ses applications aux —.....	85
— Les — et leurs progrès.....	129
— La — historique, questions pendantes, etc.....	289
— Théorie expérimentale de Hirn et Dvshlshauers sur	
la —.....	411
— Sur le frottement dans les —.....	491
— Traité des —.....	550
— Etude théorique et expérimentales sur les — à	
détentes successives.....	585
— Les — à triple et quadruple expansion.....	782
MALADIE BLEUE. — Contribution à l'étude de la Physio-	
logie pathologique de la —.....	26
MALADIES. — Leçons sur les — microbiennes.....	493
— Les — microbiennes des plantes.....	728
MALADIE DE PAGET. — Anatomie pathologique et nature	
de la — du mamelon.....	88
MAGNÉTIQUE. — Sur la mesure du champ — terrestre.....	312
MAMÈLE. — Sur les causes des récidives cancéreuses	
locales après l'amputation de la —.....	153
MANUEL. — — de l'inspecteur des viandes.....	314

MANUEL. — Manuel du candidat aux divers grades et	
emplois de Médecin et de Pharmacien de la réserve	
et de l'armée territoriale.....	553
MARS. —.....	173
MASSIF ANCIEN. — Etude géologique du — situé au sud	
du Plateau Central.....	618
MATHIEU (Emile). — Notice nécrologique de.....	687
MATIÈRES. — — colorantes.....	115
MATIÈRE ORGANIQUE. — La synthèse de la — sans chlo-	
rophyll ni lumière.....	299
MAXWELL. — Les Théories de — et la théorie électro-	
magnétique de la lumière.....	675
MÉCANIQUE. — Traité de — céleste.....	274
— Traité de — générale.....	310
— Traité de — rationnelle.....	310
MÉDECINE. — Revue annuelle de.....	773
MÉDICAL. — Annual of the universal — Sciences.....	617
MÉDICATIONS. — Les —.....	554
MEMBRES. — Chirurgie des —.....	518
MERCURE. — — et les planètes intra-mercurielles.....	173
— Les perturbations de — et les lois électro-dyna-	
miques de Gauss.....	127
— La rotation de — d'après M. Schiaparelli.....	603
METALS. — On the permanent effects of strain in —; on	
their self-registration and mutual interactions.....	782
MÉTAMÉRIE. — La — céphalique, sa place dans l'his-	
toire de l'évolution des Vertébrés.....	593
MÉTAUX. — Traité de métallurgie des — autres que le	
fer; cuivre, plomb, argent, etc., etc.....	781
MÉTHYLSACCHARINE. — La — nouvelle matière su-	
crée.....	587
MICROBES. — Propriétés pathogènes des — renfermés	
dans les tumeurs malignes.....	88
— Les — des eaux minérales.....	678
MICROCÉPHALIE. — De la Craniectomie dans la —.....	393
MOBILITÉ. — Une nouvelle cause de — de l'écorce ter-	
restre.....	267
MOLLUSQUES. — Sur quelques plantes vivant dans le	
test calcaire des —.....	215
MOLLUSQUES. — Les huîtres et les — comestibles.....	383
MORTALITÉ. — De la — à Paris pendant le mois de dé-	
cembre 1889.....	26
MOUTON. — Les parasites animaux du —.....	649
MOUTS. — Note sur la filtration des — de malt vert et	
de maïs à travers le filtre Chamberland.....	676
MOUVEMENTS. — La vitesse de propagation des — dans	
fluide indéfini.....	209
— Sur le — d'un corps soumis à l'attraction newto-	
nienne de deux corps fixes, et sur l'extension d'une	
propriété des — keplériens.....	709
MUSCLES. — La contraction des — striés.....	234
MYCORHIZES. — Les —.....	326

N

NAVIGATION. — The problem of air.....	613
NÉPHÉLINE. — Synthèse de la —.....	288
NEPTUNE. — — et les planètes ultra-Neptuniennes.....	179
NEPES. — Exposé de l'état actuel de nos connaissances	
et observations personnelles sur la terminaison	
des — dans les muscles lisses de la sangue.....	534
NEUMAYR (Melchior). — Notice nécrologique de.....	459
NICKEL. — Recherches sur le Cobalt et le —.....	56
— Un nouveau type de composé chimique : le — tetra-	
carbonyle.....	657
NOTICES NÉCROLOGIQUES. — Hirn (G.-A.).....	62
— Neumayr (Melchior).....	150
— Hébert (Edmond).....	223
— Trélat (Ulysse).....	235
— Pélégot (Eugène).....	236
— Soret (Louis).....	332
— Grad (Charles).....	421
— Toussaint (H.).....	634
— Mathieu (Emile).....	687
NOUVEAU CELLULAIRE. — Etude du —.....	210
NUTATION. — La — diurne.....	117

O

OBSERVATIONS SPECTROSCOPIQUES. — Les — de M. Janssen au sommet du mont Blanc.....	560
OBSERVATOIRE. — Rapport annuel sur l'état de l'— de Paris pour l'année 1889.....	519
— Annales de l'— de Nice.....	739
OISEAUX. — Anatomie descriptive du Sympathique chez les —.....	56
— La vie des —.....	182
OXÈS ÉLECTRIQUES. — Propagation des —.....	308
OPÉRATIONS FINANCIÈRES. — Traité mathématique et pratique des —.....	451
OPTIQUE. — Electricité et —.....	675
OSSEMENTS FOSSILES. — Notice sur les — de la Louisiane et de la Floride.....	381
OZONE. — Phosphorescence et —.....	86

P

PALÉONTOLOGIE. — Les progrès de la —.....	465
PARANÉCIES. — Maladies infectieuses des —.....	247
PAROTIDES. — De l'innervation des glandes — chez les animaux domestiques.....	522
PATHOGÈNE. — Propriétés — des microbes renfermés dans les tumeurs malignes.....	88
PATHOLOGIE. — Nouvelle contribution à la — et à l'histologie de la rage humaine.....	88
— Traité élémentaire de — générale.....	788
PÊCHES. — Les principes scientifiques des grandes —.....	137
PÉLIGOT. — Notice nécrologique de.....	256
PÉRFORATIONS. — Traitement des — traumatiques de l'estomac et de l'intestin.....	454
PÉRITONE. — Recherches expérimentales sur le lavage du —.....	56
PÉRITONITE. — Étiologie de la —.....	483
PHAGOCYTOSE. — Recherches nouvelles sur la —.....	425
PHILIPPS (Ed.). — L'éloge académique de —.....	718
PHONOGRAPHIE. — Travaux sur le —.....	303
PHOSPHATE DE CHAUX. — Origine et mode de formation des rognons de —.....	582
PHOSPHORESCENCE. — et ozone.....	87
PHOTOGAPHIC. The — image.....	586
PHYSIOLOGIE. — Travaux du laboratoire de — générale de la Faculté des Sciences de Lyon.....	617
— Revue annuelle de.....	636
— Cours de. — Programme sommaire.....	743
PHYSIQUE. — Exercices de — et applications préparatoires à la licence.....	86
— Revue annuelle de.....	302
— Cours de mathématique.....	675
PENDULE. — Mémoires sur le —.....	21
PIED-BOT. — Contribution à l'étude du — invétéré.....	344
PILES. — Une — photo-électrique.....	339
— Piles — Traité — électriques.....	246
— Les — chlorochromiques du commandant Renard.....	508
PILE-BLOC. — La — à liquide immobilisé.....	652
PLANTES. — Petites —.....	177
— Découverte d'une — entre Mars et Jupiter.....	160
— Découvertes de deux planètes (289) (290) et d'une comète.....	192
— Perturbations des —.....	274
— Découverte de deux planètes (291) (155).....	320
POINSON (Louis). — Éloge historique de.....	753
POINT CRITIQUE. — Le coefficient critique et le poids moléculaire des corps au —.....	785
POINTS INTÉRIEURS. — Surfaces sans action sur les — et la — galvanique.....	35
POLARISATION. — Sur la théorie des éléments voltaïques et la — galvanique.....	180
— Sur la — elliptique des rayons réfléchis et transmis par les lames métalliques.....	311
POLYXÉRYTES. — Les —.....	112
POMME DE TERRE. — Recherches sur la culture de la — industrielle et fourragère.....	786
PORCELAINES. — Composition des — kaoliniques.....	676

POROXYLONS. — Les —, végétaux fossiles de l'époque houillère.....	382
POTASSIUM. — Température d'ébullition du —.....	87
POTENTIELLE. — La fonction —.....	31
POULS. — Etude du — total des extrémités.....	588
PRESSION OSMOTIQUE. — La constitution des solutions moléculaires et la —.....	193
PROBABILITÉS. — Calcul des —.....	85
PROJECTILES. — De l'influence d'un vent parallèle au plan de tir sur les portées des —.....	379
PROLAPSUS. — Le traitement du — du rectum devant la Société de Chirurgie.....	25
PROPHYLAXIE. — La — internationale du choléra.....	257
PROPOS. — — scientifiques.....	522
PROTOZOAIRES. — Mission scientifique du cap Horn, 1882-83.....	588
PERSONES. — Sur la présence d'éléments semblables aux — dans l'épithélioma pavimenteux.....	247
PYONÉPHROSES. — consécutives à des lésions vésicales.....	617

R

RADIATIONS. — Les nouvelles expériences de M. O. Lodge sur les — électriques.....	272
RAGE. — Nouvelle contribution à la pathologie et à l'histologie de la — humaine.....	88
RAMIE. — La —.....	11
RÉCIDIVES CANCÉREUSES. — Sur les causes des — locales après l'amputation de la mamelle.....	183
RECTUM. — Le traitement du prolapsus du — devant la Société de Chirurgie.....	25
— Cancer du —.....	216
— Chirurgie du —.....	515
RÉFRACTION. — Influence du terme de dispersion de Briot sur les lois de la double —.....	275
RÉGIONS MONTAGNEUSES. — Etude géologique des —.....	580
RÉGULATEUR. — Regulatori di velocita a forza centrifuga. — Sur la théorie des —.....	625 et 663
REMBLAIS. — Le problème des déblais et des —.....	97
RÉSONNANCE. — Expériences de M. O. Lodge sur la — électrique.....	128
— Sur la — multiple des ondulations électriques de M. Hertz se propageant le long des fils conducteurs.....	451
RESPIRATION. — Contribution à l'étude de la — périodique et du phénomène de Cheyne-Stokes.....	711
RÉVIVISCENTE. — Une nouvelle plante —.....	127
REVUE. — Revue annuelle d'Hygiène.....	47
— de Chimie appliquée.....	112
— d'Astronomie.....	172
— de Botanique.....	236
— de Physique.....	302
— de Zoologie.....	370
— de Chimie pure.....	444
— de Chirurgie.....	512
— de Géologie.....	576
— de Physiologie.....	636
— d'Analyse.....	702
— de Médecine.....	773
RHODITÉ. — La viscosité et la — des liquides.....	76

S

SAGES-FEMMES. — Les — et l'antisepsie.....	106
SARLINE. — Conditions de la vie de la —.....	377
SATURNE. —.....	178
SCARLATINE. — Recherches bactériologiques sur l'angine pseudo-diphthérique de la —.....	618
— Contribution à l'histoire de la — d'après les observations prises pendant l'épidémie de Londres.....	788
SCHISTES. — Origine des — cristallins.....	578
SELS. — Tableaux d'analyse qualitative des — par voie humide.....	452
SENS. — Les — chez les animaux inférieurs.....	343
SENSATIONS. — Les — internes.....	56
— Nouvelle théorie du mécanisme des — lumineuses.....	198
SÉRIE PYRIDIQUE. — Nouvelles recherches sur les bases de la série — et de la série quinoléique.....	413

SÈVE. — Sur la cause de l'ascension de la	312
SODALITE. — Synthèse de la	288
SODIUM. — Température d'ébullition du	87
SOIE. — Invention de la — artificielle	114
SOLEIL. —	172
— Assumption and facts in the theories of solar and stellar proper motions	674
SOLUTIONS. — La constitution des — étendues et la pression osmotique	193
— Indices de réfraction des — salines	352
SON. — Sur la propagation du — à l'intérieur d'un tuyau cylindrique	181 et 304
SORET (Louis). — Notice nécrologique de	352
SOUDE. — Application du procédé Leblanc à la fabrica- tion de la —	112
— Fabrication de la — caustique	113
SPECTRE. — Le — du sous-chlorure	311
— Etude sur les — infra-rouges de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone	784
SPECTROPHOTOMÈTRE. — Sur un — différentiel sans po- larisation	586
SPECTROSCOPIE. — Traité élémentaire de	147
SPONGIAIRES. — Les récents travaux sur les —	668
SQUELETTE. — Recherches anthropologiques sur le — quaternaire de Chancelade	588
— des extrémités	376
STOMATES. — Structure et fonctions des —	100
SUCRES. — La synthèse des —	165
— Nouvelles recherches sur les —	592
SURFACES. — Recherches sur les — qui sont, en même temps, lieux de coniques et enveloppes de cônes du second degré	519
SURMENAGE. — Contribution à l'étude expérimentale du —, son influence sur l'infection	618
SYMPATHIQUE. — Anatomie descriptive du — chez les Oiseaux	56
— Sur l'anatomie du système nerveux grand — des échinodermes et des poissons osseux	277
SPHÈRES TOURNANTES. — Sur les tourbillons, trombes, tempêtes et —. Etudes et expériences	54
SPHILIS. — — et santé publique	150
— — et mariage	743
SYSTÈME NERVEUX. — L'évolution du —	382

T

TEMPÉRATURES. — Mesure des — élevées	276
TEMPÊTES. — Sur les tourbillons, trombes, — et sphères tournantes. Etudes et expériences	54
TEMPS. — Connaissance des —	451
TENSIONS. — Mesure des — superficielles dans les liqui- des en ébullition	54
TERRAINS SECONDAIRES. — Les — des environs de Tia- ret et de Frensd. — Recherches géologiques sur les — et l'éocène infé- rieur de la région sous-pyrénéenne du sud-ouest de la France	492
TERRES. — Les — rouges	453
TEXTILES. — Les —	396
THÉRAPEUTIQUE. — La — sous les premiers Césars	183
THERMOCIMIE. — Sur quelques applications de la — à l'étude de la constitution des alcalis organiques	381
THERMODYNAMIQUE. — La — et ses applications aux machines à vapeurs	85
— La — d'après MM. J. Bertrand, R. Clausius et G. von Leuner	670
THERMOMÉTRIE. — Traité pratique de — de la précision	86
TIGRE. — Recherches sur la structure comparée de la — des arbres	742
TORILLEURS. — Les nouveaux — chauffés au pétrole	623
TOURBILLONS. — Sur les —, trombes, tempêtes et sphé- res tournantes. Etudes et expériences	54

TOURBILLONS. — Sur les — artificiels	497
— Expériences sur les —	302
TOUSSAINT (H). — Notice nécrologique de	654
TRANSFORMATEURS. — Emploi des —	306
TRANSMISSION. — La — instantanée des images par l'é- lectrécité	798
TRANSPORT ÉLECTRIQUE. — Sur un nouveau — des sels dissous	414
TRAVAIL. — — musculaire et échanges azotés	118
TRÉLAT (Ulysse). — Notice nécrologique de	255
TREMBLEMENTS DE TERRE. — Recherches sur les —	312
— La géologie de l'Andalousie et le — du 25 décem- bre 1884, d'après le récent rapport de la mission française	696
TRÉPANATION. — La — du crâne	517 et 546
TROMBES. — (Voir tourbillons)	
TUBERCULOSE. — La — et l'auscultation	17
— Sulle principali cause di diffusione della tubercolosa	344
— Congrès pour l'étude de la —	50
— Les Tubercules et le bacille de la —	659
— Les expériences de M. Robert Koch sur la guérison de la —	719
TUMEURS. — Propriétés pathogènes des microbes ren- fermés dans les — malignes	88
— Remarques cliniques et anatomiques sur deux — vasculaires du cuir chevelu	278
— Du traitement chirurgical des — de la vessie	314
— Diagnostic précoce des — malignes du rein	415
— lymphatiques multiples avec leucémie	415
TYPHOÏDE. — La transmission de la fièvre — par l'air	143
TYPHUS. — Le micro-organisme du — du cheval	646

U

UNITÉS. — Les — électriques	4
UNIVERSITÉ. — Les voyages d'étudiants à propos du sixième centenaire de l' — de Montpellier	351
— La reconstitution des — françaises	353
URANUS. —	17
URÉTRO-PYLÉLITES. — Influence du traitement de la ves- sie sur les —	617
UTÉRUS. — Extirpation totale de l' — par la voie vagi- nale	1
— Des résultats éloignés de l'ablation des annexes de l' —	67

V. W

VACCINATION. — Traité pratique de la — animale	2
— La — contre le tétanos et la diphtérie	752
VASCULAIRES. — La circulation des matières nutritives dans les plantes	23
VÉNUS. —	174
VERTÈBRES. — La descendance des —	373
VESSE. — Influence du traitement de la — sur les uré- téro-pylélites	61
VINS. — Manuel de l'analyse des —	342
VIRULENCE. — Sur la nature et le mécanisme de la —	561
VIRUS. — A quel moment le — rabique apparaît-il dans la bave des animaux enragés ?	278
VISCOSITÉ. — La — et la rigidité des liquides	76
VITESSE. — La — de propagation des mouvements dans un fluide indéfini	209
VOL. — Une nouvelle théorie sur le — à voile des oi- seaux	737
WILLANS. — La « Central Valve Engine » de M. —	283

X. Y. Z

ZOOLOGIE. — Revue annuelle de	370
— Ouverture des nouvelles galeries de — du Muséum d'histoire naturelle	377
— Traité de —	787

ERRATA

Page 27. — Académie des sciences de Paris. Sc. physiques, ligne 44 au lieu de : *Lecoq de Boisboudran*, lire : LECOQ DE BOISBRAUDRAN.

Pages 76 et suiv. — Au lieu de : *L. Poincaré*, lire : L. POINCARÉ.

Page 91. — Colonne 2, ligne 23, au lieu de : *l'histoire nationale des Cétacés*, lire : L'HISTOIRE NATURELLE DES CÉTACÉS.

Page 92. — Ligne 50, au lieu de : *Mémoire sur les fonctions symétriques*, lire : MÉMOIRE SUR LES FONCTIONS SYMÉTRIQUES.

Page 120. — Ligne 26, col. 2, au lieu de : *M. de Cayeux*, lire : M. L. CAYEUX.

Page 152. — Ligne 3, col. de g., au lieu de : *Ch. Ferry*, lire : CH. FERRY.

Page 153. — Au lieu de : (Soc. Franç. de phys.), *Séance du 7 février 1890*, lire : SÉANCE DU 7 MARS 1890.

Page 184. — 1^{re} col. de g., ligne 5, au lieu de : *Dierkz*, lire : DIERCKX.

Page 184. — 2^e col. de d. en bas, au lieu de : *M. Fagh* : lire M. FOHN.

Page 186. — Au lieu de : *Plauck*, lire : PLANCK.

Page 188. — Soc. Sav. d'Odessa, ligne 13, au lieu de : *M. Funatar*, lire : TANATAR.

Page 188. — *idem*, ligne 27, au lieu de : *D' Fictine*, lire : TICTINE.

Page 189. — Soc. de Phys. Berlin, au lieu de : *Séance du 2 mars 1890*, lire : SÉANCE DU 20 MARS 1890.

Page 218. — Col. 2 de g., ligne 47, au lieu de : *M. Henri Bursault*, lire : M. HENRI BOURSALT.

Page 281. — Soc. chim. de Paris, ligne 21, au lieu de : *M. Gorgue*, lire : M. GORGEU.

Page 420. — Soc. de chim. Londres, ligne 13, au lieu de : *Amstrong*, lire : ARMSTRONG.

Page 745. — Soc. de Biologie, au lieu de : *Séance du 6 novembre 1890*, lire : SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1890.

Page 788. — Au lieu de : *Astley Greeswel*, lire : GRESWELL.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

UNE LETTRE INÉDITE DE SCHEELE A LAVOISIER ⁽¹⁾

Lorsque Lavoisier eut publié ses *Opuscules chimiques*, qui parurent en janvier 1774, il en adressa des exemplaires à un grand nombre de savants : Bergman, Scheele, Franklin, Guyton de Morveau, Priestley, etc., ainsi qu'aux Sociétés françaises et étrangères.

La lettre de Scheele que nous publions aujourd'hui a été écrite en réponse à l'envoi d'un exemplaire des *Opuscules chimiques*; c'est la seule lettre que le grand chimiste suédois ait adressée à Lavoisier, qui malheureusement ne donna pas suite à cette correspondance. Cette lettre est en français; nous la reproduisons sans changement :

MONSIEUR,

J'ai reçu par M. le secrétaire Wargentin (2) un livre qu'il dit que vous avés eu la bonté de me donner. Quoique je n'aye pas l'honneur d'être connu de vous, je prends la liberté de vous remercier très humblement. Je ne désire rien avec tant d'ardeur que de vous pouvoir faire montrer paraître (*sic*) ma reconnaissance. J'ai longtemps souhaité de pouvoir lire un recueil de toutes les expériences qu'on a faites en Angleterre, en France

et en Allemagne, de toutes sortes d'air. Vous n'avez pas seulement satisfait à ce souhait, mais vous avés aussi, par de nouvelles expériences, donné aux savants les plus belles occasions de mieux examiner à l'avenir le feu et la calcination des métaux. J'ai fait, pendant quelques années, des expériences de plusieurs sortes d'air, et j'ai aussi employé beaucoup de soins à découvrir les singulières qualités du feu, mais je n'ai jamais pu composer un air ordinaire de l'air fixe. J'ai bien plusieurs fois tâché, selon les avis de Monsieur Priestley, de produire un air ordinaire de l'air fixe (1) par un mélange de limaille de fer, de soufre et d'eau, mais il ne m'a jamais réussi, parce que l'air fixe s'est toujours uni au fer et l'a fait soluble dans l'eau. Peut-être que vous ne savés non plus aucun moyen de le faire. Parce que je n'ai point de grand verre brûlant, je vous prie de faire un essai avec le vôtre de cette manière. Dissolvés de l'argent dans l'acide nitreux et le précipités par l'alkali de tartre, lavés ce précipité, séchés-le et le réduisés par le verre brûlant dans votre machine fig. 8; mais parce que l'air dans cette cloche de verre est tel que les animaux s'y meurent et une partie de l'air fixe se sépare de l'argent dans cette opération, il faut mettre un peu de chaux vive dans l'eau où l'on a mis la cloche afin que cet air fixe se joigne plus vite avec la chaux. C'est par ce moyen que j'espère que vous

(1) Cette lettre fait partie de la correspondance de Lavoisier, que j'ai l'intention de publier, aussitôt que sera terminé le 5^e volume des *Œuvres de Lavoisier*, actuellement à l'impression.

(2) Wargentin, astronome suédois, né en 1717, mort en 1783, était secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences de Stockholm. Il fut aussi un des associés étrangers de l'Académie des Sciences de Paris.

(1) Priestley croyait avoir réussi à transformer l'air fixe (acide carbonique) en air ordinaire.

verrés combien d'air se produit pendant cette réduction, et si une chandelle allumée pouvait soutenir la flamme et les animaux vivre là-dedans. Je vous serai infiniment obligé, si vous me faites savoir le résultat de cet expériment. J'ai l'honneur d'être toujours avec beaucoup d'estime,

Monsieur,

Votre très humble serviteur.

A Upsale, le 30 septembre 1774.

C. W. Scheele.

Cette lettre montre que Scheele aurait précédé

Priestley et Lavoisier dans la découverte de l'oxygène, s'il avait eu à sa disposition le moyen de tenter la décomposition de l'oxyde d'argent par les rayons solaires. C'est le 1^{er} août seulement que Priestley a décomposé l'oxyde de mercure, et il est resté jusqu'au mois de mai 1775 sans reconnaître les propriétés caractéristiques du gaz qu'il venait de découvrir. Quant à Lavoisier, ses recherches sur l'air fourni par la calcination de l'oxyde de mercure ne furent entreprises qu'au mois de novembre 1774.

Édouard Grimaux.

Professeur à l'École Polytechnique.

THÉORIE DES MACHINES THERMIQUES

Existe-t-il une théorie des machines thermiques? Nous voulons dire une théorie vraiment rationnelle, établie sur des bases indiscutables, parfaitement d'accord avec les faits, assez complète pour embrasser tous les cas, et permettant non seulement d'analyser le fonctionnement de ces machines, mais encore de procéder avec sécurité aux calculs de leur établissement. Cette question provoque généralement une réponse négative de la part des savants et des praticiens, qui se trouvent d'accord pour la circonstance; les premiers, forts des ressources de l'analyse mathématique, auraient bientôt fait d'aligner leurs équations et d'en déduire la solution de ce problème, pour compliqué qu'il soit, mais ils se plaignent de ne point posséder toutes les données de la question et ils expliquent ainsi leur impuissance; les seconds, particulièrement épris de tout ce qui est immédiatement applicable, repoussent les longues formules qu'ils ne sauraient manier commodément et ils leur préfèrent quelques règles empiriques, dont ils reconnaissent l'inexactitude, mais qu'ils acceptent, à défaut de mieux. En un mot, les hommes de science désespèrent d'établir une théorie *générique* (le mot est de M. Hirn, notre maître), faute de données, et les hommes de métier regrettent de ne point posséder de théorie *pratique*, qui soit à la fois simple, limpide, exacte et d'une application aisée.

En se plaçant à leurs divers points de vue, les uns et les autres ont bien raison de ne pas être satisfaits des théories proposées et enseignées jusqu'ici; mais, nous n'hésitons pas à déclarer aux uns et aux autres, que leurs prétentions sont exagérées, et que jamais elles ne seront réalisées, parce

que les conditions du problème sont trop délicates et trop complexes, pour que nous les connaissions à fond et que nous puissions les renfermer toutes dans des équations simples et maniables.

Par contre, nous estimons que les travaux des analystes et surtout ceux des expérimentateurs ont singulièrement avancé la question des machines à feu, et que ce chapitre de la Thermodynamique est comparable à ceux qu'on admire le plus dans l'Optique physique et l'Électricité: c'est ce que nous voudrions démontrer, en faisant ressortir successivement l'étendue de nos connaissances, au double point de vue du rendement économique et du fonctionnement des machines thermiques. Nous y ajouterons, sous forme de déductions, quelques considérations sur les calculs d'établissement de ces machines.

I

RENDEMENT DES MACHINES THERMIQUES

Toutes les machines motrices employées dans l'industrie tirent leur puissance de la chaleur: les moteurs hydrauliques ou électriques, aussi bien que les moteurs animés, sont compris dans cette loi générale; mais, nous ne nous occuperons ici que des machines à feu, qu'elles soient à *vapeur*, à *air chaud* ou à *gaz tonnants*. On y brûle un combustible: la chaleur, qui résulte de cette réaction chimique, dilate la vapeur ou les gaz et leur fait acquérir une tension, une force élastique déterminée, laquelle vient s'exercer sur le piston mobile du cylindre et le pousse en avant. La pression moyenne effective du fluide sur le piston, est égale à la résistance

totale par unité de surface de ce piston, lorsque le mouvement est uniforme; en d'autres termes, l'effort moteur est égal à l'effort résistant. Par cylindrée, le travail $\mathfrak{C}$ est donné par la relation

$$\mathfrak{C} = psl,$$

p étant la pression moyenne, s la surface du piston et l sa course : on aurait encore, en appelant v le volume engendré par le piston

$$\mathfrak{C} = pv.$$

Nous venons d'expliquer la *course-avant* du piston : or, pour produire un mouvement continu, il faut lui faire succéder une *course-arrière*. Ce résultat s'obtiendra en diminuant la tension du fluide par une soustraction de calorique. Pour produire une évolution complète, il faut donc alternativement échauffer le fluide au contact d'une source de chaleur appelée *foyer* et le refroidir au contact d'un *réfrigérant*. Admettons que le foyer ait cédé Q calories et que le réfrigérant en ait pris q ; une quantité de chaleur $Q - q$ a disparu dans l'opération et nous savons qu'elle est équivalente au travail $\mathfrak{C}$, en vertu du principe de Mayer; nous avons donc :

$$(Q - q) 425 = \mathfrak{C}.$$

Mais la thermodynamique va plus loin; elle nous apprend que le rapport des quantités de chaleur reçue et cédée dépend uniquement des températures absolues, (comptées à partir de -273 degrés centigrades), T du foyer et t du réfrigérant, quand ils opèrent l'un et l'autre à température constante :

$$\frac{Q}{q} = \frac{T}{t}.$$

C'est le principe de Carnot. Toute la théorie des machines à feu est fondée sur ces deux principes et sur la considération du *cycle* parcouru par le fluide, c'est-à-dire de la série fermée d'opérations subie par lui entre son état initial et un état final identique au premier. Voici comment cette série se ferme pour constituer un cycle : le fluide est d'abord chauffé à la température constante T du foyer, puis on le sépare de la source et on le détend, sans lui fournir de calorique, jusqu'à ce qu'il ait pris la température t du réfrigérant; on le comprime ensuite au contact de ce réfrigérant à la température constante t , et on poursuit cette compression, sans perte ni gain de chaleur, de manière à le ramener au volume initial et à la température même de la source. Le quadrilatère courbe ABCD (fig. 1) est la représentation graphique de ce cycle, dans un système d'axes coordonnés rectangulaires

correspondant aux volumes et aux pressions du fluide : AB et CD sont des isothermiques, BC et DA des adiabatiques, et l'aire ABCD est, à une échelle déterminée, la représentation du travail $\mathfrak{C}$.




Fig. 1.

Le cycle que nous venons de décrire porte le grand nom de Carnot, qui en a introduit la considération dans la Théorie de la Chaleur. Cherchons à calculer le rendement de cette série d'opérations; pour cela, comparons la quantité $Q - q$ de chaleur transformée dans le cycle, à la chaleur totale disponible Q : ce rapport, que nous appellerons ρ , définit le coefficient économique et donne la mesure du rendement,

$$\rho = \frac{Q - q}{Q} = \frac{T - t}{T} = 1 - \frac{t}{T}.$$

Ce rendement est indépendant de la nature du fluide mis en œuvre; il ne dépend que de la chute de température $T - t$ entre le foyer et le réfrigérant.

C'est le rendement maximum qu'on puisse obtenir : ce théorème se démontre sans peine, mais un peu longuement et je préfère emprunter à M. Hirn les considérations par lesquelles il justifie ce maximum *a posteriori* : « Il est en quelque sorte évident, dit cet illustre savant, que le cycle de Carnot a été décrit de manière à donner un travail maximum. La chaleur cédée par la source a été employée uniquement à produire du travail : celui-ci est donc maximum. La chaleur envoyée au réfrigérant a été développée aussi économiquement que possible, puisque le travail n'a donné aucune variation de température. Les deux autres opérations n'ont eu d'autre but que de faire tomber et puis de faire remonter la température et la pression (1). »

Le cycle de Carnot jouit donc de la propriété remarquable d'assurer le maximum de sa valeur au rapport du travail produit à la chaleur dépensée; il ne s'agit donc pas de multiplier la chaleur dis-

(1) Exposition analytique et expérimentale de la théorie mécanique de la chaleur, t. I, p. 202, 3^e éd., 1875.

ponible Q par 425, l'équivalent mécanique de la chaleur, pour connaître le travail utilisable par la transformation de ce calorique; ainsi ceux qui prétendaient tirer d'un kilog. de houille, donnant 8,000 calories par sa combustion, un nombre de kilogrammètres égal à $8,000 \times 425 = 3,400,000$, commettaient une erreur étrange.

Il est aussi impossible de transformer en travail tout le calorique disponible, qu'il l'est d'actualiser toute l'énergie potentielle d'une chute d'eau en comptant comme hauteur de chute la distance du bief d'amont au centre de la terre, vers lequel la gravitation tend à faire converger les masses. Pour transformer intégralement Q en travail, il faudrait que le réfrigérant fût à la température du zéro absolu; or, refroidir un fluide au zéro absolu, c'est-à-dire à -273° centigrade, s'est aussi impossible, mais serait tout aussi nécessaire, que d'atteindre le centre de notre globe. C'est ρ qui représente la fraction utilisable, et, pour une machine qui fonctionne entre 150° et 100° , on trouve que ρ est égal à

$$\frac{423 - 373}{423} = 0,118.$$

La calorie ne donnera donc pas 425 kilogrammètres, mais seulement $425 \times 0,118 = 50$ kilogrammètres; c'est ce que Regnault oubliait lorsqu'il assignait à la machine à vapeur un rendement relatif dérisoire.

Les promoteurs des machines à air chaud qui se laissèrent griser par le succès éphémère d'Ericson ne furent pas plus logiques: ils ignoraient qu'aucun cycle ne peut avoir de coefficient économique supérieur à celui de Carnot, quel que soit le fluide mis en œuvre. Au point de vue dogmatique, il n'y a qu'à s'en référer à l'énoncé du second principe de la thermodynamique. Mais on a tellement exagéré les avantages de l'emploi de l'air chaud, qu'il convient d'insister un peu sur la question: l'air ne change pas d'état, disait-on, tandis que l'évaporation de l'eau exige une énorme dépense de chaleur *latente*; pour parler un langage plus correct, avec l'air, toute la chaleur donne du travail externe, tandis qu'avec la vapeur elle est partiellement employée en travail interne. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'une notable partie de la vapeur se condense pendant la détente: on regagne donc une fraction de ce travail interne. En somme, le seul avantage du moteur à air chaud, réside dans la chute plus grande de température entre le foyer et le réfrigérant.

Notre équation de rendement nous permet de déterminer exactement le coefficient maximum d'utilisation de la calorie dans les machines dont on

connaît les températures limites: faisons ce calcul pour une excellente machine à vapeur à condensation, une bonne machine à air chaud et un moteur à gaz à compression préalable, en admettant que le cycle de Carnot y soit réalisé:

	T	t	T-t	ρ
Machine à vapeur.....	432°	319°	113°	0,26
Machine à air chaud.....	523	323	200	0,38
Moteur à gaz tonnant.....	1803	323	1480	0,82

Mais notre hypothèse est fautive et les machines réelles ne reproduisent pas les conditions essentielles du cycle de Carnot; leurs cycles sont déformés, celui du moteur à gaz surtout (1), et il faut en tenir compte. Or, ces déformations ont pu être étudiées, et l'on a pu calculer le rendement théorique maximum qu'on puisse en espérer. N'entrons pas, pour le moment, dans le détail de ces calculs, qui sont longs et délicats, car il faut, dans chaque cas particulier, évaluer les quantités $Q - q$ et Q effectivement utilisées et disponibles, mais donnons les résultats des calculs, et appelons ρ' les nouvelles valeurs du rendement ainsi déterminé. Le rapport de ρ' à ρ caractérise le degré de perfection de chaque cycle; c'est le rendement *générique*, que nous écrirons ρ_i :

	ρ'	ρ	$\frac{\rho'}{\rho} = \rho_i$
Machine à vapeur.....	0,17	0,26	0,65
Machine à air chaud.....	0,22	0,38	0,58
Machine à gaz tonnant.....	0,38	0,82	0,45

Etrange résultat: la machine à vapeur qui, par sa constitution, est inférieure aux deux autres types, a au contraire le meilleur rendement générique; mais poursuivons et devenons plus pratiques encore.

Une bonne machine à vapeur à condensation consomme, dans d'excellentes conditions de marche, au moins 900 grammes de charbon; un moteur Bénier à air chaud consomme un kilog; enfin, nous savons un moteur à gaz, alimenté par du gaz de gazogène, qui a fourni le cheval-heure (2) au prix de 800 grammes: la chaleur utilisée dans chaque cas est de $\frac{270 \cdot 0,1}{425}$ calories, soit de 635 calories; alors qu'en estimant à 8,000 calories le pouvoir calorifique moyen du kilog. de houille, la chaleur disponible dans les trois cas est respectivement égale à 8,000. — $8,000 \times 0,9 = 7,200$ et $8,000 \times 0,8 = 6,400$.

(1) *Etudes sur les moteurs à gaz tonnant et Traité théorique et pratique des moteurs à gaz*. Paris. Gauthier-Villars, 1887.

(2) Un cheval-heure correspond à $75 \times 3600 = 270,000$ kilogrammètres.

Le rendement réel ρ'' se calcule dès lors sans peine et peut être comparé à ρ' .

	$Q - q$	Q	ρ'	ρ'	$\frac{\rho''}{\rho'} = \rho_2$
Machine à vapeur.....	635	7200	0,085	0,47	0,50
Machine à air chaud.....	635	8000	0,079	0,22	0,36
Machine à gaz tonnant.....	635	6400	0,099	0,38	0,26

L'ordre est le même que ci-dessus et ρ_2 , qu'on pourrait appeler le rendement générique pratique, puisque ρ' est le rendement pratique, décroît dans le même sens que le rendement générique théorique : les chiffres ne sont pas et ne devaient pas être identiques, parce que la théorie n'a pas tenu compte des pertes organiques et des déchets de fonctionnement de la machine, de la chaudière et du gazogène ; mais l'accord des conclusions est remarquable et justifie bien de la valeur de nos théories sur le rendement.

Observons en outre que ces tableaux renferment toute une série d'indications également précieuses pour la science et pour la pratique ; nous y lisons que les moteurs à air chaud et à gaz tonnant sont plus parfaits *in genere* que la machine à vapeur, mais que celle-ci réalise bien mieux les conditions essentielles de son cycle ; les premiers sont donc les moteurs de l'avenir, tandis que le chef-d'œuvre de Watt, qui a presque atteint la perfection dont il est susceptible, ne fera plus que de lents et insensibles progrès. Nous constatons à la fois l'excellence théorique des machines à air et à gaz et leur infériorité indiscutable au point de vue de la réalisation de leur concept ; mais nous voyons que ce sont les moteurs les plus perfectibles. La théorie a fourni aux savants les éléments d'un parallèle et d'un classement dont l'importance ne saurait échapper à personne en même temps qu'elle indiquait aux praticiens la voie à suivre pour mieux utiliser les combustibles. Les conclusions pessimistes de Regnault sur l'effet utile des machines à vapeur étaient exagérées ; les espérances chimériques qu'avaient fait naître les premières expériences d'Ericson l'étaient aussi ; grâce à la théorie, on est revenu à une appréciation plus exacte des choses et l'industrie en recueille déjà les fruits, puisqu'on produit couramment le cheval-heure au prix de 800 à 900 grammes de charbon.

II

FONCTIONNEMENT DES MACHINES THERMIQUES

M. de Pambour a publié en 1839 une *Théorie de la machine à vapeur* (1), qui fut remarquée en son

temps, et dont Navier a approuvé les conclusions dans un mémoire des *Annales des Ponts et Chaussées* : elle reposait sur la loi de la « conservation du maximum de densité de la vapeur saturée » et constituait un sérieux progrès sur les théories de Tredgold, de Wood, etc., mais il faut lire cet ouvrage pour apprécier l'étendue du champ, et l'ampleur des horizons ouverts aux ingénieurs par la Thermodynamique. Quel contraste entre les considérations étroites de M. de Pambour et l'explication lumineuse du fonctionnement de la machine à vapeur donnée par MM. Clausius, Zeuner et Hirn, pour ne citer que les maîtres de l'école nouvelle ! L'ancienne théorie n'avait abouti qu'à des règles empiriques ; la théorie mécanique énonce des principes, fondés sur une analyse minutieuse non moins que profonde du cycle des machines à vapeur : nous allons essayer de résumer brièvement cette œuvre merveilleuse, une des plus belles assurément de la physique moderne.

Dans une machine à vapeur, le foyer s'appelle *chaudière*, et le réfrigérant, *condenseur* : nous n'avons pas à dire ici ce qu'est une chaudière et un condenseur. Un mélange de vapeur et d'eau se répand dans le cylindre, que l'on peut considérer comme le prolongement de la chaudière, et pousse le piston ; la pression reste constante ainsi que la température, parce que, au fur et à mesure que le fluide se dilate et travaille, le foyer lui fournit le calorique équivalent : une partie de l'eau du mélange se vaporise donc dans cette phase appelée admission. A un moment donné, le tiroir, par lequel la communication se trouvait établie entre la chaudière et le cylindre, se ferme subitement, et le mélange se dilate, en faisant lui-même les frais du travail produit aux dépens de sa chaleur interne ; sa température baisse, sa pression diminue et une portion de la vapeur se liquéfie, pour suffire à la transformation de la chaleur en travail. Il ne saurait en être autrement ; Clausius et Rankine l'ont démontré et leur découverte a été vérifiée par Hirn ; on aurait dû pressentir le fait et le constater plus tôt, car, suivant la remarque de M. Bertrand, on ne pouvait pas espérer que la condensation produite par la détente fût compensée par l'évaporation, qui est une conséquence de l'accroissement de volume (1).

Les deux phases que nous venons de décrire sont représentées par l'isothermique AB et l'adiabatique BC.

Continuons l'étude du cycle : la détente a abaissé la température du fluide mis en œuvre jusqu'au niveau de la température, relativement basse, du

(1) *Théorie de la machine à vapeur*, Paris, Bachelier, 1839.

(1) J. Bertrand, *Thermodynamique*, p. 219. Paris. Gauthier-Villars.

condenseur; et voilà que le piston s'arrête et revient sur lui-même. Le mélange actif des premières phases devient passif et il subit une compression,




Fig. 2.

qui aurait pour effet d'élever sa température et sa pression, si le condenseur n'était pas là pour soustraire le calorique développé dans l'opération : CD est la ligne représentative de la transformation, qui est de nouveau isothermique, puisqu'elle se fait à la température constante du condenseur.

Il s'agit de fermer le cycle : pour cela, imaginons que nous séparions le mélange du condenseur et que la compression se continue, sans aucune soustraction de calorique; la compression chauffe le mélange, lequel gagne l'équivalent du travail dépensé; la pression monte ainsi que la température, la vapeur se liquéfie et, en fin de compte, si la compression a commencé en temps utile, elle aboutit à reconstituer le mélange en son état initial. Le cycle est fermé, par la courbe DA, et c'est vraiment un cycle de Carnot que vient de parcourir le fluide : tout le calorique Q a été fourni sur l'isothermique AB, le réfrigérant a repris tout le calorique sur l'isothermique CD, il n'y a eu ni perte ni gain de chaleur sur BC et DA, et le rendement ρ a pour valeur :

$$\frac{Q - q}{Q} = \frac{T - t}{T}.$$

La machine à vapeur serait parfaite, son rendement serait maximum et l'industrie posséderait sans conteste la meilleure des machines motrices, s'il était possible de faire parcourir à la vapeur le cycle que nous venons de décrire.

Mais ne nous faisons pas d'illusion : la fermeture du cycle, que nous venons d'imaginer, est fictive et nous ne la réalisons pas. Au lieu de refouler le mélange dans la chaudière, suivant l'adiabatique DA, et de le ramener ainsi à la température T, nous poussons la compression de la troisième phase jusqu'aux limites correspondantes à sa liquéfaction complète, de telle sorte qu'à la fin de l'opération le mélange se trouve, non pas à la température T

du foyer, mais à la température t du réfrigérant. Le cycle n'est pas ABCDA, mais ABCEA (fig. 2) : on le ferme en réintroduisant dans la chaudière de l'eau froide qui passe subitement à la température T, presque sans changement de volume, suivant EA. C'est la plus grande déformation du cycle.

La mise en équation des opérations du cycle réel est facile; mais nous craindrions que la vue de quelques formules un peu longues ne nous fit perdre des lecteurs, et nous nous contenterons d'indiquer les résultats du calcul. Entre les limites de 432 et 319 degrés absolus, la machine parfaite (idéale) rendrait, avons-nous dit, 26 %; entre les mêmes limites, la machine à cycle déformé (réelle) donnerait un rendement de 20 %; la perte est de 6 %. Malheureusement, il y a d'autres déformations accidentelles dont il faut encore tenir compte : ainsi l'équilibre de pression et de température ne s'établit pas entre le cylindre et la chaudière, la détente est incomplète, le condenseur ne joue pas exactement le rôle d'un réfrigérant à température constante, etc., ce qui abaisse en définitive le rendement de 20 à 17 %. Toutes ces pertes d'effet s'analysent fort bien et c'est avec une perspicacité admirable que M. Zeuner a réussi à faire la part de toutes les imperfections du cycle et de tous les déchets qui sont la conséquence inévitable des espaces nuisibles, des frottements, des résistances passives, des contrepressions, etc., en un mot de toutes les déficiences d'une machine (1).

Or, quelque complète que soit cette étude, quelque profonde que soit cette analyse, l'évaluation du rendement s'est toujours trouvée supérieure au rendement pratique; ρ_1 est égal à 0,63, alors que ρ_2 atteint à peine 0,50.

Quelle est la cause de cette divergence?

Elle nous a été expliquée par M. Hirn, à la suite des remarquables expériences qu'il a poursuivies pendant de longues années, sur diverses machines à vapeur, avec le concours de ses collègues de la Société industrielle de Mulhouse, MM. Hallauer, Leloutre, Grosseteste, etc. : ces recherches des ingénieurs alsaciens ont eu pour résultat de mettre en lumière l'action d'un facteur puissant, ignoré jusque-là, dont l'influence est considérable, nous voulons dire l'action de paroi.

Nous admettons jusqu'ici que les courbes BC et DA étaient des adiabatiques, ce qui présupposait une imperméabilité absolue du cylindre pour la chaleur : c'était une erreur, car les parois interviennent, altèrent profondément les courbes et compliquent étrangement les phénomènes dont la

(1) *Théorie mécanique de la chaleur* avec ses applications aux machines, traduction Arnthal et Cazin, 2^e éd., p. 507.

suite constitue le cycle. « Ces parois, dit M. Hirn, jouent le rôle de magasin de chaleur, à peu près comme le volant joue celui de magasin de travail; elles prennent et restituent d'une manière utile ou nuisible ce qu'elles reçoivent de la chaudière. Pendant la période d'admission, la vapeur, se trouvant en contact avec un métal plus froid qu'elle, se condense partiellement et les parois s'échauffent; quand la détente commence et que la masse gazeuse tend à diminuer, l'eau, ruisselant sur les parois plus chaudes qu'elle, s'évapore partiellement en donnant du travail; quand enfin la vapeur se précipite au condenseur, la température baissant tout d'un coup considérablement, tout le restant de l'eau ruisselant sur les parois s'évapore et refroidit ainsi le métal, qu'est obligée de réchauffer la vapeur d'admission du coup de piston suivant (1). »

L'influence des parois que nous venons de décrire est indéniable et énorme; en voici un exemple, cité par M. Hirn dans son *Exposition de la Théorie mécanique de la chaleur*, tome II, page 24. Dans un cylindre de 605 $\frac{m}{m}$ de diamètre, le volume de vapeur admis étant de 125^{lit}, 9, et le primage atteignant 1 %, on calcule que le poids de la vapeur devrait être exactement de 257,1 grammes; or, on constate que la dépense réelle est de 369,5 grammes; la condensation dépasse donc 30 %.

Mais, dira-t-on, la paroi restituera pendant la détente le calorique emprunté par elle dans la première phase du cycle: c'est vrai, et, de fait, la courbe de détente réelle est plus élevée que l'adiabatique théorique, mais la majeure partie de ce calorique ira au condenseur, produisant ainsi non seulement une perte par suppression, mais un effet nuisible, par réchauffement du condenseur. Il est facile de s'en rendre compte par le raisonnement, mais l'école alsacienne l'a prouvé d'une façon péremptoire et nous croyons devoir citer les chiffres suivants, relevés dans le curieux mémoire publié par M. Hallauer dans le *Bulletin de la Société de Mulhouse* (2): en calculant la chaleur portée au condenseur par coup de piston, d'après le poids et les températures initiale et finale de l'eau d'injection, on constate que la vapeur y a versé 122 calories au lieu de 103 qu'elle a pu fournir en se condensant, soit une augmentation de 17 %. M. Hirn a donc eu raison de déclarer (3) que « la cause la plus désastreuse de perte de chaleur dans la machine à vapeur, c'est l'évaporation instantanée de l'eau qui reste le long des parois des cylindres, à la fin de la détente, et au moment où se fait

l'échappement au condenseur ». Le nombre de calories ainsi perdues dépasse le plus souvent la quantité de chaleur transformée en travail!

On a cherché à nier cette influence énorme des parois, en invoquant la brièveté de la durée des phénomènes, la faible conductibilité des gaz, leur diathermansie, etc.; mais est-il une éloquence comparable à celle des chiffres? Du reste, l'auteur de cet article ne sera-t-il pas autorisé à citer les conclusions de sa thèse inaugurale sur l'effet thermique des parois (1)? Il a démontré, en effet, qu'il est impossible d'observer une ligne adiabatique, même pour une détente d'une masse d'air, alors que cette détente dure moins de $\frac{1}{500}$ de seconde.

M. Zeuner n'a pas cru devoir se rallier aux conclusions de M. Hirn; sans contester absolument l'effet des parois, il l'a déclaré moindre qu'on ne le supposait; dans la suite, il a substitué aux parois métalliques une provision d'eau, adhérente à la fonte, qui recevrait et rendrait alternativement la chaleur amenée par la vapeur admise. Le professeur Schmidt de Prague avait plaisamment résumé la divergence survenue entre les deux savants éminents dont nous rappelons les luttes animées, en deux mots significatifs: *Wasser oder Eisen*, de l'eau ou du fer? Toute la question est là: nous n'avons pas l'autorité voulue pour intervenir dans le débat, mais les réponses publiées par MM. Hirn et Hallauer aux attaques du savant allemand nous ont paru, quoique trop longues, absolument décisives, et nous y renvoyons le lecteur désireux d'approfondir la question (2).

En tout état de choses, il faut reconnaître que l'action de paroi est seule capable d'expliquer l'économie de combustible due à l'emploi des deux cylindres de Woolf ou du système Compound, ou à l'usage d'une enveloppe de vapeur: cette dernière pratique fait réaliser un bénéfice qui varie de 10 à 25 %. Par coup de piston, une machine à enveloppe ne consomme pas moins de vapeur, mais cette vapeur est mieux utilisée, surtout dans les machines à grande détente, et le rendement augmente; on constate en même temps une diminution dans la condensation à l'admission et une réduction de la perte au condenseur. Même résultat avec la vapeur surchauffée, dont le bénéfice est toutefois moindre dans un cylindre à enveloppe: de semblables concordances constituent un ordre de preuves et d'arguments capables d'en-

(1) *Annales de Chimie et de Physique*, t. XV, 5^e série, p. 433, 1878.

(2) Notre collègue de l'Université de Louvain, M. Ernest Pasquier, a lumineusement résumé les travaux de l'école alsacienne dans une étude publiée en 1883, dans les *Annales de l'Union des ingénieurs de Louvain*; nous signalons ce travail aux lecteurs désireux d'étudier plus complètement ces questions.

(3) Hirn, *loc. cit.*, t. II, p. 65.

trainier l'adhésion de tous les esprits non prévenus.

C'est encore l'action de paroi qui nous donne la solution des problèmes soulevés par l'étude des moteurs à gaz tonnant.

Ce fut une idée de génie qu'eut l'immortel Papin de brûler de la poudre sous un piston pour lui donner une impulsion motrice, car il introduisait et il brûlait dans le cylindre même le combustible dont il transformait l'énergie en travail mécanique (1) : le cycle se déroulait par conséquent dans une enceinte unique ainsi que le demande la théorie. Ses recherches dans cette voie le conduisirent à employer plus tard la vapeur d'eau « laquelle fait ressort comme l'air et se condense ensuite par le froid, si bien qu'il ne reste plus aucune apparence de cette force de ressort »; ce peu de mots permet d'apprécier la profondeur de vues de notre illustre compatriote qui ouvrit la voie suivie avec tant de succès par Savary et Newcomen. Les progrès de la machine à vapeur firent oublier les machines explosives, qui ne sont devenues pratiques et industrielles que dans ces derniers temps, grâce aux travaux de M. Lenoir et du Dr Otto. Aujourd'hui le moteur à gaz est un concurrent sérieux de la machine à vapeur et lorsque nous annonçons, il y a quelques années, que le gazogène remplacerait avantageusement la chaudière à vapeur, nous ne pensions pas que notre prévision se réaliserait aussi tôt. On construisit déjà des moteurs d'une puissance de 100 chevaux et même de 120 chevaux effectifs et l'on observe des consommations de charbon anthraciteux inférieures à 800 grammes par cheval-heure (2).

Le cycle d'un moteur à compression préalable est représenté par la courbe ACDFA (fig. 3); le mélange tonnant est aspiré sous la pression constante de l'atmosphère suivant AC, puis il est comprimé suivant l'adiabatique CD dans le cylindre de travail. L'inflammation ayant eu lieu, le gaz s'échauffe instantanément, sous volume constant et la pression atteint son maximum en F : le piston est refoulé en produisant du travail, et, après la détente FB, les gaz brûlés sont refroidis sous pression constante, le long de BC. C'est, à quelques variantes près, le cycle célèbre de Stirling.

Nous avons calculé le rendement théorique de ce cycle (3) : en appelant T la température explo-

sive, t la température initiale, θ la température du gaz à la suite de la compression, t' celle des gaz




Fig. 3.

brûlés à la fin de la détente, nous avons démontré que

$$\rho' = 1 - \gamma \frac{t' - t}{T - \theta}.$$

en appelant γ le rapport des chaleurs spécifiques des gaz. Le rendement générique ρ_1 de ce cycle est égal à 0,45, ce qui témoigne de sa perfection relative : il importe de faire t' aussi voisin que l'on pourra de t et de conserver à $T - \theta$ la plus grande valeur possible.

Mais j'ai supposé que la détonation était instantanée, que les produits de la combustion s'échauffaient à volume constant, que la détente se faisait suivant une adiabatique, qu'elle était complète, etc.; au lieu de cela, voyez ce qui se passe dans le cylindre et comparez le diagramme réel *acifba* (fig. 4),




Fig. 4.

au diagramme théorique. Nous avons admis qu'il ne se perdait pas de calorique par la paroi, considérée comme imperméable : or, il se dissipe en réalité une très notable portion de calorique rendu disponible par la combustion vive du gaz tonnant. La perte subie de ce chef dans la machine

(1) L'abbé Hautefeuille et Huyghens avaient déjà utilisé la force expansive de la poudre, mais le premier ne cherchait à réaliser qu'une pompe foulante et le second ne réussit guère qu'à soulever sept ou huit laquais suspendus à une corde passée sur une poulie : Papin créa au contraire une machine motrice.

(2) On a pu voir à l'Exposition un moteur Otto à 4 cylindres et un moteur Delamare-Deboutteville et Malandin à un seul cylindre développant sur l'arbre moteur une puissance de 100 poncelets.

(3) *Etudes sur les moteurs à gaz tonnant*, p. 10.

à vapeur était grande; elle est énorme dans le moteur à gaz et c'est la dégradation du cycle la plus nuisible, celle qu'il y aurait le plus d'intérêt à corriger, celle que l'on corrigera le plus difficilement. Dans les moteurs du genre Otto, cette perte dépasse 18 % et ces moteurs sont excellents!

Pour l'atténuer, il faut établir la température du cylindre au voisinage de 100 degrés, accroître la vitesse de détente, réduire au minimum le rapport $\frac{S}{V}$ de la surface du cylindre à son volume, etc.;

malgré les dénégations de M. Slaby de Berlin, j'ai maintenu mes premières affirmations (1), basées sur la théorie et l'expérience, et les praticiens m'ont apporté en maintes circonstances, et à plusieurs reprises, la précieuse confirmation de leur observation personnelle.

Il est donc bien démontré, pour toutes les machines thermiques, que « toute théorie qui ne sait ou qui ne veut pas tenir compte de l'action de paroi, ne peut conduire qu'à des résultats à peine approximatifs, sans utilité pratique réelle; » ces mots sont de M. Hirn, derrière le grand nom duquel nous abriterons nos conclusions.

L'exposé, qui précède, des applications de la théorie mécanique de la chaleur, à l'étude des machines thermiques, et des contributions apportées à cette étude par les recherches expérimentales, nous met en mesure d'apprécier la valeur relative des théories proposées pour les moteurs de l'industrie. La thermodynamique a permis d'édifier des théories *a priori*, des théories abstraites, qui ont conduit à une analyse profonde et complète du fonctionnement des machines à feu: grâce à ces théories, les hommes de science pure ont éclairé d'une vive lumière les phénomènes obscurs jusque-là, qui se produisent dans les cylindres moteurs; ils ont ouvert des horizons nouveaux à la physique mécanique, en même temps qu'ils traçaient aux praticiens des règles infaillibles, et leur épargnaient de longs tâtonnements et de douloureux mécomptes. Mais les problèmes les plus complexes ont été soulevés en même temps, et de nombreuses données expérimentales ont dû être introduites dans les calculs: quelque puissante que soit l'analyse, quelque judicieux et perspicaces que soient les observateurs, il n'est point et ne sera jamais possible de réduire à des formules simples les relations que l'on a établies entre tous ces éléments. On peut en négliger un certain nombre, comme l'a fait Clausius, mais alors la simplification qui en résulte est achetée aux dépens de la vérité; on étend le domaine de la spéculation en sortant du

domaine de la réalité. Mieux vaut assurément embrasser plus complètement l'ensemble des faits et sacrifier à l'utilité le plaisir de manier des équations incomplètes et partant inexactes.

A la question posée au début de ce travail, nous répondrons donc affirmativement: oui, il existe une théorie des machines thermiques, une théorie élégante, très claire, assez simple, mais elle néglige à dessein de tenir compte de certains éléments importants, et, par cela même, elle n'est qu'approchée; elle se prête admirablement à la critique et à l'analyse du fonctionnement des machines à feu, mais ne saurait conduire à une étude complète des phénomènes dont le cylindre est le théâtre. Il faut nécessairement recourir à l'observation des faits pour corriger quelques-unes de ses conclusions: on tiendra compte des effets perturbateurs par l'adjonction de coefficients numériques dans les équations, et la théorie sera rectifiée *a posteriori*.

III

CALCULS D'ÉTABLISSEMENT

Une machine étant donnée, et connaissant la section s du piston, sa course l , la pression h de la vapeur dans la chaudière, le nombre n de tours par minute, et le degré z de détente, on doit savoir calculer sa puissance; réciproquement, si un ingénieur entreprend la construction d'une machine, il aura à calculer les valeurs de s et de l en fonction de h , n et z pour obtenir une puissance déterminée. Voilà deux problèmes qu'il faut résoudre aisément, rapidement, et avec une exactitude suffisante, car ils se présentent souvent dans l'application: de quelle utilité sont, dans ce cas, les brillantes théories que nous venons d'exposer?

M. Bertrand répondra pour nous à cette question (1): « Poncelet, dit-il, prescrit, pour calculer le travail d'un coup de piston, de traiter la vapeur, quand elle se dilate sans communication avec l'extérieur, comme un gaz soumis à la loi de Mariotte. L'erreur commise est grande et évidente. Elle ne paraît pas cependant l'être beaucoup plus que celle qui résulte des théories dans lesquelles, à des principes beaucoup plus exacts, sont associées des hypothèses aussi éloignées de la vérité que l'imperméabilité complète des parois du cylindre à la chaleur. »

En d'autres termes, nous n'avons pas de formules plus exactes que celles de Poncelet, lequel les avait empruntées à Tredgold et à de Pambour: leur exactitude dépendra du choix de certains fac-

(1) Réponse à quelques objections contre l'action de paroi dans les moteurs à gaz, *Bulletin de la Société industrielle du Nord*, 1886.

(1) *Thermodynamique*, p. 261.

leurs numériques que nous y introduirons. L'aveu a paru humiliant pour la science; il ne faut cependant pas être injuste à son égard et lui reprocher la complication des problèmes qu'on lui a posés.

Rien de plus simple que les formules pratiques et empiriques des ingénieurs.

Si l'on ne détendait pas la vapeur, ou aurait, pour le travail, par cylindrée,

$$\mathfrak{C} = pv,$$

ainsi que nous l'avons dit ci-dessus; h étant la pression à la chaudière et h' la contrepression, derrière le piston, à l'échappement ou au condenseur, nous aurons $p = h - h'$ et

$$\mathfrak{C} = (h - h') v.$$

La puissance, pour n tours, sera

$$\mathfrak{P} = \frac{(h - h')vn}{60 \times 75} = \frac{(h - h')vn}{4500}.$$

si nous l'estimons en chevaux-vapeur, et

$$\mathfrak{P} = \frac{(h - h')vn}{60 \times 100} = \frac{(h - h')vn}{6000}.$$

si nous acceptons le *Poncelet* pour unité de puissance. Mais cette valeur de $\mathfrak{P}$ sera trop grande et nous tiendrons compte de tous les déchets et de toutes les perturbations en la multipliant par un coefficient K égal à 0,60 pour 5 chevaux et à 0,85 pour 100 chevaux. Nous le répétons, c'est de l'empirisme tout pur; hâtons-nous d'ajouter que cela donne de bons résultats.

Mais on détend la vapeur : après une admission l_0 (fig. 5), le tiroir se ferme et le degré de détente est




Fig. 5.

égal à $z = \frac{l_0}{l}$; nous admettons que les pressions sont en raison inverse des volumes et que bc est

l'hyperbole représentative de l'opération : dès lors, le travail fourni par la détente est :

$$pv \log' \left(\frac{1}{z} \right) = pv \log \left(\frac{1}{z} \right) 2,3026 \{1\}.$$

et nous avons, pour le travail total par cylindrée,

$$\begin{aligned} \mathfrak{C} &= hvz + hvz \log' \left(\frac{1}{z} \right) - h'v \\ &= hvz \left[1 + \log' \left(\frac{1}{z} \right) - \frac{h'}{h} \frac{1}{z} \right]. \end{aligned}$$

La puissance $\mathfrak{P}$ se déduit de $\mathfrak{C}$ comme précédemment et l'on adopte une valeur différente de K , d'après la perfection plus ou moins grande du type : Poncelet faisait varier sa valeur de 0,45 à 0,80 ou de 0,40 à 0,75 pour des puissances de 5 chevaux à 100, suivant que la machine était à condensation ou sans condensation.

On a plus ou moins heureusement modifié ces formules et nous citerons notamment la forme que leur a donnée M. Hrabak (2); on en a établi d'autres plus compliquées, mais présentant une plus grande prétention à l'exactitude, en tenant compte de l'espace nuisible, de l'exposant de la formule pseudo-adiabatique, de la quantité d'eau entraînée, etc.; telles sont les formules de M. Zeuner (3), de M. Pouchet (4), de M. Ledieu (5), etc.

Ce sont des tentatives louables, mais nous nous en tenons au jugement de M. Bertrand; les erreurs commises en négligeant ces éléments sont moindres que celle qui résulte de l'hypothèse de l'imperméabilité des parois : si d'autre part l'on introduit dans les formules les résultats de Hirn, comme l'a fait M. Ledieu, avec une grande habileté, on tombe dans une complication extrême.

La formule usuelle a un grand avantage, elle est élastique, et, avec de l'intuition et une parfaite connaissance des conditions faites à leur machine, les constructeurs en tirent un parti excellent, nous le savons; c'est qu'en effet K n'est pas un coefficient de construction, comme on le dit souvent, ce n'est point non plus le coefficient de rendement organique, c'est un facteur qui englobe toutes les actions perturbatrices. M. Pouchet a fait observer avec beaucoup de justesse que la formule de Pon-

(1) On obtient cette expression du travail en intégrant l'expression $\int p dv$ dans l'hypothèse que le produit pv est constant : nous désignons par $\log'$ le logarithme népérien.

(2) *Hilfsbuch für Dampfmaschinen-Techniker*.

(3) *Théorie mécanique*, traduction Arthral et Cazin, 2^e éd. p. 535.

(4) *Nouvelle mécanique industrielle*, p. 87.

(5) *Etude de thermodynamique expérimentale* sur les machines à vapeur.

celet conduit toujours à des résultats trop forts : c'est précisément la preuve que K ne doit pas être considéré comme un coefficient de réduction dû aux seules résistances passives. L'art de la construction consiste précisément à élever la valeur de K par l'emploi des enveloppes, par l'augmentation des vitesses de piston, par l'adoption des doubles cylindres Woolf ou Compound avec réchauffement du réservoir, etc. ; cette valeur de K est l'expression même de la perfection d'une machine. Nous nous rappelons à ce propos que, étant ingénieur d'une maison de construction, nous fûmes amené à augmenter un jour la puissance *nominale* de nos divers types ; un modèle, que nous propositions à nos clients pour une puissance de 50 chevaux, devint, par exemple, le modèle de 55 chevaux ; c'est qu'en effet nous avions amélioré notre construction au point d'augmenter K de 5 %.

Nous croyons avoir expliqué la préférence accordée à la formule simple et usuelle de Poncelet ; les ingénieurs ne reculent pas devant un long calcul, quand il s'impose, et ils ne sont pas routiniers au point de fermer les yeux au progrès, mais ils ne font pas de théorie par amour de l'art : ils tendent au vrai par les voies les plus courtes et les plus sûres.

En somme, nous croyons qu'il est d'un pessimisme outré de dire qu'il n'existe pas de théorie des machines thermiques ; il en existe une, signée des grands noms de Clausius et de Zeuner, à l'aide de laquelle on peut évaluer correctement leur rendement et procéder à leur étude physiologique, suivant l'heureuse expression de M. Ledieu : cette théorie, qui a été d'une incomparable fécondité, est le triomphe de la thermodynamique. Mais quand on sort des abstractions pour entrer dans le domaine de la réalité, on reconnaît que des phénomènes secondaires viennent compliquer étrangement le problème et c'est à la théorie expérimentale de M. Hirn que l'on recourt forcément pour trouver la solution des difficultés pratiques de la question. Ces difficultés sont si grandes et si nombreuses, qu'il est impossible d'établir la formule unique dont les praticiens auraient besoin pour faire leurs calculs d'établissement ; condamnés à accepter une formule empirique, ceux-ci s'y résignent trop facilement peut-être, mais nous n'oserions les en blâmer dans l'état actuel de la science.

Aimé Witz.

Professeur
à la Faculté libre des sciences de Lille.

LA RAMIE

On désigne à la fois, sous le nom de RAMIE les diverses espèces de ce genre et le textile qu'elles fournissent.

Des essais tentés récemment soit en France, soit dans nos colonies, pour la culture et l'utilisation industrielle de la Ramie, ont appelé sur cette plante l'attention d'un grand nombre de personnes. Disons d'ailleurs tout de suite qu'elle est employée, depuis fort longtemps, par les Chinois qui nous ont devancés sur tant de points. Les *A-pou*, tissus brillants et transparents qu'ils fabriquent avec les fibres de la Ramie sont connus de longue date et vendus en Angleterre sous le nom de *grass-cloth* (1).

Caractères de la plante. — La Ramie est rangée comme l'Ortie dans la famille des Urticées ; le Chanvre appartient lui-même à un groupe très voisin.

Les diverses espèces du genre Ramie sont des plantes ligneuses très ramifiées dès la base (fig. 1) ; les tiges couvertes de poils, au moins quand elles sont jeunes, sont dressées et atteignent de 2 à 4 mètres de hauteur avec un diamètre de 0^m,01 à 0^m,02 à leur partie inférieure. Les feuilles assez grandes, à limbe denté sont alternes ou opposées, pétiolées, et pourvues de stipules libres ou soudées. Les fleurs unisexuées sont réunies en glomérules à l'aisselle des feuilles (fig. 3). Les fleurs mâles se composent d'un calice à quatre divisions (rarement trois ou cinq) plus ou moins profondes avec un même nombre d'étamines superposées aux divisions du calice et insérées sur l'appareil femelle (gynécée), lequel occupe le milieu de la fleur. Dans les fleurs femelles l'ensemble du calice affecte la forme d'un sac rétréci vers son orifice supérieur qui est découpé en deux, trois, ou quatre dents (fig. 2). L'appareil femelle construit comme celui des Orties est

(1) La Ramie, importée en Angleterre sous le nom de *China-grass*, est connue sous différents noms dans ses pays d'origine :

Japon : *Tsjo, Karao* ;
Chine : *Chû, Tchou-ma* ;
Malaisie : *Ramée* ou *Rami* (c'est de là que vient le nom français de Ramie) ;
Sumatra : *Caloe, Kloeï* ;
Iles Célebes : *Gambe* ;
Assam : *Rhea* ;
Cochinchine : *Cây-Gai, Pd-Mâ* ;
Birmanie : *Pan*.

renfermé dans le sac calicinal; son ovaire en forme d'olive, contenant un seul ovule dressé, se termine



Fig. 1. — Un plant de Ramie blanche.

supérieurement en un style recourbé, filiforme, ordinairement persistant et chargé de papilles stigmatiques sur un côté seulement. Le fruit, entouré par le calice persistant, renferme une seule graine.

Le genre *Ramie* comprend environ quarante-cinq espèces répandues dans les diverses régions du globe, mais principalement dans les contrées tropicales. La nomenclature de ces nombreuses espèces est extrêmement confuse et nous ne saurions nous y arrêter ici, bien que cette question soit d'un intérêt capital au point de vue du choix des espèces à cultiver.

Nous nous contenterons d'établir deux catégories :

1° La Ramie blanche (*Boehmeria nivea*) avec des feuilles blan-

ches et tomenteuses à leur face inférieure est l'espèce qui convient à nos régions tempérées. Ses tiges aériennes se flétrissent et se dessèchent en

automne après la floraison. Une espèce voisine, le *B. candicans*, ne saurait être l'objet d'une culture fructueuse car ses tiges sont beaucoup trop rameuses et leur décortication présente de grandes difficultés.

2° La Ramie verte a les feuilles grisâtres ou vertes en dessous; la tige aérienne est vivace. Cette deuxième catégorie comprend un certain nombre d'espèces des régions tropicales; cependant on a pu les cultiver avec succès en Algérie et même dans le midi de la France. C'est à cette catégorie qu'il faut rapporter les *B. utilis* et *B. tenacissima* qui fournissent des fibres plus fines, plus soyeuses et plus brillantes que celles de la Ramie blanche. Il serait extrêmement utile de faire des cultures comparées de ces différentes espèces dans nos colonies pour choisir celles qui conviennent le mieux suivant la nature du sol.

Culture. — M. Charles Rivière, l'éminent directeur du jardin d'essai d'Alger, recommande de ne cultiver que la Ramie blanche en France et en Algérie; il faudrait réserver la Ramie verte pour les pays tropicaux. C'est, en effet, la Ramie blanche qui fournit le *china-grass* importé par les Anglais; or ce dernier produit est déjà utilisé industriellement; on connaît le traitement qu'il faut lui faire subir; il est donc prudent de s'en tenir pour le moment à la culture de la plante qui le fournit.

La Ramie affectionne les terrains meubles, silico-calcaires et bien irrigués; mais si elle se trouve bien de l'humidité, elle redoute les marais; des rizières anciennes de Java plantées en Ramie n'ont pas fourni une récolte rémunératrice. Ajoutons que les terrains salés et les eaux saumâtres ne lui conviennent pas.

La Ramie a pu être reproduite par semis en Algérie; mais la méthode la plus employée consiste à mettre en terre au printemps ou en été des fragments de *rhizomes* ou tiges souterraines (1). Pour obtenir une excellente végétation et des récoltes rapides il est nécessaire de donner au sol, avant la plantation, une préparation profonde analogue à celle que nécessite la culture de la Vigne.

La plantation de Ramie une fois faite peut être mise en valeur dès la deuxième année et se continuer, sans grands frais de culture, pendant quinze ou vingt ans; mais il faut que le cultivateur ne l'oublie pas, la finesse et le brillant de la fibre varient suivant les conditions de la culture, la nature du sol et aussi les engrais employés. Les Chinois qui pratiquent cette culture depuis des



Fig. 2. — Fleur femelle de Ramie blanche.

(1) Il ne faut pas confondre les rhizomes ou tiges souterraines produisant des bourgeons avec les racines qui ne produisent jamais de bourgeons. Les tubercules de pomme de terre par exemple sont des fragments de rhizomes renflés et naturellement séparés.

siècles savent bien quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir une filasse abondante, fine et soyeuse.

Les tiges doivent être coupées avant la floraison, quand elles ont atteint 1^m50 ou 2 mètres de hauteur et que leur épiderme prend une couleur brun foncé. La Ramie blanche donne deux coupes par année en France, trois en Algérie et en Chine,

2° Un manchon extérieur (fig. 4, 2) contenant les fibres utilisables.

Pour avoir une idée exacte de l'arrangement des éléments qui constituent ce manchon extérieur, nous allons observer un fragment de cette section transversale à un grossissement plus considérable (fig. 5).

Le manchon extérieur se montre alors formé de



Fig. 3. — Sommité florifère de Ramie blanche (*Boehmeria nivea*, Hook. et Arn.), $\frac{1}{2}$ gr. nat.




Fig. 4. — Fragment grossi de la section transversale d'une tige de Ramie blanche cultivée au Muséum.

quatre, cinq et même six dans les pays tropicaux. La culture de cette plante peut réussir non-seulement en France et en Algérie, mais encore en Tunisie, au Tonkin, en Annam, à la Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, c'est-à-dire dans la plupart de nos colonies.

Structure de la tige. — Avant d'aborder l'étude des manipulations auxquelles on soumet la tige de Ramie pour en retirer les fibres, il est utile d'indiquer quelle est la structure de cette tige, car les procédés de *décorticage* et de *dégommage* doivent être nécessairement fondés sur la connaissance de cette structure.

Une tige de Ramie blanche coupée transversalement à sa partie inférieure, au moment de la récolte, comprend :

1° Un cylindre intérieur (fig. 4, 1) constitué par le bois *b* entourant la moelle *m*. (Dans les tiges de Ramie verte, (*B. tenacissima*), la moelle se résorbe habituellement et la tige est creuse au moment de la récolte).

trois couches superposées dont la moyenne seule B comprend les fibres.

La couche extérieure A contient :

1° L'épiderme (*e*) constitué par une seule assise de cellules et recouvrant toute la tige; cet épiderme est souvent renforcé par une ou plusieurs assises de liège;

2° Cinq à dix assises de cellules allongées suivant l'axe de la tige et possédant des membranes fortement épaissies; c'est un tissu désigné sous le nom de *collenchyme* (*c*);

3° Plusieurs assises de cellules à membranes minces (*m*) confinant vers le dedans à la couche des fibres. Ces cellules contiennent souvent des cristaux d'oxalate de chaux.

La couche moyenne ou fibreuse B représente habituellement le tiers de l'épaisseur du manchon extérieur (*f*). Les fibres allongées parallèlement à l'axe de la tige se montrent sur la figure en section transversale. On voit facilement qu'elles sont isolées ou réunies par groupes de deux ou trois et que l'ensemble est relié par un tissu de cellules à membranes minces. Les fibres ne forment donc pas

une couche compacte et homogène comme l'a représenté Wiesner. Nous verrons plus loin que ce fait n'est pas sans importance au point de vue du dégomme des fibres.




Fig. 5. — Partie extérieure d'une section transversale de la tige à un grossissement plus considérable $\frac{100}{4}$.

Enfin la couche la plus interne C est constituée en grande partie par le *liber* dont les éléments caractéristiques sont des tubes allongés parallèlement à l'axe de la tige et réunis en faisceaux

tels que *p*. Ces tubes réunis bout à bout sont séparés les uns des autres par des cloisons transversales criblées de petits trous (tubes criblés). Les paquets de tubes criblés sont englobés, comme le montre la figure, dans un parenchyme mou. Les tubes criblés présentant une paroi cellulosique d'une certaine épaisseur ont été désignés par certains observateurs comme des fibres intérieures. En réalité les files qu'ils constituent offrent souvent l'apparence des fibres; mais leur paroi est plus mince, et sous l'action des agents de dégomme elles se tordent, se recourbent et



Fig. 6. — A, fibre de Ramie; B, tubes criblés formant des pelotons dans la filasse quand le liber n'a pas été éliminé par le traitement.

forment des paquets qui passeront aux étoupes (fig. 6, B). J'ajoute que leur contenu, très abondant

en matières albuminoïdes, ne peut être qu'un obstacle à la teinture, car il ne prendra pas la même coloration que la cellulose des fibres.

Enfin le liber est relié au bois (K) par une couche de cellules régulièrement disposées et se déchirant très facilement. (g). C'est suivant cette couche connue sous le nom de *cambium* ou *couche génératrice* que le manchon extérieur de la tige se déchire et se détache du bois.

Traitement industriel de la plante. — Le traitement auquel on soumet la Ramie diffère notablement de celui qui est mis en pratique pour le Chanvre et le Lin. Ces deux derniers textiles sont d'abord soumis au *rouissage*, sorte de décomposition provoquée par la fermentation naturelle ou certains agents chimiques; ensuite par le *teillage* on sépare mécaniquement les fibres de toutes les autres parties de la tige.

Pour ce qui concerne la Ramie, le rouissage naturel des tiges et même seulement de la zone fibreuse externe n'a pas donné de bons résultats; cette inefficacité du rouissage naturel peut être imputée à plusieurs causes: d'abord la couche épaisse de *collenchyme* (c) située sous l'épiderme empêche probablement la pénétration des agents qui servent à désorganiser les tissus; ensuite toutes les parties de la tige ne sont pas au même état de maturité et se rouissent inégalement vite. Disons d'ailleurs que le rouissage naturel est une opération fort lente, peu régulière et particulièrement malsaine, qu'il est utile de remplacer par un traitement chimique.

La marche généralement adoptée pour le traitement de la Ramie est la suivante:

1° *Décortique*. — Par cette opération on sépare sous forme de longues lanières le manchon extérieur au bois;

2° *Dégomme*. — Cette deuxième partie du traitement a pour but de désorganiser chimiquement les lanières pour mettre les fibres en liberté; ce traitement chimique est toujours complété par un système de frictions destinées à produire la séparation des fibres; cette opération inséparable du dégomme rappelle le traitement mécanique auquel on soumet le Chanvre et le Lin.

Décortique. — Cette opération doit se faire autant que possible sur le lieu même de l'exploitation pour éviter les frais de transport des tiges entières; de préférence sur les tiges vertes, car le séchage exigerait des soins dispendieux, un espace considérable et des conditions climatiques particulières. Ajoutons qu'au point de vue du traitement chimique ultérieur, les lanières obtenues des tiges vertes sont moins rebelles au dégomme

que celles qui sont obtenues par le décortiquage des tiges sèches.

Le décortiquage peut se faire à la main ou à l'aide de machines.

En Chine où les frais de main-d'œuvre sont très minimes, le décortiquage se fait à la main ; mais ce procédé n'est pas applicable en France ni même dans nos colonies. Cependant M. Favier, par une action préalable de la vapeur d'eau sur les tiges vertes, et M. Crozat, par une cuisson dans l'eau, ont pu rendre cette opération très facile et très rapide.

Le problème du décortiquage mécanique préoccupe depuis fort longtemps un grand nombre d'habiles mécaniciens ; malheureusement une connaissance incomplète de la structure même des tiges à décortiquer a induit en erreur certains inventeurs ; d'autre part la difficulté de se procurer des tiges fraîches pour effectuer les essais a souvent rendu illusoire les concours institués dans ce but. Le dernier en date a eu lieu pendant la dernière Exposition et a réuni les machines Barbier, Favier, Landtscherr et Michotte. La décortiqueuse présentée par ce dernier paraît simple et relativement peu coûteuse ; elle se compose de quatre cylindres broyeurs à cannelures hélicoïdales suivis d'un batteur et d'un contre-batteur pour faire tomber les fragments de bois ; les autres machines comprennent des organes identiques diversement agencés. Malheureusement les quantités de tiges traitées pendant le concours (7 à 30 kilogs pour chaque décortiqueuse), ne sont pas suffisantes pour renseigner utilement sur la valeur de ces diverses machines ; les concours n'auront une portée significative que le jour où ils auront lieu dans les conditions normales, c'est-à-dire au milieu d'une exploitation de Ramie. Ajoutons d'ailleurs qu'il est nécessaire de proposer un programme aux inventeurs pour que les comparaisons soient possibles.

D'après M. Frémy, les lanières obtenues par le décortiquage ne doivent pas être abandonnées longtemps à elles-mêmes, afin d'éviter une fermentation qui diminuerait d'une façon notable les qualités de résistance qui constituent le principal mérite de la Ramie. L'opération du dégommeage doit donc suivre de près celle du décortiquage.

Dégommeage. — Cette deuxième opération a pour but de mettre les fibres en liberté en isolant les divers éléments qui constituent le tissu des lanières obtenues par le décortiquage. La théorie du dégommeage doit nécessairement reposer sur une connaissance approfondie des substances qui constituent le squelette des végétaux, et ce sont les recherches de M. Frémy, puis celles de MM. Frémy et Urbain qui ont permis d'aborder efficacement

ce difficile problème. Le squelette solide représenté par nos figures n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire ; chaque membrane se montre en effet constituée par deux couches de cellulose que réunit une substance intermédiaire. Or, cette substance interposée entre les couches de cellulose est formée en grande partie par des composés pectiques, et surtout par la pectose de M. Frémy.

Pour désagréger le tissu des lanières, il est donc nécessaire de rendre solubles à la fois ces composés pectiques et la cutose qui relie les cellules épidermiques ; le problème consiste à trouver l'agent le moins coûteux et en même temps le moins susceptible d'altérer la cellulose des fibres.

Les Chinois font bouillir les lanières avec des cendres et les font sécher ensuite sur leurs cases. Cette opération, répétée plusieurs fois, suffit pour isoler les fibres. Ce mode de dégommeage, beaucoup trop lent, ne saurait convenir à notre industrie. Il a donc fallu rechercher les dissolvants de la pectose et de la cutose. Dans le rouissage naturel, c'est le *Bacillus Amylobacter* qui rend la pectose soluble ; des agents chimiques peuvent produire le même résultat. C'est ainsi que, comme l'a montré M. Frémy, les acides transforment la pectose insoluble en pectine soluble dans l'eau ; les liqueurs alcalines bouillantes, et principalement une dissolution faible de carbonate de soude dissolvent également la pectose.

Un grand nombre de procédés industriels ont été tentés pour opérer le dégommeage. Les principaux sont ceux de MM. Vial, Royer et Frémy. MM. Frémy et Urbain ont proposé de traiter les lanières par l'acide chlorhydrique étendu et de les soumettre ensuite à l'action d'une solution de soude caustique sous pression ; en remplaçant les bains de soude caustique par des bains d'oléate de soude, ils obtiennent des fibres plus brillantes. On peut d'ailleurs remplacer ces derniers liquides par des solutions de divers sels alcalins ; c'est ainsi que, pour des essais de laboratoire, l'oxalate d'ammoniaque m'a donné d'excellents résultats.

Des lavages énergiques opérés avec de l'eau sous pression doivent suivre chacune des opérations pour entraîner mécaniquement les éléments non fibreux.

Sans vouloir m'étendre plus longuement sur la question du dégommeage qui paraît résolue, je me contenterai d'ajouter deux observations qui ont leur importance. D'abord il n'est pas exact de dire que les fibres sont reliées par un ciment qu'il faut dissoudre pour les mettre en liberté ; en effet, les fibres sont reliées par des cellules de parenchyme et c'est le ciment qui unit tous ces éléments qu'il faut dissoudre. Pour détruire le parenchyme, il faudrait employer les agents qui dissolvent la cel-

lulose et qui attaquaient les fibres elles-mêmes. Ensuite, j'ai signalé dans un paragraphe précédent l'existence de tubes criblés formant par leur réunion en files des sortes de fibres à paroi mince. Ces éléments ne peuvent être enlevés par un traitement exclusivement chimique. Le mieux serait de racler, avant le dégomme, la face interne des lanières, et c'est, en effet, ce qu'une longue pratique a enseigné aux Chinois. En raison de la nature essentiellement albuminoïde de leur contenu, ces éléments ne prennent pas les matières colorantes comme les fibres cellulosiques et ne peuvent être qu'un obstacle à la filature et à la teinture.

Caractères des fibres. — La longueur et le diamètre des fibres de Ramie dépendent souvent, pour une même espèce, de la qualité du sol et des conditions diverses de la culture. Les fibres de la Ramie blanche sont habituellement très longues, 60^{mm} à 250^{mm}; celles qui ont plus de 0^m20 ne sont pas rares. Elles sont un peu irrégulières et s'amincissent graduellement à une grande distance de l'extrémité; celle-ci affecte souvent une forme de spatule. Presque toutes les fibres sont aplaties et constituent des sortes de rubans dont la largeur varie de 0^{mm}04 à 0^{mm}10 au milieu, et l'épaisseur, de 0^{mm}02 à 0^{mm}05 (fig. 7).

Fig. 7. — Fibre de Ramie blanche; A, en long; B, en section transversale. Gr. $\frac{360}{1}$.

La paroi paraît finement striée; cette striation est un peu oblique par rapport à la longueur; de place en place on aperçoit des lignes transversales de cassure se colorant plus fortement que le reste par les réactifs, et principalement par le chlorure de calcium iodé qui communique aux fibres une belle coloration rose, caractéristique de la cellulose pure.

Au point de vue chimique, les fibres de la Ramie, comme celles du Chanvre et du Lin, comme les poils du coton, se montrent formées de cellulose pure. Elles se colorent en bleu ou en violet par le chlorure de zinc iodé, en rose par le chlorure de calcium iodé et en brun par l'acide phosphorique iodé.

Le sulfate basique d'aniline, qui colore la cellulose en jaune-paille, ne communique aucune coloration aux fibres de china-grass (Ramie blanche); mais elle donne une très faible couleur jaune aux fibres de Ramie verte, ce qui semble indiquer une légère lignification de ces dernières.

La potasse n'agit pas sensiblement sur les fibres de Ramie; la dissolution ammoniacale d'oxyde de cuivre les gonfle beaucoup, mais ne les dissout pas complètement.

L'action de l'acide sulfurique est variable suivant le degré de concentration de ce liquide. L'acide concentré dissout les fibres en prenant une légère coloration jaune brun due à la présence de matières albuminoïdes dans leur cavité. Traitée par l'acide bihydraté, la cellulose des fibres fournit une combinaison d'acide sulfurique et de corps organique qui peut être considérée comme un acide sulfo-organique et qui se combine aux bases. Cet acide sulfo-organique donne, sous l'action de l'eau, un corps coloré en bleu par l'iode; mais cette combinaison iodée ne saurait être confondue avec l'iodure d'amidon, car elle se décompose immédiatement dans l'eau en perdant sa coloration.

Par toutes ces réactions, la substance constituante des fibres se montre formée de cellulose pure (Ramie blanche), ou présentant peut-être des traces de lignification (Ramie verte).

Lorsque l'opération du dégomme est poussée trop loin, la filasse de Ramie devient blanche; elle perd en même temps sa transparence caractéristique et son aspect soyeux; on dit qu'elle est cotonisée. Cette modification semble liée à une altération de la surface des fibres; celle-ci paraît en effet plus irrégulière, et les bandes transversales de cassure se montrent plus nombreuses et plus apparentes.

Avenir de la Ramie. — Si l'on réfléchit que la France ne produit annuellement que 75 à 80 millions de kilogs de filasse, et qu'elle en importe 125 à 135 millions de kilogs, on conviendra que la Ramie pourrait, si elle était cultivée dans nos colonies, nous affranchir du tribut de l'étranger. Ajoutons que l'Amérique ne tardera pas à nous expédier ses produits tout fabriqués au lieu de nous envoyer le coton brut. On trouverait donc à la fois, dans la Ramie, un objet de culture pour nos colonies, et, pour notre industrie indigène, un vaste champ à exploiter.

La filasse de Ramie possède sur celles de Chanvre et de Lin des avantages incontestables. Elle est remarquable par un aspect soyeux et surtout par une ténacité que ne présentent ni le Chanvre ni le Lin.

Le gouvernement anglais a fait exécuter dans ses arsenaux des expériences comparatives sur des faisceaux de filaments sans torsion dans les mêmes conditions de longueur et de poids :

Le Chanvre de Russie a supporté avant de se casser.	80 kg
Le China-grass.....	125
Le Rhea (Ramie) d'Annam cultivé.....	160

Le tableau suivant résume les résultats d'une autre série d'essais :

	RAMIE	CHANVRE	LIN	SOIE	COTON
Traction.....	100	36	25	43	12
Élasticité. ...	100	75	66	100	100
Torsion.....	100	95	80	600	100

Comme on le voit, la Ramie l'emporte sur le Lin et le Chanvre ; elle est trois fois plus tenace que ce dernier. Une autre qualité précieuse vient confirmer cette supériorité : la Ramie possède, en effet, une résistance incomparable à l'action de l'air et

de l'humidité, ce qui la rend éminemment propre à la fabrication des cordages et des voiles de navires.

Après bien des alternatives, cette plante paraît donc aujourd'hui définitivement introduite dans le domaine industriel et tout fait croire qu'elle est appelée à y prendre une place de plus en plus importante. Les insuccès de la première heure tiennent surtout à un manque absolu de concordance entre les essais de culture et les tentatives d'utilisation industrielle ; ils ne doivent décourager personne. Les 135 millions de kilogs de filasse que nous achetons tous les ans à l'étranger représentent un tribut de près d'un milliard ; la culture et l'emploi de la Ramie peuvent nous en affranchir.

Henri Lecomte.

Professeur au lycée Saint-Louis

TUBERCULOSE ET AUSCULTATION

Un médecin du siècle dernier, Raulin, qui fut observateur aussi profond qu'habile clinicien, disait dans un de ses Ouvrages (1) : « La phthisie pulmonaire est déjà parvenue au point d'alarmer l'humanité : elle s'établit principalement dans les grandes villes, au centre du luxe et de l'intempérance. » — Ces lignes, écrites en 1782, sont encore vraies aujourd'hui : à Paris, les décès par tuberculose s'élèvent annuellement à 10,500 (2) en moyenne ; loin de diminuer, leur nombre semble plutôt augmenter chaque année.

Et cependant, que de progrès ! Laënnec a créé l'auscultation. Villemin a montré la nature infectieuse de la tuberculose. Koch en a découvert l'agent virulent.

Mais ces trois grandes dates, 1819 (Laënnec), 1867 (Villemin), 1882 (Koch), donnent à l'histoire scientifique de la tuberculose un éclat qui ne se répand malheureusement pas encore sur son histoire clinique ; et nous en sommes à nous demander aujourd'hui, en 1890, si nous guérissions plus de tuberculeux qu'on en guérissait il y a cent ans. Néanmoins, si l'on se place d'un point de vue élevé pour embrasser le chemin parcouru dans le champ de la tuberculose, on est frappé de l'étendue des dernières étapes, on voit se dessiner peu à peu la route qui doit conduire au but. Les sa-

vants et les médecins ont réuni leurs efforts pour déterminer la nature et l'évolution de la maladie, et, malgré quelques points encore obscurs, ils peuvent maintenant réaborder sur un terrain solide les questions du diagnostic et du traitement.

Quel doit être aujourd'hui le rôle du médecin dans le traitement de la tuberculose pulmonaire ? quels sont les moyens par lesquels il peut prévenir ou combattre la maladie ? Le professeur Grancher l'a exposé d'une façon remarquable dans ses LEÇONS SUR LES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (1). Réunies en un volume : *Tuberculose et Auscultation*, il les a placées sous le patronage de Laënnec et dédiées à M. Pasteur. Ces deux illustres noms montrent bien ce qu'est la profession de foi scientifique de l'auteur : mettre au service de la clinique les données les plus modernes de l'anatomie pathologique et de la médecine expérimentale fournies par le laboratoire.

L'application de ces idées a enrichi la littérature médicale d'un livre de « Médecine clinique » telle qu'on doit la comprendre aujourd'hui. Ce livre vient à son heure, alors que les « espérances » et les « illusions enthousiastes » provoquées par la découverte de Koch se sont dissipées, et que l'on commence à s'apercevoir « que la tuberculose est, après comme avant, la maladie terrible, que les

(1) *Traité de la Phthisie pulmonaire*, Paris, 1782.

(2) Comptes-rendus de l'Académie de Médecine. Décembre 1889.

(1) 1 vol. in-8° de 530 pages avec figures et planches en couleurs, chez Doin.

efforts de la médecine traditionnelle et de la médecine microbienne n'ont pas terrassée ».

En médecine, comme dans toute science, on est sujet à des entraînements, et il faut bien constater que l'immensité des découvertes faites dans la voie tracée par Pasteur, devait fatalement absorber pour un temps, les facultés des cliniciens. M. Grancher s'est efforcé par ses Leçons de faire revivre les anciennes traditions dans ce qu'elles avaient d'utile et de fécond ; et après avoir montré comment on doit comprendre *anatomiquement* la tuberculose pulmonaire, il a voulu convaincre les médecins « de la nécessité absolue de pratiquer l'*auscultation* selon les règles classiques aujourd'hui trop délaissées ».

Peut-être quelques esprits voudront-ils voir dans ces lignes une tendance rétrograde, tout au moins stationnaire ; elle n'est pas possible de la part du savant qui, dès 1872, prouvait par ses études histologiques l'unité anatomique de la Phtisie pulmonaire, qui, après être allé « au laboratoire de M. Pasteur demander une place à côté de MM. Chamberland, Straus et Roux dans l'intention d'étudier la tuberculose expérimentale », est devenu « bientôt l'ami et le collaborateur du Maître ».

Du reste, la clarté de sa méthode, la netteté des résultats obtenus entraîneront facilement la conviction du lecteur, comme elles ont entraîné déjà celle des élèves qui ont suivi l'enseignement journalier du Professeur.

Ainsi donc, après les grandes découvertes modernes sur la nature et l'évolution du tubercule pulmonaire, c'est encore à l'*auscultation* que l'on vient demander les moyens de suivre pas à pas cette évolution sur le vivant. Cette nouvelle consécration de l'œuvre de Laënnec ne fait qu'augmenter l'étonnement que l'on éprouve en présence du peu d'enthousiasme avec lequel les contemporains l'accueillirent. On n'en saisit pas tout d'abord la portée. Tessier, faisant l'analyse du *TRAITÉ D'AUSCULTATION* dans le *Journal des Savants* de 1819, regardait « l'*auscultation* médiate que M. Laënnec appelle l'objet principal de son livre, comme l'*accessoire*... ». Rostan, dans le *Nouveau Journal de Médecine* 1819-1820, consacrait deux articles à l'anatomie pathologique, réservant son jugement sur la valeur de l'*auscultation*. Andral, plus tard l'annotateur du *Traité d'auscultation*, reprenait une à une les expériences de Laënnec, sans même le consulter, bien qu'opérant dans un service de l'hôpital Necker voisin du sien, animé d'un scepticisme peu bienveillant, quoique scientifique. Sans parler des pamphlets, des dénégations mensongères auxquelles Laënnec se contentait de répondre : « il y a des sourds », et « il n'y en a pas de pires que ceux qui ne veulent pas entendre »,

ce fut Broussais qui éleva la polémique au plus haut degré d'acuité. Négligeant l'*auscultation* qui ne le gênait nullement, il dirigea toutes ses armes contre l'anatomie pathologique, sentant bien qu'elle renversait toutes ses doctrines : ramenant tout processus morbide à l'*irritation*, il ne pouvait admettre la *spécificité* du tubercule. La riposte, aussi vive que serrée, fournit à Laënnec l'occasion de conclure par un exposé de principes, définissant bien la révolution qu'il venait d'accomplir dans l'étude des maladies. Dorénavant celle-ci se basera sur des rapports existant entre les altérations des organes constatées sur le cadavre et les « *signes*, certains, autant que possible physiques (1) » que ces lésions déterminent sur le vivant.

De cette révolution date toute la médecine moderne. Si le microscope, l'expérimentation ont étendu considérablement les moyens d'action de la méthode anatomique, elle n'en reste pas moins avec ses principes immuables. Et c'est en les appliquant, que le professeur Grancher, dans « Tuberculose et auscultation », a reconstitué sur de nouvelles bases l'œuvre de Laënnec, l'a fait revivre d'une vie nouvelle, apportant des éléments considérables à la solution du problème si passionnant de l'extinction de la tuberculose.

Les découvertes de Villemin et de Koch, prouvant la nature infectieuse de la maladie, ont considérablement simplifié ce problème. Elles permettent d'en poser nettement les deux termes : 1° prévenir l'invasion, la propagation de la maladie (médecine sociale) ; 2° s'efforcer de la connaître et tenter de la guérir (médecine clinique).

— La plupart des questions d'hygiène sociale concernant la tuberculose, s'adressent à la phtisie pulmonaire, qui, à elle seule, fait près de neuf fois plus de victimes que toutes les autres formes réunies (en 1888 d'après Lagneau 10.134 phtisies pulmonaires, sur 11.472 tuberculeux). Elles ont pour point de départ la connaissance et l'interprétation de ce fait, que « toute tuberculose naît d'une autre tuberculose » par transmission directe (contagion) ou par hérédité.

« Partout on enseigne » aujourd'hui « que la tuberculose est une maladie virulente, contagieuse. » Véritable révolution, qui a suivi la découverte de Koch, car Villemin n'eut pas le bonheur de faire partager de suite ses convictions et c'est à peine si l'on peut citer quelques noms parmi les contagionistes de la première heure : Hardy, Hérard, Cornil, Bouchard, etc. L'immense majorité des médecins pensait ce que Requin avait dit en 1834, que nous n'avons que faire « d'attaquer et de

(1). Laënnec. *Traité d'auscultation*. Préface de la 2^e édition 1826.

combattre en règle » la contagion, « un fantôme chimérique, un vain épouvantail ».

Et cependant ces idées de contagion, qui de tout temps avaient eu quelques partisans, s'étaient considérablement développées dans le courant du siècle dernier en s'étayant sur des observations dans lesquelles, aujourd'hui encore, nous trouvons bien des choses à glaner. D'après le *Journal de Médecine* de l'année 1784, le premier travail d'ensemble sur « la contagion de la phthisie et la manière dont elle se propage » aurait été publié à Strasbourg en 1782 chez König par A. F. C. Ewers de Swerin. Les conclusions en sont toutes d'actualité : « Trois façons dont ce terrible mal peut se propager : — la voie héréditaire, — en demeurant trop longtemps dans l'atmosphère des phthisiques, par exemple en couchant avec eux, — en faisant usage de leurs vêtements, de leurs linges, de leurs draps, ou d'autres choses semblables qui leur ont servi principalement dans le dernier degré de leur maladie. » Bien plus curieux encore sont « les conseils salutaires pour éviter la contagion » : Isolation des malades dans des appartements spacieux, aux *fenêtres ouvertes*, lessivage des planchers, blanchiment des murailles, lavage fréquent de tous les objets à leur usage, linges, ustensiles de bois et de métal etc., etc., enfin, « *la phthisique aura soin de cracher dans des vases de verre ou de faïence qu'on lavera fréquemment* ». Ewers avait observé la puissance contagieuse des crachats des phthisiques. Maintenant encore, les crachats sont les seuls agents de contagion bacillaire indiscutés ; c'est le crachat qu'il faut détruire à tout prix. « Sur ce point tout le monde est d'accord. » Il n'en est pas de même à l'égard du lait, de la viande ; là des divergences se produisent, mais dans le doute on ne doit pas s'abstenir.

Du reste, ce ne sont que questions de nuances : tous les médecins sont maintenant contagionistes, mais ils le sont plus ou moins, et en raison de leurs opinions diverses sur les dangers de la contagion, diffèrent relativement aux mesures à prendre contre elle. Néanmoins il existe peut-être une tendance à trouver qu'on est allé un peu loin dans cette voie de la contagion ; tendance fâcheuse si on se rappelle que Brouardel sur 100 autopsies de sujets au-dessus de 35 ans a trouvé 75 fois des tubercules guéris ou en évolution, par conséquent que, sur 100 individus il y en a 75 qui ont été contagionnés. Existe-t-il une maladie qui soit plus contagieuse ? Aussi pensons-nous que, « loin de se taire sur le danger de la contagion, il faut le proclamer bien haut et souvent et toujours ; » car, « on ne prendra jamais assez de précautions pour l'éviter » et « quoique nous fassions, nous ne ferons jamais trop. »

— Dans « un peu plus de la moitié des cas » la

tuberculose s'attaque à des sujets originaires d'ascendants tuberculeux ; c'est la notion d'hérédité, aussi ancienne que la tuberculose même. Mais, l'enfant hérite-t-il seulement d'un terrain favorable au développement du bacille, ou apporte-t-il en naissant le germe microbien de la tuberculose ? Si l'aptitude morbide est acceptée par tous sans contestation, il n'en est pas de même de l'hérédité directe qui, défendue par Baumgarten, Landouzy, H. Martin, a été combattue par divers expérimentateurs et récemment encore par Sanchez Toledo (1). Les expériences n'ont porté que sur la transmission placentaire, et les observations positives faites dans la race bovine par John, Malvoz et Brouvier laissent la question en suspens ; fût-elle résolue négativement, resterait encore la contamination ovulaire, et, à ce propos nous ne voyons pas pourquoi, *a priori*, on refuserait à la tuberculose ce que l'on accorde à la syphilis.

Quoi qu'il en soit, le rôle du médecin se borne à agir sur l'hérédité du terrain ; rôle moins actif qu'en face de la contagion, tout en étant fort délicat. Délicat au point de vue médical, où il consiste à reconnaître ce terrain, à voir chez le sujet suspect quels sont ses points faibles, à modifier dès l'enfance sa manière d'être organique de façon à le fortifier contre la contagion tuberculeuse. Délicat au point de vue social, où il consiste à intervenir dans les questions de mariage. Mais, si les parents deviennent chaque jour de plus en plus nombreux, qui comprennent l'importance de la médecine prophylactique chez leurs enfants, et suivent scrupuleusement pendant des mois et des années les indications du médecin, le nombre n'augmente pas beaucoup de ceux qui donnent aux avis médicaux l'importance qu'ils devraient avoir dans la détermination d'un mariage. Quel est le médecin qui n'a pas appris plus tard, indirectement, un mariage auquel il s'était opposé ? Il est vrai que nos prédécesseurs, « imbus de l'enseignement de Laënnec et de ses élèves, croyaient à l'incubité absolue du tubercule » et qu'ils prenaient parfois des décisions d'un pessimisme que les événements ne justifiaient pas toujours. Mais aujourd'hui que l'on connaît les processus tuberculeux, nous pouvons nous montrer moins intransigeants que par le passé, et nos avis plus modérés auront plus de chance d'être écoutés. Si le sujet appartient à une famille de tuberculeux, mais n'a pas eu d'atteintes personnelles, le pronostic dépendra surtout de sa constitution et son tempérament propres, car « il n'est pas beaucoup de familles nombreuses où dans trois générations successives, la phthisie n'ait fait quelque victime ».

(1) Archives de médecine expérimentale, Juillet 1889.

S'il est entaché de tuberculose pulmonaire, « il faut être impitoyable quand l'étude attentive et suivie » « a conduit à penser que la tuberculose continue sa marche régulière ou intermittente ». La tolérance sera permise, on pourra « ne pas défendre formellement le mariage », si la maladie est suspendue ou arrêtée depuis longtemps, si le malade sait et veut se soigner, car « le pronostic dépend autant du malade que de la maladie ». Du reste, le médecin n'a jamais qu'à formuler un avis purement scientifique; il doit toujours laisser aux « intéressés » le soin de « conclure en faveur du mariage ou le rejeter ».

— Quelques efforts que nous fassions, il se passera malheureusement bien des années avant que nous ayons « réussi à enrayer la marche envahissante de la tuberculose », et, pour longtemps encore, le médecin est aux prises avec elle et devra « tenter de la guérir ». C'est ainsi « que la thérapeutique de la tuberculose » est devenue « le principal souci des médecins contemporains » (Bouchard) (1), d'autant plus que nous avons appris que la phthisie pulmonaire est curable, « qu'elle guérit même dans le plus grand nombre des cas par des procédés naturels » (Bouchard). La connaissance de ces faits nous encourage à user de tous les moyens en notre pouvoir, pour aider cette tendance naturelle à la guérison; or, notre intervention n'aura d'efficacité que si elle s'effectue en temps opportun, et cette détermination de temps devient ainsi le terme délicat du problème. Il n'est possible de le résoudre que muni des notions les plus certaines sur le fonctionnement normal de l'appareil respiratoire, de façon à pouvoir en saisir les moindres anomalies. C'est ce qui a conduit le professeur Grancher à consacrer ses premières Leçons à la structure du poumon, à sa physiologie, pour passer ensuite à l'étude de la respiration normale et à son analyse. Nous n'avons pas à le suivre ici dans ses développements; — il nous suffira de dire qu'après cette étude, le médecin se sentira prêt à reconnaître les moindres traces de tuberculisat ion pulmonaire.

Peu importe qu'il diagnostique la tuberculose alors qu'elle est arrivée à maturité; ce qui est capital, c'est de la saisir dès le début de sa germination, alors qu'elle est *occulte* (Bayle), alors « que rien ne semble changé dans la santé » du sujet atteint, cependant « voué à la phthisie ». Ce diagnostic *précoce* se fait d'après les *respirations anormales*, les *altérations* du murmure respiratoire, « surtout celle de la *douceur* », la plus précieuse, la plus importante.

Le plus souvent, il faut chercher ces signes, et la première difficulté clinique consiste à analyser

les symptômes qui peuvent les faire soupçonner. On sait la prédilection de la tuberculose pour les sujets ayant été atteints de certaines maladies aiguës infectieuses, pour les chloro-anémiques, pour les pleurétiques, telle que Landouzy a pu dire que 98 % des pleurésies dites *a frigore* sont fonction de tuberculose. Dans le cours de son Livre, M. Grancher, insistant principalement sur les pleurétiques, a démontré le moyen de faire chez ces divers malades le diagnostic *précoce*, à ce moment où « la thérapeutique est souvent toute puissante pour arrêter l'évolution du processus tuberculeux ».

— Mais cette puissance de la thérapeutique varie considérablement suivant l'état social du phthisique. Le malade riche peut suivre une hygiène alimentaire soignée, se livrer à la suralimentation (Debove); il peut se rendre dans les sanatoria où les applications rigoureuses des principes modernes de phthisiothérapie ont amené 24,2 % de guérisons et même 26,3 % dans ces dernières années (Communication écrite du Dr Dettweiler, directeur du sanatorium de Falkenstein). Si le sanatorium lui répugne, il peut faire un traitement climatique dans des stations sanitaires où le médecin traitant pourra appliquer les principes des sanatoria. En fait il sera susceptible de guérir, tout au moins de prolonger considérablement son existence.

Rien de tout cela n'est possible pour les pauvres, et, si quelquefois « nous arrivons à les soulager, nous sommes obligés de renoncer à les guérir ». A l'hôpital, la thérapeutique est inefficace, car il manque aux malades l'indispensable, « l'hygiène, l'air, l'aliment, le vêtement, le repos », et cela quoi que fasse l'Administration, étant donnée l'organisation actuelle des hôpitaux.

Cependant, avec l'argent employé, on pourrait faire mieux. M. Grancher en a montré la possibilité, sans grever le budget: en établissant d'abord une sélection entre les curables et les incurables; en isolant ces derniers dans des hospices où l'entretien coûte moins cher (1 fr. 71 par jour), en employant l'argent ainsi économisé dans des sanatoria destinés aux curables. Tandis qu'aujourd'hui « tous les phthisiques sont traités indistinctement à 2 fr. 93 par jour, et ils meurent tous ».

Une réforme capitale du régime des phthisiques dans les hôpitaux de Paris s'impose donc. Avant tout, il faut: « 4.000 lits dans un sanatorium et 4.000 lits dans un hospice. » Alors « nous ne serons pas condamnés à traiter un grand nombre de nos malades par des paroles de consolation », et nous pourrions nous livrer à l'espoir de mettre bientôt sur le pied d'égalité devant la maladie: le riche et le pauvre:

D^r E. De Lavarenne.

Médecin de l'hospice thermal de Luchon

(1) *Thérapeutique des maladies infectieuses*. — Paris, 1889.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques.

Epping (J.). *Astronomisches aus Babylon.* Friedbourg-en-Brisgau, 1889, in-8°, 190 pages et planches.

Dès le second siècle avant notre ère, les Égyptiens avaient de vrais calendriers, comme le prouvent des tablettes commentées par Biot (1), il y a plus de trente ans.

A la même époque, les Babyloniens étaient au moins aussi avancés, ainsi que cela résulte d'un intéressant travail dû à la collaboration de deux Jésuites, le P. Strassmayer et le P. Epping. Parmi les 50,000 inscriptions cunéiformes que possède aujourd'hui le Musée britannique, ils en ont rencontré et déchiffré deux, parfaitement datées et qui présentent un véritable intérêt astronomique. Elles contiennent : à gauche, des éphémérides lunaires pour toute l'année; à droite, des éphémérides ou constellations planétaires, les levers et les couchers héliques des planètes et de Sirius, les commencements des saisons, etc.

Les indications de l'âge de la lune, des éclipses, visibles ou non, avaient permis de fixer les dates des inscriptions d'une manière assez précise, mais ce sont les constellations planétaires qui ont levé tous les doutes. On y trouve indiquées les positions des cinq planètes par rapport à une série d'étoiles du zodiaque, dont l'astronome chaldéen donne les distances exprimées en degrés qui valent $2\frac{2}{3}$, ou en minutes qui valent 8', avec la mention *au-dessus* ou *au-dessous*. Outre la complication résultant du choix de cette unité, il y en avait une autre tenant à ce que les planètes ne sont pas désignées par les noms retrouvés jusqu'ici (2) et ce n'est qu'après de longues recherches que le P. Strassmayer est arrivé à l'identification suivante :

Gut-tu.....	Mercurc	Te-ut.....	Jupiter
Dil-bat.....	Vénus	Genna (Mullatu).	Saturne
Anu.....	Mars	Kak-ban.....	Sirius

Le jour est divisé en 6 parties subdivisées en 60 : les astronomes chaldéens le divisaient donc en 360 parties, comme la circonférence du cercle.

Ces tablettes sont datées suivant l'ère d'Arsace et suivant l'ère de Séleucus; comme leur contenu permet de fixer, d'une manière certaine, leurs dates à 123 et 111 avant Jésus-Christ, on a pu en conclure que l'ère des Arsacides commence à 247 et celle des Séleucides à 311 av. notre ère. Cette détermination éclaire vive-

ment certains documents traduits depuis peu, notamment ceux relatifs à une éclipse de lune, d'après laquelle M. Oppert (1) avait fixé l'ère d'Arsace à 256 av. J.-C.

G. BIGOURDAN.

2° Sciences physiques.

Collection de Mémoires relatifs à la Physique, publiés par la Société française de Physique, t. IV. — **Mémoires sur le Pendule**, précédés d'une bibliographie. Paris, Gauthier-Villars, 1889.

Depuis quelques années la Société française de Physique a entrepris, sur la proposition de son secrétaire général, la publication d'une collection de mémoires relatifs à la physique. Chaque volume contient l'ensemble des Mémoires classiques, et constamment cités, qui ont marqué un progrès décisif ou seulement important dans une partie déterminée de la science. C'est ainsi que le tome IV qui vient de paraître et le tome V qui est sous presse sont entièrement consacrés à l'histoire du Pendule considéré comme instrument de géodésie, destiné à la mesure de l'intensité de la pesanteur. La seconde moitié seulement du tome IV contient des mémoires originaux reproduits ou traduits : ce sont ceux de La Condamine (1735), de Borda et Cassini (1810), de Prony (2) et enfin de Kater et de Bessel. Les planches qui accompagnaient les mémoires sont fidèlement reproduites par la phototypie, à une échelle déterminée par le format du volume. Toute la première moitié du volume est occupée par une substantielle introduction historique de 40 pages, et par une admirable bibliographie de plus de 200 pages, dues à M. Wolf, de l'Observatoire de Paris. La plupart des mémoires cités dans la bibliographie sont accompagnés d'une analyse succincte et souvent de la citation textuelle des passages les plus importants. C'est ainsi que les trois éditions que Newton a données des « Principia... » en 1687, 1713 et 1726 sont citées séparément. La correction de poussée de l'air est appliquée dans l'édition de 1713 sans explications : l'expérience célèbre sur la chute de corps différents dans un tube vide n'apparaît que dans la troisième édition.

L'abbé Picard se contentait d'une précision d'un dixième de ligne, soit environ un cinquième de millimètre, et n'observait pas de différence dans la longueur

(1) *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, 1888, t. 107, p. 467.

(2) Présenté à l'Institut en 1800; manuscrit retrouvé à l'Ecole des Ponts et Chaussées par M. le commandant Deforges, et publié pour la première fois dans ce recueil.

(1) *Journal des Savants*, 1856, p. 705.

(2) *Bibliographie générale*, par Houzeau et Lancaster, t. I, p. 83.

du pendule à secondes en passant du sud de la France jusqu'en Danemark. Comme la correction provenant des dimensions de la sphère suspendue au bout du fil était encore inconnue, les observations n'étaient comparables que si elles étaient faites avec la même sphère, et la différence de longueur observée à Londres restait discutable. C'est seulement en 1672 que les variations de la pesanteur aux divers lieux du globe furent mises en évidence par les mesures de Richer, à Cayenne, mesures régulièrement conduites, et non pas dues au hasard comme on le dit communément. L'examen de la question s'imposait dès lors à l'attention de tous les voyageurs, et l'observation de Richer partout confirmée, a singulièrement étendu le programme des recherches nécessaires. L'intensité de la pesanteur n'est plus une constante terrestre, c'est une quantité variable à la surface du globe et dont il faut déterminer la valeur en chaque point. Ces valeurs peuvent se rattacher assez simplement à la forme d'une terre homogène, ou du moins dans l'intérieur de laquelle la répartition des masses obéirait à quelques hypothèses simples. Aussi a-t-on cherché d'abord à faire servir ces mesures à la connaissance de la forme de la terre et de son aplatissement. Après avoir fait subir à la mesure brute toutes les corrections nécessaires pour en déduire l'intensité de la pesanteur en unités absolues d'accélération au lieu même de l'observation, on s'efforçait d'en déduire la valeur de la pesanteur en un autre point de la même verticale situé sur la surface idéale de la terre, sur cette surface à partir de laquelle le géodésien compte les altitudes. Mais, si l'accord s'est fait sans difficulté entre les observateurs sur la nécessité et la légitimité des premières corrections, il ne pouvait en être de même de la seconde transformation, car le calcul de l'influence de l'altitude, des massifs montagneux, ou de la mer, ne peut se faire qu'en introduisant des hypothèses sur la distribution et la densité du sol environnant, et l'on n'a d'autre critérium que la disparition des irrégularités locales dans l'ensemble des observations corrigées ; en fait les irrégularités ne disparaissent point. Sans aborder ici la discussion de ce problème, bornons-nous à constater que l'observateur ne doit se proposer qu'un but : déterminer en unités d'accélération l'intensité de la pesanteur en divers lieux de la surface de la terre, et que le tableau définitif des observations doit donner l'intensité de la pesanteur au lieu même de l'observation et non ailleurs.

Parmi ces corrections nécessaires pour passer de la mesure brute à la valeur absolue de l'intensité, l'une des plus importantes est relative à l'influence de l'air. D'abord sentie confusément parce qu'elle est double, cette influence n'a été complètement démembrée que par Stokes. D'une part, la poussée de l'air diminue la force motrice sans diminuer la masse inerte du pendule ; d'autre part l'air qui entoure le pendule est mis en mouvement par les oscillations de celui-ci, et absorbe une partie du travail de la force motrice. La correction hydrostatique connue de Newton a été très clairement expliquée par Bouguer (1749), appliquée par d'Alembert (1756), négligée pourtant par Lalande (1792), et a fini par être régulièrement employée. Quant à la correction

hydrodynamique, ce n'est que depuis le milieu du siècle qu'on est exactement fixé sur sa nature et son importance. Les mouvements du pendule sont assez lents pour que l'air qui l'entoure se comporte sensiblement comme un liquide. Tout près du pendule, la phase du mouvement périodique de l'air est la même que celle du pendule, et s'il en était de même au loin, le seul changement à faire dans les équations du mouvement serait évidemment une addition de masse proportionnelle au volume du pendule, ou ce qui revient au même, à la masse du fluide déplacé, multipliée par un coefficient variable avec la forme géométrique du pendule. Cette influence d'abord reconnue par l'ingénieur du Bat (1786) et plus tard par Bessel (1827) a été évaluée expérimentalement par eux, puis par Sabine (1829) et Baily (1832) ; elle est beaucoup plus grande pour un long cylindre que pour une sphère. Poisson avait fait en 1831 une tentative de théorie manifestement incomplète ; c'est Stokes qui en 1850 a réussi à rendre compte du rôle complet du gaz en tenant compte de son frottement intérieur. Le mouvement du pendule ne se transmet pas instantanément aux couches éloignées ; les mouvements de deux couches d'air contiguës n'ont pas exactement même phase, et le déplacement relatif de ces couches met en jeu le frottement interne du gaz. Il en résulte une diminution progressive de l'amplitude des oscillations ; mais tant que cette double influence est faible, le mode de correction adopté par du Bat et Bessel pour la durée d'oscillation reste exact.

Il faut suivre, dans l'introduction historique de M. Wolff, et dans la bibliographie les perfectionnements apportés pendant tout le XVIII^e siècle à la construction et à l'emploi du pendule simple, et voir comment la double incertitude qui résulte de l'influence de l'air et du mode de suspension du pendule a conduit les observateurs de la seconde moitié du XIX^e siècle à abandonner complètement le pendule simple et à le remplacer par le pendule invariable proposé par de Prony et Kater.

J'espère en avoir dit assez pour engager le lecteur qu'intéresse l'importante et difficile étude de l'intensité de la pesanteur, à recourir aux deux volumes que M. Wolff lui a consacrés.

Marcel BRILLOUIN.

Mendeleeff. — La loi périodique des éléments chimiques. Conférence faite devant la Société chimique de la Grande-Bretagne (*Journal of the chemical Society*, Octobre 1889).

Après avoir rappelé les travaux de Dumas, de Chancourtois et Newlands, M. Mendeleeff énonce la loi périodique sous la forme qu'il lui a donnée en 1870 et qui n'a pas été modifiée depuis :

« Les éléments rangés par ordre de poids atomiques croissants, présentent une périodicité évidente dans leurs propriétés. »

« Les éléments qui possèdent des propriétés chimiques semblables possèdent des poids atomiques qui sont égaux ou qui croissent régulièrement. »

Le savant russe examine et discute ensuite les appli-

cations qui ont été faites de cette loi, et les déductions qu'on peut en tirer.

Plusieurs chimistes ont vu dans la loi périodique une preuve à l'appui de l'hypothèse de la matière primaire, ou de l'hypothèse analogue de Prout sur le caractère composé des éléments chimiques.

M. Mendeleeff n'accepte pas cette application. D'après lui, la loi périodique étant un fait purement expérimental, et ne conduisant pas par elle-même à l'idée d'une matière unique, ne peut, pas plus que la loi d'Avogadro ou la loi de Dulong sur les chaleurs spécifiques, servir à confirmer la conception purement philosophique de la matière primaire. Dans cet ordre d'idées, on a cherché à représenter la loi périodique par une courbe ou une fonction continue; mais les périodes des éléments présentent un caractère tout différent des fonctions périodiques que considèrent les géomètres. Elles correspondent à des points isolés, à des variations brusques sans états intermédiaires, et on ne peut leur appliquer les procédés de l'analyse infinitésimale. Si l'application des mathématiques doit donner un résultat, ce sera sous une forme particulière se rapprochant de celle de la théorie des nombres (1).

Pour M. Mendeleeff, les résultats auxquels a conduit la loi périodique sont les suivants :

1^{re} Elle a provoqué la découverte de plusieurs éléments dont elle avait fait prévoir l'existence et les principales propriétés. (Gallium, Germanium, Scandium.)

2^{re} Elle a conduit à changer les poids atomiques de certains corps qui avaient été mal déterminés et à reprendre l'étude des propriétés physiques des éléments pour en montrer la périodicité.

3^{re} Enfin elle a conduit à modifier la notion d'atmicité. Je cite textuellement ce passage.

« La loi périodique a montré qu'il y a une limite d'oxydation, exactement comme il y a une limite bien connue à la capacité des éléments de se combiner avec l'hydrogène. Un seul atome d'un élément se combine avec au plus quatre atomes d'oxygène ou d'hydrogène et pendant que CH^4 et SiH^4 représentent les Hydrures les plus élevés, RuO^3 et OsO^3 sont de même les oxydes les plus élevés. Nous sommes ainsi conduits à reconnaître des types d'oxydes comme nous avons eu à reconnaître des types d'hydrures.

« La loi périodique a démontré que l'étendue maximum dans laquelle différents corps entrent en combinaison avec l'oxygène est déterminée par l'étendue dans laquelle ils se combinent avec l'hydrogène, et que la somme des nombres d'équivalents d'oxygène et d'hydrogène qui peuvent se combiner à un corps est égale à huit. Ainsi, le chlore qui se combine avec un atome ou un équivalent d'hydrogène, ne peut fixer plus de sept équivalents d'oxygène; pendant que le soufre, qui fixe deux équivalents d'hydrogène, ne peut se combiner avec plus de six équivalents ou trois atomes d'oxygène. Il devient ainsi évident que nous ne pouvons reconnaître comme une propriété fondamentale des éléments,

la valeur atomique déduite de leurs hydrures et que nous devons modifier, dans une certaine étendue, la théorie de l'atmicité, si nous voulons l'élever à la hauteur d'un principe capable de donner un aperçu sur la constitution des molécules composées. En d'autres termes, c'est seulement pour le carbone, qui est quadrivalent par rapport à l'hydrogène et à l'oxygène, que l'on peut appliquer la théorie de la valence constante et des liaisons, au moyen de laquelle tant de chimistes essayent d'expliquer la structure des molécules composées. »

Enfin, M. Mendeleeff termine en insistant sur ce que, dans l'application de la loi périodique, on doit séparer les oxydes solifiables des peroxydes dont la fonction est complètement différente.

Georges CHARPY.

Haughton (Rév. Samuel). — Illustration géométrique de la loi périodique des poids atomiques. (Transactions of the Royal Irish Academy, 1889.)

Dans une conférence faite en 1887, sous le titre « La Genèse des éléments », M. Crookes développa une idée qui existait, pour ainsi dire, à l'état latent dans les écrits d'un grand nombre de savants. Il considère nos différents éléments comme les produits de la condensation successive d'une substance unique qu'il nomme *protyle*. M. Crookes appuie principalement sa démonstration sur le dédoublement presque indéfini qu'il a fait subir aux corps considérés comme simples qui ont été retirés des terres rares (Ytterbium, Gadolinium, etc...) et sur l'existence de la loi périodique des poids atomiques. Il pense que les poids atomiques que nous connaissons sont des valeurs moyennes, et que, lorsque nous disons que le poids atomique du calcium est 40, cela signifie que ce poids est toujours voisin de 40, par exemple, entre 39,9 et 40,1. La loi périodique sera donc représentée par une fonction continue ou une courbe, et si nous n'en connaissons qu'un certain nombre de points, cela tient d'abord à ce que nous ne connaissons pas tous les éléments, et aussi à ce que, par suite des conditions particulières dans lesquelles se sont produites les condensations successives du protyle, il ne s'est formé, dans la fourniture cosmique, qu'un nombre restreint des combinaisons possibles. Il devenait donc très intéressant de connaître la fonction ou la courbe représentative de la loi périodique. En portant en ordonnées les poids atomiques des éléments, en abscisses leurs atmicités, le professeur Reynolds a obtenu une « ligne en zig-zag » qui passe par tous les points représentatifs des éléments et met en évidence certaines particularités de la loi périodique. Malheureusement, on ne peut obtenir l'équation de cette courbe. M. Haughton a essayé de la représenter par une fonction de Fourier et n'a pu y réussir. Il a cherché alors dans une autre direction et a pu obtenir les résultats suivants :

On sait que les éléments rangés par ordre de poids atomiques croissants se classent en groupes de chacun sept éléments, les membres correspondants des différents groupes présentant des propriétés analogues. La périodicité s'accuse surtout quand on prend les

(1) On peut citer, dans cet ordre d'idées, les recherches du commandant Delauney, publiées dans les comptes-rendus de l'Académie (30 septembre 1889) sous le titre : *L'enchaînement des poids atomiques des corps simples*.

périodes de deux en deux constituant ainsi des doubles périodes de chacune quatorze éléments. M. Haughton remarque que les quatorze points représentatifs de ces éléments déterminent une courbe du 4^e degré (*quartique*) et une seule. Il a calculé les équations de ces courbes et observe que :

1^o Les quartiques qui représentent les doubles périodes successives sont toutes de la même classe. Elles possèdent deux asymptotes réelles et deux asymptotes imaginaires.

2^o Les quartiques successives sont liées entre elles par des lois de variations des paramètres qui permettent de tracer la courbe complète dans le cas où on ne connaît pas les quatorze éléments.

La loi périodique se trouve ainsi représentée par une série de courbes définies algébriquement, sur lesquelles viennent se placer exactement les points représentatifs des éléments. D'après les idées de M. Crookes, il est vraisemblable que chacune de ces courbes correspond à une phase distincte dans la condensation du prototype.

Georges CHARPY.

3^o Sciences naturelles.

Žujović (J.-M.), Annales géologiques de la Péninsule balkanique (dirigées par). — Tome I, in-8^o de xv-248-160 pages, avec 2 planches de fossiles et 1 carte en couleurs. Belgrade, imprimerie de l'État, 1889.

Le Sud-Est de l'Europe est demeuré, sans contredit, la partie de notre continent où il reste le plus à faire au point de vue géologique. M. Žujović, le savant professeur de l'Université de Belgrade, a pensé que l'un des meilleurs moyens de stimuler à l'étude de ces régions peu connues était de fonder un recueil spécial, destiné en quelque sorte à devenir l'organe officiel des géologues indigènes, et en même temps à servir d'intermédiaire entre ceux-ci et les géologues étrangers, au moyen de traductions françaises ou allemandes et de courtes analyses bibliographiques. Le premier volume, seul paru, de ces nouvelles *Annales*, fait bien augurer de l'avenir de cette utile publication. Il est divisé en deux parties, rédigées respectivement en langue serbe et en français ou en allemand, et comprenant chacune des travaux originaux et des comptes-rendus d'ouvrages récents. La première débute par une *Esquisse géologique du royaume de Serbie* (p. 1-130), avec carte d'ensemble à l'échelle de 1 : 1,500,000, par M. Žujović, travail déjà publié en allemand, il y a quelques années, dans le *Jahrbuch* de l'Institut géologique de Vienne; on y remarque encore une *Etude sur quelques minéraux de Serbie*, par M. P. Ilić (p. 144-169), résultat de recherches poursuivies au laboratoire de chimie de l'Ecole des Hautes-Études de Belgrade. Viennent ensuite des résumés de mémoires récemment publiés sur la Serbie, la Bosnie, la Dalmatie, la Grèce, la Turquie, etc., résumés destinés aux géologues serbes et, comme tels, rédigés dans leur langue (p. 196-248).

Quant à la seconde partie, qui, au contraire, s'a-

dresse surtout aux géologues occidentaux, elle renferme entre autres documents une notice nécrologique, avec portrait, sur le *Docteur Josif Pančić* (1814-1888), savant botaniste, qui fut l'âme de l'enseignement scientifique en Serbie; un *Aperçu des terrains du Balkan central*, par M. Toulia (en allemand, p. 107-121); enfin, et surtout, une importante monographie des *dépôts liasiques de Rgotina*, dans la Serbie Orientale, par M. S. Radovanović (id., p. 1-106). L'auteur décrit la succession des couches en la comparant avec les coupes observées dans les régions voisines, et se livre à une discussion critique des espèces recueillies, parmi lesquelles plusieurs sont nouvelles. Le Lias de Rgotina est principalement formé de grès à brachiopodes et à bivalves, et se range surtout au niveau du Lias moyen; il représente un type de dépôts formés près des côtes, type très caractéristique du Banat et des Balkans, fort différent de celui des calcaires franchement pélagiques, de type alpin, développés dans l'Ouest de la presqu'île, en Bosnie. M. Radovanović voit avec raison, dans ce fait, une confirmation des vues émises par MM. Mojsisovics et Suess sur la grande extension du « Continent Oriental » pendant l'ère secondaire, continent dont les roches cristallines de la Thrace et de la Macédoine (Rhodope), peut-être jusqu'au Tchar-Dagh, représentent les restes. On sait que ce massif résistant, d'après M. Suess, aurait déterminé plus tard la séparation entre les plis alpins de la région illyrienne et ceux de l'arc karpatobalkanique, en s'avancant comme un coin dans l'intervalle.

On ne peut qu'applaudir aux efforts tentés par M. Žujović pour continuer le développement scientifique de cet intéressant champ d'études.

EMILIE DE MARGERIE.

Guitel (F.), préparateur de Zoologie à la Sorbonne. — *Recherches sur les Lepidogasters*. Thèse pour le doctorat ès sciences; un vol. in-8^o de 230 pages avec 14 planches en couleurs; in *Archives de zoologie expérimentale*, 1889.

Ce travail, fait aux laboratoires de M. de Lacaze-Duthiers à Banyuls et à Roscoff, se recommande par la perfection des détails et la précision des faits qu'il met en lumière. C'est la monographie très soignée d'un petit poisson (*Lepidogaster Gouanii*) qu'on rencontre fréquemment sur les côtes de la Méditerranée et de l'Océan.

Ses mœurs, aussi bien que l'étrangeté de son aspect, ont depuis longtemps attiré l'attention des naturalistes. Il jouit en effet de la remarquable propriété de se coller aux cailloux sous lesquels il s'abrite. A cet effet il porte à sa face ventrale une puissante ventouse. Elle lui permet d'adhérer aux pierres ou bien de progresser lentement sur la surface des rochers.

M. Guitel a démontré que cet organe se compose en réalité de deux ventouses; l'antérieure est formée par les nageoires ventrales, tandis que la postérieure a pour squelette l'os de la ceinture scapulaire, connu sous le nom de coracoidien.

De cette disposition résulte ce fait singulier que l'appareil ventral est entièrement entouré par les nageoires pectorales et leurs dépendances.

La peau, sur toute la surface du corps, est absolument privée d'écaillés. La ligne latérale, qui n'avait été aperçue par aucun zoologiste, est extrêmement curieuse. Elle se compose de sept tubes muqueux munis de ter minaisons nerveuses; celles-ci forment dans la tête des sinuosités dont la disposition ne varie pas. Mais le canal latéral, qu'on observe chez les autres poissons, n'existe pas chez les Lépadogasters. Il est remplacé par deux séries de petites fossettes pourvues chacune d'un bouton épidermique qui reçoit un ramuscule du nerf latéral. Il existe aussi dans la tête des séries analogues, principalement dans la région opérculaire.



Fig. 1. — Embryon de *Lépadogaster bimaculatus*, d'environ 20 jours. — Gross. = $\frac{21}{1}$.



Fig. 2. — Embryon de *Lépadogaster Goniati*, d'environ 20 jours, vu sur la face latérale. Gross. = $\frac{23}{1}$.

br = branchies.....	ot = oreille.....
cr = corde dorsale.....	r = rectum.....
cn = chromatophores noirs.	rp = partie fibreuse du sque-
cr = " rouges.	lette primitif de la
cj = " jaunes.	ceinture scapulaire..
es = estomac.....	rf = vésicule du fiel.....
f = foie.....	vo = vésicule ombilicale.....
es = œsophage.....	vn = vessie natale gonflée
ot = fossette olfactive.....	de gaz.....

L'embryogénie a été suivie par l'auteur depuis la fécondation jusqu'à l'éclosion des jeunes. Malheureusement il n'a pu saisir le passage de la larve à l'adulte. Cependant l'étude des embryons lui a montré que ces poissons, bien que dépourvus de vessie natale, à l'âge adulte, en sont munis au contraire pendant leur période larvaire. La vessie disparaît ensuite. C'est là un fait des plus intéressants, dont l'importance pour la théorie générale du développement n'échappera à personne.

Quant aux ventouses, M. Guitel a réussi à en fixer l'homologie en déterminant les connexions du cartilage qui précède, chez la larve, l'apparition des os de la ventouse antérieure.

L'auteur a ensuite comparé les Lépadogasters de nos côtes à quelques autres représentants exotiques de la même famille. Il a constaté que la ventouse unique de ces derniers ne diffère pas sensiblement de la ventouse double des espèces européennes.

Cette étude l'a conduit à adopter l'opinion de Müller qui classe les Lépadogasters parmi les Acanthoptérygiens; mais, à l'inverse de ce zoologiste, il les éloigne des Cycloptéridés et les rapproche des Gobiidés.

Tels sont les principaux résultats des recherches de

M. Guitel; son mémoire aussi soigné, dans la forme que dans le fond, clairement exposé et bien écrit, a le mérite de résoudre une question controversée, en faisant connaître, d'une façon très exacte, l'organisation d'un poisson osseux de nos rivages.

E. JOUBIN.

4^e Sciences médicales

Le traitement du prolapsus du rectum, devant la Société de chirurgie. (Comptes-rendus des séances du 27 novembre et du 4 décembre 1889).

Le travail, qu'a récemment présenté à l'Académie de médecine M. Jeannel, ayant appelé l'attention sur le traitement du prolapsus du rectum, chacun est venu apporter à la Société de chirurgie l'exposé de sa pratique. Les prolapsus légers, n'affectant que la muqueuse, absolument comparables au prolapsus normal du cheval, ont été laissés de côté. Fréquents chez l'enfant et chez quelques vieux hémorrhoidaires, ils sont faciles à guérir et sans grande importance, bien différents en cela des chutes complètes du rectum, auxquelles participent les diverses tuniques de cette portion de l'intestin.

La discussion s'est ouverte par une communication de M. Nélaton qui a rapporté deux cas d'*excision de prolapsus rectaux*; dans le premier la récidive débuta au bout de six mois; dans le deuxième déjà réséqué antérieurement par M. Périer, M. Nélaton excisa 0^m30 d'intestin mobile, prêt à s'invaginer, et, par cette intervention large, il espère avoir guéri sa malade qui aujourd'hui, seize mois après l'opération, ne présente encore rien de spécial. — Mais des extirpations étendues, comme celle pratiquée chez la deuxième malade de M. Nélaton, sont graves et par là même peu tentantes; aussi M. Verneuil croit-il que le traitement, déjà ancien, du prolapsus par l'excision (il remonte à la fin du siècle dernier) est loin de constituer un idéal chirurgical; les Allemands, et en particulier Mikulicz, en vantent, il est vrai, les avantages, mais les observations qu'ils publient ont toutes trait à des malades récemment opérés et pour lesquels il manque la sanction du temps écoulé. — M. Segond, cependant, dit avoir guéri par l'excision un malade qu'il a revu au bout de six mois; malheureusement son observation n'est pas concluante au point de vue de la cure du prolapsus en général, parce qu'il existait un rétrécissement du rectum, qui pourrait bien avoir été la cause de l'affection, si bien que le malade aurait guéri, si l'on en croit MM. Trélat et Nélaton, en vertu de l'axiome: *sublatâ causâ tollitur effectus*.

Le traitement par les cautérisations de la muqueuse, préconisé dans le but de faire adhérer les parties en déterminant la formation de tissu cicatriciel, a été employé par M. Routier qui s'est servi du thermo-cautère et par M. Delens qui a eu recours, suivant le conseil d'Allingham, à l'acide nitrique fumant. L'opérée de M. Routier a récidivé au bout d'un an et M. Delens n'a pas suivi ses malades.

Aussi M. Schwartz, après des cautérisations profondes de la muqueuse, a-t-il jugé à propos d'imiter la

conduite qu'il avait vu suivre à Albert (de Vienne) et de faire secondairement une *périnéorrhaphie antérieure à l'orifice anal*, profonde et destinée à rétrécir cet orifice en même temps qu'elle le reportait en arrière. Cette manière de faire semble plus rationnelle que celle déjà ancienne de Roux qui rétrécissait la partie postérieure de l'anus, les récidives débutant ordinairement par la paroi antérieure. Son malade est resté guéri depuis le mois de février dernier.

La fixation du rectum ou *proctopexie* a été pratiquée par M. Verneuil; en même temps qu'il rétrécit l'anus, ce chirurgien fixe, après décollement de l'espace recto-sacré, la paroi postérieure de l'intestin aux tissus fibreux présacrés. Les résultats n'ont pas été satisfaisants.

L'exposé de ces divers faits ne nous permet pas encore de conclure et nous pouvons répéter, avec M. Verneuil que, malgré la multiplicité des procédés, le prolapsus grave du rectum est une des infirmités les plus difficiles à guérir. L'avenir nous dira si la *colopexie*, récemment préconisée par M. Jeannel, qui semble une méthode des plus rationnelles, donne des résultats supérieurs à ceux obtenus jusqu'ici.

Dr HARTMANN.

Bard (L.) (de Lyon) et **Curtillet**. — Contribution à l'étude de la Physiologie pathologique de la maladie bleue. — Forme tardive de cette affection. (*Revue de Médecine*, 10 décembre 1887, page 993 et suiv.)

Des recherches anatomiques des auteurs, il résulte : que la *persistance* du Trou de Botal n'entraîne pas fatalement le mélange des sangs artériel et veineux, dans les oreillettes, grâce à l'opacité de l'orifice et surtout à la disposition de la valvule de Vieussens. Celle-ci n'est pas un opercule, mais une sorte de voile flottant, développé du côté gauche, en dehors du plan de la cloison, plus grand que l'orifice et l'obturant par application sur lui sous l'influence de la pression sanguine gauche.

La pression est-elle plus forte à droite, comme chez le fœtus, la valvule s'écarte, le sang reflue dans l'oreillette gauche : il y a mélange. La pression est-elle plus forte à gauche (ce qui est l'état normal après la naissance), la valvule s'applique sur l'orifice; le sang suit son cours normal : il n'y a pas mélange.

Que, par suite d'un trouble pathologique, d'une affection pulmonaire, par exemple, la pression sanguine droite vienne à dominer celle de gauche : il y aura mélange des deux sangs tant que durera l'attaque d'asthénie (forme tardive de la maladie bleue).

Quand la volonté elle-même est insuffisante, le mélange peut ne pas exister, grâce à une hypertrophie compensatrice de l'oreillette droite, produisant l'équilibre des pressions. — La coloration bleue des téguments semble, due en partie, à la stase veineuse qui accompagne les phénomènes asthéniques.

Dr E. DE LAVARENNE.

Bertillon (J.). — De la mortalité à Paris pendant le mois de décembre 1889. (*Bulletin médical*, 8 janvier 1890, page 21 et suiv.)

La mortalité s'est accrue à partir de la deuxième semaine du mois, pour atteindre 500 décès le 30 décembre. Cet accroissement est dû surtout aux affections aiguës et chroniques des voies respiratoires, aux maladies chroniques susceptibles de complications pulmonaires. Il porte sur tous les quartiers de la ville et toutes les classes de la société. — Il n'atteint guère les enfants et pèse spécialement sur les adultes hommes et aussi sur les vieillards.

Dr E. DE LAVARENNE.

Layet (A.), professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux. — *Traité pratique de la vaccination animale*. Paris, Alcan, 1889, un volume grand in-8°.

Cet ouvrage est un éloquent plaidoyer en faveur de la vaccine et surtout de la revaccination, si négligée partout. Montrer que la vaccination n'est jamais nocive quand elle est pratiquée dans des conditions déterminées; mettre en évidence la mortalité par la variole dans les villes où la revaccination n'est pas appliquée et celles où ce service fonctionne régulièrement, appuyé par des règlements efficaces; indiquer enfin les méthodes à suivre pour obtenir rapidement et dans des conditions économiques du vaccin animal, telle est l'œuvre de M. Layet.

Le grand argument des antivaccinateurs réside dans les cas constatés de syphilis vaccinale. M. Layet aborde résolument cette question; il en fait un historique très serré, réduit à ses justes proportions l'importance des faits observés, mais établit surtout que les cas malheureux ne se réaliseront plus, si le médecin n'utilise pour ses vaccinations que le vaccin animal.

Il est un point où M. Layet nous paraît se montrer critique trop sévère, c'est sur la condamnation presque absolue qu'il fait du vaccin conservé. Il n'admet guère que la vaccination immédiate de la génisse au bras de l'enfant. Dans la pratique, cette méthode est souvent difficile à réaliser et la pulpe vaccinale fraîche peut encore donner d'excellents résultats.

Signalons les planches en chromo-lithographie très nombreuses dans son ouvrage; elles renseigneront utilement le médecin sur l'aspect que prend la pustule soit pendant le cycle évolutif du vaccin chez la génisse vaccinifère, soit chez le sujet vacciné.

Il est à désirer que le traité de la vaccine animale de M. Layet ne soit pas lu uniquement par les médecins, mais qu'il serve à stimuler le zèle de nos administrateurs municipaux pour l'organisation d'instituts vaccinogènes établis sur le modèle de celui qui fonctionne à Bordeaux sous la direction de l'auteur; et le zèle également de nos législateurs, pour qu'ils se décident à doter la France d'une loi établissant la vaccination obligatoire.

L. O.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 6 janvier 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES.

M. **Paul Appell** : Sur les fonctions elliptiques.
— M. **P. Painlevé** : Sur les intégrales rationnelles des équations de premier ordre. — MM. **Trépiéd, Rambaud et Renaux** : Observations de la comète Borrelly. — M. **D. Eginitis** : Observations de la comète Brooks.

2^o SCIENCES PHYSIQUES

M. **P. Joubin** a vérifié, en pesant les quantités de cuivre déposées sur les différents points d'une lame de platine, que les images de Thomson s'appliquent à l'électricité dynamique. — M. **Th. Moureaux** a calculé la valeur absolue des éléments magnétiques au 1^{er} janvier 1890, sur les observations faites au Parc Saint-Maur et à Perpignan. — M. **E. Doumer** a déterminé les pouvoirs réfringents de 90 sels simples en dissolution et induit de ces déterminations quelques lois générales. — M. **E. Thoulet**, étudiant la distribution des températures profondes dans le lac de Longemer (Vosges), a constaté que les nappes isothermes ondulent d'une façon régulière. — M. **Lecoq de Boisboudran** a obtenu de nouvelles fluorescences au moyen de la samarine et des terres Z_a et Z_b avec la silice et la zircone calcinées; il en indique les principales positions spectrales. — M. **Georges Vogt** a analysé les roches employées dans la fabrication de la porcelaine en Chine; leur composition les éloigne beaucoup de celles employées en Europe. — M. **Charles Combes** identifie la matezite et le matezo-dambose respectivement avec la β - pinite et la β . inosite, en s'appuyant sur les constantes physiques de ces corps. — M. **E. Guinochet** a étudié les sels de l'acide carbalbylique pour les comparer à ceux d'un isomère déjà décrit par lui.

3^o SCIENCES NATURELLES

M. **Daubrée**, comparant la gangue diamantifère des gisements du Cap avec les météorites qui contiennent du diamant, trouve une grande analogie dans la composition de ces corps. — M. **A. Lacroix** a étudié les cipolins à minéraux et les roches à wernérite de l'Ariège. — M. **Thoulet** décrit le relief et la géologie sous-lacustre du lac de Longemer. — M. **F. Guitel** a étudié la disposition anatomique et l'innervation de la ligne latérale de la Baudroie. — M. **L. Faurot** décrit les cloisons mésentéroïdes d'une actinie, la *Peachia hastata*.
— M. **Duchartre** est élu vice-président pour l'année 1890.

L. Lapicque.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du mardi 7 janvier 1890.

1^{re} RECHERCHES SUR LA PROSTITUTION A PARIS.

M. **Commence** présente les résultats d'une statistique établie d'après les visites de prostituées faites à la Préfecture pendant 10 ans, de 1878 à 1887.

Pour 1.000 visites.	Syphilis.	Autres maladies vénériennes.	Gale.
1 ^o Filles en maisons	2,70	2,52	0,30
2 ^o Filles en carte	3,12	3,06	0,36
3 ^o Filles en dépôt	23,96	14,16	1,96
4 ^o Insoumises	166,00	131,00	19,00

Les maladies vénériennes se propagent donc le plus souvent par les Insoumises; d'où la nécessité d'une surveillance rigoureuse de la prostitution clandestine.

2^o SUITE DE LA DISCUSSION SUR LA PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE.

M. **Germain Sée** montre l'inutilité des mesures draconiennes mal prises, et cite à l'appui les règlements édictés il y a cent ans dans le royaume de Naples.

Donne lecture d'une lettre de M. Cornet (de Berlin) relative à la propagation de la tuberculose : « Le phthisique par lui-même n'est pas dangereux; mais le danger réside dans son manque de précaution à cracher dans des crachoirs » (Cornet). Tous les toussieurs doivent cracher dans les crachoirs remplis d'eau, car beaucoup de catarrheux ont de la tuberculose latente et des bacilles dans leurs crachats. Quant au traitement : la phthisie est curable, mais dans des conditions encore inconnues; il faut se borner à recommander une propreté excessive, insister sur le régime gras, huile de foie de morue et succédanés.

M. **Widal** a observé qu'en Algérie la tuberculose suit une marche croissante dans les populations civiles et militaires. L'évolution est plus lente qu'en France, la mortalité 0/0 un peu moindre. Le département d'Alger est le plus atteint, puis Constantine, Oran. La cause probable est dans l'hivernage que depuis vingt ans les phthisiques viennent faire de plus en plus aux environs d'Alger. Mais les caveaux (propagateurs) ne profitent pas de ce séjour. Donc il ne faut envoyer en Algérie que les tuberculeux n'ayant pas dépassé les périodes de début.

M. **Trélat** montre que l'hérédité tuberculeuse a été très exagérée, que la cause presque unique de la tuberculose est la contagion. Il faut donc surtout agir contre l'agent contagieux. Il votera les conclusions de la Commission; ne pas les voter semblerait nier la contagiosité, et aurait pour conséquence d'amener les malades et leur entourage à s'abstenir de précautions qu'ils considéreraient comme inutiles.

D^r E. De Lavarenne.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 4 janvier.

M. **Guignard** proteste contre les réclamations de priorité de M. Van Beneden, et cite ses mémoires, pour montrer qu'il avait vu le premier, dans la division du noyau cellulaire chez les végétaux, non seulement le dédoublement des plaques équatoriales, mais encore le cheminement, vers les pôles, des anses dédoubleées. — M. **Retterer** a éclairci le mécanisme du cloisonnement du cloaque chez les embryons des mammifères, par la méthode des coupes en série. — MM. **Arthand** et **Butte**, prouvent l'action vaso-motrice du pneumo-gastrique sur le poulmon de la grenouille. — M. **Gaston Buchet** : 1° attaque du verre par les Lichens; 2° action du venin des hyménoptères sur le lézard. — M. **Nicati** : occlusion congénitale de la pupille ayant provoqué la buphtalmie par distension de la chambre postérieure et de son arrière-cavité. — M. **Brown-Sequard** : influence du système nerveux pour retarder la putréfaction. — M. **Laborde**, 1° chez un supplicié, a constaté un anthracosis intense des poulmons et une dilatation paralytique de l'estomac, provoquée par ingestion d'alcool; 2° a vu que la lésion des tubercules quadrijumeaux, chez la grenouille produit le myosis. — M. **Pignol** : procédé d'injection intrapulmonaire de liquides antiseptiques, donnant de bons résultats thérapeutiques dans les affections du poulmon.

Séance du 11 janvier 1890

M. **J. Chatin**, cherchant si le mouton pouvait propager l'anguillule de la betterave, a vu que ce nématode est détruit dans le tube digestif de cet animal. Les observateurs qui croient l'avoir trouvé vivant dans les digestions ont probablement fait une confusion — MM. **Vignal** et **Malassez** rappellent qu'ils ont constaté, il y a plusieurs années, que les crachats des tuberculeux desséchés, humectés, desséchés de nouveau restent virulents. — M. **Würtz** a étudié l'action bactéricide du blanc d'œuf de poule; il a vu que des quantités très petites des cultures de divers bacilles, *B. anthracis*, *pyocyaneus*, *pyogenes aureus*, etc., sont détruites en quelques heures par l'albumine de l'œuf à 37°. Le blanc d'œuf coagulé n'a pas la même propriété. — M. **Jaquet** communique un cas d'ulcération de la peau, comprenant toute la région du plexus cervico-brachial, qui avait été attribuée à la piqure d'un scorpion et qui dépendait en réalité d'un syringomyélie. — M. **Morel** avu dans un épithélioma la division des noyaux s'accomplir suivant un mode multipolaire.

L. Lapique.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES (1)

Séance du 19 décembre 1889.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES

M. **A. B. Basset**, F. R. S : Sur l'extension et la flexion des cylindres et des sphères à parois minces et élastiques.

Sir **J. Norman Lockyer** F. R. S. étudie comparativement les spectres des nébuleuses et des étoilés des groupes I et II et ceux des comètes et des aurores.

Les recherches poursuivies depuis 1887 (Nov. 1886. Soc. Royale, 1888. Bakerian Lecture, janv. 1889. Soc. Royale) par l'auteur sur les spectres des météorites, l'ont conduit à cette conclusion que : la distinction que l'on a établie entre les étoilés, les comètes et les nébuleuses ne repose sur aucune base physique. Il a montré que les spectres des comètes pouvaient être construits avec les spectres des substances qui ont le plus d'éclat à basse température. En général on accepte que les comètes sont des essaims de météorites compris dans le système solaire. Elles deviennent plus brillantes à mesure qu'elles s'approchent du soleil; leur température doit donc s'élever; leurs spectres ressemblent à ceux des essaims de météorites qui se condensent graduellement hors du système solaire. Le spectre d'une comète très éloignée du Soleil λ consiste en une raie brillante au voisinage de 500, la raie la plus brillante du spectre des nébuleuses. Lorsque la température s'élève, c'est-à-dire lorsque la comète s'approche de son périhélie, la série de ses spectres est la même que celles des spectres des nébuleuses et des étoilés à basse température, comprises dans les groupes I, II et III de la nouvelle classification.

Sir J. N. Lockyer peut donner aujourd'hui une liste plus complète des raies observées dans les spectres des divers groupes de corps célestes : une comparaison plus complète peut permettre de conclure avec plus de probabilité à leur commune origine.

I. *Comparaison des comètes et des nébuleuses.* — La table donnée montre qu'il y a un grand nombre de ressemblances frappantes entre les deux spectres. Les bandes du carbone incandescent, par exemple, sont communes aux deux spectres; il en est de même des bandes du magnésium, du manganèse et du plomb. La raie de l'hydrogène 486 n'a été observée que dans une seule comète (comète III, 1880) par Konkoly.

Deux autres raies spéciales aux nébuleuses sont les raies 3,872, et 4,470 qui peuvent être les raies D₂ et f de Lorentz, du spectre de la chromosphère. Ces raies

(1) Les séances de cette assemblée sont privées. Ses publications paraissent en une seule fois vers la fin de chaque année sous la forme d'un gros ouvrage qui contient les mémoires présentés à la Société dans le courant de l'année précédente. C'est pourquoi aucun journal n'a pu, jusqu'à présent, donner d'une façon régulière l'analyse de tous ses travaux. Grâce à l'appui de deux illustres savants de Londres, nous avons réussi à l'obtenir à bref délai. Ce sera la première fois qu'une Revue publiera sans retard le compte rendu détaillé des mémoires soumis à la Société royale.

A l'égard de la plupart des académies étrangères nous avons pris des dispositions analogues. Nous sommes assurés de la collaboration régulière de plusieurs de leurs membres et de quelques autres savants étrangers qui nous enverront périodiquement des analyses proportionnées à l'importance des séances.

On conçoit qu'il nous était difficile d'imprimer dès le premier jour aux comptes rendus d'académies, que nous envoient nos correspondants, le caractère uniforme d'analyses détaillées. Nous nous appliquerons d'une façon toute particulière à obtenir cet important résultat.

sont dues probablement à des vapeurs moins denses que l'hydrogène. Aussi ne doit-on pas s'étonner qu'elles fassent défaut dans les spectres des comètes. La raison, en effet, que l'on peut invoquer pour l'absence de la raie de l'hydrogène, c'est qu'il y a une action qui repousse les vapeurs produites par des chocs, et que les vapeurs qui les premières doivent subir cette action, sont naturellement les moins denses.

II. *Comparaison des comètes et des aurores.* — Ici les coïncidences sont également frappantes. La bande de l'hydrocarbure située en 431, les bandes du carbone chaud et froid en 468-474, 483, 517 et 519 sont communes aux deux spectres. Des bandes du magnésium 500 et 521, celles du plomb et du manganèse en 546 et 558 sont également communes.

III. *Comparaison entre les comètes et les étoiles à raies brillantes.* — Les bandes du carbone chaud, du manganèse 558, du plomb, du sodium 568 sont communes; D n'a été vu brillant que dans une seule étoile (γ d'Argus) qui est probablement une des plus chaudes de son espèce.

IV. *Comparaison des comètes et des étoiles à bandes mates.* — Cette comparaison montre qu'il y a une relation très étroite entre les comètes et le groupe II. Les bandes brillantes du carbone, la bande du manganèse en 558, labande du plomb en 546, la bande du fer en 615, et labande du magnésium en 521 sont communes.

V. La table montre qu'il ya trois bandes communes à tous les spectres, 468-474, 517, 558; quatre autres bandes H. 486, Mg. 500, Mg. 521, Pb. 546 se retrouvent dans les spectres des quatre groupes. Cette ressemblance entre les spectres des quatre groupes d'astres étudiés et ceux des comètes, conduit à rapprocher ces divers astres des météorites.

Sir J. Norman Lockyer F. R. S. fait une communication sur la *présence des bandes brillantes du carbone dans les spectres des corps célestes.*

Il montre que, si les nébuleuses et un grand nombre des soi-disant étoiles sont en réalité des groupes de météorites, leur spectre doit ressembler à celui des comètes, dont la nature météoritique est généralement acceptée. Les bandes du carbone constituent le trait dominant du spectre des comètes. Voici la liste des corps célestes qui contiennent une ou plusieurs des bandes du carbone autour de 517 et de 468-474: Nébuleuse planétaire; Orion; Nébuleuses du catalogue général: n° 4373, 4231, 4390; Nébuleuse d'Andromède; γ Argus; Argelander-Oeltzen 17.681; Lalande 13.412; Cygnus: 1, 2, 3; γ Cassiopee; α Ceti; α Hercule; α Orion. Le carbone se retrouve donc depuis la nébuleuse planétaire jusqu'aux étoiles qui ressemblent à l' α d'Hercule en passant par les étoiles à raies brillantes. On le retrouve donc dans toute l'étendue des groupes I et II.

2° SCIENCES PHYSIQUES

M. C. F. Fitzgerald présente une note de **M. J. Joly** sur le calorimètre à vapeur. L'auteur a antérieurement formulé sa méthode dans les termes suivants: Si W grammes d'un corps à t_1 sont plongés dans une atmosphère saturée de vapeur, par exemple de vapeur

d'eau à t_2 , la substance subit une élévation de température de $t_3 - t_1$, et absorbe WS ($t_3 - t_2$) calories, S étant la chaleur spécifique du corps. Si λ est la chaleur latente de la vapeur à la température t_2 , une quantité de vapeur du poids de ω grammes se condensera, de telle sorte que WS ($t_3 - t_2$) = $\omega\lambda$.

Si dans cette équation λ était connu, la valeur de S se tirerait facilement. Or la valeur de λ a été exactement déterminée par Regnault pour toutes les valeurs de t_2 qui peuvent vraisemblablement se présenter.

De même si on connaît S, λ peut être déterminé. Un grand nombre d'expériences ont été faites, en se servant de divers modèles du calorimètre à vapeur; ces expériences ont conduit à construire un appareil simple et aisément maniable. L'auteur a constaté que la délicatesse de la méthode était si grande, que la chaleur spécifique des gaz à volume constant pouvait être estimée directement d'une façon très approchée.

— Les travaux de MM. Thomson, Shelford Bidwell, Villari et Ewing ont établi qu'après la rupture du courant magnétique, les fils de fer subissent, sous l'influence de changements cycliques de pression, des variations corrélatives, également cycliques, d'état magnétique. Dans un mémoire, que présente M. Thomson, **M. Chrée** décrit des phénomènes semblables dans le Cobalt. Il en a mesuré la grandeur pour des champs variés, de 0 à 400 unités C. G. S. L'état du fil de cobalt, au moment de la rupture du courant, exerce une action marquée non seulement sur la grandeur, mais même sur le sens du phénomène.

La Société ajourne sa prochaine séance au 9 janvier 1890.

R.-A. Gregory.

La Société de physique et la Société de chimie de Londres sont en vacances. Nous rendrons régulièrement compte de leurs travaux.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 9 janvier 1890

1° SCIENCES PHYSIQUES

M. J. Stephan : sur les vibrations électriques en ligne droite;

M. James Moser : 1° sur les vibrations électriques dans l'air raréfié sans électrodes; — 2° sur la conductibilité du vide.

Ces deux mémoires seront imprimés dans les *Annales de l'Académie*.

Ed. Donath : sur une nouvelle réaction générale de l'azote dans les substances organiques;

E. Hattensaur : sur la composition chimique de la *Molinia coriacea*.

Ces deux mémoires manuscrits sont renvoyés à l'examen d'une commission.

2° SCIENCES NATURELLES

D'Alf. Nalepa : sur un nouvel Insecte de la noix de Galle (mémoire-manuscrit, renvoyé à une commission).

Emil Weyr.
Membre de l'Académie

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Séance publique extraordinaire du 17 décembre 1889.

M. **Alphonse Briart** traite de la formation houillère, en s'appuyant sur l'observation des bassins houillers de la Belgique. Des deux hypothèses en présence — la théorie ancienne de la formation sur place et la théorie récente de la formation par transport (Fayol) — la première seule, lui paraît compatible avec la régularité vraiment remarquable des lits de houille dans les bassins belges. Même dans les régions qui ont subi des redressements, le parallélisme des couches soulevées ou plissées semble témoigner de la parfaite tranquillité d'un dépôt opéré sur place. La pureté relative de ces houilles milite aussi en faveur de cette interprétation. Il semble que le transport des végétaux n'aurait pu amener qu'un dépôt irrégulier dans des eaux troubles.

Il en eût été ainsi même pour des arbres charriés seulement à courte distance. Cette dernière hypothèse paraît d'ailleurs perdre presque toute sa raison d'être, si l'on admet avec l'auteur qui la défend, M. Grand'Eury, la transformation possible des débris végétaux aux bords des forêts avant le transport dans les bassins de dépôt.

La situation quelquefois verticale des *Stigmaria* dans les mines a paru, pendant longtemps, un puissant argument en faveur de l'unique théorie qui régnait alors : celle de la formation sur place. Les anciens géologues prenaient en effet les tiges de ces plantes pour les racines des végétaux houillers, et croyaient par suite les observer dans leur position primitive. Mais de ce que cette opinion est devenue insoutenable, il ne s'ensuit pas qu'il faille abandonner la doctrine du dépôt *in situ*, ni confondre la formation de la houille avec celle de la tourbe.

L'examen des bassins houillers de la Belgique conduit au contraire à supposer qu'au début de l'époque houillère cette contrée constituait une vaste plaine inondée. Elle se couvrit ensuite d'une immense forêt, dont les débris accumulés ont produit les couches stratifiées de combustible.

Cette phase semble avoir été suivie d'un affaissement du sol, que recouvrit la mer. Il en résulta un vaste estuaire ou *Polder*. La végétation disparut jusqu'à ce que les sédiments l'eussent comblé. Alors l'eau redevenit limpide, la flore reprit son domaine et une seconde couche de houille commença à se déposer. Cette théorie explique comment ont pu se constituer sur place, séparés l'un de l'autre par la formation *poldérienne*, les deux systèmes houillers de la Belgique.

Dans cette même séance :

M. **Louis Henry** a fait une lecture sur l'Empire du carbone;

MM. **Berthelot**, **Hermite**, **Gaudry** et **Du Bois-Reymond** ont été nommés associés de l'Académie; M. **Terby**, correspondant. M. **Spring** a été proclamé lauréat du concours quinquennal de mathématiques; M. **Jules Sauveur**, lauréat du prix de statistique.

Rauis,

ACADÉMIE DES SCIENCES DE SAINT-PÉTERSBOURG

Tout prochainement, nous publierons les comptes rendus des séances de cette académie, que nous enverra l'un de ses membres, l'éminent astronome M. **Backlund**.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 12 décembre 1889.

1^{re} SCIENCES PHYSIQUES

M. **Wullner** fait une communication sur le Spectre de l'Hydrogène. Le spectre de bandes se transforme en spectre de raies tant par le fait d'une diminution de la pression que par suite de l'augmentation de l'énergie produite par la décharge électrique à travers le gaz. Les raies n'apparaissent jamais à la fois, mais toujours l'une après l'autre; leur intensité croît plus rapidement que celle des bandes; il en résulte que l'éclat de celles-ci semble s'affaiblir, mais c'est là une simple apparence, due au contraste. Ces phénomènes concordent avec la conception théorique qui attribue les bandes aux vibrations des molécules ou des agrégations moléculaires, et les raies aux vibrations des atomes.

2^o SCIENCES NATURELLES

M. du Bois-Reymond présente un travail de M. **G. Svitsch** sur le rapport numérique des éléments de l'organe électrique des *Torpilles* aux éléments du système nerveux.

M. **Schultze** présente une étude de M. **Will a Rostaik** sur le Développement du *Platydictylus mauritanicus*.

M. **Pringsheim** offre de la part de l'auteur, M. **Oetmanns**, un Ouvrage imprimé avec subvention de l'Académie et intitulé: *Contribution à la connaissance des Fucacées*.

D^r Hans Jahn.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN,

Séance du 20 décembre 1889

Le D^r **Assmann** décrit les expériences qu'il a réalisées à l'aide de ses thermomètres à aspiration déjà présentés. Il les plongeait dans une grande masse d'eau qui, au repos, était à 35° C. Une turbine produisait ensuite dans l'appareil une rapide aspiration: aussitôt la température tombait à 22°, 5, C, température de l'air extérieur. La vitesse de l'air aspiré était en moyenne de 2 m, 5 par seconde.

M. **Von Helmholtz**, président, fait remarquer que la raréfaction de l'air due à l'aspiration, entraîne un abaissement de température en partie compensé, il est vrai, par le frottement de l'air. L'ensemble de ces deux facteurs pourrait être calculé d'après le régime du courant d'air.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séances des 1^{er}, 8 et 15 décembre 1889,1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES

M. Cesàro : Sur les variations de volume des corps élastiques. — **M. Marcolongo** : Sur la déformation d'une sphère homogène isotrope, avec conditions spéciales aux limites. — **M. Cavalli** : Sur l'échange de chaleur entre la vapeur et le métal dans les moteurs monocylindriques. — **M. Schiaparelli** expose les résultats des observations qu'il a faites, pendant huit années, sur la planète Mercure. Il a reconnu que Mercure tourne autour du soleil, présentant à cet astre *presque* toujours le même hémisphère; en effet, la planète a un mouvement de libration, analogue à celui de la Lune, et elle oscille à droite et à gauche sous un angle de 47°, exécutant une oscillation complète en 84 jours. C'est le premier exemple d'une planète qui se comporte comme un satellite. Ce mouvement détermine différentes conditions d'illumination et de ténèbres sur les diverses régions de la planète, qui aurait une atmosphère semblable à la nôtre, et une surface où, selon toute probabilité, manquent les grands océans; les terres semblent y être fréquemment entrecoupées par les eaux. — **M. Tacchini**, poursuivant ses observations spectroscopiques sur la chromosphère du Soleil, à l'Observatoire du Collège romain, a reconnu que pour le second trimestre de 1889 on a eu une période de calme dans les taches et dans les protubérances du Soleil. Dans le troisième trimestre, les mêmes phénomènes ont présenté une activité qui a été en croissant.

2^e SCIENCES PHYSIQUES

M. Pierpaoli a fait de nouvelles recherches relatives à l'action de la chaleur sur les vibrations d'un diapason, et il a trouvé que pour un diapason qui donne 445 v. s. à la seconde, à 13°,80, le nombre N_t des vibrations à la température t est donné par la formule : $N_t = 445,1957 (1 - 0,000397694 t)$. — **M. Marangoni**, rappelant les derniers travaux de M. Van der Mensbrugghe sur la tension superficielle des liquides et sur les phénomènes de la capillarité, explique par la théorie du savant belge la soudure des métaux à l'aide d'un fondant, l'orientation de certaines fleurs, le plissage du linge humide, etc. — **M. Mauro** donne la description de deux nouveaux composés du molybdène, qu'il vient de découvrir : le fluoxymolybdate d'ammoniaque hexagonal, et le fluoxymolybdate d'ammoniaque rectangulaire.

3^e SCIENCES NATURELLES

M. Blaserna expose quelques considérations sur l'échelle musicale aujourd'hui en usage et sur ses différences avec l'échelle mathématiquement exacte. Pour étudier d'audit les sons de cette échelle exacte, l'auteur a fait construire un harmonium dont les quatre claviers différent entre eux d'un comma pythagorique. Avec cet instrument la plus petite irrégularité des sons dans les accords et les modulations donne lieu à des battements et à des dissonances qui, en raison de la continuité des notes de l'harmonium, sont bien plus

prononcés que dans la musique ordinaire. — **M. Todoraro**, s'appuyant sur des faits observés par lui et par d'autres biologistes sur les salpes et sur les mammifères, donne une nouvelle théorie de la gémeuparité et des monstres doubles chez les mammifères. — **M. Mingazzini** a reconnu que le *Didymophyes* n'est pas formé de deux individus complètement fusionnés, comme on le croyait généralement jusqu'ici, mais qu'après la conjonction les deux êtres qui s'unissent constituent les deux parties distinctes d'un seul individu.

Séance du 5 janvier 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES

M. Bordiga, Sur une congruence du 3^e ordre et de la 6^e classe dans l'espace ordinaire. — **M. Millosevich** donne, dans une note, la correction pour les éléments paraboliques de la comète 1889 II (Barnard, mars 34) qu'il avait déjà calculés dans une note précédente.

$$\begin{aligned} T &= 1889 \text{ juin } 10.80670, \text{ t. m. Berlin} \\ \log q &= 0,373260 \\ \pi &= 186^{\circ}, 46', 58'', 4 \\ \Omega &= 310^{\circ}, 42', 9'', 7 \\ \epsilon &= 163^{\circ}, 50', 26'', 0 \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \text{écliptique } 1889,0. \end{array} \right.$$

2^e SCIENCES PHYSIQUES

M. Tacchini donne communication des informations qu'il a reçues sur le *tremblement de terre* qu'on a ressenti sur les côtes italiennes de l'Adriatique et sur les côtes de la Dalmatie, le 8 décembre 1889. La première secousse a été perçue à 6 heures 6' du matin; le centre des ondulations, selon toute probabilité, se trouve dans l'Adriatique. — **M. Agamennone** résume les discussions qu'on a faites pour établir si la *sensibilité des appareils sismiques* est due à des courants telluriques ou à des mouvements du sol; il montre comment une barre de cuivre et une barre aimantée, identiques dans leur forme et dans leur suspension bifilaire, peuvent se mouvoir d'une manière différente sous l'action d'une même secousse. — **M. Riccio** expose une méthode facile pour étudier la *réfraction atmosphérique*; méthode établie sur les déplacements que l'horizon de la mer semble accomplir, lorsqu'on le reporte à un point fixe tel que le sommet d'un clocher. — **M. Cancani** a calculé, sur les observations de 35 années, la *température moyenne de Rome*, et il l'a trouvée égale à 13°, 31. — **M. Garibaldi**, dans une série d'observations de 17 années, trouve confirmée la loi qu'il avait déjà énoncée, que les *orages magnétiques* et les *variations diurnes* de l'aiguille aimantée ont une même origine et une même mesure dans la production des taches du Soleil. — **M. Grablovitz**, au moyen d'un marégraphe, a étudié la relation qui existe entre les variations de niveau de la mer, dues aux marées, et la variation des eaux dans les sources thermales d'Ischia; il se propose de continuer ses recherches sur le phénomène de l'onde secondaire, phénomène que l'on avait déjà observé dans le lac de Genève.

3^e SCIENCES NATURELLES

M. Leone avait déjà reconnu que dans l'eau les phénomènes de *nitrication* et *dénitrication*, dus à l'ac-

tion de germes vivants, peuvent être modifiés par l'addition de substances nutritives. Le même fait se reproduit dans la terre végétale par l'adjonction des engrais; si l'engrais que l'on mêle à la terre est en grande quantité, la nitrification dans le sol s'arrête, pour recommencer plus tard, et ses produits sont détruits; si l'engrais est en faible quantité, la dénitrification de la terre est incomplète.

M. **Struwer** traite, dans un mémoire, des *grants* de la Basse Valsésie.

Ernesto Mancini.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE TURIN

Séance du 29 décembre 1889.

MM. **Segre** et d'**Ovido** lisent un rapport sur un mémoire du professeur **Gino Loria** intitulé : « L'âge d'or de la géométrie grecque. » L'Académie décide que cette étude sera publiée dans ses *Mémoires*. — M. Cossa présente, pour l'insertion aux *Actes*, un travail du **D^r Clemente Montemartini** sur la « Composition chimique et minéralogique d'une *Serpentine* de la rivière ligurienne ». — Le président, M. Michele Lessona, offre à l'Académie au nom de l'auteur, M. **Arnould-Locard**, les trois ouvrages suivants : « 1^o Catalogue descriptif des mammifères sauvages et domestiques qui vivent dans le département du Rhône et dans les régions avoisinantes », 1 vol. in-8°; 2^o « Monographie des espèces françaises appartenant au genre *Valvata* », 1 vol. in-8°; 3^o « Description des mollusques fossiles des terrains tertiaires inférieurs de la Tunisie, recueillis en 1885 et 1886 par M. Philippe Thomas », 1 vol. in-8° avec figures.

D^r Boschetti.

ACADÉMIE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE TURIN

Séance du 23 décembre 1889.

Le président, M. **Perroncito** expose quelques considérations relatives aux recherches microbiolo-

giques qu'il a le premier entreprises sur l'*Influenza* et la *Pneumonie croupale* du cheval en 1885. Ces études, reprises par M. Schütz en 1887, montrent qu'il n'y a aucune raison d'identifier l'*Influenza* du cheval et celle de l'homme.

Le colonel **Bertacchi** fait observer qu'il fut le premier en Italie à décrire l'*Influenza* du cheval en 1853. Il l'avait alors appelée *pneumo-hépatite*, ignorant que M. Samson l'avait décrite quelques années auparavant en France, précisément sous le nom d'*Influenza*.

Cette maladie est presque toujours bénigne, rarement mortelle en Italie; les vétérinaires la confondent avec la fièvre typhoïde ou d'autres affections contagieuses. Il est nécessaire : 1^o de la mieux étudier et de la classer; 2^o de voir si elle offre quelque analogie avec l'*Influenza* de l'homme; 3^o enfin, d'en démontrer le caractère contagieux ou non contagieux. Sur ce dernier point, l'auteur déclare qu'il n'a jamais constaté la transmission de la maladie des chevaux aux soldats; il n'est même jamais arrivé à la transmettre par inoculation de cheval à cheval.

M. **Perroncito** répond qu'il lui paraît nécessaire d'attribuer à cette affection une cause spécifique microbienne, sans laquelle ne s'expliqueraient ni l'apparition, ni la diffusion de la maladie.

MM. **Volante**, **Chêne** et quelques autres membres de l'Académie discutent le mode de développement de l'*Influenza*.

M. **Boschetti** fait remarquer que plusieurs télégrammes de Saint-Petersbourg et de Vienne annonçaient l'apparition simultanée de l'*Influenza* chez l'homme et les animaux (cheval, chien, poule). Il est donc très important d'élucider la question d'un rapport direct de cause à effet entre l'*Influenza* de l'homme et celle des animaux, en particulier celle du cheval et du chien.

La suite de la discussion sur ce sujet est renvoyée à la prochaine séance.

D^r Boschetti,

Membre de l'Académie.

NOUVELLES

L'éclipse totale de Soleil du 22 décembre 1889. — La zone de totalité de cette éclipse partait du nord du Venezuela, longeait les côtes des Guyanes, traversait l'Atlantique et se terminait dans l'Afrique équatoriale : plus des trois quarts de sa longueur étaient sur la mer. La Société royale astronomique de Londres avait organisé deux missions, destinées à l'étude de la couronne solaire et dirigées l'une par le P. Perry, directeur de l'observatoire de Stonyhurst, l'autre par M. Albert Taylor. Ce dernier s'était rendu à Saint-Paul de Loanda

(côte ouest d'Afrique) où le mauvais temps n'a permis aucune observation. Le P. Perry s'était établi près des côtes de la Guyane française où le ciel fut assez favorable, mais il mourut cinq jours après, emporté par la dysenterie. Le très succinct télégramme qui vient d'annoncer la mort de cet estimable savant paraît indiquer que le 22 décembre la couronne solaire avait la même forme que lors de l'éclipse du 1^{er} janvier 1889.

G. Bigourdan.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LA THÉORIE MATHÉMATIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ

1. En publiant les *Leçons sur la théorie mathématique de l'Électricité* (1), qu'il a professées l'année dernière au Collège de France, M. J. Bertrand s'est proposé d'exposer, d'une façon aussi simple que possible, les fondements les plus essentiels de la Science et leurs principales applications.

« Sans sacrifier, dit-il, dans la préface, la rigueur au désir de simplifier ou d'abrégier, j'ai « choisi toujours la voie la plus directe; je crois « l'avoir souvent simplifiée; il m'a suffi quelquefois « de supprimer les formules inutiles. »

Et, en effet, ce qui frappe tout d'abord dans cet Ouvrage, ce n'est pas seulement l'élégance du style et des démonstrations qu'on attend tout naturellement du maître qui l'a écrit, mais l'extrême sobriété dans l'emploi du calcul et, en particulier, du calcul intégral.

Les théories générales sont illustrées, soit par des exercices, soit, le plus souvent, par des applications utiles dans la pratique.

L'auteur s'est interdit deux théories dont il ne méconnaît pas l'intérêt, ni même l'utilité provisoire, mais qu'il ne juge pas assez bien acquises pour rentrer dans le cadre d'une théorie mathématique: c'est la théorie des diélectriques et la théorie, prise dans toute sa généralité, des courants dans des conducteurs à une ou plusieurs dimensions, fixes ou mobiles.

La division de l'ouvrage est des plus simples: treize chapitres, dont il ne me paraît pas inutile de donner d'abord les titres:

I. Attraction des sphères; II. La fonction potentielle; III. Surfaces sans action sur les points intérieurs; IV. Les lignes de forces.

Ces quatre premiers chapitres forment, comme on le voit, une sorte d'introduction où sont exposées les propriétés générales des forces inversement proportionnelles aux carrés des distances, indépendamment de toute application.

Les applications viennent ensuite:

V. L'électrostatique; VI. Les aimants; VII. Les courants; VIII. Les actions électro-magnétiques; IX. Les actions électro-dynamiques; X. Quelques applications; XI. Théorie de l'induction; XII. Machines électro-magnétiques; XIII. Les unités électriques.

Chaque chapitre est précédé, non seulement d'un sommaire détaillé des matières qui en font l'objet, mais de quelques réflexions indiquant l'esprit dans lequel elles ont été traitées.

Je ne crois pas pouvoir mieux rendre hommage à l'auteur de ce beau livre, et au livre lui-même, qu'en essayant de l'analyser chapitre par chapitre.

I

ATTRACTION DES SPHÈRES

2. Après avoir rappelé la définition et les premières propriétés de la fonction des forces qu'il nomme *potentiel*, dans le cas particulier des forces inversement proportionnelles aux carrés des dis-

(1) 1 vol. in-8°, Paris 1890, Gauthier-Villars.

tances (1) et celles de la *fonction potentielle* ou potentiel relatif à un point, M. J. Bertrand donne, par des considérations géométriques immédiates, le potentiel d'une surface sphérique homogène, relativement à un point pris dans son intérieur, et il en déduit, aussi sans calcul, le potentiel relatif à un point extérieur à l'aide des points conjugués, c'est-à-dire en regardant la sphère comme le lieu des points dont le rapport des distances à deux points fixes est constant. Il obtient ainsi très facilement les théorèmes classiques de Newton.

Après avoir vérifié que le potentiel ne change pas brusquement quand on traverse la surface, mais qu'il en est autrement de l'attraction, il montre, de suite, que cette double propriété appartient au potentiel et à l'attraction d'une surface quelconque.

De la surface sphérique on passe à la sphère pleine et annulaire.

Le chapitre est complété par quelques exercices très intéressants, notamment celui de la couche sphérique qui attire les points extérieurs comme si sa masse était concentrée en un point autre que son centre, emprunté à W. Thomson.

Je me permettrai une observation de détail. M. J. Bertrand prend soin de bien faire ressortir que la méthode qui lui permet de passer du potentiel de la surface sphérique relatif à un point intérieur, à son potentiel relatif à un point extérieur, est spéciale à cette surface. Mais, en insistant sur ce point, il me semble avoir un peu dépassé sa pensée lorsque (page 8), il dit : « Les deux problèmes « relatifs aux points intérieurs et extérieurs sont, « en général, de difficulté inégale, et celui des « deux qu'on a pu résoudre ne peut servir en rien « à la solution de l'autre. »

« Les surfaces sphériques font exception, etc. »

Quand on a trouvé le potentiel d'une surface fermée quelconque relatif aux points intérieurs, par exemple, et, par suite, relativement aux points de la surface même, le potentiel relatif aux points extérieurs est, par cela même, complètement déterminé ainsi qu'il est établi au § 21 de ces leçons.

Il est donc possible (je ne dis pas facile) de faire, pour toutes les surfaces, ce que M. J. Bertrand a fait pour la sphère, c'est-à-dire de déduire le potentiel relatif aux points extérieurs de celui relatif aux points intérieurs.

On ne peut donc pas dire, au moins en principe, que la connaissance de ce dernier ne puisse servir en rien à la solution du premier, ni que la sphère, à ce point de vue, constitue une exception.

II

LA FONCTION POTENTIELLE

3. Ce qui a permis à M. J. Bertrand de présenter, sous une forme très simple, beaucoup de démonstrations, notamment en ce qui touche le potentiel, c'est que toutes les propriétés du potentiel qui se rapportent aux points extérieurs au corps attirant, sont exprimées par des équations linéaires et homogènes relativement aux particules qui le composent.

Il en résulte qu'il suffit de les démontrer pour une seule particule et, alors, elles sont, en général, évidentes. Dans ce cas se trouvent :

1° L'équation de Laplace ;

2° Le célèbre théorème de Gauss consistant en ce que la moyenne des valeurs d'un potentiel relativement aux divers points d'une surface sphérique, coïncide avec sa valeur au centre de la surface, pourvu que celle-ci ne rencontre pas la masse attirante, théorème que M. J. Bertrand montre, du reste, ne pas différer, au fond, du précédent.

Il est donc certain que tout ce qu'on peut déduire de l'un se déduirait aussi de l'autre, mais avec quelle différence ! Le théorème de Gauss donne, en quelque sorte à vue, les corollaires suivants :

a) Le potentiel d'un corps relativement à un point extérieur ne peut avoir ni maximum ni minimum.

b) Si le potentiel d'un corps est constant relativement à tous les points d'une surface fermée qui ne renferme aucune partie du corps, il est constant dans tout l'espace limité par la surface.

c) Si le potentiel d'un corps contenu tout entier dans une surface fermée est nul relativement à tous les points de la surface, il l'est relativement à tous les points extérieurs à cette surface.

d) Si deux corps contenus tout entiers dans une surface fermée ont mêmes potentiels relativement à tous les points de cette surface, ils ont mêmes potentiels relativement à tous les points extérieurs à cette surface, et, par suite, mêmes masses.

e) Si deux corps placés tous deux à l'extérieur d'une surface fermée ont mêmes potentiels relativement à tous les points de la surface, ils ont mêmes potentiels relativement à tous les points intérieurs à cette surface.

f) On pourrait ajouter le théorème de Green tellement capital que M. J. Bertrand lui consacre le chapitre suivant, et qui est la suite immédiate des deux précédents.

Or, le théorème 2°, qui met ainsi en pleine lumière les conséquences que nous venons de résumer, est absolument évident quand le corps considéré se réduit à un point, et il est même manifeste que,

(1) Le potentiel ainsi entendu est donc, au signe près, l'énergie potentielle du système attirant.

dans ce cas, il ne diffère pas de cette proposition de Newton : que le potentiel d'une surface sphérique homogène relativement à un point extérieur est le même que si toute la surface était concentrée en son centre.

Etant ainsi évident pour un point, il l'est pour un corps composé d'un nombre quelconque de points.

M. J. Bertrand l'établit un peu différemment à l'aide d'une identité de Gauss, dont il tire souvent parti.

3° On peut ajouter comme se déduisant simplement du cas où la masse attirante se réduit à un point, cet autre théorème de Gauss extrêmement utile aussi, que la somme

$$\int \frac{\partial V}{\partial n} d\sigma$$

des composantes normales des actions exercées sur tous les éléments $d\sigma$ d'une surface fermée quelconque à laquelle on attribuerait la densité uniforme 1, est nulle si aucune partie du corps ne se trouve à l'intérieur de la surface.

Ce théorème aussi est équivalent à l'équation de Laplace, dont M. J. Bertrand a déduit par des intégrations partielles que la démonstration directe de Gauss évite, mais qui sont si utiles à connaître que j'en suis pas surpris que l'auteur se soit un instant départi, pour en donner un exemple, de son principe d'éviter les intégrales non indispensables.

4. Les énoncés de ces divers théorèmes se modifient quand on envisage le potentiel relativement à des points faisant partie du corps attirant. Mais les deux théorèmes de Gauss peuvent toujours se démontrer simplement.

L'équation de Laplace se transforme en celle de Poisson que M. J. Bertrand établit par le procédé dû à Gauss qui consiste à le vérifier, ce qui est immédiat, pour la sphère homogène. Par là, il se trouve tout démontré pour tout corps homogène, et, par une extension facile, pour les corps quelconques.

5. C'est, d'ailleurs, toujours à l'immortel Mémoire de Gauss (1) qu'il convient de revenir en cette importante et délicate matière. C'est d'après lui aussi que M. J. Bertrand établit ce théorème, fondement de l'Electrostatique, comme de plusieurs branches de l'Analyse et de la Physique mathématique : On peut toujours, et d'une seule manière, répartir une masse attirante sur une surface fermée donnée, ou plus généralement sur les surfaces

fermées limitant un espace à connexité multiple, de façon que le potentiel de la masse soit arbitrairement donné en chaque point de ces surfaces (1).

III

SURFACES SANS ACTION SUR LES POINTS INTÉRIEURS

6. Ce magnifique théorème paraissait comme un défi jeté aux géomètres. Il leur indiquait qu'un problème est possible; il est capital en électricité et sa solution restait inaccessible sauf dans le cas d'une sphère.

Le cas où il serait le plus utile d'en connaître la solution, c'est celui où on demanderait de distribuer la matière sur les surfaces données, de façon que son potentiel reste constant en tous les points de chacune d'elles.

Poisson, dans son magistral mémoire sur la distribution de l'électricité sur deux sphères, l'a résolu pour deux pareilles surfaces.

Les travaux de Maclaurin, de Legendre, de Gauss, d'Ivory, etc., sur l'attraction des ellipsoïdes ont permis de le résoudre pour un ellipsoïde.

Le théorème suivant, dû à Green, en donne une infinité de solutions nouvelles :

Si, sur une surface de niveau

$$V = C$$

supposée formée d'une masse attirante quelconque, on répartit une couche de matière, en lui donnant, en chaque point, la densité superficielle :

$$\rho = - \frac{1}{4\pi} \frac{\partial V}{\partial n}$$

n étant la normale extérieure, cette couche de matière exerce, sur les points extérieurs à la surface, la même action que la partie de la masse attirante placée dans son intérieur et sur les points intérieurs à la surface, une action égale et contraire à celle exercée par la partie de la masse qui lui est extérieure.

Si donc la masse attirante est tout entière à l'intérieur de la surface, la couche de matière répartie sur celle-ci n'exercera aucune action sur les points qui lui sont intérieurs, son potentiel

(1) On sait que Dirichlet a, depuis, donné de cette proposition, une autre démonstration basée sur le célèbre théorème qui porte son nom.

Les deux démonstrations supposent l'existence d'un maximum ou d'un minimum, existence au sujet de laquelle les géomètres, dans leurs exigences actuelles de rigueur, ont fait certaines réserves. Mais c'est là une discussion de pure analyse qui n'aurait pas sa place ici.

(1) Allgemeine Lehrsätze in beziehung auf die im verkehrten Verhältniss des quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs und Abstossungskräfte.

sera donc constant en ces points et, par suite, sur la surface elle-même.

Le problème de répartir une couche de matière de façon à remplir cette dernière condition est donc résolu, toutes les fois qu'on connaît les surfaces de niveau, c'est-à-dire la fonction potentielle V d'une masse attirante donnée. Or, il suffit de former cette masse avec un nombre limité de points pour que sa fonction potentielle s'obtienne sans intégration. On a donc ainsi la solution immédiate du problème dans un nombre illimité de cas.

Tout le reste du chapitre est consacré à des applications destinées à montrer le parti qu'on peut tirer de ce beau résultat, d'autant plus remarquable qu'il fournit en même temps, sans intégration, l'attraction de la couche sur tous les points de l'espace.

Il est à peine besoin d'observer toutefois que le théorème ne fournit aucun moyen d'aborder de front la difficulté du problème *direct* consistant à distribuer la matière sur une *surface donnée* d'avance. Celui-ci n'a été attaqué que par Poisson.

IV

LIGNES DE FORCE

7. Nous appelons l'attention sur ce chapitre très bref et très instructif. On sait le rôle capital et éminemment pratique que jouent, depuis Faraday, les lignes de force dans les applications de l'Électricité et de l'Électro-magnétisme.

Que les lignes de force, c'est-à-dire les trajectoires orthogonales des surfaces de niveau donnent, en chaque point de l'espace, la *direction* de l'action exercée en ce point, cela est évident; mais Faraday leur fait aussi représenter la grandeur de cette action, ou, comme on dit, la grandeur du *champ électrique* ou *magnétique* lorsque les actions sont dues à l'électricité ou au magnétisme. Il mesure cette grandeur par le *nombre* des lignes de force qui traversent une surface donnée.

M. J. Bertrand montre que cette mesure est parfaitement exacte, mais seulement pour les actions inversement proportionnelles aux carrés des distances.

D'autre part, quand un fil conducteur, traversé par un courant électrique, se déplace dans un champ magnétique, il éprouve une résistance, et on dit que le travail de cette résistance est mesurable par le nombre de lignes de force que le courant rencontre pendant son déplacement.

M. J. Bertrand cherche quelle est la loi la plus générale des actions entre courants et aimants pour laquelle cette proposition est exacte, et il trouve que c'est la loi déduite de celle de Biot et Savart, c'est-à-dire celle qu'on admet réellement comme

existant entre un pôle magnétique et un élément de courant.

Ces quelques considérations, d'ailleurs très simples, sont de nature à rendre très précise la notion si utile des lignes de force.

V

ÉLECTROSTATIQUE

8. En général, on ne rappelle pas assez les principes de l'Électrostatique tels qu'ils ont été établis par Coulomb et développés mathématiquement par Poisson.

M. J. Bertrand n'a pas failli à cette tâche et quoique je trouve le procès qu'il fait à ces principes un peu sévère, sa discussion n'en est pas moins instructive.

Je commencerai par examiner ses objections.

Pour que les fluides électriques contenus à l'intérieur d'un corps conducteur soient en équilibre sous l'action de forces électriques quelconques, il faut et il suffit que le potentiel de ces forces soit constant relativement à tous les points de la surface du conducteur.

Alors il sera constant aussi dans tout l'intérieur de ce corps.

Que la condition soit suffisante, cela est évident, parce que, si elle est remplie, la résultante des actions en un point quelconque du conducteur est nulle.

Elle est aussi nécessaire: « En effet, » dit Coulomb dans un passage reproduit par M. J. Bertrand, « si les actions en un point d'une masse métallique avaient une résultante différente de zéro, les molécules de fluides contraires qui, par hypothèse, se trouvent accumulées et réunies en chaque point de la masse, seraient sollicitées par des forces égales et contraires qui provoqueraient la séparation et détruiraient l'équilibre. »

M. J. Bertrand ne trouve pas l'assertion évidente: « Les fluides de noms contraires, dit-il, s'attirent. A distance infiniment petite, l'attraction est infiniment grande. Pourquoi cette attraction infinie sera-t-elle vaincue par la plus petite force? »

Cette attraction n'est infinie qu'en apparence; en fait, elle est infiniment petite ou nulle. Si l'objection était valable, elle vaudrait pour tout point placé à l'intérieur d'une masse attirante continue, et cela n'est pas, comme on sait, et comme cela est établi aux § 28 et suivants des Leçons de M. J. Bertrand qui, du reste, semble lui-même ne pas insister lorsqu'il dit: « Il faut ajouter, pour mettre en présence tous les éléments de la question, que la masse attirante pour chaque portion d'électricité, mise en liberté, est infiniment petite. »

M. J. Bertrand fait encore une autre observation : « Les fluides de même nom se repoussent; *on conçoit donc*, dit Coulomb, que le fluide libre « sera transporté à la surface du corps où il sera « retenu par l'air environnant. »

« Cette raison sommaire, dit M. J. Bertrand, ne « peut suffire. Les molécules des gaz se repoussent; « on ne les voit pas, pour cela, s'accumuler à la « surface du vase qui les contient.

« Le transport de l'électricité à la surface est, « en réalité, dans la théorie de Poisson, accepté « comme une vérité d'expérience. »

Que la raison sommaire donnée par Coulomb ne soit pas probante; c'est certain; mais la théorie de Poisson ne me semble pas être dans le même cas, puisque c'est l'équation même de Poisson :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -4\pi\rho,$$

qui montre que si le potentiel V est constant et, par suite, ses dérivées nulles à l'intérieur du conducteur, il en est de même de la densité électrique ρ .

C'est parce que le potentiel des actions entre molécules gazeuses n'obéit pas à une équation comme celle-ci que, malgré leur action répulsive, elles ne se portent pas toutes à la surface de l'enceinte qui les renferme.

Je crois donc que les raisonnements réunis de Coulomb et Poisson sont suffisants, étant admise l'hypothèse des deux fluides.

Cela n'ôte d'ailleurs rien à l'utilité de l'exercice qui consiste à montrer, comme le fait M. J. Bertrand, et comme l'a fait Maxwell que, si on admet à titre de fait expérimental, que le fluide se porte à la surface des conducteurs, la loi de Coulomb s'ensuit.

Du théorème énoncé au commencement de ce paragraphe, il résulte que si un nombre quelconque de conducteurs chargés à des potentiels donnés, sont soumis à leurs actions mutuelles et aux actions de masses électriques fixes, la densité de la couche qui se formera à la surface de chacun d'eux devra être telle que son potentiel ait, en chaque point de la surface, une valeur donnée.

Or, nous avons vu que les couches satisfaisant à ces conditions existent, et que le problème consistant à les trouver n'a qu'une solution. Ainsi, des conducteurs mis en leur présence mutuelle et en présence d'isolants électrisés finissent toujours par se mettre en équilibre électrique et ils n'admettent qu'un seul état d'équilibre.

Cela est encore vrai si, au lieu d'être chargés à des potentiels donnés, ils sont chargés de masses électriques données.

Si les conducteurs ne sont soumis qu'à leurs

actions mutuelles, le potentiel de chacune des couches qui se forment doit être constant en tous les points de la surface qu'elle recouvre.

Le théorème de Green permet alors de résoudre le problème dans une infinité de cas. Parmi les exemples qu'en donne M. J. Bertrand, je citerai d'abord celui, dû à Maxwell, d'un corps limité par deux calottes sphériques se coupant à angle droit.

La couche électrique sur chaque sphère est formée d'une partie constante et d'une partie inversement proportionnelle au cube de la distance à un point fixe.

Sur la circonférence d'intersection des deux calottes, la densité de la couche est nulle.

Lorsqu'on a plus d'un conducteur, la difficulté du problème direct de la distribution n'a, en réalité, comme nous l'avons dit plus haut, pu être vaincue que dans un seul cas : celui de deux conducteurs sphériques, et c'est à Poisson qu'on doit cette belle solution. M. J. Bertrand donne et établit très élégamment les résultats numériques les plus intéressants du mémoire de son illustre devancier.

9. Dans ce qui précède, on a implicitement supposé les conducteurs pleins.

Le cas où ils sont évidés s'y ramène immédiatement comme l'a indiqué, pour la première fois, Faraday par une divination que la théorie mathématique confirme. Sous la désignation 1^{re}, 2^e, 3^e, 4^e théorème de Faraday, M. J. Bertrand établit des résultats qui peuvent se résumer en ceci :

1^o Si un conducteur chargé d'une masse électrique E porte une ou plusieurs cavités dans lesquelles sont placés des isolants fixes chargés en tout d'une masse électrique M , sa surface extérieure se recouvre d'une couche électrique identique à celle qui se produirait s'il était plein et chargé de la masse électrique totale $E + M$.

Son action sur les corps extérieurs est aussi pareille à celle du conducteur plein.

Sur la surface intérieure se dépose une couche de masse — M équilibrée par l'isolant + M .

2^o Les corps extérieurs agissent sur un conducteur creux comme s'il était plein.

Ainsi, supposons deux conducteurs creux portant dans leurs cavités respectives des masses électriques + M et — M . On les réunit par un fil. Qu'arrivera-t-il? Il arrivera, d'après 1^o, que le système sera neutre.

Vient ensuite quelques théorèmes de Maxwell dont le plus important pourrait s'énoncer ainsi : Si l'on a un système de conducteurs chargés de masses électriques données $E_1, E_2, E_3, \dots$ d'où résulte sur chacun d'eux un potentiel constant $V_1, V_2, V_3, \dots$ l'énergie potentielle W du système est une fonc-

tion homogène et du second degré des masses Ei , dont les dérivées partielles $\frac{\partial W}{\partial Ei}$ donnent les potentiels V_i ou inversement, W est une fonction homogène du second degré des potentiels V_i , dont les dérivées donnent les masses Ei .

Enfin le chapitre se termine par une théorie très simple de la bouteille de Leyde, abstraction faite de l'influence du diélectrique.

VI

LES AIMANTS

10. Ce chapitre contient des indications sommaires sur la théorie de Poisson et sur le magnétisme terrestre. On y montre, d'après Gauss, comment la composante horizontale de l'action terrestre suivant le méridien étant donnée, la composante perpendiculaire s'ensuit.

M. J. Bertrand fait observer qu'il est inutile que les méridiens soient issus du pôle magnétique terrestre. Ils peuvent partir d'un point fixe quelconque sans que le résultat soit modifié, ce qui le rend pratique.

VII

LES COURANTS

11. Ce chapitre contient les premières notions générales sur les courants; les conditions de rupture d'équilibre pour les produire; les lois d'Ohm et de Joule; les théorèmes de Kirchhoff sur les réseaux de conducteurs et un théorème équivalent dû à Gauss.

Les principes sont appliqués à la recherche du travail électrique maximum pour une force contre-électromotrice donnée, ou pour une résistance donnée; au problème de Thomson sur le diamètre le plus économique d'un conducteur, enfin aux piles avec éléments assemblés en série ou en quantité.

Il y a une chose que je n'ai pas bien saisie dans ce chapitre; c'est la raison qui, lorsqu'il s'agit des courants, fait que M. J. Bertrand préfère le mot *tension* au mot *potentiel*. Je crois qu'on peut conserver le mot *potentiel* avec le sens qu'il a en électricité statique.

VIII

LES ACTIONS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES

12. Ce chapitre est un des plus élégants du volume. On peut le lire d'un bout à l'autre sans mettre la plume à la main, et, par la façon dont on y passe des lignes de force à l'angle solide de Gauss,

il ne peut que causer une égale satisfaction aux Ingénieurs et aux hommes de science.

Après avoir indiqué les expériences qui conduisent à admettre la loi élémentaire de Biot et Savart pour l'action d'un pôle magnétique sur un élément de courant, et à admettre que la réaction de l'élément de courant sur le pôle est égale et contraire à l'action, c'est-à-dire doit être regardée comme appliquée à l'élément lui-même, on en déduit aussitôt que la règle de Biot et Savart s'étend à un champ magnétique quelconque, ce qui permet d'écrire les composantes de l'action d'un champ magnétique sur un élément de courant (1).

On montre ensuite qu'un circuit fermé plongé dans un champ magnétique a un potentiel qui n'est autre que le nombre des lignes de force qu'il traverse.

Si le champ se réduit à un pôle μ , ce potentiel devient l'angle du cône ayant ce même point μ pour sommet et le circuit pour directrice.

On en déduit : 1° que si le circuit est infiniment petit, il produit la même action qu'une aiguille aimantée infiniment petite ; 2° que si le circuit est fini, il équivaut à un feuillet aimanté ; 3° qu'un solénoïde équivaut à une ligne aimantée.

IX

LES ACTIONS ÉLECTRO-DYNAMIQUES

13. Ce chapitre est aussi élégant et aussi intéressant que le précédent.

C'est Ampère, comme on sait, qui a donné le premier une loi des actions entre deux éléments de courant expliquant tous les faits connus. Depuis, on a reconnu qu'il en existe une infinité d'autres remplissant la même condition. Parmi elles, il y en a une plus simple que les autres et, à certains points de vue, plus vraisemblable, attribuée, en France du moins, à Reynaud.

(1) Lorsque, il y a quelques années, j'ai exposé cette théorie, quand j'avais l'honneur de suppléer M. J. Bertrand, j'ai énoncé la loi de Biot et Savart ainsi. Soit μ un pôle magnétique et $ab = ds$, un élément linéaire traversé, de a vers b , par un courant d'intensité I , et soit r la distance entre les points μ et a .

L'action du pôle μ sur l'élément ds est égale en grandeur, direction et sens, au moment de la force $\frac{I\mu}{r^2}$ issue de l'origine a de cet élément, par rapport à son extrémité b . D'où on conclut sans autre explication en vertu du théorème sur les moments des lignes concourantes, que l'action d'un champ magnétique représenté en a , par la force G est en grandeur, direction et sens, le moment de la force IG par rapport au point b , les moments étant portés à la gauche de l'observateur dirigé suivant la force, ce qui donne, par la formule classique des moments, les composantes de l'action cherchée, sans ambiguïté de signe.

M. J. Bertrand observe qu'elle a été donnée par Gauss et aussi, ce qui est beaucoup moins connu, par Ampère lui-même. Seulement Ampère la rejetait comme contraire au principe de l'action et de la réaction qu'à tort ou à raison il regardait comme aussi inséparable des actions à distance que des actions au contact.

M. J. Bertrand donne d'abord un moyen très ingénieux d'arriver à cette loi. Il consiste à attribuer à chaque élément d'un courant les propriétés électro-magnétiques que nous avons reconnues à un courant fermé.

Il passe ensuite à la recherche de la loi d'Ampère. Il montre qu'en admettant, avec l'égalité de l'action et de la réaction, ce fait qu'un courant fermé infiniment petit (courant élémentaire) exerce sur un élément de courant une action normale à ce dernier, ce qui est établi puisqu'un courant élémentaire équivaut à une petite aiguille aimantée, on arrive à la loi d'Ampère, à une fonction arbitraire près de la distance entre les deux éléments de courant en présence.

Puis, en invoquant les résultats obtenus sur les solénoïdes, on détermine la formule, à un facteur près, qui ne dépend que des unités adoptées.

14. On sait que Gauss a pensé à expliquer les phénomènes électriques en attribuant à deux particules électriques en mouvement une action dépendant non seulement de leur distance, mais aussi de leur vitesse. Cette action aurait pour expression :

$$T = \frac{ee'}{r^2} \left\{ 1 + k \left[u^2 - \frac{3}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 \right] \right\}$$

e, e' étant les masses de deux particules en mouvement; r , leur distance à l'instant t ; u , leur vitesse relative à ce même instant.

En considérant un courant électrique comme produit par deux flux, l'un de fluide positif, l'autre de fluide négatif, cheminant avec des vitesses en chaque point égales et contraires, on déduit de là, pour l'action de deux éléments de courant, la loi d'Ampère.

Depuis, Weber a proposé à la place de la formule de Gauss, la suivante :

$$T = \frac{ee'}{r^2} \left\{ 1 + k \left[r \frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{1}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 \right] \right\}$$

qui conduit au même résultat.

M. J. Bertrand observe que, pour deux particules, e et e' assujetties à suivre deux lignes droites avec des vitesses constantes, les deux lois sont identiques.

Cette remarque de M. J. Bertrand explique que les deux formules doivent donner des résultats identiques, si on les applique aux courants.

Mais il est évident qu'elles n'en sont pas moins différentes pour deux points libres, et celle de Gauss paraît, en ce cas, inadmissible comme contraire au principe de la conservation de l'énergie, tandis que celle de Weber y satisfait, car sa force T dérive du potentiel

$$V = \frac{ee'}{r} \left[\frac{K}{2} \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 - 1 \right].$$

Cette circonstance ne paraît pas toucher M. J. Bertrand : « En admettant, dit-il, ce qui « semble bien loin d'être justifié, qu'il y ait lieu de « choisir entre les deux formules, l'existence d'un « potentiel semble une circonstance fort indiffé- « rente. La raison pour laquelle, en effet, un poten- « tiel est présenté comme une condition néces- « saire, a pour origine l'impossibilité acceptée du « mouvement perpétuel.

« Pourquoi d'ailleurs repousser l'idée du mou- « vement perpétuel, quand il s'agit de l'action mu- « tuelle des courants? Un travail continu, nous « l'avons souvent répété, est nécessaire pour en- « tretenir un courant; pourquoi ce travail n'en- « gendrerait-il pas une force vive toujours crois- « sante? »

L'objection ne me semble pas porter; car il s'agit ici d'une loi qui, si elle est exacte, doit être universelle et applicable non seulement à des particules faisant partie d'un courant linéaire, mais à deux particules libres et en mouvement sous leurs seules actions mutuelles comme deux corps célestes le sont sous les actions newtoniennes et, par conséquent, on ne peut pas admettre une loi qui, comme celle de Gauss, conduirait alors au mouvement perpétuel; tandis qu'on peut, à ce point de vue, accepter celle de Weber.

X

QUELQUES APPLICATIONS

15. On trouve, dans ce chapitre, des applications des deux précédents :

L'action du magnétisme terrestre sur un courant plan mobile autour d'un axe.

L'action d'un courant circulaire sur un pôle magnétique situé sur son axe. On en déduit le principe du marteau pilon électrique de M. Marcel Deprez; enfin, les actions mutuelles de deux courants élémentaires ou de deux aimants infiniment petits.

XI

THÉORIE DE L'INDUCTION

16. M. J. Bertrand montre d'abord par quelques calculs simples, que si deux courants s'approchent ou s'éloignent l'un de l'autre, il doit se produire quelque modification intérieure dans chacun d'eux.

En langage ordinaire, sa démonstration peut, je crois, être présentée ainsi :

Considérons deux courants constants dont les circuits sont fixes. Pour maintenir chaque courant constant, on dépense un travail qu'on peut *exactement récupérer* sous forme de chaleur, dans son circuit.

Laissons à présent l'un des deux circuits libre de se mouvoir, l'autre étant maintenu fixe.

Le circuit mobile s'approchera ou s'éloignera du circuit fixe sous l'influence des actions électrodynamiques qu'ils exercent l'un sur l'autre ; il se produira ainsi un travail positif, que j'appellerai $\mathcal{E}$.

Si, par suite du mouvement qui occasionne ce travail, rien n'était changé dans les circuits, ni les intensités des courants, ni la chaleur qui en résulte, ce travail $\mathcal{E}$ pourrait être récupéré en sus de celui qu'on dépense pour entretenir les courants ; ce serait la solution du mouvement perpétuel.

On doit donc admettre que le déplacement des circuits produit quelque modification dans l'état des fluides qui les traverse.

Ce qui se produit, on le sait, depuis les expériences de Faraday : c'est une modification dans les intensités des courants, et uniquement cela.

En admettant qu'il en soit ainsi, le principe de l'énergie suffit à déterminer *a priori* les lois du phénomène.

Mais M. J. Bertrand pense qu'on ne peut pas être certain *a priori* qu'il ne se produise pas autre chose, par exemple une modification dans l'état calorifique des circuits, *sans modification correspondante dans les courants*, ce qui rendrait le principe de l'énergie impuissant à résoudre, à lui seul, le problème sans le concours de l'expérience.

On ne se compromet pas beaucoup aujourd'hui en affirmant que cela n'est pas probable. Je le crois cependant ; car si, dans toutes les circonstances imaginables, on a reconnu qu'un courant I traversant une résistance R produit une quantité de chaleur RI^2 , il n'est pas vraisemblable qu'il en soit autrement ici et qu'ici il produise une quantité de chaleur moindre $RI^2 - x$.

La discussion de M. J. Bertrand n'en est pas moins instructive pour le lecteur qu'elle amène à

envisager la question de l'induction sous toutes ses faces.

Une fois admis que la variation des courants est la seule chose qui se produira, l'auteur en déduit très rapidement, et sous forme élégante, les lois de l'induction. Il les énonce à l'aide des lignes de force et applique les résultats à quelques exemples.

Au point de vue purement théorique, l'expression, due à F. Neumann, de ces mêmes lois déduite de celle de l'énergie potentielle de l'ensemble des deux courants eût rendu le § 160 plus saisissant.

XII

MACHINES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES

17. Ce chapitre renferme les applications des théories qui précèdent à une étude sommaire et très facile à suivre des principales machines électromagnétiques et même électrodynamiques, depuis celle de Pixii et Clarke jusqu'à celle de Gramme.

On y trouve également des notions premières sur la théorie du transport de la force, ainsi que la théorie du double enroulement, de M. Marcel Deprez.

XIII

LES UNITÉS ÉLECTRIQUES

18. Je ne voudrais pas déflorer ce beau chapitre, en essayant de le résumer.

On a souvent, dans ces dernières années, exposé la théorie des unités électriques. L'exposition qu'on trouvera ici n'est pas inférieure à ce qu'on pouvait attendre du maître qui, bien avant qu'on s'occupât de ces questions, a su tirer si fréquemment et si ingénieusement parti des principes d'homogénéité en mécanique et en physique mathématique et, en particulier, en électricité, notamment dans la question des courants dans les lignes télégraphiques ; je désire laisser au lecteur le plaisir de savourer ce chapitre.

19. Si je ne suis pas resté trop inférieur à la tâche que je me suis imposée, j'aurai fait comprendre aux jeunes savants, comme aux Ingénieurs qui désirent se consacrer à l'étude de l'électricité que, dans ce volume de moins de 300 pages, ne renfermant pas un seul calcul laborieux, où les principes sont toujours élucidés par des exemples discutés avec soin, dont l'impression, d'ailleurs, est en tous points digne du texte, ils trouveront un enseignement aussi solide que fécond.

Maurice Lévy,

Membre de l'Institut.

NOUVELLE THÉORIE DE LA FABRICATION DE L'ACIDE SULFURIQUE


La fabrication de l'acide sulfurique a une importance telle qu'elle régit pour ainsi dire toutes les industries chimiques. Aussi l'a-t-on de tout temps étudiée avec le plus grand soin au point de vue pratique et théorique. Par des perfectionnements successifs, on est arrivé à obtenir un rendement qui peut dépasser 95 % et laisse de ce côté bien peu d'améliorations à désirer.

Les savants les plus distingués depuis Gay-Lussac se sont occupés de la théorie de l'acide sulfurique, et, comme il arrive souvent en science, chaque génération a donné des formules qui ont été complétées par la génération suivante, désireuse d'expliquer les faits qui viennent dans toute étude s'accumuler par la suite du temps. A l'encontre de ce qu'on observe presque toujours, les perfectionnements industriels ont devancé de beaucoup ceux de la théorie, de sorte qu'aujourd'hui, en présence d'hypothèses nouvelles, on se demande ce que l'on doit penser au sujet de ces réactions réputées classiques qui se passent dans les chambres de plomb où l'acide sulfurique prend naissance.

1


Tout le monde sait que l'acide sulfureux provenant de la combustion du soufre ou des pyrites se transforme en acide sulfurique *par oxydation* quand on le met en présence de l'oxygène de l'air et de deux auxiliaires indispensables : la *vapeur d'eau* et l'*acide azotique*.

L'acide sulfureux, l'oxygène et l'eau sont sommés réellement dans cette opération ; à eux trois ils forment le poids d'acide sulfurique produit, comme si l'équation de ce travail était simplement :




L'acide azotique, toujours présent pendant la transformation, ne s'use pas ; il semble qu'il aille et vienne entre les molécules à combiner comme une navette entre des fils, et c'est l'explication exacte de son rôle qui est difficile.

D'après la supposition la plus simple, les acides sulfureux SO^2 et azotique AzO^3H réagissent tout d'abord selon l'équation que voici :




Après cette première récolte d'acide sulfurique, qui reste acquise, l'acide hypoazotique AzO^2 , rencontrant de la vapeur d'eau, revient en partie à l'état d'acide azotique dont on connaît maintenant l'action, et forme en outre du bioxyde d'azote AzO .




Ce dernier se combine directement à l'air et redevient ce qu'il était précédemment : AzO^2 .



Le cycle est établi ; on conçoit que les choses puissent marcher indéfiniment ; AzO est l'agent qui prend l'oxygène de l'air pour le porter sur l'acide sulfureux : il s'oxyde et se réduit sans cesse. Ces formules bien connues paraissent être les plus anciennes déjà on a expliqué les faits un peu différemment. La vapeur nitreuse AzO^2 , formée dans la première phase que l'on continue à admettre, ferait, d'après cette théorie, de l'acide azotique et de l'acide azoteux, AzO^3H , en agissant sur l'eau :



Nous passerons sous silence l'action de l'acide azotique ainsi récupéré : elle est formulée plus haut (2) ; mais l'acide azoteux est capable aussi d'oxyder l'acide sulfureux :



et, comme l'équation le montre, il se forme, en même temps que de l'acide sulfurique, du bioxyde d'azote AzO , qui rentre dans la circulation en s'oxydant, comme d'usage, au contact de l'air (4).

En ces matières on ne peut être exclusif. Sans doute les deux théories ont raison à la fois et toutes les réactions qui viennent d'être rappelées se passent dans ces vastes chambres de plomb où le mouvement causé par l'arrivée et la condensation incessante du gaz fait changer en tout point la composition du milieu. Et, même en admettant les deux théories, on ne fait pas encore toutes les hypothèses possibles sur ce qui peut se passer. On est certainement incomplet, car on ne s'explique


pas pourquoi, dans ce milieu artificiel créé en vue d'une oxydation complète de l'acide sulfureux, il se fait des produits de réduction totale de l'acide azotique comme l'ammoniaque, et des dérivés à peine moins réduits comme l'hydroxylamine. On a constaté bien nettement la présence de ces matières dans l'acide sulfurique d'industrie, sans l'appliquer jusqu'à présent.

On sait depuis longtemps d'ailleurs que l'acide sulfureux et l'acide azoteux — dont l'existence dans les chambres est établie — réagissent pour donner des corps fort complexes, découverts par M. Frémy en 1845 : les *dérivés sulfazotés*.


II

Qu'il nous soit permis de faire une digression sur cet intéressant sujet encore peu connu et d'écrire les formules de façon à le rendre un peu moins obscur. En chimie on peut, sous certaines conditions, disposer de l'ordre des facteurs.

Si l'on développe la formule AzO^2H de l'acide azoteux, en l'hydratant en même temps, on aura l'acide azoteux hydraté $Az(OH)^3$ à symétrie ternaire comme l'ammoniaque $Az(H)^3$:




Entre un tel acide et l'ammoniaque existent d'ailleurs des intermédiaires, dont l'un est bien connu : l'hydroxylamine ou oxyammoniaque :




On sait que l'ammoniaque et l'hydroxylamine peuvent fixer de l'acide sulfureux par simple addition pour former des sels. Cela n'est pas surprenant puisque l'ammoniaque est une base et l'hydroxylamine une base encore, à peine atténuée par la seule fonction d'acide (OH) qu'elle porte. Mais l'acide sulfureux peut encore agir sur les corps tels que l'acide azoteux ; la combinaison, qui


se fait cette fois avec séparation d'eau, engendre des acides mixtes azoto-sulfureux :



On conçoit que cette séparation d'eau se puisse faire non seulement sur le premier (OH) de l'acide azoteux, mais sur les deux autres et aussi sur ceux de la dihydroxylamine et de l'hydroxylamine. On aura ainsi des acides tels que :




Plusieurs de ces acides étant polybasiques, c'est-à-dire à plusieurs fonctions OH salifiables, leurs sels sont le plus souvent fort complexes. Ils sont loin d'ailleurs d'être tous connus, car il s'agit ici de la question obscure encore des *sels sulfazotés*, mais on peut s'expliquer leurs transformations progressives aboutissant aux sels d'hydroxylamine et d'ammoniaque qu'on trouve dans les chambres de plomb comme les derniers témoins de leur action transitoire. En effet, l'eau peut dédoubler les corps sulfazotés de telle sorte qu'une partie de son hydrogène venant remplacer les groupes sulfureux, l'acide azoteux primitif se réduise jusqu'à l'état d'ammoniaque :




Nous pouvons, après cet exposé nécessaire, revenir à l'acide sulfurique et dire comment M. Raschig (1) a pu expliquer sa production en se servant de formules nouvelles. Selon cet auteur, l'anhydride sulfureux, l'eau et l'acide azotique

(1) *Deutschen chemischen Gesellschaft*, XX, p. 1158.


donnent d'emblée des acides azoteux et sulfurique :



Cet acide azoteux qui vient d'apparaître et une portion nouvelle d'anhydride sulfureux qui a eu le temps de s'hydrater, réagissent alors selon l'équation (8) ci-dessus et l'acide dihydroxylamine-sulfonique formé est détruit aussitôt par une molécule d'acide azoteux :



et AzO rentre dans la circulation par les équations (4)(5)(7). En dernière analyse, en faisant la somme des équations (8) et (10) on trouve, avec l'interprétation de M. Raschig, ce qui suit :



c'est-à-dire que les acides azoteux et sulfureux hydratés donnent naissance à de l'acide sulfurique trihydraté $\text{SO}^2\text{H}^2, 3\text{H}^2\text{O}$. Or cet acide a une densité de 1.55; c'est précisément l'acide peu concentré que produisent les chambres de plomb, quand elles fonctionnent bien.

En admettant que la nouvelle théorie que nous venons d'exposer n'explique pas à elle seule la formation de l'acide sulfurique, il ne faut pas moins en tenir compte, car elle explique aisément la formation de dérivés ammoniacaux et se trouve d'accord avec ce fait important que les chambres de plomb sont assujetties à produire de l'acide trihydraté à 1.55 de densité.

A. Étard.

Répétiteur à l'École Polytechnique.

LES DEUX NOUVELLES CARTES GÉOLOGiques DE LA FRANCE

« Près de cinquante ans se sont écoulés depuis la publication de la carte géologique de France dressée à l'échelle du 1 : 500,000 par Dufrénoy et Élie de Beaumont; aussi, quel qu'ait été le mérite de cette œuvre magistrale au moment de son apparition, elle n'est plus guère aujourd'hui qu'un document historique, rappelant quel était l'état de nos connaissances géologiques il y a un demi-siècle. » MM. L. Carez et G. Vasseur, auxquels nous empruntons cette citation, — pénétrés de l'importance et de la multiplicité des progrès réalisés par la géologie française depuis 1840, se sont imposé la lourde tâche de coordonner graphiquement l'ensemble des résultats obtenus dans l'interval. M. le commandant Prudent venait de terminer pour le Dépôt des Fortifications sa belle carte chorographique au 1 : 500,000, fournissant une base excellente pour reporter les contours géologiques. Commencée dès 1882, l'œuvre de MM. Carez et Vasseur (1) se compose de quarante-huit feuilles, dont la publication, aujourd'hui terminée, a marché sans interruption de 1885 à 1889. Ce travail, qui constitue un véritable monument

scientifique, est dû entièrement à l'initiative privée : ce qu'il a fallu de persévérance et d'énergie pour le mener à bonne fin aussi rapidement, malgré des difficultés techniques et matérielles de toutes sortes, c'est ce dont peu de personnes se rendront un compte exact.

I

A peine l'impression de la carte de MM. Carez et Vasseur était-elle commencée, que le Service géologique officiel, sentant lui aussi la nécessité de remplacer l'œuvre de Dufrénoy et Élie de Beaumont, se décidait à entreprendre une compilation nouvelle. Chargé par le ministère des Travaux publics, vers la fin de 1883, de coopérer à la publication de la carte géologique internationale de l'Europe au 1 : 1,500,000, décidée par le Congrès réuni à Bologne en 1881, le Service avait sur MM. Carez et Vasseur l'avantage de pouvoir disposer d'un personnel nombreux d'ingénieurs et de géologues, qui se mirent aussitôt à exécuter une révision générale de la géologie des différentes régions françaises; ce comité de collaborateurs comprenait : MM. Barrois pour la Bretagne, Berge-

(1) Paris, Comptoir géologique du Dr Dagincourt, rue de Tournon. Prix : 200 fr.

ron pour la Montagne-Noire et le Rouergue, Bertrand pour le Jura et la Provence, Dépéret pour le Roussillon, Fabre pour les Cévennes, Fontannes pour le bassin tertiaire du Rhône, Fouqué et Michel-Lévy pour le Massif Central, Gosselet pour l'Ardenne, Jacquot (alors directeur du Service) pour les Pyrénées et le bassin tertiaire du Sud-Ouest, Lecornu pour le Cotentin, Lory pour les Alpes, Potier pour les Alpes-Maritimes et Vélain pour les Vosges. Les explorations une fois terminées, on jugea faire œuvre utile d'anticiper sur la publication de la carte d'Europe, en adoptant l'échelle si commode du millionième; la carte, divisée en quatre feuilles dont la planimétrie a été dressée par M. Thuillier, a paru à la fin de 1888; la modicité du prix fixé par les éditeurs est, on peut le dire, sans précédent dans les annales de l'impression chromolithographique (1). Outre les levés spéciaux des collaborateurs, on a utilisé pour la rédaction définitive de la carte des travaux inédits de MM. Boisselier, Bureau, Collot, Delafond, Genreau, de Grosouvre, Hollande, Kilian, de Launay, Le Verrier, Linder, Mouret, Nentien, Oehlert et Zürcher; une partie de ces documents a d'ailleurs été également communiquée par les auteurs à MM. Carez et Vasseur, qui ont pu ainsi en faire profiter leur méritoire travail, au grand bénéfice de la géologie française.

II

En comparant les deux cartes l'une avec l'autre, on peut se placer soit au point de vue matériel, soit au point de vue scientifique. Sous le rapport de l'exécution technique, l'œuvre de MM. Carez et Vasseur et la carte au millionième constituent certainement, chacune dans son genre, des spécimens remarquables de la chromolithographie contemporaine appliquée à la cartographie géologique; le problème d'une gamme de couleurs en teintes plates, comprenant quarante ou cinquante termes, restera probablement toujours insoluble: on doit reconnaître que, dans les deux cartes, le résultat obtenu à cet égard est aussi satisfaisant que possible.

Pour la série stratifiée, la gamme est la même à partir du Carbonifère inclusivement; c'est celle qu'a adoptée le Congrès de Bologne: les couleurs se suivent dans l'ordre du spectre, du jaune (Tertiaire) au violet (Trias), chacune des couleurs étant subdivisée, sur la carte de MM. Carez et Vasseur, en nuances d'autant plus foncées que les étages correspondants sont plus anciens. Aucune décision n'ayant été prise à Bologne pour les couleurs à affecter aux divisions du groupe primaire, les au-

teurs de la carte au 1 : 500,000 ont choisi des tons arbitraires; dans la carte au millionième, rédigée seulement après la session du Congrès géologique tenu à Berlin en 1885, on a pu suivre la gamme adoptée provisoirement par la commission de la carte d'Europe; il en résulte pour le groupe primaire quelques différences entre les deux cartes: le Cambrien, le Silurien et le Dévonien figurent respectivement sous des tons rose-brique, rose et brun-rouge sur le 500,000^e, et en brun-foncé, vert olive et brun-jaunâtre sur le millionième. Les Schistes Cristallins sont en rose carmin de part et d'autre. Mais, quoique plus petite, la carte officielle y admet trois divisions au lieu de la teinte unique adoptée par MM. Carez et Vasseur.

La différence d'échelle se traduit naturellement par un moins grand nombre de divisions dans la série stratifiée (vingt-quatre contre quarante-cinq). Pour les roches éruptives, le contraste est en sens inverse; comme on pouvait s'y attendre en voyant figurer le nom de M. Michel-Lévy, leur représentation a été sur la carte au millionième l'objet de soins tout particuliers: elles sont réparties en dix-sept groupes, pour lesquels des rouges, des bruns, des jaunes, des verts, des bleus, des violets et des gris ont été mis à contribution: c'est la gamme presque entière, mais beaucoup plus vive que pour la série stratifiée. MM. Carez et Vasseur, fidèles à la tradition presque constante des cartographes, se sont contentés d'une couleur unique, le vermillon, dont cinq nuances, malheureusement difficiles à distinguer, représentent les roches granitiques et les roches acides et basiques anciennes ou récentes.

En général, l'aspect de la carte au millionième est plus éclatant, plus cru; la carte au cinq cent-millième, beaucoup plus chargée d'écritures, présente des tons moins heurtés, moins durs pour l'œil. Les principaux contrastes proviennent du mode de coloriage différent des roches volcaniques de l'Auvergne, que font bien ressortir les bleus foncés des basaltes sur la carte officielle, mais dont le rouge de MM. Carez et Vasseur ne tranche pas assez sur le fond rose (cristallin) du Massif Central; les traînées granitiques de la Bretagne sont également mises en évidence avec plus de netteté sur la carte du Service, grâce au ton brun foncé de leur ceinture cambrienne. Dans la gamme adoptée par les deux géologues parisiens, la partie la moins différenciée et en même temps la moins agréable correspond au groupe primaire et à l'ensemble de la série éruptive; aussi les régions où ces formations prédominent sont-elles rendues avec moins de bonheur, et surtout moins de clarté, que dans la petite carte du Ministère des travaux publics (Bretagne, Massif Central, Ardennes et Provinces Rhénanes).

(1) Paris, Baudry et C^{ie}, rue des Saints-Pères. Prix: 9 fr. 50.

Un avantage incontestable de la carte de MM. Carez et Vasseur réside dans la présence d'un dessin topographique très soigné : la carte au millionième ne porte que le tracé de la planimétrie. Une carte géologique sans orographie est un peu comme un corps sans âme ; la plupart des traits de la structure du sol ne deviennent intelligibles qu'avec la connaissance de son relief extérieur. L'exiguïté de l'échelle n'impose pas forcément cette lacune : les ressources de la cartographie contemporaine sont en effet assez nombreuses pour qu'il soit possible de reproduire avec exactitude les principaux accidents topographiques d'une contrée, même quand la réduction est plus grande encore, — nous n'en voulons pour preuves que les admirables cartes des États européens, à l'échelle 1 : 4,500,000, données par Vogel dans le célèbre *Atlas de Stieler*, ou encore, dans un genre différent, la carte de France, moins savamment généralisée, mais plus détaillée, dessinée par le colonel Prudent à l'échelle du millionième pour le grand Atlas de la maison Hachette.

En outre, la carte au millionième étant publiée par le Service chargé du levé de la carte géologique détaillée de la France, ne conviendrait-il pas de transformer la première en tableau d'assemblage de la seconde, et d'y indiquer, au moyen de traits rouges ou bleus, les limites respectives des feuilles du quatre-vingt millième ? Cette addition serait fort utile pour tous ceux qui, en maniant la volumineuse collection de la carte détaillée, ont besoin de s'orienter rapidement. On objectera peut-être qu'un semblable réseau quadrillé ne serait pas d'un heureux effet artistique ; mais, dans une œuvre de cette nature, ne faut-il pas être pratique avant tout ? L'ancienne carte de Dufrénoy et Elie de Beaumont portait d'ailleurs le tracé du réseau pentagonal sans que ce fût particulièrement désagréable à l'œil.

III

Si de la forme nous passons au fond, il importe d'examiner en premier lieu jusqu'à quel point les deux cartes sont d'accord dans l'interprétation de la géologie de la France et des contrées limitrophes. Une comparaison scrupuleuse permet de constater que sauf pour les Pyrénées l'accord entre les deux documents est à peu près complet ; il y a, il est vrai, de nombreuses différences de détails, soit dans le dessin des contours, soit dans l'attribution des terrains locaux à telle ou telle division de la série stratigraphique générale ; mais là est précisément l'intérêt de cette double publication simultanée : indiquer aux géologues quelles sont les questions d'intérêt régional dont la solution définitive est encore à trouver. A cet égard, nous citerons les

dépôts d'argile à silex, si développés à la surface des plateaux crayeux du pourtour du bassin parisien : on sait que Dufrénoy et Elie de Beaumont, assimilant à tort cette formation aux argiles à meulrières aquitaniennes des environs de Paris, ont étendu sur leur carte la teinte violette du Miocène à d'immenses surfaces que les eaux tertiaires moyennes n'ont jamais recouvertes. La distinction des deux terrains et la nature purement continentale de l'argile à silex (produit d'altération sur place de la craie sous-jacente) ont été reconnues depuis. Sur la carte détaillée au quatre-vingt millième, la teinte rose et l'indice *m* ont été cependant conservés ; MM. Carez et Vasseur ont complètement supprimé l'argile à silex de leur carte, en la remplaçant par le *limon des plateaux* (pl.), qui se trouve ainsi acquérir un développement exagéré ; quant au Service, il a adopté d'autres solutions dans la carte au millionième : sur la rive droite de la Seine (Thelle, Caux, Picardie), le dépôt en question figure sous la teinte du Quaternaire ; sur la rive gauche, au contraire (Eure, Perche, etc.), de même qu'au nord (Laon, Maubéuge, Cambrai) et au sud-est (Gâtinais, forêt d'Othe) du bassin, la teinte de l'Eocène recouvre uniformément les plateaux. Nous serions fort embarrassé d'indiquer les motifs de cette divergence, surtout en ce qui concerne le rôle de limite assigné à la vallée de la Seine sous ce rapport. L'attribution traditionnelle des *limons des plateaux* au Pliocène ne laisse pas elle-même d'être très douteuse, s'il est vrai que ces limons résultent d'un simple remaniement par les eaux pluviales de terrains antérieurs d'âge quelconque, comme l'admettent plusieurs géologues, à la suite de M. de Lapparent.

Dans la partie moyenne du bassin de la Loire, de nombreux lambeaux figurés comme oligocènes par MM. Carez et Vasseur (Berry, Touraine, Poitou), sont indiqués comme éocènes sur la carte du Service : question de synchronisme et de classification. Ces lambeaux appartenant très probablement à l'horizon du calcaire de Brie, la première solution paraît préférable. La région des roches anciennes du Lyonnais, du Beaujolais et du Forez est interprétée d'une manière tout à fait différente, à l'avantage du millionième, qui a bénéficié des belles études de M. Michel-Lévy, dont MM. Carez et Vasseur n'ont pu avoir communication en temps utile ; c'est la partie la plus originale et la plus nouvelle de la carte officielle. Il en est de même pour le massif du Chablais, dans la Haute-Savoie, avec cette différence que l'étude est loin d'en être terminée d'une manière définitive. On remarque des différences analogues dans la partie moyenne du bassin de la Durance, et dans les Basses-Alpes ; autour du Mont Viso, dans les Alpes Cottienues, le

Service figure en Trias ce que MM. Carez et Vasseur, d'accord avec les géologues italiens, considèrent comme pré-carbonifère : c'est la question, si débattue, des *schistes lustrés* de Lory.

Le bassin tertiaire compris entre Digne, la Durance et le Verdon est Pliocène supérieur, au cinq-cent-millième; le millionième, profitant des dernières découvertes de Fontannes, l'attribue avec raison au Miocène.

Evidemment, la distinction du Quaternaire et du Pliocène n'a pas encore été faite avec tout le soin désirable dans plusieurs parties de la France, la teinte de l'un étant souvent remplacée par celle de l'autre (Haute-Saône, Bresse, Crau, Némosais, etc.).

IV

L'un des points faibles que devront faire disparaître les recherches des années prochaines réside dans le tracé des limites d'étages sur le bord oriental et septentrional du bassin tertiaire du Sud-Ouest : telle région, suivant les cartes, et sans raison décisive apparente, passe de l'Eocène à l'Oligocène ou même au Miocène.

En Corse, — le plus négligé des départements français jusqu'à présent, — les terrains paléozoïques sont remplacés au millionième par des schistes cristallins.

Les alluvions anciennes des plateaux sous-pyrénéens ont, moins que le reste, attiré l'attention de M. Carez : le sommet des cônes quaternaires si caractéristiques de la Gascogne a été supprimé et remplacé par la teinte du Miocène supérieur. C'est, en quelque sorte, un recul sur la carte de 1840; sans même visiter les lieux, la lecture du beau chapitre consacré au plateau de Lannemezan par Surell dans la suite à ses *Etudes sur les torrents des Hautes-Alpes* (1872) suffit pour montrer le développement énorme et exclusif des dépôts d'origine fluviale entre la Garonne et le Gave de Pau. La carte au millionième est correcte sous ce rapport. Il n'en est malheureusement pas de même pour le prolongement de ces dépôts dans le sud du Béarn, chez M. Jacquot comme chez M. Carez : pourquoi supprimer de la carte, dans cette région, une formation si puissante, dont les contours étaient déjà indiqués en 1854 sur l'*esquisse* jointe à la thèse de J. Delbos, sans remonter jusqu'à Dufrenoy et à Palassou?

Pour les Pyrénées, les divergences sont si nombreuses et si profondes, qu'un article entier ne suffirait pas à en donner l'énumération; quelques-unes sont d'ailleurs systématiques : ainsi le Trias de M. Carez est presque partout figuré en Permien par M. Jacquot, qui considère en outre le cortège d'argiles gypseuses et salifères des Ophites comme

exclusivement triasique. Le désaccord, pour certaines localités, atteint des proportions presque incroyables : le massif de Montgaillard, par exemple, entre Bagnères-de-Bigorre et Tarbes, serait Granitique et Cambrien, si l'on s'en rapporte à la carte au 500,000^e, Quaternaire et Crétacé d'après le millionième ! Cela prouve combien il reste à faire, dans les Hautes-Pyrénées notamment, où les documents préliminaires font complètement défaut, et où M. Carez n'a eu à sa disposition que la carte, fort grossière, même au point de vue des tracés géographiques, de Magnan. Dans l'Aude, dans le Pays Basque, les différences sont à peine moins sensibles. Nous l'avouons sans difficulté, le travail de M. Carez nous a paru plus soigné que la partie correspondante de la carte au millionième, qui malheureusement présente comme certaines des vues encore hypothétiques : la délimitation des subdivisions du groupe paléozoïque, à en juger du moins par les faits publiés, ne paraît guère admissible, et la continuité des bandes cambriennes, siluriennes et dévoniennes, régulièrement alignées d'un bout de la chaîne à l'autre, ne repose sur aucune coupe sérieuse : il faudrait d'abord que l'on fût définitivement édifié sur l'âge de ces calcaires, représentés, suivant les cartes et les localités, comme Cambriens, Dévoniens, Carbonifères, Jurassiques ou même Crétacés ! Bref, la *géologie des hauts chaînons pyrénéens* — la comparaison des deux cartes le démontre, — est à reprendre entièrement : c'est le *desideratum* le plus sensible de la *géologie française*. Nous ne dirons rien du versant espagnol, où les tracés de la carte au millionième, pour la moitié orientale tout au moins, sont absolument fantaisistes.

V

Quant aux régions situées en dehors de la frontière, le Sud de l'Angleterre est figuré d'une manière identique. La carte au millionième a supprimé le manteau quaternaire qui imprime à la basse Belgique sa physionomie caractéristique; même élimination a été opérée pour le plateau suisse. Le Miocène belge est également supprimé et rattaché, sans que la raison en soit donnée, à l'Oligocène. Dans tout le Nord-Est, il est regrettable que l'on ait jugé suffisant de s'en tenir à des documents généraux anciens ou de seconde main. Citons parmi les cartes détaillées que l'on a négligé de consulter pour la rédaction du millionième : la carte du bassin de Mayence de Lepsius (1884); la carte du Sud du Luxembourg, de van Verweke (1886) et celle de la Lorraine occidentale, publiée par la commission géologique de Strasbourg (1886); les cartes d'une partie du Hunsrück, des environs de Trèves et de Waxweiler insé-

rées par Grebe dans les volumes de 1880, 1881 et 1883 du *Jahrbuch* de l'Institut géologique de Berlin, etc. Ces documents ont au contraire été mis à profit, ceux du moins dont la publication a eu lieu assez tôt, dans la carte de MM. Carez et Vasseur.

Il sera facile de modifier dans un tirage ultérieur de la carte officielle l'attribution au Permien, sous le n° 33, des diabases et autres roches basiques interstratifiées dans le Devonien et le Carbonifère inférieur de la Hesse et du Nassau (Bassin de la Lahn).

L'espace nous manque pour signaler les enseignements qui ressortent de l'examen des deux cartes, au point de vue de la structure et de l'histoire du sol : il faudrait un volume entier pour décrire les faits intéressants que révèle leur étude attentive : tous les éléments sont là réunis pour l'analyse du tracé des cours d'eau et de l'évolution du relief à travers les âges. Espérons que cette tâche relativement facile tentera bientôt quelque jeune géographe : nous ferons bien de nous dépêcher, si nous ne voulons pas que la science fran-

çaise soit devancée sur ce point, comme elle l'a déjà été si souvent, par la science étrangère.

On a vu ce dont était capable l'initiative privée par l'exemple de l'œuvre considérable de MM. Carez et Vasseur. Ce n'est pas la première fois que semblable morale se dégage de la comparaison avec les efforts plus puissants, mais souvent moins bien coordonnés, de l'Etat. Mais, s'il est permis d'adresser à ce point de vue quelques critiques aux services publics, il serait, du moins, injuste de méconnaître les talents qu'ils mettent en œuvre. C'est un devoir pour nous, en terminant cet article, de rendre hommage à la science dont les divers collaborateurs de la carte au millionième ont fait preuve dans l'étude des régions que chacun d'eux avait à examiner; nous sommes certain d'ailleurs que le Service géologique, sous la direction éclairée de M. Michel-Lévy, saura perfectionner son œuvre et nous en donner bientôt une seconde édition qui, cette fois, sera parfaite.

Emmanuel de Margerie.

REVUE ANNUELLE D'HYGIÈNE

L'hygiène marche, à notre époque, d'un pas tellement rapide que chaque année réalise un progrès dans chacun des éléments qui la constituent et qu'il devient important d'en dresser l'inventaire lorsque cette année finit. Celle qui vient de s'écouler offre encore une plus riche moisson que les précédentes. Deux grands faits ont signalé son passage : l'Exposition universelle et le Congrès d'hygiène. L'Exposition universelle restera le grand événement social de la fin du XIX^e siècle. Dans toutes les branches de l'activité humaine, elle marquera une date à laquelle il faudra toujours remonter.

En hygiène, il en sera de même. Les millions de visiteurs que l'Exposition internationale a attirés de tous les points du globe, ont tous parcouru les galeries du palais de l'Hygiène et ses dépendances; ils ont traversé les pavillons élevés au Champ-de-Mars par la ville de Paris; ils y ont pris connaissance d'une multitude de faits qu'ils ne soupçonnaient pas et ont emporté dans leurs foyers des notions précises qu'ils y feront fructifier un jour. L'Exposition, en un mot, a donné, pendant six mois, une immense leçon de choses à d'innombrables populations et tiendra, pour ce motif, une place considérable dans l'histoire de l'hygiène; mais, en raison même de son importance, elle a été l'objet de comptes rendus sans nombre.

Tout a donc été écrit sur ce sujet et il faut éviter de tomber dans les redites.

Pour le moment, il s'agit uniquement d'exposer, d'une manière sommaire, la part de faits et d'idées nouvelles qui revient à l'année 1889 en particulier.

I

Elle a commencé par un événement d'une importance considérable. Un décret du Président de la République, en date du 5 janvier 1889, a transféré au ministère de l'intérieur les services de l'hygiène publique qui avaient dépendu jusqu'alors du ministère du commerce et de l'industrie, en les rattachant à la direction de l'Assistance publique.

C'est la réalisation des tendances qui dirigent l'hygiène depuis bien des années et du vœu formulé à trois reprises par l'Académie de médecine, deux fois par la Société de médecine publique et reproduit par tous les Congrès scientifiques.

Deux projets avaient été soumis à la Chambre des députés : le premier en 1886 par MM. Siegfried et Chamberland au nom de cinquante de leurs collègues, le second en 1887 par le Ministre du commerce. Le premier a été adopté par la commission nommée à cet effet; mais tous deux sont tombés en désuétude par suite de la cessation des pou-

voirs de la Chambre devant laquelle ils étaient pendants. L'hygiène peut attendre maintenant. Le décret du 5 janvier a donné satisfaction à ses désirs et ses destinées sont entre les mains de l'homme qu'elle aurait choisi pour la représenter si cette nomination s'était faite à l'élection. L'hygiène administrative est fondée.

L'hygiène internationale a également fait un pas. L'Angleterre qui s'était montrée intraitable sur la question des quarantaines, à la Conférence de Rome, est revenue à de meilleurs sentiments. Par une ordonnance en date du 22 janvier 1889, elle a institué, à l'entrée de la mer Rouge (à Aden et à Périm), un système de protection que nous ne pouvons qu'approuver puisqu'il dépasse les exigences auxquelles nous avions réduit nos prétentions à la Conférence de Rome.

Pendant que l'Angleterre renonçait ainsi à l'application de ces doctrines, elles trouvaient en France un défenseur dans la personne de M. le D^r Vignard, ancien directeur du service sanitaire des bouches du Danube. Son mémoire très important (1) a soulevé au sein de la Société de médecine publique un débat qui s'est prolongé pendant les trois premiers mois de l'année 1889 et qui a permis à M. Proust d'exposer de nouveau les principes qui dirigent aujourd'hui notre administration sanitaire. Il a montré combien les mesures de prophylaxie se sont perfectionnées, par la substitution des pratiques de la désinfection à celles de l'isolement, toutes les fois que la chose est possible et par l'atténuation progressive des rigueurs de la quarantaine, réduites aujourd'hui au minimum compatible avec la sécurité du territoire.

Un jour viendra sans doute où il sera permis d'aller plus loin, peut-être même de fermer nos lazarets; mais il faut, avant d'y songer, que l'hygiène urbaine ait fait des progrès considérables dans la pratique. Il faut qu'on assainisse ces grandes villes qui s'appellent Naples, Marseille, Toulon, Barcelone et dans lesquelles le choléra trouve des foyers d'infection tout préparés, quand il débarque sur le versant septentrional de la Méditerranée. C'est là qu'il faut arriver.

II

La propagation des maladies contagieuses et l'assainissement des villes sont les deux questions que l'hygiène contemporaine a mises à son ordre du jour. Elles ont toutes deux pour base la bactériologie. Cette science si jeune encore, et qui a déjà produit de si magnifiques résultats, est devenue le

fondement de tout notre édifice. Dans tous les laboratoires on se livre à l'étude des microbes avec une ardeur qui va croissant. Leur histoire s'est enrichie cette année de quelques travaux importants.

L'une des questions les plus intéressantes qui aient été soumises à l'examen du Congrès d'hygiène de 1889 par son comité d'organisation, avait pour titre : Action du sol sur les microbes pathogènes. Les fonctions de rapporteur sont tout naturellement échues au professeur Grancher et au D^r Richard. Ils ne se sont pas bornés à établir le bilan de la science sur cette question, mais ils se sont efforcés de l'élucider, à l'aide d'observations et d'expériences multipliées.

On sait, de par Hippocrate, que les maladies infectieuses ont leur source dans l'air, les eaux et le sol. Nous savons, depuis M. Pasteur, que les agents de ces maladies sont des êtres organisés et vivants; mais nous ignorons encore les conditions dans lesquelles ils naissent et se multiplient dans ces différents milieux, ou du moins nos connaissances à ce sujet sont encore bien superficielles, surtout en ce qui concerne le sol qui a été moins bien étudié que l'air et les eaux. Les recherches de MM. Grancher et Richard, confirmant et complétant celles de M. Frankel, ont mis en lumière les faits suivants (1) :

Les germes pathogènes existent dans le sol où leur présence peut être expérimentalement démontrée. Ils sont surtout cantonnés dans les couches les plus superficielles. A la faible profondeur de cinquante centimètres on n'en trouve presque plus. Ils se multiplient difficilement dans la terre; mais ils peuvent s'y conserver longtemps à l'état de spores. Ceux qui sont enfouis à quelques centimètres sont détruits par la concurrence des *saprophytes* et ceux de la surface par l'action de la lumière solaire, qui est un puissant agent d'assainissement. La culture intensive qui ramène successivement à la surface les germes de la profondeur est le meilleur moyen de détruire les microbes pathogènes contenus dans le sol. Les bouleversements de terrain les mettent au contraire en circulation et favorisent leur action nuisible. Une couche de terre de deux à trois mètres d'épaisseur suffit pour les empêcher de pénétrer dans la nappe souterraine. — Ces conclusions ont, au point de vue pratique, une importance qu'il est inutile de faire ressortir.

La bactériologie des eaux potables a été l'objet de travaux beaucoup plus nombreux et cela se comprend sans peine. On les considère aujourd'hui comme le véhicule habituel des germes de la

(1) D^r V. Vignard. Etude pratique sur l'état actuel de la prophylaxie sanitaire internationale. (*Revue d'hygiène et de police sanitaire*, n° du 20 décembre 1888, p. 1638.)

(1) Congrès d'hygiène et de démographie. Section III. Bactériologie appliquée à l'hygiène, épidéologie. — Action du sol sur les germes pathogènes. Rapporteurs : MM. Grancher et Richard. *Revue d'hygiène*, t. XI, p. 710.)

plupart des maladies infectieuses et notamment du choléra et de la fièvre typhoïde. Chaque jour apporte de nouvelles preuves à l'appui de cette opinion; ainsi, l'analyse bactériologique des eaux qui servent à l'alimentation a plus d'importance aujourd'hui que l'analyse chimique dont on se contentait autrefois.

Des expériences concordantes ont prouvé que l'eau de source, à son émergence, est complètement exempte de germes, ainsi que celle de la nappe souterraine lorsqu'elle n'a pas été souillée. Par contre, les eaux des meilleures rivières en renferment toujours quelque peu. La Vanne, dont l'eau est pourtant excellente, en contient 122 par centimètre cube, tandis que l'eau d'égout qui sort des drains de Gennevilliers, après avoir été filtrée par le sol, n'en renferme pas plus d'une douzaine. Les eaux de puits en sont toujours fortement chargées. Frankel a prouvé, dans un récent travail (1), que ces bactéries provenaient des parois et du fond des puits, ainsi que des tuyaux des pompes.

La promptitude avec laquelle les bactéries se multiplient dans les eaux est prodigieuse. On peut en juger par celles des égouts qui en renferment plusieurs millions par mètre cube. L'immense majorité est inoffensive; cependant la bonne qualité de l'eau est en sens inverse de leur nombre. Flagge et Proskasser ont même proposé de fixer la limite des eaux potables entre 50 et 150 germes par centimètre cube. Ce serait peut-être aller un peu loin et s'exposer à de grands mécomptes, dans la pratique. Une eau très pure en bactéries banales et qui aurait accidentellement reçu quelques bacilles provenant de déjections cholériques ou typhiques serait assurément beaucoup plus dangereuse à boire qu'une eau contenant des millions de germes au nombre desquels ces derniers ne se trouveraient pas. Il serait extrêmement important de pouvoir reconnaître les microbes pathogènes des autres. Le D^r Justin Karlinski se flatte d'avoir trouvé un caractère distinctif dont l'importance serait capitale et les conséquences bien rassurantes. Dans une série d'expériences qu'il serait trop long de rapporter ici, mais dont il a publié les résultats dans les *Archives d'hygiène* de cette année (2), il a reconnu que les bacilles pathogènes ne se multiplient pas et succombent, en quelques jours, dans les eaux de source naturelles à la température de 8 degrés, tandis que les bactéries aquatiques s'y développent à merveille et avec plus

d'activité en présence des bacilles pathogènes, comme si les cadavres de ceux-ci leur servaient de nourriture. Ses expériences ont porté sur le bacille typhique, sur celui du choléra et sur la bactérie.

Lorsque l'eau est sale, c'est-à-dire nourricière, c'est encore aux bactéries banales que cette nourriture profite, et non aux bacilles pathogènes. Karlinski a ensemencé de l'eau d'égout avec des bacilles typhiques à raison de 39,000 de ceux-ci par centimètre cube. Le lendemain, il n'en restait pas de traces. M. le D^r Poincaré a fait paraître dans la *Revue d'hygiène* un travail des plus intéressants sur le même sujet; mais malheureusement il échappe à l'analyse (1).

III

Ces travaux scientifiques prouvent à quel point la question des eaux d'égout et de l'épandage préoccupe les hygiénistes. Ils tendent à faire prévaloir d'une manière définitive la doctrine soutenue avec tant d'ardeur, de persévérance et de talent par M. Durand-Claye. De toutes parts on se livre aux irrigations avec les eaux d'égout et partout on en reconnaît les avantages. En France, l'hygiène vient d'avoir gain de cause dans le procès qu'elle soutient depuis si longtemps contre les préjugés, la routine et les intérêts particuliers. Les deux Chambres ont enfin consenti à donner au Gouvernement l'autorisation de déverser, sur les terrains d'Achères, une partie des eaux d'égout de Paris, à raison de 40,000 mètres cubes par an et par hectare. Cette loi porte la date du 4 avril 1889. Elle met fin à une campagne qui a duré quatorze ans; mais Durand-Claye, qui en a supporté le poids, n'est plus là pour jouir de sa victoire. Espérons qu'il sera donné satisfaction au vœu émis par le Congrès d'hygiène le jour de sa visite à Gennevilliers, et qu'un monument commémoratif, élevé au milieu de ces terrains fertilisés par l'épandage, rappellera aux visiteurs l'homme auquel la population de Paris est redevable de ce bienfait.

La loi du 4 avril 1889 ne résout pas complètement la question, puisque les terrains d'Achères, joints à ceux de Gennevilliers, ne donnent pas plus de 1800 hectares qui, à raison de 40,000 mètres cubes par an, ne pourront pas recevoir plus de 72 millions de mètres cubes. Sur les 126 millions qui tombent annuellement dans la Seine, il en restera donc encore 54 millions, qui échapperont à l'épuration, et pour lesquels il faudra trouver de

(1) Recherches sur la désinfection des sources et la teneur en germes de la nappe souterraine. (*Zeitschrift für Hygiene*, 1889, p. 23.)

(2) Justin Karlinski. Ueber das Verhalten einiger pathogener Bacterien im Trinkwasser. (*Archiv. für Hygiene*, IX, p. 413, 1889.)

(1) Poincaré. Etude sur les circonstances qui font varier la richesse des égouts en microbes et leur action nocive. (*Revue d'hygiène*, 20 octobre 1889, p. 894.)

nouveaux terrains; mais cette difficulté est déjà levée. M. Ad. Carnot, ingénieur en chef des mines, a présenté à la Commission d'assainissement de Paris un mémoire dans lequel il a indiqué tous les terrains situés dans le voisinage de la ville et propres à l'irrigation. Ils représentent, sur la carte qu'il a produite à l'appui de son travail, une superficie de 10,000 hectares qu'on peut irriguer à l'aide de conduits n'excédant pas 50 kilomètres. On voit que Paris peut augmenter la quantité d'eau qu'il délivre à ses habitants et laisser s'accroître sa population sans crainte. Il y a dans la vallée de la Seine trois fois plus de terrains à fertiliser qu'il ne lui en faut pour suffire aux besoins de son épandage. La loi du 4 avril 1889 a posé le principe; l'application viendra d'elle-même à mesure des besoins.

IV

On ne s'étonnera pas de l'étendue que j'ai donnée à cette question, dans une revue qui doit être nécessairement succincte; c'est le grand événement hygiénique de l'année, pour Paris du moins. Si, malgré toutes ces conditions de salubrité, cette ville a encore une mortalité aussi élevée, cela tient, dans l'opinion de tous les hygiénistes, à l'imperfection de son système de vidanges et à la pollution des eaux de la Seine qu'elle est encore forcée de boire de temps en temps. Toutes les fois que cette nécessité s'impose, le chiffre des décès par fièvre typhoïde s'élève dans les arrondissements où se fait la distribution de cette eau contaminée. Nous en avons eu tout récemment la preuve. Un accident survenu dans les conduites de la Vanne a forcé de donner de l'eau de Seine à toute la ville, depuis le 31 octobre à six heures du soir jusqu'au 5 novembre. Au bout du temps nécessaire pour l'incubation et pour l'évolution de la maladie, le nombre des décès par fièvre typhoïde a commencé à s'accroître. Il est allé grandissant jusqu'au milieu de décembre, puis il a commencé à diminuer, à mesure que les effets de l'intoxication par l'eau de Seine allaient s'affaiblissant; et enfin il est rentré dans ses proportions normales. Parti du commencement de novembre, de 11 décès par semaine, il s'est élevé à 51 du 7 au 14 décembre et est retombé à 12, vers le milieu de janvier.

Le chiffre des malades a suivi la même marche. Le nombre des entrées aux hôpitaux a été de 164 dans la journée du 30 décembre. A cette date on en comptait 443 en traitement. Une progression aussi régulière est absolument démonstrative. Elle a la valeur d'une expérience de laboratoire.

Les populations commencent du reste à se pénétrer de cette vérité qu'il dépend d'elles de diminuer leur mortalité dans une proportion considé-

rable et les travaux d'assainissement des grandes villes est à l'ordre du jour dans tous les pays. Des quatre grands centres du littoral méditerranéen, foyers tout prêts à recevoir le choléra, les deux principaux sont en voie de se transformer.

A Naples, les grands travaux que comporte le projet dont on a pu voir les plans à l'Exposition universelle sont entrés dans la phase d'exécution. Les démolitions s'étendront sur une superficie d'un million de mètres carrés; elles comprendront 17,000 maisons et 62 églises. On expropriera 7,000 propriétaires. 375,000 mètres carrés seront affectés à la construction de maisons neuves et 604,000 seront consacrés au percement de nouvelles rues. La dépense qu'entraînera cette œuvre considérable est évaluée à 100 millions qui ne suffiront certainement pas. Les choses ne sont pas aussi avancées à Marseille, dont l'insalubrité légendaire peut se comparer à celle de Naples et réclame des mesures analogues. La mortalité annuelle s'y élève à 31 pour 1,000 en moyenne et dépasse 47 dans le quartier de l'Hôtel de Ville.

Son assainissement est décidé en principe comme celui de Toulon, mais on s'en est tenu jusqu'ici à dresser des plans et des devis. Cependant, le projet étudié par M. Cartier, agent-voyer en chef du département du Rhône, et qui a figuré à l'Exposition, paraît avoir de grandes chances d'exécution. Il a été adopté en principe par la Commission sanitaire et le Conseil municipal. Le Comité consultatif d'hygiène publique vient de l'approuver. Dans ce projet, chacun des bassins naturels qui composent la ville aura son réseau d'égouts aboutissant, par un conduit unique, à un grand collecteur émissaire qui traversera la ville dans toute sa longueur, du nord au sud, et viendra déboucher en pleine mer, de l'autre côté des collines de Marseille-Veire, dans la calanque de Cortiou, où la mer a une profondeur suffisante. Le grand collecteur aura douze kilomètres de longueur. La dépense est évaluée à dix-sept millions.

V

Tout en poursuivant ainsi les maladies zymotiques dans leurs principaux repaires, l'hygiène s'efforce également d'atténuer les ravages de la phthisie, qui fait plus de victimes à elle seule que toutes les épidémies réunies.

On se souvient que l'année dernière, un congrès spécial, pour l'étude de la tuberculose, s'est tenu à Paris sous la présidence de M. Chauveau, du 23 au 31 juillet. Après une importante discussion, le Congrès, avant de se séparer, adopta une série de vœux relatifs à la prophylaxie de la maladie et aux mesures à prendre pour l'empêcher de se pro-

pager. Il laissa de plus, à sa commission permanente, le soin de rédiger des *instructions* simples et pratiques sur ce sujet. Le 30 juillet 1889, M. le D^r Villemin vint, au nom de cette commission, soumettre à l'Académie de médecine le texte de ces *instructions*, en lui demandant son approbation et l'appui de son autorité pour obtenir des pouvoirs compétents les moyens de répandre ces conseils dans le public. Après une première discussion, leur examen fut renvoyé à une commission composée de MM. Verneuil, Villemin, Germain Sée, Du Jardin-Beaumetz et Cornil. Le 29 octobre suivant, M. Villemin vint lire le rapport. Les conclusions du Congrès y étaient notablement atténuées; cependant, elles furent l'objet de débats très vifs dans la longue discussion qui s'ensuivit.

L'Académie ne fait pas de difficultés pour reconnaître que la tuberculose est contagieuse et de nature parasitaire. Elle admet volontiers qu'elle peut se transmettre par les crachats des phtisiques, mais sa propagation par le lait et surtout par la chair des animaux tuberculeux ne lui paraît pas aussi bien démontrée; mais le dissentiment s'est surtout produit sur la question de savoir s'il était opportun de répandre ces instructions en dehors du monde médical et de leur donner une plus grande publicité, ainsi que le demandait la Commission. Un certain nombre d'académiciens ont pensé que cette sorte de manifeste aurait l'inconvénient d'alarmer les familles, de les éloigner des malheureux phtisiques et d'exposer ceux-ci à de cruelles rigueurs. La question de savoir s'il y avait lieu de sanctionner par un vote les conclusions de la Commission a même été soulevée; elles ont été renvoyées, le 21 janvier 1890, à la Commission, pour un nouvel examen.

VI

L'hygiène de l'habitation qui a été si largement représentée à l'Exposition universelle n'a pas réalisé en 1889 de progrès bien importants.

L'éclairage et le chauffage ont cependant attiré l'attention. De nouvelles applications de la lumière électrique ont surgi et des accidents graves ont été signalés en Amérique par le fait de conducteurs imparfaitement isolés.

En France, à Paris surtout, les poêles mobiles et à combustion lente ont donné lieu à de nombreuses intoxications par l'oxyde de carbone, et ces accidents ont provoqué, au sein de l'Académie de médecine une discussion qui a rempli plusieurs séances (1). Ce n'est pas une forme particulière de

poêle qui a été ainsi mise en cause, c'est un mode de chauffage qui tend à opérer une révolution dans nos habitudes.

Autrefois on s'efforçait d'activer la combustion et d'augmenter le tirage, en ouvrant un large accès à l'air extérieur. On réchauffait ainsi des centaines de mètres cubes d'air qui s'échappaient par le haut de la cheminée sans élever la température de l'appartement. Il en résultait une dépense énorme de combustible, mais une aération parfaite de la pièce dans laquelle un pareil courant d'air était établi. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On ralentit la combustion le plus possible à l'aide d'orifices extrêmement étroits; on perd beaucoup moins de calorique; on chauffe les maisons à beaucoup moins de frais, mais l'économie se réalise aux dépens de la salubrité et du bien-être.

Les poêles mobiles dégagent toujours un peu d'oxyde de carbone et, lorsqu'une circonstance quelconque reverse le faible courant qui dirige ce gaz dans la cheminée, il passe en entier dans l'appartement et détermine des accidents souvent mortels. La possibilité de mobiliser l'appareil, la brièveté de son tuyau et la difficulté de l'adapter exactement à toutes les cheminées, augmente le danger. Il devient menaçant lorsqu'on installe un de ces poêles, la nuit, dans une chambre à coucher.

Il ne faudrait pas croire toutefois que l'intoxication ne puisse se produire que dans la pièce ainsi chauffée. Si le gaz toxique, en remontant par la cheminée, rencontre sur sa route un tuyau conjugué, il redescend dans l'appartement d'où ce tuyau part et où il n'y a pas de feu et asphyxie les personnes qui y couchent.

Ces faits ont été souvent signalés dans les sociétés d'hygiène; mais cela n'a pas empêché l'usage des poêles mobiles de se répandre et les accidents de se multiplier. C'est pour cela que M. Lancereaux, qui avait déjà traité la question en 1881, dans *l'Union médicale*, et en 1883, dans ses *Leçons de clinique*, l'a portée le 5 février 1889 devant l'Académie de médecine.

Après l'avoir exposée avec beaucoup de talent, l'orateur terminait son mémoire en proposant à la sanction de l'Académie une série de mesures restrictives qui ne tendaient à rien moins qu'à proscrire l'emploi des poêles à combustion lente. L'Académie a pensé qu'agir ainsi eût été sortir de son rôle, que l'hygiène a pour devoir d'avertir le public et l'autorité et non de réclamer des prohibitions. Convaincue que l'économie réalisée par ce procédé de chauffage et la commodité de son emploi prévaudront toujours, dans les classes inférieures surtout, contre les dangers auxquels il expose, elle a préféré faire connaître ces périls, ainsi que les précautions à prendre pour les conjurer.

(1) Voyez *Bulletin de l'Académie* 1889, t. XXI, p. 461, 425, 461, 531, 568.

Les conclusions votées dans la séance du 16 avril ont été communiquées au ministre de l'intérieur en même temps que le compte rendu de la discussion. Ce débat, l'un des plus importants qui aient eu lieu à l'Académie en 1889, a révélé des faits intéressants et complètement inattendus, sur la proportion relative des gaz toxiques qui se dégagent des poêles mobiles, pendant la combustion, suivant l'activité avec laquelle elle se produit. La question a été portée à la même époque devant le Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, qui, le 29 mars, a adopté le rapport de M. Michel Lévy, dont les conclusions sont absolument conformes à celles de l'Académie de médecine.

La crémation n'est en somme que la plus haute expression du chauffage. Je suis donc tout naturellement conduit à en dire un mot. C'est pendant le cours de l'année qui vient de s'écouler que cette façon de se débarrasser des morts est devenue usuelle à Paris. On avait bien, en 1887, construit au Père-Lachaise un crématoire muni d'un four Gorini; mais il n'avait pas fourni de résultats satisfaisants et on y avait renoncé. En 1889, on a installé, à la place, un appareil du système Toissoul et Fradet. La chaleur y est produite par la combustion de l'oxyde de carbone activée par des courants d'air chaud. Il fonctionne depuis huit mois. On y brûle les cadavres non réclamés provenant des hôpitaux, les débris d'amphithéâtre et les corps des morts-nés. On y incinère également les personnes de bonne volonté pour lesquelles une autorisation régulière a été délivrée par la mairie de leur arrondissement. Les crémations privées ne sont pas aussi fréquentes qu'on pourrait le croire. Il s'en fait sept ou huit par mois; l'opération coûte 50 francs, sans compter l'urne ou plutôt la cassette en grès que l'administration fournit au prix de dix francs. Il y aurait beaucoup à dire sur cette mode nouvelle, même au point de vue de l'hygiène, mais cela m'entraînerait beaucoup trop loin.

VII

L'hygiène urbaine, avec les innombrables détails qui s'y rattachent, tient tant de place qu'il ne m'en reste presque plus pour parler des autres branches de la science à laquelle cette revue est consacrée et je serai forcé de me borner pour quelques-unes d'entre elles à une simple énumération.

En bromatologie, nous avons à enregistrer les falsifications alimentaires qui deviennent chaque jour plus ingénieuses et plus criminelles. A l'Exposition universelle, on avait eu l'heureuse idée de placer sous les yeux du public la collection complète des drogues à l'aide desquelles on falsifie le lait, le beurre, le poivre, la farine, le café, celles

qui servent à remplacer le houblon dans la bière et le raisin dans la fabrication du vin. Des tableaux explicatifs placés dans le voisinage édifiaient le public sur l'industrie des boissons et des aliments falsifiés. C'était à faire frémir le consommateur. Des révélations intéressantes ont été faites à cet égard au Congrès d'hygiène. Il en résulte que les sirops d'orgeat, de groseille, de grenadine qu'on trouve dans les débits de boissons, chez les confiseurs, chez les épiciers, ne renferment souvent aucune des substances qui doivent entrer dans leur composition et que *les médicaments qu'on trouve dans les pharmacies sont parfois falsifiés eux-mêmes*. Ces fraudes ne sont pas spéciales à la France; elle se laisse même distancer par l'Allemagne pour le sans-*façon* avec lequel on s'y livre. Le D^r Stutzer, de Bône, a signalé tout récemment l'apparition dans le commerce d'une nouvelle espèce de café *artificiel* fait avec de la farine torréfiée, puis agglutinée à l'aide de la dextrine.

Il existe à Cologne deux fabriques spéciales qui fournissent tout le matériel nécessaire à cette maintenance, pour la somme modique de 3,000 marks. La machine à frapper le café peut en fournir 10 à 12 quintaux par jour et le quintal revient, tous frais compris, à 20 marks. Il paraît que l'imitation est parfaite et que cet article est appelé à un grand avenir.

L'altération spontanée des aliments a été également l'objet de travaux importants. Quelques nouveaux faits d'empoisonnement par les boîtes de conserves ont été signalés, notamment par MM. Boucheron et Noir, médecins au 92^e régiment d'infanterie (1). MM. Poincaré et Macé ont fait sur ce sujet d'intéressantes expériences desquelles il résulte que, contrairement à l'opinion de M. Fernbach, on rencontre souvent, dans des conserves alimentaires animales ou végétales d'apparence intacte, des germes revivifiables, parfois même en assez grand nombre.

L'absinthe a comparu devant l'Académie de Médecine, sous la forme d'une communication de MM. Cadéac et Albin-Meunier faite à la séance du 10 septembre 1889. Leur travail avait pour but d'établir que les accidents causés par la liqueur d'absinthe ne sont pas dus à cette substance, mais bien aux autres essences qui entrent avec elle dans la dangereuse boisson et notamment à celles d'anis et de badiane. M. Laborde, chargé de rendre compte du travail précédent, a lu, le 1^{er} octobre, un rapport dont les conclusions sont absolument opposées à celles des auteurs du mémoire et confirment de tout point les faits établis par M. Magnan

(1) Boucheron et Noir. Intoxication par des viandes de conserves altérées. (*Archives de médecine militaire*, février 1889, p. 97.)

et par tous les savants qui se sont occupés de la question (1).

Pour M. Laborde, l'essence d'absinthe est la plus toxique de toutes celles qui entrent dans la composition de la liqueur de ce nom. C'est la seule qui soit capable de produire l'attaque épileptique, vraie, systématisée, et pour le prouver, pour faire passer la conviction dans tous les esprits, M. Laborde fait apporter deux cobayes sur la tribune de l'Académie; il injecte à l'un d'eux un gramme d'essence d'absinthe, à l'autre un gramme d'essence d'anis. Au bout de cinq minutes, le premier est pris de convulsions violentes ayant tous les caractères de l'attaque épileptique et succombe en moins d'une demi-heure. L'autre résiste à merveille à l'injection hypodermique qu'il a subie. C'est cette démonstration insolite qui provoqua, de la part d'une dame de l'assistance, une protestation que le président ne crut pas devoir tolérer et qui a fait, à ce moment, quelque bruit dans la presse médicale (2).

VIII

En Hygiène militaire, l'événement important de l'année, c'est le rapport adressé par M. de Freycinet, ministre de la guerre, au président de la République et qui a paru au *Journal officiel* du 17 juin 1889. Ce document de premier ordre est le résultat d'une enquête faite par les directeurs du service de santé des corps d'armée, en exécution de la circulaire du 13 mai 1888. Elle a porté sur tous les points qui intéressent la santé du soldat et plus particulièrement sur les maladies infectieuses auxquelles toutes les agglomérations d'hommes sont exposées.

Le ministre, après avoir constaté avec une légitime satisfaction que la mortalité a diminué d'un tiers dans l'armée, depuis plus de dix ans, passe en revue les moyens de l'abaisser encore et de prévenir, ou du moins d'atténuer, les épidémies devenues beaucoup plus fréquentes par suite des grands mouvements de personnel qu'amène l'appel sans cesse renouvelé des réservistes, des territoriaux, des hommes dispensés, etc., etc. La question des eaux potables, des latrines, de la désinfection dans les casernes, des revaccinations dans les corps de troupes, les mesures à prendre à l'égard des tuberculeux sont l'objet de prescriptions empreintes d'une sollicitude éclairée qu'on n'était pas habitué à rencontrer dans les documents émanant de l'administration militaire.

(1) Rapport sur un travail présenté à l'Académie de médecine par MM. Cadéac et Albin-Meunier relatif à l'étude physiologique de la liqueur d'absinthe, au nom d'une commission composée de MM. Ollivier et J. V. Laborde, rapporteur.

(2) *Bulletin de l'Académie de médecine*, 1889, t. XXI, p. 276.

Cette revue ne serait pas complète si j'oubliais d'y mentionner l'exposition allemande pour la préservation des accidents. Elle s'est ouverte le 1^{er} mai 1889. Pendant que les populations du monde entier se pressaient sur toutes les routes du globe pour venir admirer les merveilles du Champ-de-Mars et de l'Esplanade des Invalides, quelques visiteurs parcouraient les galeries installées dans le quartier d'Alt-Moabit, sur l'emplacement occupé par l'Exposition d'hygiène de 1883. C'étaient pour la plupart des Allemands, des Autrichiens et des Belges; quelques hygiénistes français avaient même poussé le dévouement jusqu'à s'y rendre. Ils en sont revenus satisfaits du soin avec lequel on avait disposé tout ce qui a trait à l'hygiène industrielle et aux professions qui l'intéressent. Il m'est impossible d'entrer dans plus de détails.

En somme l'année 1889 a été bonne pour l'hygiène, ainsi que je le disais en commençant. Chaque jour la santé publique s'améliore et la mortalité va diminuant. Pourquoi faut-il que la natalité s'abaisse plus rapidement encore? A cet égard les statistiques publiées cette année sont effrayantes et mes tristes prévisions sont dépassées. Il y a quatre ans, dans une conférence que je faisais à Rouen, je signalais cette décroissance et j'en faisais ressortir les résultats terribles pour l'avenir. Je montrais la population de la France demeurant stationnaire au milieu de l'essor rapide des peuples voisins. A cette époque déjà, son accroissement était tombé à 2,42 pour 1000 et je prédisais que les premières années du siècle prochain assisteraient à son arrêt complet. Eh bien, je restais au-dessous de la vérité. Nous n'irons pas jusque-là. La statistique de 1888, dont les résultats sont consignés dans le *Journal officiel* du 20 août 1889, accuse 837,867 décès pour 882,639 naissances seulement. Ainsi l'excédent pour la France entière ne dépasse pas 44,772; il est inférieur à celui de la ville de Londres qui, cette même année, a été de 53,934. Il n'est plus que de 1.17 pour 1000 et pendant ce temps-là le flot des étrangers monte toujours. En 1886, nous en avions déjà 1,137,037; en 1888, ils étaient 1,146,367. Le temps approche, où cette invasion étrangère sera seule à combler nos vides, et, si cela continue, nous perdrons bientôt, dans ce commerce, notre caractère, nos qualités nationales et nous tomberons au rang de ces petits États qui n'ont pas d'individualité propre et avec lesquels on ne compte plus. Il n'est pas encore trop tard pour y aviser; mais il n'est que temps et c'est là, comme je le répète sur tous les tons depuis bientôt dix ans, le véritable péril social.

D^r Jules Rochard,

Membre de l'Académie de Médecine.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Zaremba. — Sur un problème concernant l'état calorifique d'un corps solide homogène indéfini. Thèse de Doctorat ès sciences mathématiques (Faculté de Paris, 30 novembre 1889).

La question traitée dans cette thèse est la suivante : *Trouver quel doit être l'état calorifique d'un corps solide homogène indéfini pour qu'un système de courbes isothermes, à un instant donné, restent isothermes après un temps quelconque, de telle sorte que la température d'un point puisse s'exprimer en fonction du temps et de deux autres variables indépendantes.*

Ce problème intéressant fut posé en 1858 par l'Académie des sciences de Paris; un seul mémoire fut envoyé au concours; il était de Riemann; ce mémoire était digne du grand géomètre quant au fond, mais les calculs étant très incomplets, le prix ne lui fut pas décerné.

Depuis lors M. Weber, examinant un cas particulier de la question, a cherché tous les cas où la température d'un corps homogène indéfini peut être donnée par une fonction du temps et d'une seule autre variable indépendante.

M. Zaremba reprend le problème et en conduit la solution, nous ne dirons pas jusqu'au bout, mais beaucoup plus loin qu'il n'avait été fait jusqu'ici; il montre qu'elle comprend quatre cas : le premier a été traité par M. Weber, il en expose les calculs en les développant davantage; le quatrième a été entièrement résolu par Riemann, il ne peut qu'en reproduire les résultats; mais c'est dans l'étude des deux cas intermédiaires que se trouve le vrai mérite du travail de M. Zaremba, la part d'invention très réelle qui lui appartient; ces deux cas, en effet, n'avaient été étudiés que très incomplètement par Riemann, en ce sens que les solutions indiquées par lui ne constituaient qu'un cas très particulier des solutions générales; M. Zaremba, sans parvenir à trouver toutes les solutions au moins dans l'un des deux cas, en indique cependant plusieurs ayant un haut degré de généralité.

L. O.

Dwelschauvers-Dery (W.), Professeur à l'Université de Liège. — Exposition universelle de 1889. — La machine à vapeur. Opuscule grand in-8° de 95 pages et trois planches. Extrait de la *Revue Universelle des Mines*, t. VII, 3^e série.

M. Dwelschauvers-Dery, le célèbre professeur belge dont les beaux travaux sur la machine à vapeur sont justement appréciés, était en mesure de faire une étude particulièrement intéressante des moteurs à l'Exposition; les recherches de toute sa vie le préparaient à ce travail et la position de vice-président du Jury de la Mécanique générale le lui rendait facile. Aussi regrettons-nous qu'il ne nous ait donné qu'un compte-rendu si court, si rapide et espérons-nous qu'il le complètera un peu plus tard dans un Mémoire plus développé.

Après avoir exposé brièvement l'histoire de la machine à vapeur depuis un siècle et montré que le génie de Watt a tout inventé: condenseur, pompe à air, chemise de vapeur, détente, double effet,... M. Dwelschauvers arrive à la machine actuelle et expose les différents types qui figuraient à l'Exposition; il insiste sur les machines à grandes vitesses et à hautes pressions dont

le nombre était relativement important et qui présentent, comme l'on sait, des avantages, tant au point de vue de l'économie de vapeur que de la réduction des dimensions et de la régularité.

L'opuscule se termine par des considérations fort intéressantes sur les générateurs dits inexplosibles et sur les Compound (machines à plusieurs cylindres où la détente se fait par cascade); personne n'était plus autorisé que M. Dwelschauvers à traiter ce dernier point, car ses recherches sur les échanges de chaleur entre la vapeur et les parois du cylindre sont aujourd'hui devenues classiques.

En somme, l'Exposition de 1889 n'a mis en lumière aucune invention capitale en ce qui concerne les moteurs à vapeur; les machines sont les mêmes, au fond, qu'en 1878; de réels progrès ont été faits, mais ce sont des progrès d'exécution, qui accusent d'ailleurs une précision devenue tout à fait remarquable.

J. POULET.

Sinigaglia (Francesco), Ingegnere. — *Le Macchine a vapore* secondo le più recenti investigazioni teorico-pratiche per i costruttori e per l'insegnamento tecnico. Un vol. grand in-8° de 132 pages et 20 figures. Stabilimento, Bontempelli, Roma.

Sinigaglia (Francesco), Ingegnere. — *Appendice al trattato le Macchine a vapore. — Regolatori di velocità a forza centrifuga.* Opuscule grand in-8° de 44 pages et 12 figures. Stabilimento, Bontempelli, Roma.

Une édition française de l'important ouvrage de M. Sinigaglia sera publiée sous peu par M. E. de Billy, ingénieur des mines; nous ajournons le compte-rendu au moment où cette édition française aura paru.

L. O.

Weyher (C. L.), Ingénieur civil. — *Sur les Tourbillons, trombes, tempêtes et sphères tournantes. Étude et expériences.* Deuxième édition, revue et augmentée. Un vol. grand in-8° de 128 pages, avec 3 planches en couleur. Gauthier-Villars et fils, éditeurs, 55, quai des Grands-Augustins, Paris.

2^{re} Sciences physiques.

Gossart (M.-E.). — *Mesure des tensions superficielles dans les liquides en caléfaction.* (Méthode des larges gouttes.) Thèse de doctorat ès sciences physiques. (Faculté de Paris.)

Quand on projette avec une pipette quelques gouttes d'un liquide sur une capsule métallique chauffée à température élevée, on constate qu'elles n'entrent pas en ébullition, mais se réunissent en un globe, sphérique s'il y a peu de liquide, de plus en plus aplati si l'on en met davantage. Ce fait bien connu et d'autres analogues constituent les phénomènes de *caléfaction*. Depuis longtemps, déjà, les physiciens ont rejeté les théories bizarres et compliquées, qu'avait autrefois émises sur ce sujet Boutigny (1), à la suite d'expériences fort ingénieuses, d'ailleurs, et conduites avec habileté. L'aspect et la forme du liquide en caléfaction

(1) Boutigny. *Annales de chimie et de physique*, 3^e série, t. IX, XI, XXVII, XXVIII.

rappellent ceux du mercure sur le verre ou de l'eau sur du verre enduit de noir de fumée, c'est-à-dire ceux de liquides placés dans des vases qu'ils ne mouillent pas. L'on a tout naturellement été conduit à rapprocher les deux phénomènes (1) : l'expérience montre que la goutte caléfiée ne touche pas la capsule chaude ; elle en est séparée par une couche de vapeur très peu diathermane ; elle peut, par suite, se trouver à une température relativement basse et se comporter comme un liquide qui ne mouille pas le vase sur lequel il repose.

Dans son intéressant travail, M. Gossart établit nettement l'exactitude de cette manière de voir : la goutte doit être considérée comme plongée dans une atmosphère de vapeur ; sans contact avec la paroi, elle doit prendre une forme qui dépend seulement des propriétés intrinsèques du liquide dans les conditions de l'expérience, de sa densité d et de sa constante capillaire a^2 , ou, si l'on préfère, de la tension superficielle F du liquide en contact avec la vapeur (on sait d'ailleurs que l'on a la relation $a^2 = \frac{2F}{d}$). Si

cette conception est exacte, on peut, *a priori*, prévoir pour un liquide dont les propriétés capillaires sont connues, la forme que prendra la goutte, ou bien, inversement, de la mesure de ses dimensions déduire la valeur de la tension superficielle. Cette méthode est, au fond, la méthode connue, en capillarité, sous le nom de *méthode de la large goutte*.

Si l'on considère, par exemple, sur un plan de verre une goutte de mercure, assez large pour que l'on puisse regarder le rayon de sa base comme infini par rapport au rayon de courbure de sa section méridienne (2), on démontre qu'elle tend à devenir plane dans sa plus grande épaisseur e et que l'on a la relation

$$e = 2\sqrt{\frac{F}{d}} \cos \frac{\theta}{2}$$

avec la paroi, c'est-à-dire l'angle formé par la tangente à la section méridienne, au point où elle rencontre la paroi, avec la paroi elle-même.

La connaissance de l'épaisseur e et de l'angle θ permet donc de calculer la valeur de la tension F . Ce procédé de mesure a souvent été appliqué (3), mais un phénomène particulier rend cette application fort difficile : l'angle de raccordement n'est pas constant ; la moindre altération superficielle du liquide, la plus légère cause accidentelle, entraînent des variations très notables de la valeur de cet angle.

Au lieu de se compliquer, comme on pourrait croire, le problème se simplifie dans le cas d'une goutte caléfiée. Le liquide, étant maintenu à distance finie de la capsule, est soustrait aux actions moléculaires de la paroi, et la théorie de Laplace (4) permet de prévoir que l'angle de raccordement doit être rigoureusement et constamment nul ; on doit, par

suite, avoir simplement $e = 2\sqrt{\frac{F}{d}}$.

M. Gossart a cherché à vérifier ce fait important par divers procédés.

(1) Voir par exemple : Jamin et Bouty. *Cours de physique*, t. II, 2^e fasc., p. 212.

(2) M. Gossart montre que pour une goutte circulaire d'un diamètre quatre fois plus grand que la hauteur, les conditions théoriques sont réalisées avec une très grande approximation ; si la goutte n'est pas circulaire, elle prend une forme allongée, et les mêmes équations représentent son profil transversal.

(3) En particulier par Quincke, Pogg. Am. CV, 1. M. Lippmann (*Comptes-rendus des séances de la société de physique*, 4 déc. 1885) a décrit une ingénieuse disposition pour éviter les inconvénients de la mesure de θ .

(4) Supplément au livre X de la *Mécanique céleste*. M. Gossart montre cependant par une ingénieuse application de la méthode stroboscopique qu'il y a contact intermittent de certains points de la goutte avec la plaque, mais ces contacts de très courte durée ne troublent pas les mesures.

Il mesure au cathétomètre l'épaisseur d'une goutte d'un liquide en caléfaction dont la tension superficielle est bien connue à diverses températures ; cette mesure se fait aisément, car la goutte ne touchant pas la paroi, on aperçoit toujours nettement entre la goutte et la plaque un trait lumineux qu'il est facile de pointer. La comparaison de l'épaisseur ainsi mesurée et de celle calculée par la formule confirme l'hypothèse fondamentale.

Il faut, pour ainsi dire, le *portrait géométrique* de la goutte, le calcul permettant de connaître la forme qu'elle doit prendre, puis il la photographie : les deux images, ramenées aux mêmes dimensions, se superposent très exactement.

On peut, enfin, déduire de la théorie le poids d'une goutte de contour donné et peser, d'autre part, la goutte caléfiée ; ce dernier procédé est, on le conçoit aisément, assez difficile à employer.

L'angle de raccordement est donc bien constamment nul. Ces expériences sont absolument probantes ; un autre point, très important aussi, était à vérifier. Dans les calculs, dont on applique les résultats, on admet essentiellement que la tension superficielle du liquide est la même en tous les points, ce qui suppose implicitement que la goutte se trouve à une température uniforme et que l'atmosphère ambiante est partout identique : M. Quet (1) a montré, en effet, théoriquement que la vapeur exerce une action capillaire sur le liquide et les belles expériences de M. Wolf (2) ont établi l'influence des variations de température sur la tension superficielle. Mais, dans l'espèce, ces causes d'erreur ne sont pas bien considérables et la discussion des expériences prouve qu'on les peut négliger.

Il est nécessaire de connaître exactement la température des gouttes caléfiées ; on sait, depuis de nombreux expérimentateurs, qu'elle est toujours légèrement inférieure à la température d'ébullition du liquide sous la pression environnante. M. Gossart a voulu vérifier le fait en opérant des mesures sous des pressions variables ; à cet effet, il produit le phénomène de la caléfaction sous la cloche d'une machine pneumatique ; de telles mesures entraînent nécessairement d'assez grandes complications expérimentales. Malheureusement, faute de matériel suffisant, il n'a pu, pour mesurer les températures, employer des pinces thermo-électriques et a dû recourir à des thermomètres à mercure dont la masse est un peu trop considérable et qui peuvent facilement s'échauffer par suite du rayonnement provenant de la plaque métallique ; il a pu, néanmoins, constater que les températures des liquides en caléfaction sont toujours inférieures aux températures d'ébullition régulière correspondantes et que l'écart croît avec la température.

Dans la dernière partie de sa thèse, l'auteur résume des expériences entreprises pour mesurer la tension superficielle d'un grand nombre de liquides à leurs températures de caléfaction à l'air libre ; il s'est servi uniquement du procédé de mesure de l'épaisseur par le cathétomètre ; pour calculer la tension F par la formule, il est nécessaire de connaître, en outre, la densité d des liquides considérés à la température de l'expérience ; M. Gossart a utilisé les nombres obtenus par Isidore Pierre, le regretté doyen de la Faculté des sciences de Caen. Parmi les résultats obtenus, signalons les suivants : les cinq premiers alcools ont et gardent, à toutes températures, sensiblement la même tension superficielle, et il en est de même des éthers éthyliques des acides gras.

En résumé, le travail de M. Gossart fournit une interprétation rigoureuse de phénomènes sur lesquels on avait des idées encore un peu vagues ; il donne, en outre, un procédé très intéressant pour mesurer la

(1) Rapport sur le progrès de la capillarité.

(2) *Annales de chimie et de physique*, 3^e série, XL, IX, 230.

tension superficielle des liquides au voisinage de leurs points d'ébullition.

Lucien POINCARÉ.

Kruss (Gerhard) et **Schmidt** (F. W.). — *Recherches sur le cobalt et le nickel. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 22 p. 2026 à 2028.

Les auteurs pensent que le produit décrit comme de l'oxyde de nickel pur renferme en réalité un nouvel oxyde qu'ils cherchent à isoler. Ils sont partis d'un nickel soigneusement débarrassé de fer, de manganèse et de magnésium et dans lequel aucun réactif ne permettait de déceler la présence d'un métal connu.

Ce nickel peut, par des précipitations fractionnées à l'état d'arsénite basique de nickel et d'ammoniaque, être divisé en deux parties dont l'une possède un poids atomique compris entre 56 et 58, inférieur à celui admis pour le nickel (58,6, d'après Zimmermann) et l'autre un poids atomique supérieur, voisin de 61. Il en résulterait que le poids atomique 58,6 du nickel ne doit pas être adopté d'une manière définitive et que ce métal est peut-être un mélange de deux ou de plusieurs métaux.

MM. Krüss et Schmidt se réservent l'étude de cette question et ont commencé des recherches analogues sur le cobalt.

Henri GAUTIER.

3° Sciences naturelles.

Marage (R.). — *Anatomie descriptive du Sympathique chez les oiseaux*. 6 pl. *Annales des sciences naturelles*, t. VII, 1889, p. 1 à 72.

Dans l'échelle animale les Oiseaux représentent des formes intermédiaires entre les Reptiles et les Mammifères. Tandis que le système sympathique est encore uni au système cérébrospinal chez les Reptiles, celui des Oiseaux tend, d'une façon marquée, à l'individualité, surtout chez les Rapaces, qui forment la transition aux Mammifères. Chez ces derniers les deux systèmes sont complètement distincts : sympathique et nerfs cérébrospinaux.

A. E. MALARD.

Beaunis (H.). — *Les Sensations internes*, un vol. in-8° de la Bibliothèque internationale, Paris, Alcan, 1889.

De toutes les sensations, les plus difficiles à étudier sont celles qui relèvent de la sensibilité générale. Dans la vie normale, elles passent presque inaperçues, précisément parce qu'elles sont incessantes, et que leur intensité varie peu. Aucun organe spécial ne leur étant affecté, elles ont jusqu'alors presque entièrement échappé à l'investigation expérimentale. C'est pourquoi M. Beaunis s'attache surtout à montrer le parti qu'on peut tirer de l'observation clinique pour les étudier. Dans certains états pathologiques, il arrive en effet qu'elles atteignent un haut degré d'acuité : telle est, par exemple, la sensibilité de l'intestin, qui chez l'homme sain est fort obscure. M. Ribot, dans de magistrales études, avait déjà mis en lumière les troubles qu'apporte dans notre état sensif l'altération de quelques-uns de ses facteurs. Ces maladies de la personnalité permettent, pour ainsi dire, de la disséquer et d'en isoler les éléments.

M. Beaunis applique cette méthode à l'analyse de nos sensations internes. Il traite d'abord de celles qui se manifestent à intervalles réguliers, comme la faim et la soif, accompagnées chaque fois d'un même état de la conscience. Puis il passe en revue divers ordres de sensations fort peu étudiées jusqu'à présent. Citons notamment les pages qu'il consacre au sens de l'existence, qu'entretiendrait en nous une sorte d'intégration de facteurs sensoriels infinitésimaux.

Pour ce qui est des sens dits de l'orientation, du ma-

gnétisme et de la durée, M. Beaunis se borne à indiquer les faits qui semblent s'y rapporter, mais les considère comme trop incomplets pour autoriser une tentative d'explication. — Enfin le plaisir et la douleur, analysés par les procédés de la physiologie, conduisent l'auteur à voir en eux comme une résultante de toutes nos sensations. Par une suite de considérations ingénieuses il essaie de rattacher à la sensibilité physique tous les états émotionnels de l'esprit, même la douleur morale.

Tous ceux qu'intéressent ces délicats problèmes en trouveront, dans le savant ouvrage de M. Beaunis, une critique très renseignée, jointe à une grande finesse d'aperçus.

L. O.

4° Sciences médicales.

Delbet (P.). — *Recherches expérimentales sur le lavage du péritoine. Annales de gynécologie*, septembre 1889, t. XXXII, p. 163.

A une époque où le lavage du péritoine entre franchement dans la pratique d'un certain nombre d'ovariotomistes [Bantock, dans sa dernière centaine de laparotomies (*The Brit. gynec. J.* 1889-90, p. 343), y a eu recours cinquante fois], il était intéressant de préciser les différents phénomènes physiques et biologiques qui accompagnent ce lavage ; c'est ce qu'a tenté de faire M. Delbet dans une série d'expériences sur des chiens.

Dans la première partie de ses recherches, il s'est proposé de préciser les diverses conditions mécaniques du lavage du péritoine. Les trois conclusions qui ont trait à ces conditions mécaniques sont les suivantes : 1° Le liquide employé en lavage se repand dans toute la cavité péritonéale. — 2° Il est difficile, peut-être impossible de débarrasser complètement par le lavage le péritoine des substances étrangères qui ont pénétré dans sa cavité. — 3° Après le lavage, il reste toujours dans le péritoine une quantité notable de liquide, qui occupe le petit bassin, les fosses iliaques, les fosses lombaires.

Dans une seconde partie, il s'occupe des conditions biologiques du lavage. Il conclut de nombreuses expériences faites sur des chiens atropinisés, chloroformés, curarisés, que le lavage du péritoine dans les limites thermiques de 18° à 50° n'a, sur la respiration et sur la circulation, que des influences insignifiantes ou nulles ; et qu'il n'expose à aucun danger de ce côté. L'action hémostatique des lavages à haute température paraît à l'auteur au moins douteuse. — Il aborde ensuite la question importante de l'absorption par le péritoine pendant le lavage. Voici la conclusion de ce chapitre : La quantité de liquide absorbé dans les premières minutes du lavage est considérable. Lorsqu'on emploie la solution de chlorure de sodium à 7 p. 1000, on obtient ainsi une véritable transfusion indirecte. L'auteur ayant constaté par des dosages de l'hydratation du sang que l'absorption, d'abord très considérable, diminue rapidement au point de devenir à peu près nulle quand la quantité d'eau contenue dans le sang a atteint un certain taux, s'est demandé si l'on ne pourrait pas profiter de ce moment pour laver le péritoine avec des solutions toxiques sans danger d'intoxication. Dans une série d'expériences faites avec des solutions de strychnine, il est arrivé à démontrer d'une manière saisissante la réalité de cette hypothèse : d'où sa septième conclusion que voici in-extenso : Il est possible de laver le péritoine avec des substances toxiques sans danger d'intoxication. Il faut pour cela faire précéder le lavage toxique d'un lavage de dix minutes de durée avec la solution salée à 7 p. 1000, et le faire suivre d'un troisième lavage avec la même solution pour débarrasser le péritoine de l'excès de substance toxique.

D^r HARTMANN.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 13 janvier 1890

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES

M. **Emile Picard** : Sur l'emploi des approximations successives dans l'étude de certaines équations aux dérivées partielles.

2^o SCIENCES PHYSIQUES

MM. **Ed. Sarasin** et **L. de la Rive** : Résonance multiple des ondulations électriques de M. Hertz. — M. **Cornu** : Observations relatives à la communication précédente. (Voir plus loin aux *Nouvelles*.) — M. **Alphonse Berget** a déterminé la conductibilité thermique de divers métaux au moyen de sa méthode; comparant ces conductibilités aux conductibilités électriques déterminées sur les mêmes échantillons par la méthode du pont double de Thomson, il trouve que la loi de proportionnalité des deux conductibilités n'est exacte qu'approximativement. — M. **P. van Berchem** a repris, pour les dissolutions gazeuses, les recherches que M. Ludwig et M. Soret avaient faites sur les solutions salines. Ces recherches ont montré que si deux parties de la solution sont portées à des températures différentes, la concentration s'accroît dans les parties froides. L'auteur montre qu'il en est de même pour les solutions d'acide chlorhydrique et celles d'ammoniaque. — M. **Lecoq de Boisbaudran** a étudié quelques nouvelles fluorescences données par la samarine et les terres Zz et Z β dans divers dissolvants solides. Il montre que quelquefois la calcination modifie entièrement le spectre de fluorescence d'un composé. — M. **L. Pigon** a déterminé la chaleur de formation du chlorure de platine anhydre, qu'il obtient en décomposant à 360° dans une atmosphère de chlore l'acide chloroplatinique. Le chlorure de platine anhydre est dissous dans l'acide chlorhydrique, et la chaleur dégagée par cette réaction, déduite de la chaleur de formation de l'acide chloroplatinique, donne pour PtCl $_4$ 59 Cal, 8 — M. **Besson** a obtenu la combinaison de l'hydrogène phosphoré gazeux bien sec avec le fluorure de bore, en faisant réagir ces corps à une température inférieure à 0.30°; il a combiné aussi ce même gaz au fluorure de silicium en ajoutant une forte pression à la réfrigération. — M. **Aimé Girard** rectifie les chiffres qu'il avait donnés en 1873 pour les pouvoirs rotatoires de la matezite et du matezo-dambosse. — MM. **Maquenné** et **Tanret**, qui avaient fait connaître l'existence d'une inosite dextrogyre et d'une inosite lévogyre, ont obtenu par le mélange de ces deux corps à parties égales, une troisième inosite (*vacemo-inosite*) différant des deux premières par une constante physique et inactive dans la lumière polarisée.

3^o SCIENCES NATURELLES

M. **Edouard Heckel**, étudiant la germination de diverses graines contenant des alcaloïdes, a constaté que ces alcaloïdes (strychnine, brucine, daturine, caféine, etc.) sont transformés et utilisés par la plante pour son développement. Il apparaît du nitrate de potasse. — M. **A. Giard**, à propos du travail présenté par M. Roule à l'Académie en 1889, rappelle

que, dès 1876, il avait rapproché les Mollusques des Annelides et créé un phylum des *Gymnotoca* comprenant à la fois les Vers et les Mollusques. — M. **Léon Vailant** signale plusieurs espèces de poissons, désignées indistinctement à l'île de la Réunion sous le nom de *Bichique*, dont le fretin présente des montées pareilles à celles de l'anguille. Au moment de la montée, depuis un siècle au moins, ces poissons sont capturés en quantité considérable, sans qu'il paraisse y avoir eu la moindre diminution dans leur abondance. — M. **A. Vaysière** a pu observer à l'état frais quelques échantillons du *Proposiposma variegatum* qui lui ont été envoyés de Madagascar par M. Sikora; il signale les particularités de cette espèce rare. — M. **Salomon Reinach** établit par des considérations philologiques que la notion d'éruptions volcaniques en France au v^e siècle de notre ère repose sur une fausse interprétation des textes de l'époque.

Séance du 20 janvier 1890

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES

M. **Zaremba** : Sur l'intégration d'une équation aux dérivées partielles. — M. **de Jonquières** : Note sur un point fondamental de la théorie des polyèdres. — M. **C. Guichard** : Détermination des congruences, telles que les lignes asymptotiques se correspondent sur les deux nappes de la surface focale. — M. **M. Hamy** : Sur la théorie de la figure des planètes. — M. **G. Leveau** : Ephémérides pour la recherche de la comète périodique de d'Arrest à son retour de 1890. — M. **D. Eginotis** : Observations de la comète Swift, faites à l'observatoire de Nice avec l'équatorial de 0^m38. — M. **Rud. Wolf** : Sur la statistique solaire de l'année 1889 (comparaison avec les variations magnétiques).

2^o SCIENCES PHYSIQUES

M. **A. Leduc**, qui avait d'abord étudié les variations de la résistance électrique du bismuth placé dans un champ magnétique, en négligeant les influences de la température, s'est aperçu que celle-ci est assez considérable et il l'a calculée. — M. **Ch. Antoine** a calculé la compressibilité de l'azote jusqu'à 3,000 atmosphères. — M. **H. W. Bakhuys Rooyboom** montre que les faits curieux observés par M. Joannis sur la dissociation du sodammonium sont un cas particulier d'une loi qu'il a posée en étudiant les conditions de l'équilibre entre le chlorure de calcium et l'eau. — MM. **J. L. Soret** et **Alb. Rilliet** ont étudié l'absorption des rayons ultra-violetes par quelques corps de la série grasse; ils ont vu que de très petites proportions d'impuretés dans ces corps font varier considérablement leur pouvoir absorbant pour cette partie du spectre. — M. **E. Doumer** montre, par un certain nombre de déterminations expérimentales, que les sels doubles obéissent à la loi qu'il a déterminée pour les sels simples, à savoir que le pouvoir réfringent moléculaire d'un sel est proportionnel au nombre de valences de la partie métallique d'un sel. — MM. **Berthelot** et **P. Petit** ont formé et étudié les oxydes de divers graphites pour déterminer la façon dont le carbone est polymérisé dans ces graphites. Ils ont, en outre, déterminé les chaleurs de formation et de combustion de ces oxydes. — M. **Ph. A. Guye** montre qu'il existe une relation fixe entre le pouvoir réfringent moléculaire d'un corps et l'une des constantes de l'équation par laquelle M. Van der

Waals rend compte des phénomènes du point critique; il en tire des conclusions pour l'étude de la constitution moléculaire du corps au point critique. — **M. J.-A. Le Bel**, pour déterminer la constitution intime du chlorure ammonique, s'est adressé aux chloroplatinates des dérivés de substitution de ce corps; arrivé à l'isobutyltriméthylammonium, il a obtenu un dimorphisme évident, et ainsi prouvé l'existence de l'isomérisie dans ces dérivés. — **M. Raoul Varet**, poursuivant ses recherches sur les réactions entre les sels de cuivre et les cyanures métalliques, a trouvé que l'action des sels oxygénés est différente sur le cyanure de zinc, d'une part, et sur les cyanures de cuivre et de mercure, de l'autre; ces cyanures semblent donc avoir une constitution particulière. — **M. A. Haller**: Sur les différents bornylphényluréthanes gauche, droite et racémique et les isobornylphényluréthanes.

3^e SCIENCES NATURELLES

M. Berthelot, à propos de la communication faite par **M. Heckel** dans la dernière séance, fait remarquer la similitude et la connexité qui existent, au point de vue de la nitrification, entre la vie des microbes habitant la terre et celle des microbes qui s'inoculent et se développent dans les plantes. — **MM. C. Chabrière** et **L. Lapicque**, étudiant l'action physiologique de l'acide sélénieux, ont montré que ce corps : 1^o met obstacle aux fermentations s'il est en quantité suffisante, sinon il est réduit par les micro-organismes; 2^o est très toxique pour les animaux supérieurs, qu'il tue par un processus initiatif général. — **M. Paul Pelseneer** montre que le quatrième orifice palléal qu'on observe chez certains Lamellibranches, est morphologiquement destiné à livrer passage au byssus. — **M. Pierre Viala** a étudié le parasite qui produit le *Pourridié* de la vigne; son évolution doit le faire ranger dans un genre spécial du groupe des Tuberculeuses. — **M. L. de Launay** expose les résultats de ses recherches microscopiques sur la structure des roches de l'île Metelin.

L. Lapicque.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 14 janvier 1890

M. Péan montre une femme de 32 ans chez laquelle, il y a 14 mois, il a enlevé à six semaines d'inter-




Fig. 1. — Avant l'opération.

valle 1^o les deux maxillaires supérieurs, les malaïres, le sphénoïde; 2^o le maxillaire inférieur, envahis par

des ostéo-fibrômes causés par des hétérotopies dentaires. Cette opération, faite à la prière de la malade



Fig. 2. — Après l'opération.

sur le point de succomber, est *unique* dans la science. Les conséquences en ont été des plus heureuses; les déformations et troubles fonctionnels qui en avaient résulté ont pu être corrigés par des appareils ingénieux de prothèse.

M. Berger présente une petite fille de huit mois, à laquelle il a extirpé une encéphalocèle de la région occipitale, grosse comme un petit œuf. La tumeur, malgré ses petites dimensions, renfermait des tissus analogues à ceux de la plupart des parties constituant l'encéphale. L'encéphalocèle n'est donc pas due simplement à une hydropisie ventriculaire (Spring), mais se forme de toutes pièces en dehors du crâne, est le degré inférieur de l'encéphalie d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire. — Le diagnostic de la *variété* d'encéphalocèle est toujours obscur. — Le seul traitement est l'extirpation.

M. Lagneau, traitant du surmenage et de la sédentarité dans les écoles, voit deux obstacles aux réformes projetées : 1^o chaque professeur s'oppose à la réduction de sa spécialité (d'où 8 à 10 heures de travail au lieu de 7, 8, 9, de 11 à 17 ans); 2^o manque d'entente entre les administrations rédigeant les programmes d'admission aux grandes Ecoles, etc., etc., et l'Université chargée de la préparation. — **M. Brouardel** montre que l'Université ne s'arrêtera certainement pas dans la voie des réformes où elle est entrée d'elle-même.

Séance du 21 janvier 1890

M. Chauvel présente deux observations de carie costale survenue après ouverture d'abcès du foie entre les : a) septième et huitième, b) sixième et septième côtes. La carie, l'ostéite chroniques ont dû être produites par le contact d'un pus irritant et ont entraîné la formation d'un trajet fistuleux, indéfiniment persistant. En pareil cas, le traitement doit consister : à inciser le trajet, enlever les parties osseuses altérées, après avoir réséqué au besoin une côte saine pour se faire du jour, gratter les parois et laisser le bourgeonnement combler la perte de substance.

M. Terrillon présente l'observation d'un malade atteint de rétrécissement de l'œsophage, depuis huit mois nourri par une fistule stomacale (gastrostomie). En raison de l'irritation très douloureuse de la fistule, il tente la dilatation de l'œsophage, sous le chloroforme, en introduisant le doigt dans le cardia par la fistule. Impossibilité. Mais, quelques jours après, il peut passer, de haut en bas, une fine bougie; le catéthérisme de bas en haut devenant possible; quelque

temps après, la perméabilité de l'œsophage était complète. Oblitération de la fistule stomacale en deux temps. Guérison.

M. Albert Robin lit un travail du professeur **Renaut** (de Lyon) sur la « fausse imperméabilité » de certains reins brightiques, et « la thérapeutique de l'urémie coma-teuse ». Dans la majorité des néphrites interstitielles la plus grande partie des glomérules reste perméable. Le défaut de perméabilité du rein tient à un œdème causé par un réflexe d'origine bulbo-cérébrale ayant pour point de départ un empoisonnement subaigu des centres, par la toxine accumulée en même temps que l'urée dans l'organisme. Que, sous certaines influences, l'œdème devienne complet, il y a attaque d'urémie. Après cela-ci le rein peut recupérer sa perméabilité comme l'attestent les doses considérables d'urée éliminées les jours suivants. Donc le traitement doit consister : 1° à éviter l'accumulation des toxines par une alimentation laissant le moins possible de résidus (lacto-végétale, œufs, viande de porc, etc.); 2° à entretenir la perméabilité du rein par la décongestion systématique (ventouses sèches, applications discrètes de sangsues). Dans le cas d'attaque d'urémie : 1° décongestion rénale par saignée générale et applications locales, répétées de sangsues; 2° augmentation de la tension vasculaire par l'ingestion de liquides par la bouche et surtout en lavement; 3° suractivité imprimée aux combustions interstitielles par l'inhalation continue d'oxygène.

En raison de l'importance des débats relatifs à la *Prophylaxie de la Tuberculose*, nous publions après le vote un article d'ensemble résumant la discussion.

D^r E. De Lavarenne.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 18 janvier 1890

M. **Ch.-E. Quinquaud**, dans trois notes successives : 1° précise la méthode à employer pour étudier l'activité respiratoire (qu'il appelle capacité respiratoire) des divers tissus; 2° établit à ce point de vue une hiérarchie des tissus, dans laquelle le muscle est le plus actif et le sang le moins actif; 3° montre que l'absorption d'oxygène peut servir à déterminer le moment où commence la putréfaction d'un tissu. — M. **Et. Colas** établit deux périodes dans l'action de la nicotine sur le cœur et les vaisseaux : dans la première, il y a un ralentissement du cœur dû à une action directe sur les ganglions intra-cardiaques; dans la seconde, la force du cœur est augmentée et la pression monte malgré une vaso-dilatation. — MM. **Char-rin** et **Roger** ont constaté que la fatigue augmente la réceptivité des animaux pour les maladies infectieuses. Inoculant des cultures charbonneuses à des rats blancs, dont les uns étaient obligés de marcher dans un cylindre rotatif, tandis que les autres se reposaient, ils ont constamment vu les premiers mourir beaucoup plus rapidement que les seconds, avec certaines doses même ceux-ci survive, tandis que les premiers succombaient à l'infection. — M. **Fabre-Domergue** décrit un organisme parasite de l'*Hesione Stenstrupii* (annélides). — MM. **Edouard Boinet** et **A. Char-rel** ont étudié des tumeurs lépreuses rapportées d'Hanoï par le premier d'entre eux. Cherchant à déterminer l'importance des cellules géantes de ces productions, ils ne pensent pas qu'on puisse leur accorder un rôle phagocytaire.

Séance du 25 janvier 1890

M. **Cadéac** a envoyé une note intitulée : Contribution à l'étude de la maladie pyocyanique. — MM. **Ar-thaud** et **Butte** ont étudié l'influence du système nerveux sur la sécrétion biliaire; pour eux, l'excitation du bout périphérique du vague sectionné ralentit la

sécrétion; l'excitation du bout central l'accélère. — M. **Nicenti** a envoyé une note sur la fonction sécrétoire de la couche choriocapillaire de l'œil. — M. **Laborde** entretient la Société des fonctions du cerveau.

L. Lapicque.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 19 janvier 1890

M. **Lippmann**. — *Force électromotrice et différence de potentiel dans les circuits induits.*

M. Lippmann insiste sur la distinction qu'il y a lieu d'établir entre les deux termes trop souvent confondus : *force électromotrice et différence de potentiel*; dans une communication antérieure M. Pellat avait déjà appelé l'attention de la Société sur ce point important. La considération des phénomènes d'induction fournit des exemples manifestant nettement la différence : on peut imaginer des courants produits par des forces électromotrices d'induction dans des circuits où le potentiel est partout le même. Une comparaison employée entre le courant électrique et un courant d'eau rend le fait facile à comprendre : un courant d'eau peut être produit par une chute de niveau analogue à la chute de potentiel; mais il est aussi loisible de supposer de l'eau en mouvement dans un tube parfaitement horizontal, le mouvement étant produit par quelque action mécanique jouant le rôle de force électromotrice. Dans les expériences de M. Elihu Thomson, qui tout le monde a vues dans la section américaine de l'Exposition, une bobine cylindrique et verticale est parcourue par des courants alternatifs; un anneau de cuivre est placé horizontalement; son centre étant sur l'axe de la bobine, il devient le siège de courants d'induction et cependant la parfaite symétrie du système suffit à démontrer que nulle part ne peut exister de différence de potentiel.

M. Lippmann termine cette intéressante communication, en montrant l'intérêt de la distinction établie pour la théorie des machines d'induction.

M. **Moissan** répète devant la Société ses belles expériences sur le fluor. La Revue leur consacrera prochainement un article spécial.

Lucien Poincaré.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 9 janvier 1890

1^{re} SCIENCES PHYSIQUES

J.-A. Fleming. — *Sur les décharges électriques entre des électrodes à différentes températures dans l'air et dans le vide approché.* Si l'on scelle une plaque métallique dans le globe de verre d'une lampe à incandescence, et si on la réunit par un galvanomètre sensible à l'électrode positive, il se développe dans le galvanomètre un courant de quelques milliampères. Lorsque la lampe est mise en action par un courant continu, la plaque métallique isolée est instantanément abaissée au potentiel de la base de la tige négative de charbon. Lorsque la plaque isolée et l'électrode positive sont unies par un galvanomètre, il se développe un courant qui s'accroît de 0 à 3 ou 4 milliampères, à mesure que le charbon arrive à l'incandescence. Quand la lampe est mise en action par un courant alternatif, un courant continu passe par le galvanomètre, qu'il soit en rapport avec l'électrode positive ou l'électrode négative. La tige négative de charbon est l'élément actif; si elle est entourée d'un tube de verre ou isolée de toute autre manière, il ne passe plus de courant. Le maximum d'effet se produit lorsque la plaque isolée est aussi voisine que possible de la base de la tige négative de charbon; l'effet devient très faible lorsque la plaque est éloignée de quatre ou cinq pouces.

2^e SCIENCES NATURELLES

Sir J.-B. Lawes Baronet et le professeur **J. H. Gilbert** présentent une note sur de *Nouvelles expériences relatives à la question de la fixation de l'azote libre*. (MM. Hellriegel et Willfarth étaient arrivés à cette conclusion que bien que les plantes à chlorophylle les plus élevées ne puissent pas utiliser directement l'azote libre de l'air, quelques-unes d'entre elles cependant peuvent fixer de l'azote qui est entré en combinaison sous l'influence d'organismes inférieurs.) Les expériences préliminaires ont été faites avec des pois, des lupins bleus et des lupins jaunes, semés dans différents terrains. Si la quantité d'azote dans la semence est de 1 au commencement de l'expérience, le gain total dans la plante est de 9.58, lorsque les graines ont été semées dans du sable lavé auquel on a ajouté les cendres de la plante; il est de 22.03 quand elles ont été semées dans de la bonne terre de jardin. Ce gain total, cependant, en tenant compte de tous les produits, est, si l'on estime l'azote initial comme égal à 1, de 2.98 dans un cas et de 4.08 dans l'autre. — **M. Oldfield Thomas** a constaté l'existence d'une première dentition complète, bien que rudimentaire, à la mâchoire supérieure de l'*Oryctolope*, et sur une certaine longueur de la mâchoire inférieure. Cette observation étant faite sur un Edenté offre un certain intérêt pour la théorie de la descendance.

Séance du 16 janvier 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES

M. J. H. Michell : Sur la théorie des directions des courants libres. — L'objet principal de cette note est de donner une méthode générale pour la solution du problème des directions des courants libres dans des liquides soumis à un mouvement à deux dimensions, lorsque les surfaces qui les renferment sont planes. — Le professeur **Norman Lockyer** : Sur la Raie principale du spectre des Nébuleuses. L'auteur se sert du sidérostato pour observer le spectre des corps célestes, notamment celui de la nébuleuse d'Orion; il a comparé sa raie brillante principale avec le spectre donné par des substances terrestres. Cette raie coïncide avec la partie la moins réfrangible d'une des bandes du spectre de la flamme du magnésium; il est un peu moins réfrangible que la composante la moins réfrangible de la double raie de l'azote. M. Lockyer a fait en même temps une série d'expériences pour déterminer la longueur d'onde de la bande du magnésium qui coïncide avec la raie principale de la nébuleuse et de la raie de l'azote qui l'avoisine. La longueur d'onde de la bande du magnésium est de 5006.5, la longueur d'onde de la raie de l'azote, de 5005.1. La longueur d'onde trouvée pour la raie principale de la nébuleuse n'est pas éloignée de la moyenne des longueurs d'onde acceptées pour cette raie. La raie est indéfinie, à l'extrémité bleue, comme l'ont noté d'autres observateurs; on peut donc légitimement croire que cette raie est la trace d'une bande.

2^e SCIENCES NATURELLES

M. A. W. Mayo Robson : Observations sur l'excrétion et le rôle de la bile. L'auteur rapporte le cas d'une femme de quarante-deux ans, chez qui s'était produite, à la suite d'une opération chirurgicale, une fistule biliaire, par où toute la bile s'est écoulée pendant quinze mois; pendant ces quinze mois, la malade s'est bien portée. Depuis lors, elle a été complètement guérie par une autre opération, qui a supprimé la fistule. En vingt-quatre heures, la quantité de bile sécrétée était de 29,98 onces; elle variait de 39,53 onces à 23,86 onces.

R. A. Gregory.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 17 janvier 1890

Le **D^r S. P. Thompson** fait une communication sur les poudres électrisées, et présente de belles expériences sur la production des figures de Lichtenberg. L'auteur a récemment recherché les conditions qui font varier ce phénomène et est arrivé aux conclusions suivantes : La nature du diélectrique ne change pas le caractère des figures produites, et la nature des poudres employées ne semble pas avoir non plus un effet bien important sur les images. Il fait observer l'importance du rôle joué par les aspérités du plateau, le vent électrique produit par les rugosités intervenant dans le phénomène. M. Thompson a constaté ce fait curieux que ce « vent électrique » est beaucoup plus considérable si le plateau est chargé négativement que s'il est, au contraire, chargé positivement; il appelle l'attention de la Société sur ce point et serait heureux de connaître les interprétations qu'on en peut donner. — Le professeur **Rücker** dit qu'il a récemment obtenu des figures provenant des décharges sur des plaques photographiques. On observe généralement que les décharges négatives produisent des plages rondes tandis que les positives donnent des réseaux enchevêtrés. Il fait aussi remarquer le caractère très nettement distinct des décharges positives ou négatives dans un vide partiel; des recherches sur ce sujet auraient évidemment une grande importance. — Le professeur **Adams** rapproche ces faits d'un autre bien connu : il est plus difficile d'isoler une charge d'électricité négative, qu'une charge égale d'électricité positive. — Le professeur **Ayrton** lit un mémoire sur les galvanomètres, par MM. **Ayrton, T. Mather et W. E. Sumner** : Dans l'organisation du laboratoire de physique de l'Institution centrale de la Cité, les auteurs ont eu occasion d'expérimenter des galvanomètres de type très variés. Ils se sont demandé si les galvanomètres pour avoir leur sensibilité maxima devaient ou non être rendus astatiques; la question a été résolue; ils doivent être astatiques pour être moins affectés par les variations perturbatrices du champ magnétique extérieur; on a déterminé avec soin la meilleure manière de placer sur le fil le miroir servant à la lecture de la déviation. Quand on mesure des quantités d'électricité en se servant du galvanomètre comme galvanomètre balistique, on lit la première impulsion de l'aiguille, et l'on corrige d'ordinaire par un calcul compliqué le nombre obtenu, si la déviation est un peu grande; les auteurs donnent une table de réduction pour les différentes valeurs de cette déviation. Les fils et les bornes sont isolés avec des soins tout particuliers déjà décrits par le professeur Ayrton. On remarque que les instruments ordinaires diffèrent entre eux de 2^e environ, si l'on considère les angles comme proportionnels aux intensités; le galvanomètre du type d'Arsonval par exemple s'écarte de cette proportionnalité quelquefois d'une façon très notable; mais en ajoutant des pièces polaires courbes à l'aimant, on obtient une proportionnalité exacte à moins de 0.15 %, bien entendu dans des limites convenables (sur une échelle d'environ 30 pouces). Dans les usages pratiques, pour indiquer la sensibilité d'un galvanomètre, il convient de classer le nombre de degrés par microampère sur une échelle placée à une distance égale à 2,000 fois une division de cette même échelle. Une table contenant les constantes (résistance, sensibilité, coefficient de self-induction, dimensions des fils) des divers instruments étudiés, est jointe au mémoire et déposée sur le bureau. Il résulte de ces recherches que dans les meilleurs appareils à système astatique, la résistance doit être de 10 à 30 mille Ohms. A cause de l'heure avancée, la discussion relative à cette communication est remise à la prochaine séance.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 16 janvier 1890

J.-C. Tresh : Nouvelle méthode pour doser l'oxygène dissous dans l'eau. Le procédé est basé sur ce fait que, en l'absence de l'oxygène, l'acide azoteux et l'acide iodhydrique réagissent pour former de l'iode, de l'eau et du bioxyde d'azote. En présence de l'oxygène, le bioxyde d'azote est de nouveau oxydé, et l'acide azoteux formé met en liberté une quantité d'iode équivalente à la quantité d'oxygène qui existait dans l'eau. En déduisant de l'iode total la quantité d'iode mise en liberté par l'acide azoteux introduit, on peut ainsi déterminer la proportion d'oxygène contenue dans l'eau examinée. L'iode est dosé au moyen d'une liqueur titrée d'hyposulfite de soude. — **F.-J. Lloyd :** Note sur un lait de qualité anormale. — **R.-H. Adie :** Les sulfates d'antimoine. L'auteur a étudié précédemment les composés formés par l'oxyde arsénieux et l'acide sulfurique. Il examine actuellement les combinaisons de l'acide sulfurique avec l'oxyde antimonieux. Les deux oxydes donnent des sels acides avec l'acide sulfurique fumant. Avec l'acide sulfurique monohydraté, on obtient les corps $Sb^2(SO^1)^3$ et $As^2O(SO^1)^2$.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 19 décembre 1889

M. du Bois-Reymond lit un travail sur la polarisation négative interne des muscles.

Séance du 9 janvier 1890

M. Fuchs présente la suite de ses Contributions à la théorie des équations différentielles linéaires. — **M. du Bois-Reymond** présente un rapport de **M. Steiner**, de Cologne, sur ses études concernant le système nerveux central des Invertébrés.

Dr Hans Jahn.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 16 janvier 1890

Victor de Dautches : Sur l'ellipse du plus petit périmètre passant par trois points donnés. — **Joseph Loschmidt :** Etudes stéréochimiques.

Le Président, **M. Stefan**, présente la suite de son mémoire, annoncé dans notre dernier numéro, sur les *Ondulations électriques dans les conducteurs rectilignes*. Voici l'analyse de l'ensemble de son travail :

La distribution d'un courant électrique dans un conducteur à trois dimensions, ou dans un ensemble de circuits dérivés se fait de telle façon que la quantité de chaleur dégagée conformément à la loi de Joule soit minima pour une intensité totale donnée; ce fait a été établi par Kirschhoff dans le cas de conducteurs quelconques; mais il n'est vrai que s'il n'y a nulle part de force électromotrice dans les portions de circuit considérées.

Dans les courants d'intensité variable, tels que les courants périodiques, les forces électromotrices d'induction jouent un rôle considérable, si considérable même qu'elles font pour ainsi dire disparaître l'influence des valeurs différentes de la résistance sur la distribution électrique. On peut, dans beaucoup d'applications, supposer toutes les résistances nulles pour calculer cette distribution; c'est ce qu'a fait, pour la première fois, **M. G. Lippmann**.

De cette théorie, on déduit la proposition suivante : La distribution de l'intensité d'un courant variable se fait de telle façon que, pour une même intensité totale, l'énergie électro-dynamique du système est minima, ou, ce qui revient au même, l'énergie magnétique est

minima. L'énergie électro-dynamique peut, en effet, être considérée comme de l'énergie magnétique résultant de l'aimantation du conducteur et du milieu environnant.

Si l'on a affaire à un conducteur rectiligne et de section circulaire, le courant se répartit naturellement d'une façon symétrique autour de l'axe et l'action à l'extérieur est la même que s'il était tout entier concentré sur cet axe même; l'énergie du milieu environnant est donc indépendante de la distribution; l'énergie totale devant être minima, il est évident que le courant doit se condenser en une couche indéfiniment mince, répandue sur la surface, car la force magnétique est alors nulle dans tous les points du conducteur, et l'énergie interne a sa valeur la plus faible possible. — Si le conducteur n'est pas circulaire, la répartition se fait encore comme celle d'une charge d'électricité statique sur le même conducteur.

Dans ses dernières expériences, **M. Hertz** a donné des preuves très concluantes de ce fait que les onduations électriques ne pénètrent pas dans l'intérieur des conducteurs le long desquels elles se propagent, surtout quand le nombre des vibrations devient très grand.

Il est à remarquer que ces principes s'appliquent vraisemblablement au cas de chocs électriques très rapides, tels par exemple qu'un coup de foudre.

La vitesse de propagation d'une onde électrique dans un conducteur dépend de deux constantes, le coefficient de self-induction et la capacité de ce conducteur; la capacité ne varie pas avec la nature du conducteur, et, à cause du mode de distribution superficielle, l'énergie magnétique et le coefficient de self-induction doivent aussi être considérés comme indépendants de la constitution magnétique du conducteur, à condition, bien entendu, que l'on ait affaire à des courants très rapidement variables. Ce fait a été découvert par **M. Hertz**, mais il l'interprétait d'une façon plus compliquée.

Il résulte aussi des considérations précédentes que la vitesse de propagation est indépendante de la forme de la section; on démontre aisément que le produit du coefficient de self-induction par la capacité ne dépend pas de cette forme.

En résumé, on voit qu'on peut dans certains cas traiter les problèmes de distribution de l'intensité d'un courant électrique dans les conducteurs isolés et parallèles, par l'application de méthodes démontrées en électrostatique.

Émil Weyr,

Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance du 19 janvier 1890

Le Président annonce la mort du prince Amédée, frère du Roi, et lève la séance en signe de deuil.

Ernesto Mancini.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE TURIN

Séance du 12 janvier 1890

M. Segre présente pour l'insertion aux *Actes* : « Un nouveau champ de recherches en géométrie. » — **M. Basso** communique une monographie de **M. Righi** sur les forces élémentaires électro-magnétiques et électro-dynamiques. — **M. Cossa** présente, pour l'insertion aux *Actes*, deux mémoires de **M. le Dr L. Gazzino** : 1° « Recherches sur les phénols chlorobromés et bromobichlorés »; 2° « Recherches sur les phénols métabichlorés et métabromés. »

Dr Boschetti.

ACADÉMIE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE TURIN

Séance du 12 janvier 1890

Dans une lettre au Président, **M. Collilanzi**, de Novare, décrit une épizootie spéciale qui sévit en ce moment sur les bœufs. — **M. Griglio**, de Palerme, envoie à l'Académie la description des ravages considérables que le *charbon* a causés en Sicile en 1889. M. le secrétaire général, Professeur **De Silvestri**, appelle l'attention de l'Académie sur l'urgence d'assurer le fonctionnement régulier du service vétérinaire, si souvent réclamé en Italie, mais que cependant le ministère n'a pu encore établir. — **M. Perroncito** répond qu'en sa qualité de Président de l'Académie, il a pris part aux délibérations y relatives et pu se convaincre des bonnes dispositions du gouvernement au sujet des mesures d'hygiène. Le Roi lui-même a rendu hommage au talent déployé par le Dr Bottero dans la lutte entreprise par ce savant, en faveur des vaccinations anti-charbonneuses en Italie. — M. le Président communique à ce sujet une lettre de **M. Pasteur**. Les sentiments exprimés à l'Académie par cet illustre parmi les illustres sont accueillis avec une respectueuse et reconnaissante émotion. — **M. Airoidi** entretient l'Académie de l'activité mise par l'Institut Pasteur de Turin au service des vaccinations anti-charbonneuses. Il prie M. le Président d'intervenir près de M. le Ministre de l'Agriculture, au sujet du vaccin, que les vétérinaires ne cessent de réclamer, mais qu'on ne peut pas envoyer gratuitement. — **M. Boschetti** rend compte de l'heureux résultat des vaccinations pratiquées par lui à Villanova d'Asti avec le concours de **M. le Dr Sanaglia**. — **M. Bertacchi** décrit les analogies et les différences que présentent l'*Influenza* de l'homme et celle des animaux. — **M. Boschetti** développe, à ce sujet, ce qu'il

avait déjà indiqué à la dernière séance : il faudrait étudier la maladie d'une façon comparative, car elle a l'air d'une maladie animale : en Autriche, Hongrie, Russie, même en certaines villes italiennes, l'*Influenza* a fait son apparition simultanément chez l'homme et les animaux ; en Angleterre elle a frappé les chevaux avant l'homme. Presque tout le monde a été malade. Le contagement encore inconnu de la maladie doit être bien virulent, car les bronchites et pneumonies qu'elle développe sont galopantes. Aussi serait-il dangereux de ne voir dans l'*Influenza* qu'une maladie bénigne. MM. les Professeurs Brouardel et Proust à Paris, tous les grands médecins et hygiénistes en Italie l'ont d'abord envisagée comme telle. Mais il faut se défier de l'optimisme en hygiène ; il tend à prévaloir dans les Académies et les conseils de l'Etat ; nous en voyons les conséquences en constatant la mort de tant de gens instruits, — médecins, artistes, professeurs, — qui ne se sont pas soignés. — **M. Massa** expose ses recherches sur le *Choléra des pigeons*. Il a observé d'abondantes hémorrhagies intestinales ; mais il a toujours constaté l'absence du pointillé décrit comme constitué par des colonies de microbes spécifiques de la maladie. — **M. Massa** a découvert dans le fromage de Lodi un micro-organisme particulier, qui paraît chromogène. Ce microbe pullulant exclusivement dans la partie verte du fromage, l'auteur lui attribue la production de la matière colorante. Il poursuit ses recherches sur ce sujet. — **M. Perroncito** montre un cysticerque semblable au *C. Cellulosa*, qui vivait à l'état de cystide dans la foie d'un singe ; puis un cœur de sanglier avec un Cystis d'*Echinococcus* dans le ventricule gauche. — **M. Baes** décrit un cas de dilatation énorme de la vésicule biliaire, provoquée par les distomes. Il a trouvé dans la vésicule les œufs de ces animaux.

Dr Boschetti,

Membre de l'Académie.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

G. A. HIRN

Notre chère Alsace pleure un de ses plus illustres enfants : Gustave Adolphe Hirn est mort à Colmar, le 14 janvier, à l'âge de 75 ans ; le défunt était chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de la Rose du Brésil, officier de l'ordre de Léopold, membre correspondant de l'Institut de France, associé des académies de Belgique, du Danemark, de Madrid, de Stockholm, de Saint-Petersbourg, de Bologne, de Rome, etc., etc. Malgré tant et de si glorieux titres, il aimait à rappeler qu'il était président de la Société d'Histoire naturelle de Colmar.

L'histoire de sa vie sera écrite, car elle est pleine de grands enseignements et de nobles exemples ; c'était un industriel, qui consacra avec désintéressement sa fortune, ses talents, son temps et sa vie tout entière aux études et aux recherches scientifiques. Né le 21 août 1815, au Logelbach, près de Colmar, il entra, à 19 ans, dans la fabrique d'impressions de son grand-père maternel, laquelle se transforma bientôt et devint une filature et un important tissage de coton, sous la raison sociale Haussmann, Jordan, Hirn et Cie. C'est là qu'il inventa, en 1850, le mode de transmission de l'énergie par câble téléodynamique ; une puissance de trente-huit chevaux fut transportée, avec un rendement inespéré, à 240 mètres de distance par l'intermédiaire d'un câble métallique flexible, marchant à grande vitesse sur des poulies légères, de plus d'un mètre de diamètre. Le prix du transport d'un cheval-heure à 1,000 mètres ne dépasse pas $\frac{2}{10}$ de centime par

ce procédé. Une semblable découverte pouvait enrichir l'ingénieur qui l'avait faite : Hirn préféra l'honneur à l'argent ; il ne prit aucun brevet, autorisa tout le monde à l'imiter et donna librement tous les renseignements qu'on lui demandait.

Hirn laisse une œuvre scientifique considérable ; il fut ingénieur, mécanicien, astronome, physicien et philosophe.

On retrouve l'esprit pratique de l'ingénieur et le jugement du mécanicien dans toutes ses productions, mais son génie se révèle surtout dans quelques inventions plus heureuses, parmi lesquelles nous citerons celle du pandynamomètre de torsion et de flexion ; en déterminant l'angle de torsion d'un arbre ou la flexion d'un balancier, on mesure le travail avec une remarquable précision, dans les cas où l'emploi du frein de Prony serait impossible ou trop dangereux.

L'astronome a étudié les conditions d'équilibre et la nature des anneaux de Saturne ; il a apporté sa contribution aux théories proposées pour expliquer la production et l'entretien de la chaleur solaire.

Mais c'est surtout le physicien qui restera : son œuvre capitale est la *Théorie mécanique de la chaleur* et son nom ne pourra pas être séparé de ceux des immortels créateurs de cette science. Il y débuta, croyons-nous, en 1858, par ses *Recherches sur l'équivalent mécanique de la chaleur*, qui furent couronnées par la Société de Physique de Berlin ; ses remarquables expériences sur le frottement et l'écoulement de l'eau, l'écrasement

du plomb et le forage du fer le conduisirent à assigner une valeur de 432 kilogrammètres à l'équivalent de la calorie; le premier, il constata expérimentalement que dans une machine à vapeur il disparaît toujours une quantité de chaleur proportionnelle à la totalité du travail fourni; il démontra ensuite que la même relation existe entre le travail dépensé et la chaleur produite dans l'organisme humain, assimilable, à cet égard, aux moteurs thermiques en général. Il formula des lois théoriques qui portent son nom: la loi de la détente isodynamique, effectuée sans variation de chaleur et sans production de travail externe, la loi qui établit la proportionnalité à la température absolue du produit du volume interatomique par la somme des pressions interne et externe, etc.; il établit d'autres relations encore, qui sont exposées, un peu confusément peut-être, dans son magistral traité de *la Théorie mécanique de la chaleur*, dont la troisième édition parut en 1875.

Le physicien redevint ingénieur, quand il chercha à établir la théorie des machines à feu: il inaugura une méthode essentiellement expérimentale, qui devait faire connaître tous les phénomènes qui se passent dans l'intérieur des cylindres. Des ingénieurs et des savants lui apportèrent leur collaboration; MM. Leloutre, Hallauer et Grosseteste de Mulhouse et Dwelshauvers-Dery de Liège l'assistèrent dans ses mémorables recherches, poursuivies de 1873 à 1878, avec un zèle infatigable, et c'est ainsi que fut mise en lumière l'influence thermique des parois sans laquelle on ne saurait se rendre compte rationnellement du fonctionnement des machines à vapeur. Les travaux de l'école alsacienne ont été critiqués, mais tous les esprits impartiaux s'accordent à reconnaître qu'ils feront époque dans l'histoire des moteurs thermiques.

Signalons encore à l'actif du physicien les travaux qu'il publia avec Cazin, sur la détente des vapeurs sur-

chauffées (1866), un mémoire sur les propriétés optiques de la flamme dans les corps en combustion (1873), une étude sur une classe particulière de tourbillons (1878), une étude sur le métronome (1885), etc. et de nombreuses notices météorologiques et statistiques sur l'Alsace.

Arrivons au philosophe et au penseur qui se révèle dans les *Conséquences philosophiques de la Thermodynamique*: cet ouvrage important ne saurait être analysé ici, mais nous croyons pouvoir en faire ressortir l'idée dominante. Hirn se proposait de « réfuter le matérialisme et le panthéisme pour couronner le spiritualisme »: ce peu de mots suffit pour faire ressortir le but élevé de ce travail, dans lequel tout n'est pas à louer également, mais qui témoigne des hautes préoccupations de ce grand esprit. Il y enseigne que la force est un élément spécifique de l'univers, distinct de la matière; il repousse avec énergie la théorie cinétique actuellement en honneur dans la science et en particulier la théorie des gaz. Pour appuyer son argumentation, il publia en 1884 un *Mémoire sur l'écoulement et le choc des gaz en fonction de la température*, qui souleva une vive controverse; il y répondit par des brochures sur la *Cinétique moderne et le dynamisme de l'avenir* et sur la *Notion de force dans la science moderne*. Ces questions sont trop graves pour que nous nous permettions de nous y arrêter davantage dans cette courte notice.

Nous l'avons dit, l'œuvre de Hirn est considérable et cette longue et laborieuse carrière a été d'une remarquable ampleur et d'une admirable fécondité. Le savant a creusé un large et profond sillon dont on reconnaît longtemps la trace dans les diverses sciences qu'il a cultivées; la gloire sera la première récompense de son labeur, mais son amour du bien et du vrai, sa bonté, son désintéressement, ses nobles vertus recevront, nous n'en doutons pas, une récompense plus durable encore.

Aimé Witz.

NOUVELLES

LA DISCUSSION RÉCENTE DES EXPÉRIENCES DE M. HERTZ

L'année qui vient de s'écouler a vu se créer de toutes pièces une fortune scientifique exceptionnelle. En 1888, M. Hertz était connu de ceux seulement qui suivent de près le mouvement des idées; aujourd'hui, son nom est dans toutes les bouches; beaucoup d'hommes de sens le placent au niveau des plus grands physiciens; les Universités de Berlin et de Bonn se le disputent; l'Académie des sciences de Paris vient de lui décerner le prix La Caze.

Anticipons un peu, afin de rendre justice au caractère de M. Hertz; peu de gens sont moins *hertzistes* que lui, et c'est avec une parfaite modestie qu'au dernier Congrès des naturalistes allemands, il attribuait à Faraday et à Maxwell tout l'honneur des théories dont ses expériences n'avaient pour ainsi dire donné, selon lui, qu'une démonstration populaire.

Ce n'est point le moment de refaire l'histoire détaillée de la doctrine de l'action du milieu. Emise par Faraday, elle fut développée plus tard par Maxwell, qui trouva, dans certaines relations mathématiques et déterminations numériques, des preuves éclatantes de l'exactitude des vues de Faraday.

Maxwell alla plus loin; dans son immortel *Treatise of electricity and magnetism*, il jeta les bases d'une doctrine merveilleuse, la théorie électromagnétique de la lumière. Comme on va le voir, le point de départ était simple, presque aussi simple que l'œuf de Christophe Colomb, mais pour le concevoir, il fallait se débarrasser de tout ce que l'on savait.

« En plusieurs passages de ce Traité, dit Maxwell, on a tenté d'expliquer les phénomènes électriques par une action mécanique transmise d'un corps à l'autre

par l'intermédiaire d'un milieu qui remplirait l'espace compris entre les corps. La théorie ondulatoire de la lumière suppose aussi l'existence d'un milieu. Nous avons maintenant à montrer que le milieu électromagnétique a des propriétés identiques à celui qui propage la lumière (1). »

Maxwell démontre ensuite que la vitesse de propagation des perturbations électromagnétiques est égale au rapport v de l'unité électro-magnétique à l'unité électrostatique d'électricité. Or les mesures faites à l'époque où Maxwell écrivit son Traité permettaient déjà de comparer cette vitesse à celle de la lumière. Ces deux vitesses étaient exprimées par des nombres du même ordre de grandeur, sans que l'on pût encore affirmer leur égalité.

La question paraissait donc jugée; pourquoi a-t-il fallu plus de vingt ans pour qu'elle entrât dans les notions courantes? C'est probablement parce que l'étude du Traité de Maxwell ne peut être abordée sans de solides connaissances mathématiques et la ferme volonté de vaincre les difficultés. Cependant, chacun connaissait, au moins de nom, la théorie de Maxwell, et ne demandait qu'à être définitivement renseigné sur son exactitude. C'est à M. Hertz qu'était réservée la rare bonne fortune de rendre tangible, par des expériences faciles à répéter, la propagation des actions électriques. Il concentra toutes les curiosités. Des sociétés savantes, ses expériences passèrent dans les

(1) MAXWELL, *Traité d'électricité et de magnétisme*, traduction de M. Schlegmann-Lui, t. II p. 485 (Gauthier-Villars).

revues, puis dans les journaux quotidiens, faisant bouillir de neige d'enthousiasme.

Pour montrer que les actions électromagnétiques se propagent avec une vitesse finie, il fallait produire une action variable, et saisir sa variation dans l'espace. Nous essayerons de montrer de quelle manière le problème a été résolu.

Considérons un courant alternatif, produisant dans l'espace environnant, un effet d'induction qui se propage avec une vitesse V , supposée d'avance peu différente de celle de la lumière. Si T est la période d'une oscillation complète, la longueur λ des ondes d'induction sera égale à VT . Pour une période de $\frac{1}{1000}$ de seconde, la longueur d'onde est de 300 kilomètres. On se proposait de mesurer une onde entière ou même plusieurs ondes : comme les effets d'induction ne peuvent être mesurés qu'à 15 ou 20 mètres au plus des appareils, il fallait à tout prix produire des oscillations beaucoup plus rapides.

Sir W. Thomson a démontré que, lorsqu'on réunit deux conducteurs chargés à un potentiel différent, il se produit, dans certaines circonstances, une décharge oscillatoire. La durée de l'oscillation dépend en particulier de la forme des conducteurs (capacité et auto-induction), et peut être rendue extrêmement rapide. Pour la réalisation expérimentale, il manquait encore un dispositif permettant d'établir un contact de très courte durée. Et voici où se place l'idée importante et absolument originale de M. Hertz : en faisant jaillir entre deux boules de métal poli une étincelle d'une *qualité* particulière, le circuit se trouvait fermé pendant un temps de l'ordre du milliardième de seconde. Certains appareils (excitateurs) ont été construits de manière à produire théoriquement des oscillations électriques dont la longueur d'onde n'excédât pas 30 centimètres. L'effet d'induction est constaté au moyen de l'étincelle qui jaillit dans l'interruption d'un fil métallique courbé en cercle; ce fil est un *résonateur*.

Muni de ce dispositif, M. Hertz étudie la réflexion de l'onde électrique sur une paroi métallique; sa réfraction au travers d'un bloc d'asphalte; sa concentration par des miroirs, sa propagation le long d'un fil. Tous les phénomènes de l'optique ou de l'acoustique sont imités par l'onde électrique. Devant un miroir plan, on constate des ondes fixes; le maximum d'intensité des phénomènes est dévié de la ligne droite par le passage des ondes dans un diélectrique. M. Hertz trouve, dans un fil, des ondes semblables à celles qui se produisent dans l'air; elles ont une longueur parfaitement constante *pour un même exciteur*, et, en mesurant cette longueur dans un fil et dans l'air, M. Hertz est amené à déclarer que la vitesse des ondes électriques dans l'air est du même ordre que celle de la lumière. Ces expériences de M. Hertz furent bientôt répétées dans les principaux laboratoires de l'Europe; les préoccupations de l'Exposition, qui s'étendaient au loin, ne permirent pas de les faire avec tout le soin désirable; elles avaient plutôt partout le caractère d'expériences de démonstration. Le succès n'était pas toujours complet, ce qu'on attribuait à des défauts d'appareils, mal copiés pensait-on, sur ceux de M. Hertz. Cependant, dès l'abord, plusieurs difficultés se présentèrent. Telle étincelle est bonne, telle autre ne vaut rien; une bobine d'induction, employée pour charger l'excitateur, donne de bons résultats; on n'obtient rien avec une machine de Holtz. Par hasard, un tube de Geissler est un bon résonateur; cinq cents autres ne résonnent pas. A chaque nouvelle expérience se place un pourquoi auquel on ne trouve pas de réponse. Les esprits chercheurs demandent à être mieux renseignés, et attendent des détails plus précis sur les expériences concluantes.

La place dont nous disposons ne nous permet pas de nous arrêter plus longuement sur plusieurs points de détail qui sont loin d'être clairs; nous avons hâte d'en venir aux dernières nouvelles.

Il y a un mois, une commission de l'Académie des sciences fut chargée de décerner un prix pour le *meilleur travail sur la physique* fait dans les deux dernières années. Le prix fut décerné à M. Hertz, tout en faisant « des réserves formelles sur la valeur démonstrative de certains résultats ». Les membres de la Commission qui avaient insisté sur ces restrictions ne se croyaient pas si près de voir leurs craintes confirmées par l'expérience.

Le 13 janvier, M. Cornu a présenté à l'Académie une note de MM. Edouard Sarasin et Lucien de la Rive (de Genève), dans laquelle ces habiles expérimentateurs annoncent une *résonance multiple* et démontrent que la longueur d'onde observée dans un fil est étroitement liée au résonateur. Avec un même exciteur et des résonateurs variant du simple au double, ils trouvent des longueurs d'onde qui leur sont proportionnelles.

« Ce résultat, dit à cette occasion M. Cornu, est extrêmement grave pour la théorie de M. Hertz : en effet, le seul élément expérimental fixe et incontestable paraissait être la valeur de la longueur d'onde de la propagation électrique correlative d'une période bien définie de l'excitateur.

« Nous apprenons aujourd'hui que cette longueur d'onde est variable avec l'appareil d'observation : la théorie de M. Hertz est alors enfermée dans un dilemme dont les deux termes sont également fâcheux : l'expérience montrant que $\lambda = VT$ est variable, ou bien c'est la période T qui n'est pas fixe et unique, conclusion contraire à l'hypothèse fondamentale, à l'idée originale de l'auteur; ou bien c'est le facteur V qui est variable avec l'explorateur, conséquence absurde, puisque V doit représenter la vitesse de propagation de l'induction, c'est-à-dire une constante spécifique.

« On voit qu'il est très prudent de procéder comme l'ont fait MM. Sarasin et de la Rive, c'est-à-dire d'étudier d'abord et avec précision la méthode expérimentale, très curieuse, imaginée par M. Hertz, avant de songer à la présenter comme une démonstration de l'identité de l'électricité et de la lumière ».

Avant même que les expériences de MM. Sarasin et de la Rive aient donné lieu à cette critique de M. Cornu, l'éminent physicien avait déjà formulé des doutes à l'égard des conclusions de M. Hertz.

Dès la première séance de la Société française de physique dans laquelle les expériences de M. Hertz furent fidèlement répétées par M. Joubert, M. Cornu montra un scepticisme marqué sur divers points, et en particulier sur le calcul de la période d'oscillation de l'excitateur. Aujourd'hui, M. Cornu répète que ce calcul repose « sur des bases contestables »; peut-on, en effet, calculer la période de l'excitateur sans faire intervenir l'énorme capacité, l'auto-induction et la résistance très considérable de la bobine qui sert à charger l'excitateur? N'est-ce point là le motif des insuccès auxquels conduit l'emploi d'une machine de Holtz? C'est ce que de nouvelles expériences nous apprendront peut-être.

De quelle manière que l'on envisage la question, on reconnaît que la communication de MM. Sarasin et de la Rive commentée par M. Cornu constitue un gros événement scientifique. Sans attaquer les bases de la méthode de M. Hertz, ni les conclusions que l'on pourra en tirer, les faits récents amènent à penser que plusieurs détails importants de cette méthode ne pourront être considérés comme définitivement acquis à la Science que lorsqu'ils auront été soumis au crible d'une expérimentation nouvelle.

Ch.-Ed. Guillaume.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

ÉTUDES RÉCENTES SUR LES COMÈTES ET LES ÉTOILES FILANTES

De tout temps l'apparition des comètes a vivement frappé les imaginations et partout ces astres ont été considérés comme des présages, heureux ou malheureux suivant les circonstances, mais en général malheureux et même terribles. Jusqu'à la fin du xvi^e siècle on les considéra, avec Aristote, comme de simples *météores*, c'est-à-dire comme des phénomènes ayant leur siège dans l'atmosphère terrestre; et par suite on ne crut pas utile d'observer leurs routes dans le ciel. A cette époque, elles renversèrent l'hypothèse si persistante de l'incorruptibilité des cieux, qui les emprisonnait dans l'orbite de la lune; en même temps elles prirent rang parmi les astres et on commença de les observer; mais leur vraie route ne fut découverte que par Newton. Dès ce moment, il fut possible de fixer leur véritable orbite parmi les planètes et leur apparition n'eut plus rien de merveilleux. La découverte de la périodicité de la comète de Halley augmenta l'intérêt qui s'attachait à leur étude et à partir du xviii^e siècle on ne se contenta plus de les observer quand elles se présentaient fortuitement; on les chercha avec assiduité : Messier le premier s'est acquis dans cette sorte d'investigation une grande célébrité. Depuis lors, l'intérêt présenté par les comètes ne s'est pas affaibli; on les cherche aujourd'hui avec tant de zèle que certaines d'entre elles, quoique faibles, sont découvertes à peu près en même temps par plusieurs astronomes. On les étudie ensuite aussi longtemps que le permettent les puissants instruments dont on dispose, parce qu'elles ont fourni sur la constitution de l'Uni-

vers des données extrêmement importantes, et promettent de nous révéler encore bien des secrets. De plus, en raison des difficultés que présente le calcul de leurs perturbations, elles sollicitent les efforts des Analystes et contribuent ainsi aux progrès des Mathématiques elles-mêmes.

I. — NOMBRE DES COMÈTES

Le nombre de comètes vues jusqu'ici et dont il a été possible de calculer les orbites s'élève à près de 350, parmi lesquelles 13 ont été vues plusieurs fois avec certitude, de sorte que leur périodicité est bien établie; 17 autres (1), vues une seule fois, ont des périodes inférieures à 100 ans, mais il est prudent de ne pas les inscrire définitivement sur la liste des comètes périodiques, car certaines d'entre elles n'ont pas été revues aux époques indiquées par le calcul, soit par suite de leur désagrégation, soit à cause de perturbations qu'elles ont subies de la part des grosses planètes. Ces perturbations, qui ont pu changer complètement leurs routes, ne peuvent être calculées avec précision, parce que, en général, les observations d'une seule apparition sont insuffisantes pour bien déterminer les éléments de l'orbite, particulièrement le grand axe.

Les anciens avaient remarqué seulement les comètes les plus brillantes; jusqu'à l'invention des lunettes on en trouve à peine 44 dont on ait pu dé-

(1) Il faudrait peut-être les réduire à 15, car Le Verrier a montré presque avec certitude que la comète de Vico est la même que celle de 1678; et la comète de Blanpain (1819) pouvait être identique avec celle de Grischow (1743).

terminer les orbites, et tant mal que bien d'ailleurs, parce que, comme je l'ai déjà dit, on ne cherchait pas à fixer leurs positions avec exactitude.

C'est en 1678 que fut rencontrée la première comète télescopique : découverte par La Hire à Paris avec une lunette, elle resta toujours invisible à l'œil nu. Le total de celles qui ont été découvertes avant 1700 et dont on a pu calculer les orbites est de 62 ; le XVIII^e siècle en vit découvrir à peu près autant (59) ; le XIX^e siècle sera plus riche encore, car de 1801 à 1890 il en a été observé 208 (1).

En 1889, il en a été découvert sept dont l'une [d 1889 = 1889 V (2)], trouvée par M. R. Brooks, à Genève (Etat de New-York), le 6 juillet, est des plus intéressantes : d'abord elle est périodique et sa durée de révolution est assez courte, car une détermination provisoire donne sept ans. En 1886 elle a passé très près de Jupiter qui a dû changer considérablement son orbite. M. Chandler pense qu'elle pourrait être identique à la célèbre comète de Lexell (1770 II).

En outre, elle était accompagnée de plusieurs autres petites comètes qui sans aucun doute se sont formées à ses dépens.

II. — LE MILIEU RÉSISTANT

La comète d'Encke, appelée aussi comète de 1200 jours parce que c'est à peu près sa période, présente une anomalie très remarquable en ce que la durée de sa révolution diminue progressivement, ainsi que Encke le reconnut le premier ; cette découverte a été confirmée par les calculs de von Asten et de M. Backlund : de 1819 à 1868, le retour au périhélie s'est ainsi avancé de 12 jours. Mais cette diminution de la durée de révolution, régulière jusqu'à 1868, a changé par suite de causes encore inconnues : on attribue le fait à une modification dans la constitution physique de la comète. L'accélération du moyen mouvement, qui était d'abord de 0^m10, n'est plus que de 0^m03, d'après les observations faites de 1871 à 1883. Le calcul des perturbations de cette comète est rendu d'ailleurs doublement pénible par la rapidité de son mouvement et par son passage fréquent près de divers planètes, qui la troublent fortement. Ainsi, en 1838 et en 1878, elle s'est beaucoup rapprochée de Mercure ; les perturbations produites par cette planète étaient alors assez considérables pour fournir une détermination nouvelle de sa masse : en admettant

que l'accélération du moyen mouvement de la comète n'ait pas varié de 1881 à 1883, M. Backlund a trouvé pour la masse de Mercure (celle du soleil étant prise pour unité) $\frac{1}{2,608,700}$ valeur à peu près double de celle qui était généralement admise.

Encke expliqua l'accroissement de vitesse de sa comète par l'action d'un milieu résistant hypothétique qui, à chaque instant, courbant un peu plus la route de la comète, la rapprocherait du Soleil et diminuerait ainsi la durée de sa révolution.

Déjà en 1744, de Chéseaux avait émis l'idée d'un milieu répandu dans l'espace céleste et exerçant une certaine extinction sur la lumière ; Euler, Boscovich, Laplace, etc., examinèrent successivement l'influence qu'un tel milieu pourrait avoir sur les mouvements des astres.

La découverte de l'accélération du moyen mouvement de la comète d'Encke donna une assez grande probabilité à l'existence de ce milieu, dont Encke supposait la résistance proportionnelle au carré de la vitesse de l'astre et à l'inverse du carré de la distance au Soleil.

En 1861 les recherches de M. A. Møller firent naître l'espoir que la comète de Faye présenterait un second exemple de l'énigmatique accélération ; mais dans la suite il a été possible de représenter les observations en ne faisant intervenir que la seule loi de l'attraction universelle.

Plus tard Oppolzer crut rencontrer une accélération analogue pour la comète de Winnecke ; mais les recherches plus approfondies que M. de Hærdtl vient de publier montrent qu'il n'y en a aucune trace.

La comète d'Encke offre donc le seul exemple jusqu'ici connu de cette anomalie ; il est vrai que, de toutes les comètes périodiques, c'est celle qui se rapproche le plus du Soleil ; mais des comètes non périodiques s'en rapprochent beaucoup plus encore ; telle fut la grande comète de 1882 dont on obtint de bonnes positions avant son passage au périhélie et qui rasa presque la surface du Soleil. Si le milieu résistant existait, du moins tel que le concevait Encke (1), son action, proportionnelle à l'inverse du carré du rayon vecteur, aurait dû être notable, et cependant M. Kreutz a pu représenter toutes les observations sans faire intervenir un tel milieu.

Ce résultat, rapproché de la variation inexplicable de 1868, est peu favorable à l'existence d'un milieu résistant, repoussée autrefois par Bessel et combattue encore il y a quelques jours par M. Faye. Toutefois avant de l'abandonner défini-

(1) En comptant pour une seule les diverses apparitions de la même comète périodique.

(2) C'est-à-dire la quatrième (d) comète découverte en 1889, et la cinquième (V) de la même année dans l'ordre des passages au périhélie. De même e 1888 = 1889 I, désigne la cinquième (e) comète découverte en 1888, mais qui a passé au périhélie qu'en 1889 et la première de cette année.

(1) Oppolzer pensait qu'il faudrait tenir compte, en outre, de la densité de la matière cométaire, avec laquelle peut varier la résistance du milieu.

tivement, il est bon d'attendre que l'on ait étudié complètement la comète de Brorsen, la seconde des comètes périodiques dans l'ordre des distances au Soleil, et dont la théorie a été un peu négligée.

III. — COMÈTES DOUBLES OU MULTIPLES

La division de la comète découverte en 1889 par M. Brooks a rappelé l'attention sur les comètes multiples. Les anciens nous ont laissé la description de comètes qui se sont partagées; mais leurs récits furent traités de fables jusqu'au premier dédoublement bien constaté, celui de la célèbre comète périodique de Biéla, dont la durée de révolution est de 6 ans $\frac{3}{4}$: elle se dédoubla vers la fin de 1845 et fut revue en 1852, époque où les deux parties étaient fort écartées. Elle n'a plus été aperçue depuis, bien qu'en 1865 par exemple elle se trouvât dans d'excellentes conditions de visibilité. En 1872 et en 1885 elle devait être voisine de la Terre; on la considère comme l'origine des pluies extraordinaires d'étoiles filantes du 27 novembre de ces deux années.

La comète 1860 I, découverte à Olinda (Brésil) par M. Liais, fournit le second exemple de comète double.

La grande comète de 1882 (1882 II) qui fut visible en plein jour les 18 et 19 septembre, et dont le noyau se divisa sous les yeux des observateurs, était accompagnée de fragments cométaires assez nombreux, remarqués principalement par M. Barnard. Aussi il a examiné, dit-il, depuis cette époque les environs des nombreuses comètes qu'il a observées; c'est ainsi qu'il a découvert, le 1^{er} et le 2 août 1889, divers compagnons (ou petites comètes secondaires) très voisins de la comète Brooks et dont le plus brillant a été observé assez longtemps: il avait une queue dirigée comme celle de la comète elle-même; il s'écartait assez rapidement de celle-ci en ligne droite, ce qui montre bien qu'il s'était formé aux dépens de la comète même, et à une époque très peu éloignée.

Ces divisions de comètes soulèvent des questions du plus haut intérêt. Se produisent-elles sous l'influence de perturbations extérieures ou de causes intestines? C'est ce que l'on ignore exactement; à priori on conçoit plusieurs causes: si par exemple une comète passe très près d'une planète, les différences d'action de celle-ci sur les diverses parties de la comète seront considérables et il pourrait en résulter un commencement de division qui se continuerait ensuite.

Pour la comète Brooks de 1889 certains observateurs ont vu la queue du compagnon principal se prolonger jusqu'à la comète même; et tandis que l'éclat de la comète diminuait, celui du com-

pagnon allait en augmentant, comme si une portion de la comète s'était écoulée dans le compagnon. Les deux parties de la comète de Biéla avaient déjà offert des fluctuations de ce genre, l'une augmentant d'éclat, quand l'autre diminuait.

Les changements intérieurs que subissent les comètes se manifestent d'autres fois par de grandes variations d'éclat, dues sans doute à des éruptions, mais dont la cause nous échappe également. Ainsi la comète périodique Pons-Brooks, dont la durée de révolution est de 71 ans $\frac{1}{2}$ et qui a été visible en 1883-84, a présenté à plusieurs reprises des variations d'éclat considérables et presque subites; plus récemment, la comète Sawerthal (1888 I) a présenté des fluctuations plus considérables encore avec cette circonstance remarquable que, lorsque le noyau devenait plus brillant, la nébulosité perdait de son éclat, et inversement; pour la comète de Halley on avait déjà remarqué cette sorte de compensation entre l'éclat du noyau et celui de la chevelure.

IV. — ORIGINE DES COMÈTES

Les comètes périodiques sont généralement faibles; soumises plus longtemps que les autres à l'action des planètes, elles doivent se diviser plus rapidement que les comètes non périodiques; on a vu en effet avec quelle rapidité s'est dispersée la matière qui formait celle de Biéla. Puisqu'elles se désagrègent ainsi, comment se fait-il que toutes n'aient pas encore disparu en lambeaux? C'est, sans doute, ce qui aurait déjà eu lieu, si elles ne se renouvellent point. Quelle est donc l'origine des comètes? Pour certains astronomes elles appartiennent toutes et toujours au système solaire; toutes seraient périodiques, décrivant des ellipses plus ou moins allongées dont le Soleil occuperait un des foyers. Les comètes seraient alors le résidu de la nébuleuse primitive aux dépens de laquelle a été formé le système solaire, ou, suivant d'autres, des matériaux provenant des grosses planètes et projetés dans l'espace par des volcans, auxquels on peut supposer, en remontant assez haut, beaucoup plus d'énergie qu'à ceux qui sont en activité sous nos yeux. Mais l'hypothèse la plus généralement adoptée est celle de Laplace, d'après laquelle les comètes, venant de l'espace inter-stellaire, marchent à l'origine sur des orbites paraboliques ou hyperboliques, pénètrent dans le système solaire en étrançant pour en ressortir le plus souvent, mais quelquefois s'y trouvent fixées par l'action perturbatrice d'une planète; dans d'autres cas cette planète peut déformer leur ellipse actuelle, la transformer en parabole ou en hyperbole et rejeter ainsi la comète hors du système solaire.

Tel a été sans doute le cas de la célèbre comète de Lexell (1770 II), découverte à Paris par Messier le 14 juin 1770, et à laquelle Lexell reconnut une durée de révolution de 5 ans $\frac{1}{2}$. Mais, se demanda-t-on aussitôt (1), « comment se peut-il faire qu'une comète qui revient à nous tous les cinq ans et demi ait été observée pour la première fois en 1770? » Citons textuellement la réponse de Lexell : c'est l'origine de la théorie de la capture des comètes périodiques par les planètes (2) : « On pourrait, dit-il, hasarder plusieurs conjectures, pour rendre raison d'un événement si singulier, mais je me contenterai d'en proposer une qui paraît très probable. Comme la distance aphélie de la comète au Soleil est presque égale à la distance de Jupiter à cet astre, il naît de là un soupçon qu'il a pu se faire que le mouvement de cette comète fut autrefois dérangé par l'action de Jupiter, de manière qu'elle ait décrit une orbite toute différente de celle qu'elle parcourt actuellement : on trouve par le calcul que cette comète a été en conjonction avec Jupiter, le 27 mai 1767, et que la distance de l'une à l'autre n'était que $\frac{1}{560}$ de la distance de la comète au Soleil, d'où, ayant égard aux masses de Jupiter et du Soleil, on conclut que l'action de Jupiter sur la comète était trois fois plus grande que celle du Soleil, et que par conséquent elle a été assez forte pour changer le mouvement de cette comète d'une manière d'autant plus sensible, que n'ayant dans son aphélie qu'un mouvement fort lent, elle a été exposée plus longtemps à l'action de Jupiter. » Lexell ajoute qu'en 1779 la comète passerait plus près encore de Jupiter qu'en 1767 et que par suite la comète subirait « un changement total dans son mouvement ». Et cette comète n'a peut-être pas été revue depuis (3). Le résultat singulier auquel était parvenu Lexell ne devait être admis qu'après les preuves les plus incontestables, et, pour les acquérir, l'Institut proposa comme sujet de prix pour l'an IX la détermination de l'orbite de cette comète. Le mémoire couronné, celui de Burekhardt, conduisit à peu près aux résultats antérieurs, sur lesquels il ne resta plus alors aucun doute. Laplace confirma ensuite l'hypothèse de Lexell en faisant calculer l'action de Jupiter en 1767 et en 1779 : il trouva que la comète avait dû être invisible avant la première de ces époques et le redevenir après la

dernière. Le Verrier, qui a depuis repris la question en la serrant de plus près, n'est pas aussi affirmatif, mais il résulte de son travail que la comète, après 1779, a pu s'échapper sur une orbite hyperbolique.

Cette question si intéressante de la capture des comètes par les planètes n'avait été abordée jusqu'ici que par des calculs numériques, et on n'avait pas donné d'indications générales sur le mécanisme de la transformation radicale qu'une planète (et en particulier Jupiter, la plus grosse de toutes) peut opérer sur une orbite cométaire donnée. Cette lacune vient d'être comblée par M. Tisserand (1) qui a montré que l'action de Jupiter s'exerçant sur une comète parabolique dont les éléments ont entre eux des rapports convenables, pourrait la transformer, même en une seule fois, en une comète elliptique analogue à un grand nombre de celles qui sont actuellement fixées dans le système solaire. Il existe même deux *critéria* permettant de juger si des comètes vues à diverses époques peuvent être des apparitions d'une seule, dont les éléments auraient été fortement modifiés dans l'intervalle par l'action perturbatrice d'une planète. Dans le cours de son travail, M. Tisserand a donné à l'un de ces critères une forme élégante sur laquelle M. Schulhof a présenté quelques considérations intéressantes (2).

Afin de compléter le tableau de l'état actuel de la question, ajoutons que pour certains astronomes, M. Bredichin par exemple, les comètes périodiques devraient leur origine à la segmentation de comètes paraboliques dont elles se seraient violemment détachées par un phénomène éruptif. De son côté enfin, M. Kirkwood assimile certaines comètes périodiques aux astéroïdes, tout en admettant d'une manière générale que les comètes sont à l'origine étrangères au système solaire.

V. — FIGURE DES COMÈTES; LEUR SPECTRE

La figure des comètes et les formes de leurs queues sont depuis quelques années l'objet d'études suivies, résumées par M. Faye dans une savante notice insérée dans l'*Annuaire du Bureau des longitudes pour 1883*. Un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que la formation des queues prouve l'existence d'une force répulsive ayant son origine dans le Soleil. Diverses hypothèses ont été proposées sur sa nature : pour Olbers, Bessel, elle était d'origine électrique; pour M. Faye elle naîtrait de la propriété qu'auraient tous les corps incandescents de repousser

(1) Pingré, *Cométographie*, t. II, p. 89.

(2) Mémoires de l'Académie des sciences, 1776, p. 648.

(3) M. Schulhof vient d'annoncer qu'il espère l'identifier à la comète de Finlay (1886, VII); de son côté M. Chandler pense qu'elle peut être identique à la comète découverte top 889 par M. Brooks : ses arguments sont très sérieux, mais on ne pourra se prononcer avant d'avoir une détermination plus exacte de la durée de révolution de cette comète Brooks (1889, V).

(1) Bulletin astronomique, t. VI, p. 241 et 289.

(2) Bulletin astronomique, t. VI, p. 465 et 513.

Les matériaux réduits à une excessive ténuité.


La matière des comètes révèle ordinairement sa nature au spectroscope par trois bandes brillantes qui coïncident avec quelques-unes des raies des hydrocarbures. Outre ces bandes, pour la première fois en 1882 on a observé dans un spectre cométaire (Comète Wells, 1882 I) la présence des raies du sodium, qui n'ont paru que lorsque la comète a été très voisine du Soleil, alors que les bandes ordinaires avaient déjà disparu. Cette particularité prouverait-elle pour cette comète une origine cosmique différente des autres? On ne le croit pas en général. M. Hasselberg pense que les raies du sodium ne seraient visibles qu'à la suite d'une action électrique se manifestant à une faible distance du Soleil, action qui en outre ferait disparaître les bandes des hydrocarbures. Cette manière de voir se trouve confirmée par la grande comète de la même année (1882 II), dont le spectre présentait, au voisinage du Soleil, uniquement les raies du sodium; plus tard, quand elle s'en fut éloignée, on aperçut les raies des hydrocarbures tandis que celles du sodium disparaissaient.

VI. — ÉTOILES FILANTES; BOLIDES

On a vu que les comètes se désagrègent; que deviennent les fragments qui en résultent? Ils donnent naissance à des étoiles filantes. Depuis les travaux de Schiaparelli, de Le Verrier, etc., on sait, en effet, que des essaims d'étoiles filantes circulent dans les orbites de quelques comètes; en outre, M. Schiaparelli a montré qu'un essaim de corpuscules attirés par le Soleil doit se déformer peu à peu sous l'influence de cette attraction, en s'allongeant le long de l'orbite même que décrit son centre et former ainsi une sorte de chaîne parabolique; il a reconnu ensuite qu'une planète peut donner lieu à la formation d'un courant elliptique par la perturbation qu'elle exerce sur un essaim ayant une orbite de forme quelconque avant le commencement de cette action.

On a été ainsi amené à considérer les comètes comme des amas de matière nébuleuse attirés dans notre système par l'action prépondérante du Soleil, et subissant de sa part, comme de celle des grosses planètes près desquelles ils viennent à passer, une déformation progressive qui les allonge en courants paraboliques ou elliptiques, tels que ABT, et sur lesquels la matière est très inégalement distribuée; elle est divisée en une multitude d'amas partiels, sortes de flocons d'une excessive légèreté qui n'ont de commun en chaque point que les directions et les vitesses de leurs mouvements. Mais si, dans quelque partie de l'amas primitif ou du courant qu'il a formé, il existe une ou plusieurs concentrations, de sorte que, par l'attraction mu-

tuelle, la matière y résiste à une dissolution en flocons isolés, ces parties, telles que A et B, pourront



être vues à de grandes distances; elles constitueront autant de comètes faisant partie du courant météorique, dans lequel elles pourront se fondre dans la suite jusqu'à cesser d'être visibles à l'état de comète isolée: c'est ce qui a dû arriver pour la comète de Biéla. Si ce courant coupe l'orbite terrestre en un point T, tous les ans, en passant par ce point, la Terre rencontrera des corpuscules qui, par leur passage à travers notre atmosphère, donneront naissance à des étoiles filantes, à des flux périodiques d'intensité variable, suivant le plus ou moins grand rapprochement des flocons nébuleux. Le passage par le point T d'une partie plus dense de l'anneau pourra donner naissance à ces recrudescences périodiques mentionnées depuis bien longtemps pour les étoiles filantes du 10 août.

Quant aux étoiles filantes qui se meuvent indistinctement de tous les côtés, et connues depuis Olbers sous le nom d'étoiles filantes *sporadiques*, elles peuvent provenir de flocons nébuleux arrivant isolément des profondeurs de l'espace ou de courants météoriques fortement dispersés par de puissantes attractions.

On évalue à environ 100 millions le nombre d'étoiles filantes que reçoit la surface entière de la Terre en un jour. En fixant, d'après A. Herschel, le poids moyen d'une étoile filante à 5 grammes, ce serait un poids total de 500,000 kilogrammes par jour au minimum, car on ne tient pas compte du nombre d'étoiles filantes invisibles à l'œil nu et qu'on aperçoit dans les lunettes, non plus que des poussières cosmiques invisibles. Avec ces données, on a calculé que la densité moyenne du milieu interplanétaire, à la distance 1 du Soleil, est à celle de l'eau comme 1 est à 10 suivi de 21 zéros, 10^{22} ; mais près du Soleil, où viennent s'entrecroiser tous les courants de corpuscules, cette densité doit être

bien plus forte; cependant elle ne pourrait dépasser $1:10^{18}$ sans donner lieu à une couronne plus brillante que celle qu'on observe autour du Soleil, pendant les éclipses.

Comment se produit la lumière des étoiles filantes? On l'explique ordinairement par la transformation de leur mouvement en chaleur, par suite du frottement de l'air; mais récemment M. Minary a combattu cette manière de voir, et M. Cornu ne paraît pas éloigné d'attribuer l'illumination de la trajectoire des étoiles filantes à un développement ou à une décharge d'électricité statique, sans élévation considérable de température.

Quant aux bolides, beaucoup d'astronomes les considèrent comme ayant même origine que les étoiles filantes et les comètes; mais les minéralogistes opposent à cette assimilation des objections tirées principalement de la structure interne des aérolithes, et M. Faye admet l'hypothèse de Lagrange, d'après laquelle les bolides seraient des matières d'origine planétaire, lancées dans l'espace par les volcans et rencontrant la Terre

après avoir erré plus ou moins longtemps dans l'espace.

Le système solaire, qui de prime abord se limite aux planètes principales, est donc parcouru en tous sens par un nombre incalculable de corps de toutes dimensions. A la simplicité primitive succède en apparence une complexité extrême. Mais tous ces corps, du plus grand au plus petit, obéissent à la même loi, celle de l'attraction newtonienne; chaque fois qu'une exception s'est présentée, étudiée avec soin, elle a conduit à de nouvelles découvertes et à une éclatante confirmation de la règle générale. Cependant les phénomènes cométaires, l'action mystérieuse du Soleil sur l'aiguille aimantée, etc., montrent que d'autres forces exercent aussi leur action dans le système solaire; peut-être sont-elles au fond de la même nature que la cause inconnue qui produit l'attraction: à l'avenir est réservé le soin de soulever le voile qui nous cache encore ces relations.

G. Bigourdan.

Astronome adjoint à l'Observatoire de Paris.

LES INSECTES VÉSICANTS

C'est Duméril (1800) qui le premier appliqua le nom de *Vésicants* à une tribu de Coléoptères dont les principaux types, Cantharide (fig. 1), Meloé (fig. 2), Mylabre (fig. 3), sont renommés, depuis des siècles et par tous les pays, pour la propriété dont jouissent leurs préparations de développer une ampoule lorsqu'on les applique sur la peau.


tous les Insectes de la tribu sont vésicants (1), d'autre part qu'aucun autre insecte ne jouit de cette propriété.

I

On sait que c'est à la *cantharidine*, principe découvert par Robiquet (1813), que sont dues les propriétés irritantes ou épispastiques des insectes vésicants. Pour déceler la présence de la cantharidine, on peut avoir recours à la méthode chimique ou à la méthode physiologique.

La première consiste dans l'emploi du chloroforme et surtout de l'éther acétique qui permettent d'isoler facilement le principe actif et de l'obtenir cristallisé. Quant à la méthode physiologique, elle a été employée dès 1828 par Bretonneau. On fait agir l'un des dissolvants ci-dessus sur l'espèce étudiée, et on applique l'extrait gras obtenu soit sur les lèvres d'un jeune animal, soit sur la peau. Une ampoule se produit d'autant plus rapidement que l'extrait est plus riche en cantharidine.

Nos recherches nous ont conduit à ce résultat que nous énonçons plus haut, à savoir que tous les



Cantharide ordinaire.

Epicauta verticalis.

Fig. 1. — Deux espèces de Cantharides.

Cette dénomination, après diverses alternatives, fut définitivement adoptée par Mulsant, dans la monographie qu'il publia en 1837. Les recherches les plus récentes ont démontré combien Duméril et Mulsant avaient été heureusement inspirés, car il est hors de doute aujourd'hui, d'une part que


(1) Il faut en excepter toutefois le petit groupe des Horides, assez récemment réuni à la tribu des Vésicants et qui devrait peut-être en être séparé, pour diverses raisons.

insectes de la tribu sont vésicants. On observera toutefois qu'il y a des degrés suivant l'espèce considérée. Ainsi c'est parmi les Mylabres qu'on trouve les espèces les plus riches en cantharidine. Certaines d'entre elles en renferment jusqu'à 12^{gr}, pour 1000, tandis que la cantharide ordinaire n'a jamais donné plus de 6^{gr} 35 de principe actif pour 1000. Les Meloés (fig. 2) qu'on emploie beaucoup dans nos campagnes et dans la médecine vétérinaire peuvent renfermer comme les Mylabres, suivant les espèces analysées, jusqu'à 12 pour 1000 de cantharidine. On ne doit pas oublier, en comparant les résultats des analyses, que dans une même espèce, voire dans un même individu, la proportion en principe actif est soumise à certaines influences dont quelques-unes sont encore assez mal connues d'ailleurs. Abstraction faite de l'état de conservation des échantillons examinés, il est hors de doute que les conditions physiologiques dans lesquelles se trouvent les insectes au moment de la récolte sont susceptibles de faire varier dans une grande mesure les proportions de cantharidine. La nourriture plus ou moins abondante dont ils disposent dans le lieu où ils se trouvent, l'époque plus ou moins rapprochée de l'accouplement, sont autant de conditions dont il faut tenir compte, ainsi que je m'en suis assuré. Les cantharides

peut varier considérablement d'une récolte à l'autre. C'est ainsi que des cantharides de France (récolte 1866) ont pu donner à M. Fumouze, tantôt 4 gr. 80 de cantharidine, tantôt 2 gr. 75 seulement par kilogramme d'insectes. De même, des cantharides d'Allemagne (récolte 1866) lui ont donné 4 gr. 35 de cantharidine, tandis qu'il n'en avait obtenu que 2 gr. 15 ou même 1 gr. 70 de cantharides de même provenance (récolte 1865). Des écarts semblables ont d'ailleurs été relevés par divers expérimentateurs.

Il est bien établi, comme je le disais plus haut, que tous les insectes de la tribu des Vésicants jouissent de propriétés épispastiques. Il est établi de même que ce caractère leur appartient en propre. Quelques Coléoptères, tels que les Carabes, les Chrysomèles, les Coccinelles, appliqués sur la peau, y déterminent de la rougeur, parfois même une légère éruption, mais aucun n'est réellement vésicant, car aucun ne renferme de la cantharidine. En dehors des Coléoptères, on a attribué à quelques insectes des propriétés de même ordre. C'est ainsi qu'un Hémiptère, une Cigale (*Cicada sanguinolenta*, Oliv.; *Huechys vesicatoria*, Port.) est employée en Chine comme vésicant, dans certaines maladies et principalement contre la rage. Les analyses et les expériences les plus récentes (Brongniart et Arnaud, Fumouze) ont démontré l'absence de toute trace de cantharidine chez cette Cigale. J'ai moi-même expérimenté sur cette espèce et il m'a été impossible de déceler la présence du principe actif. On cite encore une Araignée (*Tegenaria medicinalis*) qui serait employée comme vésicant dans diverses parties de l'Amérique; ce que l'on sait des Arachnides laisse à penser qu'on a attribué une vertu épispastique à cet insecte en raison du pouvoir irritant du venin qu'il sécrète.

C'est donc un fait bien acquis : la cantharidine n'existe que chez les Vésicants. On s'est longtemps demandé où siège le principe actif chez ces insectes. Il résultait des analyses faites dans le but d'élucider ce point que les parties molles étaient incomparablement plus riches en cantharidine que les parties dures. C'est l'abdomen que l'on considérerait comme parties molles, la tête, les pattes et les élytres étant les parties dures. Mes recherches sur la Cantharide m'ont permis d'y déterminer d'une façon plus précise le siège exact de la cantharidine. Celle-ci est localisée d'une part dans les organes génitaux de l'insecte, et d'autre part dans le sang. Chez le mâle, c'est spécialement la troisième paire de vésicules séminales, à l'exclusion des autres parties de l'appareil génital, qui renferme la substance active; chez la femelle, c'est à la fois la poche copulatrice et les ovaires. Les œufs, après la ponte comme dans l'ovaire, manifestent un très énergique pouvoir vésicant.



Meloë majalis.

Meloë proscarabeus.


Fig. 2. — Meloés.

abondamment nourries sont beaucoup plus actives que celles que l'on soumet à la diète; de même l'époque de l'activité sexuelle est incontestablement celle où le pouvoir vésicant est le plus grand, ce qui se comprend aisément puisque, dans les conditions biologiques normales, c'est le moment où la vie de l'insecte atteint sa plus grande intensité.

En tenant compte de ces diverses conditions, on s'explique comment le rendement en cantharidine

II

Les insectes vésicants, si bien caractérisés par leurs propriétés épispastiques, le sont également par diverses particularités de structure telles que la mollesse de leurs téguments et la bifidité des ongles qui terminent les tarses ainsi que par un faciès très particulier qui les distingue aisément des autres Coléoptères. Il y a cependant entre leurs différents genres des caractères parfois très tranchés, mais qui n'enlèvent rien au faciès général que l'inclinaison en bas de la tête, la forme et le développement du corselet contribuent pour une grande part à leur donner. Leur livrée est ordinairement assez sombre, et en dehors de quelques teintes à reflets métalliques brillants (la *Cantharide* est d'un beau vert doré et certains *Meloés* d'un bleu métallique) c'est le noir avec le jaune ou le rouge qui font tous les frais de leur parure. D'ailleurs, il est difficile d'imaginer jusqu'à quel point ces 2 ou 3 couleurs peuvent donner lieu dans leur répartition et leur arrangement à des figures variées. Les *Mylabres* (fig. 3), sous ce rapport,



Mylabris sidae.

Mylabris melanura.

Fig. 3. — Mylabres.

constituent à coup sûr le groupe d'insectes le plus intéressant qu'on puisse voir. Il comprend en effet plusieurs centaines d'espèces chez lesquelles les seules différences ne consistent parfois que dans le nombre ou la forme des punctuations jaunes qui s'espacent sur le fond noir des élytres ou dans l'épaisseur des lignes noires qui traversent le fond jaune.

Quand on étudie la distribution géographique des Vésicants, on est frappé de voir qu'un groupe d'insectes relativement aussi peu considérable présente une répartition aussi étendue. En fait, il existe des Vésicants dans toutes les parties du monde, et certains genres comptent des repré-

sentants dans toutes les régions. Tels sont, par exemple, le genre *Cantharis* et le genre *Meloé* qu'on trouve en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. On en a même signalé dans des îles plus ou moins éloignées des continents, comme Madère et Madagascar. Mais ce ne sont pas seulement ces genres, très riches en espèces, qui se disséminent ainsi dans toutes les contrées du globe; ce sont aussi quelques genres beaucoup moins bien partagés sous le rapport du nombre, tels que *Zonitis* et *Nemognatha*. On trouve, en effet, des *Zonitis* en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique et en Australie; des *Nemognathes* en Espagne, en Grèce, en Afrique, en Sibérie et dans les deux Amériques.

Par contre, certains genres font absolument défaut dans des parties déterminées du globe. Les *Mylabres*, par exemple, qui abondent en Asie et en Afrique, manquent absolument en Amérique. Cette absence totale de *Mylabres* et de représentants des genres voisins donne à la faune américaine un caractère très particulier que vient compléter la présence de genres qui lui sont propres, tels les *Triterania*, *Tetraonyx*, *Henous*, *Megetra*, *Macrobasis*, *Pyrota*, etc., qui sont des genres qu'on ne trouve que dans cette région. La faune asiatique et la faune africaine, remarquables par l'abondance des *Mylabres*, ont entre elles beaucoup d'autres points communs et sont, par suite, moins bien nettement définies que la faune américaine. Quant à la faune européenne, elle est en quelque sorte synthétique, la plupart des genres y étant représentés. Sa situation géographique l'explique aisément, ainsi que les variétés de climat qu'elle présente du nord au midi. Rappelons toutefois que la faune d'Europe peut se caractériser par l'existence d'un genre qui lui est absolument propre, le genre *Sitaris*.

III

Le genre *Sitaris* (fig. 4) est devenu célèbre parmi les Vésicants, car, s'il n'est pas employé en thérapeutique, vu sa petite taille et sa rareté relative, il a fait l'objet des premières recherches de M. J.-H. Fabre sur le développement des Vésicants. Je n'ai pas l'intention de refaire l'historique de cette très intéressante question, mais on ne peut parler des mœurs larvaires si curieuses des insectes qui nous occupent sans citer le nom de M. J.-H. Fabre. Il a étudié ces mœurs avec un soin et une sagacité remarquables, et il les a racontées dans un style à la fois précis et brillant qui restera le modèle des descriptions zoologiques.

Le développement des insectes vésicants est dominé par deux faits principaux : le parasitisme des larves et l'*hypermétamorphose*, suivant le nom créé

par Fabre pour rappeler les nombreuses phases qui se succèdent au cours de leur évolution. On sait en effet que les Vésicants passent successivement à partir de l'œuf par six états différents : 1° le *triongulin* (fig. 5), petite larve hexapode dont les pattes sont chez certaines espèces munies de trois ongles.




Fig. 4. — *Sitaria humeralis* (d'après Fabre). — a 2° larve; b pseudo-chrysalide; c 3° larve; d nymphe (à un fort grossissement).

2° La *seconde larve*, à téguments plus mous, à pattes généralement courtes. Elle dévore avec avidité et grossit en proportion, si bien que n'ayant souvent pas plus de 2 à 3 millimètres quand elle sort de la mue du triongulin, elle peut atteindre à son état ultime jusqu'à 20 millimètres de long. Au cours de cet accroissement, sa configuration générale présente chez certaines espèces des modifications assez profondes. Tout d'abord elle ressemble assez dans son allure générale aux larves des carabes; Riley donne à cet état le nom d'*état carabidoïde*; puis survient une mue à la suite de laquelle la larve, par le développement considérable de son abdomen rappelle la forme des larves de lamellicornes; d'où le nom d'*état scarabéidoïde* que lui donne Riley (ces désignations ne sont applicables qu'à certains genres comme les *Epicauta* et *Cantharis*, mais ne sauraient être généralisées, car elles ne peuvent convenir à la deuxième larve des *Sitaris*, par exemple). 3° A la deuxième larve succède la *pseudo-chrysalide* (*larva coarctata* de Riley). C'est une sorte d'état latent qui dure un temps variable suivant les espèces et qui répond d'une

façon à peu près constante à la période hivernale. A ce stade la jeune larve, légèrement contractée et par suite moins volumineuse que dans le stade précédent, est protégée par des téguments plus durs et reste dans un état complet d'immobilité. 4° De la mue pseudo-chrysalidaire sort la *troisième larve* qui dans ses traits généraux rappelle absolument la deuxième larve. Mais ses appareils buccaux sont atrophiés, et, bien que manifestant quelque activité au début de son apparition, elle ne prend aucune nourriture. Il est à remarquer d'ailleurs que toute larve de Vésicant cesse de manger à partir de sa transformation en pseudo-chrysalide. 5° De la mue de la troisième larve la *nymphe* fait issue; et enfin 6° apparaît l'*insecte parfait*.

Telles sont les diverses phases du développement par lesquelles passent tous les Vésicants. Primitivement démontrées pour les Meloé par Newport et Fabre, pour les *Sitaris* et les *Zonitis* par Fabre, elles ont été retrouvées par Lichtenstein chez la *Cantharide*, par Riley chez les *Epicauta* et par nous même chez les genres *Cerocoma* et *Stenoria*. A chacun des stades que nous venons d'énumérer correspond une mue, sauf pour le stade deuxième larve qu'accompagnent plusieurs mues successives, en relation avec l'accroissement considérable qui se manifeste au cours de cette période où la larve absorbe de grandes quantités de nourriture. Récemment Brauer a tenté de prouver que les phases par lesquelles passent les Vésicants peuvent être ramenées aux quatre phases qu'on observe chez tous les autres Coléoptères. Considérant que chez les Coléoptères il existe quatre *stades de mue* (*hautungstadium*) qui correspondent à quatre *stades de développement* de l'insecte, il croit pouvoir ramener également à quatre le nombre des stades de développement des Vésicants. Dans ce but, il distingue les nombreuses mues qui se succèdent au cours de l'évolution de ceux-ci en *mues d'accroissement* et *mues de développement*; ce qui nous paraît très juste. Ces dernières au nombre de quatre correspondraient aux quatre stades de développement des Coléoptères. Ce seraient : 1° une mue entre le premier stade larvaire et le deuxième; 2° une mue entre le deuxième stade larvaire et le troisième; 3° une mue entre le troisième stade larvaire et la nymphe; 4° une mue entre la nymphe et l'imago. Le stade pseudo-chrysalide est considéré par Brauer comme faisant partie du stade deuxième larve; il regarde le tégument épais de la pseudo-chrysalide comme un durcissement de la peau de la seconde larve. C'est à mon avis une erreur, car l'apparition de la pseudo-chrysalide est toujours précédée d'une mue de la deuxième larve, et cette mue n'est évidemment pas une mue d'accroissement, puisque la pseudo-chrysalide

est contractée, et qu'il s'écoule un certain temps entre le moment où la deuxième larve cesse de manger et celui où elle mue pour donner issue à la pseudo-chrysalide. Cette dernière mue de la deuxième larve est donc bien une mue de développement, et les caractères anatomiques très différents que présentent la deuxième larve et la pseudo-chrysalide en sont une preuve. Quoi qu'en dise Brauer, je persiste à penser que le stade pseudo-chrysalide caractérise les Vésicants (1) et quelques autres insectes qui ont été signalés parmi les hyménoptères comme présentant également ce stade. Dans le cas particulier des Vésicants, bien qu'on ne puisse se livrer qu'à des conjectures tant qu'on n'aura pas fait l'étude histologique et anatomique complète de la larve aux diverses phases de son évolution, l'apparition du stade « pseudo-chrysalide » semble pouvoir être considérée comme une conséquence du parasitisme. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'avec ce stade commence une seconde phase de l'évolution de l'insecte, la phase de développement par excellence, au cours de laquelle aucune nourriture n'est prise, tous les phénomènes qui s'opèrent consistant dans les métamorphoses successives, aboutissant à la forme parfaite.

IV

Les Insectes vésicants, avons-nous dit, vivent en parasites pendant leur développement. Les Meloés, les Sitaris, et les Zonitis qui ont été étudiés les premiers ont en effet été rencontrés dans des cellules d'hyménoptères. Ils se nourrissent du miel après avoir dévoré l'œuf auquel il était destiné. Ce premier repas suffit chez les Sitaris à amener le triongulin à l'état de seconde larve, c'est-à-dire à une forme nouvelle susceptible de flotter sur le miel nourricier, tandis que le triongulin n'aurait pu s'y soutenir et y devait périr englué. Fabre a écrit dans tous ses détails l'histoire singulière de ce triongulin du Sitaris qui, après avoir attendu pendant tout l'hiver à l'entrée de leurs galeries la sortie des hyménoptères (Anthophores), s'attache, au moment où ceux-ci gagnent la campagne, aux poils de leur corselet, puis passe du mâle sur la femelle pendant l'accouplement. Là, il attend paisiblement que la femelle ait amassé la provision dans la cellule qu'elle a construite et gagne précipitamment la surface de l'œuf au moment où l'hyménoptère le dépose sur la pâture qui lui est réservée. Les triongulins des Meloés (fig. 5) paraissent agir de même, à quelques détails près, et l'on pouvait croire que tous les Vésicants vivent au

cours de leur développement en parasites dans les cellules de divers hyménoptères. Les travaux de




Fig. 5. — *Meloe cicatricosus* (d'après Newport). — a Triangulai, b ongles, c antenne, d pseudo-larve, e nymphe encore en partie dans sa mue.

Riley, puis les nouvelles recherches de Fabre et les nôtres ont démontré qu'il en est autrement. Les *Epicauta*, *Macrobasis* et *Hemous*, genres américains assez voisins des *Cantharides*, sont, à l'état larvaire, parasites des nids de certains Criquets. Ces nids sont des sortes de capsules cylindriques à paroi papyracée où les œufs sont symétriquement rangés et dont l'orifice est bouché par une matière spumeuse assez semblable à du blanc d'œuf battu et cuit. Le triongulin des Vésicants en question après sa sortie de l'œuf s'enfonce dans la terre à la recherche des nids de Criquets, ronge le bouchon spumeux et pénètre dans la coque. Là il passe bientôt à l'état de deuxième larve qu'on voit flotter dans un abondant jus formé par les œufs que l'animal ouvre en grand nombre. J'ai voulu savoir si les *Epicauta* d'Europe (*E. Verticalis*) se comportent de même. Après avoir obtenu le triongulin de cette espèce, je lui ai offert tout d'abord le miel de divers hyménoptères, sans aucun succès. Puis j'ai remplacé le miel par des nids d'un Orthoptère que j'ai pu me procurer assez abondamment (*Edipoda caerulea*). Le triongulin s'est attaqué avidement à ces nids et, après avoir absorbé le contenu de quelques œufs, il a subi sa transformation en seconde larve. Le fait est donc bien avéré : les *Epicauta* et genres très voisins sont parasites des nids de certains Cri-

(1) Brauer cite le Meloé erythrocnemus qui ne lui aurait pas présenté de stade pseudo-chrysalide.

quets. On peut ajouter plus généralement qu'ils sont parasites des nids d'Orthoptères autant que ceux-ci sont abordables et que les œufs ne sont pas protégés par une coque trop résistante. C'est ainsi que j'ai pu élever des *Epicauta verticalis* avec des œufs d'Ampuse et de Mante religieuse. Mais il me fallait ouvrir les nids que partagent de nombreuses cloisons, assez dures pour décourager le triongulin.

Les recherches de M. Fabre sur le *Cerocoma Schaefferi* ont abouti, d'autre part, à un résultat assez inattendu. C'est, en effet, dans les cellules d'un Hyménoptère (Tachyte) qui nourrit ses jeunes avec de jeunes Mantes que l'éminent zoologiste a trouvé les larves de ce Cerocome. Il a pu les suivre dans les diverses phases de leur développement et constater que la provision de jeunes mantes est absorbée en entier par la larve du Vésicant. Il est assez curieux, comme le dit M. Fabre, de voir chez les Vésicants ce goût prononcé pour l'Orthoptère. Les *Epicauta*, *Macrobasis*, etc., préfèrent les œufs, tandis que les *Cerocomes* mangent les jeunes. — Le *Cerocoma Schreberi*, sur lequel j'ai fait les premières observations de l'hypermétamorphose du genre, va peut-être plus loin, et je ne serais pas étonné qu'il s'attaquât aux grands Orthoptères adultes que certains Tachytes donnent en pâture à leurs jeunes. Il est certain que dans les endroits où j'ai trouvé ce Cerocome, il existait un certain nombre de ces nids de Tachytes.

Quoi qu'il en soit, il est bien prouvé aujourd'hui que parmi les Vésicants, les uns ont des larves mellivores (*Meloë*, *Sitaris*, *Zonitis*), les autres, des larves carnivores (*Epicauta*, *Cerocoma*, *Macrobasis*, etc.). Or, il est intéressant de savoir quelle place occupent dans ces groupes la Cantharide ordinaire et les Mylabres, qui sont les Vésicants les plus anciennement connus. Pour la Cantharide, jusqu'à ces dernières années, on en était réduit aux conjectures. Lichtenstein, de Montpellier, entreprit d'élucider ce point et parvint à démontrer expérimentalement que ses larves sont mellivores. J'ai pu vérifier ce fait et l'établir d'une manière définitive en faisant connaître le mode naturel du développement de cet insecte. J'ai montré en même temps — et ceci doit être général — que la larve de la Cantharide n'est pas parasite des cellules d'un Hyménoptère absolument déterminé, mais des cellules de divers Hyménoptères qui produisent un miel réunissant certaines conditions de composition et de consistance, et qui le renferment dans des cellules à paroi mince. C'est ainsi que j'ai toujours trouvé les pseudo-chrysalides de la Cantharide au voisinage de cellules de Colletes (*Colletes signata*, *C. cunicularis*) dont les parois papyracées et minces sont facile-

ment attaquées par les mandibules du triongulin. Le triongulin des Cantharides se comporte, en effet, comme celui des *Epicauta*. Loin de rechercher les fleurs comme celui des Meloés pour y attendre le passage de quelque Hyménoptère aux poils duquel il pourra s'accrocher, il fuit la lumière, s'enfonce avec activité dans le sol et court évidemment à la recherche de cellules remplies d'une pâture à sa convenance.

Nous ne savons rien encore du développement des Mylabres. Toutefois, la forme des triongulins me laisse croire qu'ils appartiennent au groupe des Vésicants dont les larves sont carnivores, et je ne serais pas étonné d'apprendre qu'à l'exemple des *Cerocomes*, ils s'attaquent aux cellules de quelque Hyménoptère nourrissant ses larves d'Orthoptères.

V

Quand on jette un coup d'œil d'ensemble sur les mœurs larvaires des Vésicants, on remarque qu'il est possible d'établir deux groupes, suivant que la larve est sédentaire ou errante. J'entends par larve sédentaire celle qui, s'étant installée dans une cellule pourvue abondamment de nourriture, y reste pendant tout le cours de son évolution, jusques et y compris la transformation en insecte parfait. C'est le cas pour les *Sitaris*, les *Zonitis* et un certain nombre de Meloés (fig. 6).




Fig. 6 *Meloë Cicatricosus* (d'après Newport). — Dans les cellules d'*Anthophora retusa*.

La larve errante est celle qui, parvenue à la période ultime de son second stade, abandonne la cellule ou le nid d'Orthoptère qui lui a servi de grenier d'abondance, et va creuser à quelque distance une loge où elle se transforme bientôt en pseudo-chrysalide et subit les dernières phases de ses métamorphoses. C'est le cas de la Cantharide, des *Cerocomes* et des *Epicauta* (fig. 7). Dans le premier cas (*Sitaris* et *Zonitis*), la pseudo-chrysalide reste incluse dans la mue de la deuxième larve et la troisième larve dans la mue de la pseudo-chrysalide, et c'est dans cette double enveloppe que s'opèrent les transformations finales. Dans le deuxième cas (Cantharide, *Cerocome*, *Epicauta*) les choses se passent autrement. La mue de la deuxième larve

se fend pour livrer passage à la pseudo-chrysalide qu'on trouve toujours alors portant à son extrémité postérieure la mue de la seconde larve sous forme d'une petite pelote fripée. La troisième larve sort complètement aussi de la mue de la pseudo-chrysalide qu'on retrouve alors à côté de la troisième larve, mais conservant grâce à sa consistance la forme de la pseudo-chrysalide.




Fig. 7. *Epicaula vittata* (d'après Riley). — a État carabidoïde de la 2^e larve; b état ultime de cette seconde larve; c mandibule de cette larve; d pseudo-chrysalide de la même espèce; e nymphe de *Epicaula cinerea*.

Ici se place une observation relative aux Meloés qui semble bien montrer que ce genre est intermédiaire aux deux groupes précédents. D'une part, chez les Meloés, la pseudo-chrysalide ne sort qu'à demi de la mue de la deuxième larve ou sort

complètement (*M. cyaneus*) (fig. 8) et la troisième larve elle-même ne fait dans la plupart des cas que passer sa tête et son corselet hors de la mue pseudo-chrysalidaire, ou s'en débarrasse complètement. D'autre part, j'ai trouvé que la deuxième larve de certaines espèces (*M. cyaneus*, *M. autumnalis*), au lieu d'être sédentaire comme celle de *M. cicatricosus*, est errante et va creuser loin de la cellule de l'Hyménoptère une loge où elle se transforme en pseudo-chrysalide et subit ses dernières transformations.



Fig. 8. — *Meloe cyaneus*, Pseudo-chrysalide grossie de $\frac{2}{3}$ environ; m, mue de la 2^e larve.

La place qui m'est donnée pour cette analyse de l'histoire des Vésicants ne permet pas d'entrer dans les considérations que peut faire naître l'étude attentive des faits que je viens de rappeler brièvement. Ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire et que nombre de points relatifs au développement des Vésicants sont à élucider. C'est le cas de dire avec Gebler : « Au surplus, la postérité ne se plaindra pas que nous ne lui ayons laissé rien à observer. »

D^r H. Beauregard,

Professeur agrégé
à l'Ecole supérieure de Pharmacie.

LA VISCOSITÉ ET LA RIGIDITÉ DES LIQUIDES

Si un ensemble de forces agissant sur une masse matérielle homogène vient à la déformer sans la comprimer ou la dilater, deux genres de réactions bien distinctes peuvent apparaître, qui s'opposent à l'effort exercé.

Pendant le temps de la déformation, et pendant ce temps seulement, les premières se font sentir; elles dépendent essentiellement de la plus ou moins grande rapidité de la déformation; elles cessent avec le mouvement et ne sauraient en aucun cas ramener le corps à son premier état d'équilibre: l'existence de ces réactions nous conduit à l'idée de viscosité.

Les secondes sont de nature différente; elles continuent à s'exercer quand la déformation reste stationnaire, et si les forces extérieures viennent à disparaître, elles sont capables de faire revenir le corps à sa forme initiale pourvu qu'une certaine limite n'ait pas été dépassée: elles constituent la rigidité (1).

La cohésion est le résultat de ces deux systèmes de réactions.

I

On a étudié avec le plus grand soin la cohésion des solides, la rigidité surtout. Dès 1678, Hooke énonçait comme résultat de ses expériences sur les ressorts la loi fondamentale qui renferme toute la théorie: Le changement de forme est propor-

formation par laquelle une sphère de rayon égal à l'unité se transforme en un ellipsoïde dont les axes sont $1 + e$ et $1 - e$. Dans le cas particulier d'un corps *isotrope*, c'est-à-dire possédant les mêmes propriétés dans toutes les directions, si l'on considère un cube $abcd$ taillé d'une manière quelconque dans la masse et que l'on suppose la face supérieure ca soumise à une force tangentielle T qui l'amène en $c'd'$, tandis que la face ab est maintenue immobile, la déformation produite est un cisaillement. La force T rapportée à l'unité de surface est l'effort de cisaillement; dans la limite de l'élasticité parfaite elle est proportionnelle au déplacement cc' ; le rapport $\frac{cc'}{dc}$ reçoit le nom de résistance au cisaillement (*Resistance to shearing*); dans le cas considéré on l'appelle également la rigidité simple.



(1) En général, on appelle effet de cisaillement (*shear*) une dé-

tionnel à la force extérieure, ou, ce qui revient au même, la réaction est proportionnelle à la déformation : *ut tensio sic vis*. A cette époque, les savants désireux de sauvegarder la priorité de leurs découvertes et peu soucieux de les faire connaître avant le complet achèvement de leurs travaux, n'avaient pas encore imaginé les *plis cachetés* qui encombrant aujourd'hui les cartons des Académies; ils avaient coutume de recourir à des anagrammes sous lesquels ils énonçaient, en les voilant, les résultats obtenus; on ne peut s'empêcher de sourire en songeant que la belle loi de Hooke fut tout d'abord publiée sous l'anagramme : *ceiinosssttw*.

Depuis deux cents ans, les déformations des solides ont été l'objet de travaux analytiques de premier ordre et de recherches expérimentales de haute précision; cette étude est classique, nous la laissons ici complètement de côté.

La cohésion des liquides est moins connue. Des travaux tout récents et très remarquables ont ramené l'attention sur cette importante question; nous allons essayer de les exposer sommairement; mais il est nécessaire auparavant de rappeler les résultats antérieurement connus, et d'indiquer les considérations théoriques qui ont guidé l'expérience.

Le calcul est un instrument admirable, la langue algébrique est parfaite, mais il est souvent possible de ne l'employer qu'avec réserves; nous chercherons à expliquer les idées qui ont conduit à la théorie, sans entrer dans les détails mathématique de l'analyse.

II

Quand les idées de Pascal furent admises, les liquides apparurent comme des fluides parfaits : sur chaque élément plan, le résultat de toutes les actions exercées par la masse liquide est une pression normale à l'élément, et cette pression se transmet intégralement à tous les éléments. Ce principe entraîne des conséquences nombreuses et faciles à vérifier, une entre autres : la surface libre d'un liquide en équilibre doit être plane et horizontale; les liquides, même très épais, pourvu qu'ils ne renferment pas de particules solides, finissent toujours par prendre une position d'équilibre conforme à la théorie. Obermayer (1) plaçait un morceau de poix sur une gouttière, au fond de la gouttière il mettait un bouchon de liège et par-dessus la poix un caillou; au bout de quelques jours la poix s'était moulée sur la gouttière, la surface était plane et horizontale, le caillou tombé au fond, le bouchon surnageait à la surface. L'équilibre du

système s'était établi suivant les lois ordinaires de l'hydrostatique.

Ces observations conduisent à considérer la *rigidité* comme absolument nulle dans les liquides, cette rigidité ne pouvant exister sans *action tangentielle* aux éléments s'exerçant dans un liquide déformé en équilibre; la généralité des propriétés de la matière a fait cependant supposer depuis longtemps que les fluides devaient recéler des traces de rigidité; mais il a fallu de nombreux efforts pour les démasquer; un physicien russe d'une extrême habileté, M. Schwedoff, y est récemment parvenu.

On s'est aperçu beaucoup plus rapidement de l'insuffisance des lois de l'hydrodynamique déduites de la supposition de pressions normales aux éléments. Newton, Bernoulli, Euler soupçonnaient cette insuffisance. Un grand nombre de faits familiers la démontrent nettement : une expérience célèbre entre toutes en est une preuve évidente : dans ses mémorables recherches sur l'équivalent mécanique de la chaleur, Joule faisait tourner dans un calorimètre plein d'eau des palettes métalliques; si les actions tangentielles n'existaient pas, le liquide entraîné glisserait sans frottement sur le liquide ambiant et le travail moteur serait le même, que les palettes plongent ou ne plongent pas dans la masse liquide. La *viscosité* ou *frottement interne* des liquides se manifeste donc nettement dans le mouvement; depuis longtemps déjà on l'a étudié.

Nous parlerons de la viscosité avant d'aborder la question de la rigidité : c'est l'ordre chronologique. Quand une science n'est pas terminée, quand il est impossible de l'exposer d'une façon dogmatique, l'ordre même des idées qui se sont successivement présentées à l'esprit des chercheurs n'est-il pas celui qu'il convient de suivre?

III

Navier (1), le premier, a proposé une théorie d'ensemble sur le mouvement des fluides, en tenant compte de la viscosité.

Comme dans toutes les théories moléculaires, il suppose les liquides formés par des molécules soumises (indépendamment des actions extérieures telles que la pesanteur) à des forces d'attraction mutuelle, et à des forces émanant des molécules des corps avec lesquels le fluide est en contact. Ces forces s'exercent suivant la droite qui joint les molécules deux à deux, sont proportionnelles aux masses, dépendent de leur distance respective, diminuent quand la distance augmente, et s'annulent pour les valeurs de la distance supérieure

(1) Wiener Anzeiger 90.

(1) Mémoires de l'Académie des Sciences, VI, 1823.

à une limite très petite; en outre, si le liquide est en mouvement, l'action de deux molécules qui s'approchent ou s'éloignent est augmentée ou diminuée d'une quantité proportionnelle à la vitesse relative des deux molécules.

Traduisant ces données, le calcul permet de trouver les équations différentielles générales du mouvement; ces équations sont compliquées: elles conduisent à définir en chaque point un certain coefficient μ qui pourrait dépendre de la densité au point considéré; Navier suppose que ce coefficient est le même pour tous les points du fluide; il varie seulement avec sa nature et son état thermique; c'est une hypothèse, mais l'expérience la légitime.

On a appelé μ coefficient de frottement interne ou coefficient de viscosité; il est facile de démontrer la proposition suivante: Imaginons dans la masse liquide deux plans parallèles distants de l'unité de longueur, mobiles l'un par rapport à l'autre; la force, nécessaire par unité de surface pour conserver à l'un des plans une vitesse relative égale à l'unité de vitesse, égale précisément la quantité μ .

La signification physique du coefficient apparaît clairement; si le mouvement des molécules liquides ne rencontrait pas d'obstacles, μ serait nul; si μ existe dans tous les fluides, s'il est plus grand pour la glycérine que pour l'eau, c'est que tous les fluides sont visqueux, c'est que la glycérine est plus visqueuse que l'eau.

Au lieu de considérer, avec Navier, les actions de molécule à molécule, on peut, avec Cauchy (1) et d'autres physiciens, décomposer la masse liquide en parallélépipèdes élémentaires et en résidus tétraédriques, prendre la résultante de toutes les forces moléculaires sur chaque face plane, écrire pour chaque solide infinitésimal l'équation de l'équilibre dynamique; on trouve ainsi les équations du mouvement: elles sont identiques à celles de Navier.

La théorie est facile, mais la pratique compliquée; l'équation différentielle doit être intégrée pour servir à calculer des expériences réelles; les mathématiques sont impuissantes à traiter le cas général; des hypothèses particulières sont à introduire dans chaque application.

Plusieurs méthodes ont été employées pour vérifier l'accord entre l'analyse et l'observation et mesurer en même temps le coefficient de frottement. La meilleure est l'écoulement du liquide dans un tube capillaire.

Navier imaginait que le liquide se partage en couches cylindriques s'emboîtant les unes dans les

autres, animées de vitesses différentes, l'axe allant plus vite, la périphérie moins rapidement, comme, dans les glaciers, descendent inégalement les neiges du centre et les neiges des bords.

Poiseuille (1), voulant se rendre un compte exact du mouvement du sang dans les vaisseaux capillaires, fut amené à étudier les lois de l'écoulement; il était médecin, mais la précision de ses mesures ferait envie à plus d'un physicien. *Sous la même pression, à la même température, à travers des tubes de même longueur, les quantités d'eau écoulées sont proportionnelles aux quatrièmes puissances des diamètres*; ainsi s'énonce la loi qu'il découvrit (2). Poiseuille n'ignorait pas la théorie de Navier, mais ses expériences lui parurent la contredire d'une manière formelle. Dans l'intégration de ses équations, Navier avait supposé que la vitesse de la couche liquide en contact avec la paroi n'est pas nulle; le calcul ainsi fait ne conduit pas à la loi des diamètres; il la démontre au contraire, si on écrit que la couche externe est complètement immobile.

L'hypothèse est-elle plausible? Deux cas sont à distinguer: le liquide mouille ou ne mouille pas le solide.

Pour une paroi mouillée le doute n'est guère possible. M. Duclaux (3) a fait à ce sujet des expériences probantes (fig. 2). Prenons un thermomètre contenant de l'alcool coloré dans le réservoir; au-dessus plaçons une couche d'alcool incolore, et chauffons: le liquide coloré ne chasse pas le non coloré; il le traverse, s'allonge en forme de cône arrondi à son sommet; les particules liquides éloignées de la paroi sont donc les premières à avancer; les plus voisines restent immobiles. La

(1) Mémoires des savants étrangers, IX, 1846.

(2) Dans ses expériences (fig. 1), Poiseuille faisait écouler sous une pression constante obtenue par une pompe à main et régularisée par un réservoir à air comprimé une quantité




Fig. 1. — Appareil de Poiseuille.

d'eau déterminée. Ce liquide était contenu dans une ampoule E soudée au tube capillaire D et mesuré entre deux repères a et b. On notait soigneusement le temps nécessaire à l'abaissement du niveau de a en b et l'on relevait ces niveaux à l'aide d'une lunette L. Tout l'appareil était plongé dans un bain à température constante.

(3) Annales de chimie et de physique, 4^e série, t. XXVI, 1872.

difficulté de sécher complètement un vase de verre, la rupture qui se produit nécessairement dans une masse fluide quand on la veut séparer d'un solide adhérent sont des preuves évidentes que, si l'immobilité n'est pas absolue, du moins l'action entre les molécules d'un solide et celles d'un liquide est énorme vis-à-vis de l'action entre deux particules liquides.

Si le liquide ne mouille pas, comme l'eau dans le cuivre, le mercure dans le verre, la difficulté est plus grande. Navier admettait que le frottement entre la paroi et le fluide est proportionnel à la vitesse d'entraînement. L'expérience ne confirme pas cette hypothèse; la loi de Poiseuille subsiste; la couche externe reste donc sensiblement en repos.

La question est encore obscure.

Coulomb (1) avait imaginé un procédé très différent pour étudier la viscosité. Un disque horizon-



Fig. 2. — Expériences de M. Duclaux.




Fig. 3. — Appareil de Coulomb.

tal (fig. 3) est supporté par un fil de torsion; déplacé légèrement de sa position d'équilibre, il effectuerait dans le vide de petites oscillations isochrones et d'amplitude constante; si on le plonge dans un liquide, la couche liquide adhérente frotte contre les couches contiguës, les oscillations demeurent isochrones, mais les amplitudes vont en décroissant. Dans l'hypothèse de Navier, le calcul permet de trouver la relation entre le coefficient de frottement et le décroissement des amplitudes; mal-

heureusement, il ne peut se terminer sans approximations : on doit par exemple négliger l'influence de la force centrifuge. On ne saurait par suite traiter le cas des vitesses un peu grandes.

D'autres méthodes ont été employées; on peut remplacer le mouvement d'oscillation par un mouvement de rotation continue; l'expérience se complique, mais l'analyse mathématique se simplifie. L'idée d'éliminer l'influence des bords et de prendre, au lieu d'un disque, des corps de forme géométrique simple est naturelle; plusieurs expérimentateurs y ont songé.

M. Elie (1) prend une sphère tournant dans une sphère concentrique; le moyen est théoriquement parfait, mais l'exécution difficile.

M. Couette (2), dans un travail remarquable dont les résultats généraux seuls ont été publiés, emploie deux cylindres circulaires de même axe; l'extérieur est animé d'un mouvement de rotation uniforme, le liquide intermédiaire tend à entraîner le liquide intérieur, mais on le maintient à l'état de repos par un système de poulies supportant des poids; les poids font connaître le moment du frottement du liquide sur le cylindre.

Le même physicien a repris, avec de nombreux perfectionnements, les expériences d'écoulements dans les tubes capillaires; nous ne pouvons entrer ici dans le détail des soins apportés aux mesures.

Les résultats sont importants et curieux : les deux méthodes ont marché d'accord.

Le mouvement des liquides se fait sous deux régimes différents : si la vitesse est petite, les intégrales les plus simples des équations de Navier représentent rigoureusement les faits observés; si la vitesse est grande, elles ne suffisent plus à traduire les données expérimentales. Entre certaines limites les deux mouvements sont possibles et se produisent alternativement.

M. Couette démontre ces conclusions d'une façon élégante; une veine liquide sort d'un tube horizontal sous une pression variable à volonté; tant que le débit reste inférieur à une certaine limite, dépendant d'ailleurs du diamètre du tube, la veine est lisse et d'amplitude constante; quand la période de transition est atteinte, la veine éprouve des changements brusques d'aspect et d'amplitude, qui se succèdent d'une façon irrégulière, tantôt lisse et allongée, tantôt ridée et rac-

(1) Journal de physique, 2^e série, I, 224.

(2) Outre ses travaux personnels sur la question (*Comptes rendus*, 6 août 1888), M. Couette a publié une étude très soignée sur les théories mathématiques relatives à la viscosité des liquides (*Bulletin des sciences physiques*, t. I), à laquelle nous avons emprunté diverses indications. Nous remercions M. Couette des renseignements qu'il a bien voulu nous fournir.

courcée; vient-on à dépasser la limite, le second régime s'établit, la veine reste troublée, mais les oscillations disparaissent.

Un Anglais, M. Osborne Reynolds (1), a remarqué les mêmes phénomènes; il les manifeste en introduisant dans l'axe de la veine qui s'écoule, de l'eau




Fig. 4. — Expériences de M. Osborne Reynolds.

colorée; sous de faibles pressions, la coloration se maintient régulièrement dans la partie centrale du jet liquide (fig. 4); la pression critique atteinte, elle se répand dans toute la masse; des tourbillons apparaissent; la confusion est complète. Tels les flots d'une rivière peuvent, sans s'y mêler, traverser les eaux d'un lac tranquille, ou bien au contraire se confondre avec elles en perdant leur couleur propre et leur aspect particulier.

Pour les vitesses un peu grandes les phénomènes sont donc fort compliqués, mais nous ne saurions conclure des expériences à l'insuffisance de la théorie; nous avons introduit des hypothèses particulières qui sont des approximations.

Nous avons supposé, par exemple, le coefficient de frottement indépendant de la pression; des expériences de MM. Roentgen (2) et Warburg (3) prouvent au contraire que la viscosité augmente quand la pression augmente; l'eau toutefois fait exception: on sait les singularités que présentent beaucoup de propriétés physiques de ce liquide.

Les recherches sur l'écoulement dans les tubes capillaires sont intéressantes, mais les tuyaux de conduite, les rivières et les torrents seraient plus utiles à considérer. Un cas relativement simple a donné lieu à de nombreux travaux; l'écoulement se fait à travers, non plus un tube, mais une série de tubes capillaires comme une membrane poreuse. M. Brunhes (4) a montré, dans une étude très soignée, que le passage des liquides à travers les substances perméables et les couches filtrantes peut encore se déduire simplement de la théorie de Navier.

La question générale a fait l'objet de mémoires

de haute valeur: MM. de Saint-Venant, Bousinesq (1), Maurice Lévy (2), etc., l'ont traitée avec les ressources de la plus savante analyse; mais c'est une science à part, l'hydraulique; nous ne pouvons en parler ici.

IV

La rigidité des liquides est une question neuve, avons-nous dit; nous entendions parler des études expérimentales. Poisson (3), l'illustre géomètre à qui les physiciens découvrent chaque jour de nouveaux titres de gloire, a depuis longtemps émis sur ce sujet une idée fort curieuse, que Maxwell a développée par la suite.

Il ne semblait pas aisé d'aborder le problème directement; on a au début songé à un détour.

Les corps rigides transparents et homogènes acquièrent, quand on les déforme, la propriété de polariser la lumière; une baguette de verre tordue devient doublement réfringente comme le spath; si les liquides présentent des traces de rigidité, ils offrent sans doute le même phénomène après une déformation.

L'expérience a été faite par plusieurs physiciens: elle a réussi. Tout récemment M. Kundt et M. de Metz ont entrepris sur ce sujet des études bien conduites. M. de Metz (4) emploie, comme M. Couette, un cylindre mobile tournant dans l'intérieur d'un cylindre fixe concentrique; un faisceau de lumière polarisée par un nicol traverse le liquide compris dans l'espace annulaire parallèlement aux génératrices; la double réfraction donne naissance à une vibration elliptique, dont on mesure les éléments.

Peut-on conclure par analogie que les liquides sont rigides? La probabilité est grande, mais une expérience directe serait beaucoup plus sûre; M. Schwedoff (5) d'odessa, le premier, essaya de l'effectuer.

Il prit encore deux cylindres concentriques (fig. 5); l'un d'eux est suspendu par un fil de torsion: on imprime au fil une certaine torsion; la gaine liquide comprise




Fig. 5. — Appareil de M. Schwedoff.

(1) Essai sur la théorie des eaux courantes (*Mémoires des savants étrangers*, t. XXIII et XXIV).

(2) Annales des Ponts et Chaussées, 1867.

(3) Journal de l'École polytechnique, t. XIII, 20^e cahier.

(4) Wiedemann. Annal. t. XXXV, 1888.

(5) Journal de physique, 2^e série, t. VIII, 1889, p. 341.

(1) Philosophical Transact., 1883.

(2) et (3) Wiedemann Annal., XXII, 1881, p. 510 et 518.

(4) Sur le passage des liquides à travers les substances perméables et les couches filtrantes. Toulouse, 1881.

entre les deux cylindres est déformée, les deux couches extérieures étant maintenues au contact des parois. Si le liquide n'était que visqueux et non rigide, toute réaction cesserait avec le mouvement; l'équilibre subsisterait dans la nouvelle position quand on détordrait le fil; le liquide, au contraire, est-il rigide, il tendra à revenir à sa position initiale, en entraînant avec lui le cylindre et imprimant au fil une torsion contraire à celle qu'il avait précédemment.

Tel est le principe de la méthode. L'appareil est délicat, les mesures difficiles; il nous est malheureusement impossible d'entrer dans le détail de toutes les ingénieuses dispositions employées par l'habile physicien (1).

Le résultat est positif : les liquides sont rigides, mais à un degré bien faible. La rigidité d'une solution contenant $\frac{1}{2}\%$ de gélatine, énorme par rapport à celle de l'eau, est cependant encore 1 trillion 840 billions de fois moindre que celle de l'acier. Le chiffre est certain... à quelques billions près.

M. Schwedoff a voulu comparer les résultats obtenus à ceux qu'on déduit de la théorie de Maxwell; indiquons le principe de cette théorie (2).

Si l'on examine la seconde méthode qui nous a conduit aux équations de Navier, un rapprochement s'impose. La théorie se développe parallèle à la théorie de l'élasticité, il ne faut que remplacer le mot vitesse par le mot déplacement, l'identité est complète, le coefficient de frottement μ devient le coefficient ε d'élasticité.

Les dimensions des deux coefficients sont telles qu'on peut considérer μ comme le produit de ε par un temps T.

Les forces moléculaires qui se développent au sein d'une masse matérielle déformée et qui constituent la rigidité acquièrent une certaine valeur E_0 ; Maxwell suppose que cette rigidité peut, quand le temps s'écoule, décroître petit à petit, et tendre insensiblement vers zéro. Dans cette idée, le temps T serait le temps au bout duquel E_0 serait réduit à la $\left(\frac{1}{e}\right)^{\text{mo}}$ partie de sa valeur primitive, (e étant la base des logarithmes népériens 2,7182818...). Pour les solides parfaitement élastiques, ce temps est infini; pour les liquides parfaitement fluides il serait nul; la généralité des propriétés de la matière ne nous autorise-t-elle pas à supposer qu'en réalité il n'est jamais ni nul ni infini?

(1) L'exactitude des résultats dépend essentiellement de la précision apportée à la mesure des angles de torsion. Cette mesure se faisait au moyen de la réflexion d'un rayon lumineux sur deux miroirs m et m' liés invariablement, l'un m au tube LF entourant le fil de torsion r et par suite à l'extrémité supérieure de ce fil fixée en L, l'autre m' au cylindre intérieur M et par suite à l'extrémité inférieure de r fixée en M.

(2) Philos. Mag., t. XXXV, 1868.

Si l'hypothèse était juste, il existerait une relation entre les deux coefficients μ et ε , et l'on devrait constater que les corps les plus visqueux sont en même temps les plus rigides. Les expériences de M. de Metz contredisent formellement cette conséquence. L'addition d'un liquide qui ne présente jamais le phénomène de la double réfraction à un autre qui le présente nettement affaiblit beaucoup les valeurs de la polarisation; la viscosité peut être au contraire augmentée dans une forte proportion.

Le frottement intérieur est 400 fois environ plus grand dans la glycérine que dans la gélatine, et cependant la gélatine devient doublement réfringente par la déformation, tandis que la glycérine ne divise pas le rayon réfracté.

Dans ses mesures, M. Schwedoff a constaté que la rigidité semble bien diminuer avec le temps, comme le voudrait la théorie de Maxwell; mais cette diminution est plus apparente que réelle : une étude précise le démontre. Les réactions produites par la déformation doivent être décomposées en deux. Les premières ne se font plus sentir, une fois la déformation produite; elles proviennent d'une partie de la déformation que l'on doit considérer comme *résiduelle*, et n'apparaissent d'ailleurs que si la déformation totale a dépassé une certaine limite; ce sont elles qui s'amoindrissent au fur et à mesure que le temps s'écoule. Les secondes sont seules actives, elles tendent seules à ramener le liquide à sa position initiale, leur valeur est constante, leur *relaxation* est sensiblement nulle. La distinction est quelque peu délicate, mais les expériences sont très précises et l'établissent nettement.

V

Le doute n'est plus permis : les liquides sont rigides comme ils sont visqueux. Dans beaucoup de phénomènes, il y a lieu de tenir compte de cette rigidité et de cette viscosité.

Des quantités physiques, en apparence indépendantes les unes des autres, sans aucun lien évident, se trouvent parfois présenter entre leurs valeurs numériques des rapports très frappants et qui ne semblent pas l'effet du seul hasard. On a trouvé parfois, dans de telles constatations, l'origine de théories intéressantes et curieuses.

Plusieurs physiciens ont ainsi cherché des relations entre la viscosité et les autres propriétés des liquides, mais les résultats sont médiocres et semblent artificiels; nous n'insisterons point sur ces travaux d'ailleurs fort nombreux. Un seul fait est vraiment à noter, nous le signalerons en terminant. G. Wiedemann (1) a montré que dans di-

(1) Poggendorff, Annal., t. IC.

verses solutions salines la conductibilité électrique est proportionnelle au coefficient de viscosité ; on regarde le plus souvent l'électrolyse comme accompagnée du déplacement des produits de la décomposition, des ions, dans la masse liquide ; la découverte de G. Wiedemann donnerait de cette manière de voir une importante justification ; malheureusement elle n'est pas très exacte ; un point toutefois a été établi d'une façon incontestable par M. Bouty (1) dans ses belles recherches sur la résistance électrique des dissolutions : pour les dissolutions très étendues, le produit de la conductibilité par le frottement interne est indépendant de la température.

Nous terminerons ici l'exposé bien sommaire et bien imparfait de ces intéressantes questions relatives à la mécanique des fluides. Un géomètre éminent, M. de Saint-Venant (1), qui a, durant plusieurs années, consacré à leur étude sa haute intelligence et son profond savoir, disait : « C'est une désespérante énigme » ; les efforts des chercheurs n'ont cependant pas été vains, si quelques points sont encore obscurs, si quelques problèmes sont encore à élucider, si l'énigme subsiste, il est aujourd'hui permis d'en attendre et d'en espérer la solution.

Lucien POINCARÉ.

Agrégé préparateur à la Sorbonne.

EXPÉRIENCES SUR L'ÉLECTROLYSE DES MUSCLES

On sait que lorsqu'un courant électrique passe à travers une dissolution saline, le sel est décomposé en métal qui va au pôle négatif et radical acide qui va au pôle positif ; les éléments solides ou gazeux mis en liberté n'apparaissent que sur les conducteurs métalliques, appelés électrodes, qui servent à amener le courant. Toute la portion liquide intermédiaire semble n'avoir subi aucune transformation. Il est évident que la quantité de substance ainsi électrolysée croît avec la durée de l'opération. Faraday a aussi fait voir qu'elle est proportionnelle à l'intensité du courant.

I

Cette propriété reçoit de nombreuses applications en chirurgie ; lorsqu'on applique des électrodes en deux points du corps et qu'on fait passer un courant, les sels dissous dans les liquides de l'organisme sont décomposés. Au pôle positif on voit apparaître des acides, au pôle négatif des bases produites par l'action sur l'eau des métaux alcalins mis en liberté. Les effets locaux que l'on obtient dépendent de la forme des électrodes employées. Si l'électrode est vaste, l'action sera faible sur une grande surface et négligeable ; elle sera intense si l'on emploie des aiguilles ou des couteaux, comme on le fait dans le traitement des anévrysmes ou la destruction des rétrécissements cicatriciels.

Sur ce point l'accord est complet, entre tous les physiologistes ; mais que se passe-t-il sur le trajet du courant à travers les tissus ? N'y a-t-il aucune modification ainsi que cela a lieu dans un liquide ? La question est des plus controversées, car jusqu'à présent on n'a donné aucune expé-

rience concluante dans un sens ou dans l'autre. Les recherches que j'ai faites sur cette question m'ont permis de donner une solution que je crois à l'abri des critiques (2).

Voici l'observation qui m'a servi de point de départ.

Enregistrons une série de contractions du muscle gastrocnémien d'une grenouille, en nous servant, pour les provoquer, d'un courant continu toujours de même sens et traversant le muscle dans toute sa longueur ; nous verrons l'amplitude des contractions aller en diminuant d'autant plus rapidement que le courant employé a été plus intense et que la durée de chaque excitation a été plus longue.

Nous ne pouvons attribuer ce résultat qu'à deux causes : à la fatigue, ou à une action du courant sur le muscle.

Ce n'est pas la fatigue, car on peut laisser reposer le muscle sans que pour cela il recouvre ses propriétés primitives ; de plus on constate qu'en renversant le sens du courant exciteur, le muscle se contracte aussi bien qu'au début. Enfin, si l'on fait une série d'excitations en renversant chaque fois le sens du courant, on peut obtenir un nombre considérable de contractions sans affaiblissement sensible.

Ces résultats s'expliqueraient très bien par l'hypothèse d'une électrolyse sur tout le trajet du courant, dont le résultat serait une modification

(1) Sur l'hydrodynamique des cours d'eau (*Comptes rendus* t. XXIV, 1872).

(2) Mes premières recherches ont paru dans ma thèse de doctorat en médecine : *Contribution à l'étude de l'électrophysiologie*, Mars 1889, Paris. J'ai fait ensuite une communication au Congrès des Electriciens (août 1889) où j'ai été vivement attaqué par M. le D^r Danion, qui d'ailleurs a été seul de son avis parmi les electriciens présents. (Le compte rendu du Congrès va paraître prochainement).

(1) *Annales de chimie et de physique*, 6^e série, t. III.

dans la substance propre du muscle. En conséquence j'ai cherché à démontrer qu'il y avait décomposition ailleurs qu'au contact même des électrodes et je me suis basé pour cela sur la polarisation.

Chaque fois qu'un courant électrique produit une action chimique, il en résulte une force électromotrice dite de polarisation de sens contraire à celle qui donne naissance au courant. Il s'agit dans le cas présent de mesurer avec précision la force électromotrice de polarisation pendant le passage du courant à travers un muscle, puis de rechercher la part qui revient aux électrodes afin de voir s'il y a un reliquat.

Je pris deux cristalliseurs (fig. 1) contenant une solution de chlorure de sodium à 1 pour 100 et je les réunis par un siphon plein du même liquide; chaque cristalliseur contenait une lame de platine servant d'électrode. Je fis passer un courant évalué au moyen d'un galvanomètre placé dans le circuit, et je mesurai la force électromotrice de polarisation pendant l'électrolyse (1). J'eus ainsi l'action des électrodes seules. Je supprimai alors le siphon et je le remplaçai par une grenouille dont les deux pattes de derrière trempaient dans les deux cristalliseurs; je fis une nouvelle mesure. Je pus constater ainsi que toujours, à intensité de courant égale, la force contre-électromotrice était plus grande dans le second cas que dans le premier, et qu'elle pouvait atteindre un maximum d'environ $\frac{1}{5}$ de Volt.

Il est donc certain qu'il se produisait des actions

(1) Voici la méthode que j'ai employée pour mesurer les forces électromotrices de polarisation; elle est due à M. Chaperon, *Journal de Physique*, 1884, p. 373.




Fig. 1. — P, pile servant à l'électrolyse. — G, galvanomètre donnant l'intensité du courant de charge. — CC, cristalliseurs. — A, commutateur. — M, condensateur de 10 microfarads. — B, commutateur. — G', galvanomètre balistique. — T, T, T, terre.

Le courant ayant passé un moment et la polarisation étant complète, on abaisse quatre ou cinq fois le commutateur A, le condensateur M prend une charge proportionnelle à la force électromotrice de polarisation de CC. On abaisse B, la charge de M passe à travers G' dont l'élongation est par suite proportionnelle à la force électromotrice cherchée.

chimiques autres que celles qui avaient lieu aux électrodes mêmes. On m'a objecté que cela pouvait être au contact de la peau et du liquide des cristalliseurs; il me semble cependant que le doute n'est pas possible, si l'on rapproche cette expérience de la diminution de contractilité produite par le passage du courant; j'indiquerai d'ailleurs encore divers faits venant confirmer mon hypothèse.

Arrivé à ce point, je voulus rechercher si l'action chimique se bornait à la mise en liberté de produits capables de se recombiner dans la suite, ou de s'éliminer, le muscle reprenant alors ses propriétés primitives.

Sur une première grenouille, je fis passer un courant continu dans une patte jusqu'à ce que le gastrocnémien fût devenu peu contractile sous l'influence d'excitations faites à l'aide d'un courant continu de même sens que le premier; cela fait, je retirai la pile du circuit que je fermai sur lui-même. Si nous nous trouvions en présence d'une simple décomposition, la grenouille allait se comporter comme un accumulateur et se dépolariser. Or, il n'en fut rien : au bout de deux heures, il n'y avait aucun changement.

Une seconde grenouille fut aussi soumise à un courant continu; après quoi je la remis dans l'aquarium où elle séjourna huit jours. Au bout de ce temps je pus constater que non seulement elle n'était plus excitable pour un courant de même sens que celui qui avait servi à faire l'électrolyse, mais aussi pour un courant de sens contraire ou même un courant induit; le muscle était altéré.

J'avais de plus fait une expérience parallèle sur une troisième grenouille, mais en me servant d'un courant alternatif d'une bobine d'induction. Au bout de huit jours, la contractilité était aussi parfaite que dans la patte témoin à laquelle je n'avais pas touché.

II

Non seulement ces trois expériences confirment pleinement ma théorie, mais encore elles permettent de pousser plus loin l'analyse des faits.

Le courant électrique traversant des muscles y donne lieu sur tout son parcours à des décompositions chimiques; à la suite de ces décompositions il y a action secondaire des produits mis en liberté sur la substance propre des muscles. Cette action secondaire ne tue pas le muscle immédiatement, car un courant de sens contraire au premier peut lui rendre sa contractilité, mais il est atteint et périclité si on ne lui porte remède rapidement.

Une idée qui s'impose maintenant est de rechercher ce que peut donner l'examen microscopique.



Fig. 2. — Fibre musculaire normale.

J'ai fait un grand nombre de préparations par les méthodes les plus variées; ayant toujours obtenu les mêmes résultats, il me suffira de donner deux dessins à la chambre claire, l'un d'une coupe en travers d'un gastrocnémien de grenouille altéré et l'autre d'une coupe en long. Cette grenouille avait été soumise à cinq ou six jours d'intervalle à des séances d'électrolyse de cinq minutes, l'intensité du courant étant de deux milliampères. L'animal avait été sacrifié huit jours après la dernière séance.




Fig. 3. — Coupe transversale.

Sur la coupe en travers (fig. 3), on voit les fibres musculaires très inégales comme forme et comme volume; au lieu d'être presque accolées les unes aux autres comme sur le muscle normal, elles sont séparées, le tissu conjonctif interfasciculaire ayant pris un grand développement.

Mais ce qui est bien plus intéressant, c'est ce que l'on observe sur les dissociations et les coupes en long (fig. 4). En faisant des coupes à diverses




Fig. 4. — Coupe longitudinale.

époques après l'électrolyse, j'ai pu suivre l'altération dans ses diverses phases représentées sur la figure. D'abord la striation transversale des muscles disparaît et ils deviennent un peu plus transparents; puis le muscle se fragmente de plus en

plus jusqu'à être réduit en granulations. Son enveloppe ou sarcolemme semble résister plus longtemps. On retrouve aussi, dans les préparations, des fibres bien plus fines que les autres et admirablement striées; je ne sais encore d'où elles viennent; peut-être se sont-elles formées depuis la dernière séance d'électrolyse; ce point peut donner lieu à une étude intéressante.

En dernier lieu, pénétré de cette idée que les mêmes lois s'appliquent à la matière, organisée ou non, et convaincu que lorsqu'on a l'explication rationnelle d'un phénomène produit par les agents physiques sur les tissus vivants, on doit pouvoir le reproduire sur les corps inorganiques, je fis une expérience qui donne l'explication physique des faits ci-dessus exposés.

Je pris un tube en U dans le fond duquel je versai une solution de gélatine fortement salée et colorée au tournesol bien neutre; dans chaque branche, une fois la gélatine solidifiée, je versai de l'eau colorée au tournesol, puis je fis passer un courant à l'aide d'électrodes en platine. Le résultat ne se fit pas attendre; non seulement je vis le tournesol changer de couleur au niveau des lames de platine, mais aussi à la surface de séparation de la gélatine et de l'eau: il vira au bleu du côté du pôle négatif, au rouge du côté du pôle positif.

Enfin je cherchai à reproduire autant que possible ce que je crois devoir se passer dans les muscles. Reprenant mon tube en U je plaçai dans le fond une solution de gélatine contenant du chlorure de sodium, et au-dessus de chaque côté je versai de l'eau albumineuse. Je fis passer alors le courant et je vis l'albumine se coaguler à la surface de séparation du côté du pôle positif et se dissoudre complètement du côté du pôle négatif.

Donc sous l'action du courant il peut y avoir formation d'acides et de bases à la surface de séparation de deux milieux non métalliques: or le muscle n'est pas une masse homogène et nous pouvons y retrouver toutes les conditions de l'expérience que je viens de citer. Sous l'influence du courant il y aura en certains points dégagement d'acides, en d'autres de bases. — Ces acides et ces bases au contact de la myosine agiront sur elle pour l'altérer. — Si l'on renverse le sens du courant, on peut annuler le premier effet, mais si l'action des acides et des bases sur la myosine n'est pas arrêtée rapidement, l'altération devient profonde, et il en résulte les phénomènes signalés plus haut.

Ces recherches sont loin d'être complètes, j'espère pouvoir bientôt continuer mes expériences et pousser plus loin l'étude des faits.

Dr Georges Weiss.

Professeur agrégé
à la Faculté de Médecine de Paris

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Bertrand (Joseph). — *Calcul des probabilités*, 1 vol. gr. in-8°, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1889.

Réduite à ses moindres termes, la théorie des probabilités consiste en cinq ou six propositions fondamentales. Ce sont d'abord les principes relatifs à la probabilité totale, à la probabilité composée et à l'espérance mathématique, puis le théorème des épreuves répétées et celui de Jacques Bernoulli, enfin le principe de Bayes sur la probabilité des causes.

Dans l'exposition de ces principes, M. Bertrand s'est surtout attaché à préciser les conditions dans lesquelles ils sont applicables et à mettre en garde contre toute fausse interprétation. Les principes sont justes; ils conviennent à toutes les probabilités simples évaluées en nombre; mais c'est dans cette évaluation qu'est le péril; si elle est imparfaite, les conséquences ne méritent aucun crédit. Des exemples propres à piquer la curiosité du lecteur et à captiver son attention viennent tour à tour éclairer la doctrine et donner à l'exposition un attrait particulier.

Le calcul des chances n'a été d'abord qu'une science purement spéculative; Pascal, Fermat, Leibnitz, Huygens n'avaient guère en vue que le problème des *partis*. C'est le théorème de Bernoulli qui a donné au calcul des probabilités sa valeur objective. « Le hasard, à tout jeu, corrige ses caprices; les irrégularités même ont leur loi. » Telle est l'image heureuse par laquelle M. Bertrand traduit cette proposition qui, publiée en 1763 dans l'Arts *conjectandi*, est devenue justement célèbre. Son énoncé mathématique est le suivant: si on nomme *écart* la différence entre la probabilité d'un événement et le rapport du nombre de ses apparitions au nombre total des épreuves, et si on prend ce dernier nombre assez grand, il y aura une probabilité, aussi voisine qu'on voudra de la certitude, que l'écart soit moindre que toute quantité donnée. Mais, encore ici, il y a des précautions à prendre dans l'application; M. Bertrand les définit avec netteté: la probabilité doit être objective et rester constante pendant les épreuves. Par exemple, la probabilité pour qu'il pleuve demain ne comporte pas l'application du théorème de Bernoulli.

L'emploi du théorème de Bayes sur les probabilités *à posteriori* donne lieu à des observations analogues; et, c'est avec un vif intérêt que l'on voit l'illustre maître condamner, d'un style ferme et incisif, l'emploi de certaines formules relatives à la probabilité des événements futurs, déduites des événements observés comme corollaire de la probabilité des causes. N'est-on pas allé jusqu'à calculer la probabilité de la présence du Soleil dans un nombre d'années assigné!

Parmi les applications du calcul des probabilités, celle qui se rapporte aux erreurs fortuites et à la méthode des moindres carrés est assurément la plus intéressante et la plus utile. C'est aussi celle qui tient la plus large place dans l'ouvrage qui nous occupe. Il pouvait sembler qu'après Gauss il n'y eût plus rien à glaner dans ce champ; et cependant que d'aperçus ingénieux, que de formules nouvelles et élégantes ne trouve-t-on pas dans les quatre chapitres consacrés à ce sujet! Les travaux si remarquables du grand géomètre de Göttingue sur la combinaison des erreurs d'observation y sont exposés avec une hauteur de vue en harmonie avec leur importance, et discutés avec la finesse et la précision qui caractérisent la manière

du savant secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

La question de la ruine des joueurs a fourni la matière d'un chapitre fort instructif. Quand le jeu est équitable, la ruine des joueurs est certaine, mais en combien de temps? Cette question de la durée du jeu a exercé la sagacité des géomètres les plus distingués; elle a, disons-le en passant, fait l'objet du premier mémoire d'Ampère; mais elle est loin d'être épuisée, tant on peut changer les conditions et varier le point de vue. Parmi les résultats nouveaux rencontrés par M. Bertrand, nous signalerons en particulier celui-ci: Si deux adversaires jouent, à des conditions équitables, jusqu'à la ruine de l'un d'eux, les mises étant de un franc à chaque partie, le nombre probable des parties est égal au produit des deux fortunes. L'étude du cas où le jeu n'est pas équitable nous a conduit nous-même à une formule susceptible d'une heureuse interprétation et à laquelle M. Bertrand a fort gracieusement donné asile dans son livre.

La doctrine des chances n'offre plus la même certitude quand on l'applique à la statistique et aux décisions judiciaires. Deux chapitres sont consacrés à ces questions, et c'est ici que l'idée maîtresse de l'œuvre apparaît dans tout son éclat: l'application du calcul des probabilités n'est légitime que pour des événements fortuits assimilables à des tirages dans une urne; l'imvariabilité approchée du rapport entre le nombre des événements et le nombre total des épreuves est une condition nécessaire pour l'assimilation, mais elle ne suffit pas, il faut encore que les probabilités d'écart soient les mêmes. C'est pour avoir ignoré ou méconnu ces préceptes que des géomètres de grand renom se sont livrés sur les probabilités des jugements à des calculs stériles dont Stuart Mill a pu dire, non sans raison, qu'ils étaient le scandale des mathématiques. L'assimilation des jurés à des urnes est plus que téméraire; M. Bertrand en fait prompt et bonne justice. Le récit fort piquant des étranges tentatives de Condorcet et de ses adeptes termine cet ouvrage remarquable dont nous sommes parvenu peut-être à faire pressentir l'importance, mais dont la lecture seule peut faire apprécier le charme pénétrant.

Eugène Roucné.

Madamet (A.) Directeur de l'École d'application du Génie maritime. — *La Thermodynamique et ses applications aux machines à vapeur*. Un vol. grand in-8° de 237 pages, avec 97 fig. dans le texte, Bernard et C^{ie}, éditeurs, 53 ter, quai des Grands-Augustins.

Le volume que vient de publier M. Madamet sur la thermodynamique ne fait pas double emploi avec les nombreux traités déjà parus sur ce sujet; son livre se distingue par un caractère spécial: c'est un livre pratique; il s'adresse aux ingénieurs plutôt qu'aux purs théoriciens.

Ce point de vue particulier auquel l'auteur s'est placé et qui constitue le très grand intérêt de son ouvrage apparaît dès les premières pages, dans l'exposé même des notions générales sur lesquelles repose la science. Après avoir donné le principe de l'équivalence et le principe de Carnot, M. Madamet fait remarquer que le premier, en fournissant l'équivalence de l'énergie calorifique et de l'énergie mécanique, renseigne sur la *quantité* de la chaleur, tandis que le second, en faisant connaître la fraction maxima du calorique qui peut

être converti en travail, donne en quelque sorte la *qualité* de la chaleur. Cette remarque, dont les applications pratiques ont de l'importance, montre bien dans quel esprit le livre est conçu.

L'auteur, après avoir appliqué rapidement la thermodynamique aux gaz, aux liquides et aux vapeurs, arrive à l'étude des divers phénomènes relatifs aux machines à vapeur; c'est là vraiment la partie importante de l'ouvrage; toutes les questions si complexes, si difficiles, que fait naître l'emploi des moteurs y sont successivement étudiées; les problèmes de détente ou de compression irréversibles des gaz et des vapeurs, le calcul des échanges de chaleur entre la vapeur et les parois, l'influence des détentes successives, des espaces morts, de la surchauffe, de l'entraînement d'eau, de l'étranglement de la valve, de l'enveloppe de vapeur... etc., y sont l'objet de chapitres spéciaux.

Toute cette portion du livre nous a paru d'un réel intérêt, en ce sens qu'elle ne prête pas à une critique trop souvent faite, et à juste titre, aux applications de la thermodynamique; les gaz parfaits n'existent pas, les courbes adiabatiques sont irréalisables, les moteurs réversibles sont purement fictifs et si l'on veut appliquer les formules de la théorie aux cas de la pratique, on fait de telles hypothèses qu'on pourrait ainsi tout démontrer avec le même degré de vraisemblance.

Mais s'il est ainsi impossible d'étudier *a priori* avec une rigueur mathématique les phénomènes que présente une machine, il n'en est pas moins vrai que la théorie peut fournir à la pratique d'utiles renseignements et des explications fondées; c'est ainsi, par exemple, qu'en ce qui concerne les échanges de chaleur, on est en mesure, comme l'a montré M. Dwelshauvers-Dery, de les calculer avec une grande approximation. C'est à ce point de vue essentiellement raisonnable que se place M. Madamet et c'est pourquoi nous pouvons conseiller aux ingénieurs, aux praticiens, d'avoir son livre: ils le consulteront avec fruit.

H. L.

2° Sciences physiques.

Guillaume (Ch.-Ed.). — *Traité pratique de thermométrie de précision*. Un volume grand in-8°, 336 pages, 12 tables et 4 planches. Gauthier-Villars et fils.

Peu de personnes se font une idée exacte des erreurs qu'elles peuvent commettre dans la lecture d'un thermomètre. Tous les observateurs consciencieux dont les recherches étaient dirigées vers les effets de la chaleur ont été amenés à se préoccuper de la détermination précise des températures, et chacun a fourni quelques renseignements utiles sur la solution pratique de ce problème; mais il restait à coordonner leurs travaux et à les compléter par une étude systématique de la question. Cette étude a été entreprise par le Bureau international des poids et mesures avec les ressources exceptionnelles que cette institution doit à son caractère; la part considérable qu'y a prise M. Guillaume le désignait pour résumer dans un traité spécial les résultats obtenus.

Les températures qui font plus particulièrement l'objet de ce traité sont comprises dans l'intervalle de 0° à 100°, mais c'est déjà un bon résultat que de pouvoir, dans cet espace restreint, réduire à quelques millièmes de degré l'erreur possible des observations isolées.

L'échelle thermométrique qui s'accorde le mieux avec les principes de la thermodynamique est celle que l'on fonde sur la dilatation réelle de l'hydrogène, et c'est à elle qu'on devra rapporter dorénavant toutes les températures mesurées; mais le thermomètre fondé sur la dilatation apparente du mercure dans le verre restera toujours l'instrument immédiat le plus commode à observer et à adopter dans toute espèce de recherche. Or le thermomètre à mercure, désormais convenablement

construit, étudié et observé suivant des règles bien définies (ch. I et II), fournira des indications que l'on saura dégager de toutes les causes d'erreur et en particulier de la variation si complexe du réservoir (ch. III); ces indications corrigées, variables avec la nature du verre (ch. IV), permettront enfin de connaître, d'après la comparaison qui a été faite une fois pour toutes (ch. V), la température qu'on indiquée, dans les mêmes conditions, un thermomètre à hydrogène. Un dernier chapitre du livre de M. Guillaume est consacré à l'étude de la dilatation des solides. Les tables qui le terminent mettent au point, on peut le dire, l'état actuel de la science en ce qui concerne les mesures de haute précision.

Ch. RIVIÈRE.

Witz (Aimé), Docteur ès sciences, Ingénieur des arts et manufactures, Professeur de physique à la Faculté libre des Sciences de Lille. — *Exercices de Physique et Applications préparatoires à la licence*. Un vol. in-8° de 320 pages avec 144 fig. dans le texte; Gauthier-Villars et fils, 55, quai des Grands-Augustins à Paris.

Sous un titre modeste ce livre tient plus qu'il ne promet; c'est un recueil de problèmes, d'exercices, où toutes les questions que peut amener l'étude de la haute physique sont posées et résolues; la thermodynamique, en particulier, a un développement considérable; l'électricité occupe près de la moitié du volume.

Chacun des chapitres est précédé d'un résumé très clair, très précis, très bien fait, de la théorie à laquelle il se rapporte; un tableau synoptique, placé à la suite de ce résumé, réunit les constantes numériques qu'il faut connaître; puis viennent les applications.

Ce volume, qui comprend près de 500 problèmes et où les questions les plus délicates de la physique sont abordées, nous paraît avoir une réelle importance; il réunit des qualités si incontestables de clarté, de hauteur de vues, que nous n'hésitons pas à le signaler non seulement aux étudiants qui préparent la licence, mais encore aux maîtres, dont il est digne à tous égards de fixer l'attention.

L. O.

Dewar. — *Phosphorescence et Ozone*, Communication faite à l'Institut royal de la Grande-Bretagne, le 8 juin 1889, et non encore publiée.

Geissler découvrit le premier que les gaz très raréfiés sont phosphorescents. Il faisait passer une décharge électrique dans une série de ballons vides, et constatait ainsi que le résidu gazeux restait lumineux environ cinq secondes après la cessation de la décharge. On ne connaît pas les transformations chimiques qui se produisent dans de telles conditions. Becquerel et plusieurs autres physiciens sont arrivés sur ce point à des résultats contradictoires; les uns rapportent le phénomène à la présence de l'ozone, la phosphorescence ne s'obtenant qu'avec les composés oxygénés, les autres croient à une action de la substance qui constitue les tubes.

M. Dewar a entrepris à ce sujet de nouvelles expériences. L'appareil qu'il emploie est représenté (fig. 1.) Une puissante machine pneumatique permet d'obtenir un courant continu d'air à une pression très faible. Cet air se dessèche et se purifie dans les tubes A. et B. contenant : A, du chlorure de calcium; B, de la potasse caustique; il est filtré ensuite sur du coton C, contenu dans un tube en U; après quoi il entre dans un tube à deux ampoules, où l'on peut faire passer des décharges électriques. Les pôles peuvent être indifféremment en charbon, en platine ou en aluminium, cela ne modifie pas les résultats. La partie inférieure du tube s'ouvre dans un large cylindre de verre D mis en communication avec la machine pneumatique et un manomètre à mercure M. Quand le courant d'air fortement raréfié passe à travers le tube (qui est entouré d'une boîte pour

cacher la lueur de la décharge électrique), une traînée lumineuse d'environ deux pieds de long, rappelant par




Fig. 1.

sa forme la queue d'une comète, apparaît dans le cylindre de verre.

Cette lueur peut se produire avec d'autres gaz que l'air, mais seulement avec ceux qui contiennent de l'oxygène. L'oxygène pur augmente l'intensité de la lueur, mais la raccourcit; l'acide carbonique, le bioxyde d'azote donnent des aigrettes brillantes. On peut constater qu'avec tous ces corps il se produit de l'ozone en plaçant dans la lueur de l'iodure de potassium qui brunit immédiatement. Sur les parois du tube il reste au contraire intact.

L'hydrogène, les matières organiques, surtout les huiles essentielles font disparaître la phosphorescence. Il suffit de placer dans le voisinage de la prise d'air un mouchoir contenant une matière odoriférante pour voir la lueur s'éteindre, et il faut attendre ensuite assez longtemps avant que l'appareil fonctionne comme auparavant. Tous ces faits tendent à montrer que c'est à l'ozone seul qu'est due la phosphorescence.

L'ozone s'est donc formé dans l'appareil à une température très élevée. Pour montrer la possibilité de cette réaction, M. Dewar décrit un appareil analogue à celui que MM. Troost et Hautefeuille ont employé dans le même but. Cet appareil est représenté fig. 2. Il se compose de trois tubes concentriques : A en verre, B, C en platine. Un courant d'eau froide circule entre A et B et se déverse ensuite par A en entraînant le gaz compris entre B et C par un petit trou ménagé au sommet de B. Entre les deux tubes de platine on fait alors circuler




Fig. 2.

de l'oxygène et on chauffe extérieurement l'appareil au moyen d'un chalumeau oxyhydrique. L'oxygène ainsi chauffé est brusquement entraîné et refroidi par le courant d'eau; on constate alors qu'il est ozonisé. Ainsi l'ozone s'est formé sous l'action d'une température élevée, permettant la dissociation des molécules d'oxygène et leur recombinaison en molécules plus complexes d'ozone. « Nous pouvons concevoir qu'il n'est pas improbable

« que quelques-uns des corps élémentaires puissent « être formés un peu comme l'ozone dans l'expérience « précédente, mais à des températures très élevées, par « l'association de certains composants dissociés, et avec « absorption simultanée de chaleur. »

Georges CHARPY.

Perman (E.). Températures d'ébullition du sodium et du potassium, *Journal of the Chemical Society*, 1889, p. 326-329.

Les métaux alcalins attaquant rapidement les enveloppes de verre à la température du rouge, ceux-ci sont portés à l'ébullition dans un tube de fer. Dans la vapeur métallique, on y longe de petites sphères de verre terminées par une longue tige capillaire que l'on ferme à la lampe quand elles se sont mises en équilibre de température avec la vapeur (l'équilibre est atteint assez rapidement pour que le verre ne soit pas sensiblement attaqué). Ces ampoules sont lavées à l'eau bouillante pour détruire le métal adhérent, soigneusement essuyées et pesées; on en brise alors la pointe sous l'eau, on détermine le poids de l'eau qui a pénétré dans l'appareil et aussi celui du même liquide qui le remplit complètement; avec la mesure de la pression atmosphérique, on a les données nécessaires au calcul de la température par la formule

$$\frac{VH}{1 + \alpha t} = \text{const.}$$

Par cette méthode l'auteur a trouvé :

Température d'ébullition du sodium.....	742°
» » » potassium.....	667°

Henri GAUTIER.

3° Sciences naturelles.

Roux (E.), chef de service à l'Institut Pasteur. — Bactérie charbonneuse asporogène, *Annales de l'Institut Pasteur*, t. IV, n° 1, 25 janvier 1890.

Les expériences célèbres de MM. Pasteur, Chamberland et Roux sur la fabrication du vaccin anti-charbonneux ont établi que la culture de la bactérie à 42°5 : 1° diminue sa virulence; 2° suspend sa faculté sporogène. En 1883, MM. Chamberland et Roux ont montré qu'on peut la destituer de cette propriété d'une façon définitive en ajoutant $\frac{1-3}{5000}$ de bichromate de potasse au bouillon dans lequel elle se développe. Sa virulence, atténuée par l'antiseptique, se conserve ensuite sans changement appréciable dans les cultures du filament en bouillon ordinaire.

M. Roux vient de constater que la prolifération du microbe au contact prolongé de l'acide phénique à $\frac{1-3}{5000}$ produit aussi ce résultat. En passant successivement de lapin à lapin par l'inoculation du sang de l'animal qui vient de mourir, les filaments rendus asporogènes voient leur virulence s'exalter, mais sans jamais recouvrer leur faculté primitive de former des spores.

Cette observation est très importante pour la théorie de l'atténuation des virus. Dans les cultures à 42°5, instituées par MM. Pasteur, Chamberland et Roux pour transformer en vaccin la bactérie virulente, l'agent de l'atténuation restait à déterminer, puisque deux facteurs pouvaient agir à la fois : la température et l'oxygène de l'air. Les nouvelles expériences de M. Roux prouvent qu'à 33° l'action de l'air sur les filaments asporogènes « n'est pas assez énergique pour produire la diminution de virulence; elle doit être exaltée par une température plus élevée ».

Signalons aussi avec l'auteur quelques conclusions qui ne sont pas particulières à ses recherches, mais que son travail confirme et tend à généraliser : la

transmission héréditaire d'un caractère biologique (impuissance à former des spores) acquis, une fois pour toutes, à la suite d'un artifice de culture; l'impossibilité de fonder d'une façon certaine la distinction spécifique des microbes sur les différences de leur virulence et de leur développement. M. Roux commente à ce sujet une hypothèse émise depuis longtemps par M. Pasteur : « Les organismes pathogènes que nous connaissons aujourd'hui sont peut-être, dit-il en terminant, d'anciens saphrophytes adaptés progressivement à la vie parasitaire. »

L. O.

Boschetti (D^r Federico.) — *L'Anatomia del Cavallo, presentata in Tavole sinottiche*; brochure in-4^e, *Unione tipografico-editrice Torinese*, Torino, 1890.

L'auteur est le traducteur italien du classique *Traité d'Anatomie comparée*, de MM. Chauveau et Arloing. Pour faciliter l'étude du cheval, il a composé un ensemble de 14 tableaux où se trouvent très heureusement groupés, sous forme synoptique, toutes les particularités saillantes de l'organisation de cet animal. Son opuscule, écrit surtout pour les vétérinaires, rendra service aussi à tous ceux qui s'occupent d'Anatomie comparée.

L. O.

Beauregard (H.). — *Les Insectes vésicants*. F. Alcan. Paris, 1890.

4^e Sciences médicales.

Verneuil (A.). — *Propriétés pathogènes des microbes renfermés dans les tumeurs malignes*, *Rev. de chirurgie*, Paris 1889, t. IX, p. 793.

Frappé des accidents fébriles qui surviennent quelquefois chez les malades qu'il opère, en particulier dans les cas où il s'agit de néoplasmes ramollis, le professeur Verneuil a cherché si la cause des accidents n'était pas dans une auto-inoculation produite au cours de l'intervention. Les recherches, qu'il a pratiquées avec la collaboration de ses chefs de laboratoire successifs MM. Nepveu et Clado, lui ont fait constater la présence dans ces néoplasmes de microbes de nature variable. Ce seraient ces microbes qui amèneraient dans l'évolution et la nutrition des tumeurs diverses modifications, entre autres l'accroissement rapide, le ramollissement et l'ulcération; leur présence expliquerait aussi la fièvre plus ou moins intense et irrégulière, qu'on observe quelquefois chez les malades porteurs de certaines tumeurs malignes et qu'on a décrite sous le nom de fièvre des néoplasmes. En résumé, mémoire plein de vues ingénieuses, qu'on lira avec intérêt et qui demande de nouvelles recherches, que M. Verneuil nous promet, du reste, dans un avenir prochain.

HARTMANN.

L. Wickam, interne des hôpitaux. — *Anatomie pathologique et nature de la « maladie de Paget du mamelon »*. Laboratoire de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis. (*Archives de médecine expérimentale*, 1890, T. I, p. 46).

Cette maladie, décrite en 1874 par Paget, reconnue d'origine parasitaire après les remarquables travaux de Darier (1889), présente un intérêt puissant, en ce sens qu'elle est un des aboutissants de la théorie parasitaire du cancer, les parasites qui la produisent (sporozoaires de l'ordre des sporospermies) semblant avoir une influence directe sur le développement de l'épithéliome, dernier stade de son évolution. Rare avant la ménopause, généralement unilatérale, elle débute par le mamelon, qui, tendant de suite à se rétracter, se charge de concrétions cornées ou de petites croûtes recouvrant une légère exulcération. L'aréole est en-

suite envahie, puis les tissus voisins, sous forme d'une plaque rouge, — présentant : en certains points des squames et des croûtes; en d'autres, de petites exulcérations rouge vif, humides; ailleurs des plaques épidermiques minces et sèches, cicatricielles, que les sensations de brûlure et les démangeaisons qui l'accompagnent, pourraient faire prendre pour de l'eczéma, si elle ne franchait sur les tissus sains par ses bords bien limités, de couleur rosée, en forme de bourrelet régulièrement circulaire ou polycyclique. A une période variable de ce développement lent et progressif, parfois plusieurs années après le début, le mamelon qui a continué à se rétracter par formation de tissu scléreux (Vidal) devient le siège d'une ulcération végétante. L'épithéliome, qui a débute par l'épiderme ou par les glandes ou leurs conduits est constitué; il est toujours à type pavimenteux, de forme lobulée ou tubulée. Dans les lobes et les tubes épithéliaux on trouve toujours des sporospermies bien évidentes nettement enkystées, sporospermies dont M. L. Wickam a pu suivre pas à pas l'évolution pathogénique dans les périodes : de début (squameuse), intermédiaire (exulcération), terminale (épithéliale) de la maladie du mamelon.

D^r E. DE LAVARENNE.

Schaffer (D^r) (de Buda-Pesth). — *Nouvelle contribution à la pathologie et à l'histologie de la rage humaine*. (*Annales de l'Institut Pasteur*, n^o 12, 1889.)

L'auteur a eu l'occasion de faire l'autopsie de six individus morts de la rage; à cette occasion il a pu étudier à nouveau les lésions du système nerveux. Comme les autres auteurs il a constaté à l'œil nu des congestions et des hémorragies dans diverses régions de la moelle; mais après durcissement des centres nerveux dans le liquide de Müller, il a trouvé un grand nombre de petits îlots atteints de ramollissement nécrotique; déjà M. Gamaleïa avait signalé que la rage médullaire est caractérisée par la nécrose des foyers. Ces lésions dans les cas de M. Schaffer se montraient dans les cornes antérieures et postérieures et dans la substance blanche, surtout à la limite des faisceaux de Goel et de Burdach. M. Schaffer a fait voir que les régions de la moelle les plus altérées sont celles qui correspondent au lieu de la morsure, c'est-à-dire moelle cervicale surtout atteinte dans les morsures du membre supérieur, moelle lombaire dans celles du membre inférieur. Les faits expérimentaux de Burdach, de Cantani, de Veste et Zagari avaient déjà éclairé ce point de doctrine, bien en rapport avec la théorie nerveuse de la rage généralement acceptée aujourd'hui, théorie qui veut que le virus rabique suive le trajet des troncs nerveux, de la morsure aux centres bulbo-médullaires. L'auteur ne dit pas s'il a trouvé des localisations bulbaires dans les cas de morsure à la face.

Les faits réellement nouveaux du mémoire de M. Schaffer consistent dans les altérations des éléments nerveux non signalées jusqu'ici. Les cellules des cornes antérieures présentent des altérations variées, atrophie pigmentaire, formation de vacuoles, mais surtout une dégénérescence granuleuse du noyau de la cellule; ce que l'auteur appelle dégénérescence fibrineuse n'est probablement que le premier degré de l'atrophie granuleuse. Les altérations de la substance blanche consistent en une hypertrophie du cylindre-axe, dégénérescence des gaines de myéline qui peuvent disparaître. Mêmes lésions dans le bulbe. Les nerfs périphériques en rapport avec le lieu de la morsure sont aussi malades; les altérations consistent en infiltration de leucocytes, hypertrophie du cylindre-axe, dégénérescence de la gaine. De tous ces faits l'auteur conclut que les lésions de la rage sont caractérisées par une myélite aiguë, insulaire, disséminée, non systématique, avec prédominance dans la région correspondant à la morsure.

D^r H. DUBIEF.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 27 janvier 1890.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. A. Cayley** : Sur les racines d'une équation algébrique. — **M. Paul Appell** : Sur les fonctions de deux variables à plusieurs paires de périodes. — **M. Paul Painlevé** : Sur les transformations simplement rationnelles des surfaces algébriques. — **M. de Jonquières** : Sur le théorème d'Euler dans la théorie des polyèdres. — **M. Du ménil** : Variations de grandeur de l'étoile Mira-Ceti.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Ch. V. Zenger**, en comparant les Tables spéciales, a remarqué que les orages magnétiques et les aurores boréales sont simultanés sur les continents européen et américain, ce qui montre leur origine extra-terrestre; il relève en outre une relation entre ces phénomènes d'une part, d'autre part la période solaire de 12, 6 jours et le passage des essais périodiques d'étoiles filantes. — **M. A. Etard**, qui avait précédemment étudié la solubilité d'un mélange de chlorures de divers métaux, a étudié cette fois le cas où dans la solution d'un même métal, les métalloïdes varient; en déterminant la quantité et la composition de la partie du mélange qui se dissout à des températures variables, il met en lumière la loi suivant laquelle les métalloïdes se partagent la saturation d'un métal en fonction de la température. — Après avoir reconnu que les solutions d'iode dans les divers dissolvants présentent une gamme de nuances allant du violet au brun, **MM. H. Gautier et G. Charpy** appliquant à ces solutions la méthode cryoscopique concluent que le poids moléculaire de l'iode en dissolution prend, depuis 1^{er} dans les solutions brunes, des valeurs d'autant plus voisines de 1² (molécule de l'iode en vapeur), que la couleur de la solution se rapproche davantage du violet. — **M. L. Amat** a fait l'étude calorimétrique des phosphites et pyrophosphites de soude. — **MM. A. Béhal et V. Auger** en faisant réagir le chlorure d'éthylmagnésium sur l'éthylbenzène en présence du chlorure d'aluminium, ont obtenu une diéthylbenzène en position méta. — **M. A. de Schulten**, en faisant évaporer lentement le carbonate d'ammoniaque d'une solution de carbonate de cuivre dans ce sel, a obtenu la formation de cristaux de malachite, identiques aux points de vue cristallographique et optique à la malachite naturelle, et peu différents comme indice de dureté.

2° SCIENCES NATURELLES. — **M. L. Ranvier** a trouvé dans diverses membranes connectives des Vertébrés des éléments particuliers qu'il appelle *clasmatoctes*. Ces cellules, facilement visibles sur un mésentère de Batracien fixé à l'acide osmique et coloré par le violet de méthyle BBBB, présentent comme propriété caractéristique un bourgeonnement incessant. Elles proviennent de globules blancs émigrés dans les mailles du tissu conjonctif. On trouve en effet toutes les formes intermédiaires entre le globule blanc amiboïde et le clasmatoctes bien caractérisé. — **M. Ch. Bohr** comparant la tension des gaz dans le sang et dans l'air expiré par le poulmon, conclut que les différences de pression ne peuvent expliquer les échanges respiratoires et qu'il faut admettre, de la part du parenchyme pulmonaire, une sorte d'action sécrétoire. — **M. Ch. Musset** a démontré sur un certain nombre de plantes croissant librement, que la lumière de la lune exerce une action sur l'orientation des fleurs. Il appelle cette action *sel-*

notropisme. — **M. Abel Dutartre** signale le fait que le poison de la salamandre a une action destructive intense sur les globules sanguins des mammifères et des batraciens. — **M. Aimé Girard** indique que l'espèce de pomme de terre appelée *Richters imperator* donne des rendements en fécule supérieurs à ceux des autres espèces. — **M. Dehérain** confirme le fait. — **MM. G. Sée et Bordes**, étudiant la pneumonie fibrineuse au point de vue bactériologique, ont toujours retrouvé le *diptococcus lanceolatus* dans le poulmon des individus morts de cette maladie, plusieurs fois dans d'autres organes, une seule fois dans le sang. — **M. A. de Grossouvre** signale la présence de fossiles alpins dans le callovien de l'Ouest de la France.

Séance du 3 février 1890.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. A. Cayley** : Sur les racines d'une équation algébrique. — **M. A. Mannheim** : Sur un mode de transformation en géométrie cinématique. — **M. L. Ralfy** : Détermination de toutes les surfaces harmoniques réglées. — **M. Paul Painlevé** : Sur les transformations simplement rationnelles des surfaces, et sur une classe d'équations différentielles. — **M. F. Tisserand** : Sur les noyaux de la grande comète II de 1882. — **M. Tacchini** : Observations solaires du second semestre de 1889.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — Poursuivant leurs recherches sur la propagation du son dans un tuyau cylindrique, **MM. Violle et Vautier** sont parvenus à établir un certain nombre de faits dont les plus généraux sont les suivants : Quelle que soit la nature de l'ébranlement initial, l'onde sonore tend vers une forme simple déterminée. — Cette forme une fois atteinte, les différentes parties de l'onde se propagent avec une même vitesse uniforme. La vitesse normale de propagation du son dans l'air libre, sec, à 0° est de 331^m.10. — **M. Joubin** a étudié l'état du champ magnétique dans les conducteurs à trois dimensions; il a employé comme conducteur une large colonne de solution de sulfate cuivrique; en observant les déviations d'un petit aimant promené à l'intérieur comme à l'extérieur de cette colonne liquide, il a reconnu que le champ magnétique produit par un courant existe aussi bien dans le milieu traversé par le flux électrique que dans le milieu extérieur et qu'il y a continuité en passant par la surface de séparation. — **M. J. Borgman** a répété les expériences de **M. E. Thomson** sur les actions mécaniques des courants variables; il a obtenu quelques faits nouveaux, par exemple en faisant agir ces courants sur du mercure en couche mince. — **M. R. Savatier** expose les résultats des observations actinométriques qu'il a faites à Kiev en 1888-1889 au moyen de l'actinomètre de **M. Crova**. — **M. Joannis**, qui avait étudié la tension de dissociation du sodammonium, conteste la légitimité de l'interprétation que **M. Roozeboom** a donnée de ces phénomènes d'après ses propres études sur l'équilibre. Il apporte quelques faits nouveaux qui contredisent cette interprétation. — **M. Besson** a étudié les combinaisons du gaz ammoniac et du gaz hydrogène phosphoré avec le bichlorure et le bibromure de silicium. — **M. F. Osmond** a étudié l'influence que la présence de certains corps étrangers exerce sur les modifications allotropiques du fer et de l'acier pendant que ces corps s'échauffent ou se refroidissent. Il a examiné à ce point de vue des alliages de fer à divers degrés de carburation avec le bore, le nickel, l'arsenic, le silicium et le tungstène. — **M. E. Mallard** signale une nouvelle variété miné-

rale cristallisée de la silice. Cette variété, qu'il appelle *Lussatte*, forme une enveloppe fibreuse aux grands cristaux de quartz limpide que l'on trouve dans divers gisements de bitume. — **M. A. Gorgeu**, en faisant l'analyse de deux oxydes de manganèse naturels, les *Psilomelanes* et les *Wado*, les a trouvés constitués par des combinaisons très stables de l'acide manganique avec diverses bases. — **M. Stanislas Meunier**, en réduisant simultanément par l'hydrogène le chlorure de platine et le chlorure de fer, a obtenu à une température relativement basse la formation du platine ferrique magnétipolaire; par ce procédé il a pu reproduire, en même temps que l'ensemble des caractères physiques et chimiques de cette espèce minérale, les traits essentiels du gisement du platine au sein des roches magnésiennes.

3^e SCIENCES NATURELLES. — **M. Faurot** a étudié le développement de l'*Hulcampa chrysanthellum* d'après la disposition des cloisons mésentériques. — **M. Paul Marchal** montre que l'appareil excréteur de l'écrevisse est formé : 1^o d'un sac cloisonné dont les cavités affectent la disposition d'une glande en grappe; 2^o d'un réseau glandulaire occupant toute la face inférieure de la glande; 3^o d'un tube transparent entouré; 4^o d'un cordon spongieux pelotonné sur lui-même; 5^o d'une vessie et 6^o d'un canal excréteur, ces différentes parties communiquant entre elles dans cet ordre. — **M. P. Dangegard** a étudié la manière dont les diverses parties de la tige et de la racine des Gymnospermes s'unissent région à région. — **M. A. de Tillo** présente avec une carte hypsométrique de la Russie d'Europe quelques considérations générales sur l'orographie de ce pays.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 28 janvier 1890

L'Académie termine la discussion sur la prophylaxie de la tuberculose par le vote des conclusions suivantes proposées par **M. Bergeron** : « 1^o La tuberculose est une maladie parasitaire et contagieuse. Le microbe de la contagion réside dans les poussières qu'engendrent les crachats desséchés des physiques et le pus des plaies tuberculeuses. Le plus sûr moyen d'empêcher la contagion consiste donc à détruire ces crachats et le pus, avant leur dessiccation, par l'eau bouillante et par le feu. 2^o Le parasite se trouve aussi quelquefois dans le lait des vaches tuberculeuses; il est donc prudent de n'employer le lait qu'après l'avoir fait bouillir. 3^o L'Académie appelle l'attention des autorités compétentes sur les dangers que les tuberculeux font courir aux diverses collectivités dont elles ont la direction, tels que lycées, casernes, grandes administrations et ateliers de l'Etat. » — **M. Bouchard** fait une communication sur la pathogénie de la grippe à propos d'observations recues de **M. Tueffert** (de Montbéliard) montrant la filiation de la grippe chez 11 malades. Ces faits, rapprochés de ceux de contagion de villes en villes, tendent à prouver la nature infectieuse et contagieuse de la maladie qu'il lui avait refusée précédemment. Il n'a pas trouvé d'organisme spécifique de la grippe, mais, dans les affections secondaires symptomatiques : le staphylococcus pyogenes aureus (herpès fébrile), le pneumococcus (pneumonie, otites, etc.), le streptococcus (crachats bronchiques, pleurésies, arthrites, amygdalites), organismes habituels à notre économie devenant nocifs et constituant l'élément infectieux dans la grippe, soit par diminution de la défense de l'organisme contre leur passage, soit par exaltation de leur virulence. — **M. Aug. Ollivier**, sans conclure des animaux à l'homme, cite des cas de contagion d'une dame à son chat, de 5 chats entre eux, qui semblent démontrer la nature contagieuse de la grippe et son

mode de contagion par le mucus nasal. — **M. Tarnier** présente une infirmière de la clinique se servant constamment de solutions de sulfate de cuivre, qui porte aux mains un pseudo-eczéma avec gerçures et excoriations saignantes, dont **M. Fournier** montre le danger au point de vue de la contagion de la part des nourrissons syphilitiques; il pense qu'il faut renoncer à l'emploi du sulfate de cuivre en obstétrique.

Séance du 4 février 1890

M. Proust, à l'appui de la nature contagieuse de la grippe, cite un rapport de mer du D^r d'Hoste du *Saint-Germain* relatant une épidémie de bateau (151 passagers sur 436, plus 47 hommes d'équipage) ayant eu pour origine l'embarquement d'un passager arrivant de Madrid où régnait la grippe, atteint de la maladie le lendemain de l'embarquement, l'ayant communiquée au docteur, etc., etc., du 6 décembre au 5 janvier. — **M. Laborde**, à l'appui de la communication de **M. Bouchard** (27 janvier), cite le cas d'un médecin, atteint d'érysipèle grave dans le cours d'une grippe, dont la bonne est morte rapidement d'une pneumonie sans pneumocoques mais avec streptocoques de l'érysipèle. — Expériences à ce propos : laboratoire de **M. Brouardel**. — **M. Devillers** pense que le lait bouilli, cause la plus efficace de diarrhée infantile, est ainsi plus dangereux que le lait non bouilli, cause exceptionnelle de tuberculose. — **M. Périer** présente un malade auquel il a fait, en conservant le bras, l'atlation de l'omoplate envahie par un sarcome. Opération le 15 octobre. Guérison parfaite. Pas de récurrence. Fonctionnement du bras limité, mais s'améliorant : le malade peut porter la main à la bouche. — **M. Budin** : lit son rapport sur « l'antisepsie des femmes en couches par les sages-femmes », concluant à l'autorisation à donner aux sages-femmes diplômées, d'employer un seul antiseptique toujours le même : sublimé 0.25, acide tartrique 1 gramme, Rouge de Bordeaux 1 milligramme pour un litre d'eau. (Discussion renvoyée). — **M. Armand Gautier** en commun avec **M. Mourgues** fait une communication relative aux alcaloïdes de l'huile de foies de morues. Celle-ci doit son efficacité : 1^o A ses corps gras facilement assimilables grâce à leur légère acidité et à leur saponification partielle. 2^o à sa richesse en phosphate, acide phosphorique, lécithine, phosphore combiné à l'état organique, donc très assimilable, et à la petite quantité de bromine et d'iode combinés; 3^o à ses alcaloïdes : butylamine, amylamine et surtout morrhuine et acide morrhuique, agissant puissamment sur les centres nerveux qui président à la nutrition. Plus grande efficacité des huiles colorées riches en bases. Suractivité des fonctions rénales, sudorales, intestinales; augmentation d'appétit; indices d'une *suractivité* nutritive.

D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 4^{er} février 1890

M. Retterer a complété l'étude du développement de la région anale des mammifères; le cloaque se divise par la réunion de haut en bas des deux replis cloacaux latéraux; quand la cloison est arrivée à l'orifice du cloaque, le rudiment périnéal figure un 8 de chiffre dont les deux boucles sont ouvertes; l'orifice antérieur ou urétral se ferme d'arrière en avant, l'orifice postérieur ou anus, d'avant en arrière. — **M. Léon Guignard** a déterminé, dans les feuilles de laurier-cerise et les amandes, la localisation de l'*émulsine*, c'est-à-dire de la diastase qui dégage l'acide cyanhydrique de l'amygdaline. Cette substance est renfermée exclusivement : pour les amandes, dans la périécyle des faisceaux libero-ligneux; pour les feuilles de laurier-cerise,

dans une gaine de cellules spéciales entourant le péricycle sclérifié. — **MM. Arthaud et Butte** ont fait des recherches pour déterminer le mécanisme par lequel l'extirpation du pancréas produit la glycosurie; ils croient que le phénomène tient aux troubles circulatoires produits indirectement dans le foie. — **M. H. Vincent** indique que, pour obtenir sûrement des cultures du bacille typhique avec ses caractères classiques, il faut l'ensemencer dans du bouillon phéniqué, porter à 42° et pratiquer les ensemencements successifs avec des cultures très jeunes. — **M. Gréchant**, s'est assuré que lorsqu'on empoisonne un animal par une goutte d'acide cyanhydrique dans l'œil, ce n'est pas par les voies respiratoires que se fait l'absorption. — **MM. Malassez et Vignal** rappellent qu'ils ont constaté les virulences des crachats tuberculeux après plusieurs dessiccations successives. — **M. Nicati** fait une communication pour démontrer que le glaucôme est un œdème variqueux de la chorio-capillaire.

Séance du 8 février 1890

M. Ch. Henry : Principe et graduation d'un thermomètre physiologique. — **M. Déjerine** communique un cas de *syringo-myélie* type, remontant à 40 années, dont il a l'observation clinique et l'autopsie. Ce cas confirme entièrement la théorie physiologique qui fait passer les sensations tactiles par les cordons blancs postérieurs, et les sensations thermiques et douloureuses par l'axe gris de la moelle. — **M. Tournoux** a envoyé une note sur la formation du périnée chez les moutons. — **M. Pouchet** signale quelques particularités que présentait le chachalot récemment échoué à l'île de Ré. — **M. Malassez** présente un appareil de contention d'un type nouveau pour lapins, rats et cobayes.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1890

M. Gernez expose la suite de ses recherches sur l'application de la mesure du pouvoir rotatoire à l'étude de diverses combinaisons chimiques. Si l'on ajoute à une dissolution contenant 1 équivalent d'acide malique, dissolution donnée d'un faible pouvoir rotatoire, des fractions graduellement croissantes d'équivalent de molybdate de soude ou d'ammoniaque, sels naturellement inactifs, on constate que le pouvoir rotatoire varie dans une proportion considérable (1 à 200 par exemple). Les variations sont d'abord progressives, puis le pouvoir rotatoire passe par un maximum, diminue, peut changer de signe, passe par un nouveau maximum, etc... Ces divers maxima correspondent à des proportions simples et caractérisent sans doute des combinaisons déterminées. On voit à quelles erreurs on s'exposerait si on voulait appliquer à l'analyse de tels mélanges les règles adoptées en saccharimétrie. — **M. Ph. A. Guye** fait une communication sur la constitution moléculaire des corps au point critique. **M. van der Waals** a proposé une formule bien connue pour relier la pression, la température et le volume d'un corps à l'état liquide ou gazeux; dans cette formule entre un coefficient b qui est proportionnel au coefficient critique (rapport de la température à la pression critiques); d'après les conceptions de **M. van der Waals**, ce coefficient représenterait le volume propre des molécules de la masse considérée. Dans un tout autre ordre d'idées, **Clausius** a démontré la relation $v = \frac{K-1}{K+2}$

(K étant la constante diélectrique et v le rapport de la somme des volumes des petites masses sphériques conductrices qu'il imagine au sein du diélectrique, au volume total de ce diélectrique). **Maxwell** établit d'autre part, dans la théorie électro-magnétique de la lumière

que K est égal au carré de l'indice de réfraction n (1). On est, d'après ces théories, conduit à regarder le nombre $T = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \frac{M}{d}$ (M étant le poids moléculaire,

d la densité) comme proportionnel au volume des molécules. **M. Guye** a vérifié, sur une cinquantaine de corps, l'exacte proportionnalité du coefficient b au nombre T . Cette loi remarquable établit un lien fort curieux entre des théories distinctes; elle fournit, en outre, des conséquences chimiques fort intéressantes.

LUCIEN POINCARÉ.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Séance du 4 janvier 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Terby** rend compte de la découverte récente faite par **M. Schiaparelli** sur la rotation de Mercure : la durée de la rotation de cette planète serait égale à celle de sa révolution autour du Soleil; elle serait donc, par rapport à cet astre, dans les mêmes conditions que la Lune par rapport à la Terre; et, de même que nous ne voyons jamais qu'une seule face de la Lune, de même une seule face de Mercure verrait le Soleil.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — **M. P. Van Beneden** fait une lecture sur un point de l'histoire nationale des Cétacés. Un journal français avait annoncé la capture, à l'île Saint-Honorat, d'un énorme poisson extraordinaire que le syndic des gens de mer à Cannes avait pris pour un Narval et dont il avait donné une description très sommaire. Celle-ci a suffi à **M. Van Beneden** pour déterminer l'espèce à laquelle appartenait ce monstre marin. La connaissance des Cétacés dans les mers d'Europe a fait, dit-il, de grand progrès en ces derniers temps; les moindres indications de taille ou de couleur suffiraient pour reconnaître tout Cétacé qui, dorénavant, viendra échouer sur une côte quelconque des mers d'Europe. Nous comptons en tout 20 à 23 espèces dans nos mers, en y comprenant même trois qui sont propres au Groënland et au Spitzberg : le *Mysticetus*, le *Beluga* et le *Narval*, qui ne quittent pas les glaces polaires; 14 d'entre elles pénètrent dans la Méditerranée et autant dans la Baltique. Il est à remarquer qu'aucune de ces espèces n'appartient à ces mers intérieures, et qu'il en est de même des 3 seuls Delphinides qu'on rencontre dans la mer Noire : le *Marsouin*, le *Tursiops* et le *Dauphin ordinaire*. — Quel est le nom du Cétacé qui vient de se perdre sur le rocher de Bancals? Des 12 ou 13 Cétacés qui visitent la Méditerranée 3 appartiennent aux Balénides (*Balenoptera musculus* et *rostrata*, *Megaptera boops*). Les *Ziphioides* ne comprennent que le *Ziphius cavirostris* et *Hyperoodon*. Parmi les Delphinides il n'y a que l'Orque et le Globiceps qui atteignent la taille de celui qui vient d'échouer. Le monstre échoué est sans doute le *Ziphius cavirostris*, puisque l'*Hyperoodon*, que l'on capture périodiquement sur les côtes des Écorés, ne visite que les régions méridionales. On ne connaît qu'un seul exemple d'un *Hyperoodon* capturé dans la Méditerranée. Il est vrai, si l'on tient compte de la taille, que le monstre de Saint-Honorat pourrait être un Orque, mais les fortes dents de l'Orque et la coloration toute particulière de la peau auraient sans doute attiré l'attention des pêcheurs qui l'ont vu échouer. Du reste, nous avons aujourd'hui nos références au sujet de cette détermination : le Musée royal de Belgique a fait l'acquisition du squelette, qui comble une lacune importante dans la collection des Cétacés vivants et nous y trouvons tous les caractères de ce curieux Cétacé.

F. FOLIE,

Membre de l'Académie,
Directeur de l'Observatoire de Bruxelles.


(1) Pour une longueur d'onde infinie.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 23 janvier 1890

SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Isaac Roberts** : Sur une méthode photographique pour déterminer la variabilité des étoiles. La méthode proposée consiste à prendre une ou plusieurs images d'un espace donné du ciel sur la même plaque photographique; la plaque est disposée de telle sorte que les images ne peuvent se superposer. On peut ainsi découvrir tous les changements d'intensité lumineuse qui se sont produits entre les deux moments où les photographies ont été prises. On a appliqué cette méthode à la nébuleuse d'Orion; on a pu constater que, dans un espace de moins de deux degrés carrés, 10 étoiles avaient en cinq jours considérablement varié d'intensité lumineuse.

SCIENCES PHYSIQUES. — **M. J. Hopkinson** : Un fil d'acier nickelé (fer : 74 %, nickel 25) perd ses propriétés magnétiques, si on le chauffe au rouge sombre et qu'on le laisse ensuite se refroidir. La résistance électrique



Résistance suivant la température.

du fil aux températures ordinaires est très différente dans les deux états. La résistance spécifique à l'état magnétique est d'environ 0,000052, et à l'état non-magnétique d'environ 0,000072. Les échantillons non magnétiques présentent une résistance à la rupture de 50 tonnes par pouce carré; l'allongement maximum est de 32 %. Des échantillons magnétiques présentent une résistance de 81 tonnes par pouce carré, l'allongement maximum est de 7 %. Après la rupture d'un fil non magnétique, les deux parties du fil deviennent magnétiques. Si on refroidit, au moyen d'acide carbonique solide, un fil non magnétique, toutes ses propriétés changent; il est transformé d'acier doux en acier trempé, il devient magnétique et il faut le chauffer à 600° pour lui rendre ses propriétés primitives.

Séance du 30 janvier 1890

SCIENCES PHYSIQUES. — **M. L. F. Vernon Harcourt** : Recherches sur les effets des murs longitudinaux (haining walls) dans un estuaire comme la Mersey. Les expériences ont été faites sur un modèle de l'estuaire pour résoudre deux problèmes. (1. L'influence des murs longitudinaux placés dans le large estuaire supérieur sur le chenal, situé au dessous de Liverpool et qui traverse la barre. 2. Les effets des murs longitudinaux placés dans l'estuaire inférieur sur le chenal qui traverse la barre. Voici les résultats : les murs placés dans l'estuaire supérieur sont nuisibles, parce qu'ils augmentent la quantité d'eau dans l'estuaire, tandis que dans l'estuaire inférieur ils augmentent la profondeur du chenal de sortie; ils offrent ainsi le meilleur moyen de créer à travers la barre un chenal fixe et profond.

SCIENCES NATURELLES. — **D^r C. S. Sherrington** : Sur les cellules nerveuses extérieures de la moelle épinière des mammifères. L'auteur a observé des cellules nerveuses isolées non seulement dans les parties profondes des colonnes latérales, mais aussi dans les colonnes antérieures et postérieures. Dans les colonnes postérieures, ces cellules semblent détachées du

groupe vésiculaire postérieur de Clarke et elles ressemblent de très près aux cellules de la colonne de Clarke. Elles sont souvent voisines des cellules de la colonne de Clarke, mais dans quelques cas, elles sont beaucoup plus éloignées de la substance grise, elles peuvent même être très voisines de la périphérie de la colonne extéro-postérieure. Dans la partie de la colonne latérale qui est adjacente aux formations réticulaires latérales, il y a de nombreuses cellules nerveuses dispersées entre les tracts de fibres blanches. Elles sont souvent fusiformes, mais souvent aussi multipolaires. Dans la colonne latérale elle-même, il n'est pas rare de trouver des cellules détachées du groupe des petites cellules de la corne latérale (Clarke's tractus intermedio-lateralis), situées dans la substance blanche, nettement en dehors des limites de la substance grise. Ces cellules sont fusiformes. Dans les colonnes antérieures, on trouve des cellules multipolaires parmi les faisceaux de fibres qui passent entre le bord interne de la corne antérieure et la commissure antérieure à la base de la scissure antérieure. Si les cellules externes de la colonne postérieure appartiennent au groupe de Clarke, il semble probable que ce groupe est en connexion directe avec ces fibres médianes des racines postérieures qui, après un trajet ascendant dans la colonne de Burschlach, plongent dans la substance grise à la base de la corne postérieure. — **Professeur J. R. Green** : Sur la germination des graines du *Ricinus communis*. L'auteur a recherché comment les réserves nutritives deviennent, pendant la germination, assimilables pour l'embryon; il a trouvé dans la graine un ferment zymogène, qui entre aisément en action sous l'influence de la chaleur et des acides faibles. Il décompose les principes gras et détermine la formation de glycérine et d'acide ricinoléique. Les matières protéiques sont décomposées par un autre ferment, avec formation de peptone et d'asparagine. Les seuls produits qu'absorbe l'embryon sont un acide cristallisé, du sucre et peut-être des peptones et de l'asparagine. Le mode d'absorption est toujours la dialyse. Les changements chimiques commencent dans l'endosperme et se produisent même lorsqu'on a enlevé soigneusement l'embryon. La germination est plus rapide cependant si tout ou partie de l'embryon reste en contact avec l'endosperme. Il se développe au cours de la germination un ferment analogue à la présure, d'une grande activité, mais son action n'est point encore expliquée.

Séance du 6 février 1890.

SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **Major Mac Mahon** (Royal Artillery) : Mémoire sur les jonctions symétriques des racines de systèmes d'équations. — Ce mémoire traite de l'extension aux systèmes de quantités algébriques de la nouvelle théorie des fonctions symétriques par rapport à un seul système récemment développée par l'auteur. (*American Journal of Mathematics*, V.II.)

SCIENCES NATURELLES. — **D^r J. W. Eldridge Green** : Nouvelle théorie de l'achromatopsie et de la vision des couleurs. D'après l'auteur les personnes qui ont une vue normale ne perçoivent que six couleurs : le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Les autres couleurs ne sont perçues que comme des nuances de celles-là. Tandis que la série physique, (le spectre) comprend un nombre infini d'unités, la série psycho-physique c'est-à-dire la série perçue par l'esprit, se compose d'unités définies, dont le nombre dépend des dimensions du centre de perception. Au premier degré d'achromatopsie, on ne perçoit que cinq couleurs dans le spectre, au suivant quatre, puis trois, puis deux; alors apparaît entre le vert et le bleu une bande neutre, qui va grandissant jusqu'à ce que l'on arrive dans certains cas à l'achromatopsie complète. L'auteur considère donc la vision normale comme une hexachromie et la vision des achromatopsiques comme une pentachromie, une tétrachromie, ou une dichromie.

Richard O. GREGORY.

ACADÉMIE DES SCIENCES
DE SAINT-PÉTERSBOURG1^{re} séance de l'année : 28 janvier 1890

Rapport de M. le Secrétaire perpétuel sur les travaux de 1889. — 1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. **Tchebycheff** a inséré dans les *zapiskys* un mémoire sur les expressions approximatives de la racine carrée de la variable par des fractions simples. L'auteur y fait l'application générale d'un théorème démontré par lui dans son mémoire sur « les questions de minima qui se rattachent à la représentation approximative des fonctions ».

— M. **Imchenetsky**, dans son mémoire sur l'intégration des équations différentielles symétriques, a fait des recherches importantes sur une nouvelle forme de ces équations. — Parmi les mémoires des savants étrangers, il faut rappeler ceux de M. **Bobylev** sur le principe de Hamilton ou d'Astrogadsky; — de M. **H. Struve** sur les satellites, Thétys et Rhia, de Saturne; — de M. **Bonadourff** sur le calcul des arcs des parallèles sur l'ellipsoïde terrestre.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — C'est surtout la météorologie qui a été étudiée. Les variations magnétiques ont été l'objet de nombreuses recherches. M. **Wild** les a mesurées à Pawlowsk au moyen d'appareils perfectionnés et d'un enregistreur photographique d'une grande précision. Les déterminations concordent avec les résultats des calculs entrepris par M. **Müller** pour faire subir aux autres observations de Saint-Petersbourg et de Pawlowsk la correction des perturbations. M. **Abels**, dans le Nord-Ouest de la Sibirie, M. **Assafry** dans le gouvernement d'Eriwan ont relevé l'un l'inclinaison, l'autre les trois éléments magnétiques. Dans la contrée de la Léna, les variations séculaires de ces trois éléments ont été étudiées pendant l'été 1888 par M. **Stetting** aux stations météorologiques d'Irkoutsk, Iakoutsk, Olekminsk, Witinsk, Blagwentschensky-Prüsk et Baïtschlikowo. Ses observations, réduites aux moyennes de 1888, et comparées aux résultats obtenus pour 1829 par Hansteen, Due et Ermann, pour 1870 et les années suivantes par M. Müller et Fritsche, ont conduit à rectifier notablement les cartes magnétiques de la Sibirie. — La température de l'air a donné lieu à plusieurs travaux : M. **Wild** a fait voir qu'elle est toujours inférieure à celle qu'indique la méthode d'Assmann. De son côté M. **Leyst**, par l'emploi d'instruments enregistreurs, a démontré que l'erreur commise en lisant les thermomètres *maxima* et *minima* à une heure quelconque de la journée peut, aussi bien pour les *maxima* que pour les *minima*, atteindre plus de 1^o C. Il a déduit de ses recherches les heures du jour où il faut lire les thermomètres extrêmes, et donné des règles pour corriger les lectures faites à d'autres heures. — La pression barométrique a surtout été étudiée par M. **Schönrock**; ce savant a comparé, à ce sujet, les résultats de toutes les observations faites en Europe depuis 1880. En les rapportant à ceux du baromètre de M. **Wild**, seul absolu, et, pour cette raison, généralement adopté, il a constaté que non seulement les divers baromètres normaux employés en Europe diffèrent jusqu'à $\pm 0^{\text{mm}}$, 3 de celui de M. **Wild**, mais en outre que pour beaucoup d'entre eux les corrections ont même changé de 0^{mm} , 2 et plus dans le courant de six années. L'auteur attribue ces changements à plusieurs causes : la capillarité du mercure dans les branches ouvertes des baromètres varie avec l'humidité de l'air; le mercure s'oxyde; enfin les lectures aux baromètres de voyage sont passibles d'inexactitudes. Aussi conclut-il avec M. **Wild** que les observatoires centraux des différents pays devraient se procurer des instruments vraiment normaux, comme les baromètres maintenant établis à Saint-Petersbourg, Pawlowsk et Helsingfors. Ces appareils concordent absolument jusqu'à 0^{mm} , 01. — Les orages en Russie ont vivement attiré l'attention (Mémoires de MM. **Schönrock**, **Kaminsky** et **Kierwonsky**). M. **Berg**

a défini la fréquence, l'extension, la marche et le caractère général de ces phénomènes dans toute la Russie en 1886. De son étude il résulte que : 1^o La grêle accompagnant les orages est chez nous moins fréquente en été que dans les autres saisons; 2^o la période diurne des orages a été déterminée pour chaque mois; 3^o la considération de la température et de la pression de l'air est insuffisante pour rendre compte des orages; il faut y joindre celle de l'humidité absolue de l'air.

— M. **Gresnevsky** a étudié l'accumulation des neiges par les vents dans la Russie d'Europe. Ces neiges constituent un obstacle considérable à la circulation des trains sur les voies ferrées, surtout dans le Sud et le Sud-Est de notre pays. Le transport de la poste et des voyageurs y est maintenant moins régulier avec les chemins de fer qu'autrefois avec les chevaux, parce que ceux-ci éprouvaient moins d'arrêt du fait des neiges. L'important serait d'être prévenu des endroits les plus menacés afin de les débayer avant l'arrivée des trains. Les observations organisées dans ce but par les chemins de fer sont absolument insuffisantes. L'auteur a donc cherché une connexion entre l'amorcellement de la neige et les facteurs généraux du temps. Il a dressé trois cartes des cyclones et anticyclones dont dépendent les tempêtes et, pour chaque région de la Russie d'Europe, fait connaître les conditions qui y déterminent des accumulations de neige dangereuses pour les chemins de fer. Il nous a mis en mesure de prédire un jour à l'avance, d'après les isobares de nos cartes synoptiques, la force et la direction du vent en tout endroit de la Russie d'Europe pourvu de voies ferrées; et il a précisé davantage les faits qui permettent de prévoir la formation de la neige. On augmenterait considérablement l'exactitude de cette prévision par la création d'un service de dépêches relatives à l'état de la couche de neige en un grand nombre de points du territoire. — Signalons enfin les recherches du général **Gadolin** sur la probabilité de la variation des vents, de cet auteur et de M. **Wild** sur la diffusion de la lumière, de M. **Béktyoff** sur l'énergie de l'oxydation du rubidium, de M. **Beilstein** sur le dosage de l'antimoine, de M. **Blaese** sur le dosage de la soude en présence de la potasse, de M. **Ribalkino** sur l'équilibre chimique entre HCl et H par rapport aux métaux, de M. **Rusanow** sur les produits de condensation des aldéhydes avec les phénols.

Travaux de la séance. — 1^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. **Wild** présente les *Annales de l'Observatoire physique central* pour 1888. On y trouve les observations météorologiques et magnétiques de Pawlowsk, Catherinebourg, Irkoutsk, les travaux de 580 stations observant les pluies, 692 observant les orages et 298 stations observant des phénomènes météorologiques variés.

2^o SCIENCES NATURELLES. — M. **Tschersky** décrit d'après 2518 ossements 25 espèces de mammifères post-tertiaires trouvées par MM. Bunge et Foll (expédition de 1885-1886) sur les côtes de la Nouvelle-Sibirie, le long du fleuve Jana et près de l'embouchure de la Léna : *Felis tigris*, *Canis lupus* et *familiaris*, *Vulpes lagopus*, *Ursus maritimus* et *arctos*, *Gulo borealis*, *Phoca foetida*, *Trichechus rosmarus*, *Spermophilus Eversmanni*, *Arvicola* (2 espèces encore indéterminées), *Lemmus obensis*, *Myodex torquatus*, *Lepus variabilis*, *Bison priscus*, *Ovibos moschatus*, *Ovis vivicola*, *Colus soiga*, *Alces palmaris*, *Rangifer tarandus*, *Cervus elaphus*, *Equus caballus*, *Rhinoceros thicorinus*, *Elephas primigenius*. — Dans la collection des « résultats scientifiques des voyages de Przewalski », M. **Maximovitch** a consacré 2 volumes à la flore de Tangoute, de la Mongolie et du Thibet oriental; son travail s'étend jusqu'à l'Inde, la Perse et le Turkestan chinois, remplissant les lacunes de la flore de l'Asie boréale et centrale. Depuis le Japon jusqu'à l'Asie mineure on connaît donc maintenant, au moins dans ses grands traits, la flore de l'Asie. C'est surtout aux savants russes qu'on doit ce résultat.

O. BACKLUND, Membre de l'Académie.


ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 23 janvier 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. J. von Hepperger** : Intégration des équations relatives aux perturbations des éléments des comètes périodiques de faible inclinaison, par la Terre, Vénus et Mercure.

2^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. G. Adler** étudie les variations de la force électrique à travers un mur conducteur. — **M. le président J. Stefan** continue ses recherches sur les ondulations électriques dans les conducteurs rectilignes. Si un courant d'intensité variable parcourt un fil conducteur, entouré d'un tube concentrique également conducteur et isolé du fil, il se produit dans ce tube un courant induit. Le principe précédemment établi du minimum d'énergie magnétique permet de déterminer d'une façon très simple la distribution des courants : l'énergie a visiblement la plus petite valeur possible quand tout le courant central est condensé sur une couche infiniment mince à la surface du fil, et tout le courant induit, condensé sur une couche infiniment mince à la surface interne du tube ; à chaque instant l'intensité du courant induit est égale et de signe contraire à celle du courant inducteur. Dans ces conditions, la force magnétique est nulle dans tout l'espace : sauf dans le milieu isolant qui sépare le fil du tube. Remarquons aussi ce fait très important : le tube forme un écran parfait, aussi bien pour les actions d'induction que pour les actions magnétiques provenant du fil conducteur ; il produit en effet sur tout conducteur extérieur un courant induit égal et de signe contraire à celui que produit le fil intérieur. L'analogie présentée par ce problème avec le problème de la distribution d'une charge d'électricité statique sur deux cylindres concentriques (l'intérieur étant isolé et l'extérieur relié au sol), est ici encore absolument complète ; elle persiste d'ailleurs si les conducteurs ne sont ni concentriques ni de sections circulaires. La vitesse de propagation des ondulations dans le fil est modifiée par la présence du tube ; le champ magnétique ne s'étend en effet qu'au diélectrique interposé entre les deux, la self-induction est donc diminuée dans le fil, elle disparaît même complètement si les deux conducteurs sont concentriques et de section circulaire ; il en résulterait une augmentation de la vitesse de propagation si la capacité demeurait invariable, ce qui a lieu si le tube est isolé ; mais s'il est relié au sol, la capacité du fil intérieur augmente dans la même proportion que diminue sa self-induction et la vitesse de propagation garde sa valeur primitive. On peut encore augmenter la capacité en introduisant entre le tube et le fil un milieu ayant un grand pouvoir diélectrique ; la vitesse de propagation est alors modifiée. Sir W. Thomson a déjà signalé cette influence. Si au voisinage d'un fil parcouru par un courant variable, on place un second conducteur rectiligne et parallèle, le courant primitif se distribue sur la surface du premier fil, les courants induits se distribuent sur chacun d'eux comme le ferait une charge d'électricité statique répandue sur le premier, et la charge induite par influence sur le second supposé relié au sol ; quand le conducteur a une section circulaire, le courant n'est pas également distribué sur sa surface, le côté tourné vers le second conducteur présente une plus grande densité. Dans un tube de Geissler, par exemple, cette condensation pourrait être rendue visible du côté d'un conducteur placé parallèlement au tube ; mais, en réalité, le phénomène pourrait être masqué par la répulsion électro-dynamique qui s'établirait entre les deux conducteurs. Un conducteur placé à côté d'un fil parcouru par un courant variable joue ainsi le rôle d'écran pour les effets magnétiques et les effets d'induction ; l'écran a d'autant plus d'action qu'il entoure plus complètement le fil. **M. Hertz** a démontré qu'un système de fils tendus parallèlement se comporte comme un plan conducteur ; un pareil système exerce donc le rôle

d'écran s'il peut être parcouru par des courants induits ; il ne possède plus, au contraire, cette propriété, s'il n'est le siège d'aucun phénomène d'induction, c'est-à-dire s'il est placé perpendiculairement au courant primaire ; c'est aussi la condition essentielle pour que ce système soit capable de réfléchir les effets d'induction dans l'espace, car ces effets réfléchis sont précisément les effets du courant induit dans la surface du conducteur qui les réfléchit. — **M. Paul Mohr**, en chauffant à 430° dans un tube scellé, 12 molécules d'aniline avec 1 molécule d'hexachlorure de benzène a obtenu un corps cristallin et soyeux (la triphénylimidobenzine) :



3^{re} SCIENCES NATURELLES. — **M. V. von Ebner** discute les questions controversées sur la structure de l'émail des dents. — **M. Franz Toula** adresse un rapport sur ses recherches géologiques dans le Balkan Oriental. Il a traversé la chaîne dans six directions différentes, entre Roustchouk, Varna et Slivno ; il signale la présence des terrains suivants : 1^{re} Quaternaire (Lass, alluvions fluviales) ; 2^{re} Néogène (*Belvedere Schotter*, étage sarmatique, couches à *Spaniodon*, couches marines de Varna) ; 3^{re} Tertiaire inférieur (calcaires marins des environs de Slivno, probablement oligocènes ; marnes nummulitiques ; horizon à alvéolines près de Varna ; flysch à fucoides, en partie) ; 4^{re} Crétacé (flysch à inocérames ; craie sénonième à faciès anglo-parisien ; Cénomaniens analogue aux *Korymben Schichten* et couches à Orbitolites ; Barrémien de Rasgrad à *Desmoeceras difficile* ; Hauterivien de Chloumla à *Crioceras Duvati*) ; 5^{re} Jurassique (Lias-Dogger) : affleurements peu nombreux ; 6^{re} Trias (manque à l'Est de Slivno. Les terrains sédimentaires plus anciens sont complètement défaut et les roches cristallines sont peu développées. L'important district volcanique du Sud du Balkan, est constitué principalement par des andésites à agite.

Emil WEYR, Membre de l'Académie

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 7 février 1890.

M. E. Budde : Sur la rotation très rapide d'un corps solide avec un point fixe doué de 3 moments d'inertie différents. — **M. Falke** présente de nouveaux étalons pour la mesure des résistances électriques. Il s'est occupé surtout de la préparation de substances métalliques dont la résistance électrique ne subit pas de changements temporaires comme celle de l'argent et de l'alliage de platine et d'argent. Un alliage de 25 % de nickel et de 75 % de cuivre fut trouvé le meilleur ; la résistance des étalons reste constante même après l'action brusque de la chaleur. Les alliages de cuivre et de manganèse offrent des phénomènes assez curieux. Le coefficient de variation avec la température, étant du reste relativement petit, est positif jusqu'à une certaine température, puis devient négatif. La température correspondant au changement de signe du coefficient est d'autant plus haute que l'alliage est plus riche en manganèse. Les alliages de nickel et de manganèse offrent des phénomènes tout à fait analogues ; seulement la température, où le coefficient change de signe, est plus basse. La résistance de ces alliages de manganèse est relativement grande et constante. — **M. Zaeger** communique les expériences instituées par **M. Deinda**, à Leipzig, sur les forces électro-motrices que présentent des couches de mercure de températures différentes exposées à des pressions inégales. Dans les couches chaudes il se constitue un courant allant des points de moindre pression aux points de pression plus grande. La force électro-motrice à 100° C., pour une différence de pression de 10 at mosphères, est égale à 0,1 micro-volts.

D^r HANS JAHN.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance du 2 février 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Volterra** : Sur les équations différentielles qui se rapportent au calcul des variations. — **M. Péano** : Sur la définition de l'aire d'une surface. — **M. Del Re** : Sur les groupes complets de trois transformations linéaires involutoires dans les espaces à n dimensions.

M. Tacchini lit une notice nécrologique sur **M. Respighi**, membre de l'Académie et directeur de l'observatoire du Capitole, mort le 10 décembre 1889, à l'âge de 65 ans. **M. Respighi** était un savant de grand mérite et d'une grande activité; il laisse de nombreux travaux d'astronomie et de physique céleste. — **M. Tacchini** présente à l'Académie le résumé de ses observations sur les *taches*, *facules* et *protubérances solaires*, faites à l'observatoire du collège Romain pendant le 4^e trimestre de 1889. Il résulte de ses observations, assez nombreuses malgré le mauvais temps, que dans le mois de novembre il y a des jours où les taches manquent complètement; le même phénomène se reproduit dans le mois suivant et continue dans le mois de janvier 1890. La fréquence et la hauteur des protubérances est aussi en diminution; il est donc certain que ce calme du soleil qui a commencé en avril 1889 confirme que nous passons par le vrai minimum de l'activité solaire.

2^e SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Pisati** a fait des recherches pour établir si la propagation du flux magnétique dans le fer est un phénomène analogue à celui de la propagation de la chaleur dans des barres chauffées à une seule extrémité, et exposées à l'action refroidissante de l'air. Les expériences exécutées par **M. Pisati** démontrent que cette analogie existe réellement et que, pour le flux magnétique dans le fer, deux espèces de conductibilités sont à considérer : une conductibilité interne et une conductibilité externe. — **M. Reggiani** décrit ses recherches sur la densité de l'eau de la Méditerranée. Les échantillons de cette eau furent recueillis pendant la campagne hydrographique exécutée sur le *Washington* en 1883, par le contre-amiral Magnaghi, directeur du bureau hydrographique de la Marine Royale à Gênes. Les échantillons de l'eau étaient conservés dans des tubes en verre fermés à la lampe; **M. Reggiani**, après avoir exposé la méthode suivie dans ses déterminations, donne des tables, avec les valeurs exactes jusqu'à la sixième décimale, de la densité de l'eau puisée dans différentes stations à des profondeurs qui, de la surface de la mer, vont jusqu'à 2,820 mètres. Il décrit ensuite les aréomètres à immersion totale, imaginés par **M. Pisati**. Ces aréomètres sont à densité constante et à densité variable. Celui à densité constante repose sur le principe de réduire la den-

sité de l'eau de la mer de façon à la rendre égale à celle de l'aréomètre, en y ajoutant de l'eau distillée; on calcule le volume du mélange et on en déduit la densité de l'eau de la mer. Pour l'aréomètre à densité variable on réduit, au moyen d'une surcharge, la densité de l'aréomètre jusqu'à égalité avec celle de l'eau de la mer; le rapport entre le poids ajouté et le volume de l'aréomètre donne la densité de l'eau. Ces aréomètres à immersion totale, ont l'avantage d'éviter l'erreur produite par la tension superficielle des liquides; en outre ces appareils sont d'un usage facile et rapide à bord des navires. — Sur un rapport de **MM. Cerruti** et **Blaserna**, l'Académie approuve la publication dans ses *Mémoires* du travail de **M. Cantone**, relatif à la déformation du fer doux par effet de la magnétisation.

3^e SCIENCES NATURELLES. — **M. Strüver**, en visitant les carrières de gneiss de Beura dans l'Ossola, a recueilli des échantillons de calcite cristallisée. Il y a découvert de petits cristaux noirâtres, à éclat métallique, de brookite, minéral qui n'avait jamais été trouvé en Italie. Les petits cristaux sont cachés dans l'intérieur de la calcite, ce qui fait qu'ils peuvent facilement échapper à une observation superficielle; ils sont opaques, et transparents seulement en quelques endroits. Il serait à désirer qu'une plus grande quantité du minéral permit d'ajouter des recherches chimiques aux mesures cristallographiques. — **M. Capellini** ayant eu l'occasion d'examiner des débris fossiles trouvés dans les argiles écaillées de l'Emilia, que l'on croyait appartenir à un crocodile, a reconnu que c'étaient les restes fossiles d'un Ichthyosaure, et précisément de *Ichthyosaurus Campylodon*. Au même horizon géologique du Crétacé inférieur appartiennent les Cycadées fossiles que l'on a trouvées dans les fleuves et dans les torrents de l'Emilia. Ces découvertes confirment l'opinion de **M. Capellini**, qu'une partie des argiles écaillées de l'Emilia doivent être attribuées au Cénomien. — **M. Morpurgo**, sur le conseil de **M. Bizzozero**, a entrepris des recherches pour reconnaître si, après la section des nerfs vasomoteurs, il se produit une modification de l'activité régénérative de l'organe auquel les nerfs appartiennent. En extirpant à des lapins le ganglion sympathique supérieur d'un seul côté, on voit que dans l'oreille de ce côté le processus de la régénération physiologique est plus manifeste, et que les blessures y guérissent plus rapidement que dans l'oreille du côté où l'on a laissé intact le nerf sympathique. Snellen, en 1857, avait obtenu d'une autre manière les mêmes résultats.

Aux dernières élections de la classe des sciences mathématiques, physiques et naturelles de l'Académie sont nommés membres étrangers quatre savants français : **MM. G. Darboux, H. Bazin, M. Berthelot, J.-B. Chauveau.**

Ernesto MANCINI.

NOUVELLES

LA SYNTHÈSE DES FLUORURES DE CARBONE

Aucun chimiste n'avait réussi jusqu'à présent à combiner directement le carbone aux halogènes : fluor, chlore, brome et iode; fait d'autant plus extraordinaire que l'on connaissait depuis longtemps des composés formés à partir des éléments entre le carbone et plusieurs des métalloïdes.

A la suite des belles recherches qui ont conduit **M. Moissan** à isoler le fluor, ce savant a montré que ce métalloïde se combine avec une grande énergie aux deux corps simples les plus voisins du carbone, le bore et le silicium. Ces réactions faisaient prévoir la possibilité d'effectuer la synthèse directe de fluorures de

carbone. Bientôt, en effet, **M. Moissan** annonça qu'il était parvenu à faire brûler le charbon dans le gaz fluor. Dans une séance récente de la Société française de Physique (17 janvier 1890) il fit voir à ses auditeurs le spectre d'un gaz fluocarboné.

L'union directe du carbone et du fluor étant ainsi établie, il restait à résoudre deux questions importantes : d'une part, préciser les conditions dans lesquelles ces combinaisons directes s'effectuent, et d'autre part trouver une méthode pratique pour préparer à l'état de pureté ces différents fluorures de carbone prévus dès lors par la théorie. C'est à ce double résultat que viennent de parvenir d'une façon tout à fait indépendante **M. Moissan** et **M. Chabrier**.

Les nouvelles expériences de M. Moissan communiquées le 10 février à l'Académie de Sciences ont montré que les nombreuses variétés de carbone se comportent fort différemment vis-à-vis du fluor. C'est là un fait du plus haut intérêt, sur la portée duquel M. Berthelot a spécialement appelé l'attention de l'Académie, en présentant le travail de M. Moissan. Ce savant a montré en effet que le noir de fumée calciné s'enflamme spontanément à la température ordinaire, dès qu'il se trouve en contact avec le fluor pur. Il en est de même du charbon de bois très poreux. Le graphite de la fonte ou le graphite de Ceylan ne prennent feu qu'au dessous du rouge sombre. Le diamant enfin, maintenu à une température voisine de 1000°, ne brûle pas dans le fluor. Quant au produit gazeux qui se forme dans ces combustions, il serait constitué par un mélange de deux fluorures de carbone, dont l'un est le tétrafluorure. D'après les dernières communications de M. Moissan, le même gaz prend naissance lorsqu'on fait passer des vapeurs de tétrachlorure de carbone sur du fluorure d'argent chauffé.

D'autre part, M. Chabrie, déjà très favorablement connu par ses recherches sur les dérivés organiques du sélénium, a présenté le 7 février à la Société chimique de Paris, et le 10 février à l'Académie des Sciences, la première série des expériences qu'il a faites au laboratoire de M. Friedel, et qui l'ont conduit à une méthode fort intéressante de préparation des fluorures de carbone. M. Chabrie a fait réagir en tubes scellés les différents chlorures de carbone, tels que C_2Cl_4 , C_2Cl_2 , C_2Cl_6 etc, en présence du fluorure d'argent, et il a constaté que, dans ces conditions, il y a production de chlorure d'argent et des fluorures correspondants. Grâce à l'emploi des tubes scellés, au moyen desquels il est possible de prolonger le contact intime des corps jusqu'à réaction complète, on comprend qu'on obtienne ainsi les fluorures de carbone, en quantité théorique et chimiquement purs. Comme l'a fait remarquer M. Friedel, l'intérêt de cette méthode réside donc dans son caractère général. Indépendamment de ces résultats, M. Chabrie a fait connaître, dès le 7 février, un procédé d'analyse du tétrafluorure de carbone CF_4 , aussi rapide que rigoureux, qui lui a permis de déterminer la composition de ce gaz.

Ces recherches fort intéressantes font le plus grand honneur aux deux savants qui les ont exécutées. Elles ouvrent un champ de travail qui promet d'être fructueux, et, à ce titre, elles ne manqueront pas d'attirer l'attention des chimistes.

Ph. A. GUYE.

LA LÈPRE DANS LES COLONIES ANGLAISES

On se souvient encore de l'émotion produite par la mort du Père Damien : ce courageux missionnaire vivait depuis dix ans dans l'île de Molokai où sont isolés les lépreux des îles Sandwich et avait contracté lui-même la Lèpre en 1883. Ce martyr n'a pas été stérile, et l'Angleterre s'est émue de l'envahissement progressif de ses colonies par le terrible fléau. Une souscription a été ouverte sous le patronage du Prince de Galles, afin de pouvoir instituer des missions scientifiques dans le double but d'étudier la maladie, tant dans les laboratoires de l'Europe que sur place dans les pays lépreux, et d'établir des léproseries aussi nombreuses que possible.

Les chiffres donnés à cette occasion sont intéressants à plus d'un titre : le recensement de 1881 donnait

131,618 lépreux répandus dans les possessions anglaises de l'Inde, dont 53,886 pour la seule présidence du Bengale ; ce chiffre, certainement au-dessous de la vérité, s'élève aujourd'hui à plus de 200,000. En 1887, on estimait qu'il n'y avait pas plus de 2,000 lépreux, soit 1 pour 100, hospitalisés dans les asiles spéciaux. Ces derniers sont, du reste, parfaitement insuffisants : on en compte 23 seulement pour l'Inde entière, dont 3 dans le Bengale, pouvant contenir 300 malades. C'est à cette pénurie de ressources que doivent parer les fonds recueillis actuellement. Le danger est pressant, paraît-il, car on signale également une augmentation sensible dans le nombre des lépreux de la colonie du Cap.

Dans la Guyane anglaise, en 1831, on comptait 431 lépreux à Demerary, et le dernier recensement donne un chiffre de 1000 individus atteints de Lèpre, soit 1 pour 250 habitants ; cet accroissement a été surtout sensible dans les dix dernières années.

Devant cet envahissement, l'internement des lépreux dans des asiles spéciaux est devenu le mot d'ordre du gouvernement anglais.

Si nous consultons les publications scientifiques

anglaises, la contagion de la Lèpre n'y est cependant pas admise sans réserves : M. Jonathan Hutchinson fait observer que les lépreux de Norvège ont émigré en grand nombre aux Etats-Unis, sans y créer un foyer de Lèpre ; de même en Angleterre, les lépreux revenant de l'Inde n'ont pas nécessité l'internement.

Le Dr Abraham a fait le 8 janvier à l'« Epidemiological Society » une communication sur 118 cas de Lèpre observés au Punjab, dont il lui est impossible de tirer un argument pour la contagion : nous relevons dans sa communication deux points intéressants. C'est d'une part que la nourriture exclusive de poisson ne semble pas être une condition favorable au développement de la Lèpre, comme on l'avait dit ; c'est d'autre part, qu'il existe des cas bien avérés de guérison, ou tout au moins d'amélioration très sensible et prolongée, grâce au traitement, par l'usage interne et externe des huiles de gurjun et de chanmoogra. Si les résultats n'ont pas toujours paru favorables, c'est que le traitement n'avait pas été suffisamment prolongé et énergique : un malade dont le Dr Philippe (Jamaïque) rapporte l'histoire, a « vécu dans la graisse » suivant son expression, depuis 1879 jusqu'à 1886. Cette opinion a du reste été soutenue par M. Leloir au Congrès International de Dermatologie de Paris (1889).

M. E. Neve qui a observé la Lèpre dans la province de Cachemir, n'est pas moins opposé à l'idée de contagion, ou, du moins ne saurait l'affirmer (*Lancet*, novembre 89).

Il n'en est pas de même du Dr Kanrin (Norvège), convaincu pour sa part qu'on trouve rarement un lépreux dont on ne puisse prouver les relations avec d'autres lépreux ; si l'on hésite dans le rapprochement de ces faits, c'est en raison de la très longue période d'incubation, qui fait perdre de vue le point de départ (*Lancet*, 23 janvier, 90).

Rapprochés de cette communication l'opinion émise par le Dr Von Wahl, à un congrès de médecins Livoniens, que la Lèpre augmente chaque jour en Livonie, et qu'il n'y a pas de doute sur la communication de cette maladie de personne à personne : dans les nombreux faits qu'il a observés, les ascendants étaient presque toujours indemnes, et d'ailleurs il est à remarquer que les individus atteints de Lèpre deviennent dès le début de leur affection complètement impuissants : l'hérédité ne semble donc pas devoir être admise comme cause principale.

Dr Ray, DURAND-FARDEL.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LE PROBLÈME DES DÉBLAIS ET DES REMBLAIS ⁽¹⁾

Le problème des déblais et des remblais se pose toutes les fois qu'il s'agit de transporter des matériaux d'un endroit à un autre. Si, par exemple, on veut élever un remblai de chemin de fer avec des terres empruntées à une tranchée de volume égal, il faudra évidemment chercher à faire cette opération en en réduisant les frais autant que possible. Les terres extraites de la tranchée (*déblai*) sont chargées sur des tombereaux qui les transportent au remblai : le prix du transport de chaque tombereau est proportionnel à la masse de terre qu'il contient et à la longueur du chemin qu'il suit, c'est-à-dire au produit de la masse transportée par le chemin parcouru, si nous admettons toutefois que tous les chemins sont de même qualité. Il faudra donc partager la tranchée à creuser (*déblai*) et le remblai à élever en volumes élémentaires équivalents se correspondant deux à deux de telle manière que, si l'on multiplie la masse de chacun des volumes élémentaires du déblai par le chemin qu'il doit suivre pour être transporté sur le volume correspondant du remblai, la somme des produits ainsi obtenus soit la *plus petite possible*. Dans ce problème pratique, les transports se font suivant des routes dont la forme varie avec la nature du terrain et, même avec l'état des travaux, au moins dans le voisinage immédiat du déblai et du remblai.

Parmi les auteurs qui ont essayé de traiter mathématiquement la question, Dupin seul a cherché à tenir compte de cette variation dans la forme des routes qui complique extrêmement le problème pratique.

Il est utile de remarquer que le problème se simplifie lorsque le déblai et le remblai peuvent être assimilés à des aires ou à des lignes situées dans un même plan : c'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'il faut dépaver une certaine aire pour repaver avec les mêmes matériaux une aire équivalente, ou lorsqu'il s'agit de combler un long fossé peu large et peu profond avec la terre fournie par le creusement d'un autre fossé de même nature.

I

Dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences* pour 1781, Monge, s'affranchissant des complications que présente le problème pratique, admet que les éléments du déblai *suivent des lignes droites* pour être portés sur ceux du remblai, et se pose la question de géométrie suivante :

« Deux volumes équivalents étant donnés, les
« décomposer en parcelles infiniment petites et
« deux à deux équivalentes, se correspondant sui-
« vant une loi telle que, si l'on multiplie le chemin
« parcouru par chaque parcelle, transportée sur
« celle qui lui correspond, par le volume de cette
« parcelle, la somme des produits ainsi obtenus soit
« un minimum. »

Pour simplifier le langage et rappeler le problème pratique, Monge nomme arbitrairement l'un des volumes *déblai* et l'autre *remblai* : le système

(1) Bibliographie : Monge, *Mémoires de l'Académie des Sciences*, 1781. — Dupin, *Applications d'Analyse, de Géométrie et de Mécanique*. — Darboux, *Comptes-Rendus*, t. CI, p. 1312 (Rapport). — A. de Saint-Germain, Etude sur le problème des déblais et des remblais (*Mémoires de l'Académie de Caen*, 1886, Imprimerie Le Blanc-Hardel, Caen). — Appell, *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des sciences*, t. 29, n° 3.

de routes rectilignes qui réalise le minimum demandé est le *meilleur système de routes*. Le mémoire que Monge consacre à cette question est l'un des plus importants qu'il ait publiés le grand géomètre, moins par la solution du problème des déblais et des remblais, que par les théorèmes de géométrie qui y sont établis, en passant, comme lemmes et comme propositions incidentes : c'est en effet, dans ce mémoire, que se trouvent développées les propriétés, maintenant classiques, des systèmes de rayons rectilignes et des lignes de courbure des surfaces.


La méthode suivie par Monge consiste à chercher d'abord des conditions nécessaires auxquelles doivent satisfaire les routes. Parmi ces conditions, la suivante se place au premier rang : dans le meilleur système de routes, les lignes droites suivies par deux parcelles quelconques ne doivent jamais se couper, si ce n'est à leur point de départ commun dans le déblai ou à leur point d'aboutissement commun dans le remblai ; car, si deux routes se croisent entre leurs extrémités, une figure bien simple montre que l'on peut diminuer le prix du transport des deux parcelles du déblai en échangeant leurs points de destination dans le remblai. Il résulte de ce principe que toutes les parcelles du déblai et du remblai, qui se trouvent sur la route suivie par une autre parcelle, doivent suivre la même route qu'elle. Donc, sur chaque route du meilleur système, il cheminera en général une infinité de parcelles formant, dans le déblai et le remblai, deux filets infiniment minces équivalents. Pour préciser ce point d'une importance capitale, considérons deux volumes équivalents, de forme ellipsoïdale, comme ceux que représente la figure ci-contre : les routes devront traverser les deux volumes de part en part, et, si l'on trace celles de ces routes qui s'appuient sur une petite courbe fermée C marquée à la surface du déblai, elles formeront une sorte de tuyau découpant dans le déblai et le remblai des volumes équivalents DD' et RR' . Les parcelles du déblai situées dans ce tuyau en DD' seront transportées, dans son intérieur, sur les parcelles du remblai en RR' . C'est l'ensemble de toutes les routes de ce genre qu'il s'agit de déterminer de façon à rendre minimum le prix total du transport.

Après avoir montré que cette détermination est facile dans le cas simple où les deux volumes peuvent être assimilés à des aires planes situées dans un même plan, Monge fait connaître, pour le cas général, la proposition suivante qui est la base de toute sa théorie :

Les routes appartenant au meilleur système doivent être normales à une même surface.

C'est dans le but d'établir ce théorème que

Monge étudie les propriétés essentielles des systèmes de droites et donne, pour exprimer que



des droites se succédant dans l'espace d'une manière continue sont normales à une même surface, une condition géométrique très simple qui conduit immédiatement aux propriétés des lignes de courbure. Mais les raisonnements à l'aide desquels il prouve que les routes du meilleur système doivent être normales à une même surface, sont si peu satisfaisants que le théorème était mis en doute par certains géomètres ; la démonstration géométrique que Dupin en a donnée plus tard est également sujette à de graves objections. Le théorème de Monge est vrai pourtant : à la suite d'une question posée par l'Académie en 1884, il a été démontré géométriquement d'une façon très élégante par M. A. de Saint-Germain, et analytiquement par d'autres auteurs, notamment par M. Otto Olmèsorge (1) ; la démonstration analytique, fondée sur le calcul des variations, permet de montrer que le théorème de Monge est encore vrai, même si la densité est variable dans le déblai et le remblai.

II

D'après ce théorème, voici comment on procédera pour obtenir le meilleur système de routes correspondant à un déblai et à un remblai donnés. On cherchera une portion de surface continue S telle que les normales à cette surface le long de son contour soient tangentes à la fois au déblai et au remblai, et que les normales à l'intérieur du contour traversent entièrement le déblai et le remblai en remplissant la condition suivante que nous avons déjà indiquée : si l'on prend une suite continue de ces normales formant un tuyau de

(1) Le Mémoire de M. Otto Olmèsorge a été présenté à l'Académie, mais n'a pas été publié à notre connaissance.

section très petite, ce tuyau doit détacher, dans le déblai et le remblai, des volumes équivalents. Toutes ces conditions étant réalisées, ces normales formeront le meilleur système de routes, sauf dans des cas exceptionnels sur lesquels il serait trop long d'insister. Ces cas exceptionnels ne pourront pas se présenter si la surface S est convexe du côté du déblai et du remblai.

Pour déterminer la surface S normale aux routes du meilleur système, il faut intégrer une équation aux dérivées partielles du second ordre déjà donnée par Monge. Dans l'état actuel du calcul intégral, cette équation ne peut être intégrée que dans des cas particuliers, par exemple dans le cas où le déblai et le remblai sont des aires homogènes équivalentes situées dans des plans parallèles ou sur la surface d'une sphère. Mais, même en admettant qu'on ait réussi à intégrer l'équation, on se trouvera, pour la détermination des deux fonctions arbitraires qui figurent dans l'intégrale générale, en face de nouvelles difficultés de la nature de celles qui se présentent dans la théorie des surfaces minima. Le célèbre problème des surfaces minimales consiste à trouver, parmi toutes les surfaces continues passant par une courbe fermée donnée, celle dont l'aire est la plus petite possible. On peut obtenir physiquement cette surface en construisant, avec un fil métallique, un contour égal à la courbe donnée et le plongeant dans un liquide légèrement visqueux; le contour étant ensuite retiré, le liquide forme une lame continue très mince passant par la courbe et représentant approximativement la surface demandée (1). Si l'on veut déterminer analytiquement cette surface, il se présente des difficultés que M. Darboux résume de la manière suivante: « Si l'on considère toutes les surfaces formant une nappe continue passant par une courbe fermée, le calcul des variations apprend que la surface d'aire minimum aura, en chaque point, ses rayons de courbure égaux et de signes contraires. L'équation aux dérivées partielles de cette surface une fois intégrée, la condition à laquelle elle est assujettie de passer par la courbe ne permet pas de déter-

« miner complètement les deux fonctions arbitraires dont elle dépend. Il existe une infinité de surfaces minima contenant la courbe; mais ces surfaces ne satisfont pas toutes, on le sait, à la condition, supposée cependant par le calcul des variations, de former une nappe continue reliant les uns aux autres tous les points de la courbe. On ne peut déterminer les deux fonctions arbitraires qu'en employant des considérations tout à fait indépendantes de la méthode des variations, puisque la condition à laquelle il s'agit de satisfaire est supposée remplie au moment même où commence l'application de cette méthode. Le problème auquel on est ainsi conduit arrête aujourd'hui encore les efforts des géomètres et n'a pu être résolu que dans quelques cas particuliers.

« La solution du problème de Monge présente des difficultés analogues et peut-être plus grandes. Les fonctions arbitraires d'une variable, qui entrent dans les équations du système des routes, doivent être déterminées par la condition que les routes forment un système continu, permettant de transporter dans l'ensemble du remblai la totalité des parcelles qui composent le déblai. La condition, évidente *a priori*, que les routes limites soient tangentes à la fois à la surface du déblai et à celle du remblai, ne fait connaître qu'une de ces deux fonctions, et il n'existe, comme dans la théorie des surfaces minima, aucune règle fixe et précise conduisant à la solution complète de la question proposée. »

Il est quelques cas simples où la solution complète se trouve aisément. Ainsi, lorsque le déblai et le remblai sont des volumes symétriques l'un de l'autre par rapport à un plan passant entre les deux volumes, la symétrie pouvant être oblique, les routes du meilleur système s'obtiennent en portant chaque élément sur son symétrique; elles sont parallèles à une même direction c'est-à-dire normales à un plan. Lorsque le déblai et le remblai sont des volumes de révolution autour d'un même axe, les routes du meilleur système sont situées dans les plans méridiens; elles sont normales à une surface de révolution autour du même axe.

P. Appell.

Professeur à la Sorbonne.

(1) En 1833, M. Schwarz, professeur à l'Université de Göttingue, a reproduit ainsi devant l'Académie des Sciences les plus importantes des surfaces minima, en employant un liquide et des appareils de son invention.

STRUCTURE ET FONCTIONS DES STOMATES

La surface des feuilles est criblée de petits orifices découverts et étudiés presque simultanément vers 1680 par Malpighi et N. Grew. Ces orifices ne reçurent que beaucoup plus tard le nom sous lequel on les connaît maintenant. En 1819 Link les appela *stomates* parce qu'ils sont constitués par deux cellules en forme de croissant, disposées à peu près comme les lèvres qui circonscrivent la bouche, *στωμα*; elles s'affrontent en effet par leurs cornes aplaties, en laissant entre leur partie concave, une fente, nommée *ostiole*, occupant toute l'épaisseur de l'épiderme et donnant accès dans les tissus de la plante.

Dès la découverte des stomates, les opinions furent partagées sur leur rôle. Malpighi (1) et, avec lui, Guettard, de Saussure, les considéraient comme des glandes (glandes miliaires de Guettard, glandes corticales de de Saussure). N. Grew (2) au contraire et avec lui Hedwig, qui les nommait *pores évaporatoires*, pensa qu'ils servaient soit à l'exhalation des liquides superflus, soit à l'entrée de l'air.

Nous donnons, à titre de curiosité, avec une courte description tirée de l'ouvrage de N. Grew, une copie fidèle d'un dessin (fig. 1) représentant la distribution des stomates dans le Lis blanc : « Les « téguments, d'un très grand nombre de plantes, « tout au moins, présentent plusieurs orifices ou pas- « sages (*pass-ports*), qui servent soit à l'élimination « de la sève superflue, soit à l'admission de l'air.

« Ces orifices ne sont pas pareils dans toutes les « feuilles; ils varient en grandeur, en nombre, en « forme et en position, d'après la nature de la « plante ou de la feuille, et donnent à la feuille un « grain différent... Dans le lis blanc, ils sont ova- « les, très blancs et chacun est entouré d'une « étroite bordure blanche. Ils semblent à une dis- « tance de $\frac{1}{8}$ ou $\frac{1}{16}$ de pouce l'un de l'autre, lors- « qu'on les regarde avec un bon verre; ils sont « dispersés sur toute la feuille, mais sans ordre « régulier.

« Dans la feuille de Pin, ils sont également ova- « les, et ont à peu près la même grandeur que « ceux du lis; il y en a à peu près le même nombre; « mais ils n'ont pas de bordure. Leur arrangement « est très élégant; ils sont tous disposés très exac- « tement en rang et en file d'une extrémité de la « feuille à l'autre. »

L'étude que nous allons faire brièvement [de ces organes montrera que Grew était dans la vérité.




Fig. 1. — Extrémité d'une feuille de Lis blanc, avec ses stomates, fac-simile d'une gravure de l'ouvrage de N. Grew (1682), représentant l'extrémité de la feuille en grandeur naturelle et cette même extrémité grossie.

I

On peut facilement voir les stomates d'une feuille d'*Iris*; il suffit de la plier en deux: elle se casse au niveau du pli, mais l'épiderme de la face concave résiste, et si l'on écarte doucement les deux fragments, on détache des lambeaux d'épiderme sous l'aspect d'une mince pellicule incolore que l'on peut directement examiner au microscope (fig. 2);




Fig. 2. — Stomates de la feuille d'*Iris* vus de face et en coupe; *c.st* cellules stomatiques, *ep* épiderme, *a* crêtes externes des cellules stomatiques.

le même résultat peut être obtenu avec des feuilles de *Yucca*. Mais, dans la plupart des feuilles, l'épiderme ne se détache pas aussi facilement, et pour en obtenir des fragments, on fait bouillir, pendant quelques minutes, des morceaux de feuilles dans une dissolution de potasse ou de soude caustique à 4 0/0; par l'ébullition, les tissus de la feuille sont dissociés et l'on sépare aisément, en agitant le liquide, l'épiderme des deux faces ainsi que les nervures. Les figures 3 et 4 représentent l'épiderme d'une feuille de Chou et celui d'une feuille

(1) Minimi tumores, voluti glandulae foramine perviae, Malpighi, *Opera omnia*, 1687.

(2) « Orifices or Pass-ports, either for the better avolation of superfluous sap, or the admission of air. » N. Grew, *Anat. of plants*, 1682.

de Lierre obtenus ainsi, avec les stomates qui s'y trouvent distribués.

Pour compléter les renseignements fournis par l'examen de l'épiderme vu de face, il faut pratiquer des coupes transversales minces sur différentes feuilles, de manière à voir comment les stomates sont constitués dans l'épaisseur; les figures 1, 3, 4, représentent de semblables coupes dans les feuilles de Chou, d'*Iris*, de *Cycas*.




Fig. 3. — Épiderme de la feuille du Lierre isolé par la macération; à gauche, face inférieure; à droite, face supérieure.

On voit, en comparant ces divers dessins, que les cellules de bordure de l'ostiole, qui sont nom-



Fig. 4. — Feuille du Chou, épiderme vu de face et de profil; o ostiole, c.st cellules stomatiques, p parenchyme, ép épiderme, c chambre stomatique, aa' crêtes des bords de l'ostiole.

mées *cellules stomatiques*, ont toujours la forme d'un croissant et se fixent l'une contre l'autre par leurs cornes aplaties; elles renferment presque toujours des grains de chlorophylle et des grains d'amidon, ce qui les distingue des cellules épidermiques, ordinairement incolores et souvent dépourvues de leur contenu protoplasmique.

Sur les coupes transversales pratiquées au milieu d'un stomate, on peut constater que l'ostiole, c'est-à-dire la fente qui traverse l'épiderme, d'abord large à l'orifice extérieur, se rétrécit peu à

peu vers le milieu, pour s'élargir ensuite à la face inférieure; il donne accès dans une lacune assez grande, laissée entre les cellules du parenchyme et qui a reçu le nom de *chambre stomatique* ou *respiratoire* c.

L'épaisseur de la membrane des cellules stomatiques n'est pas uniforme; la face supérieure et la face inférieure sont fortement épaissies, très réfringentes et souvent munies, du côté de l'ostiole, de crêtes saillantes aa' qui limitent celle-ci, tandis que les faces interne et externe sont très minces; dans le Chou les deux arêtes existent aa'; dans l'*Iris* il n'en existe qu'une a, enfin dans le *Cycas*, les arêtes manquent.

La situation des stomates relativement à la face externe de l'épiderme est variable; parfois placés dans le même plan que l'épiderme, comme on le voit dans la feuille du Chou, ces organes sont rarement saillants; le plus souvent, ils sont refoulés assez profondément au dessous de la face externe de l'épiderme, par suite du développement des cellules avoisinantes qui forment une sorte de chambre ou de puits au-dessus de l'ostiole, comme on le voit dans la feuille du *Yucca*, du *Pin*, du *Cycas*.




Fig. 5. — Coupe d'un stomate de *Cycas revoluta*; c.st cellules stomatiques, o ostiole, c chambre respiratoire, a anti-chambre, ép épiderme.

Les stomates existent seulement dans les organes recouverts par l'épiderme; ils manquent dans les tiges des arbres dont l'épiderme est exfolié ou crevassé, ainsi que dans toutes les racines, qui sont dépourvues d'épiderme, ou dont l'épiderme s'exfolie partiellement de très bonne heure. C'est donc dans les feuilles qu'ils sont surtout intéressants à étudier. Là ils sont répandus en égal nombre sur les deux faces, quand celles-ci sont semblables (feuilles de *Jacinthe*, de *Blé*, etc.); mais dans la plupart des feuilles dont les deux faces sont différentes, les stomates, rares ou absents à la face supérieure, sont très nombreux à la face inférieure (fig. 3). Enfin dans les feuilles toujours submergées, les stomates n'existent pas et les feuilles nageantes n'en sont pourvues ordinairement qu'à la face supérieure.

Le nombre des stomates est très considérable,

puisque certaines feuilles en possèdent jusqu'à 700 par millimètre carré; en moyenne il est de 100 ou 200 par millimètre carré; mais même dans ce cas, ces orifices sont si nombreux qu'une seule feuille peut en présenter un ou plusieurs millions; ainsi une feuille de Tilleul en présente 1,000,000 environ; une feuille de Nénuphar en porte 7,500,000, une feuille de Chou 11,000,000 et sur une feuille de *Victoria regia*, Nymphéacée des régions équatoriales de l'Amérique, il en existe environ un milliard!

On conçoit que des organes répandus avec tant de profusion dans l'épiderme des feuilles aient depuis longtemps attiré l'attention des physiologistes.

II

Nous avons vu que les stomates, désignés d'abord sous le nom de glandes, furent bientôt considérés comme les orifices naturels d'exhalation et d'inhalation des gaz qui circulent dans les méats ou les lacunes de la plante et sont utilisés par les tissus vivants. Une des plus anciennes expériences qu'on réalise pour montrer la communication des stomates avec les cavités de la plante, consiste à prendre une feuille de Nénuphar munie de son long pétiole. Le limbe étant placé dans l'eau, on saisit l'extrémité du pétiole entre les lèvres et l'on insuffle de l'air; on voit aussitôt des bulles d'air sortir du limbe par les stomates, après avoir circulé dans les cavités de la plante. Cette expérience due à Raffeneau-Delille (1) a été modifiée et variée, souvent d'une manière ingénieuse, par MM. Sachs et Merget. Malgré l'intérêt qu'elles présentent, nous n'insisterons pas sur ces expériences, parce qu'elles ne s'appliquent pas aux plantes vivantes à l'état normal; en outre comme un certain nombre d'entre elles pourraient être réalisées avec des membranes entièrement privées d'orifices, elles ne peuvent nous permettre d'affirmer si les stomates jouent un rôle prépondérant dans les échanges gazeux.

Nous décrirons seulement les expériences qui ont été entreprises sur des plantes vivantes, soit pour déterminer le lieu de sortie de la vapeur d'eau exhalée par les feuilles, soit pour déterminer le mode de pénétration ou de sortie des gaz consommés dans l'acte respiratoire ou chlorophyllien.

Garreau (2) a réalisé le premier des expériences précises sur cette double question. Il mastiquait deux cloches en verre contre les faces d'une feuille encore attachée à l'arbre; chaque cloche, transformée ainsi en une chambre close dont l'une des parois était formée par la face supérieure ou par la

face inférieure, renfermait une nacelle contenant du chlorure de calcium ou de la baryte caustique, suivant que l'on voulait étudier l'émission de vapeur d'eau ou d'acide carbonique. Dans ces expériences, réalisées avec des feuilles dont la face supérieure présente moins de stomates que la face inférieure, Garreau a toujours constaté que l'émission de vapeur d'eau est plus faible, toutes choses égales d'ailleurs, à la face supérieure qu'à la face inférieure. Ces expériences semblaient mettre hors de doute l'importance des stomates dans l'émission de la vapeur d'eau, et il y a une dizaine d'années, M. Merget (1) compléta la démonstration par des expériences très ingénieuses. Il employa des papiers imprégnés de certains sels, capables de changer de teinte suivant que la proportion d'eau qu'ils renferment est plus ou moins grande. Le sel le plus sensible est un mélange de protochlorure de fer et de chlorure de palladium; ce sel communiqué au papier sec une teinte blanc jaunâtre, qui devient d'un gris plus ou moins foncé quand on le place dans un milieu humide. En lavant ce papier avec du perchlorure de fer, on fixe la teinte obtenue, d'une manière inaltérable.

Le papier sensibilisé étant préparé, on en plie un carré en deux et l'on place dans le pli une feuille encore adhérente à la plante, en maintenant le papier appliqué sur sa surface par une faible pression; si l'on opère par exemple avec une feuille adulte de *Fusain du Japon*, qui est dépourvue de stomates à la face supérieure, on constate, au bout de quelques minutes, que le papier sensibilisé n'a pas changé de teinte à la face supérieure, tandis que la partie adhérente à la face inférieure présente une teinte grise parcourue par un élégant réseau blanc formé par les nervures, toujours dépourvues de stomates.

Si l'on avait employé une feuille très jeune de *Fusain*, dans laquelle les stomates ne sont pas encore entièrement formés, les deux faces de la feuille auraient produit sur le papier sensibilisé une teinte uniforme grise, parce que dans ces conditions, la vapeur d'eau est exhalée par diffusion à travers la cuticule de l'épiderme.

Les stomates méritent donc bien le nom de *pores évaporatoires* que leur avait donné Hedwig; mais ne sont-ils que cela, servent-ils aussi à l'émission et à l'absorption de l'oxygène et de l'acide carbonique? Cette question était encore controversée, il y a quelque temps, car Boussingault (2) vint contredire en 1868 les résultats publiés par Garreau. Tandis que ce dernier avait constaté, pendant la

(1) Raffeneau-Delille, *Ann. sc. nat.*, 1814, t. XIV, p. 328.

(2) Garreau, Recherches sur l'absorption et l'exhalation des surfaces aériennes des plantes. *Ann. sc. nat.*, 3^e série, t. VIII 1849.

(1) Merget, Comptes-rendus, février 1877, août 1878.

(2) Boussingault, Sur les fonctions des feuilles. *Ann. de chimie et de physique*, 1868.

respiration, un dégagement d'acide carbonique en rapport avec le nombre ou la distribution des stomates; Boussingault, en étudiant le phénomène chlorophyllien, crut pouvoir affirmer que l'exhalation d'oxygène était indépendante de la présence ou de l'absence des stomates. L'autorité qu'on attache, à si juste titre, aux travaux de l'illustre agronome, nous oblige à donner quelques détails sur les expériences qui ont servi à formuler la conclusion que nous venons de rappeler; conclusion inexacte, disons-le tout de suite, parce que si les expériences de Boussingault sont irréprochables, les conditions dans lesquelles il s'était placé n'étaient pas comparables.

Ce savant employait deux feuilles aussi semblables que possible; l'une, enduite de suif ou d'empois d'amidon à sa face inférieure, était collée par cette face sur une feuille de papier noircie, de manière à ne recevoir les radiations que par la face supérieure, dépourvue de stomates; l'autre feuille, recouverte du même enduit à sa face supérieure, était collée aussi sur du papier noirci, de manière à ne recevoir les radiations que par sa face inférieure à stomates libres. Ces deux feuilles ainsi préparées étaient placées chacune dans une éprouvette contenant, avec l'air normal, une proportion connue d'acide carbonique, et exposées au soleil par la face libre. L'analyse de l'atmosphère confinée, au bout d'un certain temps d'exposition, montre que la feuille recevant les radiations par sa face supérieure, et dont les stomates sont bouchés, exhale dans le même temps, un volume d'oxygène plus considérable que la feuille recevant les radiations à sa face inférieure, mais dont les stomates sont libres. Ce résultat est indiscutable, et on peut l'obtenir aussi souvent que l'on recommencera l'expérience, mais l'interprétation de Boussingault est inexacte, car les feuilles employées ne sont pas comparables au point de vue de l'éclaircissement, à cause de l'inégale répartition de la chlorophylle dans les deux faces des feuilles.

On sait en effet que dans les feuilles à faces dissemblables comme celles du *Laurier-Rose*, du *Laurier-Cerise* employées dans ces expériences, le parenchyme vert qui renferme les grains de chlorophylle n'est pas homogène. A la face supérieure (fig. 6), il est formé de cellules trois à quatre fois plus longues que larges, étroitement appliquées entre elles, et ne laissant que des méats très étroits; elles sont disposées normalement à la surface de l'épiderme et forment deux ou trois rangées d'un tissu assez compact qu'on nomme *parenchyme en palissade*. A la face inférieure les cellules ordinairement étoilées, à trois, quatre ou cinq branches sont étalées parallèlement à la surface de l'épiderme; elles laissent entre elles de larges espaces remplis

d'air, méats ou lacunes, qui ont valu au parenchyme de cette région le nom de *parenchyme lacuneux*.




Fig. 6. — Coupe d'une feuille de *Lierre*; ép epiderme, pp parenchyme en palissade, pl parenchyme lacuneux.

neur. C'est à cause de ces masses d'air intercalées entre les cellules, que le ton de la feuille, d'un vert franc à la face supérieure, est plus ou moins lavé de blanc à la face inférieure. Si l'on suppose alors des radiations tombant normalement sur la face foliaire supérieure, elles traverseront le parenchyme en palissade sans être affaiblies par des réflexions ou des réfractions successives et la plus grande partie, absorbée par les grains de chlorophylle, servira à dissocier l'acide carbonique de l'air; cette activité se traduira par l'exhalation d'un volume considérable d'oxygène. Au contraire, si les radiations frappent d'abord la face foliaire inférieure, elles ne rencontreront les régions du parenchyme en palissade, riche en chlorophylle, qu'après avoir traversé successivement l'air des lacunes et le suc cellulaire; l'inégale réfringence de ces milieux successivement traversés affaiblira, par de nombreuses réflexions ou réfractions, l'intensité de la lumière incidente et comme conséquence on observera un dégagement faible d'oxygène.

Les résultats obtenus par Boussingault s'expliquent ainsi naturellement sans l'intervention des stomates, et l'on ne peut que s'étonner de voir qu'un grand nombre de botanistes aient accepté, sans la discuter, la conclusion de Boussingault, en admettant sans donnée scientifique précise, que la diffusion seule à travers l'épiderme pouvait entretenir les échanges gazeux. En réalité le problème n'était pas résolu, les expériences qui précèdent ayant établi seulement que les gaz peuvent parvenir aux tissus vivants, soit directement à travers l'ostiole des stomates, soit par diffusion à travers l'épiderme. Il ne restait plus, pour élucider complètement cette question, qu'à déterminer la part qui revient à chacune de ces deux voies d'introduction dans les conditions normales.

C'est ce que j'ai tenté de faire il y a deux ans en mesurant le coefficient de diffusion des divers gaz à travers la cuticule. Sans insister sur la description de la méthode employée, je me bornerai à donner un aperçu des résultats les plus importants (1).

La vitesse de diffusion des gaz est très différente et les diverses valeurs obtenues pour l'épiderme de la feuille de Houx, sont presque identiques à celles que M. Graham a données pour la vitesse de diffusion à travers le caoutchouc.

Si l'on représente par 1 le temps employé pour la diffusion de l'unité de volume de l'acide carbonique à la pression de 760, la durée de la diffusion de divers gaz, toutes choses égales d'ailleurs, sera :

Acide carbonique.....	1
Hydrogène.....	2 75
Oxygène.....	5 50
Azote.....	11 50

La vitesse de diffusion est :

1° Indépendante de la température, celle-ci étant comprise entre les limites des variations climatiques;

2° Proportionnelle à la différence des pressions que le gaz exerce sur les deux faces de la membrane;

3° Inégale pour les diverses plantes comme le montre le tableau suivant :

	Acide carbonique diffusant par heure et par cent. carré de surface pour une différence de pression = H.
	cm ³
Houx.... { Face supérieure.....	0 005
{ Face inférieure.....	0 009
Fusain du { F. S.....	0 067
Japon..... { F. I.....	0 192
Pommier. { F. S.....	0 053
{ F. I.....	0 305
Iris.....	0 041
Sagittaire.....	2 241
Potamoï perfolié..... { Feuilles submergées.....	1 234
Potamoï luisant.....	0 592

On voit que la perméabilité des surfaces épidermiques, abstraction faite des stomates, est toujours plus grande à la face inférieure qu'à la face supérieure, lorsque les feuilles ont un parenchyme hétérogène. En outre, si l'on se rappelle que les feuilles submergées sont dépourvues de stomates, le rôle important de ces orifices pourra être pressenti en remarquant, dans ce tableau, que la perméabilité des surfaces submergées est notablement plus considérable que celle des surfaces aériennes.

Il nous reste maintenant à signaler les résultats

obtenus par l'occlusion mécanique des stomates, *occlusion qui doit être réalisée en respectant la perméabilité des surfaces*. Différents enduits répondent à ce desideratum : le meilleur est la gélatine glycinée. J'ai alors comparé les échanges gazeux (respiratoire ou chlorophyllien) de deux feuilles aussi semblables que possible, soumises aux mêmes conditions. L'une avait les stomates libres; l'autre, enduite de gélatine glycinée, avait les stomates bouchés. Les chiffres qui suivent sont suffisamment probants pour que nous nous dispensions d'insister.

ECHANGE GAZEUX RESPIRATOIRE

		Feuille à stomates bouchés	Feuille à stomates libres
Fusain...	CO ² dégagé	4 35	5 58
	O absorbé	5 27	6 67
Poirier...	CO ² dégagé	7 97	13 86
	O absorbé	10 10	17 53
Pommier.	CO ² dégagé	4 95	12 86
	O absorbé	6 61	21 80
Iris.....	CO ² dégagé	4 58	5 51
	O absorbé	6 10	7 95

PHÉNOMÈNE CHLOROPHYLLIEN

	Feuille à stomates bouchés	Feuille à stomates libres
Fusain du Ja- { CO ² absorbé.....	3 28	6 66
pon..... { O dégagé.....	3 20	8 04
Bupleurum..... { CO ² absorbé.....	2 03	5 24
fruticosum..... { O dégagé.....	2 18	5 49
Rhamnus ala- { CO ² absorbé.....	1 69	7 52
terum..... { O dégagé.....	1 77	7 91

L'affaiblissement des échanges gazeux (respiratoire ou chlorophyllien) provoqué par l'occlusion des stomates, est dû à des causes différentes. Dans la respiration, l'occlusion des stomates apporte un obstacle à l'arrivée de l'oxygène dans les tissus et la feuille subit un commencement d'asphyxie. Au contraire, dans le phénomène chlorophyllien, c'est l'acide carbonique qui ne peut plus pénétrer en quantité suffisamment grande, et l'assimilation est réduite à la moitié, au tiers, parfois même au cinquième de sa valeur normale.

Je crois avoir résolu définitivement la question et montré que les stomates sont indispensables aux plantes aériennes aussi bien pour l'émission ou l'entrée des gaz que pour l'émission de la vapeur d'eau.

S'il était besoin d'une nouvelle démonstration de la nécessité de ces orifices, on la trouverait dans l'existence des curieux mouvements de ces organes déjà signalés et étudiés par Banks (1805), Moldenhawer (1812) et étudiés plus récemment par Mohl (1), MM. Muller (2) et Schwendener (3). Il résulte

(1) H. Mohl, Welche Ursachen bewirken die Eiweiterung. Bot. Zeit., 1836.

(2) Muller N. J. C., Die Anatomie und mechanik der Spaltöffnungen. Jahrb. für win. Bot., 1871. VIII.

(3) Schwendener (J.), Über Bau und mechanik der Spaltöffnungen, 1861, Berlin.

(1) L. Mangin, Recherches sur la pénétration ou la sortie des gaz dans les plantes. Annales de la Science agronomique française et étrangère, Nancy, 1888.

d'expériences faites sur l'épiderme vivant que, dans les feuilles jeunes, l'ostiole s'agrandit ou diminue suivant les variations extérieures, de manière à ouvrir ou à fermer presque complètement le stomate.

Ainsi, quand on examine un stomate dans l'air sec, les bords de l'ostiole sont rapprochés presque jusqu'au contact; si l'atmosphère devient humide, on voit l'ostiole s'élargir progressivement jusqu'au moment où l'atmosphère est saturée. Les alternances d'obscurité et d'éclairement produisent le même phénomène : fermés à l'obscurité, les stomates s'ouvrent largement à la lumière. Ces mouvements sont produits par les variations qu'éprouve la quantité d'eau contenue dans les cellules stomatiques et dans les cellules épidermiques. Si la quantité d'eau est faible, la pression exercée sur les parois des cellules est presque nulle et les membranes, obéissant à leur élasticité propre, prennent la situation de repos du stomate : l'ostiole se ferme. Lorsque le volume d'eau augmente, la cellule se gonfle, et les parois sont fortement pressées; si les membranes étaient uniformément épaissies, cette pression transmise sur des parois uniformément élastiques ne pourrait modifier la forme des cellules et le stomate resterait fermé, mais nous savons qu'il n'en est pas ainsi et que deux plaques épaisses existent souvent dans chaque cellule stomatique, sur le bord de l'ostiole, à la face externe et à la face interne; par suite les membranes minces, qui réunissent ces deux plaques, se distendent pendant que la cellule se gonfle, et l'ostiole s'agrandit parce que chaque cellule stomatique revêt la forme d'un croissant dont la concavité est d'autant plus accusée que la pression intérieure est plus forte.

Quant à la cause qui détermine l'afflux de l'eau dans les cellules stomatiques, elle est encore peu connue. On a supposé, il est vrai, l'existence d'une substance douée d'un grand pouvoir osmotique et par suite capable d'absorber l'eau par diffusion avec une grande énergie. Cette hypothèse, qui explique très bien le mécanisme de l'ouverture dans un milieu saturé, devient insuffisante lorsqu'on veut se rendre compte de l'action des radiations. Il est probable que la substance vivante intervient dans ces phénomènes par son irritabilité propre et met en jeu, dès l'arrivée des radiations, les forces osmotiques restées jusqu'alors à l'état latent.

Quoi qu'il en soit, les stomates, dans les feuilles jeunes, sont largement ouverts dans les conditions où les échanges gazeux sont les plus actifs, et ce fait est une nouvelle confirmation du rôle important que ces orifices jouent dans la plante, rôle entrevu par N. Grew il y a deux siècles.

REVUE GÉNÉRALE 1890.

III

Les stomates que nous venons de décrire, nommés *stomates aérifères*, sont les plus nombreux et les plus faciles à observer. Il existe d'autres orifices, nommés *stomates aquifères*, parce qu'ils servent à l'exhalation de l'eau à l'état liquide.

Ces orifices sont situés ordinairement à l'extrémité des nervures sur les bords ou au sommet de la feuille. Ils sont semblables aux stomates aérifères, au moins dans les jeunes feuilles; mais on n'y observe pas les mouvements que nous avons signalés dans ces derniers; en outre, l'ostiole, au lieu de déboucher dans une cavité remplie d'air, communique avec un parenchyme à grandes cellules, qui est placé à l'extrémité d'une nervure.

Dans un grand nombre de feuilles adultes, la surface foliaire, en s'agrandissant, détermine souvent la destruction d'un ou de plusieurs stomates qui sont remplacés par une fente plus ou moins grande, nommée *pore aquifère*.

Ces orifices servent à expulser en nature l'eau des tissus, et leur activité se manifeste le plus souvent quand la transpiration est ralentie par le séjour des plantes dans une atmosphère trop humide. On peut vérifier très aisément ce fait chez les Graminées, par exemple, le Blé. Si l'on sème des grains de blé dans une assiette remplie de sciure de bois humide, on obtient au bout de quelques jours un petit champ de blé dont les pousses ont de 0^m,10 à 0^m,15 de hauteur. Si on le couvre d'une cloche, de manière à saturer rapidement l'air emprisonné, on aperçoit, au bout de quelques heures, de petites gouttelettes d'eau placées à l'extrémité des feuilles, au niveau du pore aquifère. Ces gouttelettes sont exhalées à partir du moment où la transpiration ne peut plus s'accomplir. La cloche enlevée, les gouttelettes disparaissent au bout de peu de temps, mais on peut en faire apparaître de nouvelles en couvrant de nouveau l'assiette.

Dans les prairies ou les champs, le matin, après le dépôt de la rosée, on voit toujours de semblables gouttelettes à l'extrémité des brins d'herbe; on les considère comme produites par la rosée, tandis qu'en réalité elles ont été exhalées des tissus de la feuille. La quantité d'eau exhalée par ces pores peut être considérable, car on a pu recueillir à la pointe d'une feuille de *Colocase*, et pendant une nuit, jusqu'à 22 grammes d'eau.

Ainsi, c'est principalement par les stomates que circulent les divers gaz consommés ou produits par la nutrition générale des végétaux. Une seule objection peut encore être faite : l'absence des stomates sur les feuilles submergées, les racines et

les tiges dont l'épiderme est exfolié. Pour ces dernières on a depuis longtemps signalé l'existence des *lenticelles* qui suppléent à l'absence des stomates; ce sont des régions où les cellules du liège laissent entre elles des écarts plus ou moins grands servant à établir la communication entre les lacunes de la tige et le milieu ambiant. Quant aux feuilles submergées, l'absence des stomates est compensée largement, ainsi que mes recherches

l'ont établi, par une très grande perméabilité de l'épiderme, perméabilité qui peut devenir jusqu'à dix fois égale à celle des feuilles aériennes.

On voit donc que par des procédés différents le même résultat physiologique est atteint, et la communication facile est toujours assurée entre les tissus vivants et l'atmosphère.

Louis Mangin,

Professeur au lycée Louis-le-Grand

LES SAGES-FEMMES ET L'ANTISEPSIE

Depuis les découvertes de Pasteur, depuis leurs applications à la pratique médicale, des progrès considérables ont été réalisés en obstétrique. Grâce aux antiseptiques, les épidémies qui décimaient par moments les maternités ont presque totalement disparu et on peut dire aujourd'hui, sans aucune exagération, que les statistiques de certains services d'accouchements sont infiniment supérieures aux statistiques de la pratique civile de beaucoup de médecins et de la plupart des sages-femmes.

I

En 1874, alors qu'étant encore interne des hôpitaux, nous avons pendant quelques jours suivi à Edimbourg le service de Lister, nous avons été frappé des résultats obtenus en chirurgie grâce à l'emploi de l'acide phénique. En 1877 et en 1878, parcourant les différentes maternités d'Autriche, d'Allemagne, de Russie, de Danemark, de Hollande, etc., nous avons vu qu'on y essayait l'antiseptie avec des résultats divers, mais pleins de promesses; et quand, au retour, on nous pressait de publier un résumé des notes que nous avions prises, nous répondions à nos amis : A quoi bon? notre travail serait inutile ! Les statistiques de ces dernières années appartiennent à l'histoire, une ère nouvelle va commencer; jusqu'ici chaque accouchement était pour nous une source de craintes, après toutes nos opérations nous voyons survenir une fièvre plus ou moins intense; tout cela va disparaître, l'accouchement doit devenir un acte normal, ne donnant presque aucune inquiétude; les opérations ne seront plus suivies d'accidents d'infection.

Le premier novembre 1878, en entrant dans le service du professeur Depaul, comme chef de clinique, nous lui avons proposé d'essayer l'acide phénique, mais il s'y est énergiquement opposé. Il avait l'acide phénique en horreur et disait volontiers, comme l'a fait l'autre jour le professeur

Trélat : « Il pue votre acide phénique. » Nous avons été réduit à recourir aux solutions de chloral, de permanganate de potasse, d'acide thymique, mais cela était fait d'une manière bien insuffisante.

M. Tarnier, dont l'esprit était largement ouvert aux idées nouvelles et à qui nous communiquions nos impressions de voyages, M. Tarnier, qui avait déjà étudié avec un si grand soin toutes les questions de contagion, qui avait fait construire un pavillon, portant à juste titre son nom, où toutes les conditions d'un isolement efficace se trouvaient réalisées, M. Tarnier s'empressa d'employer l'acide phénique à la Maternité et il eut de suite de très bons résultats. Il s'efforça de faire mieux et, après les travaux de Davaine, après quelques recherches expérimentales faites sous sa direction par son interne d'alors, M. Bar, il essaya le sublimé sous forme de liqueur de Van Swieten. Les statistiques devinrent telles que beaucoup de chirurgiens, laissant de côté l'acide phénique, employèrent le sublimé. Les accoucheurs avaient donc marché à la suite de Lister et des chirurgiens en employant l'acide phénique; les chirurgiens à leur tour suivirent M. Tarnier et les accoucheurs en utilisant le sublimé.

II

Mais, si l'on a pu faire ainsi rapidement de grands progrès dans les maternités, en a-t-il été de même dans la pratique civile et en particulier dans la pratique des sages-femmes? Malheureusement non. M. Brouardel a montré qu'il existe encore aujourd'hui des épidémies graves de fièvre puerpérale dans la clientèle de certaines sages-femmes : dans l'une, survenu l'année dernière aux environs de Paris, 12 femmes sont mortes en huit jours par la faute de l'accoucheuse. Quand, justement frappé de cette mortalité, le parquet a voulu poursuivre, les sages-femmes ont répondu qu'elles n'étaient pas responsables, car elles n'avaient pas le droit de prescrire les antiseptiques et par con-

séquent de s'en servir. L'ordonnance de 1846 ne leur permet pas, en effet, de s'en faire délivrer par les pharmaciens; c'est pourquoi le ministre de l'intérieur a demandé à l'Académie de médecine : *convient-il d'autoriser les sages-femmes à prescrire les antiseptiques ?*

La sage-femme transporte souvent l'infection d'une accouchée malade à une accouchée saine. Siredey a cité une accoucheuse qui, du 21 mars au 25 mai 1879, assista 44 parturientes; 20 furent malades à différents degrés et 5 succombèrent pendant cette période.

A chaque instant on trouve rapportées dans les journaux des épidémies semblables; et combien restent inédites!

Mais la source de la contagion n'est pas toujours le transport de la septicémie puerpérale elle-même : tout le monde sait qu'il est commun de voir l'érysipèle être l'origine d'accidents puerpéraux; de même, s'il y a un abcès, un phlegmon, un panaris, le pus mis en contact avec les organes génitaux de l'accouchée peut être la cause de la septicémie.

Pfannenstiel a rapporté, l'année dernière, l'histoire de quatre décès survenus à Breslau : il s'agissait de fièvres puerpérales dont l'origine pouvait être attribuée à de graves angines tonsillaires; les personnes atteintes d'angine étaient : la fille de la sage-femme, deux enfants d'une famille qui habitait la même maison, et deux domestiques, dont l'une soigna trois des femmes en couches. Des faits semblables avaient été déjà signalés en Belgique par Grœningen.

On connaît, en Amérique, l'histoire d'un médecin qui perdait toutes ses femmes en couches : ne sachant à quoi attribuer ses désastres, il quitta sa pratique, brûla ses vêtements, coupa ses cheveux, sa barbe et attendit. Les premières femmes qu'il accoucha, quand il revint chez lui, succombèrent. Il renonça à l'obstétrique. Il était atteint d'ozène, de suppuration des fosses nasales et ses doigts n'étaient probablement jamais indemnes. Il peut en être de même si les sages-femmes, si les gardes ont des ulcérations, des plaies, de l'eczéma qui suppurent. Un de nos confrères nous a rapporté l'histoire d'une garde appartenant à une corporation religieuse qui, dans une même année, perdit successivement quatre femmes qu'elle soignait. Le scandale devenant trop grand à Paris, la supérieure du couvent l'envoya en province!

Il est aussi des sages-femmes qui, malgré les règlements, font de l'exercice illégal de la médecine, soignent les affections utérines qu'elles ignorent, badigeonnent des cols, mettent des tampons, laissant leurs clientes non guéries, ou permettant à la maladie de s'aggraver, quand elles ne font pas

pis. Elles ne s'exposent, devant les tribunaux indulgents, qu'à de légères peines ou à de petites amendes, mais veut-on savoir à quoi elles exposent leurs accouchées?

« Chez une sage-femme agréée par l'Administration, dit Siredey, plusieurs cas d'accidents puerpéraux s'étaient succédé presque sans relâche depuis douze à quinze mois. Un jour, il entra à l'hôpital Lariboisière deux de ses pensionnaires, si gravement atteintes qu'elles succombèrent quelques heures après leur admission. Je me rendis aussitôt chez cette sage-femme pour examiner son installation, et tâcher de découvrir la cause du mauvais état sanitaire de ses accouchées. Je constatai d'abord que les différentes pièces de l'appartement, à l'exception d'une seule, étaient très étroites et mal tenues... Enfin, j'appris qu'au milieu des accouchées vivait la mère de cette sage-femme, atteinte d'un cancer de l'utérus. Sa fille lui administrait des injections vaginales et lui donnait les soins qu'exigeait son état, tout en faisant des accouchements. »

A côté de ces causes, il faut citer les infections qui sont propagées par les bassins, les cathéters ou les canules. Les vêtements eux-mêmes peuvent être incriminés. Il y a une dizaine d'années, je reçus la visite d'un médecin des hôpitaux, absolument navré de ce qu'il venait de voir : une de ses parentes, atteinte d'accidents puerpéraux, se trouvait dans un état très grave. Cherchant partout la cause de l'infection, il interrogea la sage-femme qui restait près de l'accouchée comme garde, et lui dit : « Depuis quand portez-vous cette robe ? » — « Cette robe, lui répondit-elle, c'est ma robe de bataille, je la mets uniquement pour faire des accouchements. » Et elle sortait de soigner une femme qui avait succombé à l'infection puerpérale!

Que de faits du même genre il serait facile de citer!

Il y a deux ans, un de nos élèves nous appela pour voir avec lui une de ses accouchées qui se trouvait dans un état très grave. Il n'avait jamais eu dans sa pratique d'accidents de septicémie; il prenait les plus grandes précautions, absolument convaincu de la nécessité de l'antiseptie, et ne savait quelle pouvait être la cause des accidents qu'il observait. Il s'agissait d'une infection puerpérale à forme typhoïde, si sérieuse que la pauvre petite femme succomba vingt-quatre heures plus tard. J'avais remarqué que la garde avait l'index recouvert d'un doigtier. Je la fis venir et l'interrogeai, elle avait un panaris. « Mais, me dit mon confrère, son doigt était absolument cicatrisé avant l'accouchement, je l'ai examiné avec soin. » C'était vrai, malheureusement la garde portait depuis plusieurs semaines une robe de laine; bien

entendu elle l'avait conservée ; le doigt était guéri, mais les manches avaient suffi pour apporter l'infection. Le croirait-on ? Une des réformes les plus difficiles à obtenir est le port, par les sages-femmes et les gardes, de robes de toiles qui se lavent. Il semble qu'elles sont déshonorées, quand on veut leur imposer ce costume.

III

Aussi, en présence de ces différentes sources de septicémie, que de précautions il faut prendre dans la pratique obstétricale de la ville et dans les services hospitaliers. Dans ces derniers, les sages-femmes, les élèves en médecine, les infirmières, les nourrices, peuvent apporter l'infection. Les accouchées, dans la salle commune, doivent se trouver dans un état de santé parfaite ; si la température s'élève un peu chez quelques-unes, s'il y a de la fétilité des lochies, on ne tarde pas, en général, à voir apparaître des frissons, des lymphangites du sein chez les mères, des ophtalmies, des inflammations péri-ombilicales chez les nouveau-nés. Toutes ces affections marchent habituellement de pair. Et si quelques femmes sont souffrantes, les premières n'étant que peu atteintes, d'autres peuvent devenir rapidement malades : il semble qu'alors la virulence s'accroît en passant de l'une à l'autre.

Dès que les plus légers accidents surviennent, il faut donc redoubler d'attention et de précautions ; par conséquent il importe, dans les salles de femmes en couches, de supprimer non seulement la mortalité, mais encore toute morbidité. Il en doit être absolument de même pour les sages-femmes qui pratiquent à la ville et à la campagne. Aussi, faut-il s'efforcer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'apparition de cas isolés dans la clientèle des accoucheuses et, si l'un de ces cas existait, pour s'opposer au développement d'une épidémie.

En France, depuis le 1^{er} novembre 1882, l'administration de l'Assistance publique, à la demande des accoucheurs des hôpitaux, fournit gratuitement à ses sages-femmes agréées, pour chaque parturiente, un litre de solution concentrée d'acide phénique ; elles font donc de l'antisepsie ; mais cette mesure, qui a donné de bons résultats, ne s'applique qu'à un petit nombre de sages-femmes et n'est malheureusement pas généralisée.

En Saxe, les sages-femmes sont soumises à des règlements sévères et elles sont placées sous la direction d'un médecin régional dont elles dépendent. On leur prescrit d'avoir toujours des vêtements absolument propres, à manches courtes, elles doivent se laver les mains, les ongles, les

avant-bras, avec une solution phéniquée ; chaque sage-femme reçoit en effet du médecin régional une ordonnance à son nom, l'une pour 50 grammes de vaseline phéniquée, l'autre pour 150 grammes d'acide phénique en solution concentrée. Avec cet acide phénique, la sage-femme prépare des solutions à 2 %, en en versant deux cuillerées à thé dans un demi-litre d'eau chaude et en mêlant avec soin ; pour la solution à 5 %, elle met cinq cuillerées à thé dans un demi-litre d'eau pure et chaude. La bouteille porte la mention suivante :

ACIDE PHÉNIQUE

Très caustique

ATTENTION

Selon l'ordonnance : deux ou cinq cuillerées à thé à mêler avec un demi-litre d'eau.

Pour la sage-femme X...

La sage-femme doit tout de suite faire savoir, personnellement si c'est possible, ou par écrit au médecin régional, tout cas de maladie fébrile d'une de ses accouchées, ou tout cas que le médecin qui a été appelé déclare être de la fièvre puerpérale.

Elle fera connaître aussitôt que possible, et de la même manière, au médecin régional, tout cas de mort et la cause du décès.

Une accouchée est-elle atteinte de fièvre, la sage-femme ne doit plus lui donner de soins.

Pendant cinq jours au moins, elle ne fera plus d'accouchements.

Sur la première page de l'*Instruction*, il est dit que les sages-femmes qui ne s'y soumettront pas seront passibles d'une amende qui pourra s'élever à 150 marks, et s'exposeront à un emprisonnement dont la durée pourra être de six semaines.

En Prusse, les instructions, qui sont analogues, ne sont pas moins rigoureuses.

En Belgique, grâce surtout à l'impulsion donnée par Charles, de Liège, de grands progrès ont été réalisés. Les sages-femmes doivent avoir recours à l'antisepsie : dans certaines provinces on leur fait employer l'acide phénique, dans d'autres elles sont autorisées à se servir de solutions mères de sublimé, ainsi composées :

SUBLIMÉ CORROSIF.....	10 GRAMMES
ALCOOL.....	100 GRAMMES
INDIGO, quantité suffisante pour colorer.	

Une cuillerée à café dans un litre d'eau constitue une solution à 1 p. 2000 environ et donne l'eau sublimée qui sert aux différents usages.

L'Italie se préoccupe aussi de propager chez les sages-femmes les règles de l'antisepsie.

En Angleterre, l'organisation des accoucheuses est toute différente de celle qui existe sur le continent ; un nombre limité d'entre elles passe des

examens ; il n'est pas rare de voir exercer des poursuites contre elles. Nous citerons en particulier le cas d'une sage-femme qui fut, en février 1875, traduite devant les assises de Salford. Plusieurs de ses clientes ayant succombé à l'infection puerpérale, deux médecins lui conseillèrent successivement de cesser sa pratique pendant quelque temps ; elle ne tint aucun compte de ces avertissements et eut de nouveaux désastres. Le jury la condamna et le juge, en lui infligeant six mois de prison, lui dit : « Vous paraissiez une femme respectable, mais c'est une chose très grave que d'être ainsi une cause de mort ; la justice ne peut laisser ces faits impunis, car les décès ont été déterminés par votre négligence, alors que vous aviez été pleinement avertie. »

IV

Cette question des sages-femmes et de l'antiseptisme est donc réellement à l'ordre du jour. De tous côtés les accoucheurs demandent des réformes sérieuses et discutent celles qui ont été proposées afin d'obtenir la disparition de la fièvre puerpérale. Les articles publiés sur ce sujet depuis quelques années sont innombrables. Le professeur Fritsch, de Breslau, a été jusqu'à dire et redire : Si une sage-femme perd une accouchée, si, après enquête, on ne trouve la possibilité d'aucune autre cause de mort et si l'antiseptisme a été omise, cette sage-femme doit être condamnée pour homicide par imprudence. Et combien d'accoucheurs professent en Allemagne cette opinion !

Le médecin régional, écrit Valenta, devrait diriger les sages-femmes ; de plus, chaque médecin particulier devrait dénoncer et faire punir toute sage-femme convaincue de ne pas être antiseptique.

On va plus loin encore ; en Allemagne où le temps d'instruction des sages-femmes est bien moins long que chez nous, beaucoup de médecins disent qu'il faut avant tout qu'elles soient habituées à la pratique de l'antiseptisme, le reste n'est qu'accessoire.

Léopold recommande aux accoucheuses de suivre les progrès journalièrement réalisés en obstétrique ; quant à Fehling, il déclare que les sages-femmes, qui n'ont pas appris l'antiseptisme au moment de leurs études devraient suivre de nouveaux cours pendant trois ou quatre semaines.

Il y a quelques années, une élève se présentait à la Faculté de médecine de Paris pour recevoir le diplôme de sage-femme de 1^{re} classe. Elle avait admirablement répondu et elle allait être reçue avec une excellente note, lorsque nous eûmes l'idée de lui parler de l'infection puerpérale et de l'antiseptisme : sur ces points elle était absolument ignorante : elle avait fait son stage en 1878, et depuis elle n'avait suivi aucun cours. Nous avons cru qu'il

était de notre devoir de l'engager à compléter ses études et à se représenter trois mois plus tard.

En Belgique, dans le but de maintenir les connaissances théoriques et pratiques des sages-femmes à la hauteur de la science, on a, dans certaines provinces, institué des conférences. Dans la province de la Flandre occidentale, ces conférences sont bisannuelles : chaque séance est de deux heures au minimum. Les sages-femmes reçoivent un jeton de présence qui varie de 1 franc à 3 fr. 50, suivant la distance qu'elles ont à parcourir pour s'y rendre. A la fin de l'année, des primes en argent sont accordées à celles qui se sont distinguées par leur zèle, leur dévouement ou leur mérite.

Dans l'industrie, quand des procédés nouveaux et plus économiques surgissent, ceux qui n'y ont pas recours sont bien vite ruinés par la concurrence. Les sages-femmes, si peu payées, n'ont pas grand chose à redouter sous ce rapport, l'humanité aimant mieux faire des sacrifices d'argent pour ses plaisirs et ses satisfactions d'amour-propre que pour sa santé. Et pourtant, quelle économie de vies humaines les sages-femmes pourraient faire, si elles se mettaient au courant des progrès réalisés !

V

Dans tous les pays, les médecins s'efforcent donc de supprimer les causes d'infection, de faire disparaître les épidémies de fièvre puerpérale dans la pratique des sages-femmes et, pour cela, on a recours aux antiseptiques.

On a parlé d'employer l'eau bouillie ; mais si, dans les cas simples, lorsque les sages-femmes se lavent les mains, les avant-bras et se nettoient les ongles avec le plus grand soin, l'eau bouillie peut suffire, elle ne saurait détruire les germes qui, mis en contact avec les organes génitaux plus ou moins lésés, déterminent l'apparition des accidents puerpéraux. La prudence veut donc qu'on y renonce.

Mais les antiseptiques sont nombreux et vouloir demander aux accoucheuses qu'elles connaissent plusieurs méthodes, serait évidemment trop. « Beaucoup de sages-femmes, a dit, en effet, Fischel, considèrent l'antiseptisme comme un tracas inutile. » Il importe, par conséquent, dans la pratique de simplifier le plus possible. C'est pourquoi il vaut mieux ne permettre aux sages-femmes que l'emploi d'un seul antiseptique.

Quel antiseptique doit-on préférer ?

Il faut que cet antiseptique soit réellement efficace et n'expose pas trop les femmes aux intoxications et aux cautérisations : il faut qu'il coûte bon marché et qu'il puisse être aisément conservé et transporté. Toutes ces conditions ne sont pas faciles à réunir.

Nous ne ferons que citer l'acide salicylique, le chloral, l'eau oxygénée, le permanganate de potasse, l'iode, l'iodoforme, le bi-iodure de mercure, le chlorure de chaux, le chlorure de zinc et le thymol. Parmi ces substances, les unes sont insuffisantes comme antiseptiques, d'autres s'altèrent à l'air et ne peuvent être conservées, d'autres sont irritantes, d'autres salissent les linges ou les mains des personnes qui les emploient, d'autres enfin sont trop peu solubles et d'un maniement difficile.

Parmi les antiseptiques non toxiques, l'acide borique, la créoline et le naphthol ont été essayés.

L'acide borique est trop peu puissant pour qu'il soit permis de compter sur lui.

La créoline dont la composition exacte n'est pas connue, forme dans l'eau une émulsion dont la couleur et l'odeur sont désagréables; elle occasionne, même à la dose d'une cuillerée à café par litre d'eau, de la cuisson et de la douleur.

Le naphthol, qui est peu soluble, détermine parfois au niveau des organes génitaux une sensation de cuisson ou de brûlure, qui dure peu, mais n'en est pas moins désagréable.

Restent les deux antiseptiques qui ont été le plus employés : l'acide phénique et le sublimé.

L'acide phénique a rendu et rend encore de grands services; son action est cependant loin d'être aussi considérable qu'on l'avait cru tout d'abord.

Bien souvent, dans la pratique des sages-femmes, il ne donne que l'illusion de l'antiseptie; elles en jettent quelques gouttes dans l'eau dont elles vont se servir et, comme l'odeur est pénétrante, elles se figurent que cela est suffisant. Pour que les sages-femmes aient facilement à leur disposition la quantité d'acide phénique qui leur est nécessaire, on doit leur délivrer des solutions très concentrées; ces solutions-mères, dans l'alcool ou la glycérine, sont caustiques et toxiques; il faut donc prendre des précautions en les maniant. Si on emploie des solutions un peu fortes d'acide phénique, à 2 % par exemple, on voit survenir des rougeurs et même des plaques de gangrène qui forcent à y renoncer. Son action sur la peau étant parfois très irritante, les sages-femmes n'y ont pas recours spontanément ou refusent de s'en servir. Enfin, l'acide phénique est très dangereux pour les nouveau-nés; on en a vu qui ont succombé à la suite d'un simple pansement avec une compresse imbibée d'une solution d'eau phéniquée à 5 %.

C'est au sublimé que la Commission de l'Académie de médecine s'est ralliée.

Le sublimé a été conseillé en 1881 par M. Tarnier, au Congrès international de Londres. Depuis, son usage s'est rapidement répandu, car il donne d'excellents résultats; grâce à lui, la mortalité s'est

encore abaissée dans les maternités. Avec le sublimé, et nous ne saurions trop insister sur ce point, on observe aussi une diminution considérable de la morbidité. Beaucoup d'auteurs ont publié des statistiques absolument convaincantes.

De Saint-Moulin a donné les résultats de la maternité de Bruxelles. La mortalité puerpérale par infection, quand on y faisait usage de l'acide phénique comme antiseptique, a été de 0,96 % sur un total de 3.442 accouchements; elle est descendue à 0 % quand on a eu recours au sublimé.

Ici, à Paris, dans notre service de la Charité, depuis le mois de février 1887, pas une seule femme n'a succombé à la septicémie contractée à l'hôpital. Nous venons de relever tous les tracés du 1^{er} novembre 1889 au 20 janvier 1890 et nous avons trouvé que 4 % seulement des femmes avaient eu véritablement de la morbidité.

Or, il y a un grand intérêt à supprimer toute morbidité. Lorsqu'une femme, après son accouchement, a eu un peu de fièvre parce que ses organes génitaux n'étaient pas dans un état d'asepsie parfaite, il n'est pas rare de voir survenir des endométrites, des inflammations des annexes, des phlegmons tardifs, qui peuvent la rendre malade pendant longtemps et qui parfois mettent son existence en danger.

Il faut donc chercher à supprimer le plus possible la morbidité pendant les suites de couches et c'est surtout avec le sublimé, les chiffres le prouvent surabondamment, qu'on peut obtenir ce résultat.

VI

Mais on fait à l'emploi du sublimé une grosse objection : A certaines doses, dit-on, il est toxique, et il peut déterminer l'empoisonnement des malades; il peut même, des erreurs étant commises, être une source d'accidents pour l'entourage des femmes en couches.

On a beaucoup accusé le sublimé; évidemment, quelques personnes paraissent très susceptibles à l'action de ce médicament; mais en réalité, les intoxications ne sont pas fréquentes. Nous avons, pour notre part, employé le sublimé depuis 1882, nous y avons eu presque exclusivement recours dans notre service d'hôpital et dans notre pratique de la ville : c'est à peine si, à de longs intervalles, nous avons noté un peu de gingivite ou d'érythème, et cependant, au début, nous ne faisons usage que de solutions à 1 p. 1000.

En relevant avec grand soin les cas de mort par intoxication qui ont été publiés depuis que M. Tarnier a conseillé l'emploi du sublimé en obstétrique, c'est-à-dire depuis plus de huit ans, nous sommes arrivé à un total de seize cas, et encore quelques-uns d'entre eux nous paraissent-ils fort discutables. Quatorze fois, des injections intra-utérines avaient

été faites plus ou moins abondantes et avec des solutions variant entre 1 p. 1000 et 1 p. 2000; deux fois seulement, on n'avait pas fait d'injections intra-utérines, mais comme il existait une déchirure étendue du périnée, on avait eu recours à des irrigations de sublimé à 1 p. 1000 pendant qu'on pratiquait la suture. L'existence d'une néphrite, une anémie profonde due à une hémorragie ou la rétention du placenta dans la cavité utérine avaient, dans quelques cas, favorisé l'intoxication.

Or, il ne faut pas l'oublier, toutes les fois qu'il survient quelque chose d'anormal pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, toutes les fois qu'il y a de la fièvre après la parturition, la sage-femme doit prévenir un docteur, qui intervient ou qui prend les précautions nécessaires pour empêcher les accidents de s'aggraver; *elle n'a donc jamais à recourir spontanément aux injections intra-utérines*; si elle en pratique, ce ne peut être que sous la direction et la responsabilité d'un médecin.

Ajoutons enfin que, contrairement à ce qui a été observé pour l'acide phénique, les nouveau-nés supportent admirablement le sublimé.

M. Tarnier a bien voulu rappeler à la Commission de l'Académie de médecine que, depuis longtemps, il nous avait vu porter sur nous de petits paquets contenant 50 centigrammes de sublimé. Le contenu d'un de ces paquets jeté dans l'eau chaude y est rapidement dissous et constitue la meilleure des préparations antiseptiques. M. Tarnier a donc demandé à la Commission de conseiller pour les sages-femmes l'usage de petits paquets analogues.

Chacun de ces petits paquets, que les sages-femmes auront le droit de prescrire, contiendra 25 centigrammes de sublimé; en le mettant dans un litre d'eau, on aura une solution à 1 p. 4000.

Laplace a montré que l'acide tartrique, mis avec le sublimé, s'oppose à la formation d'albuminates de mercure en partie insolubles; or, un gramme d'acide tartrique en poudre, et le sublimé réunis se dissolvent promptement dans l'eau froide et surtout dans l'eau chaude; dissolution plus rapide, action plus puissante, voilà deux avantages que présente ce mélange.

Enfin, pour que les erreurs soient aisément évitées, on ajoutera au contenu du paquet une petite quantité de matière colorante; elle sera rose ou bleue, ce point n'est pas encore déterminé.

Sur chaque paquet, qui portera l'étiquette rouge exigée par la loi, on devra lire :

SUBLIMÉ, 25 CENTIGRAMMES

Pour un litre d'eau

POISON

La dose de 25 centigrammes fera courir bien peu de risques d'intoxication. Elle sera néanmoins suffisante en général si les sages-femmes, et elles ne devront pas manquer de le faire, se lavent les mains pendant plusieurs minutes, dans une solution chaude, avec du savon et une brosse, si elles nettoient minutieusement les espaces sous-ongueaux de leurs doigts et si, en terminant, elles laissent pendant quelques instants leurs mains dans la solution de sublimé.

Les instruments en verre, en gomme, en caoutchouc durci, en celluloïde, les vases émaillés, etc., pourront être plongés, pendant quelque temps, dans une solution de sublimé et deviendront ainsi antiseptiques; les quelques instruments en métal dont les sages-femmes font usage, les ciseaux et l'insufflateur, ne pouvant séjourner longtemps dans les sels de mercure, on les rend aseptiques en les faisant bouillir dans de l'eau pendant quelques minutes.

L'emploi de ces paquets constitue un moyen très simple pour pratiquer l'antiseptie et ce moyen est en même temps de beaucoup le plus économique.

Les sages-femmes ne prépareront ainsi leurs solutions qu'au moment même où elles en auront besoin; obligées de mettre dans un litre d'eau tout le paquet qui vient d'être ouvert, elles n'auront pas l'illusion de l'antiseptie, comme quand elles se bornent à jeter quelques gouttes d'acide phénique dans le vase rempli de liquide; la coloration empêchera toute confusion; enfin, les solutions étant utilisées tout de suite et n'étant pas conservées, les personnes de l'entourage ne courront aucun risque.

En outre, comme il est nécessaire que les sages-femmes aient à leur disposition une substance antiseptique pour enduire leurs mains et les instruments, les pharmaciens pourront également leur donner des doses de 30 grammes de la vaseline au sublimé à 1 p. 1000.

Ces paquets et cette vaseline au sublimé constituent donc les seules substances antiseptiques que les sages-femmes seront autorisées à prescrire; les dangers d'intoxication sont ainsi tellement réduits qu'on peut les considérer comme à peu près nuls. Du reste, on parle souvent de ces dangers du bichlorure de mercure et on oublie trop ceux de la septicémie. On peut compter les cas d'empoisonnement attribués au sublimé, en obstétrique; au contraire, le nombre des existences qui ont été conservées et le seront encore dans l'avenir, grâce à cet antiseptique, est incalculable.

D^r P. Budin,

Membre de l'Académie de Médecine.

REVUE ANNUELLE DE CHIMIE APPLIQUÉE

Les industries qui relèvent de la chimie sont, à notre époque, si nombreuses, elles se transforment si rapidement qu'un in-folio ne saurait suffire à en exposer, d'une façon complète, les récents progrès. C'est seulement sur les plus importants que nous nous proposons d'attirer l'attention du lecteur. Ils se rapportent à ce que l'on est convenu d'appeler la « grande industrie chimique » et la fabrication des matières colorantes.

LA GRANDE INDUSTRIE

Trois événements considérables se sont produits en ces derniers temps dans le domaine de la chimie appliquée : deux procédés nouveaux ont été inventés pour préparer le chlore et la soude caustique. Enfin une industrie des plus intéressantes, fondée sur l'emploi du coton nitré, a été créée de toutes pièces : nous voulons parler de la fabrication de la soie artificielle.

I

Pour bien comprendre l'importance du perfectionnement que vient de recevoir l'industrie du chlore, il est utile d'indiquer l'origine même de cette industrie, aujourd'hui si florissante.

L'application du procédé Leblanc à la fabrication de la soude permet d'obtenir à la fois les sels de soude proprement dits, la soude caustique et l'acide chlorhydrique nécessaire aux besoins des laboratoires ou de l'industrie pour la fabrication du chlore, des chlorates et des chlorures décolorants.

Dyar et Hemming en 1838 donnèrent un procédé de transformation directe du chlorure de sodium en carbonate de soude, par l'action du bicarbonate d'ammoniaque sur le sel marin.

MM. Schloesing et Rolland installèrent industriellement à Puteaux, en 1856, la fabrication de la soude à l'ammoniaque, mais la réussite complète de ce procédé ne fut réalisée que par MM. Solvay frères, qui de 1863 à 1873 rendirent cette méthode absolument pratique.

Le succès de la fabrication de la soude à l'ammoniaque porta une très sérieuse atteinte à l'industrie de la soude pratiquée par le procédé Leblanc, et maintenant que, depuis plus de deux ans, M. Solvay a monté une fabrication importante de soude caustique dont le prix de revient est inférieur à celui de la soude obtenue par la méthode Leblanc, il ne reste plus comme source de bénéfices dans cette méthode ancienne que le chlore et ses dérivés commerciaux.

M. Pechiney vient de mettre en pratique, dans

les usines de Salindres, une idée théorique donnée vers 1884 par M. Weldon. Ce procédé nouveau de fabrication du chlore repose sur l'extraction directe de ce gaz à l'état de liberté par l'emploi du chlorure de magnésium, soit artificiellement obtenu par l'action de l'acide chlorhydrique sur la magnésie, soit naturellement extrait des eaux de la mer ou des sels de Stassfurth, soit enfin régénéré comme résidu de la transformation en chlorates alcalins du chlorate de magnésie obtenu par l'action directe du chlore sur la magnésie résiduelle.

1° *Emploi, pour la fabrication du chlore, du chlorure de magnésium préparé artificiellement.* — On prend la magnésie provenant d'opérations précédentes, on fait arriver sur elle l'acide chlorhydrique en dissolution dans l'eau. On opère dans des cuves en pierre munies d'agitateurs mécaniques. Après dissolution, on sature par un léger excès de magnésie en vue de précipiter le fer et l'alumine. On décante.

La solution décantée de chlorure de magnésium est concentrée dans des chaudières jusqu'à ce que son point d'ébullition s'élève de 115° à 140°. Alors on mélange, dans un pétrin mécanique, cette solution concentrée de chlorure de magnésium avec de la magnésie. On emploie 1 équivalent 1/3 environ de magnésie par équivalent de chlorure.

Après solidification de l'oxychlorure de magnésium, on concasse la masse et on blute sur des tamis à mailles de 0^m,003. Les poussières d'oxychlorure sont employées avec la magnésie à la fabrication du chlorure de magnésium.

Les fragments concassés d'oxychlorure sont desséchés sans perte d'acide chlorhydrique, la température de dessiccation étant inférieure à 300°.

La dessiccation se fait en plaçant sur des wagonnets munis de tablettes superposées l'oxychlorure en couche mince d'environ 3 à 6 centimètres d'épaisseur. Les wagonnets réunis en train, sont placés dans un carreau ou arche qui en renferme environ 10 et qui est traversé par des chaleurs perdues qui élèvent la température à un degré compris entre 250 et 300. Deux chambres d'isolement à chaque extrémité de l'arche permettent l'arrivée et le départ des wagonnets.

L'oxychlorure de magnésium desséché est ensuite soumis dans un four chauffé entre 800° et 1000° à l'action d'un courant d'air dont l'oxygène déplace le chlore de l'oxychlorure et laisse comme résidu la magnésie.

Cette opération de production du chlore se produit alternativement dans deux fourneaux semblables chauffés par un brûleur mobile. Dès que

l'un des fours est amené à la température nécessaire pour une opération, on déplace le brûleur mobile que l'on approche du second fourneau, et on charge alors dans le premier appareil déjà chauffé l'oxychlorure de magnésium qui doit être décomposé par l'action de l'oxygène de l'air.

Le four est muni de deux portes, une supérieure par laquelle on fait le chauffage à l'aide du brûleur mobile, et par des ouvertures de laquelle on laisse, pendant le travail de mise en liberté du chlore, rentrer l'air extérieur; une seconde porte inférieure fermée aussi pendant le travail et montée sur un axe creux par lequel un ventilateur aspire les gaz contenus dans le fourneau.

Les gaz aspirés par le ventilateur contiennent en outre des éléments de l'air, du chlore libre et de l'acide chlorhydrique. Sur 100 parties de chlore total dégagé de l'oxychlorure de magnésium, 53 parties restent à l'état de chlore gazeux, 47 au contraire sont à l'état d'acide chlorhydrique. La température de ces gaz est comprise entre 300° et 400°.

Le ventilateur formé d'un système de cloches en plomb, montant et descendant sur un bain de chlorure de calcium, muni d'une tuyauterie à soupape fonctionne comme les aspirateurs anciens des usines à gaz d'éclairage, il aspire dans les fours l'atmosphère gazeuse qui s'y forme et refoule les gaz dans un réfrigérant en forme de tour à section carrée traversée de part en part par des séries de tubes inclinés en verre, refroidis intérieurement par un courant d'eau. Les gaz chauds se refroidissent contre ces tubes et une partie de l'acide chlorhydrique se condense et se rassemble au bas de la tour réfrigérante. Ensuite les gaz sont envoyés dans des bonbonnes où se termine la condensation chlorhydrique.

Le chlore qui reste libre est enfin envoyé dans les appareils à production des chlorures décolorants ou des chlorates.

2° *Emploi, pour la fabrication du chlore, du chlorure de magnésium naturel des eaux de la mer ou des sels de Stassfurth.* — Les eaux mères du chlorure de potassium obtenues comme résidu du traitement des eaux de la mer, ou comme résidu du traitement de la carnallite naturelle de Stassfurth renferment des quantités considérables de chlorure de magnésium.

On peut employer ce chlorure naturel exactement comme le chlorure artificiel a été traité dans le cas précédent.

3° *Emploi pour la fabrication du chlore, du chlorure de magnésium résidu de la fabrication du chlorate.* — Aux usines de Salindres pour fabriquer les chlorates, on fait agir le chlore obtenu par le procédé de M. Péchiney sur de la magnésie, résidu de fabri-

cation du chlore, employée au lieu et place de la chaux dont on se sert d'habitude. Cette magnésie est mise en suspension dans l'eau à raison de 50 à 100 grammes par litre et soumise à l'action du chlore libre dans des vases en forme de baratte, munis d'ailleurs d'agitateurs mécaniques. On obtient une liqueur mixte de chlorate de magnésie et chlorure de magnésium que l'on décante et concentre ensuite depuis 20° Baumé jusqu'à 48°, on fait alors cristalliser le magnésium et on brise la masse pour séparer à la turbine le chlorure solide de magnésium, de la liqueur formée par le chlorate de magnésie et par une partie du chlorure de magnésium primitif. A cette liqueur on ajoute de la magnésie. Il se fait de l'oxychlorure de magnésium insoluble dans la dissolution de chlorate et on turbine pour séparer la liqueur de chlorate de magnésie purifiée.

A cette liqueur, on ajoute alors du chlorure de potassium pour faire par double décomposition du chlorate de potasse et du chlorate de magnésium. On concentre vers 40° la liqueur mixte, puis on fait cristalliser le chlorure de potassium.

Le chlorure de magnésium, résidu de cette fabrication est employé à la production du chlore comme il a été dit en premier lieu.

II

Au cours de l'année 1889, il a été pris en Allemagne un brevet de principe pour la fabrication de la soude caustique par M. Romiguières, déjà breveté en France en 1888 pour le même procédé.

Sa méthode consiste à faire agir sur des métaux tels que le plomb, le zinc ou l'étain, pris sous forme de grenailles, la soude caustique en présence de l'air chaud. Si on place dans un appareil comparable à un lessiveur de papeterie de la grenaille de plomb, zinc ou étain au contact d'une dissolution concentrée de soude caustique, et si on fait arriver dans l'appareil un courant d'air chaud, l'oxygène de l'air se fixe sur le métal dont l'oxyde se dissout à mesure de sa formation dans la lessive alcaline en présence de laquelle la réaction se produit. On obtient donc par la dissolution du métal une dissolution soit de plombite de soude, soit de zincate ou de stannate de soude suivant les cas.

Si, par exemple, on a opéré sur du plomb et formé une dissolution de plombite de soude et que l'on ajoute à cette dissolution une quantité de sel marin ou chlorure de sodium équivalente à la quantité de plombite de sodium qu'elle renferme déjà, on aura un précipité de chlorure de plomb et il restera dans la dissolution un double équivalent de soude caustique. On pourra donc réserver la moitié de la dissolution pour procéder à une opération ultérieure et concentrer l'autre moitié de la dissolution de soude caustique

pour la préparation commerciale de cet alcali.

Le chlorure de plomb qui reste comme résidu peut pour moitié être traité par l'acide sulfurique en vue de la production du sulfate de plomb et de l'acide chlorhydrique, pour autre moitié, il peut être traité par des sulfures alcalins, en vue de la production du sulfure de plomb.

On peut alors, en mélangeant à équivalents égaux le sulfate et le sulfure de plomb, et en soumettant ce mélange à l'action de la chaleur dans un fourneau, obtenir à la fois du plomb métallique et de l'acide sulfureux. Le plomb métallique est livré au commerce ou rentre dans la fabrication suivant les cas, l'acide sulfureux est en nature employé dans des chambres de plomb à fournir un double équivalent d'acide sulfureux qui pour moitié rentre dans la préparation du sulfate de plomb et pour l'autre moitié est livré au commerce.

M. Romiguières dans son brevet se propose d'appliquer son procédé à la séparation de l'argent des plombs argentifères, en même temps qu'à la production de la soude caustique.

Il se propose aussi d'appliquer ce procédé au traitement des alliages triples de plomb, zinc, et argent obtenus par la désargentation des plombs d'œuvre par le zinc dans la méthode de M. Cordurrié par exemple.

Il se propose également de l'appliquer au décapage des résidus de fer blanc en vue de l'extraction de certains de ces résidus.

Dans ce cas, l'opération consiste dans un lessivage des rognures de fer blanc en présence de la soude caustique et de l'air chaud injecté dans les lessiveurs. Le résultat de cette opération est une dissolution de stannate de soude d'une part, et du fer décapé pur pouvant être livré aux ateliers métallurgiques de l'autre.

La dissolution des stannates de soude peut d'après l'inventeur et suivant les circonstances commerciales, être concentrée par l'action de la chaleur, cristallisée pour fournir du stannate de soude commercial, ou bien ce stannate de soude purifié peut être dissous dans l'eau et traité par l'acide sulfureux pour donner du sulfite de soude, ou par le chlore pour donner de l'hypochlorite de sodium, en même temps que les autres stanniques ou métastanniques livrables au commerce pour la fabrication des glaçures de faïence, ou encore susceptibles d'être réduits par le charbon pour donner de l'étain métallique qu'il suffit de couler en lingots pour le livrer aux ateliers de laminage et aux fonderies de bronze.

III

A côté de ces intéressantes innovations, nous devons signaler aussi, parmi les applications les plus

curieuses de la chimie, l'invention toute récente de la *soie artificielle*, due à M. de Chardonnet.

Le coton nitré étant soluble dans les mélanges d'alcool et d'éther et formant le collodion, l'éther et l'alcool volatils laissant par leur évaporation déposer le coton nitré qu'ils avaient primitivement dissous, on a pu et depuis longtemps déjà mettre à profit les propriétés de ces substances pour former sur des plaques photographiques, par exemple, des lames minces de coton nitré.

M. de Chardonnet s'est proposé non seulement de mettre en usage les propriétés de ces substances pour obtenir des fils, mais même de préparer ces fils à tous degrés de ténuité, et de les obtenir à volonté en blanc ou en couleur. Son procédé consiste à dissoudre la cellulose octo-nitrée dans un mélange à proportions convenables, d'alcool et d'éther de façon à former un collodion un peu épais, que l'on étire en fils de tel calibre qu'on le désire en le faisant écouler par filage régulier dans un tube creux en verre étiré. Le fil de collodion passe d'abord dans une cuve remplie d'eau. Le contact de l'eau produit la coagulation du collodion qui reçoit par cette coagulation la fixité de la forme de fil cylindrique déjà donnée par la filière à travers laquelle il a tout d'abord passé. Ensuite le fil est entraîné sur des dévidoirs placés dans une chambre à circulation d'air. L'éther et l'alcool s'évaporent dans cette chambre et le fil réel reste formé de la cellulose octo-nitrée qui résulte de l'évaporation du collodion.

Une fois que le fil se trouve ainsi obtenu, on dénitre partiellement au moins la matière qui le forme en le laissant séjourner pendant plusieurs jours au contact d'eau aiguillée d'acide nitrique.

L'eau est capable comme l'on sait de décomposer dans certaines conditions les éthers organiques. Un effet de cet ordre se produit par son contact avec la cellulose octo-nitrée et il résulte de son action une séparation d'environ moitié des produits azotés fixés sur la cellulose. Le fil dénitré partiellement correspond comme composition à de la cellulose tétra-nitrée. Il semble cependant résulter d'expériences tout à fait récentes que l'on peut pousser jusqu'à sa limite théorique la dénitratification du fil de soie artificielle. Alors la matière ne paraît pas être plus sensiblement combustible que le coton ordinaire. Dans tous les cas, on peut donner à ce fil telle coloration qu'on le veut soit avant filage en mêlant la matière colorante avec le collodion soit après filage en opérant par les procédés ordinaires de la teinture pour fixer sur la fibre artificielle les matières colorantes usuelles.

Henri Boucheron,

Professeur à l'École Centrale des arts et manufactures.

MATIÈRES COLORANTES



L'industrie des matières colorantes et des produits organiques est plus scientifique que jamais. Il faut avouer qu'il ne pourrait guère en être autrement dans les conditions où se trouve aujourd'hui cette branche importante des arts chimiques. Avec les laboratoires de recherches somptueusement installés et organisés par la plupart des grandes usines, qui y occupent un nombre toujours croissant de chimistes distingués, on ne peut s'étonner de voir grossir chaque année la liste des brevets accordés en matière de couleurs et de produits organiques. Encore faut-il bien se dire que le travail qui vient ainsi au jour ne représente qu'une petite fraction des résultats obtenus; autant que possible, les industriels préfèrent exploiter en secret tous les procédés présentant quelques difficultés opératoires.

Nous nous bornerons ici à signaler les tendances dominantes dont se sont inspirés les travaux les plus récents.


I

Pas plus que précédemment, il n'y a à enregistrer cette année la découverte de matières colorantes appartenant à une classe entièrement nouvelle de composés organiques. L'industrie n'a créé en 1889 aucun produit nettement caractérisé par de nouveaux groupes chromogènes, pour employer la désignation par laquelle les chimistes désignent actuellement les groupes d'atomes, ou, si l'on veut, les fonctions chimiques caractéristiques pour les corps colorés. On vit donc encore sur le passé et l'on est loin d'avoir épuisé la mine ouverte par l'ensemble des recherches antérieures. Ce n'est cependant pas que l'on ne trouve, dans les recueils purement scientifiques, quelques mémoires fort intéressants ayant trait à de nouveaux groupes chromogènes. Ces travaux n'ayant encore reçu aucune sanction pratique ne sont que des promesses pour l'avenir.

À défaut de découvertes frappantes dans une voie absolument originale, les chimistes ont dû se rabattre sur les méthodes connues. C'est ce qui rend compte de cette tendance générale à appliquer à des homologues élevés ou à des corps complexes les réactions qui se sont montrées fructueuses avec les premiers termes des diverses séries organiques qui sont en quelque sorte à la base de toute l'industrie des matières colorantes. Ainsi, l'on sait que lorsqu'on fait réagir en solution étendue les sels diazoïques sur les phénols ou sur les dérivés amidés, on obtient des composés dits *azoïques*, qui prennent naissance par l'une ou l'autre des réactions suivantes :




Quant aux sels diazoïques employés dans ces réactions, il est presque inutile de rappeler qu'ils se forment lorsqu'on fait réagir, en solution acide, l'acide azoteux sur les amines primaires :




Toutes ces réactions sont d'une extrême généralité, de sorte qu'en remplaçant l'aniline et le phénol par leurs homologues (toluidines, xyloïdines, naphtylaminés, naphthols, etc.) ou par des dérivés plus ou moins substitués (acide salicylique, acide sulfanilique, etc.), on avait préparé un nombre très considérable de matières colorantes, dont le *Ponceau*, le *Bordeau*, la *Vésuvine*, la *Tropéoline*, etc. sont les représentants les plus connus.

Il était à prévoir que ces réactions devaient s'appliquer à des corps contenant deux fois le groupe amidogène AzH^2 , et par conséquent susceptibles de donner des sels diazoïques diatomiques, comme c'est le cas par exemple de la benzidine, un des représentants les plus simples de ces corps deux fois amidés. Par la simple inspection des formules suivantes :



on voit que le chlorure diazoïque de benzidine est au chlorure de diazobenzine, ce que la benzidine est à l'aniline, ou ce qui revient au même ce que le diphényle est à la benzine. On conçoit dès lors aisément que le chlorure diazoïque de benzidine réagissant sur des phénols ou des amines, à la manière du chlorure de diazobenzine, donnera naissance à des corps contenant quatre atomes d'azote, ainsi que l'exprime l'équation suivante :



Les matières colorantes qui se forment dans ces réactions contiennent donc deux fois le groupe $-Az = Az-$ caractéristique des dérivés azoïques. C'est pourquoi on les a désignées sous le nom de *couleurs dis-azoïques*. Ces couleurs, qui sont de date relativement récente, ont fait l'objet, pendant cette dernière année, de nombreuses recherches, suivies de plusieurs demandes de brevets. Il faut croire que leur propriété de se fixer sur la fibre végétale non mordancée, — propriété que ne possèdent pas les couleurs azoïques simples, — n'est pas étrangère à l'intérêt que les industriels portent à ce nouveau groupe de matières colorantes. Au point de vue des applications en teinture et dans les travaux d'impression, c'est un réel avantage.

Parmi les corps diamidés qui ont servi de point de départ aux travaux les plus récents, il convient de citer le diamidodibenzyle que MM. Poirrier et Rosensthiel ont ainsi transformé en une belle matière colorante, le rouge de Saint-Denis, ainsi que le diamidocarbazol, employé dans un but analogue par la « Société Badoise ».


Il ne faudrait pas croire que ces applications nouvelles qui paraissent fort simples sur le papier fussent tout naturellement indiquées. En pratique la résolution de ces questions se heurte à des difficultés sérieuses provenant des conditions souvent très défectueuses dans lesquelles sont préparées les diamines en général. L'étude de ces nouveaux composés doit donc être précédée de travaux assez importants, ayant pour but d'abaisser le prix de revient des diamines sur lesquelles on désire opérer. Les grandes usines n'hésitent pas alors à s'imposer de lourds sacrifices pour résoudre ces questions préliminaires, et l'on pourrait citer bien des cas où l'on n'a pas reculé devant un travail considérable en vue d'améliorer seulement de quelques centièmes les rendements de certaines opérations.

II


Dans un tout autre ordre d'idées, l'attention des chimistes s'est portée du côté des matières colorantes sulfurées. Ces dernières ont été momentanément l'objet d'un véritable engouement dont on reviendra, très certainement. Plusieurs des produits ainsi obtenus se sont en effet montrés peu résistants à l'action prolongée de la lumière, et, à l'avenir, il ne faudra accepter les matières colorantes sulfurées qu'avec discernement.

Reconnaissons cependant que si quelques-uns de ces produits se sont montrés plus ou moins défectueux, il en est qui donnent d'excellents résultats et présentent une stabilité aussi complète qu'on peut la désirer. Tel est le cas par exemple de la *cyclamine*, nouvelle matière colorante due à M. P. Monnet de Lyon.

On sait que lorsqu'on chauffe ensemble la resorcin et l'anhydride phthalique simple ou substitué, on obtient des fluorescéines :




Or, d'après M. Monnet, cette fluorescéine dichlorée se transforme sous l'action du sulfure de sodium en un dérivé sulfuré, qui donne avec l'iodé un corps dont voici la formule probable :



Ce composé, ou plutôt son sel de potassium, n'est autre que la *cyclamine*, belle matière colorante rose d'une nuance plus riche que le *rose bengale*.

Indépendamment des recherches que nous venons d'analyser, il faut encore signaler divers travaux relatifs à la préparation de couleurs bleues, grises et vertes dérivées du bleu d'alizarine (Société Badoise). Citons également une méthode nouvelle de préparation de la rhodamine de M. Cérésolé (Meister, Lucius et Brüning), ainsi que des tentatives diverses pour préparer des matières colorantes dérivées de la pyridine, de la quinoléine, du rétène, des indophénols, du diphénylméthane et du diamidostilbène.

Nous mentionnerons enfin un travail d'un intérêt plutôt théorique de M. Gräbe qui a définitivement fixé la constitution de l'euxanthone, le principe tinctorial du jaune indien; ce savant est parvenu à le reproduire par synthèse en faisant réagir dans de certaines conditions l'acide hydroquinone-carbonique sur l'acide β -résorcylique.



L'analogie de constitution de l'euxanthone et de l'alizarine est mise en évidence par les formules de ces deux composés.

Ph. A. GUYE,
Docteur ès sciences.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX


1^o Sciences mathématiques.

Folie (F.), directeur de l'Observatoire de Bruxelles, — **La Nutation diurne**. (Notices extraites de l'*Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles*.)

Depuis cinq ou six ans, M. Folie a vivement attiré l'attention sur divers petits mouvements de l'axe de rotation de la Terre et consacré à la détermination de l'un d'eux, la nutation diurne, une partie de son activité scientifique. On sait que dans le mouvement de la Terre autour du Soleil l'axe de rotation de notre planète se transporte en restant à *peu près* parallèle à lui-même. Mais ce parallélisme ne se conserve qu'à *peu près*, car l'axe de la Terre décrit autour de l'axe de l'écliptique un cône droit dont la demi-ouverture est de $23^{\circ}\frac{1}{2}$; ce mouvement, dont la période est de 26.000 ans, produit la *précession des équinoxes*, connue depuis Hipparque (2^e siècle av. J.-C.). Outre ce mouvement général, l'axe de la Terre décrit autour de sa position moyenne, et en 18 ans $\frac{2}{3}$, un cône à base elliptique dont le grand axe égale $18''$: ce second mouvement produit la *nutation*, découverte par Bradley qui la fit connaître en 1748. Plus tard, les travaux de Poincaré (1855) appelèrent l'attention sur un troisième mouvement de l'axe de la Terre dans l'espace, la *nutation initiale*, dont la période est d'environ 10 mois et qui est extrêmement faible: les essais tentés jusqu'ici pour le mettre en évidence sont restés à peu près infructueux. Enfin M. Folie a montré que, si l'intérieur de la Terre est fluide,

l'axe de la croûte terrestre est, par suite, soumis à une *nutation diurne* qui le déploie dans l'intérieur de la Terre et le fait tourner, en 12 heures environ, autour de sa position moyenne: cette nutation diurne est certainement très faible, mais sa détermination présente néanmoins une grande importance, car, ainsi que tout mouvement négligé de l'axe de la Terre, elle entrera comme erreur dans les déterminations qui supposent que la latitude est invariable.

Soit P le pôle, supposé immobile; une étoile E tournant autour de ce pôle sera, après 6 heures, en E', et l'angle EPE' sera droit. Mais si dans cet intervalle de



6 heures, le pôle se déplace parmi les étoiles et vient de P en P', cet angle ne sera plus droit; l'écart dépendra d'une part de la grandeur et de la direction du déplacement PP', d'autre part, de la distance de l'étoile au pôle, comme le montre la comparaison des deux

MÉTHODES ET ÉTOILES EMPLOYÉES		OBSERVATOIRES	N_d	L LONG. EST DE PARIS
Polarissime.....	Observations d'ascension droite.	Kieff.....	0,209	9.19 ^m
α Petite Ourse.....	—	Harvard College.....	0,077	9.29
117 Zone polaire.....	—	Bonn.....	0,136	11.1
297.....	—	—.....	0,22	12.7
α Petite Ourse.....	—	Bruxelles.....	0,10	10.23
α —.....	—	Poulkova.....	0,18	11.45
δ —.....	—	—.....	0,32	8.41
α —.....	—	Greenwich.....	0,12	10.17
α —.....	—	Washington.....	0,17	11.36
σ Octant.....	—	Cordoba.....	0,11	10.17
α Lyre.....	Observations au premier vertical.	Washington.....	0,095	8.48
Petites $\star$ t. vois. du pôle.	Observations d'azimut.....	Cointe (val. moy.) (1).	0,325	10.2
—.....	—	— 2 ^e série.....	0,163	7.50
Détermination d'azimut.....	—	Strasbourg.....	0,099	8.45

(1) Cette valeur moyenne est déduite de quatre nuits d'observation seulement, chaque nuit a manifesté l'existence de la nutation diurne et fourni, pour la longitude du premier méridien, des valeurs comprises entre $8^h 23^m$ et $11^h 26^m$ à l'Est de Paris.

figures. Ainsi ce sont les étoiles les plus voisines du pôle qui mettront le mieux en évidence les effets de la nutation diurne, effets qui en outre seront maxima à 6 heures d'intervalle.

Pour manifester d'aussi faibles mouvements, les observations doivent être très précises et faites, par suite, avec un instrument bien stable, tel qu'une lunette méridienne. L'instrument que M. Folie préférerait aujourd'hui serait une lunette absolument fixe dirigée vers le pôle et dont le micromètre se composerait uniquement de deux fils mobiles placés à angle droit; on ne pourrait pas répondre de la stabilité absolue de cet instrument, non plus que d'aucun autre d'ailleurs, mais on éliminerait les erreurs instrumentales en com-

binant les observations de deux étoiles; et on tiendrait compte de la nutation initiale au moyen d'observations faites à 12 heures d'intervalle.

La connaissance de la nutation diurne dépend de celle de deux constantes que M. Folie, aidé de plusieurs de ses collaborateurs, a déterminées de diverses manières et qui sont en premier lieu un facteur numérique N_d , le coefficient de la nutation diurne, et en second lieu la longitude L de ce que M. Folie appelle le *premier méridien*, celui qui traverse la croûte terrestre dans sa plus grande épaisseur.

Voici (tableau ci-dessus) l'ensemble des valeurs obtenues pour ces constantes, et déduites d'observations variées faites dans divers observatoires.

La dernière valeur fournit, par la manière dont elle a été obtenue, une preuve inattendue de l'existence de la nutation diurne : M. Kobold avait déterminé, sans tenir compte de la nutation diurne, l'azimut du cercle méridien de Strasbourg par des observations de la polaire; au lieu d'une période annuelle à laquelle on aurait pu s'attendre, ces azimuts présentent une période diurne procédant suivant le temps sidéral. M. Folie ayant repris la discussion de ces déterminations en tenant compte de la nutation diurne a pu diminuer considérablement les corrections azimutales de M. Kobold et a obtenu en outre, pour les constantes de la nutation diurne, des valeurs très concordantes avec les déterminations antérieures.

En présence de ces résultats, il paraît bien difficile de mettre en doute l'existence de la nutation diurne, admise d'ailleurs aujourd'hui par les astronomes les plus autorisés : M. O. Struve, M. Gyllden, etc.; et même la valeur moyenne des constantes ci-dessus paraît jouir d'une assez grande précision.

Les conséquences qui résultent de l'existence de la nutation diurne sont importantes : au point de vue géologique elle démontre que l'écorce terrestre flotte sur un noyau dont la surface tout au moins est fluide; au point de vue astronomique, elle exige que l'on soumette à une nouvelle discussion les observations d'où ont été déduites les constantes de l'aberration et de la nutation, calculées en faisant abstraction de la nutation diurne. On devra avoir égard à cette nutation dans les déterminations de parallaxes absolues; enfin, dans les observations journalières, l'azimut des instruments méridiens devra être déterminé uniquement au moyen de lectures sur des miroirs bien installés jusqu'à ce que l'on connaisse la valeur précise des constantes de la nutation diurne. — On voit par là toute l'importance du sujet et on ne saurait trop louer M. Folie des efforts qu'il a faits pour attirer de ce côté l'attention des astronomes qui, à l'origine, étaient, généralement, disposés à mettre en doute l'existence d'une nutation diurne sensible.

G. BIGOURDAN.

2° Sciences physiques.

Pellat (H.). — Leçons sur l'électricité. Publiées par l'Association amicale des élèves de la Faculté des Sciences de Paris. (Georges Carré, éditeur).

M. Blondin vient de rédiger et de publier sous ce titre les leçons faites à la Sorbonne par M. Pellat, sur l'électrostatique, la pile, l'électricité atmosphérique.

La première partie, la plus développée, traite de l'électrostatique : l'auteur, ainsi qu'il l'indique lui-même dans sa préface, s'est surtout attaché à bien mettre en relief le nombre relativement petit des connaissances concernant l'électricité que nous ne pouvons acquérir que par l'expérience et qui constituent les lois fondamentales; les autres connaissances importantes ont été déduites ensuite de ces lois fondamentales par le raisonnement aidé le plus souvent de l'analyse mathématique, et la vérification expérimentale de ces déductions a été indiquée toutes les fois qu'elle présentait quelque intérêt. Les démonstrations mathématiques, tout en conservant leur rigueur, sont très simplifiées et restent à la portée d'un lecteur n'ayant encore suivi que les cours des lycées. Beaucoup de ces démonstrations sont données sous une forme nouvelle toujours très claire, et plusieurs théorèmes que beaucoup d'auteurs traitent avec un peu de vague sont présentés d'une façon originale en même temps que plus rigoureuse.

À la suite d'un chapitre concis quoique fort complet sur la théorie purement électrique de la pile, théorie que ses travaux personnels lui permettent de traiter avec une compétence toute particulière, M. Pellat donne en quelques mots les principales lois des courants et un exposé élémentaire de quelques-unes des méthodes de mesure électrique les plus usuelles.

La troisième partie de l'ouvrage est un très bon exposé de l'état actuel des connaissances sur l'électri-

cité atmosphérique. M. Pellat y décrit les méthodes expérimentales appliquées jusqu'à ce jour, indique les résultats obtenus par les différents observateurs, puis, développant ses idées personnelles, déduit des conséquences fort intéressantes sur l'électrisation négative de la terre, la variation du potentiel de l'air, les diverses causes d'électrisation des nuages, l'explication des orages et des aurores boréales.

Les trois chapitres très distincts qui constituent le nouveau livre de M. Pellat sont également intéressants. L'auteur a su y introduire une note absolument originale et en faire un ouvrage d'une lecture facile et d'une réelle utilité didactique.

F. N.

Brauer. — Recherches expérimentales sur la loi périodique. (*Zeitschrift für physikalische chemie*, 13 septembre 1889.)

Au moment où M. Mendeleeff énonça la loi périodique qui porte son nom, un certain nombre de corps ne se rangeaient à la place indiquée par leurs analogies qu'à la condition de modifier les poids atomiques alors adoptés. Des recherches récentes ont justifié la plupart de ces modifications; c'est ainsi qu'on prend aujourd'hui pour poids atomique de l'indium 113 au lieu de l'ancienne valeur 75,6; pour le lanthane, 180 au lieu de 94; pour l'uranium 240 au lieu de 116, etc.. Mais une exception subsiste pourtant : le tellure devrait, d'après ses analogies, être compris entre l'iode et l'antimoine, et avoir un poids atomique voisin de 125. Or un grand nombre de déterminations récentes, faites par des méthodes différentes et suffisamment concordantes, conduisent à la valeur moyenne $Te = 127,64$, avec une erreur probable de $\pm 0,008$. Cette valeur est supérieure au poids atomique de l'iode, 126,86, et diffère de la valeur à laquelle conduit la loi périodique, de plus de deux cents fois l'erreur probable sur la détermination du poids atomique. On se trouve donc conduit à l'alternative suivante : ou bien la loi périodique n'est pas exacte, et, pour le tellure, les propriétés ne sont pas fonctions du poids atomique; ou bien, le soi-disant tellure pur est un corps composé.

La valeur trop élevée du poids atomique serait due alors à l'existence dans ce corps d'éléments à poids atomiques considérables, éléments peut-être connus, peut-être inconnus, et qui pourraient bien se rapprocher des corps hypothétiques auxquels M. Crookes a donné le nom de méta-éléments. Pour vérifier ces hypothèses, M. Brauer a procédé de la façon suivante. Il a préparé des composés de tellure pur, les a fractionnés de différentes façons; puis sur chaque fraction il a déterminé le poids atomique. Les différentes fractions provenant de la précipitation du tellure par l'ammoniaque, ont donné pour le poids atomique les valeurs suivantes : 129,63, 127,63, 137,72, 127,71, 128,88, 127,57. Ces valeurs diffèrent de quantités bien supérieures à l'erreur probable; elles conduisent donc à admettre que le tellure est un corps composé. Cette hypothèse est également suggérée par les résultats de l'analyse du bibromure de tellure, qui donnent des nombres oscillant entre 130 et 133.

L'auteur se propose d'isoler le tellure pur, et de chercher les corps qui l'accompagnent, si son hypothèse se trouve justifiée.

Georges CHAREY.

3° Sciences naturelles.

Argutinsky (P.). — Travail musculaire et échanges azotés. *Archiv. für die gesamte Physiologie*, 1890,

L'auteur s'était fixé un régime alimentaire constant, dont il dosait exactement l'azote; il dosait de même celui des excréta. S'attachant plus spécialement à l'azote de l'urine (azote total, évalué par la méthode de Kjeldahl), il n'observait que de légères oscillations journalières tant qu'il menait sa vie habituelle. Mais lorsqu'il avait fait une promenade d'une journée dans un pays montagneux, l'excrétion d'azote augmentait ce jour-là et les deux jours suivants en général. L'excès d'azote de ces trois jours totalisé allait de 7 à 10 gr.

M. Argutinsky a calculé la force vive mise en liberté par la combustion de la quantité d'albumine correspondant à cet azote. Calculant d'autre part le nombre de kilogrammètres correspondant à ses ascensions, c'est-à-dire multipliant son poids par la somme des hauteurs de chacune des petites montagnes qu'il avait gravies, il est arrivé à une concordance satisfaisante entre ces deux chiffres. Il en conclut que c'est au dépens des albumines, au moins pour la plus grande partie, que se fait le travail musculaire.

Cette conclusion est en désaccord avec l'opinion la plus généralement adoptée par les physiologistes contemporains. Il est donc intéressant de critiquer les expériences sur lesquelles elle repose.

Les dosages de l'auteur semblent avoir été faits avec toute la rigueur désirable. Son régime était bien fixé et l'augmentation de l'azote excrété pendant trois jours à la suite de la promenade ne peut être attribuée qu'à ce travail. Mais l'évaluation de la quantité de ce travail, malgré la précision des chiffres, est loin d'être exacte. Calculant comme nous l'avons dit, l'auteur obtient pour son travail des équivalents calorifiques qui varient suivant les expériences de 177 à 276 calories. Mais à côté de la force utilisée, nous devons tenir compte, d'abord de l'élévation de la température du corps (0° 7 dans la seule expérience où elle ait été mesurée, soit 49 calories pour un poids de 70 kilos) et surtout de la vaporisation d'un poids d'eau assez considérable; l'auteur évalue lui-même à 1 kilog. au minimum l'augmentation de la perspiration cutanée et pulmonaire, soit plus de 500 calories. On voit que ces quantités de chaleur sont plus considérables que celles qui correspondent au travail calculé.

D'autre part ce travail calculé n'est lui-même qu'une partie du travail réellement effectué; M. Argutinsky n'a en effet tenu compte ni de l'effort de la translation horizontale, ni de la descente, ni de la suractivité des muscles respiratoires et du cœur. De plus ses chiffres supposent que le rendement utile des muscles d'un homme qui gravit une montagne est de 100 pour 100, proportion inadmissible. Dans ces conditions la concordance observée entre le travail de l'ascension et la force vive dégagée par les albumines qui ont fourni l'excès d'azote urinaire, concordance qui n'est d'ailleurs qu'approximative, perd beaucoup de sa valeur. Comment dès lors affirmer, puisque l'énergie dégagée par la combustion des albumines n'est qu'une petite partie de l'énergie totale dépensée par l'organisme, qu'elle a précisément été utilisée par le travail que M. Argutinsky a considéré? L. LAPICQUE.

4° Sciences médicales.

Chauvel et Nimier. — *Traité pratique de la chirurgie d'armée.* Paris, G. Masson, 1890.

A une époque où tous les médecins civils de 20 à 45 ans ne sont incorporés au service de santé militaire et peuvent, au lendemain d'une déclaration de guerre, être appelés à servir à côté de leurs confrères de l'armée active, un traité de chirurgie d'armée est destiné à rendre de grands services, s'il met le médecin civil au courant des diverses questions de la chirurgie d'armée. Les transformations absolues des règlements du service de santé, qui a conquis dans ces dernières années son autonomie, et les progrès immenses de la chirurgie, dus à la méthode antiseptique, font que le traité, publié autrefois par Legeuest, n'est plus en rapport avec les exigences actuelles. Aussi avons-nous lu l'ouvrage de MM. Chauvel et Nimier, comptant y trouver les notions qui manquent, en général, au médecin civil pour remplir utilement son rôle en temps de guerre. Notre attente n'a pas été déçue.

Nous y avons trouvé à la fois l'exposé court, mais suffisant, du service de santé en campagne des ambulances, de l'évacuation des blessés, en même temps qu'une description complète des plaies de guerre.

Les auteurs, après une étude des plaies par armes

blanches, abordent d'une manière détaillée les plaies par armes à feu. Les nouveaux projectiles, leur mode d'action sur les parties molles et sur les os, leur symptomatologie, leur traitement, font l'objet d'autant de chapitres successifs. Un seul point nous a étonné, c'est la sévérité avec laquelle est condamné l'appareil plâtre dans le traitement des fractures. Dans une deuxième partie, MM. Chauvel et Nimier nous montrent les différences que présentent les plaies suivant la région affectée. Nous signalerons comme particulièrement intéressantes les recherches faites sur les lésions des os causées par les nouveaux projectiles. D^r HARTMANN.

Mott (D^r Fred. W.). — *Un cas d'anémie pernicieuse.* (*The Lancet*, février, 1890).

L'anémie pernicieuse progressive, depuis les communications de Biermer (1868-1872), constitue encore un groupe nosologique mal défini; il faut distinguer, dans les anémies graves progressivement mortelles, deux séries de faits: ceux où la cause est manifestement connue (cancer, tuberculose, ostéomyélite chronique, bothriocephale, ankylostome, etc.) et ceux où l'anémie semble essentielle, c'est-à-dire où il est impossible de faire un autre diagnostic. C'est là une distinction bien nettement établie dans la thèse du D^r Planchard (Paris, 1888). Les conclusions de cette thèse établissent que l'anémie pernicieuse est une maladie infectieuse, opinion admise aujourd'hui par beaucoup d'auteurs, mais dont il reste à faire la preuve microbiologique.

L'observation de M. Mott n'apporte pas la solution à cette question, mais l'autopsie pratiquée avec soin met en évidence des faits encore peu connus. Il s'agit d'une femme de 49 ans, dont l'histoire clinique n'offre pas d'intérêt spécial, morte avec tous les signes pouvant justifier le diagnostic d'anémie pernicieuse.

L'autopsie ne révèle pas en effet de lésion particulière à laquelle on puisse rapporter cet état. Les cavités du cœur sont dilatées, les tissus anémiques, la rate normale; les reins sont légèrement dégénérés, le foie est dur, augmenté de volume, de coloration vert olive.

Au microscope les cellules hépatiques en dégénérescence graisseuse assez marquée; mais le fait intéressant est la proportion de granulations pigmentaires de nature ferrugineuse contenues dans ces cellules. En les traitant par le ferrocyanure de potassium additionné d'acide chlorhydrique, les coupes du foie prennent une coloration bleu foncé; en faisant agir le sulfocyanure de potassium acidulé d'acide chlorhydrique, la coloration est rouge sang, par formation de sulfocyanure de fer. M. Vasey, a traité le foie réduit en cendre, de façon à se rendre compte de la quantité de fer (en poids) contenu dans tout l'organe. Il donne le chiffre de 3 gr. 60 d'oxyde de fer pour un poids de 1240 grammes de foie vide de sang. Les reins contiennent également des traces de fer déposés dans les cellules des tubes contournés.

M. W. Mott tire de ces constatations la conclusion que, dans l'anémie pernicieuse, il se fait une désintégration des globules rouges au niveau du foie, l'hémoglobine donnant un pigment ferrugineux déposé dans les cellules hépatiques et passant en outre dans les urines sous forme d'urobilin. Ces urines étaient en effet très colorées, et le D^r Hunter (*Practitioner*, septembre 1889) a trouvé dans un cas analogue une urobiline pathologique.

L'examen microscopique n'a décelé l'existence d'aucun micro-organisme spécial. MM. J. Bond et Coppsan (*Lancet*, 1887) avaient montré que si l'on ajoute à du sang normal, *in vitro*, du sérum en voie de putréfaction, l'hémoglobine cristallise très rapidement; ils ont fait voir également que le sang dans l'anémie pernicieuse a une tendance particulière à former rapidement des cristaux d'hémoglobine. De ces faits, M. W. Mott est tenté de déduire que, dans l'anémie pernicieuse, il y a un microbe encore inconnu sécrétant une substance toxique dont l'action sur le sang provoque la précipitation de l'hémoglobine qui se dépose alors dans les cellules hépatiques et rénales.

D^r Hay. DURAND-FARDEL.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER (1)

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 février 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Stieltjes** : Sur la fonction exponentielle. — **M. A. Mannheim** : Sur un mode de transformation en géométrie cinématique. — **M. de Jonquières** : Note sur un Mémoire de Descartes longtemps inédit sur les polyèdres. — **M. R. Perrin** : Sur une généralisation du théorème d'Euler relatif aux polyèdres. — **M. M. Hamy** : Procédé physique pour la mesure de l'inclinaison du fil de déclinaison des cercles méridiens.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — Des recherches que **M. H. Lesœur** a faites sur la tension de dissociation des hydrates alcalins il résulte que, pour chaque hydrate, il existe une température à laquelle sa tension de dissociation se confond avec la tension de vapeur de la solution saturée. Les courbes figurant ces deux tensions se raccordent tangentiellement. Cette propriété appartient à tous les hydrates salins pendant une certaine période de leur existence définie. — **M. Moissan** a étudié l'action du fluor sur le carbone. La combinaison se fait d'autant plus facilement que le charbon employé est moins dense. On obtient ainsi, si le carbone n'est pas en excès, un tétrafluorure de carbone que l'on peut également préparer en faisant agir du tétrachlorure de carbone sur du fluorure d'argent. Si le charbon est en excès, on a un nouveau corps gazeux. — **M. Chabrie** a préparé le tétrafluorure de carbone par l'action du fluorure d'argent sur le tétrachlorure de carbone. Il a déterminé la formule de ce gaz en mesurant l'acide carbonique fourni par sa décomposition. Il a de plus pris la densité du gaz et l'a trouvée à peu près égale à la densité calculée. Les autres chlorures réagissent également. CCl_4 donne C_2F_4 . — En étudiant la flamme bleue du sel commun, **M. Salet** a trouvé dans le spectre observé des bandes bleues qu'il a reconnues être celles du cuivre. Il en conclut à un nouveau procédé pour la recherche du cuivre. — **M. Le Chatelier** a étudié la résistance électrique du fer et de ses alliages aux températures élevées. Les courbes représentatives mettent nettement en évidence, pour les fers et les aciers, les deux transformations moléculaires remarquées par **M. Osmond** à 730° et 855°. L'acier manganèse et le nickel en donnent une. Le ferromnickel, chauffé dans l'hydrogène humide, présente, pendant le refroidissement, un retard à la transformation analogue à celui que produit la trempe de l'acier, et qui paraît dû à l'oxydation du silicium qui y est contenu. — Des recherches thermochimiques de **M. Leo Vignon** sur la soie il résulte : 1^o que le pouvoir absorbant de la soie se manifeste dans le calorimètre avec des dégagements de chaleur nettement appréciables ; 2^o que les grès de soie et la fibreine appartiennent au même type chimique ; 3^o que les fonctions chimiques du grès de soie ont plus d'intensité que celle de la fibreine ; 4^o que ces fonctions sont nettement accusées. — **M. Raulin** a étudié, pour le dosage de la potasse dans les terres, un procédé basé sur la très faible solubilité dans les liquides aqueux du phosphomolybdate de potasse. Il a perfectionné le procédé de **John Henri Schmidt** pour le dosage volumétrique de l'humus.

3^o SCIENCES NATURELLES. — En étudiant la matière

colorante des *Diaptomus*, **M. Raphaël Blanchard** a reconnu que le pigment du *Diaptomus bacillifer* est une carotène. Il en conclut que l'organisme animal est capable de fabriquer des hydrocarbures. — **M. Louis Mangin** montre que, chez les phanérogames et les cryptogames, les tissus à éléments mous sont constitués par des cellules unies par un ciment de pectates insolubles. — **M. Louis Claudel** a cherché à déterminer la cause du déplacement de la zone colorée dans les téguments séminaux. Il a montré que la zone épaisse peut occuper toutes les positions de l'épiderme à l'amande ; or les matières colorantes spermatochromiques ne se forment que dans des cellules vivantes, les pigments ne peuvent donc apparaître en dehors de la zone épaisse. — **M. Beauguy** étudie la formation du quartz dans la source de Mauhourat, à Cauterets ; la température est assez peu élevée pour qu'on puisse admettre que ce minéral peut se former dans des conditions analogues à la température ordinaire. — **M. A. Lacroix** signale l'existence des roches à leucite aux environs de Trébizonde ; il les rapporte aux types leucite et leucotéphrite ; il indique la composition d'andésites et de trachytes, rapportés du Caucase, et qui sont riches en divers silicates ferromagnésiens, particulièrement en hypersthène. — **M. de Cayeux** a pu déterminer la cause de la coloration et de la dureté de certaines craies pseudodolomitiques du nord de la France ; l'élément auquel elles sont dues est le phosphate de chaux ; certains échantillons en renferment 60 %.

Séance du 17 février 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. de Jonquières** : Ecrit posthume de Descartes sur les polyèdres. — **M. Seydler** : Sur le problème de Saint-Petersbourg. — **M. Demartres** : Sur les surfaces réglées dont l'élément linéaire est réductible à la forme de Liouville. — **M. Petot** sur les surfaces dont l'élément linéaire est réductible à la forme $ds^2 = F(U + V)(du^2 + dv^2)$. — **M. Tisserand** application des lois électrodynamiques de Gauss au mouvement des planètes. (Voir *Nouvelles* p. 127.) — **M. Bazin** : sur la distribution des pressions et des vitesses dans l'intérieur des nappes liquides issues de déversoirs sans contraction latérale. — **M. Thoullet** : De quelques objections à la théorie de la circulation verticale profonde de l'eau dans l'Océan. — **M. Mouchez** : Observations des petites planètes à l'Observatoire pendant les trois premiers trimestres de 1889. — **M. de la Baume-Pivineuil** : Sur l'observation de l'éclipse totale de soleil du 22 décembre 1889.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Ch. Antoine** a étudié la compressibilité de l'air jusqu'à 3000 atmosphères. — En étendant les théorèmes connus sur la conservation des flux de force et d'induction magnétiques aux régions intérieures des corps, **M. Paul Janet** arrive au théorème suivant : le flux d'induction magnétique se conserve dans tout l'espace, y compris les conducteurs, magnétiques ou non, parcourus par des courants quelconques. — **M. Lucien Poincaré** a étudié les piles à électrolytes fondus. Il a trouvé que la théorie d'Helmholtz leur était applicable. — **M. Adolphe Minet** a dressé un tableau donnant les constantes électriques de l'électrolyse par fusion ignée des oxyde et fluorure d'aluminium. — **MM. P. Hautefeuille** et **A. Perrey** ont étudié les silicoglucuronates de soude comme ils l'avaient fait pour ceux de potasse. Ils en ont trouvé cinq. — Des recherches de

(1) Le présent numéro de la *Revue* paraissant, par exception, le 28, plusieurs comptes-rendus académiques n'ont pu être insérés.

M. Osmond sur le rôle des corps étrangers alliés au fer, il résulte que ces corps avancent ou retardent la transformation allotropique de ce métal selon que leur volume atomique est plus ou moins grand que celui du fer. — **M. J. Ville** a constaté que l'acide hypophosphoreux en agissant sur les aldéhydes peut donner des acides divalents et monobasiques ou acides oxyphosphéniques. — **M. Guinocet** a étudié l'acide carballylique dibromé. Cet acide est tribasique. — **M. Bayrac** a trouvé un procédé rapide et exact pour doser l'acide urique des urines : il emploie une solution titrée d'hypobromite de soude à chaud.

3^e SCIENCES NATURELLES. — **M. Raphaël Dubois** a étudié l'action de la lumière sur le Protée à yeux rudimentaires des grottes de la Carniole; ce Protée distingue la lumière de l'obscurité par les yeux et par la peau, mais la sensibilité dermatologique est deux fois moindre que la sensibilité oculaire. — **M. G. Carlet** a montré que la cire est produite par les quatre derniers arceaux ventraux de l'abdomen; elle est sécrétée par les cellules d'une membrane épithéliale, située entre deux feuillets, l'un extérieur, l'autre intérieur, appartenant à l'arceau ventral. La substance cireuse traverse la couche cuticulaire pour venir s'accumuler au dehors. — **M. Ed. Bureau** : Sur une fougère reviviscente, (voir *Nouvelles*, page 128). — **MM. Georges Linossier** et **Gabriel Roux** exposent le résultat de leurs recherches sur l'alimentation minérale, hydrocarbonée et azotée du champignon du muguet; l'oxygène libre est absolument indispensable au muguet; c'est dans la série des hydrates de carbone que l'on trouve ses meilleurs aliments hydrocarbonés; ils semblent d'autant meilleurs que leur poids moléculaire est plus élevé; la peptone constitue leur meilleur aliment azoté, l'albumine vient dans les derniers rangs; les récoltes sont meilleures dans les milieux légèrement alcalins. — **M. Gaston Bonnier**, à la suite de recherches expérimentales sur la culture d'une même plante à diverses altitudes, variant de 50 à 2400 mètres, est arrivé aux résultats suivants : la formation de réserves relativement abondantes dans les parties souterraines des plantes alpines peut s'expliquer non seulement par la différence d'intensité lumineuse, mais aussi par l'adaptation spéciale des feuilles à une nutrition beaucoup plus active; les tiges aériennes sont étalées, plus courtes et plus rapprochées du sol; les fleurs sont plus colorées, les feuilles plus épaisses et d'un vert plus foncé, les tissus protecteurs des tiges plus développés. Grâce à l'épaisseur plus grande du tissu en palissade et à l'abondance de la chlorophylle, l'assimilation par les feuilles est beaucoup plus grande à égalité de surface. — **MM. Lortet** et **Despeignes** ont démontré l'existence de microbes pathogènes en grand nombre dans les eaux des galeries filtrantes du Rhône, eaux qui alimentent la ville de Lyon.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 11 février.

M. Laborde demande que les sages-femmes emploient une solution titrée de sublimé additionnée de sulfate de cuivre, ayant, d'après ses expériences, des propriétés vomitives immédiates, suffisantes pour empêcher l'intoxication en cas de méprise. — **M. Guéniot** considère comme dangereux de mettre entre les mains des sages-femmes le sublimé; tout en le reconnaissant comme le roi des antiseptiques, il préférerait leur donner l'acide phénique ou le thymol comme à Vienne. — **M. Charpentier** voudrait qu'on autorisât les sages-femmes à se servir, non pas d'un seul antiseptique le meilleur, il est vrai, mais le plus dangereux, mais de tous les antiseptiques, en les rendant responsables en cas d'accidents, après leur avoir enseigné l'asepsie. — **M. Trélat** approuve le choix du sublimé, montrant comme chirurgien les dangers de

l'acide phénique et l'insuffisance du thymol. — **M. Budin** soutient les conclusions de la commission dont les deux premières sont votées, en substituant le mot *poison à toxique* dont **M. Colin** fait remarquer la confusion possible avec tonique, après observations de **M. Brouardel** qui, à la Morgue, n'a pas constaté d'empoisonnement par le sublimé contre quinze par l'acide phénique. — **M. Jaccoud** rend compte de ses observations sur la grippe. Dans tous les cas de pneumonie, broncho-pneumonie, bronchite capillaire, il a trouvé le pneumocoque, qui n'existait pas dans ceux de congestion pulmonaire et de bronchite simple. Il considère la présence du pneumocoque comme un signe différentiel entre la pneumonie et la fluxion de poitrine. — **M. Mosny** expose l'observation d'une broncho-pneumonie érysipélateuse primitive contractée par une femme de 37 ans soignant un malade atteint d'érysipèle de la face. Mort. Autopsie. Dans les noyaux de broncho-pneumonie : présence d'un seul micro-organisme, morphologiquement le streptocoque de l'érysipèle; les cultures donnent des colonies pures de streptocoque; les inoculations de ces cultures déterminent chez le lapin un érysipèle type, suivi d'abcès. Premier cas démonstratif, indiscutable. — **M. Périer** présente un cas de résection de l'apophyse transverse de la septième vertèbre cervicale, très hypertrophiée, formant à droite une saillie dans le creux sus-claviculaire, déterminant de violents accidents de compression du plexus axillaire et du récurrent. L'opération nécessita une large ouverture de la plèvre qui n'eut d'autre conséquence que de la douleur et de la dyspnée pendant 12 heures. Guérison sans encombre. — **M. Lucas-Championnière** donne une statistique de 44 cas de fractures de la rotule, guéries plus rapidement et mieux que par les anciens procédés, par incision large de l'articulation et suture des fragments. — Communication de **M. Créquy** qui a constaté que, pendant l'épidémie de grippe, les employés des bureaux de la Compagnie de l'Est ont été plus atteints que les employés de la voie, exposés à toutes les intempéries.

Séance du 18 février.

M. Dujardin-Baumetz, rapporteur d'une étude de **M. Valude** (de Vierzon) sur l'emploi de la macération d'écorce de panboto (légumineuse mimosée du Mexique) contre les fièvres palustres, pense que la valeur de ce médicament comme succédané du sulfate de quinine ne pourra être jugée qu'après de nouvelles expériences. — **M. Laboulbène** cite des cas de pneumonies érysipélateuses observés par lui, autrefois, à Sainte-Périne. Un malade atteint d'érysipèle de la face meurt de pneumonie double, sa femme et six personnes qui venaient les voir meurent également de pneumonie double sans qu'aucun traitement n'ait eu d'action. — **M. Renault** (de Lyon) fait une communication sur une nouvelle maladie organique du cœur caractérisée : anatomiquement par le ramollissement du ciment qui unit bout à bout les cellules musculaires cardiaques et les soude entre elles, amenant la dissociation segmentaire du tissu musculaire du cœur, d'où l'asthénie cardiaque : cliniquement par l'arythmie du pouls et du cœur sans hypertrophie préalable, l'impossibilité de localiser le choc précardial, la matité rectangulaire, un souffle systolique, médio-cardiaque, doux et instable, sans tuméfaction du foie ni signes de dilatation du cœur droit. S'observant surtout chez les vieillards, déterminant la mort par syncope ou par asystolie causée le plus souvent par un simple rhume. Traitement par la digitale et les toniques généraux. — **M. Panas** a répété les expériences de **M. Gley** sur l'action anesthésique locale de l'ouabaine et de la strophanthine, et trouve que la première ne semble pas douée de propriétés anesthésiques sur l'œil humain, que la seconde tout en ayant ces propriétés est très irritante et ne peut être substituée à la cocaïne. — **M. Gréhan** dans ses recherches sur l'acide cyanhydrique, a constaté qu'en injectant dans le sang d'un chien de 10 kilos une

solution contenant un centième de centimètre cube d'acide pur, la mort arrivait en 40 minutes, l'acide restant dans le sang, sans s'éliminer par les poumons. En injectant 5 centimètres cubes de la solution au cinq millième dans l'estomac, 42 minutes après la respiration s'arrête avec abaissement de température de 2°.

— **M. Chaput** lit une observation de guérison, d'une fistule stercorale compliquée de rétrécissement du bout intestinal inférieur, par résection de ce bout et suture circulaire après abrasion suivant un procédé personnel.

D^r. E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du vendredi 21 février 1890.





M. Pellat : *Limite entre la polarisation et l'électrolyse*. Considérons deux métaux plongeant dans un électrolyte A, et mis en communication avec les deux pôles d'une source d'électricité de force électromotrice variable E; tant que E restera inférieure à une certaine valeur M, les deux électrodes se *polariseront*, mais l'électrolyse ne se produit pas dans A; le fait est bien connu, mais la valeur de M très mal déterminée. M. Pellat a étudié le phénomène dans le cas d'une cathode en mercure, et par plusieurs expériences ingénieuses, établit que la force électromotrice M est précisément celle qui rend maxima la constante capillaire du mercure en contact avec l'électrolyte; une manière très simple d'établir cette loi consiste à chercher la valeur minima de la force électromotrice qui fait apparaître une bulle d'hydrogène dans le tube d'un électromètre capillaire de M. Lippmann; si l'on a soin d'éliminer par un artifice l'erreur résultant de la difficulté qu'a une bulle à se dégager au sein d'une masse liquide, où ne préexiste aucune bulle, on constate que l'apparition se produit exactement au moment où la constante capillaire est la plus grande possible. Au même moment, la couche double d'électricité entre la surface du mercure et celle de l'électrolyte est nulle, comme il est facile de le démontrer; il résulte de là des conséquences importantes relativement au mécanisme de la polarisation; il en résulte aussi une méthode pour déterminer la différence vraie de potentiel au contact du mercure, et d'un métal dont l'électrolyte est l'un des sels. — **M. Bouty** fait observer que les actions produites, dans le sein même de l'électrolyte et non plus au contact de l'électrode et du liquide, restent les mêmes, quelque faible que soit la valeur de la force électromotrice, comme le prouve la mesure de la résistance. — **M. Mascart** présente de belles expériences sur la *polarisation chromatique*. Un cristal à deux axes observé en lumière convergente offre le phénomène de la *dispersion des axes*. Les anneaux formés autour de chacun des pôles sont plus resserrés d'un côté que de l'autre et empiètent par suite les uns sur les autres, d'où la production de *franges achromatiques*; la production de telles franges favorise d'ailleurs la vision des autres franges, du côté où elles se produisent, et il est très facile par suite de déterminer le côté; il convient de remarquer que, dans le cas où les axes cristallographiques sont inclinés, le phénomène n'est pas symétrique autour des deux pôles. L'observation de la position de la frange achromatique, par rapport aux pôles, fournit un procédé très simple pour déterminer la nature de la dispersion. M. Mascart projette sur un écran le phénomène obtenu dans tous les cas possibles; il montre aussi le résultat fourni par la superposition de deux cristaux croisés à deux axes; il termine en montrant des cristaux observés en lumière circulaire, analysée circulairement; dans ce cas les hyperboles disparaissent, et les lemniscates deviennent plus belles.

Lucien POINCARÉ.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 6 février 1890.

M. Ramsay : *Observations sur l'anhydride azoteux et le peroxyde d'azote*. L'auteur recommande comme la meilleure préparation le procédé suivant. On ajoute dans le liquide bleu verdâtre obtenu par l'action de l'acide arsénieux sur l'acide nitrique une solution d'anhydride azotique obtenue par l'action de l'anhydride phosphorique sur l'acide azotique; la couche supérieure est décantée et distillée. L'auteur suppose que la réaction est la suivante : $\text{Az}^2\text{O}^3 + \text{Az}^2\text{O}^3 = 2\text{Az}^2\text{O}^4$. Le point d'ébullition du peroxyde d'azote est trouvé de 10 à 14°. Le poids moléculaire de l'anhydride azoteux déterminé par la méthode cryoscopique est de 80, 9, 92, 7, 81 au lieu de 74 correspondant à la formule Az^2O^3 . L'auteur n'a pu congeler l'anhydride azoteux même à — 90° en le refroidissant avec du protoxyde d'azote liquide. — **M. Pichering**. *Note sur la loi de congélation des dissolutions*. L'auteur considère l'abaissement du point de congélation d'un dissolvant comme pouvant être attribué à trois actions qu'il distingue en mécanique, physique et chimique. Il essaie de donner aux valeurs de ces trois actions une expression mathématique. — **MM. Henderson et Campbell**. *Action de la chlorhydrine chronique sur la nitrobenzine*. — **MM. Hiny Armstrong et W. P. Wynne**. *Etudes sur la constitution des dérivés tri-substitués de la naphthaline*. Les auteurs ont étudié précédemment les dérivés di-substitués de la naphthaline. Ils abordent aujourd'hui l'étude des dérivés tri-substitués en prenant comme composés types les trichloronaphthalines. Ils proposent pour les acides amido-disulfonés les schémas suivants : le nombre indiqué à côté de chaque schéma est le point de fusion de la trichloronaphthaline correspondante :



La trichloronaphthaline correspondant à ce dernier acide présente un cas de dimorphisme curieux. Récemment préparée elle fond à 65°. Une seconde fusion effectuée immédiatement après la première se produit à 56° et au bout d'un certain temps la transformation a disparu; on retrouve 65°.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance générale annuelle, 7 février 1890

La séance est consacrée à la discussion du mémoire « sur les galvanomètres » du **P^r W. E. Ayrton** et de **MM. Mather et E. Sumpner**, lu dans la dernière séance et que nous avons analysé précédemment. Un long tableau de nombres accompagnant le mémoire est présenté à la Société; il résume les résultats des expériences sur plusieurs galvanomètres. De ce tableau, il résulte que la sensibilité des galvanomètres du type d'Arsonval croît régulièrement avec le nombre de fils employés; on peut, par suite, en se servant de forts aimants permanents, obtenir de très bons résultats, à condition de disposer convenablement les fils. Parmi les galvanomètres, où des aimants font partie du système mobile, l'expérience prouve que les meilleurs sont ceux du type de Lord Rayleigh, de Gray ou de Rosenthal. Les fils doivent, dans ce cas, être très nombreux et très fins, comme l'a montré M. Boys. Une aiguille astatique tendant à se mettre perpendiculaire à la direction du champ magnétique terrestre, on doit toujours placer le galvanomètre dans une position telle que l'aiguille soit dirigée de l'est à l'ouest. Il faut calibrer les galvanomètres balistiques de faibles résistances par la mesure de la déviation produite par un courant connu; on évite ainsi la nécessité d'employer des grandes capacités ou des potentiels élevés. — **M. Boys** pense que le facteur de mérite d'un galvanomètre ne doit pas être défini par le nombre de divisions de l'échelle pour un micro-ampère avec la condition d'un moment constant. Il en résulterait un trop grand avantage pour les instruments du type de Gray et de Rosenthal; car l'on peut souvent augmenter la sensibilité d'autres appareils en diminuant le moment d'inertie de l'équipage mobile; il signale l'avantage résultant de l'emploi de fils d'araignée au lieu de fils de soie, et conteste l'utilité du mode proposé d'enroulement sur le cadre; il avait lui-même employé, pour avoir une grande sensibilité, des galvanomètres du type d'Arsonval, mais il y a renoncé à cause du diamagnétisme du cuivre et du trop grand amortissement dû aux courants de Foucault. — **M. Swinburne** pense que le facteur de mérite d'un galvanomètre doit être défini différemment suivant qu'il s'agit d'un instrument destiné à mesurer un courant, ou à servir d'appareil de réduction au zéro. Il désirerait que l'on déterminât de la même façon la sensibilité obtenue par l'emploi d'un téléphone ou d'un galvanomètre Lippmann. — Le **P^r Fitzgerald** rappelle que, suivant lord Rayleigh, l'emploi d'un microscope pour observer les déviations angulaires est aussi sensible que la méthode ordinaire du miroir et de l'échelle graduée à condition de n'employer le miroir que comme pointeur.

ACADÉMIE DES SCIENCES
DE SAINT-PÉTERSBOURG

Séance du 12 février 1890.

M. le Secrétaire perpétuel donne lecture de la suite de son rapport sur les travaux de 1889 : SCIENCES NATURELLES.

— Les travaux géologiques et paléontologiques de l'année 1889 se rapportent surtout à l'expédition envoyée par l'Académie au nord de la Sibérie et aux îles de la nouvelle Sibérie. La première publication des résultats scientifiques de cette expédition consiste dans le mémoire du **Baron de Tall** : « Les pétrifications paléozoïques de l'île Kotelný, de la Nouvelle

Sibérie. » **M. de Tall** montre que les couches dévonienues, qui se trouvent sur la côte de l'île Kotelný, se rapportent aux étages supérieurs du dévonien moyen, se relient aux mêmes couches du système dévonien de l'Oural et ressemblent beaucoup, quant à la faune, aux couches correspondantes de l'Amérique du Nord. D'où ce résultat que l'île Kotelný s'étendait, à l'époque de la transgression moyenne-dévonienne entre les larges bassins maritimes de l'Oural et de l'Amérique du Nord. — La collection des plantes tertiaires trouvées dans les « montagnes de bois » de la Nouvelle Sibérie, ont été étudiées par **M. Schmathausen** — **M. Rohon** a décrit les poissons des couches siluriennes, qui se trouvent dans le musée de l'Académie. — **M. Zagadka** a publié dans les *Zapiskys* ses recherches paléontologiques sur une nouvelle forme d'éponge marine. — **M. Maximovitch** a, par son étude des matériaux recueillis par Potanini, étendu nos connaissances de la flore de l'Ouest à la flore du Nord de la Chine. Grâce à ses trouvailles, la flore, qui était peu connue jusqu'à présent, promet maintenant de rivaliser par sa richesse avec celles de l'Inde et de l'Himalaya. — **M. Famintzin** a fait des recherches importantes sur la symbiose des algues avec certains animaux. Il a pu constater dans des cas spéciaux l'existence d'une vie psychique dans la plus simple forme des représentants de la vie animale; de même il a pu suivre la marche du développement et de l'alimentation des infusoires dans leur symbiose avec des algues. Le mémoire, dans lequel sont exposés ces intéressants résultats, est intitulé : Contribution à la symbiose des algues et des animaux. — Nos zoologistes se sont principalement occupés des collections apportées de l'Asie centrale par Przewalsky et de la publication d'une ornithologie complète de la Russie. — Dans les *Résultats scientifiques des voyages de Przewalsky dans l'Asie centrale*, **M. Buchner** a décrit les Rongeurs, **M. Plecke** les Oiseaux de chiant et **M. Herzstein** les Poissons. La publication des *Ornithographia Rossica* de **M. Pleske** avance avec rapidité. — **M. Tatchanovsky** a publié un mémoire sur les Oiseaux de la Sibérie orientale, où il décrit 400 espèces et indique la répartition géographique de chacune d'elles. — **M. Warpachovsky** a décrit les poissons du gouvernement de Nischny-Novgorod. — Dans le domaine de l'anatomie et de la physiologie ont été publiées diverses notes par **MM. Wedensky, Keller, Saint-Hilaire, Lavrovsky, Galawine, Feoktistov**.

Travaux de la séance. — **M. Wild** décrit un boussole d'inclinaison, se distinguant surtout par le mode de lecture de la position de l'aiguille magnétique, par la construction spéciale du support de cette aiguille, qui lui assure une plus grande stabilité, puis par la possibilité de faire soi-même toutes les corrections des différentes pièces de l'instrument pour chaque installation, et enfin par une pièce supplémentaire, sorte de pince qui permet de placer l'aiguille magnétique dans l'instrument sur son support, de l'y retirer et de l'aimanter sans la toucher avec les doigts. Pendant l'été passé, **M. Wild** a établi lui-même l'instrument à l'Observatoire de Pawlowsk; pour se convaincre de son usage facile et sûr, trois séries d'observations ont été faites par lui avec chacune des quatre aiguilles appartenant à l'instrument. Elles ont démontré que l'erreur moyenne d'une détermination de l'inclinaison n'est que $\pm 0,19$, c'est-à-dire la moitié de celle que nos meilleurs boussoles d'inclinaison ont permis d'atteindre jusqu'à présent. Pourtant, ce n'est que par des observations régulières pendant un intervalle de temps assez long qu'on pourra définitivement juger de la valeur du nouvel instrument. — **M. Offsiannikoff** lit un mémoire : Sur la structure des fibres nerveuses.

O. BACKLUND,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Séance du 1^{er} février 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Folie fait hommage de l'Annuaire de l'Observatoire pour 1890. Indépendamment des matières ordinaires, ce livre renferme quelques notices intéressantes. La première est consacrée à la biographie de notre regretté confrère Houzeau. La seconde notice relate les séances tenues par la Société astronomique à Bruxelles du 10 au 12 septembre, et ses visites au nouvel Observatoire à Nele, ainsi qu'à l'Institut astronomique de Cointe et aux établissements Cockerill à Seraing. « Dans la troisième, dit M. Folie, j'ai exposé les résultats, déduits par M. Niesten, de mes observations de Cointe, quant aux constantes de la nutation diurne, et, par M. Bijl, des observations des circompolaires à Poulkova, quant aux constantes de la nutation initiale, au moyen de formules implicitement contenues dans celles de Laplace, mais qu'aucun astronome n'avait encore songé à utiliser dans des observations faites à 42 heures sidérales d'intervalle. La constante de cette dernière nutation est tellement faible, du reste, comme l'avait déjà affirmé Laplace, que l'on peut en faire abstraction complète dans les réductions de presque toutes les observations. C'est ce qu'a fait M. Niesten dans ses calculs, dont les résultats ne pourront guère être modifiés par l'introduction de la nutation initiale. Ces résultats sont :

Constante de la nutation diurne $0^{\circ}.1634 \pm 0,0026$
 Longitude du 1^{er} méridien $7^{\circ}49'43'' \pm 43''$ E de Paris.

« La faiblesse des erreurs probables est une preuve convaincante de la réalité de ce petit mouvement de l'axe de la croûte terrestre, et, par suite, de la fluidité au moins superficielle du noyau du globe. Qu'il me soit permis de rappeler ici, pour établir d'une manière incontestable le caractère diurne de ce mouvement de l'axe de la croûte terrestre, les résultats, déduits il y a un an par M. Niesten, de mes premières observations de Cointe. Les deux dernières colonnes ci-dessous donnent la constante de la nutation diurne et la longitude du premier méridien qui résultent des seules observations consignées sur la même ligne horizontale :

2 observations de t et Q,	26 septembre 1888	$0^{\circ}.19$	$9^{\circ}43'$
$\frac{1}{4}$ —	P	2 décembre	$0^{\circ}.43$ 11.26
2 —	P et Q	$\frac{1}{4}$ »	$0^{\circ}.46$ 8.23
2 —	P et Q	7 »	$0^{\circ}.20$ 10.37


« Une autre preuve, peut-être plus frappante, dont j'ai déjà eu l'honneur d'entretenir l'Académie, est celle que j'ai tirée des azimuts de la lunette méridienne de Strasbourg. On n'a pas tenu compte, dans leur détermination, de la nutation diurne. Or, en admettant que la lunette était exactement installée dans le méridien, et que les azimuts déterminés proviennent simplement de la négligence de la nutation diurne dans la réduction des observations, j'ai pu déterminer les constantes de cette nutation, et j'ai trouvé :

$$N_d = 0,099$$

L. — $125^{\circ} 33,5$ à l'E. de Strasbourg,

« valeurs qui s'écartent peu de celles que M. Niesten a déduites de mes observations de Cointe. » — Le même auteur fait ensuite hommage de sa note intitulée : *Preuve inattendue de la nutation diurne*, insérée dans les *astronomische Nachrichten*, n^o 2,948 (1).

A l'occasion de ces présentations, M. Folie expose l'histoire de la question. Il rappelle qu'en 1882, il s'était demandé si, dans l'hypothèse où la terre serait constituée par une croûte solide reposant sur un noyau fluide, au moins superficiellement, il n'existerait pas une nutation diurne de l'axe terrestre, née jusqu'alors par les astronomes ; et il donnait, en 1884, la théorie de cette nutation ; bientôt après, il en démontrait l'existence et en déterminait approximativement la grandeur. Mais, en même temps, se présentait une question fort délicate : la précession des équinoxes et la nutation annuelle, telles qu'elles ont été déterminées par les astronomes, concordent fort bien avec la théorie que Laplace et ses successeurs en ont donnée dans l'hypothèse d'une terre entièrement solide. S'ensuit-il que la croûte doit suivre le noyau dans ces deux mouvements ? Puisque la nutation diurne existe pour la croûte et non pas pour le noyau, la croûte doit glisser sur lui dans ce dernier mouvement. Une telle conséquence était-elle compatible avec les lois de la dynamique ? M. Ronkar s'occupa de la question, et démontra ce beau théorème de mécanique générale, applicable aux mouvements périodiques d'un système de points matériels, dans lesquels on tient compte de leurs réactions mutuelles : 1^o Dans les mouvements à courte période, le mouvement de l'écorce solide est indépendant des réactions du noyau fluide ; 2^o Dans les mouvements à longue période, le mouvement de l'écorce et celui du noyau s'effectuent comme si les deux masses étaient solidaires. Il continua d'étudier la question au point de vue plus spécial du mouvement de la croûte solide du globe sur son noyau, et M. Folie présenta à l'Académie, dans sa séance annuelle du 16 décembre dernier, un travail dans lequel M. Ronkar, appliquant les deux lois mathématiques ci-dessus au noyau et à l'écorce du globe, montre que, dans la précession, ces deux corps sont absolument solidaires, quel que faible que soit leur frottement mutuel, qu'il en est bien probablement de même quant à la nutation annuelle, tandis que, dans la nutation diurne, le mouvement de l'écorce est absolument indépendant de celui du noyau. — Le général Liagre critique ces conclusions : La note de M. Ronkar prend, selon lui, pour point de départ l'hypothèse de l'existence de ce *microbe* que M. Folie appelle la nutation diurne, mais dont la vitalité semble loin d'être démontrée. Non seulement le travail de M. Ronkar est fondé sur cette hypothèse ; mais, de plus, pour étudier le frottement de la croûte solide sur le noyau du globe, M. Ronkar admet deux hypothèses qui vont précisément à l'encontre des deux lois suivantes établies par le général Morin : 1^o Le frottement est indépendant de la vitesse ; 2^o sa grandeur est indépendante de l'étendue des surfaces de contact. Or, M. Ronkar suppose le frottement proportionnel à la vitesse et à l'étendue de la surface de contact. Mais, en admettant même que ses calculs soient exacts, ils ne prouvent nullement que l'écorce peut glisser sur le noyau. La surface de l'écorce n'est pas lisse ; elle est hérissée d'aspérités qui doivent empêcher son glissement sur le noyau. On sait qu'il y a des montagnes de plus de 8,000 mètres d'altitude, et que le fond de certaines mers est à des profondeurs au moins aussi grandes. De plus, comme l'a dit M. Faye dans l'Annuaire du Bureau des longitudes, et M. Folie est même parti de cette opinion pour établir la position de son premier méridien, l'écorce solide du globe doit être plus épaisse sous les mers que sous les continents. Voici donc, ajouté-t-il, en faisant au tableau la figure reproduite ci contre, quelle est la forme de la croûte terrestre. Qui ne voit qu'avec des aspérités et des creux semblables, la croûte doit nécessairement suivre le noyau fluide dans tous les mouvements de celui-ci ? Or, M. Ronkar trouve qu'elle glisse sur le noyau dans les mouvements à courte période (nutation



(1) Voyez la présente Revue, page 117.

diurne), tandis qu'elle est entraînée avec lui dans les mouvements à longue période (précession des équinoxes et nutation annuelle). « Je serais, ajoute M. Liagre plutôt tenté d'admettre, que dans ces derniers mouvements il peut y avoir une certaine indépendance entre le noyau et l'écorce, parce que les aspérités de celle-ci ont pu être usées à la longue. » — M. de la Vallée Poussin fait remarquer que la figure qu'a faite M. le général Liagre pour donner une idée du relief du globe ne répond nullement à celle que s'en font les géologues; pour ceux-ci, ce relief, tant au-dessus qu'au-dessous des mers, ne présente que des ondulations très douces, et l'on peut même dire qu'en tout point sa convexité est tournée vers l'extérieur, absolument, ajoute-t-il, comme la courbe annuelle que décrit la Lune autour du Soleil à toujours sa convexité tournée vers l'extérieur, malgré les sinuosités occasionnées par sa révolution mensuelle autour de la Terre (1); il estime donc qu'au point de vue géologique, il n'est pas possible de faire une objection sérieuse contre le glissement de la croûte solide du globe sur son noyau fluide. — M. Folie revient sur cette question en disant : « Tout en laissant à M. Ronkar le soin de répondre lui-même *in extenso*, je ferai observer d'abord que le *microbe* de la nutation diurne, dont le général nie l'existence, se porte assez bien, comme on a pu le voir par les notices dont je viens de faire hommage et par l'insertion en tête du n° 2948 des *Astron. Nachr.*, d'un article que j'ai carrément intitulé : *Preuve inattendue de la nutation diurne*. Les astronomes compétents qui sont à la tête de la rédaction des *Astron. Nachr.*, n'eussent certes pas inséré l'article s'ils partageaient la manière de voir du général, quant à l'existence de mon *microbe*. En second lieu, M. Ronkar n'est nullement parti de l'hypothèse de son existence. Il y a plus d'un an déjà, il démontrait un beau théorème de mécanique rationnelle sur les mouvements relatifs de deux systèmes de points matériels, dans lesquels on tient compte du frottement et des actions mutuelles. Il vient de l'appliquer au mouvement de l'écorce terrestre supposée capable de glisser sur la couche superficielle fluide du noyau intérieur. Cette application lui est-elle interdite? Le général Liagre, et c'est la seule critique mathématique qu'il adresse au travail de M. Ronkar, lui reproche d'admettre d'autres lois du frottement que celles qui ont été établies par le général Morin. Je le prie de croire que M. Ronkar, élève de Clausius, de Helmholtz et de Kirchhoff, les trois plus grands physiciens de l'Allemagne, connaît un peu mieux les lois du frottement qu'on ne les connaissait il y a cinquante ans; qu'au surplus, le général Morin n'a jamais étudié les lois du frottement qu'en mécanique appliquée, c'est-à-dire dans le cas de vitesses médiocres, et qu'il s'agit ici de vitesses autrement considérables. Quant à l'objection finale que le général Liagre prétend tirer contre la possibilité de la nutation diurne, des aspérités internes de la croûte solide du globe, j'ajouterais à la réponse qu'a déjà faite M. de la Vallée Poussin, que, les aspérités fussent-elles plus considérables qu'il n'est admis par les géologues, l'objection encore ne me gênerait nullement. » A ce sujet, M. Folie trace au tableau, au-dessous des aspérités dessinées par le général Liagre, un cercle concentrique à celui qui représente le niveau des mers, en disant : « Admettez que la croûte (qui a une épaisseur de 100 kilomètres au moins) se compose de toute la partie de la Terre supérieure au cercle que je viens de tracer. Ou verrez-vous encore des aspérités qui empêchent cette partie de glisser sur le noyau intérieur? Or, ajoute-t-il, M. Ronkar a précisément admis dans son travail que le frottement s'exerce entre l'écorce solide du globe et le

noyau intérieur, par l'intermédiaire d'une couche liquide interposée, et qu'il varie simplement en raison inverse de l'épaisseur de cette couche. Il m'a remis une note dans laquelle il justifie mathématiquement cette manière de voir. Je m'étais proposé de demander l'insertion de cette note, qui est le complément de celle de décembre, mais je prie l'Académie de désigner d'autres commissaires que moi pour examiner le nouveau travail de M. Ronkar. »

2^e SCIENCES PHYSIQUES. — M. Van der Mensbrugghe, professeur à l'Université de Gand, gendre de Plateau, et continuateur des célèbres travaux de ce savant, étudie la condensation de la vapeur d'eau dans les espaces capillaires. Il commence par rappeler un résultat théorique obtenu par Sir William Thomson, et consistant en ce qu'à une température donnée, la tension maxima de la vapeur est moindre près d'une surface concave que près d'une surface plane, et qu'ainsi la condensation de la vapeur s'opère plus aisément sur les corps dont la surface offre une infinité d'espaces capillaires concaves que sur les corps à surface unie. M. Van der Mensbrugghe s'est proposé de soumettre la théorie de l'illustre physicien anglais à des vérifications expérimentales; en attendant les résultats de ses recherches, il expose une série de faits auxquels, d'après lui, la formule de Sir W. Thomson est applicable. Il signale successivement la nature granuleuse de la surface des corps hygroscopiques, le dépôt inégal de l'humidité sur les vitres plus ou moins unies, l'effet destructeur de l'humidité sur le tulle et l'altération produite à la longue dans les rideaux d'appartements. Il insiste sur ce que les toiles peintes se détériorent bien plus sur la face postérieure que sur la face peinte et recouverte d'un vernis. La théorie indique qu'avant d'exposer des tableaux dans les musées, dans les églises, etc., il faudrait vernir la face postérieure préalablement séchée, et remplir ainsi tous les petits intervalles de la matière textile. De cette manière les tableaux pourraient braver les siècles, absolument comme les bandelettes qui entourent la tête des momies égyptiennes, et qui étaient imprégnées d'une substance résineuse. L'auteur cite encore les faits suivants : Une aiguille, piquée sur une pelote formée par une étoffe bourrée de son, se rouille bien plus sur la partie engagée dans la pelote qu'à la surface libre. Un ruban ou une cordelette, servant à suspendre des tableaux à des crochets en fer, se détériore lentement, mais d'une manière continue, aux points de contact avec le fer, et provoque ainsi des accidents qu'on peut éviter en empêchant avec soin tout contact de la cordelette avec le métal. A ces exemples se rattachent les productions de rouille observées au bout d'un certain temps à la surface d'un clou enfoncé partiellement dans un mur, dans du bois, du carton, etc., ou bien sur une lame de tôle recouverte en partie par un morceau de papier, ou encore d'un objet quelconque en fer non recouvert d'une couche grasse et conservé dans une enveloppe de coton, de laine, etc. — Le même auteur traite de la formation du *brouillard* et des *nuages*. D'après lui la présence de corpuscules solides est nécessaire à leur formation. La condensation produite autour de ces noyaux solides est due, selon lui, à la forme irrégulière, dentelée, ou poreuse de la surface des corpuscules flottant toujours et partout dans l'air. Comme vérification M. Van der Mensbrugghe rappelle la production des pluies torrentielles survenant parfois après les grandes éruptions volcaniques qui lancent dans l'atmosphère des quantités prodigieuses de cendres et de corpuscules emportées au loin, et propres à devenir des noyaux de condensation; c'est à la même cause qu'il attribue les *brouillards* si persistants observés à d'immenses distances du lieu de l'éruption et dont on a pu constater de frappants exemples dans plusieurs parties du monde après la terrible éruption volcanique du Krakatoa en 1883.

F. F.

Membre de l'Académie.

(1) Voir sur ce point le Profil terrestre de la zone comprise entre 31° et 65° de latitude Nord, à l'échelle de 1 millimètre. (Erd profil der Zone von 31° bis 65° N. Br., von F. Lingg, München, 1886.)

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 21 février

M. **Planck** expose les résultats de ses recherches sur le développement d'électricité et de chaleur dans un électrolyte. Ses calculs ont pour base la théorie de la dissociation électrolytique de M. Arrhenius et de la pression osmotique de M. J. van t'Hoff. Supposons que, dans un point de l'espace (x, y, z) se trouvent des ions positifs avec la pression osmotique : p, p', p'' etc., et la mobilité respective : μ, μ', μ'' etc., tandis que : q, q', q'' — respectivement v, v', v'' désignent les mêmes grandeurs pour les ions négatifs. Posons :

$$U = \mu p + \mu' p' + \mu'' p'' + \dots$$

$$V = v q + v' q' + v'' q'' + \dots$$

le potentiel de l'électricité étant égal à φ ; alors le nombre des ions qui traversent l'unité de surface, suivant la direction de la normale v , est :

$$N_v = - \left\{ \frac{\partial(u+V)}{\partial v} + \frac{\varepsilon}{R} (u-V) \frac{\partial \varphi}{\partial v} \right\};$$

puisque chaque ion transporte une quantité d'électricité = ε , le courant aura l'intensité :

$$I_v = - \varepsilon \left\{ \frac{\partial(u-V)}{\partial v} + \frac{\varepsilon}{R} (u+V) \frac{\partial \varphi}{\partial v} \right\}$$

équation à laquelle on peut donner la forme :

$$\frac{I_v}{\varepsilon^2 (u+V)} = - \frac{\partial \varphi}{\partial v} - \frac{R}{\varepsilon} \frac{\partial(u-V)}{\partial v} \frac{1}{u+V}$$

La force électro-motrice se compose donc de deux parties, l'une dépendant de la différence du potentiel, l'autre de la différence des pressions osmotiques. Dans ces formules R désigne une constante ne dépendant que de la température. La discussion des équations générales de l'hydrodynamique conduit à des résultats assez curieux. Indiquons-les seulement pour le cas spécial que le mouvement ne dépend que d'une des coordonnées (x) et qu'il n'y a qu'un électrolyte binaire au sein de la solution. Alors on a :

$$U = \mu p, \quad V = v q, \quad p = q$$

et la différence du potentiel est :

$$- \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{R}{\varepsilon} \left(\frac{\mu - v}{\mu + v} \right) \frac{\partial p}{\partial x} \frac{1}{p} - \frac{R}{\varepsilon^2} \frac{I}{\mu + v} \frac{1}{p}$$

ou si $I = 0$:

$$- \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{R}{\varepsilon} \left(\frac{\mu - v}{\mu + v} \right) \frac{\partial p}{\partial x} \frac{1}{p}$$

donc par intégration :

$$\varphi' - \varphi = \frac{R}{\varepsilon} \frac{\mu - v}{\mu + v} \log \frac{p}{p'}$$

C'est la formule trouvée déjà par Helmholtz et Nevus pour la force électro-motrice des courants de concentration. La vitesse de la diffusion se trouve égale à :

$$N = - \frac{\varepsilon \mu v}{\mu + v} \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\mu - v}{\mu + v} \frac{I}{\varepsilon}$$

et la quantité de chaleur développée pendant l'unité du temps :

$$W = R \frac{\varepsilon \mu v}{\mu + v} \left(\frac{dp'}{dx} - \frac{dp}{dx} \right) + \frac{R}{\varepsilon} \left(\frac{\mu - v}{\mu + v} \right) I \log \frac{p}{p'} \\ + \frac{R}{\varepsilon^2} \frac{1}{\mu + v} \int_x^\infty \frac{dx}{p} I^2$$

On a donc à distinguer, outre la chaleur de Joule, dépendant du carré de l'intensité du courant, une quantité de chaleur dépendant de la première puissance de l'intensité, et, ce qui est le résultat le plus intéressant, une troisième quantité de chaleur indépendante de l'intensité du courant et ne dépendant que de la différence des pressions osmotiques. — M. **Pringsheim** discute les résultats de quelques expériences, qu'il a exécutées dans le but de résoudre la question posée par M. Siemens, si les vapeurs dans les flammes luisent par suite de l'élévation de la température ou par suite des procès chimiques dans la flamme même. Dans ce but il a chauffé des vapeurs de sodium dans un tube en porcelaine fermé par des plaques en verre. Les vapeurs donnent un spectre d'émission et d'absorption, mais bien que l'échauffement soit fait dans une atmosphère d'azote, les réactions chimiques ne sont pas tout à fait exclues, la porcelaine étant attaquée par les vapeurs de sodium. Des expériences avec des flammes d'un mélange de sulfure de carbone et d'air atmosphérique, flammes qui se distinguent par une température très basse (150° environ), n'ont pas donné de résultats plus nets. La question est donc encore à résoudre. — M. **du Bois-Reymond** explique une expérience curieuse. Si l'on verse dans de l'eau saturée d'ozone goutte à goutte de l'eau de fontaine, chaque goutte s'illumine. Il attribue ce phénomène à l'oxydation de matières organiques contenues dans l'eau.

D^r HANS JAHN.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 6 février 1890

M. **Schmidt** adresse un mémoire « sur les changements de volume dans la dissolution des sels dans l'eau ». — Le secrétaire dépose un pli cacheté de M. **Richard Harkup**, dans lequel il décrit de nouveaux procédés de fabrication d'une poudre convenant pour toutes les armes de tir. — Le D^r **James Moser** envoie un travail intitulé : *Remarques sur la capacité d'induction et la conductibilité de l'espace vide*. Le D^r **Thomas Albarracín** présente six photographies microscopiques des principaux organes de l'oreille pour l'enseignement de l'audition. — Le D^r **Heinrich** adresse un mémoire intitulé : Sur un cas caractéristique de la transformation d'un épiderme et de son interprétation biologique. Voici les principales conclusions de ce travail : « L'épiderme interne de la capsule de l'*Adumia cirrhoza* est, au point de vue du développement, un épiderme, mais presque dans tous ses caractères distinctifs, il s'éloigne des épidermes ordinaires, même de l'épiderme interne bien connu des fruits; dans l'état de comp et développement, il est composé de cellules à parois épaisses et fibreuses, séparées par de vastes espaces intercellulaires, disposés en forme de réseaux qui peuvent renfermer une grande quantité d'eau. Cet épiderme interne du péricarpe de la plante considérée est en rapport de causalité avec la germination; en effet la germination des semences d'*Adumia* se produit à l'intérieur du fruit et l'épiderme métamorphosé du péricarpe sert à contenir une réserve d'eau nécessaire à la germination. — M. **Frédéric Becke** présente un mémoire « sur la cause de la tétraoédrie de la dolomite. M. Seligmann a découvert en Suisse un échantillon de dolomite et de magnésite cristallisées ensemble et affectant les

mêmes formes. D'après l'étude de ces cristaux, la magnésite paraît présenter une hémiedrie du système rhomboédrique. La forme asymétrique des figures d'érosion observée par Tschermak peut être interprétée par une déformation. Dans l'hypothèse développée dans ce travail, on est conduit aux relations suivantes :

Ca C²O⁶Ca hémiedrie du système rhomboédrique ;
Ca C²O⁶Mg tétrartoédrie du système rhomboédrique ;
Mg C²O⁶Mg hémiedrie du système rhomboédrique ;

On a une relation analogue pour le fer oligiste et le fer titané. Comme il y a un degré moindre de symétrie dans la molécule de dolomite magnésifère ou de fer titané, cela se traduit par la tétrartoédrie du cristal. — M. Schaffer adresse un travail intitulé « sur la coloration de la tétine humaine par l'acétate d'hématoxyline. »

Emil WEYR,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance du 16 février 1890.

I^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. **Volterra**, Sur une

extension de la théorie Jacobi-Hamilton relative au calcul des variations. — M. **Tonelli**. Sur la connexion des espaces.

2^o SCIENCES NATURELLES. — Sur un rapport de M. Guidi l'Académie décide d'insérer dans ses *Mémoires* un travail de M. **Lagumina**, qui a reproduit et illustré le *Livre de la Palme d'Abû Hâtîmas Sigistân*, dont le texte se trouve seulement dans un ancien manuscrit à Palerme. Ce travail, qui regarde la philologie et l'histoire littéraire, est très intéressant encore pour l'histoire naturelle, parce qu'il donne une description détaillée de tous les pays où l'on cultivait la palme au IX^e siècle lorsque la domination arabe s'étendait depuis la Chine jusqu'à l'Atlantique. — M. **Pigorini** décrit une nécropole découverte dans le lit du Taro, dans la province de Parme. Les tombes sont formées par des vases grossiers et mal cuits où l'on trouve seulement des restes carbonisés. Pour économiser l'espace, ces vases étaient superposés, et même on introduisait des vases plus petits dans les grands. La nécropole se trouve à une profondeur de 6^m 90; elle doit remonter à l'âge du bronze.

Ernesto MANCINI.

NOUVELLES

LES PERTURBATIONS DE MERCURE

ET LES LOIS ÉLECTRODYNAMIQUES DE GAUSS

La loi d'attraction de Newton est-elle la seule qui puisse rendre compte du mouvement des corps célestes? La question est des plus intéressantes. M. Tisserand vient à ce sujet de publier une note fort curieuse dans les *Comptes-rendus* du 17 février. Dès 1872, l'éminent astronome avait recherché ce qui arriverait si les astres de notre système planétaire étaient gouvernés par la loi proposée en électrodynamique par Weber (1); l'action exercée entre les masses en mouvement dépendrait alors à la fois, de la distance et de la vitesse.

Si l'on attribue au coefficient $h = \sqrt{\frac{2}{k}}$ de la formule

une valeur égale à la vitesse de la lumière, on trouve que la substitution de la loi de Weber à celle de Newton ne produit dans les éléments elliptiques des planètes que des changements insensibles; la longitude du périhélie fait exception: dans l'hypothèse de la loi de Weber, le grand axe de l'orbite de Mercure, par exemple, tournerait dans le sens direct de 14^m,4 en un siècle. Dans la note actuelle, M. Tisserand examine le résultat obtenu en remplaçant la loi newtonienne par la loi de Gauss; les conséquences sont les mêmes, mais le déplacement du périhélie pour un temps donné est sensiblement le double de ce qu'il est dans la loi de Weber; or, les recherches récentes de M. Newcomb prouvent qu'en réalité le périhélie de Mercure tourne de 38^m par siècle en plus des 527^m dues à l'attraction des planètes. Pour expliquer cet excédent, Le Verrier avait émis l'hypothèse d'une planète intra-mercurelle. Cette hypothèse est aujourd'hui reconnue peu plausible; il est très curieux de constater que la loi de Gauss explique les $\frac{2}{3}$ de l'excédent sans troubler les autres conséquences de la loi de Newton.

Doit-on conclure de cet accord que la loi de Gauss est celle qui régit réellement le système céleste? M. Tisserand ne le pense pas; la conclusion serait un peu hâtive, il faut l'avouer. Dans ses *Leçons sur l'électricité*, M. J. Bertrand a consacré un chapitre fort intéressant à l'étude des lois de Gauss et de Weber; il démontre que les deux formules doivent donner des résultats identiques si on les applique à des courants, mais il n'en

est plus de même si l'on considère deux particules libres; et dans ce cas, comme le remarquait fort justement M. Maurice Lévy dans son article du 30 janvier, la loi de Gauss est nettement contraire au principe de la conservation de l'énergie, et semble conduire au mouvement perpétuel.

D'autre part Clausius a montré que la formule de Gauss appliquée aux phénomènes d'électricité dynamique n'est pas compatible avec l'hypothèse où un courant électrique serait constitué par un seul courant d'électricité positive, par exemple, et non de deux courants égaux d'électricités contraires. Les expériences de M. Rowland établissent d'une façon certaine que le transport mécanique d'une seule charge d'électricité statique équivaut à un courant; la loi de Gauss, comme d'ailleurs celle de Weber, serait donc peu vraisemblable. Clausius (1) a proposé une formule d'accord avec le principe de la conservation de l'énergie, d'accord aussi avec les expériences de Rowland. Il serait peut-être intéressant d'examiner les conséquences de la loi de Clausius ou d'autres analogues dans cet ordre nouveau d'idées sur lequel M. Tisserand vient si heureusement d'attirer l'attention des astronomes.

LUCIEN POINCARÉ.


EXPÉRIENCES DE M. LODGE

SUR LA RÉSONNANCE ÉLECTRIQUE

Le professeur Oliver J. Lodge, de Liverpool, vient de publier dans le journal anglais *Nature* (20 février), une expérience d'un grand intérêt sur le débordement d'une bouteille de Leyde B, provoqué par la décharge d'une bouteille voisine A.

A l'armature externe de celle-ci on adapte un fil de fer courbé en arc, lequel se termine en boule à son extrémité libre.

Cette boule doit se trouver tout près du bouton de l'armature interne de l'autre bouteille. Au moyen d'un arc analogue on relie les deux armatures



(1) Voir sur cette loi l'article de M. Maurice Lévy, p. 39 de la *Revue*.

(1) Die mechanische Behandlung der Electricität. Braunschweig, 1879.

de la bouteille B. On munit en outre l'armature externe d'un fil C, dépourvu de self-induction, qui, fixé en dedans, vient retomber au dehors en passant par-dessus le bord de la bouteille; ce fil est destiné à permettre à l'écoulement de s'effectuer.

Si les deux circuits sont en face l'un de l'autre, à distance convenable, et que le curseur S soit bien placé, toute décharge de A fera déborder B. Un très léger déplacement du curseur S suffit pour empêcher le phénomène de se produire.

« Il y a, dit M. Lodge, peu ou point d'avantage à recourir à de longues étincelles primaires; les vibrations sont plus régulières et mieux définies avec les étincelles courtes. Inutile de remarquer, ajoute-t-il, que les deux bouteilles constituent respectivement un excitateur et un résonnateur de Hertz: mais la grande précision avec laquelle elles fonctionnent au même moment est plus utile avec ces grandes capacités qu'avec de simples sphères ou disques, parce que l'onde se prolonge davantage et qu'il y a plus de vibrations qui se superposent. La résonnance obtenue avec de courtes étincelles primaires se distingue mieux de l'effet d'une onde unique. Les étincelles sont encore assez brillantes pour qu'un nombreux auditoire les aperçoive facilement. » L. O.

UNE NOUVELLE PLANTE RÉVIVISCENTE

On sait, depuis longtemps, qu'un certain nombre d'êtres vivants peuvent passer un temps plus ou moins long de leur existence dans un état de vie tellement ralentie, que les manifestations vitales extérieures ont complètement disparu. Ainsi, quand l'eau vient à manquer à certains Infusoires, tels que les Kolpodes, à des Rotifères, des Tardigrades, des Vers, ils se rétractent, se raccourcissent, se dessèchent, et peuvent rester plusieurs mois à l'état de vie ralentie; mais si on les humecte de quelques gouttes d'eau, ils sortent de leur sommeil léthargique, et reprennent toute leur vitalité. C'est ainsi que Claude Bernard a vu des Anguilles revenir à la vie après avoir été conservées pendant quatre années dans un flacon très sec et bien bouché.

Dans le règne végétal on observe des phénomènes analogues; ils sont fréquents chez les Algues, mais beaucoup plus rares chez les plantes élevées en organisation.

Cette curieuse propriété de la réviviscence a pourtant été constatée en 1863 par MM. Bureau et Paul Bert sur un certain nombre de Cryptogames vasculaires, mais



Fig. 1. — *Polypodium incanum* à l'état sec.

l'on ne connaît jusqu'ici aucune phanérogame douée de cette faculté.

Dans la séance de l'Académie des Sciences du 17 février, M. Bureau a présenté une fougère de l'Amérique du Nord, le *Polypodium incanum* Pluck., très semblable à première vue au *Polypodium* qui pousse dans nos pays sur les murs et les troncs d'arbres. Les exemplaires que l'auteur a étudiés, récoltés l'été dernier, lui étaient parvenus à l'état sec; avant d'essayer leur réviviscence, il les a chauffés pour leur faire perdre une plus grande quantité d'eau. Ainsi, l'un d'eux qui, sec, pesait 8 gr. 5, fut chauffé pendant 10 jours et graduellement jusqu'à 55°, et perdit environ 6 gr. 7; il était alors gris, tout recroquevillé, très cassant et absorbait très facilement l'humidité. En le plongeant dans l'eau, M. Bureau l'a vu se détendre peu à peu, et au bout de 36 heures, les feuilles s'étaient étalées, avaient repris leur forme normale et leur couleur verte, et la plante était capable de vivre de nouveau comme si elle n'avait subi aucun changement. L'expérience peut d'ailleurs être renouvelée sur le même exemplaire; l'auteur a reconnu qu'elle réussit d'autant mieux que la plante est plus jeune, la réviviscence se faisant alors plus rapidement.



Fig. 2. — *Polypodium incanum* revenu à l'état normal.

Ces faits si intéressants de réviviscence ne doivent pas être confondus avec les propriétés hygroscopiques d'un certain nombre de plantes, et bien connues surtout chez une petite crucifère annuelle, la rose de Jéricho (*Anastatica hieracifolia*), qui, après avoir été desséchée, reprend dans l'eau sa forme première; mais cette plante se comporte alors comme une éponge; et son changement de forme tient simplement à ce que les cellules à parois cellulósiques de la face interne des branches perdent ou absorbent l'eau plus facilement que les cellules lignifiées de la face externe. L'intérêt du fait que M. Bureau vient de signaler réside tout au contraire dans la constatation d'une véritable réviviscence chez une plante d'organisation relativement élevée.

C. SAUVAGEAU.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LES MACHINES A VAPEUR ET LEURS PROGRÈS

A l'époque où Watt fut amené à étudier la machine de Newcomen, celle-ci, poussée à ses derniers perfectionnements par Smeaton, consommait une centaine de kgs. de vapeur par cheval-heure. Environ 99 % de la chaleur convoyée dans le cylindre par la vapeur servaient à réchauffer les parois métalliques de cet organe que l'eau de condensation refroidissait aussitôt après; il n'en restait pas 1 % pour faire le travail extérieur, la seule chose cherchée, utile au but que se propose l'homme dans l'emploi de la machine.

Watt réduisit à moins d'une vingtaine de kgs la consommation pratique par cheval-heure. Aujourd'hui, cent ans après les premiers succès de ce savant physicien, nos machines les plus perfectionnées arrivent à six kgs. environ dans des essais d'une assez courte durée; mais probablement, en marche courante, la consommation est plus élevée.

Tel est le progrès réalisé en un siècle par le concours de tant de savants physiciens et mécaniciens, tant de constructeurs, d'ingénieurs, d'hommes pratiques, sur une machine maintenant employée dans toutes les contrées du monde, devenue familière au moindre des êtres pensants et qui a centuplé les forces de l'humanité. Est-il arrêté? S'il reste un pas à faire en avant, dans quelle voie, désormais, semble nous mener l'histoire du passé? Les moyens d'économiser la vapeur sont-ils épuisés? Ont-ils tous été pratiquement assez éprouvés? Le dernier mot de la perfection est-il dit? Telles sont les questions que nous allons essayer de résoudre.

L'histoire de la machine à vapeur présente un fait singulier et remarquable. Dans la recherche des moyens d'économiser la vapeur, nous sommes revenus, après de longues et nombreuses pérégrinations, au point de départ même, au premier principe qui a guidé Watt dans ses admirables inventions : diminuer l'action fâcheuse des parois métalliques des cylindres. Il n'avait pas d'autre but quand il a posé comme règle qu'il fallait envelopper le cylindre d'une chemise de vapeur, et opérer la condensation dans un vase à part. Dans la machine à feu de Newcomen, à chaque double pulsation du piston, le métal du cylindre venait en contact une fois avec un jet d'eau aussi froide que possible, une fois avec de la vapeur à environ 100°; naturellement, une notable partie de cette vapeur se condensait, puis était expulsée sans avoir produit aucun effet utile. C'est à cette perte considérable que Watt apporta un remède efficace. On crut, ou l'on paraît tout au moins avoir cru que le mal avait complètement disparu; il n'en fut plus question qu'environ un demi-siècle après. Alors, plusieurs savants et expérimentateurs commencèrent à s'en préoccuper, jusqu'à ce que Hirn en fit une question de théorie, une question fondamentale. Mais y a-t-il bien quinze ans que les ingénieurs en font sérieusement état? Ce n'est en fait que dans ces toutes dernières années que l'action des parois métalliques des cylindres est devenue l'objet d'études multiples, expérimentales et théoriques. Le Logelbach était français quand Hirn y a exécuté ses premiers essais qui ont fait école, et c'est en France qu'il a tout d'abord

été suivi par des chercheurs malheureusement isolés. En Amérique, M. Isherwood a été aussi longtemps seul à y travailler, et M. Clarke en Angleterre; mais c'est surtout dans ces deux pays que s'est produit le mouvement le plus puissant parmi les ingénieurs et les constructeurs pour débrouiller ce que l'action des parois des cylindres a de vague et d'obscur, et chercher les moyens de l'annuler ou tout au moins de l'atténuer (1).

On retrouve en tout son influence : elle modifie le degré de détente le plus favorable, la perte due à l'espace mort, le degré de compression le plus économique. Elle est la seule raison d'être de l'économie procurée par l'enveloppe, par les grandes vitesses, par la détente dans des cylindres multiples. Sans admettre l'action des parois on ne parviendrait pas à expliquer l'influence de la vitesse. Pourquoi donc est-on resté presque un demi-siècle sans prêter aucune attention à un phénomène dont l'importance n'échappe plus à personne aujourd'hui ?

I

Les préoccupations du commencement du siècle étaient d'une autre nature : introduire partout la machine à vapeur, l'approprier à toutes sortes de besoins industriels, la substituer aux agents alors connus, le vent, l'eau, la force musculaire des animaux ; chercher les meilleures formes, les plus rationnelles, les plus élégantes. C'est une période

(1) Nous avons publié en 1878, 1879 et 1880 dans la *Revue universelle des Mines*, etc. (à Liège et à Paris), un historique détaillé des travaux de Hirn et de ceux qui s'étaient occupés de la même question. Autant que possible, nous avons fourni les pièces à l'appui de nos dires, surtout quand il s'agissait de déterminer avec précision ce qui appartenait à chacun parmi les diverses découvertes mentionnées. Il nous manquait alors un document d'une grande importance, dont l'existence n'a été révélée qu'en l'année 1889 par M. A. Madamet, directeur de l'Ecole d'application du Génie maritime, dans son savant traité de Thermodynamique. C'est un extrait de deux rapports de M. Reech, faits en 1850 sur des essais d'une machine à vapeur d'eau et à vapeur de chloroforme de M. Lafont. L'influence des parois y est signalée et décrite avec la plus grande clarté et expérimentalement démontrée ou plutôt découverte. Toute une théorie nouvelle est renfermée dans cette seule phrase, page 212 : « ... la quantité de calorique cédée initialement par la vapeur condensée pendant la durée de l'introduction et le commencement de la détente, se retrouvera intégralement « dans la somme des deux quantités de calorique dont l'une « se perdra par le refroidissement extérieur du système et « dont l'autre sera rendue par les parois intérieures du système à la vapeur sortante... » Et la délibération du Conseil des Travaux de la Marine renferme cette autre phrase d'une grande portée : Ces expériences « sont le point de départ d'une théorie nouvelle sur la machine à vapeur ordinaire. » Nous ignorons si l'on peut trouver la trace des progrès qui seraient partis du remarquable travail de Reech, qui a précédé de cinq ans la publication première de Hirn; nous ne l'avions nulle part rencontrée dans nos recherches, il y a quelque douze ans, et nous savons que Hirn n'en avait aucune connaissance.

de sélection dans la construction, où à la routine se substituent des règles raisonnées et bien fondées pour proportionner les cylindres, les volants, les régulateurs, pour économiser les métaux, perfectionner l'exécution.

Ce n'est guère que vers 1840 que la question du système de distribution devient une question d'économie en même temps que de régularité. Alors viennent les raffinements; les moyens d'économiser le charbon prennent une grande place parmi les préoccupations des ingénieurs. On commence à demander des lumières à l'expérience; le frein de Prony et l'indicateur de pression sont de mieux en mieux appréciés; M. de Pambour cherche le degré de détente le plus économique. Mais le grand progrès dans ce sens ne devait dater que du jour où M. Richards livra aux praticiens un indicateur portatif, petit, commode à placer, facile à manier, admirablement exécuté et dont les inscriptions méritaient confiance pour les moyennes vitesses généralement admises alors.

Mais la science expérimentale est presque stérile si elle n'est pas vivifiée par les rayons brillants de la théorie. Celle-ci est l'outil indispensable du progrès. Un de ces génies dont les siècles sont avarés, Sadi Carnot, posa la pierre fondamentale de la théorie des moteurs thermiques, en démontrant que pour eux, comme pour les roues hydrauliques, il existe un maximum de travail à retirer d'une chute de température donnée avec une dépense donnée de chaleur; qu'il existe un moteur thermique idéal, parfait, tout comme un moteur hydraulique parfait. La connaissance de ce dernier a donné la marche à suivre pour perfectionner nos récepteurs réels; les progrès de la machine à vapeur désormais pouvaient être puisés à la même source. Mais Carnot (1824) devança trop son siècle; l'heure n'était pas venue pour les ingénieurs de le comprendre. Il avait apporté la lumière au monde, mais le monde ne l'a point connue jusqu'au moment où Rankine en Angleterre et Clausius en Allemagne fondèrent définitivement la science de la thermodynamique (1847) dont les développements ultérieurs furent extraordinairement rapides.

L'équivalence des deux formes de l'énergie, travail mécanique et chaleur, avait bien été soupçonnée par Carnot, mais on ne le sut que dans ces derniers temps, et ses notes manuscrites à ce sujet sont restées stériles pour l'avancement de la théorie nouvelle. Ce principe expérimental, on le sait, a été acquis à la science par les travaux de Rumford (1796) et surtout de Joule et de Mayer (1843 et 1842). En l'associant au principe de Carnot, Clausius et Rankine, indépendamment l'un de l'autre, en composèrent un système complet,

monument scientifique le plus grandiose qu'ait élevé notre siècle. Rankine s'attacha particulièrement aux applications à la machine à vapeur et aux moteurs thermiques en général. Le premier, croyons-nous, il a cherché à déterminer le rendement thermique, en comparant le travail obtenu par les machines réelles avec celui que donnerait pour une même dépense une machine parfaite, celle de Carnot. Malheureusement son attention n'avait pas été attirée sur l'importance de l'action thermique des parois et la grandeur de son influence sur le rendement. Peut-être ne l'a-t-il pas soupçonnée; Clausius n'y croyait pas. Il y avait bien des travaux à faire, bien des éléments à déterminer avant d'évaluer avec quelque exactitude la chaleur perdue par l'action des parois et l'efficacité des moyens employés pour la diminuer. A ce point de vue Regnault a rendu les plus grands services à la science des machines à vapeur. Car il ne suffisait pas d'avoir le chiffre exact de l'équivalent mécanique de la calorie, il fallait aussi notamment une table exacte des données relatives à la vapeur saturée, avec le poids du mètre cube et les chaleurs interne et totale du kilogramme. Mesurer la quantité de chaleur qui de la chaudière allait directement dans le condenseur, après s'être attardée quelque temps dans le métal du cylindre, n'était guère possible et n'a pas été fait avant 1855, époque où Hirn entre en scène. Ce qu'il apporte est nouveau, et marque l'origine d'une ère nouvelle dans la science des machines à vapeur, celle de l'expérience. A partir de là toutes les idées relatives à la vapeur vont passer au creuset d'épreuve. La loi de Mariotte et ses congénères ont vécu. Hirn veut savoir ce qui est, et non pas proposer quelque chose qui pourrait être. Il trouve absurde l'idée généralement admise alors que le cylindre est un réservoir purement géométrique, ayant perdu ses propriétés physiques; c'est bien du métal et quand il est froid et en contact avec de la vapeur chaude, il condense une partie de celle-ci jusqu'à ce qu'il ait pris la température de la vapeur; et s'il est chaud et recouvert d'une couche d'eau saturée, si la pression devient inférieure à celle de saturation de cette eau, la chaleur du métal fait bouillir l'eau et la vaporise jusqu'à ce que le métal et l'eau qui le recouvre aient pris la température correspondante à la nouvelle pression. C'est la chaleur fournie au métal par la vapeur condensée ou soustraite au métal par l'eau qui s'évapore, qui doit être évaluée. Or aucune *théorie* ne pourrait la faire et l'expérience seule en montrera l'importance. Mais dans ce but l'expérience doit être faite d'une certaine façon. Il faut pouvoir suivre les calories sans les perdre de vue depuis leur exode de la chaudière jusqu'à leur consommation dans le condenseur, et,

dans ce but, tout mesurer, le poids et la pression de la vapeur sortant de la chaudière et le poids de l'eau entraînée, le poids de l'eau de condensation et ses températures à l'entrée et à la sortie, le travail indiqué, la chaleur rayonnée, la chaleur fournie par l'enveloppe, etc. Il faut mettre la machine en régime, et dresser le bilan de l'essai : le nombre de calories amenées par la vapeur dans le cylindre est égal à la somme de trois autres : de celles qui ont été perdues par rayonnement extérieur; de celles qui sont passées au condenseur avec la vapeur; de celles enfin que le travail extérieur a consommées. Voilà ce que le physicien de Colmar a apporté de nouveau et qui s'est imposé à tous les chercheurs. Tous ceux qui aujourd'hui dressent le bilan de leurs essais ne font qu'imiter Hirn et appliquer sa théorie. Mais il fallait quelque chose de plus, c'était distinguer des autres les calories perdues *par l'action des parois*. Toutes les calories perdues, à part le rayonnement extérieur, se retrouvent dans le condenseur. Elles sont entrées dans le métal pendant l'admission; une partie en est sortie utilement pendant la détente, une autre, en pure perte pendant l'émission, allant droit au condenseur, et laissant refroidir le métal du cylindre. La *théorie pratique* de Hirn, aujourd'hui partout admise, était plus qu'en germe dans le mémoire de 1855; on l'y trouve dans ses bases essentielles. On peut la résumer en peu de mots, et en une équation :

La chaleur apportée dans le cylindre se décompose en trois parties : 1^{re} celle que le travail extérieur a consommée; 2^e celle qui a été perdue par l'influence des parois; 3^e celle qui a été autrement perdue. Dans la seconde partie se trouve le rayonnement extérieur; dans la troisième, toutes les ruptures du cycle, etc.

L'intervention de Hirn, dans cet ordre d'idées, avait été précédée ou accompagnée par celle d'autres ingénieurs qui travaillaient indépendamment; mais à une seule exception près, que nous avons déjà signalée, il ne s'y trouve rien qui approche d'une méthode d'essai et d'une théorie expérimentale du genre de celles du savant français. Les condensations et évaporations dans le cylindre avaient été signalées et admirablement décrites par Combes (1843, 1845); enseignées dans ses cours par Thomas (1850); plus pratiquement déterminées par Lechatellier, Flachet, Petiet, Polonceau (1851); expérimentalement étudiées et discutées par D. K. Clark en Angleterre qui chercha entre autres choses l'influence de la détente sur les condensations (1851-55). M. Reech en France (1850) est celui dont les travaux se rapprochent le plus de ceux de Hirn; mais ils ne sont guère connus que depuis qu'ils ont été exhumés par M. Madamet, 1889. En Amérique, M. Isherwood commence en 1860 la publication d'archives de la

plus-haute importance où l'influence des parois a sa large part. Ses essais sont les plus nombreux et les plus méthodiquement faits pour rencontrer les cas généraux qui peuvent se présenter. Son œuvre s'est poursuivie et développée sans relâche jusqu'aujourd'hui. Et si, dans peu de temps, on arrive à prédire la consommation d'une machine en projet, ses travaux auront contribué sans aucun doute à obtenir ce résultat.

L'œuvre de Hirn resta vingt ans sans recevoir d'autres développements que ceux du maître et de quelques disciples immédiats. Mais depuis quinze ans environ l'armée des chercheurs est devenue innombrable; à leur insu ou non ils suivent tous sa méthode avec ou sans variante. On remarque la participation intéressée de constructeurs intelligents et désireux de bien faire, avec celle désintéressée des professeurs dans leurs laboratoires, aidés de leurs élèves avides de vérité. Depuis le mouvement créé il y a dix ans environ par le professeur Kennedy, suivi par le professeur Unwin, l'Angleterre a enrichi toutes ses écoles de laboratoires de mécanique d'où l'on a déjà vu sortir de remarquables travaux. (Professeur Reynolds de Manchester.) Le superbe laboratoire du Sibley Collège à Ithaque (États-Unis), dirigé par M. Thurston, a déjà rendu les plus grands services à la science et à la pratique. Dans ce petit nombre d'années, hypothèses, opinions préconçues sont tombées comme capucins de cartes; les illusions se sont évanouies et ont fait place à de substantielles réalités. Dès maintenant on prévoit le moment où tant de lumières jetées sur la question conduiront à sa solution complète et définitive. Il sera venu quand on connaîtra avec précision le mode et la grandeur de l'influence des divers facteurs qui interviennent dans l'action mécanique de la chaleur exercée par le moyen des machines à vapeur.

Pour nous résumer, le dernier mot n'est pas dit, puisque le constructeur ne saurait déterminer avec certitude quelle sera la consommation d'une machine dont il n'existe que le projet. Mais la voie est tracée et le résultat certain, parce que sur la route du progrès, vivement éclairée par les travaux déjà faits, se presse une multitude d'ingénieurs et de professeurs ardents à la recherche de la vérité et pourvus des moyens pratiques de la découvrir.

II

Quel sera le résultat final? et où s'arrêtera l'économie? Il convient de répondre à cette question avant de parler des moyens mis en œuvre pour économiser. Car le résultat ne saurait ni dépasser ni même atteindre celui que donnerait une machine à vapeur fonctionnant suivant le cycle de Carnot. Voyons donc d'abord quel serait celui-ci pour une

machine où le véhicule de la chaleur serait un certain poids, par exemple un. kg, de vapeur d'eau.

La machine se compose d'un cylindre et d'un piston mobile, par le moyen duquel agit une résistance que l'on peut faire varier à volonté suivant les besoins. Entre les parois du cylindre, le fond et le piston, se trouve emprisonné un kg. de vapeur d'eau qui reçoit l'action de la force naturelle appelée chaleur et lui sert de véhicule pour faire du travail extérieur contre la résistance. Cette eau ou mélange d'eau et de vapeur va s'échauffant, se vaporisant, se refroidissant, se condensant alternativement. Tantôt elle reçoit de la chaleur d'une source inépuisable maintenue à la température absolue constante T ; tantôt elle est comprimée par le piston, ce qui est une autre façon de recevoir de la chaleur. Ou bien elle perd de la chaleur en la cédant à un corps froid maintenu à la température absolue constante T' , ou encore en faisant du travail extérieur contre la résistance opposée par le piston. La vapeur subit ainsi, sans sortir du cylindre, une série d'opérations thermiques à la suite desquelles elle est ramenée à son état primitif; c'est ce que l'on appelle un *cycle fermé* d'opérations. La somme des quantités de chaleur reçues et rendues sous n'importe quelle forme, par la vapeur qui subit un cycle fermé d'opérations est nécessairement égale à zéro, bien entendu lorsqu'il n'intervient aucun phénomène électrique ou chimique.

Mais il ne suffit pas que le cycle soit fermé pour être parfait. Il faut en outre que : 1^o la résistance du piston soit à chaque instant égale à la tension de la vapeur; 2^o que la température des parois qui enferment la vapeur soit constamment égale à celle même de la vapeur.

Le moteur hydraulique parfait est aussi caractérisé par deux conditions semblables, mais beaucoup plus faciles à réaliser. Il faut qu'à chaque instant la résistance de la roue soit égale à la pression due au poids de l'eau; il faut en outre éviter toutes les fuites prématurées, toutes les pertes d'eau qui pourraient se produire en route. La roue Sagebien réalise de très près les conditions du maximum.

Le cycle de Carnot est complété en quatre opérations, dont deux *isothermales* ou à température constante, une fois à la température T de la source de chaleur, une fois à la température T' du corps froid; et deux *adiabatiques*, c'est-à-dire sans recevoir ni perdre de chaleur, une fois la température tombant par détente de T à T' , une fois la compression élevant la température de T' à T . Pour fixer les idées et même asseoir certains arguments, nous prendrons comme température du corps

chaud, celle qui correspond à 6 atmosphères de pression pour la vapeur saturée, soit $159^{\circ}2$ c. ou $273 + 159.2 = 432^{\circ}2 = T$; et pour le corps froid 15° ou $273 + 15 = 288^{\circ} = T'$. A cette dernière température la pression de la vapeur saturée est $P' = 172.7$ kgs. par mètre carré. A la température T correspond la pression $P = 62,000$ kgs. par mètre carré.

La figure ci-dessous aidera à faire comprendre les explications, mais elle n'est pas faite à l'échelle, autrement le volume après la détente adiabatique serait égal à 193 fois le volume avant la détente, c'est-à-dire au point D. Si la figure respectait ces proportions, elle serait absolument inintelligible.




Fig. 1.

Au départ le kilogramme de fluide dans le cylindre se trouve à l'état A; c'est de l'eau pure à la température T et à la pression de saturation P exercée par le piston. On le met en contact avec la source de chaleur en laissant le piston se soulever lentement; l'eau se vaporise à température constante et on arrête l'opération quand il ne reste plus de liquide, état D. Pendant cette première opération *isothermale*, le fluide a reçu Q calories de la source et a fait un travail extérieur équivalent à $\bar{C}_a$ calories et représenté dans la figure par la surface $aADa$.

Deuxième opération DE. On laisse détendre la vapeur sans lui fournir et sans lui soustraire de chaleur en diminuant progressivement la pression du piston; sa chaleur interne diminue d'une quantité équivalente au travail extérieur effectué. Sa température baisse également et il y a condensation partielle. On arrête l'opération quand la température est devenue T' et l'état E. Travail effectué $\bar{C}_e = dDEd$.

Troisième opération. La vapeur étant à la température T' du corps froid, on la met en relation avec ce dernier, puis on pousse le piston de manière à le faire rétrograder. Mais le moindre excès de pression au-dessus de P' tend à augmenter la température de la vapeur et cette augmentation suffit pour faire passer de la chaleur de la vapeur au

corps froid à température constante et égale à T' . On arrête cette compression *isothermale* lorsque la quantité de chaleur versée au corps froid a acquis la valeur de Q' dans l'équation $\frac{Q'}{Q} = \frac{T'}{T}$. A ce moment C, la vapeur a reçu de la pression du piston la chaleur équivalente au travail extérieur $\bar{C}_e$ représenté par l'aire $eECe$, et a rendu au corps froid Q' calories.

La dernière opération, une *compression adiabatique* CA, ramène la vapeur à son état primitif d'eau pure à la température T et à la pression P . On augmente petit à petit la pression du piston et tout le travail extérieur ainsi dépensé a pour effet d'augmenter la chaleur interne du fluide, sa température par conséquent, et de le condenser. La chaleur équivalente au travail extérieur ainsi dépensé est $\bar{C}_c = cCAc$.

Le kilogramme d'eau est donc revenu à son état primitif après avoir reçu Q calories du corps chaud; rendu $\bar{C}_a$ calories pour faire le travail extérieur pendant l'admission de la chaleur; rendu $\bar{C}_d$ calories pour faire le travail extérieur pendant que la température baissait; reçu $\bar{C}_e$ calories de la part du piston pendant la compression isothermale et rendu Q' calories au corps froid; reçu enfin $\bar{C}_c$ calories de la compression adiabatique du piston tandis que la température revenait à T .

Puisque le cycle est fermé, la somme algébrique de ces six quantités de chaleur est nulle et l'on a

$$Q - \bar{C}_a - \bar{C}_d + \bar{C}_e - Q' + \bar{C}_c = 0$$

ou

$$Q - Q' = \bar{C}_a + \bar{C}_d - \bar{C}_e - \bar{C}_c = \bar{C} = \text{aire ADECA.}$$

La chaleur équivalente au travail définitivement obtenu,

$$\bar{C} = Q - Q' = Q - Q \frac{T'}{T} = Q \left(\frac{T - T'}{T} \right),$$

est représentée par le produit de deux facteurs, la chute de température $T - T'$, et le *poids thermique* $\left(\frac{Q}{T} \right)$, qui est constant. L'analogie avec l'expression du travail de la pesanteur est remarquable.

Dans l'exemple que nous avons choisi, ce que nous avons appelé Q est la chaleur de vaporisation du kilogramme d'eau sous pression constante; c'est ici $494^{\circ}4$. Le travail maximum que l'on peut en retirer entre les températures $432^{\circ}2$ et 288° est donc en kilogrammètres

$$425 \times \frac{494.4}{432.2} (432.2 - 288) = 70.073^{\text{km}}$$

Il ne représente que $\frac{432.2 - 288}{432.2} =$ un tiers de la chaleur dépensée.

Supposons que l'on puisse faire abstraction du temps nécessaire pour obtenir ce résultat, alors nous pourrions calculer combien de calories il faut dépenser par heure dans une machine parfaite pour obtenir un cheval de force. Celui-ci représente 270,000 kilogrammètres par heure; on dépensera donc par heure

$$\frac{270,000}{70,073} \times 494.1 = 1903^{\circ}.9.$$

Généralement on estime la consommation de nos machines en kgs de vapeur, bien que cette unité soit mal définie. Nous proposons d'appeler *kilogramme de vapeur* une valeur de 655^o.062 qui est la *chaleur totale du kilogramme de vapeur à 6 atmosphères de tension*. Alors l'équivalent de 1903^o.9 sera

$$\frac{1903.9}{655.062} = 2^{\circ}.906.$$

Conclusion : une machine parfaite, à condensation, avec vapeur à 6 atmosphères et eau de condensation à 15°, consommerait l'équivalent de 2^o.906 de vapeur par cheval-heure.

III

Nos meilleures machines aujourd'hui consomment au moins le double. Il y a donc de la marge, mais peut-on s'attendre à diminuer encore beaucoup la consommation réelle et par quels moyens? Nous ne croyons pas qu'on la diminuera encore sensiblement, et le but des améliorations devrait se réduire à assurer à toutes les machines le résultat acquis seulement à titre exceptionnel pour quelques-unes d'entre elles.

C'est que certaines conditions du cycle parfait sont incompatibles avec ce que l'industrie exige des machines; telle est l'égalité de la résistance du piston et de la tension de la vapeur qui donnerait lieu à un mouvement uniforme et très lent du piston; or, ce que la pratique demande, c'est un mouvement uniforme de rotation de l'arbre. D'autres sont physiquement irréalisables, par exemple, l'imperméabilité absolue des parois du cylindre. Sous ce double rapport, les roues hydrauliques sont beaucoup plus favorisées, comme nous l'avons déjà dit. Un chiffre suffit pour démontrer l'impossibilité pratique d'une détente poussée aussi loin que le veut la perfection du cycle. Le volume que le piston devrait engendrer par cheval-heure serait de 230 mètres cubes! soit par seconde, 0^m.639! Une machine de 100 chevaux avec 5 mètres de vitesse

par seconde au piston aurait plus de 4 mètres de diamètre! et l'admission cesserait au *cent et quatre-vingt-treizième de la course!* En outre, on ne saurait faire passer la chaleur de la vapeur à l'eau du condenseur sans échauffer celle-ci; on doit donc se résoudre à une perte sur la chute de température, comme dans le cas du déversement prématuré des roues par-dessus. Dans le moteur idéal, c'est toujours le même kg. d'eau qui subit les opérations thermiques dans les cycles successifs. Mais nos cylindres se prêtent mal aux rôles combinés de foyer, de condenseur et de transmetteur d'énergie. Le fluide doit être renouvelé à chaque coup de piston, il vient de la chaudière, passe par le cylindre, puis se rend au condenseur, et l'on ne voit guère le moyen de faire autrement. Sans doute, on a fait des types de machines à air chaud où c'était toujours le même fluide qui était en jeu, mais où sont ces machines d'antan? De la nécessité de renouveler ainsi le fluide à chaque pulsation, il résulte que nous devons reprendre l'eau du condenseur à 30° ou 35° et l'échauffer d'abord à la température T de la chaudière avant de lui fournir utilement de la chaleur; et ce n'est pas par compression, c'est en dépensant des calories. Nous donnons ainsi 124 calories outre les 494 utilisées, sans y gagner autre chose que le travail de la compression, environ 34 calories. Enfin, la contre-pression est toujours beaucoup plus élevée que celle qui correspond à la température T et qui est ici de 172^o.7 par mètre carré. Il est bien difficile d'obtenir une contre-pression qui dans le cylindre, descende en dessous de 1,500 kgs. par mètre carré.

Les phénomènes des parois sont inéluctables; de la chaleur est prise par le métal à la vapeur pendant l'admission et restituée en partie pendant la détente, utilement mais toujours avec une perte, et, en partie, c'est-à-dire pour le reste, pendant l'émission en pure perte.

Qu'on n'imagine pas que ces pertes nombreuses et inévitables puissent être considérablement réduites chacune individuellement.

La perte sur le chauffage de l'eau dépasse 7 % de la chaleur idéalement disponible; celle qui provient d'une détente incomplète 25 %; celle qui provient de l'excès de contrepression 6 %; sur la chaleur fournie pendant l'expansion 5 % au moins; sur le rayonnement extérieur, la dépression entre la chaudière et le cylindre et, encore 7 %, et l'on arrive aisément à 50 % de perte totale dans les meilleures conditions.

Si l'on met à part le rayonnement extérieur, l'ensemble de toutes ces pertes constitue l'excès de chaleur qui passe au condenseur; un des plus grands mérites de la théorie de Hirn et de sa méthode d'expérimentation est d'avoir cherché dans

l'eau sortie du condenseur l'évaluation des misères réunies de nos moteurs à vapeur. Un autre est d'avoir mis à part la portion de ces pertes due à l'intervention des parois. La conséquence qu'on en déduit, sans être absolument encourageante, est tout au moins fort utile à la pratique. Tous les moyens d'économie doivent tendre à diminuer l'action définitive des parois. Mais lorsque, par l'emploi judicieux d'un de ces moyens, l'on est parvenu à ce but, la différence ne va pas toute au travail; loin de là, la majeure partie va grossir les autres pertes. C'est notamment ce qui arrive par l'emploi des grandes vitesses, ou de la vapeur surchauffée, ou de l'enveloppe à vapeur, ou de l'enveloppe à flamme de gaz. (Voir *Selected papers of the Institution of civil Engineers*, Londres, 1889, article de Donkin et Dwelshauvers-Dery.)

Parmi les pertes nous n'avons pas encore signalé celles qui proviennent de l'espace mort. C'est qu'on possède dans la compression à la fin de la course de retour un moyen sûr et commode de diminuer cette perte et, en certains cas, de l'annuler. Si la compression est complète, c'est-à-dire si elle a été élevée jusqu'à la pression de la vapeur vive venant de la chaudière celle de la vapeur qui a été enfermée dans l'espace mort, c'est qu'elle aura fourni la chaleur nécessaire pour élever aussi la température des parois de l'espace mort, du couvercle du cylindre et même du piston, chose que ne fait pas l'enveloppe. Il s'ensuit que la condensation initiale est de beaucoup diminuée. Mais si, avec les formules qui ne tiennent pas compte de l'action des parois, on cherche quelle économie peut procurer la compression complète, on trouve que le résultat dépend du degré de détente; qu'avec condensation, pour les petites déteintes, il y a perte, que le bénéfice ne commence que lorsque la pression à la fin de la détente est réduite au huitième ou neuvième de ce qu'elle était au commencement; que le bénéfice est complet, c'est-à-dire que l'influence de l'espace mort est annulée dans le cas où la détente est aussi complète, c'est-à-dire où la pression à la fin de la détente est égale à la contre-pression. La démonstration est simple, si l'on admet que la loi de la détente et celle de la compression sont les mêmes, ce qui n'arrive probablement jamais. Nous allons la présenter en faisant voir d'abord que la détente complète est la plus favorable. Soit (fig. 2) ADEFBA le diagramme d'indicateur d'une machine où la contrepression est $fF = \overline{OB}$, et le travail obtenu du poids de vapeur admis est représenté par l'aire ADEFBA. Il est évident qu'on aurait obtenu de la même dépense un travail plus grand en poussant la détente jusqu'en h , où la pression finale est égale à la contrepression; mais aller plus

loin, jusque i , par exemple, c'est perdre le travail représenté par HKIH.




Fig. 2.

Dans la figure 3, soit ADEBA la surface représentant le travail obtenu d'une dépense $V = AD$ de vapeur faite dans un cylindre sans espace nuisible. Pour une pression quelconque $p = OG$, le volume occupé par la vapeur est $GJ = nV$. Soit maintenant un espace nuisible v




Fig. 3.

rempli de vapeur à la même pression initiale; la détente du volume $v + V$ se fera suivant la même loi et, pour la pression p , le volume occupé sera $nv + nV = \overline{LK}$. Individuellement le volume additionnel v sera devenu $nv = \overline{LI}$, et nous pouvons ainsi tracer le lieu CA des points I, et il est clair que dans l'hypothèse où la loi de la compression est la même que celle de la détente, la courbe CA sera celle de la compression complète. Donc, avec espace mort et compression complète, le travail définitivement obtenu sera représenté par l'aire CADE'C, évidemment égale à BADEB, puisque l'on a nécessairement, pour toute pression, égalité entre les portions d'abscisses GI et JK.

Quoi qu'il en soit de ce genre de démonstration, on peut affirmer dès aujourd'hui que la compression diminue l'action des parois d'une manière plus favorable que l'apport par une enveloppe quelconque d'une quantité de chaleur qui ne peut atteindre le piston. Il serait avantageux de combiner ce moyen avec la surchauffe de la vapeur qui est loin d'avoir été assez éprouvée pour qu'on en puisse parler en connaissance complète de cause. Le fait qu'elle fonctionne avec succès et sans

accroc depuis environ 35 ans au Logelbach, dans deux machines de 150 chevaux, suffit pour démontrer que d'autres insuccès sont dus à des causes étrangères au procédé lui-même. Une condition essentielle est que le piston soit parfaitement étanche; elle entraîne la verticalité du cylindre, à moins qu'on ne parvienne à en faire d'horizontaux sans fuites. Les joints de l'appareil de surchauffe doivent être particulièrement soignés, et la température de la vapeur, ne pas dépasser 230°; le graissage des cylindres doit être bien fait, sans précaution spéciale toutefois.

Le moyen d'économiser la vapeur le plus en vogue aujourd'hui consiste à la faire détendre dans plusieurs cylindres successifs. Il revient à diviser la chute totale de température en plusieurs parties, ce qui diminue l'action des parois. On y trouve aussi cet avantage que la chaleur expulsée du premier cylindre soit par l'action des parois, soit par des fuites au piston, passe utilement au second cylindre, et ainsi de suite, de manière que c'est au dernier seulement qu'il se produit une perte définitive, à part le rayonnement extérieur bien entendu. Dans un essai de consommation sur la machine à triple cylindre du laboratoire d'une école d'Angleterre, il a été trouvé une dépense de 5*561 de vapeur par cheval-heure. C'est la moindre consommation accusée dans des essais sérieux.

Mais l'emploi des cylindres multiples est inséparable de celui des enveloppes à vapeur. Comme Hirn l'a démontré, l'action des parois est toute autre dans la machine à cylindre unique et dans la machine à deux cylindres. Dans la première, les parois rendent de la chaleur à la vapeur pendant l'expansion, même sans enveloppe; dans la seconde, la vapeur qui se détend est en fait séparée de celle qui vient de la chaudière, et les parois du grand cylindre que l'admission n'a pas réchauffées prennent de la chaleur à la vapeur qui s'y détend, pour l'envoyer ensuite au condenseur. Si l'on y ajoute une enveloppe de vapeur, la chaleur fournie par celle-ci sert à augmenter directement le travail de détente; tandis que dans la machine à un cylindre la chaleur de l'enveloppe ne fait qu'aider la vapeur à reprendre aux parois une partie de celle que l'admission y avait arrêtée.

Résumons-nous au moyen de quelques chiffres. Dans les machines les mieux constituées, où l'on n'a mis en œuvre aucun moyen de diminuer l'action des parois, le travail obtenu représente au plus 12 % de la chaleur dépensée. Dans la perte de 88 % les parois comptent pour environ 15 %. En supposant que l'on applique un moyen efficace qui annule l'action des parois, des 15 % disparus,

environ 4 passeront au travail et 11 iront grossir les autres pertes. Au lieu de 12 %, on aura 16 % de rendement et 84 de perte. Nous ne croyons pas que ce résultat sera dépassé ni même atteint.

Il est du reste un facteur dont il est nécessaire de tenir compte et qui est du plus haut intérêt pour l'industriel, ce sont les frottements du mécanisme. Ce que l'industriel achète en définitive, c'est le travail sur l'arbre et non le travail indiqué. Entre le travail indiqué et le travail au frein existe un déchet plus ou moins grand suivant que la machine est plus ou moins compliquée, plus ou moins bien exécutée, plus ou moins bien entretenue et lubrifiée. L'importance de ces conditions a été bien mise en lumière par les expériences que le savant professeur Thurston a dirigées dans son laboratoire du Sibley collège à Ithaque (Et.-Un. d'Am). On y voit entre autres que le rendement du mécanisme des Compounds est fort inférieur à celui des machines à simple cylindre, ce que M. Walther Meunier de Mulhouse avait déjà signalé, et qui en diminue les avantages. Parmi ses conclusions, la plus importante est qu'il y a encore à gagner sur le rendement du mécanisme qui fort souvent s'élève à peine à 80 %. Le frottement des paliers principaux emporte environ la moitié du déchet et peut être considérablement réduit. En équilibrant bien les distributeurs on peut diminuer leurs frottements des neuf dixièmes. Sous le rapport du mécanisme, de l'exécution et du graissage, nous avons probablement plus de marge pour le progrès que sous celui de la thermodynamique.

Un mot pour finir. Soit f_1 le rapport de la quantité de chaleur qui serait utilisée dans un moteur de Carnot, à la quantité totale de chaleur dépensée; on a $f_1 = \frac{T - T'}{T}$. Soit f_2 le rapport du travail réel indiqué à celui que donnerait le moteur de Carnot. Si f' est le rendement du fluide, il est égal au produit des deux rapports précédents $f' = f_1 f_2$.

L'expérience prouve que, quand on emploie de la vapeur surchauffée, le premier rapport f_1 augmente, mais le second f_2 reste à peu près le même qu'avec de la vapeur saturée. Le bénéfice de l'enveloppe, au contraire, porte entièrement sur f_2 . Avec les très hautes pressions, la vapeur saturée, l'enveloppe et la multiplicité des cylindres, on réalise un bénéfice sur chacun des deux rendements, f_1 et f_2 . Nous ne savons si ce fait a déjà été signalé en ce qui concerne la vapeur surchauffée, mais il nous paraît présenter quelque importance aujourd'hui qu'on ne recule pas devant des pressions fort élevées.

V. Dwelshauvers-Dery,
Professeur à l'Université de Liège.

LES PRINCIPES SCIENTIFIQUES DES GRANDES PÊCHES

Les diverses questions relatives à l'industrie de la pêche ont pris de nos jours une importance considérable et celle-ci est devenue un véritable problème social qui préoccupe à juste titre les nations civilisées. La France possède une population de 85000 marins dont l'unique moyen d'existence est la capture annuelle de 78.500.000 francs (1) de poisson; l'Angleterre en prend pour 300 millions avec ses 120.000 pêcheurs, les Etats Scandinaves pour 400 millions avec 130.000 pêcheurs, la Russie pour 400 millions, les Etats méditerranéens pour 100 millions, les Etats-Unis d'Amérique pour plus de 500 millions. Le monde pêche et consomme annuellement pour deux milliards de francs de poisson.

I

Si l'agriculture s'est vue forcée par la nécessité de sortir d'une routine séculaire et de se transformer en une science précise de chiffres, de mesures, d'analyses chimiques entre les mains des physiiciens et des chimistes, aujourd'hui les guides les plus sûrs de l'agriculteur, il doit en être de même pour l'exploitation des eaux, l'aquiculture, obligée, elle aussi, de sortir de la routine et de s'appuyer sur des principes rigoureux. La population humaine s'accroît, nos besoins augmentent; hommes et choses doivent fournir leur production maximum et nos terres comme nos eaux, fatiguées par une longue production trop souvent insoucieuse de l'avenir, exigent des ménagements. Pour la France en particulier, le dépeuplement des eaux douces et salées est hors de doute et peu de personnes compétentes seraient disposées à soutenir que nos pêcheries de Terre-Neuve sont dans un état florissant.

En France, la pêche maritime appartient à la marine, celle des cours d'eau navigables à l'Administration des ponts et chaussées, celle des cours d'eaux non navigables, aux riverains. Ce système a été critiqué. Pour les cours d'eau non navigables, notamment, on a observé que ce qui appartient à tous n'appartient en réalité à personne, que l'exploitation est faite d'une façon désastreuse et que la répression du braconnage est illusoire. On semble préférer le système adopté à l'Étranger, en Suisse par exemple, où les cours d'eau, propriété des cantons, sont loués à des fermiers intéressés à exploiter méthodiquement, à faire respecter une législation d'ailleurs très sévère pour les braconniers, et en outre sont soumis à des charges parmi

lesquelles figure en première ligne l'obligation de repeupler en rejetant à l'eau chaque année un nombre déterminé d'alevins. La discussion de ces critiques, dans ce qu'elles peuvent avoir de fondé ou d'exagéré, n'est pas de notre compétence.

Au point de vue scientifique pur, la France diffère encore des étrangers. Dans notre pays, le problème de la pêche est considéré comme appartenant à l'histoire naturelle, à la zoologie; pour les Anglais, les Norvégiens, les Danois, les Hollandais, les Écossais, les Allemands, les Suisses, les Américains du Nord, c'est avant tout une question de physique, de chimie, de topographie, de géologie.

L'être qui vit dans les eaux, plante ou animal, est un instrument de physique dont les indications sont extrêmement compliquées parce qu'elles dépendent à la fois de conditions physiologiques et des conditions physiques du milieu ambiant, composition chimique, température, densité, agitation des eaux, configuration et nature du sol immergé. A chaque état physiologique correspond un mode spécial d'équilibre du milieu. Si les circonstances cessent d'être convenables, l'animal est toujours libre de fuir et la plante de mourir. De toutes façons, la présence ou l'absence de l'être vivant est l'indication et la mesure d'un ensemble de conditions physiques.

Nos instruments de laboratoire se bornent à enregistrer un phénomène unique, le thermomètre n'indique que les variations de la température, l'aréomètre celles de la densité, l'analyse chimique celles de la composition, l'examen géologique celles de la nature du fond, l'appareil à mesurer les courants celles du courant; au contraire l'être vivant fournit toutes ces indications en même temps. Tandis que nos instruments mesurent par gradation continue, le poisson n'a que deux degrés, tout au plus trois, sa présence, son absence et sa rareté. Un problème scientifique devant être abordé par son côté le moins compliqué, au lieu de commencer par l'animal, il est logique d'étudier dès le début et séparément à l'aide des méthodes et instruments ordinaires, chacun des éléments dont le groupement constitue le milieu; on se servira du thermomètre, de l'aréomètre, de l'analyse chimique et plus tard seulement on passera au poisson.

La composition chimique des eaux douces est variable mais, pas plus que leur économie thermique, elle n'est difficile à établir; pour la mer, il en est autrement. Les éléments les plus importants sont la profondeur et la nature du fond, ce qui impose la possession de cartes isobathes et géolo-

(1) A. Gobin, *la Pisciculture en eaux douces*, p. 219.

giques sous-marines dont malheureusement nous n'avons pas encore une seule relative aux côtes de France. Vient ensuite la nature de l'eau de mer, fonction de trois variables, la salinité ou quantité de sel par litre, la température et la densité, car on sait que pratiquement la proportion relative des divers sels les uns par rapport aux autres, est identique dans tout l'Océan. Ces trois variables étant liées entre elles par une formule, il suffira d'en connaître deux quelconques.

La mesure de la température se borne à une lecture thermométrique; c'est l'opération la plus simple de la physique; il y aura donc lieu de la choisir. Le dosage des halogènes est une opération délicate, exigeant un matériel encombrant et fragile, verrerie, burettes, pipettes graduées, liquides colorés, réactifs pesés à renouveler; il faut ensuite opérer par le calcul les corrections de température. Au contraire, un aréomètre de précision, et en particulier celui du modèle inventé par M. J.-Y. Buchanan et employé par lui à bord du *Challenger*, est un instrument extrêmement précis puisqu'il donne la densité avec quatre décimales exactes; son maniement ne réclame aucune éducation technique préalable, il est toujours prêt à fonctionner et ses calculs de réduction se bornent à une lecture et à une division. Aucune hésitation n'est donc permise et les variations dans la nature de l'eau de mer seront étudiées par le thermomètre et par l'aréomètre.

Si les mesures sont aisées, les lois à découvrir sont au maximum de complication. L'Océan se divise en deux régions distinctes : la haute mer où les fonds sont supérieurs à 200 mètres, le plateau ou soubassement continental où ils sont inférieurs à cette limite. L'étude de la distribution de la température en mer profonde, quoiqu'elle ne soit pas encore complètement connue, est sans difficulté sérieuse. Il suffira d'un nombre convenable de sondages thermométriques, aux mêmes lieux à des époques différentes de l'année, pour déterminer la profondeur de la variation thermique annuelle, nulle surface ne servant de limite supérieure à la zone océanique profonde immobile et de limite inférieure à la zone superficielle de mouvement où tous les phénomènes de la mer accomplissent et ferment leur cycle d'action.

Malheureusement le poisson fréquente peu les régions éloignées des côtes ou du moins il nous est impossible de nous emparer de lui dans ces retraites inabordables à nos appareils de pêche; il se tient sur le plateau continental où le sol est accidenté, les fonds de nature différente, où la température subit des variations continuës, où la densité de l'eau est troublée par mille causes, par l'afflux d'eau douce provenant des fleuves dont le

débit change avec la saison, avec la marée, avec les courants modifiés eux-mêmes par les marées, la configuration des terres, le vent et l'état de la mer. Autant de motifs pour n'entreprendre cette étude avec l'instrument poisson qu'après en avoir découvert au moins les lois principales avec les instruments thermomètre et aréomètre. La méthode générale de procéder du simple au compliqué s'impose bien davantage lorsque le problème à résoudre est difficile.

II

On objectera que la pisciculture s'occupe des poissons et qu'avant tout il faut connaître l'histoire, les mœurs et les besoins de ceux-ci. Cela est vrai, et le serait bien davantage encore si la pêche ne datait que de quelques années. Mais l'humanité se nourrit de poissons depuis longtemps et dès à présent la science a suffisamment à faire pour coordonner, analyser et expliquer les faits connus par n'importe quel vieux pêcheur. Je ne prétends pas que la zoologie soit inutile, je me borne à croire — avec bien d'autres — que la zoologie est appelée à donner le dernier mot plutôt que le premier, et qu'elle procédera beaucoup plus rapidement et sûrement lorsque les sciences précises, la topographie, la géologie sous-marine, la physique et la chimie auront préparé son champ d'étude et simplifié sa tâche.

Et d'ailleurs, même en France, je ne suis pas le seul à penser ainsi. Je citerai comme preuve un remarquable travail sur la pêche de la morue au Sénégal. L'auteur, M. Hautreux (1), ancien lieutenant de vaisseau, explique la présence de la morue dans les parages du cap Blanc par des mesures de températures, des vitesses de courants et des profondeurs d'isothermes. Dans ces questions ayant la pratique pour sanction immédiate, la plus belle de toutes les théories, le plus serré de tous les raisonnements, la plus savante de toutes les dissertations est encore le succès. La plupart des nations, la Norvège, l'Allemagne, l'Écosse, la Suisse, les États-Unis, sont de l'opinion que j'énonçais plus haut et toutes se félicitent de croire qu'en fait de pêcheries et d'agriculture, il faut d'abord des chiffres, des mesures et des cartes.

Prenons la Suisse afin d'en achever avec les eaux douces. Tous les lacs du pays sont relevés topographiquement par courbes isobathes de 10 en 10 mètres et souvent de 5 en 5 mètres; au point de vue de la limnimétrie, de l'optique, de la température, le nombre des travaux auxquels ils ont donné lieu est considérable; leurs eaux, celles des

(1) A. Hautreux, *Pêche de la morue au Sénégal*, Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux, 5 mars 1888.

rièrres et des ruisseaux, ont été analysées en des points différents, à des époques différentes; on a étudié chimiquement les conditions les plus favorables au développement des œufs et le rôle si important des carbonates. Les zoologistes terminent l'œuvre des ingénieurs et des physiciens. Il en est de même pour les lacs d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, d'Angleterre, de Russie et des Etats-Unis. A l'exception de la partie française du Léman dont le plan, exécuté par les soins de l'administration des Ponts et Chaussées, n'est pas encore publié, les 20.000 hectares de lacs que nous possédons sont en blanc aussi bien sur nos cartes topographiques que sur nos cartes géologiques. J'essaie de combler cette lacune, car j'ai commencé l'étude des lacs des Vosges et de Savoie.

Pour la pêche en eau salée, je me bornerai à mentionner les travaux allemands sur la Baltique et la mer du Nord, l'expédition de la *Pommerania* en 1872 et les publications de la Commission d'études scientifiques des mers allemandes à Kiel (1). Cette dernière possède dix-huit stations maritimes où l'on prend chaque jour la température et la densité de la mer et qui sont rattachées aux vingt et une stations danoises et aux stations hollandaises.

En Norvège, le professeur H. Mohn, directeur de l'Institut météorologique, le savant chef des fructueuses campagnes du *Vöringen* dans l'Océan du Nord, a publié dans le *Morgenbladet* de Christiania, au commencement de 1889, un article intitulé : « La température de la mer et la pêche aux îles Loffoden. » Parlant de ce fait, reconnu par les officiers surveillant la pêche, que la morue, dans ces parages, ne quitte jamais une eau dont la température est de 4° à 5° C, il en conclut la nécessité de charger un vapeur de l'Etat de suivre d'une manière constante, pendant toute la saison de pêche et tout le long de la chaîne des Loffoden, cette couche isotherme, au moyen de sondages thermométriques et d'avertir régulièrement de sa profondeur les pêcheurs désormais assurés de trouver des morues.

L'aquiculture a fait ses plus grands et ses plus rapides progrès aux Etats-Unis. Je ne parlerai que de la pêche en eau salée. Tandis que le *Blake* de l'*U. S. Coast and Geodetic Survey* ne quitte point les régions du Gulf-Stream et exécute chaque année ses recherches afin de les appliquer plus spécialement à l'océanographie et à la navigation, l'*U. S. Fish Commission* chargée des pêches possède trois navires. L'*Albatross*, après avoir étudié pendant cinq ans la mer qui baigne les côtes est

de l'Amérique, explore maintenant les côtes du Pacifique, l'Alaska et la Californie. La Commission, dans le but de ne point interrompre ses travaux sur l'Atlantique a, l'été dernier, armé le schooner de 83 tonneaux, le *Grampus*, pour une campagne scientifique qui a duré tout le mois d'août. Le navire portait les professeurs W. Libbey, Rockwood, Magie et Mac Neil et avait pour mission de contribuer à établir les rapports existant entre la température et la densité des eaux et les migrations des poissons, c'est-à-dire de mesurer des températures, des densités, de recueillir des échantillons d'eau et de tenir compte de tous les phénomènes météorologiques de l'atmosphère sur une zone comprise entre la pointe orientale de l'île Nantucket et Montauk Point, à l'extrémité septentrionale de Long Island en latitude, jusqu'à la limite du Gulf-Stream à l'est. Quoique fortement contrariée par le mauvais temps, l'expédition a déjà, avant tout examen détaillé des échantillons rapportés, établi deux résultats importants : le peu de convenance d'un bâtiment à voiles pour de telles campagnes scientifiques et la connaissance du passage sous-marin des eaux froides et alourdis du courant de Cabot par-dessous les eaux légères et chaudes du Gulf-Stream pour rejoindre le milieu de l'Atlantique. En résumé, les Américains font de la pisciculture avec des sondages, des thermomètres et des aréomètres.

III

Le même mode de procéder se retrouve en Ecosse chez les deux administrations qui s'occupent concurremment des eaux écossaises. J'ai déjà parlé (1) des beaux travaux de la *Scottish marine Station* de Granton sous la savante et énergique impulsion que lui communique M. John Murray, directeur du *Challenger office* d'Edimbourg, l'un des maîtres de l'océanographie. Un yacht à vapeur de 30 tonneaux, la *Medusa*, étudie d'une façon complète une localité déterminée, le Firth of Forth où l'embouchure de la Clyde, par exemple, au point de vue topographique, géologique, physique et chimique. Il est suivi dans ses expéditions par un laboratoire flottant, l'*Ark*, qui profite des troupes zoologiques de la drague pour examiner sommairement les êtres vivants rapportés. C'est seulement après achèvement des études physiques que les naturalistes prennent possession d'un terrain désormais connu et procèdent alors à coup sûr.

Le *Fishery Board for Scotland* a pour but spécial de ses recherches l'industrie de la pêche. Le contrôle des pêcheries écossaises a été confié de 1808

(1) J. de Guerne, la Commission d'études scientifiques des mers allemandes, à Kiel. Bulletin mensuel de la Société nationale d'acclimatation de France, avril 1887.

(1) J. Thoulet, De l'état des études d'océanographie en Norvège et en Ecosse. Rapport sur une mission du ministère de l'Instruction publique. Archives des missions, 3^e série, t. XV.

a 1882 aux *Commissioners of british white Herring Fisheries*. A cette époque, les médiocres résultats obtenus d'efforts dévoués, mais bornés aux questions industrielles, techniques et administratives ont forcé à reconnaître la nécessité absolue de donner une large place à l'élément scientifique pur. Malgré quelques résistances, le service fut organisé; on s'assura d'un laboratoire à Saint-Andrews et du concours de l'Université d'Edimbourg; on fit l'acquisition d'un petit vapeur, le *Garland*, et l'on chercha à profiter des bateaux garde-pêches de l'Etat mis temporairement à la disposition des savants.

L'œuvre du *Board* est divisée en trois chapitres :

1° Partie technique. — Étude générale des questions relatives à la pêche, appareils de pêche, leur effet sur les fonds, destruction des jeunes poissons; boëte; statistique, surveillance des régions de pêche, conservation du poisson.

2° Partie biologique. — Faune marine; structure, distribution, migrations, nourriture, mœurs des poissons, crustacés et mollusques comestibles.

3° Partie physique. — Recherches sur la température, la densité, la salinité, la composition des eaux au voisinage de la côte.

A propos de la seconde partie du programme, nous remarquerons une tendance évidente à ne s'occuper, autant que possible, que de questions limitées. On préfère achever un sujet restreint plutôt que d'en prendre un trop vaste destiné à rester plus ou moins incomplet. Une note de M. T. Wemyss Fulton (1), secrétaire scientifique du *Board*, présente un excellent résumé des divers mémoires publiés, sur lesquels le manque de place nous empêche de nous étendre davantage. Le hareng a été particulièrement étudié, mais la morue, divers autres poissons, les coquillages et même les micro-organismes inférieurs servant à l'alimentation des poissons ont aussi attiré l'attention.

Les croiseurs de l'Etat ont accompli l'exploration topographique et physique d'aires bien déterminées; chaque opération de pêche faite à bord du *Garland* dans un but quelconque, industriel ou zoologique, a été accompagnée de mesures physiques; enfin on a établi un système d'observations continues de la température et de la densité de la mer en diverses stations comprenant tous les phares et bateaux-feux des côtes d'Écosse.

Plusieurs mémoires ont paru dans les Reports annuels du *Fishery Board*. En 1883, le Dr Gibson (2) a examiné le Moray-Firth à bord du *Jackall* et

dressé une carte des profondeurs ainsi que des courbes de températures, de densités et de salinités à différentes profondeurs. Ces observations ont été continuées (1) en 1886 à bord du *Garland* par MM. Gibson et H. R. Mill. Ce dernier a étudié (2) les environs de l'île Lewis, dans les Hébrides et comme toujours, ses résultats sont illustrés d'une carte bathymétrique par courbes d'égale profondeur, de 10 en 10 brasses, teintées de six teintes plates bleues d'intensité croissante pour la mer, d'une teinte plate brune pour la terre et de coupes isothermes également teintées montrant les inflexions des nappes isothermes au voisinage de la terre et des hauts-fonds. Les cartes coloriées sont considérées comme indispensables. En 1886, le même savant a rédigé un nouveau mémoire sur les conditions physiques du Firth of Forth (3). Enfin, en septembre 1888, le Dr Gibson, sur le *Jackall*, a fait un voyage d'exploration (4) le long de la côte est d'Écosse et de l'autre côté de la mer du Nord, à Bergen et à Copenhague. En un grand nombre de stations, il a pris des séries verticales de températures, de densités et de salinités, il a dosé les éléments gazeux dissous dans l'eau et récolté des échantillons destinés à des analyses détaillées.

En résumé, les nations étrangères semblent unanimes à admettre les règles suivantes. La culture des eaux douces ou salées doit être basée sur des principes strictement scientifiques et précis, topographie des fonds, géologie, propriétés physiques et chimiques, représentés et résumés sur des cartes dressées par courbes isobathes à aires teintées et sur des schémas coloriés; l'œuvre sérieuse du naturaliste ne commence en réalité qu'après l'achèvement de cette tâche préparatoire. Préférer à la multiplicité des observations leur qualité, c'est-à-dire employer plutôt un personnel restreint, éclairé, compétent et habile muni d'instruments délicats soigneusement étalonnés. Remplacer les études générales par des études se rapportant à des localités définies, mais absolument complètes et d'une précision indiscutable. A la condition de se conformer à ce programme, on avancera sûrement dans la voie du progrès.

J. Thoulet,

Professeur

à la Faculté des Sciences de Nancy.

(1) John Gibson and H. R. Mill, *Report on a physical and chemical examination of the water in the Moray Firth and the firths of Inverness, Cromarty and Dornoch*, 6^e ann. Rep. Fishery Board for Scotland, part. III, pp. 313-347, pls XI-XIV, 1888.

(2) Hugh Robert Mill, *Report of physical observations on the sea to the west of Lewis, during July and August 1887* 5^e Report pp. 349-375.

(3) Fifth Report, pp. 349-354.

(4) F. Gibson, *Report on observations relating to the physics and chemistry of the North sea during 1883 and including a review of the analytical work hitherto undertaken for the Fishery Board for Scotland*.

(1) R. Wemyss Fulton M. B. *The scientific work of the Fishery Board for Scotland*, Journal of the Marine Biological Association, March 1889.

(2) Fourth Ann. Rep. Fishery Board for Scotland, pp. 189-201, pls VI-VII, 1886.

SUR LES EXPÉRIENCES DE M. HERTZ

Il paraît difficile de douter que M. Hertz ait réellement observé des oscillations électromagnétiques de quelques décimètres de longueur d'onde; mais il est certain que les physiiciens qui essaient de répéter ses expériences réussissent rarement à produire des ondes aussi courtes, et ont même quelque peine à juger au fonctionnement de l'excitateur si celui-ci intervient activement et rend prédominantes ses vibrations propres, ou s'il livre simplement passage aux mouvements extérieurs produits dans la bobine d'induction. La comparaison avec les phénomènes sonores me semble particulièrement convenable pour bien mettre en relief le genre de difficultés qu'on rencontre et le rôle de l'excitateur.

D'abord la bobine d'induction est assez bien représentée par un grand réservoir d'air, à volume variable, comme les soufflets d'orgue, alimenté par ce que les facteurs d'orgue appellent une pompe, c'est-à-dire par un soufflet mû de l'extérieur et qui puise l'air dans l'atmosphère. De ce réservoir un conduit de forme quelconque amène l'air jusqu'à un sommier dont les différentes ouvertures sont closes par des soupapes. Les mouvements périodiques les plus variés peuvent prendre naissance dans ce réservoir, commandés les uns par le mouvement de la pompe, d'autres par la forme même du réservoir et des conduites, d'autres enfin par la construction des soupapes. Sur les trous du sommier montons des tuyaux d'orgue, et ouvrons les soupapes. A tous les mouvements que produit la soufflerie viendront se superposer ceux du tuyau d'orgue. Il y a longtemps déjà que les facteurs d'orgue savent rendre les sons du tuyau intenses et purs, c'est-à-dire indépendants de la construction des réservoirs d'air. C'est ce que M. Hertz sait certainement faire, mais par adresse, plutôt que par méthode; il a imaginé le tuyau capable de renforcer un mouvement de longueur d'onde déterminée; il y a mis une soupape, — l'interruption que doit franchir l'étincelle entre les deux parties de l'excitateur; — il sait de plus reconnaître quand, en modifiant un peu la soupape, il en a fait une anche — en d'autres termes, quand il a mis l'étincelle à l'unisson de l'excitateur tout entier. — Alors le mouvement périodique propre à l'excitateur devient particulièrement intense, et à peu près pur. Si pour en étudier les propriétés on se sert d'un récepteur à l'unisson de l'excitateur, — d'un résonnateur en un mot — on observera uniquement ce qui est dû à ce mouvement périodique spécial. Sans supprimer pour cela les autres

mouvements périodiques qui proviennent du réservoir, — mouvements qui resteront observables par les résonnateurs différents ou par des récepteurs sensibles à toutes les périodes, — on réussit à les éliminer de l'observation.

Ainsi font les facteurs d'orgues, mais leur art est un peu plus avancé. D'abord ils savent construire le réservoir et les conduites de façon que les mouvements périodiques qui y prennent naissance et dont quelques-uns sont extrêmement intenses — ceux que produit la manœuvre de la pompe — soient en dehors des limites de période auxquelles l'oreille est sensible; ils savent de plus établir les conduites du réservoir au sommier, et intercaler un régulateur de pression, de manière à amortir considérablement l'amplitude de ces mouvements que l'oreille percevrait sous forme de variations d'intensité du son principal. Surtout ils savent construire un tuyau d'orgue complet, c'est-à-dire un résonnateur et une embouchure accordés à l'unisson; ils ont pour cela des règles qui permettent d'approcher beaucoup du résultat par la construction même; au sortir des mains de l'ouvrier le tuyau parle déjà, il rend un son assez pur dont la hauteur est fixe et indépendante du mode d'insufflation. La main de l'accordeur n'est nécessaire que pour les derniers et délicats réglages qui donnent au son déjà pur ses qualités musicales et la hauteur exacte qu'il doit avoir par rapport aux autres tuyaux du même jeu. Nous n'en demandons pas tant en électricité, et nous nous contenterions de pouvoir acheter un excitateur tout accordé, ou d'avoir des règles pratiques pour le construire. Mais nous n'en sommes pas là; nous savons seulement que l'étincelle de l'excitateur présente un aspect particulier quand l'accord est obtenu; mais, naturellement, aucune description de cet aspect n'en donne l'idée tant qu'on ne l'a pas vu. Nous sommes à peu près dans l'état d'un sourd-muet à qui l'on donnerait une soufflerie sans régulateur de pression ni conduites, ainsi qu'un tuyau muni d'une anche, mais non réglée, en y ajoutant quelques explications, et en manière de conclusion: « Quant à l'anche, vous verrez, en déplaçant la languette, une position pour laquelle l'anche prend « un aspect particulier; elle paraît à la fois étalée, « et comme translucide; etc... Il suffit de l'avoir « une fois observé pour le reconnaître; c'est alors « que l'anche est accordée. »

Que ferait le malheureux sourd-muet? Il serait, j'imagine, fort embarrassé, et réussirait rarement à obtenir l'accord, surtout si l'anche

était membraneuse, sensible à l'humidité et à la température, et demandait — comme l'étincelle de l'excitateur — un réglage incessant à mesure que l'état atmosphérique se modifie. Forçant alors la pression des soufflets, il pourrait produire les bruits les plus variés, assez intenses pour être sensibles avec un résonnateur à flammes de König même à grande distance ; mais dans ces bruits provenant de toutes les imperfections de construction, il trouverait toutes les longueurs d'onde aussi bien que celle du tuyau d'orgue. C'est, je pense, ce qui a dû arriver pendant longtemps à M. Hertz, et ce qui arrive souvent encore à ceux qui essayent de reproduire ses expériences. Après avoir obtenu quelquefois par hasard l'aspect caractéristique de l'anche, mais sans réussir à le maintenir, notre sourd-muet acquerra peu à peu de l'habileté, réussira plus souvent à faire parler le tuyau, mais sans se débarrasser complètement des sifflements, des ronflements, de tout le tapage des sons étrangers, et surtout sans obtenir encore un son pur et harmonieux dans lequel la période fondamentale soit dominante. Si les résonnateurs ne parlent plus tous, il en restera pourtant beaucoup de sensibles : celui du son fondamental de l'anche (peu différent de celui du tuyau) et tous ceux des sons supérieurs de cette anche, sans relation numérique simple entre eux. Voilà à peu près où nous en sommes. M. Hertz est probablement seul plus habile jusqu'à présent.

M. Hertz a bien fait de multiplier les observations de tout genre dès qu'il a su régler son excitateur, de montrer comment toutes les expériences de propagation de la lumière ont leurs analogues en électromagnétisme, et de vérifier ainsi de la manière la plus étendue, au moins au point de vue qualificatif, les prévisions de Maxwell. Maintenant il serait bon qu'il revint sur ses pas, et habile comme il a dû le devenir, qu'il précisât tous les détails de construction nécessaires pour rendre facile la reproduction de ses expériences. Au point de vue purement expérimental, sa situation n'est pas sans analogie avec celle de Fresnel au début des expériences sur les interférences de la lumière ; on sait par quelle prodigieuse habileté celui-ci suppléa à l'insuffisance des moyens de construction, comment il fit d'abord la célèbre expérience des deux miroirs en les fixant à la cire molle sur une planchette (1). Je laisse à penser si le réglage par tâtonnements était facile, si les expérimentateurs ont dû souvent voir les franges d'interférences pures de tout phénomène de diffraction, et surtout faire des mesures concordantes tant qu'ils n'ont employé que ce dispositif

rudimentaire. Heureusement Fresnel a su indiquer comment les deux miroirs devaient être construits pour que le réglage pût se faire méthodiquement, comment l'observation à l'œil nu des images réfléchies permet d'amener les deux miroirs si près de la position convenable que les franges soient visibles à coup sûr, et qu'il ne reste que peu de chose à faire pour les rendre parfaites.

Ne doutons donc pas plus de la réalité des courtes longueurs d'onde de M. Hertz, que nous n'aurions dû douter il y a soixante-quinze ans, des interférences de Fresnel ; mais reconnaissons qu'il faut encore une singulière habileté pour observer le phénomène pur de tout mélange. Demandons à M. Hertz de nous épargner le long apprentissage par lequel il a passé, en consacrant pour quelques mois tous ses efforts à l'établissement de préceptes de construction et de méthodes de réglage d'un succès assuré.

Le résonnateur est inventé, et, ce qu'il y a de plus important, le moyen d'observation par l'étincelle. Il reste à préciser le mode de construction des conduites — attache de l'excitateur à la bobine — à inventer le régulateur de pression, et enfin surtout à transformer la soupape — étincelle — en une anche véritable. Alors vraisemblablement une machine de Holz, une batterie de bouteilles de Leyde de grande capacité, donneront d'aussi bons résultats qu'une bobine d'induction. Pour que l'étincelle puisse être réglée une fois pour toutes, il faut évidemment la produire non à l'air libre, mais dans un vase clos contenant un gaz inerte, incapable d'altérer les électrodes, vraisemblablement de l'azote ; le vase de verre sera probablement de dimensions comparables à la demi-longueur d'onde en tous sens, au lieu d'être étroit comme un tube de Geissler ; pour éviter les irrégularités dues aux charges lentement variables, que toutes sortes de circonstances peuvent produire sur l'isolant, la surface interne du verre sera dorée ou argentée dans presque toute son étendue et maintenue en communication avec le sol. Cette surface fera l'effet d'un tuyau cylindrique solide autour d'une corde qui vibre dans l'air ; si les vibrations de la corde sont longitudinales — ce qui est l'analogie probable de l'étincelle — le diamètre du cylindre-enveloppe n'a guère d'influence, sa longueur en a davantage ; l'amplitude du mouvement de la corde attachée aux deux bouts étant maximum au milieu, crée un ventre de vibrations longitudinales dans le tube étroit et il convient de donner à celui-ci une longueur d'un quart d'onde de part et d'autre du milieu de la corde, s'il est fermé, d'une demi-onde s'il est ouvert, pour que les mouvements de l'air et de la corde soient concordants dans la région moyenne

(1) Fresnel. *Œuvres*, t. I, p. 186 et p. 268 ; t. II, p. 17.

d'amplitude maximum. Pour une corde à vibrations transversales, c'est la longueur du cylindre qui devient à peu près indifférente et le diamètre qui doit être d'un quart de la longueur d'onde dans l'air. Dans le cas des étincelles, il s'agit de déterminer la relation entre les dimensions du vase de verre, la pression du gaz, la distance des électrodes et la période fondamentale de l'étincelle correspondante. Ce doit être facile pour M. Hertz, grâce à la longue pratique qu'il a de ces expériences, et aussi à l'ingéniosité naturelle dont il a déjà donné assez de preuves.

Concluons donc ainsi : il est certainement possible de construire un excitateur ayant une période propre. Il est possible d'obtenir seul au dehors le mouvement périodique de l'excitateur, avec sa période fondamentale et toute une série de périodes

plus courtes, caractéristiques à la fois de l'excitateur et de son étincelle, mais indépendantes de l'appareil qui sert à le mettre en action. M. Hertz y est sûrement parvenu, mais il ne nous a pas fait connaître encore de moyens réguliers et certains d'obtenir le même succès. Une seule expérience favorable, dont nous n'ayons aucune raison de douter, est ici plus intéressante qu'une foule d'expériences négatives; tous les résultats contradictoires qu'on pourra citer ne prouvent rien, sinon que les appareils étaient mal réglés. Espérons que M. Hertz aura à cœur de dissiper toutes les objections que ces insuccès soulèvent, en découvrant et nous faisant bientôt connaître les lois des étincelles de très courte période.

Marcel Brillouin.

Maître de conférences,
à l'École normale supérieure.

RECHERCHES SUR LE BACILLE TYPHIQUE

ET LA TRANSMISSION DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE PAR L'AIR

La fièvre typhoïde est sans aucun doute une des maladies infectieuses qui font le plus de ravages dans la population urbaine des deux mondes. Chaque année nous lui payons un tribut de 12 à 15 habitants pour 10.000 et de plus les victimes appartiennent, à de rares exceptions près, aux individus de 20 à 30 ans ! La thérapeutique, l'hygiène luttent, il est vrai, très brillamment contre le fléau, mais malgré cela les statistiques mortuaires sont encore excessivement élevées.

I

Depuis une dizaine d'années l'étiologie de la fièvre typhoïde a fait d'immenses progrès : les recherches d'Eberth, de Gaffky, Klebs, Chantemesse et Widal, etc. ne permettent plus de douter de la nature infectieuse de la maladie. La première description exacte, détaillée, du bacille typhique a été fournie par Eberth et Klebs. Ces deux anatomopathologistes ont démontré l'existence d'un bacille spécifique à cette affection et leurs expériences ont été confirmées dans la suite par Meyer, Friedlander, Gaffky, etc., etc.

On admet généralement que le microbe de la fièvre typhoïde est un bacille mobile, court, dont la longueur atteint à peu près 4 fois le diamètre (plus exactement 3,6 μ sur 8,1 μ) ; ses extrémités sont quelquefois arrondies, quelquefois aiguës. Il peut aussi dans certains cas prendre la forme de navettes. Gaffky, qui a le premier signalé cette

particularité, considère la partie centrale du bacille comme ayant produit les spores qui se trouvent réunies aux deux extrémités.




Fig. 1.

Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi ; dans cette forme particulière le protoplasma s'est retiré de la zone moyenne aux deux extrémités : la partie centrale est vide. Vers une certaine phase de l'évolution du bacille c'est par le milieu que se forme la division en deux du batonnet. Il n'y a

donc là qu'un simple phénomène de sisciparité, attendu qu'on ne trouve jamais de spores libres dans du liquide contenant cette forme particulière du bacille d'Eberth. S'il fallait s'en rapporter seulement aux caractères physiques attribués au bacille typhique, il est très probable qu'on risquerait de le confondre avec une foule d'autres germes banals ayant des caractères analogues. Il y aurait, nous le pensons, un grand intérêt lorsqu'on fait la description de tel ou tel genre de microorganismes de joindre à la description la nature du milieu dans lequel les propriétés attribuées à ces microorganismes sont constantes.

C'est seulement dans les cultures en bouillon que le bacille typhique est à peu près quatre fois plus long que large. Suivant les milieux de culture, on observe des différences très grandes dans l'aspect du microbe. — Si on l'ensemence sur des morceaux d'albumine, on obtient au bout de quelques jours une culture de bacilles longs, filamenteux, à mouvements lents, onduleux, semblant unicellulaires et non divisés, comme cela a lieu chez certaines bactéries filiformes. Les cultures




Fig. 2.

faites sur des pommes de terre ne donnent pas à la trainée d'ensemencement cet aspect assez particulier que présentent les cultures du même bacille sur un pareil substratum. Il se forme un voile un peu plus foncé que la surface de la pomme de terre; les bacilles sont aussi un peu plus longs que normalement; pour retrouver les dimensions primitives et les caractères des cultures sur pomme de terre, il faut faire passer le microbe de l'albumine au bouillon de bœuf peptonisé.

Contrairement à l'opinion de Friedlander aujourd'hui universellement acceptée, le bacille typhique

n'est pas un anaérobie facultatif. Les expériences que nous avons faites avec M. J. Ogier nous ont montré que ce microbe est franchement aérobie. Friedlander, dans ses recherches, s'était servi, pour faire le vide dans des ballons, de la trompe à eau; il avait en outre opéré directement sur des ballons de culture, c'est-à-dire qu'il s'était borné à faire un vide aussi complet qu'il est possible d'en faire un avec la trompe à eau; puis il avait scellé les tubes de culture ainsi privés d'air. Il est évident que la plus petite trace d'oxygène laissée dans le ballon était suffisante pour permettre au bacille de se développer; aussi avons-nous opéré différemment. Nous avons fait le vide avec la trompe à mercure et nous avons en outre remplacé l'air enlevé, après chaque aspiration de la trompe, par de l'azote pur ou de l'acide carbonique.

En répétant cette opération une vingtaine de fois, on obtient des ballons ne contenant plus trace d'oxygène. Dans ces conditions les bouillons ensemencés avec du bacille typhique sont toujours demeurés stériles. Nous sommes arrivés à des conclusions identiques en cultivant le bacille typhique dans des tubes scellés contenant du bouillon peptonisé.

L'analyse nous a fourni les résultats suivants, après 40 jours à l'étuve à 24° :

Volume total des gaz contenus dans le tube = 6", 38	
Acide carbonique.....	0", 34
Oxygène.....	0, 00
Acide sulhydrique.....	0, 00
Ammoniaque.....	0, 00
Azote.....	6, 00

Tout l'oxygène de l'air a été détruit, une partie s'est transformée en acide carbonique et le resté a servi à oxyder la matière organique du bouillon.

II

En étudiant avec M. J. Ogier la question de l'épandage des eaux d'égout de la ville de Paris sur la plaine d'Achères, nous avons été amenés à envisager différents problèmes relatifs d'abord au passage des microorganismes dans le sous-sol et les eaux, ensuite au sort de ces microorganismes exposés à l'air par l'épandage sur le sol. Il semble démontré, d'après les travaux de MM. Grancher, Deschamps et J. Ogier, que théoriquement le sol est un bon filtre pour les eaux et que les microorganismes sont retenus à la surface ou du moins à une profondeur de 50 centimètres au maximum. Mais que deviennent les microorganismes, le bacille typhique en particulier, lorsqu'ils se trouvent ainsi exposés à l'air à la surface du sol? Le Bacille subit-il des modifications? se transforme-t-il en spores, comme l'admettent certains savants, ou bien est-il détruit au bout d'un certain temps?

Il existe des cas de fièvre typhoïde où la contagion par l'air atmosphérique est des plus évidentes. M. Vaillard l'a démontré dernièrement au sujet d'une épidémie qui avait éclaté à l'hôpital de Saint-Louis, épidémie qui a cessé aussitôt que les locaux furent désinfectés. L'analyse bactériologique des poussières de la salle y a décelé la présence du bacille typhique provenant très vraisemblablement de déjections typhiques répandues par mégarde soit sur les draps soit sur le parquet. Que devient le bacille typhique ainsi répandu sur le sol et mélangé aux poussières atmosphériques?

Nous avons institué quelques expériences à ce sujet. Nous avons fait passer un courant d'air sec et privé de germes à travers un ballon de bouillon de culture de bacille typhique. L'air après avoir ainsi barboté à travers ce liquide de culture passait à travers un second ballon de bouillon stérile. Quelles que soient la durée de l'expérience et la quantité d'air passé à travers le ballon de culture, le second ballon témoin demeure toujours stérile. Si, au lieu de faire passer un courant d'air à travers un liquide, on le fait passer dans un ballon contenant de la pierre ponce, imbibée d'une culture de bacille typhique, les résultats sont les mêmes, à la condition que le courant d'air ne soit pas trop violent.

On obtient au contraire des phénomènes tout différents, si dans ce même ballon contenant de la pierre ponce imbibée de bouillon typhique, on fait passer non plus de l'air sec, mais de la vapeur d'eau provenant d'un autoclave chargé à 1 1/2 atmosphère. Le ballon témoin est déjàensemencé au bout d'un quart d'heure. Les globules de vapeur d'eau jouent, dans ce cas, le rôle de ballons enduits de liquide typhogène.

Dans la nature une foule de circonstances favorisent cette production de vapeur d'eau à l'état de brouillard : et d'ailleurs la statistique nous fait voir que c'est toujours au mois d'octobre, novembre, décembre et janvier que se montrent les exacerbations typhiques à Paris, en dehors, bien entendu, des années d'épidémie. Les germes typhiques ainsi répandus dans l'atmosphère ne conservent pas indéfiniment leur virulence. Ils perdent au contraire assez rapidement leur vitalité dans l'air sec ; mais avant de périr le bacille se modifie, du moins dans les conditions de nos expériences, et se transforme en petites granulations douées de mouve-

ments browniens. Ces granulations supportent très peu la dessiccation et au bout de quelques jours à peine les poussières de germes typhiques sont complètement détruites.

Dans la nature, les germes typhiques ne rencontrent que très rarement ces conditions de destruction. Le mode de propagation le plus général de la fièvre typhoïde réside dans la pollution des eaux soit par le lavage des vêtements ayant appartenu à des typhiques soit par l'infiltration des fosses d'aisances. Il semble en effet que ce soit le mode de contagion le plus fréquent, mais il n'en existe pas moins des cas où la fièvre typhoïde se manifeste d'emblée par une localisation pulmonaire. Le D^r Richardière a eu occasion de rencontrer deux cas où les malades ont succombé à des accidents typhiques pulmonaires sans lésions des plaques de Peyer. Ces pneumonies typhiques ont été signalées par Jaccoud, Potain, Lépine. Il faut donc admettre que le Bacille typhique a pénétré dans l'arbre bronchique malgré les moyens de défense et de protection que l'organisme possède ! Il faut en outre que le germe typhique lorsqu'il pénètre jusqu'aux alvéoles pulmonaires ne trouve pas dans la couche épithéliale une barrière suffisante pour arrêter la pénétration de ces germes dans l'organisme !

Le D^r Tchistovitch a démontré que normalement on peut considérer le parenchyme pulmonaire comme un élément de protection efficace contre l'infection microbienne. Les conditions ne sont plus les mêmes lorsque pour une raison quelconque la couche épithéliale des alvéoles pulmonaires n'arrête plus les germes ; ils peuvent pénétrer dans l'organisme et produire une infection générale ou bien se localiser et produire des lésions pulmonaires.

L'économie possède encore une dernière ressource : les beaux travaux de M. Metchnikoff nous ont fait voir que le poumon est une sorte de champ de bataille phagocytaire. Mais dans l'infection typhoïdique à lésions pulmonaires primitives, il semble que les phagocytes du poumon sont suffisants pour empêcher le développement du germe infectieux ; il en résulte que la contagion de la fièvre typhoïde par l'air, dans les conditions que nous avons signalées plus haut, ne peut avoir lieu que si les cellules macrophages n'opposent plus une dernière barrière à l'envahissement microbien.

D^r Frédéric Bordas



BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques.

Lonchamps (G. de), professeur de mathématiques spéciales au lycée Charlemagne. — *Les fonctions pseudo- et hyper-Bernoulliennes et leurs premières applications. Contribution élémentaire à l'intégration des équations différentielles.* Extrait du tome LII des Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers publiés par l'Académie royale de Belgique, 1889.

Ce Mémoire est divisé en trois parties; nous ne ferons que mentionner les deux premières relatives aux fonctions que M. G. de Longchamps appelle pseudo-Bernoulliennes; tout l'intérêt du travail réside, en effet, dans la troisième partie où l'auteur définit les fonctions hyper-Bernoulliennes et montre l'utilité qu'elles peuvent présenter pour l'intégration de certaines équations différentielles.

Il applique d'abord ces fonctions à l'intégration de l'équation de Riccati. Cette équation célèbre qui peut s'écrire :

$$\frac{dy}{dx} + Ay^2 = Bx^m$$

se rattache, comme l'on sait, à d'importants travaux exécutés récemment en analyse.

M. Fuchs, le premier, a étudié les équations de la forme :

$$F\left(z, y, \frac{dy}{dz}\right) = 0,$$

où les coefficients des diverses puissances de $\frac{dy}{dz}$ sont des polynômes en y , à coefficients fonctions de z , polynômes tels que le coefficient de $\left(\frac{dy}{dz}\right)^{-k}$ est, au plus, du degré $2k$ en y (1).

Lorsqu'on suppose z constant, on a une relation algébrique entre y et $\frac{dy}{dz}$; si le genre de cette relation est égal à l'unité, on sait, grâce à M. Poincaré, que l'équation est intégrable par des quadratures; si le genre est plus grand que l'unité, l'intégrale est algébrique (2).

Enfin M. Fuchs a montré que, dans le cas du genre nul, l'équation se ramène à celle de Riccati et, par conséquent, aux équations linéaires.

Il résulte de là, comme le remarque l'auteur, que l'équation de M. Fuchs, dans l'hypothèse du genre nul et de z constant, est intégrable par une fonction hyper-Bernoullienne.

M. G. de Longchamps, après avoir examiné et résolu le cas où l'exposant m est fractionnaire dans l'équation de Riccati, applique son procédé à diverses autres classes d'équations; il étudie l'équation de Boole

$$x \frac{dy}{dx} - Ay + By^2 + Cx^p = 0,$$

et la généralisation de cette équation :

$$x \frac{dy}{dx} - Ay + By^2 + Cx^p + Dx^q + \dots = 0,$$

(1) Fuchs. Ueber Differentialgleichungen deren Integrale feste Verschiebungspunkte besitzen. — *Acta Mathematica*, tome V.

(2) Poincaré. Sur un théorème de M. Fuchs. — *Comptes-rendus de l'Académie des Sciences*, 15 juillet 1884.

puis, il termine par quelques indications sur les fonctions hyper-Bernoulliennes de degrés supérieurs et sur les équations différentielles dont elles fournissent une intégrale particulière.

C'est dans ce dernier point que se trouve l'avenir de la méthode imaginée par M. G. de Longchamps; le caractère principal que l'on cherche aujourd'hui pour les nouvelles fonctions est de se prêter à l'intégration des équations différentielles; celles qui viennent de créer M. G. de Longchamps, sous le nom de fonctions hyper-Bernoulliennes, le présentent à un haut degré et ont, à ce titre, un grand intérêt. L. O.

W. M. Hicks, (F. R. S.). — *Elementary Dynamics of particles and solids.* Un volume in-8° de 397 pages. Macmillan and Co. London and New-York, 1890.

Le livre de M. Hicks est un ouvrage d'enseignement; il est spécialement destiné aux mécaniciens pour qui la connaissance de la dynamique est précieuse, mais dont l'instruction mathématique est peu étendue; il ne s'appuie que sur les éléments de l'algèbre et de la géométrie et ne suppose pas la connaissance préalable du calcul différentiel et intégral.

La statique et la cinématique sont exposées simultanément; les méthodes adoptées sont simples et claires; des exercices nombreux complètent le texte. En somme, c'est un livre bien fait et qui peut rendre des services pour l'étude de la mécanique. G. NAUD.

Durand-Claye (Alfred), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. — *Hydraulique agricole et Génie rural.* Leçons professées à l'Ecole des Ponts et Chaussées, rédigées par Félix Launay, ingénieur des Ponts et Chaussées, 2 volumes grand in-8° jésus de 500 pages environ avec figures dans le texte. Paris, 1890. Octave Doin, éditeur.

Alfred Durand-Claye, mort prématurément en 1888, a laissé une œuvre considérable; pendant vingt ans il a consacré toute son énergie à l'étude de la salubrité dans les grandes villes; aucune des questions que soulève l'hygiène publique ne lui est restée étrangère; il a été, comme on l'a dit, l'apôtre de l'utilisation agricole des eaux d'égout et son nom restera attaché à ce grand problème du tout à l'égout au sujet duquel il a montré un si remarquable talent.

Depuis 1880 Alfred Durand-Claye était chargé du cours d'Agriculture et d'hydraulique agricole à l'Ecole des Ponts et Chaussées; son enseignement était réputé, mais n'avait jamais été publié. M. Launay, ingénieur attaché au service municipal de l'assainissement de la Seine, avait été le secrétaire de la Commission de l'hydraulique agricole au Ministère de l'Agriculture; il était en situation de rédiger, sur les notes du Maître, un cours qu'il connaissait bien; c'est le premier volume de ce cours qui vient de paraître.

Ce volume est divisé en cinq livres comprenant la Météorologie, la Géologie hydraulique et agricole, la Physiologie végétale, la répartition des eaux, les cours d'eau. C'est, en quelque sorte, la partie générale du cours. Dans le second volume, qui paraîtra incessamment, seront comprises les questions des machines, de procédés agricoles, d'assainissement. Tous ceux qu'intéressent l'agriculture, le génie rural, l'aménagement des eaux, l'hygiène, consulteront avec fruit cet ouvrage si consciencieux, si complet; le plus bel éloge que nous en puissions faire, c'est de dire qu'il est digne en tous points du nom de Durand-Claye. J. POULET.

Henry (Charles), bibliothécaire de la Sorbonne. — *Application de nouveaux instruments de précision à l'archéologie*. Paris, Ernest Leroux, 1890.

Cette brochure renferme des études déjà publiées passim par l'auteur en vue d'appliquer à l'analyse scientifique des œuvres d'art des procédés exacts de mesure. L'éloge de cette tentative n'étant plus à faire, nous nous bornons à signaler la nouvelle publication de M. Henry.

2° Sciences physiques.

Himstedt (G.). — *Sur l'action électromagnétique de la convection électrique*. (Wied. Ann. déc. 89)

Si on met en mouvement un conducteur chargé, l'électricité qu'il porte se déplace avec lui, et ce déplacement de l'électricité par convection produit les mêmes actions électromagnétiques que le déplacement de l'électricité sur un conducteur ou courant électrique. C'est ce que Rowland a démontré en 1876.

Il faisait tourner très rapidement autour d'un axe vertical un disque d'ébonite doré, en communication avec un des pôles d'une batterie. De part et d'autre du disque tournant étaient deux autres disques conducteurs immobiles, en communication avec le sol. Une aiguille aimantée, suspendue au-dessus du disque, éprouvait une déviation quand on mettait en mouvement le disque supposé d'abord à l'état neutre : c'est un des phénomènes qui sont compris sous le nom de magnétisme de rotation. Mais la déviation change si le disque est chargé, elle augmente ou diminue suivant que le disque est chargé d'électricité positive ou négative. Et le sens de cette déviation supplémentaire est bien celui que donnerait l'application de la règle d'Amperé, si on cherchait l'effet sur l'aiguille aimantée, d'un courant marchant dans le sens du mouvement de l'électricité positive.

M. Himstedt a fait des expériences de mesure en perfectionnant le dispositif de Rowland, de manière à obtenir plus de sensibilité. Il prend deux disques pouvant tourner autour d'un même axe horizontal, mais indépendamment l'un de l'autre ; et suspend entre les deux, et à égale distance, un système statique de deux aiguilles aimantées.

Il a pris soin de vérifier que, si l'on fait tourner en même temps les deux disques dans le même sens, leurs effets s'ajoutent ; que si on les fait tourner en sens contraire, leurs effets se retranchent, et l'appareil ainsi construit est comparable à un galvanomètre différentiel.

Les lois du phénomène sont les suivantes :

Pour des charges égales et de signes contraires (sur un même plateau), on a des actions électromagnétiques rigoureusement égales et de signes contraires.

L'action électromagnétique est proportionnelle à la vitesse de rotation du disque.

L'action électromagnétique est proportionnelle au potentiel auquel est porté le disque tournant, tant que ce potentiel est inférieur à 4,000 volts. Cette limite supérieure, 4,000 volts, au delà de laquelle la proportionnalité n'existe plus, est toujours la même, quelle que soit la vitesse de rotation. Au delà de 4,000 volts, l'action électromagnétique croît beaucoup moins vite que le potentiel, et il arrive même un moment où elle paraît ne plus croître du tout ; comme si, au delà d'une certaine charge, l'électricité que porte le conducteur n'était plus tout entière entraînée avec lui ; comme si, dans le cas présent, « deux couches constituant un trop plein d'électricité, restaient immobiles de part et d'autre du disque, laissant le disque tourner entre elles. »

En réalité, quand le potentiel est trop élevé, la déperdition est très notable, et l'on ne peut tirer de l'expérience aucune conclusion certaine.

Bernard BUAHNE.

Colson (R.) capitaine du Génie. — *L'Énergie et ses transformations*. G. Carré, éditeur, 58, rue Saint-André-des-Arts, Paris, 1889.

L'auteur rappelle d'abord le lien que les transformations et les manifestations diverses de l'énergie établissent d'une manière indiscutable entre les phénomènes calorifiques, lumineux, chimiques, électriques et magnétiques. Il cherche ensuite à se représenter le mécanisme de ces transformations dans l'hypothèse d'un milieu transmissif ou éther, jouissant des propriétés suivantes : son élasticité est mise en jeu par les mouvements vibratoires des molécules pondérables ; il relie ces molécules et transmet leurs vibrations avec plus ou moins de facilité suivant leur forme et leur amplitude ; sa tension plus ou moins grande constitue l'état électrique des corps ; ses déplacements, enfin, produisent les décharges électriques. Dans l'état actuel de la science, cette théorie ne peut être qu'intuitive et laisse encore forcément bien des points dans l'obscurité ; mais cet essai de synthèse n'en représente pas moins un effort très louable qui a conduit l'auteur à des vues originales, principalement en ce qui concerne les phénomènes électriques.

La lecture de cet ouvrage ne suppose, d'ailleurs, que des connaissances élémentaires et il ne faut pas oublier que l'hypothèse qu'on y trouve développée prend de jour en jour une place plus grande dans les préoccupations des physiciens.

Ch. RIVIÈRE.

Salet (Georges) maître de conférences à la Faculté des Sciences. — *Traité élémentaire de Spectroscopie*. 1 vol. in-8°, Masson, 1888.

Ce traité est élémentaire par la manière dont les théories y sont exposées, les problèmes résolus, en ce sens que le lecteur n'a besoin pour le lire que de mathématiques élémentaires. De même ont été laissées de côté les recherches d'intérêt plus étroitement théorique dont les résultats ne pouvaient influer sur la pratique dans le laboratoire, et celles qui touchent aux spectres ultraviolets. Il n'est pourtant pas borné à l'exposition des simples éléments. A côté de la théorie, les faits y sont présentés avec les détails qui peuvent rendre l'ouvrage d'un usage pratique et courant et non pas seulement pour le commençant. A la suite d'un aperçu rapide de la théorie ondulatoire de la lumière et d'un exposé fort clair et poussé dans ses détails les plus importants de celle du prisme, vient un chapitre sur les spectres de diffraction et la mesure des longueurs d'onde. Il est suivi de la description des spectres métalliques des flammes, puis de ceux de l'étincelle électrique. Vient ensuite un chapitre important sur la question difficile et encore obscure des spectres des métalloïdes et des gaz, où l'on retrouve d'intéressants travaux de l'auteur. De très nombreuses figures, reproductions variées de spectres, rendent l'ouvrage commode à consulter au laboratoire. Entre autres on y retrouvera les spectres de Thalen, de Lecoq de Boisbaudran, les planches du spectre solaire d'Angström. Ce premier volume nous fait désirer que l'auteur achève promptement un ouvrage d'autant plus précieux au travailleur que rien d'aussi étendu et soigné tant pour le texte que l'exécution matérielle n'existe encore sur ces matières.

E. DEMARÇAY.

Biltz (Heinrich) et **Meyer** (Viktor). *Détermination, à la température du rouge blanc, des densités de vapeur de quelques corps simples et composés*, *Zeitschrift für physikalische Chemie*, p. 249 à 270.

Les auteurs ont évalué toutes les températures au moyen d'un thermomètre à air dont ils donnent la des-

cription; le tableau suivant résume leurs résultats numériques:

SUBSTANCE	TEMPÉRATURE	DENSITÉ
Bismuth.....	1626°	11.983
	1640°	10.125
Phosphore.....	1677°	3.226
	1708°	3.147
	1484°	3.632
Soufre.....	1719°	2.198
Antimoine.....	1572°	10.743
	1640°	9.781
Arsenic.....	1742°	5.454
	1736°	5.543
Thallium.....	1636°	16.115
	1728°	14.218
Mercure.....	1731°	7.006
Chlorure cuivreux.....	1691°	6.603
	1700°	6.441
Chlorure d'argent.....	1735°	5.698

De ces résultats les auteurs concluent que la molécule du bismuth ne renferme qu'un atome comme celle des autres métaux dont la densité de vapeur est connue (mercure, cadmium, zinc) et que d'autres expériences sont nécessaires pour fixer les poids moléculaires de l'antimoine, de l'arsenic et du thallium.

H. GAUTIER.

Erich Jäger et Gerhard Krüss. — Recherches sur le Chrome. *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 22, p. 2028 à 2054.

On sait qu'il est très difficile d'obtenir le chrome métallique dans un état de pureté parfaite, exempt d'oxyde chromique et d'acide silicique; pour cette raison les propriétés de ce métal sont mal connues et les déterminations de son poids atomique effectuées successivement par MM. Péligot, Berlin et Stewert ne sont pas rigoureusement concordantes.

Les auteurs ont entrepris une série de recherches sur ce métal et ses composés; dans ce premier mémoire ils étudient les chromates et polychromates de potassium, d'ammonium et d'argent, puis les sels doubles résultant de la combinaison de ces chromates avec le chlorure mercurique et donnent une détermination de la chaleur spécifique du chrome.

Le chromate d'ammoniaque ne peut être obtenu pur par évaporation de sa solution parce que, comme cela a lieu avec la plupart des sels ammoniacaux, il se dissocie en ammoniaque et bichromate; il faut verser une solution concentrée d'ammoniaque sur l'acide chromique solide jusqu'à ce que le chromate formé se dissolve par une légère élévation de température; les cristaux se déposent par refroidissement. Les mesures cristallographiques effectuées par M. Muthmann font ranger ces cristaux dans le système monoclinique, tandis que, d'après M. Wyruboff, le chromate d'ammoniaque est rhombique et isomorphe du sulfate de sodium.

Le trichromate d'ammoniaque s'obtient par l'action de l'acide chromique sur le bichromate.


Le tétrachromate, dont plusieurs savants avaient nié l'existence, se prépare en dissolvant à chaud le trichromate dans l'acide azotique de densité 1,39 et se dépose quand on laisse refroidir lentement.

Le trichromate de potassium se prépare en dissolvant à chaud le bichromate dans l'acide azotique de densité 1,19; il se dépose par refroidissement en cristaux


appartenant au système monoclinique, très facilement décomposables par l'eau en bichromate et acide chromique libre.

En remplaçant l'acide de densité 1,19 par un acide de densité 1,41 on obtient le tétrachromate; ces cristaux sont tabulaires et paraissent appartenir au système rhombique; l'eau les décompose aussi facilement que ceux du trichromate.


Jusqu'à présent on connaît trois sels formés par la combinaison du chlorure mercurique avec les chromates alcalins; ils répondent aux formules:




Les auteurs ont obtenu une nouvelle série de ces sels doubles dont la composition est représentée par les formules:



Lorsqu'on remplace le bichromate d'ammoniaque par le monochromate, la réaction n'est pas aussi simple; il se forme du bichromate, du chlorhydrate et un nouveau sel double



Ce dernier en présence de l'eau bouillante se dédouble, donnant encore du bichromate et du chlorhydrate, en deux chromates mercuriques basiques:



Le mémoire se termine par une détermination de la chaleur spécifique du chrome pur obtenu par la méthode de Wöhler. Cette chaleur spécifique est égale à 0,1216, ce qui donne pour la chaleur atomique 6,36 en adoptant la valeur moyenne 52,3 pour le poids atomique de ce métal.

H. GAUTIER.

Sansone (Antonio), Ancien directeur de la section de teinture à l'Ecole technique de Manchester, principal rédacteur du Journal *The Textile Manufacturer* pour la section de teinture et d'impression. **L'impression des tissus de coton, Blanchiment, Impression, Teinture.** Un volume in-8° carré de xiv-502 pages, avec atlas de 38 planches et de 14 cartes d'échantillons. Traduit de l'Anglais par J. A. MONTELLIER, chimiste, répétiteur de technologie et de chimie à l'Ecole supérieure de Commerce de Paris. Georges CARRÉ, éditeur, 58, rue Saint-André-des-Arts, Paris.

Le livre de M. Sansone publié en Angleterre, il y a deux ans environ, sous le titre *The Printing of Cotton fabrics* y a obtenu un très réel succès.

Il n'existait pas, en effet, d'ouvrages au courant de l'état actuel de cette importante industrie.

Les traités de Persoz, de Schutzenberger, de Grace Calvert, de Crookes, d'O'Neill, si excellents qu'ils fussent, ne suffiraient plus aujourd'hui, en raison des modifications profondes qu'a subies depuis quinze ans l'impression des toiles peintes.

La suppression à peu près complète de la garance, la découverte de nombreuses matières colorantes et, en particulier, de l'alizarine artificielle, l'usage des couleurs d'aniline... etc. ont amené des changements considérables dans les procédés et dans l'outillage.

Le volume de M. Sansone donne sous une forme concise tous les renseignements relatifs au blanchiment et à l'impression des tissus; il convient aussi bien à l'étudiant qui veut apprendre qu'au praticien qui y trouvera une masse de faits intéressants.

E. LEROY.

3° Sciences naturelles.

Bréal (E.). — Expériences sur la culture des Légumineuses. *Annales agronomiques*, t. XV, p. 529.

Depuis longtemps, les agronomes, M. G. Ville en tête, ont reconnu que les Légumineuses prospèrent dans des sols dépourvus de principes azotés, mais contenant les autres matières minérales indispensables aux plantes et qu'après leur récolte elles laissent la terre enrichie en azote combiné. MM. Hellriegel et Wilfarth ont vu, dans ces dernières années, que les nodosités qui existent sur les racines de ces végétaux sont remplies de bactéries et que c'est la présence de ces organismes qui les rend capables de fixer l'azote de l'air. M. E. Bréal s'est inspiré de ces observations pour se livrer à des recherches fort intéressantes qui lui ont mérité le prix Desmazières décerné par l'Académie des Sciences.

Il a reconnu notamment qu'on pouvait transporter par des inoculations les bactéries d'une Légumineuse à une autre et provoquer ainsi la naissance des nodosités. Il a cultivé dans 1 kilogramme de sable stérile deux lupins dont l'un avait été inoculé : ce dernier a donné une plante contenant quatre fois plus d'azote que la graine d'où elle provenait, tandis que le lupin voisin, non inoculé, n'avait pas augmenté l'azote de la graine. M. Bréal a observé aussi que les alternatives de sécheresse et d'humidité favorisent la formation des nodosités sur les racines des Légumineuses. Enfin un fragment de racine de luzerne garni de nodosités, planté dans un gravier stérile, a donné en une année trois récoltes qui contenaient 80 fois plus d'azote que le semis ; le gravier qui était garni des racines de la plante avait plus que doublé l'azote qu'il renfermait primitivement.

A. HÉMENT.

Moniez (R.), professeur à la Faculté de Médecine de Lille. — La Faune souterraine, extrait de la *Revue biologique du Nord de la France*, Le Bigot frères, Lille, 1889.

L'auteur a poursuivi ses recherches dans le Nord de la France et indiqué, dans son mémoire, à l'occasion des espèces rencontrées en cette région, la plupart de celles qui ont été signalées dans les eaux souterraines de divers pays. Ces espèces se rapportent en général aux termes inférieurs de la série zoologique : Rhizopodes, Infusoires, Annélides, Copépodes, Ostracodes et Cladocères. Non seulement ces classes fournissent chacune à la faune souterraine plusieurs genres et de nombreuses espèces, mais en outre celles-ci y sont le plus souvent représentées par une grande quantité d'individus. Au contraire, Crustacés supérieurs, Mollusques et Articulés sont dans ces profondeurs d'une rareté extrême. La présence de quelques Poissons (Lamproie, Anguille) semble n'y être qu'accidentelle. On connaît cependant dans certaines grottes d'Amérique des animaux de cette classe, près desquels il faut ranger un amphibien célèbre, le Protée des grottes de la Carniole.

L'étude de cette faune conduit à des conclusions importantes pour la biologie. Elle montre d'abord que les habitants normaux des eaux souterraines dérivent de la faune de surface. La plupart arrivent aux eaux profondes à la faveur des crevasses dues à l'érosion des roches, ou des fissures qui se produisent dans le sol des marais. Chez plusieurs espèces subissant cet entraînement passif ou cette émigration spontanée, beaucoup d'individus paraissent identiques aux formes de surface, « ce qui montre bien que leur arrivée dans la nappe aquifère se fait d'une manière continue et non point accidentellement ».

Il est possible que beaucoup y périssent. Mais, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que ceux qui s'accoutument de la vie à l'obscurité y acquièrent des caractères très nets d'adaptation. A quelque groupe zoologique qu'ils appartiennent, ils subissent des modi-

fications anatomiques et physiologiques d'une même sorte. Les pigments tendent à disparaître ; l'appareil visuel ou simplement sensible à la radiation se décolore, se simplifie ou s'atrophie. L'abondance des récoltes de M. Moniez et le soin qu'il a mis à les observer lui ont permis de reconnaître chez plusieurs espèces diverses étapes de leur acclimatation naturelle. Parmi celles en qui les caractères d'adaptation se sont accumulés par voie d'hérédité, plusieurs sont tellement différenciées « qu'elles arrivent à ne plus avoir que des points de contact éloignés avec leurs formes ancestrales ». Ces curieux résultats méritent à tous égards de fixer l'attention des naturalistes.

L. O.

Kowalewsky. — *Biolog. Centralblatt*, 9. 1889, p. 33 à 47 ; 65 à 76 et 127.

L'auteur a étudié les organes excréteurs des animaux inférieurs au moyen d'injections de carmin ammoniacal dans le système circulatoire. Il a recherché ensuite quels sont les organes par lesquels se fait l'élimination du carmin. Suivant que ce dernier demeure violet ou devient rouge, il en déduit la réaction de l'organe. Par cette méthode, il a distingué dans la glande verte des Crustacés trois portions physiologiquement distinctes : les sacculs terminaux à réaction acide, les canalicules à réaction alcaline, l'anse blanche à réaction neutre ; les glandes coquillères des formes inférieures ont les mêmes réactions. — Chez les Insectes, les tubes de Malpighi semblent remplacer les canalicules de la glande verte des Crustacés. Quant aux vésicules terminales de la glande verte, elles seraient représentées physiologiquement par les cellules du péricarde des Insectes ; M. Fol compare ces cellules à des phagocytes. — Chez les Mollusques, l'excrétion se fait à la fois dans les cellules excrétrices et dans les vacuoles à concrétion de l'organe de Bojanus, — ce qui peut, jusqu'à un certain point, les rapprocher des Vertébrés. — Parmi les Vers, l'excrétion se fait chez les Annélides par une petite partie du nephridium, et par les cellules chloracogènes (réaction acide). — Chez les Hirudines les relations sont très compliquées ; l'auteur se réserve de les étudier plus tard. Enfin chez les Echinodermes l'excrétion se fait par les corps de Tiedemann et la glande ovoïde (prétendu cœur) ; la réaction est acide.

A. E. MALARD.

4° Sciences médicales.

Dmitri de Ott, professeur à l'Institut clinique de Saint-Petersbourg. — Extirpation totale de l'utérus par la voie vaginale, indications modernes de la cure radicale des tumeurs malignes utérines. *Annales de gynécologie*, Paris, octobre et novembre, 1889, t. XXXII, p. 241 et 327.

Il y a tantôt un an, M. Verneuil, par la lecture d'un important mémoire à la Société de chirurgie, avait soulevé une longue discussion sur le traitement opératoire du cancer de l'utérus. Venu tout d'abord simplement pour défendre l'hystérectomie partielle, il en arriva au cours des débats à attaquer l'hystérectomie totale. Suivi par MM. Polaillon, Tillaux, Reclus et Marchand, il rencontra en face de lui des adversaires décidés et nombreux, MM. Bouilly, Pozzi, Regnier, Richelot, Routier, Schwartz, Terrier et Trélat. Comme le fait arrive souvent, la discussion fut vive mais chacun resta avec sa conviction antérieure. Il est vrai que l'hystérectomie totale, entrée depuis trois ans seulement dans la pratique des chirurgiens français, était encore bien jeune pour pouvoir lutter avec avantage contre l'amputation du col utérin. Les moyennes de survie étaient naturellement toutes en faveur de cette dernière opération. Mais comme le faisait justement observer le professeur Trélat, « il y a eu une époque où l'on eût facilement prouvé que les femmes opérées de

kyste ovarique avaient une survie moindre que les femmes non opérées (1). Qui oserait aujourd'hui songer à cette démonstration ? »

L'accumulation des faits seule pouvait permettre de trancher la question. A ce titre l'important mémoire, que vient de publier Ott dans les *Annales de gynécologie*, est d'un haut intérêt. Les trente hystérectomies vaginales, qu'a pratiquées ce chirurgien, ont toutes été suivies de succès opératoire.

Dix-sept malades ont été revues et peuvent être divisées en deux catégories : la première comprend des malades opérées de bonne heure, la deuxième des femmes qui ne sont venues que tardivement se faire traiter. Dans la première série de huit cas, on ne note qu'une récidive, après un an et un mois. Les autres malades, actuellement bien portantes, ont été revues après trois ans et deux mois, deux ans et un mois, un an et un mois, un an, un an, un an, un an. Dans la deuxième série de neuf cas, la récidive est toujours survenue rapidement après un mois, un mois, deux mois, trois mois, trois mois, cinq mois, neuf mois, dix mois, onze mois. Même dans cette dernière série, l'opération semble utile, aucun des moyens usités n'amenant un bien-être temporaire aussi parfait que l'extirpation totale de l'utérus par la voie vaginale.

Aussi Ott admet-il que l'hystérectomie totale peut être pratiquée dans un grand nombre de cas et divise-t-il les indications de cette opération en :

1° Indications relatives, correspondant aux cas où l'extirpation est considérée comme un procédé palliatif.

2° Indications absolues, correspondant à ceux où l'opération est un moyen radical de guérison des malades.

L'important pour la malade est d'être opérée de bonne heure et comme alors le diagnostic clinique est souvent difficile, Ott conseille de faire des incisions partielles préalables, de manière à trancher la question par l'examen microscopique.

Il insiste sur les précautions à prendre dans ces excisions de recherche, sur la nécessité qu'il y a à enlever des fragments assez volumineux de tissu utérin, le diagnostic histologique ne reposant souvent que sur la considération purement topographique des tissus et non sur la présence de tel ou tel tissu réputé cancéreux. Malgré toutes ces précautions, le diagnostic reste encore quelquefois impossible, de l'aveu du professeur Ott qui, comme MM. Cornil et Terrier, pense que le dernier mot n'est pas encore dit sur l'anatomie pathologique de certaines formes de cancer et sur celle de productions bénignes dépendant d'une endométrite. Dans ces cas douteux, on doit attendre avant de pratiquer l'hystérectomie et se borner à une observation systématique et prolongée de la malade, observation suivie, en cas de besoin, de raclages répétés, accompagnés chaque fois de recherches microscopiques.

Nous ne nous arrêtons pas ici à décrire la technique opératoire et les précautions qu'emploie Ott pour arriver aux résultats remarquables qu'il obtient, les

meilleurs qui aient encore été publiés. Ce sont là choses qu'on ne peut résumer et qui n'ont de valeur que lorsqu'on les lit dans le texte original. Qu'il nous suffise de dire que ce chirurgien a recours à une antiseptie rigoureuse opératoire, préopératoire et postopératoire, qu'il ne se sert pas des longues pinces à demeure (méthode Richelot), qu'il a soin dans la ligature des ligaments larges de faire un nœud perdu sur la partie supérieure de ceux-ci de manière à ne pas attirer les ovaires vers la plaie vaginale et que grâce à cet ensemble de soins il guérit ses malades sans réaction notable, sans même ces vomissements abondants que nous voyons si souvent en France, chez nos opérées, alors même que les suites doivent être des plus simples et conduisent à la guérison.

D^r HARTMANN.

Barthélemy (D^r T.), médecin au concours de Saint-Lazare. — Syphilis et santé publique.

Si, comme le faisait remarquer le professeur Fournier, on jugeait de la gravité de la syphilis d'après le bulletin municipal de statistique mortuaire, de son influence sur la santé publique d'après les compte rendus des Conseils d'hygiène, on porterait certainement un jugement contraire à la vérité. La syphilis, en effet, est au même titre que la tuberculose, l'alcoolisme, un des fléaux de notre époque. C'est là ce qui apparaît clairement quand on lit l'ouvrage que vient de publier le D^r Barthélemy, — en le dédiant à Alfred Fournier, nulle dédicace ne pouvait mieux s'adresser qu'au savant professeur qui a déjà tant fait contre ce terrible mal. — Sous une forme éminemment scientifique, l'auteur en s'appuyant sur des faits indiscutables, a su s'exprimer de façon à amener les législateurs à cette conviction, partagée par tous les médecins, qu'il est de nécessité absolue de prendre des mesures énergiques contre la propagation de la syphilis. Et cela en montrant son danger pour le malade qui en est atteint, pour ceux qui l'entourent, pour sa descendance. Il n'est pas de cause plus violente, que la syphilis, d'avortement, de mort en bas âge. A Paris sur 100 enfants conçus, 13 meurent par syphilis; ceux qui proviennent de parents en puissance de la maladie et qui ne meurent pas, vont grossir le nombre des rachitiques, des sourds, des aveugles, des épileptiques, des aliénés. Quels ravages ! quelles causes de dégénérescence de la race ! quand on songe qu'à Paris, il y a 150,000 femmes et 300.000 hommes syphilitiques !

En présence d'un semblable danger, il n'y a pas à hésiter ; des mesures restrictives de la prostitution, sa réglementation s'imposent. Lorsqu'elles s'adresseront à des malades, ces mesures, tout en étant énergiques, pourront rester bienveillantes ; mais elles sont nécessaires, elles n'ont rien d'attentatoire à la liberté individuelle, elles sont l'application d'un droit de défense sociale. Le D^r Barthélemy, faisant œuvre véritable d'hygiène, a indiqué ce que devraient être ces mesures, démontré les résultats qu'on en obtiendrait ; maintenant, aux législateurs d'agir.

D^r E. DE LAVARENNE.

George (Hector). — Leçons élémentaires d'hygiène. Paris, Delalain J., 1890.

Worms (D^r J.). — Etude clinique sur le diabète sucré. Paris, G. Masson, 1889.

Luis (J.). — Leçons cliniques sur les principaux phénomènes de l'hypnotisme dans leurs rapports avec la pathologie mentale. Paris, G. Carré, 1889.

Luis (J.). — Hypnotisme expérimental. — Les émotions dans l'état d'hypnotisme et l'action à distance des substances médicamenteuses ou toxiques, 1 vol. in-16 de 320 p. avec 28 photographures. (Bibliothèque scientifique contemporaine). Paris, J.-B. Baillière et fils, 1890.

(1) M. Trélat aurait pu dire : Il y a eu une époque où l'on a soutenu l'introduction de l'ovariotomie en France ; Velpéau (*Académie de médecine*, 25 novembre 1856) s'était en effet, quelque temps après, élevé avec énergie contre « cette opération affreuse, qui doit être proscrite quand même les guerisons annoncées seraient réelles ». Il avait démontré par les chiffres que la moyenne de survie était beaucoup plus considérable après les ponctions suivies d'injections, qu'après la cure radicale par ablation. « N'envions donc pas l'ovariotomie à nos confrères d'Amérique, s'écriait-il. La chirurgie française est aujourd'hui dans une excellente voie : à la fois très hardie et très prudente, elle doit renoncer à toute opération aventureuse ; pour qu'elle intervienne, il faut, en somme, que le remède soit moins dangereux que le mal. » La chirurgie a marché, la méthode antiseptique est venue, les statistiques d'ovariotomie ont changé du tout au tout et actuellement nous regrettons tous pour notre pays qu'il se soit si tardivement engagé dans la voie tracée par les chirurgiens étrangers. Peut-être en sera-t-il de même pour l'hystérectomie vaginale. En tous cas, le mémoire que nous analysons ici est bien fait pour entraîner cette conviction.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 24 février 1890.

SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A. Mannheim : Transformation en géométrie cinématique.

SCIENCES PHYSIQUES. — M. Carvalho demande l'ouverture d'un pli cacheté déposé par lui le 31 mai 1886, contenant la conclusion suivante : « L'influence du terme de dispersion de Briot sur la double réfraction du spath d'Islande prouve que la vibration lumineuse d'un rayon polarise rectilignement est dans un azimut perpendiculaire au plan de polarisation. » — M. J. R. Rydberg présente les conclusions, ramenées à des formules algébriques, de ses recherches sur la constitution des spectres linéaires des éléments chimiques. — M. James Moser a étudié les phénomènes lumineux qui se produisent dans un tube à air raréfié sans électrodes, au voisinage d'une bobine d'induction en activité ; plaçant un de ces tubes à l'intérieur d'un autre dans lequel on peut faire le vide à divers degrés, il observe des alternatives d'éclairage et d'obscurité, qui le conduisent à admettre que le vide n'est pas conducteur des vibrations électriques. — M. H. Le Chatelier avait démontré que la biréfringence d'une lame de quartz, graduellement chauffée, décroît lentement jusqu'à la température de 570°, puis recommence à croître ; avec M. E. Mallard, il vient d'étudier d'une façon précise la marche du phénomène, par une méthode photographique. Les auteurs ont étudié par la même méthode les variations de la biréfringence dans la barytine et le disthène. — MM. Raoult et A. Recoura ayant déterminé par l'ébullioscope la tension de vapeur des solutions de divers composés dans l'acide acétique, ont trouvé pour le rapport constant qui unit la tension de vapeur et le poids moléculaire du dissolvant et du corps dissous une valeur paradoxale. Ils remarquent que cette anomalie disparaît si l'on admet que le poids moléculaire physique de l'acide acétique liquide et bouillant est égal à celui de sa vapeur saturée. — M. C. Lefèvre a recherché quels sont les composés qui prennent naissance lorsque l'on fait réagir par la voie sèche les différents arsénates de potasse et de soude sur les oxydes de la série magnésienne. — MM. A. Etard et P. Lebeau indiquent un dosage volumétrique du cuivre très sensible, reposant sur la décoloration, par une liqueur titrée de protobromure ou de protochlorure d'étain, de la solution concentrée du sel de cuivre additionnée d'acide bromhydrique. — MM. A. Haller et Miniguin, en chauffant l'éther campho-carbonique en tube scellé avec du sodium et de l'alcool, ont obtenu l'éther éthylique de l'acide hydroxycampho-carbonique.

SCIENCES NATURELLES. — M. Ad. Chatin communique les résultats de ses analyses portant sur la composition chimique des truffes de diverses provenances, et comparativement, sur la composition du sol dans lequel ces champignons avaient poussé. — M. A. B. Griffiths ayant cultivé sur l'agar-agar peptonisé le microbe qu'il a décrit sous le nom de *Bacterium alli*, a isolé des vieilles cultures une base organique, l'*hydrocoridine*, qui correspondrait à la *coridine* de M. Gautier. — M. Gessard a étudié la fonction chromogène du

bacille pyocyanique dans divers milieux de culture ; il montre que l'on obtient toujours le pigment bleu en présence des peptones, et exclusivement la substance fluorescente verte en présence de l'albumine sans peptones. Il a trouvé pour plusieurs autres espèces de microbes l'apparition de la même fluorescence liée à la nature du milieu. — Les recherches de M. J. Chatin montrent que, dans la formation des organes reproducteurs de l'Hydre d'eau douce, on n'a jamais affaire à des noyaux libres, comme cela avait été dit, mais bien à des cellules dont le noyau énorme n'est entouré que d'une mince couche de protoplasma. — MM. P. Fischer et E.-L. Bouvier ont trouvé chez un prosobranchien senestre, le *Neptuna contraria*, que tous les organes asymétriques ont suivi le renversement de la coquille, et sont retournés symétriquement par rapport à ceux des prosobranchiens dextres ; antérieurement, l'un des auteurs avait observé, dans d'autres prosobranchiens senestres, la disposition inverse. — M. Verneuil divise les pneumococques scrotales en deux espèces : dans la première ou aérienne, qui est bénigne, les gaz sont formés presque exclusivement d'azote ; dans la seconde, ou septique, qui est maligne, les gaz sont produits par des microbes ; l'analyse n'a pas été faite. — M. F. Guyon expose les résultats de ses recherches cliniques et expérimentales sur l'anatomie et la physiologie pathologique de la rétention d'urine. — A propos d'une nouvelle mâchoire de *Dryopithecus* découverte dans le miocène moyen de Saint-Gaudens, M. Albert Gaudry montre que les caractères anatomiques de cet anthropomorphe l'éloignent de l'homme et le mettent dans l'échelle des êtres au-dessous de plusieurs des singes actuels ; il ne saurait donc être considéré comme l'ancêtre de l'homme. — M. Milne-Edwards est du même avis ; il pense que ce singe devait se tenir dans la position des quadrupèdes. — M. Emile Blanchard, comparant les faunes et les flores de l'archipel de la Sonde, d'une part, et de l'Indo-Chine de l'autre, conclut de leurs rapports que ces pays ont dû être en continuité de territoire jusqu'à une époque récente. — M. A. Is-sel a trouvé dans le calcaire éocène de Rovergno (Pavie), de nombreuses empreintes de radiolaires dont plusieurs sont incluses dans des cristaux d'albite ; ce fait prouve un métamorphisme produit sans violence sur cette couche tertiaire ; il est probablement dû à des actions hydro-thermales. — M. St. Meunier, réduisant par l'hydrogène un mélange de protochlorure de fer et de sesquichlorure de chrome, a obtenu un alliage de fer et de chrome ; oxydant cet alliage par la vapeur d'eau à haute température, il a reproduit le fer chromé naturel.

Séance du 3 mars 1890.

SCIENCES MATHÉMATIQUES. — Mlle D. Klumpke : Observation de la nouvelle planète Luther (Hambourg 24 février 1890) faites à l'Observatoire de Paris.

SCIENCES PHYSIQUES. — M. G. Lippmann expose les formules au moyen desquelles on peut, des indications des séismographes, déduire la loi des mouvements du sol. — M. H. Becquerel présente une note historique sur les piles à électrolytes fondus et fait remarquer qu'avec ces piles on pouvait utiliser la chaleur perdue par les foyers des machines à vapeur. — M. P.

Janet étudie analytiquement l'aimantation transversale des conducteurs magnétiques, telle qu'il l'a définie dans une communication précédente. — **M. Ch. Ferry** analysant les conditions nécessaires pour qu'une frange d'interférence soit localisée en un point donné, arrive à la conclusion générale que ces conditions sont les mêmes, quel que soit le mode de production des franges. — Des recherches que **MM. Ph. Barbier** et **L. Roux** ont faites sur la dispersion des dissolutions aqueuses il résulte que : 1° Le pouvoir dispersif (exprimé par le coefficient B de la formule de Cauchy réduite à deux termes) est une fonction simple de la concentration. 2° Le rapport $\frac{B}{\rho}$ (d étant la densité de la dissolution à la température de l'observation) varie très peu avec la concentration. — **M. C. Chabrie** a déterminé la densité de vapeur des chlorures de sélénium; il indique les conclusions que l'on peut tirer de ses expériences au point de vue de la décomposition de ces chlorures par la chaleur. — **MM. E. Grimaux** et **Ch. Cloez** ont étudié quelques dérivés de l'érythrite, l'*hydrofurane* et les *bromhydrines* de l'érythrite. — **M. Markownikoff** a étudié les dérivés de l'*heptaméthylène*. — **MM. H. Moissan** et **Ed. Landrin** ayant extrait du quinquina de Cusco une grande quantité d'*uricine* ont pu faire l'étude de cet alcaloïde, qui est un isomère de la *cusconine*. — **M. Th. Schlossing** a fait de nombreuses séries de recherches pour déterminer l'intensité de l'absorption de l'ammoniaque de l'atmosphère par la terre végétale. Son procédé consiste à faire circuler pendant un certain temps un courant d'air filtré sur divers échantillons de terre; l'azote à ses différents états est dosé dans ces échantillons avant et après. Le premier groupe de ces expériences portant sur des terres non calcaires, montre des absorptions qui, ramenées à l'hectare pour une année, varient de 26 à 36 kilogrammes.

SCIENCES NATURELLES. — **M. R. Dubois**, analysant la façon dont les Pholades répondent aux excitations gustatives portées sur le siphon, trouve que dans ces phénomènes intervient le même mécanisme que dans la fonction photodermaïque. — **M. Mayet** indique que pour bien mettre en évidence le noyau des globules blancs, il faut mélanger l'acide acétique au sang dans la proportion d'un tiers; il signale quelques particularités qu'il a pu observer par cette méthode. — **M. A. Chatin** achève de communiquer le résultat de ses recherches sur la composition chimique des Truffes; il fait ressortir que cette composition est indépendante de celle du terrain nourricier. — Les expériences de **M. Pagnoul** sur le développement des tubercules de pomme de terre confirment la relation étroite qui unit chez les végétaux la fonction chlorophyllienne à la production de l'amidon. — **M. L. Guignard**, par une méthode microchimique, a déterminé quels sont les tissus, qui, dans les feuilles de Laurier-Cerise et dans les embryons de l'Amandier, contiennent l'émulsine et l'amygdaline. — **M. L. Trabut** a observé un Ophrys hybride, chez lequel il a pu voir des pétales se transformer en étamines; on a donc ici un renforcement de la sexualité au lieu de l'affaiblissement normal. — **M. V. Lemoine** signale les rapports que présente la faune de Laramie (Amérique), considérée comme crétacée, avec la faune cernaysienne des environs de Reims, qui est tertiaire. — **M. A. Gaudry** fait remarquer à ce propos que le développement des êtres ne semble pas s'être accompli d'une manière identique sur l'ancien et sur le nouveau continent. — **M. E. Rivière** continuant à explorer la station néolithique de Champigny, a découvert les débris d'un squelette humain avec différents objets. — **M. Venukoff** a étudié la formation du delta de la Neva. — **M. Daubrée** présente l'*Atlas fac-simile* pour servir à l'histoire de la première période de la cartographie, par **M. Nordenskiöld**. — **M. Levasseur** présente son ouvrage sur le Brésil.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 23 février 1890.

M. Doyen (de Reims) présente les résultats d'analyses, faites avec **M. Lajoux**, d'eaux de puits contaminés. Il a trouvé par litre 25 millions de bactéries, dont 15 millions de bacilles typiques, qui se sont montrés, ainsi que d'autres cultures (charbon, diphtérie, etc., etc.) encore fertiles après congélation à -100° . L'analyse chimique a prouvé un rapport direct entre le chlore et l'acide azotique et le degré de contamination de l'eau par les matières organiques animales. — **M. Dujardin-Baumetz** lit un rapport sur une communication de **M. Nicaise** relative à l'aération par les fenêtres entr'ouvertes dans le traitement de la phthisie. Cette aération systématique de jour et de nuit, préconisée et appliquée par le **D^r Detweiler** au sanatorium de Falkenstein, aidée d'un régime suralimentaire et d'exercices de gymnastique respiratoire, a donné 24, 2 % de guérisons relatives et 43, 2 % guérisons définitives. Résultats encourageants d'une méthode qui demande à être employée dans nos climats avec une grande prudence, en l'adaptant à la résistance des malades, en la complétant par l'emploi d'un traitement pharmaceutique raisonné. — **M. Léon Danion** expose sa méthode de traitement des fibro-myômes utérins par les tampons électriques vaginaux en amadou et les renversements; elle n'a jamais produit d'accidents; ses résultats sont plus rapides et plus complets que ceux des autres méthodes.

Séance du 2 mars 1890.

M. Bertrand (de Toulon) présente une note sur la valeur, dans le diagnostic des abcès du foie et de leurs adhérences, d'un frottement, causé par une péri-hépatite adhésive, perceptible au niveau du 7^e ou 8^e espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure. — **M. Laborde** expose ses recherches relatives aux différences d'actions de substances présentant une certaine parenté. Il n'est pas indifférent, comme on a quelque tendance à le faire, de les substituer les unes aux autres. La quinine n'a pas la même action que la cinchonine, le chlorate de soude que le chlorate de potasse, surtout l'iode de sodium que l'iode de potassium; ce dernier a sur les centres nerveux, sur la tension vasculaire une action que n'a pas le premier, qu'on a pu ainsi donner à doses énormes et sans résultat dans certaines affections cardiaques. — **M. Moissan** donne les résultats de ses expériences sur les propriétés physiologiques comparées des composés chlorés et fluorés. En tant qu'anesthésique le fluorure d'éthyle n'est pas maniable et est rapidement toxique, le fluorure de méthyle produit facilement l'anesthésie sans excitation préalable, action comparable à celle du chlorure de méthyle. Des expériences, en cours, sur le fluorforme ont déjà donné d'importants résultats.

MM. Bietrot (de Reims) et **Villard** (de Marseille) sont élus membres correspondants.

D^r E. DE LA VARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 13 février 1890.

M. du Cazol présente un malade qui à la suite d'une arthrite traumatique du genou a été atteint d'une amyotrophie du triceps crural. Ce malade présente des phénomènes qui semblent démontrer l'exactitude de la théorie de Vulpian qui attribue à ces amyotrophies une origine médullaire. L'excitabilité médullaire est exagérée, et cette hyperexcitabilité se montre non seulement du côté malade, mais du côté opposé, ce qui permet d'affirmer que la moelle est atteinte dans toute son épaisseur. Elle est atteinte aussi dans toute sa hauteur; le choc du tendon rotulien détermine un cri

réflexe dont le siège se trouve dans les parties les plus élevées du myélaire. — M. **Laborde** indique un dispositif expérimental pour démontrer que le siège du cri réflexe est dans la région bulbo-protubérantielle. Il montre l'analogie qui existe au point de vue du mécanisme physiologique du cri réflexe entre l'animal privé de son cerveau et le malade de M. du Cazal. — M. **Galippe** a trouvé un nouveau micro-organisme chromogène, qu'il propose d'appeler *micrococcus roseonitens*, dans plusieurs cultures de végétaux et en particulier dans la tige du chou-fleur. Il peut être, suivant les milieux de cultures et l'âge de celles-ci, rose vif, dichroïque (jaune et vert), ou blanc opalin. — M. **P. Mégnin** a découvert dans le sinus infra-oculaire d'une oie caboue (*Sarcidiornis melanotos*), un parasite nouveau qu'il propose de nommer *Monostoma sarcidiornicola*. C'est une espèce voisine du *Monostoma mutabile* de M. van Beneden.

Séance du 22 février 1890.

M. **Gley** a observé une dissociation de la sensibilité, au cours de l'anesthésie locale produite par l'ouabaine et par la strophantine; la sensibilité au froid reparaît avant la sensibilité tactile. — M. **Rodet** réclame la priorité du procédé communiqué par M. Vincent pour l'isolement du bacille typhique. — M. **Galtier** a fait des expériences pour déterminer si la rage pouvait être inoculée par l'absorption du virus par les muqueuses; un petit nombre d'expériences ont donné un résultat positif. — MM. **Letulle** et **Vagnez** communiquent un cas de maladie de Friedrich avec autopsie; il s'agit en résumé d'un sclérose systématique du segment postérieur de la moelle avec arrêt de développement de l'organe. — M. **Besques** indique des réactions colorées permettant de reconnaître la présence dans l'urine de différents phénols. — M. **Tourneux** envoie une note sur l'intestin caudal chez l'embyon du chat.

Séance du 1^{er} mars 1890.

MM. **Blocq** et **Marinescu** communiquent les résultats de l'examen anatomique de la moelle dans un cas de maladie de Friedrich; ils pensent que le processus de cette maladie est évolutif, au lieu d'être inflammatoire comme dans le tabès. — M. **Vincent** a trouvé dans l'épithélioma pavimenteux des corps cellulaires qui ressemblent à des psorospermies; les essais de culture ont été stériles. — M. **L. Guignard** a étudié une bactériacée marine, dont les zoogées recouvrent les rochers. — Il proteste contre la façon dont M. **Van Beneden** fils interprète ses publications sur la Karyokinèse. — M. **Gréchant** a vu que l'acide cyanhydrique, en solutions au millièmes, provoque des convulsions, qui n'apparaissent pas avec des solutions beaucoup plus étendues; la mort arrive alors par l'arrêt de la respiration. — M. **Dupuy**, ayant enlevé à des cobayes le ganglion sympathique cervical, a pu retrouver les lésions oculaires, résultant de cette ablation, jusque dans la septième génération des descendants des animaux opérés. — M. **Remy-Saint-Loup** a étudié la production de la matière colorante de l'aplysie; c'est le foie qui est l'organe sécréteur de cette substance.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 7 février 1890

M. **Lippmann** fait une communication sur le phénomène du retard d'électrolyse. Comme M. Pellat l'a montré dans la dernière séance, il existe une valeur minima M pour la force électromotrice E, en deca de laquelle n'apparaît jamais une bulle d'hydrogène dans de l'eau acidulée en contact avec une cathode en mercure; mais l'électrolyse ne se produit pas nécessairement quand E dépasse M; E peut encore croître de un volt sans que l'électrolyse commence. L'équilibre

s'établit entre la force électromotrice de polarisation et la force électromotrice du circuit, mais l'expérience ne peut durer qu'un temps de plus en plus court au fur et à mesure que la différence E — M va en augmentant. M. **Lippmann** examine les diverses explications possibles du phénomène: formation d'un hydrure inconnu d'eau, dissolution sursaturée d'hydrogène, formation d'un hydrure de mercure; toutes ces hypothèses rencontrent de sérieuses objections. Ne devrait-on pas plutôt considérer ce retard, analogue à celui qui se produit dans un grand nombre de réactions chimiques, comme dû à une certaine élasticité de la molécule se manifestant avant la rupture qui produit la décomposition. — M. **Ch. Ed. Guillaume** parle de la théorie des dissolutions. Dans un mémoire très important, M. **Heilmoltz** a calculé la différence D, entre l'énergie libre du gaz hydrogène et oxygène dissous dans l'eau et celle de l'eau à l'état liquide; la valeur de D dépend des volumes spécifiques des gaz en dissolution. Si l'on suppose que ces volumes peuvent prendre toutes les valeurs positives, on voit que D s'annule pour une certaine valeur critique de la concentration; au-dessous de cette concentration l'eau doit se décomposer spontanément; ce qu'il démontre la nécessité de la dissociation. Dans un examen serré de cette théorie, M. **Guillaume** montre que cette valeur critique est telle que les atomes gazeux sont trop éloignés pour pouvoir, en réalité, exercer une action sur l'équilibre général du liquide; il se demande si cette contradiction n'est pas due à l'impossibilité d'attribuer toutes les valeurs positives aux volumes spécifiques; l'imperméabilité de la matière d'une part; la notion de concentration critique d'autre part, semblent indiquer l'existence d'une limite inférieure, et d'une limite supérieure. — M. **Guillaume** présente ensuite des appareils pour l'étude des thermomètres à mercure destinés au laboratoire d'enseignement à la Sorbonne. — M. **Bouty**, directeur du laboratoire, met ces appareils à la disposition des physiciens qui auraient des thermomètres à étudier. — M. **Th. Homen** lit un mémoire intitulé: sur la résistance électrique du gaz.

Lucien POINCARÉ.

ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 13 février 1890.

Le Dr **Schmarda** présente un mémoire du Dr **Alfred Nalepa**, professeur à l'école normale de Linz, intitulé: « Sur l'acarus de la galle. » — M. **Weiss** commente un mémoire qui a pour titre « détermination de la trajectoire du météore du 23 octobre 1889 par le professeur Niessl à Brunn ». Des riches matériaux d'observations rassemblés à l'Observatoire de l'Université de Vienne, il résulte que le météore qui est apparu le 23 octobre 1889 à 5 h, 22 de temps moyen de Vienne à 170 kilom. au-dessus de la contrée de Hajós près de Kaloza en Hongrie s'est déplacé suivant une trajectoire inclinée de 28° sur l'horizon et dirigée dans l'azimut 341° jusqu'à 36 kil. 6 au-dessus de la région comprise entre Neutra et Tapolezan, où il s'éteignit. La lumière du météore était verdâtre; le diamètre de la sphère lumineuse atteignait 300^m; la vitesse géocentrique, d'après une discussion soignée de 21 observations relatives à la durée du phénomène peut être évaluée à 22 kilom. au moins; d'où on déduit que sa vitesse héliocentrique est de 32 kilom (valeur minima). La trajectoire a l'aspect hyperbolique. Le point d'apparition avait la position suivante:

$$\alpha = 311^{\circ}, \delta = -41^{\circ}3$$

Cette position permet un rapprochement avec deux phénomènes analogues observés en octobre et décembre.

Emil WEYR,
Membre de l'Académie.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 13 février 1890.

1^o SCIENCES PHYSIQUES. — Le général **G. S. Walker** présente quelques remarques au sujet de l'unité de longueur d'une échelle-étalon, construite par Sir Georges Shuckburgh. Dans les déterminations de la longueur du pendule à secondes qui ont été faites par Kater, à Londres, et par Sabine, à Greenwich, on s'est servi, pour mesurer la distance entre les deux extrémités du pendule, d'une échelle-étalon construite par Sir Georges Shuckburgh, M. le commandant Desforges (du service géodésique français), a entrepris, à la demande du général Walker, l'étude comparative de la portion de cette échelle dont se sont servis Kater et Sabine et d'un des mètres étalons du Bureau international des Poids et Mesures. L'échelle a été comparée avec l'étalon métrique français de laiton N, à la température de 48° F, et on a constaté que la distance entre la division 0 et la division 39,4 de l'échelle de Shuckburgh était égale à 1^m,0006273. En ramenant à la température de 62° F (température à laquelle on opéra Kater et Sabine), on obtient le chiffre de 1^m,0007619 ou 39,460428 poudces. Ainsi la longueur réelle de l'espace entre 0 et 39,4 sur l'échelle de Shuckburgh peut être regardée comme ne différant que d'environ 0,0004 de pouce de la quantité qui est indiquée sur l'échelle.

— **M. Edward Matthey** étudie la liquation des alliages d'or et de platine. On sait que, lorsqu'après avoir fait fondre les alliages de certains métaux, on laisse se refroidir la masse en fusion, quelques-uns des métaux composants se séparent et s'accumulent, soit au centre, soit à la périphérie de la masse solidifiée; on donne à cette séparation le nom de liquation. On n'a encore cependant que peu d'observations sur la liquation de l'or. Il passe chaque année de main en main pour plusieurs millions sterling d'alliages d'or, sur la foi d'essais faits sur des échantillons prélevés sur les parties externes des lingots; ces essais, naturellement, ne méritent aucune confiance, si la composition du lingot n'est pas la même au centre et à la périphérie. L'auteur a fait porter ses expériences sur les alliages d'or et de platine; il a constaté que la méthode ordinaire d'essai ne donne pas le pourcentage net de l'or et du platine dans la masse entière. On fond dans un moule spécial de 3 poudces de diamètre un alliage d'or et de platine, et on coupe en deux les sphères ainsi obtenues. On a prélevé des échantillons à l'intérieur et à l'extérieur des sphères et on les a essayés. Avec une sphère contenant 880 d'or et 50 de platine, on a observé dans le pourcentage de l'or une différence maxima de 0,32 (887 à l'extérieur, 883,8 au centre); pour le platine, on a trouvé 47,6 à la périphérie et 52,3 au centre. Des variations analogues dans le pourcentage de l'or ont été constatées dans d'autres sphères. On peut conclure que, par suite de la liquation, le platine s'amasse au centre de l'alliage.

— Le Professeur **G. Norman Lockyer** dans une précédente communication sur le spectre de la Nébuleuse d'Orion avait démontré par des observations faites à l'aide du sidérostat que la raie principale de la nébuleuse coïncidait avec l'extrémité la plus brillante de la bande du magnésium (λ 5006,4). Il s'est servi du même appareil pour comparer directement les raies de la nébuleuse avec les raies de l'hydrogène vues dans un tube vide et les raies du fer, telles qu'on les obtient en faisant jaillir l'étincelle électrique entre deux pôles de fer; on les a mises successivement en face de la fente d'un collimateur secondaire. Voici quels ont été les résultats.

1. La troisième raie de la nébuleuse coïncide avec la raie de l'hydrogène.

2. La seconde raie de la nébuleuse coïncide avec la raie du fer λ 4956,8.

3. La raie la plus brillante de la nébuleuse est moins réfrangible que les raies de l'azote, mais elle coïncide

exactement avec le bord le moins réfrangible de la bande du magnésium. — Le même auteur étudie les photographies du spectre de la nébuleuse d'Orion. L'auteur, avec l'aide de **M. Fowler**, a obtenu sur une même plaque des photographies du spectre de la nébuleuse d'Orion et du spectre du magnésium incandescent. Le temps de pose a été porté jusqu'à 4 heures; il existe une ressemblance fort remarquable entre toutes les photographies. Une photographie obtenue après une exposition de trois heures à la lumière de la partie brillante de la nébuleuse qui est située en dedans du trapezium, contient au moins 28 raies; 8 d'entre elles tombent entre F et G. Les raies principales sont au voisinage de λ 500,495, des raies de l'hydrogène en F, G, h et II, et la forte raie de l'ultra violet au voisinage de λ 3 β . On a construit une courbe d'après les longueurs d'onde connues de ces raies et elle a permis de déterminer les longueurs d'onde des autres raies. Des raies très marquées se trouvent au voisinage de λ 4470, 3886 et 3868 et des raies plus faibles au voisinage de λ 4027 et 4045. Des raies plus faibles encore se trouvent au voisinage de λ 3933 (K), 4226, 4690 et 4735; toutes ces raies sont dues, semble-t-il, au carbone ou à des métaux à basse température. Quelques-unes des raies principales semblent coïncider avec les raies brillantes principales de P du Cygne. Dans la photographie où la raie principale de la nébuleuse coïncide sensiblement avec la bande du magnésium, la raie ultra-violet de la nébuleuse semble coïncider avec la moins réfrangible des trois bandes du magnésium en λ 3730.

Séance du 20 février 1890

SCIENCES NATURELLES. — Le Dr **A. Sheridan**, étudie comparativement des digestions naturelles et artificielles. Il existe dans la digestion naturelle des facteurs fort importants qui font défaut dans les digestions artificielles. Les principaux sont 1) le mouvement constant de la masse en digestion, 2) l'élimination constante des produits, 3) l'addition constante de nouvelles quantités de suc digestif. Afin de se débarrasser en partie du moins de ces difficultés, on a placé la substance en expérience dans un tube en U de parchemin, maintenu à 40° C, par un bain d'eau chaude. Le tube contient également le liquide digestif; il est placé dans un bain dont la composition est la même que celle du liquide digestif, sauf qu'il ne renferme point de ferment et il est maintenu en mouvement constant. Par ce moyen, on est venu à bout de la première et de la deuxième difficulté, mais non de la troisième. L'étude comparative des résultats obtenus par ce procédé et de ceux de la digestion *in vitro* montre : que la digestion salivaire est plus complète dans le dialyseur qu'*in vitro* (réaction de l'ode); que les bactéries ont moins de tendance à se développer dans le dialyseur; que la quantité d'amidon converti en sucre est plus grande dans le dialyseur qu'*in vitro* et que la proportion de dextrine qui reste comme résidu est moindre; que dans le cas des solutions diluées il y a peu de différence entre ce qui se passe *in vitro* et ce qui se passe dans le dialyseur; que la faible quantité de dextrine que l'on trouve comme résidu justifie cette hypothèse que dans des conditions favorables tout l'amidon est converti en sucre dans le tube digestif; que le sucre formé est surtout de la mélasse. Voici maintenant ce qui concerne la digestion hypnique. Les matières protéiques contiennent toujours de grandes quantités de leucine et de lysine, lorsqu'elles sont soumises à la digestion artificielle, tandis qu'on en retrouve à peine des traces dans les digestions naturelles. Elles disparaissent donc à mesure qu'elles se forment ou bien ne se forment pas du tout. Mais comme l'action de la trypsine sur les premières peptones formées donne naissance à ces substances, il est probable que les peptones sont soustraites au fur et à mesure à l'action des ferments digestifs. La substance sur laquelle on a expérimenté, est la fibrine

à divers états. La digestion est beaucoup plus complète dans le dialyseur que *in vitro*, lorsqu'on opère sur de la fibrine bouillie et séchée par l'alcool et l'éther. Si l'on se sert de fibrine simplement bouillie et séchée par la pression, la dissolution des matières protéiques est plus complète dans le dialyseur que *in vitro*. Si l'on opère sur la fibrine séchée à l'air n'ayant subi aucune autre préparation, la quantité de leucine et de tyrosine est un peu plus grande *in vitro* que dans le dialyseur. — **M. Ernest W. L. Holt** décrit quatre stades du développement du cerveau chez le *Clupea harengus*, 1) premier stade larvaire, 2) premier stade post-larvaire, 3) stade du $\frac{1}{2}$ pouce, 4) stade du $\frac{3}{4}$ pouce. Au premier stade on remarque que le cerveau présente une courbure très marquée dirigée vers le bas, cette courbure est due à la forme de la tête. La voûte du cerveau est très mince et pénètre dans le thalamencéphale. Les extrémités des couches optiques sont vésiculeuses, les ventricules optiques n'existent pas en avant du cerveau moyen et ne sont que partiellement développés plus en arrière. Le corps pituitaire est opposé à la voûte du palais, il est borné en avant et latéralement par l'infundibulum et en arrière par la notochorde. Au second stade l'axe crânien se redresse en raison du développement rapide des cartilages oraux et trabéculaires qui poussent en avant la partie antérieure du cerveau. Le cerveau moyen est grand, et le pli cérébelleux s'aplatit au milieu; l'infundibulum est un sac à parois minces et à peine plissées. Au troisième stade un septum median de teinte pâle apparaît entre les deux ventricules optiques à la partie antérieure; les lobes olfactifs se projettent en avant sous la forme de masses bulbueuses et le cervelet, qui a beaucoup augmenté de volume, se continue en avant sous la forme d'un repli épais. Dans le quatrième stade le cerveau s'aplatit très nettement et de larges cellules ganglionnaires apparaissent dans les *torisemicirculares*. Derrière la région des nerfs auditifs, il existe une aire ganglionnaire qui va d'un côté à l'autre à travers la moelle. Voici maintenant ce qui concerne le développement des régions pinéales: dans les premiers stades la voûte du thalamencéphale consiste en une simple rangée de cellules. La cavité infrapinéale commence à apparaître au troisième stade, beaucoup plus tard que chez le Saumon: à ce stade la glande pinéale présente une cavité ouverte qui contient un liquide albumineux coagulable; plus tard le cartilage crânien recouvre la glande pinéale. Elle subit une contraction plus considérable que chez le Saumon, mais cette contraction n'a pas la valeur morphologique de celle qu'on observe chez le Petromyzon. — **M. Sheridan Delephine** décrit une fermentation qui détermine la séparation de la cystine. L'analyse d'un grand nombre d'urines contenant de la cystine a amené l'auteur aux conclusions suivantes: 1) l'addition d'un acide dans lequel la cystine est insoluble ne suffit pas à déterminer la séparation de la cystine, ce qui semble établir que la théorie généralement admise sur l'état où se trouve la cystine dans l'urine n'est point exacte; 2) Il existe dans l'urine un composé qui sous l'influence d'une fermentation donne naissance à la cystine, 3) Cette fermentation est due au développement d'un organisme qu'on peut séparer de l'urine par simple filtration; c'est donc un organisme de grande dimension, peut-être une torula, 4) Les cas où l'on a trouvé de la cystine dans les reins et le foie prouvent que la fermentation peut commencer dans l'économie. — **M. le Dr J. Gnezd**a a étudié une réaction du cyanogène dans les matières protéiques. En examinant les réactions colorées des matières protéiques, il est arrivé à ce résultat qu'elles sont dues à la présence dans ces matières du cyanogène ou de quelque radical qui contient du cyanogène. Il a également constaté qu'en modifiant un peu le réactif, on peut s'en servir pour distinguer très exactement les unes des autres ces diverses classes des matières protéiques. La modification la plus importante résulte de la substitution de l'ammoniaque à la

potasse ou à la soude, ou à son addition à ces bases. Quand on ajoute du sulfate de cuivre et de la potasse à de l'albumine ou à de la globuline, il se produit une coloration violette. Les mêmes réactifs donnent avec les peptones et les albuminoïdes une coloration d'un beau rouge. Le sulfate de cuivre et l'ammoniaque donnent avec l'albumine une coloration bleue, qui passe au violet, si l'on ajoute de la potasse; le sulfate de cuivre et l'ammoniaque donnent avec les peptones et les albuminoïdes une coloration violette, qui passe au rouge, si l'on ajoute de la potasse. On peut se servir pour une réaction analogue du sulfate de nickel.

Séance du 6 mars 1890.

1° SCIENCES PHYSIQUES. — **Lord Rayleigh**: Sur la tension des surfaces liquides récemment formées. Marengoni a émis l'hypothèse que la possibilité d'extension des surfaces liquides et la viscosité superficielle sont dues à la présence sur le liquide d'une pellicule constituée par une substance dont la force capillaire est moindre que celle de la masse. Si tel est le cas, et si la basse tension des solutions de savon par rapport à celle de l'eau pure est due à une pellicule, la formation de cette pellicule doit être une question de temps; pour éclaircir ce point, on a examiné les propriétés de la surface liquide immédiatement après sa formation.

Les figures 1 et 2 représentent l'appareil dont on s'est servi.

Le liquide soumis à l'examen était contenu dans un flacon ordinaire, de 6^m 8 de diamètre, auquel était soudé vers le bas un tube de 0^m 1 courbé à angle droit. Une ouverture elliptique de 0^m 001 sur 0^m 002, était percée dans une mince feuille de laiton, scellée par du ciment à l'extrémité du tube. Cette ouverture était à environ 0^m 15 au-dessous du bord, vers le milieu du flacon; ce qui servait à déterminer la position de la surface libre au moment de l'observation. Un jet liquide s'échappant par un orifice de cette espèce prend la forme d'une chaîne; la période complète λ , qui correspond à deux anneaux de la chaîne, est la distance parcourue par une partie donnée du liquide pendant le temps occupé par une vibration transversale complète de la colonne autour de sa position cylindrique d'équilibre. On a obtenu des photographies agrandies du jet liquide, et la figure 3 est la reproduction de la photographie d'un jet d'eau. La distance 2λ est celle qui sépare les points A et B.




Fig. 1 et 2.



Fig. 3.

Le tableau suivant se rapporte à des expériences où l'on s'est servi d'oléate de soude. Toutes les longueurs sont données en millimètres.

	Eau	Oléate	Oléate	Oléate	Oléate
		1 p. 40	1 p. 80	1 p. 400	1 p. 4000
22.	40.0	45.3	44.0	39.0	39.0
h	31.5	11.0	11.0	11.0	23.9

h représente la hauteur du liquide dans un tube capillaire. Les valeurs trouvées pour h montrent, ce qui a déjà été établi, que dans de larges limites les tensions superficielles des solutions de savon, déterminées par le moyen des tubes capillaires, sont presque indépendantes de la richesse des solutions. On peut aisément montrer que, *ceteris paribus*, la valeur de la tension capillaire T varie comme λ^2 , de telle sorte que pour voir si l'addition d'une petite quantité de savon fait varier la tension capillaire de l'eau, il suffit de comparer la longueur d'onde λ dans les 2 cas, en ayant soin que dans les deux cas la dimension de l'ouverture et la hauteur du liquide soient pareils; c'est ce qui a été fait dans les expériences rapportées ici. — On a également comparé l'eau pure avec la saponine; on s'est servi d'une infusion de châtaignes de cheval (poids spécifique 1,02), diluée avec six fois son volume d'eau. Quelques photographies ont donné les résultats suivants :

$$2\lambda(\text{eau}) = 39.2 \quad 2\lambda(\text{saponine}) = 39.8$$

$$h(\text{eau}) = 30.5 \quad h(\text{saponine}) = 20.7$$

On voit ainsi que bien que les hauteurs capillaires diffèrent beaucoup, les tensions au début sont presque égales, ce qui montre que, dans ce cas, comme dans celui du savon, on peut regarder comme prouvé, ce fait que l'abaissement de la tension est dû à la formation d'une pellicule. — Prof. J. W. Mallet : L'argent dans les poussières volcaniques. Second cas observé : éruption du Junguragua (Andes de l'Equateur). L'auteur, il y a trois ans, a signalé la présence d'une petite quantité d'argent dans un échantillon de poussière volcanique qui provenait de l'éruption du Cotopaxi. Il a analysé un échantillon analogue qui provenait de l'éruption du Junguragua en janvier 1886. Il a fait avec grand soin des essais par la voie sèche et par la voie humide, qui lui ont permis d'évaluer la quantité d'argent à environ une partie pour 107,200 parties de cendre. La cendre du Cotopaxi contenait une partie d'argent pour 83,000 de cendre.

2^e SCIENCES NATURELLES. — Dr J. C. Ewart : Sur le développement du ganglion ciliaire ou moteur oculaire. L'auteur a examiné les nerfs crâniens d'un certain nombre d'Elasmobranches à divers stades de développement; il a constaté que le ganglion ciliaire est dans les mêmes relations avec l'un des nerfs crâniens (le n. ophtalmique profond) que les ganglions sympathiques du tronc avec les nerfs rachidiens; on peut donc considérer le ganglion ciliaire comme un ganglion sympathique. Des recherches ultérieures ont montré que les ganglions qui sont en rapport avec les branches du tronc (5^e paire) peuvent être considérés également comme appartenant au système sympathique. — Dr J. C. Ewart : Les nerfs crâniens de la Torpille. Il a constaté que le tronc nerveux n'envoie pas de branches aux organes électriques; le nerf lyomandibulaire contient un gros faisceau de fibres qui se rendent à la partie antérieure et inférieure de l'organe électrique. On constate que ce gros cordon nerveux a son origine dans la partie antérieure du lobe électrique. Le nerf glosso-pharyngien est un gros cordon nerveux, qui passe par une large ouverture de la paroi externe de la capsule auditive. Ce gros nerf est formé de deux parties distinctes : l'une d'elles, petite et plus profonde, est entièrement recouverte par l'autre, qui innerve la moitié antérieure de l'organe électrique. Les deux premiers nerfs branchiaux qui dépendent du nerf vague sont accompagnés des troisième et quatrième nerfs électriques. On voit donc que tous les nerfs électriques naissent du lobe électrique.

R. A. GREGORY.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 21 février 1890.

M. Hawes montre des photographies de l'intérieur d'un transmetteur téléphonique Blake sur lequel du charbon s'est déposé. La portion considérée du transmetteur se compose d'un diaphragme en métal, d'un bouton de charbon poli, et d'un contact en platine porté par un ressort en maillechort placé entre eux. Le diaphragme présente un aspect moucheté dû au dépôt, mais la partie en contact avec le maillechort reste comparativement nette. Le dépôt est très adhérent; un examen microscopique y fait soupçonner des particules de cuivre et des cristaux métalliques. M. Hawes attribue le dépôt à un « bombardement » de particules de charbon. M. Boys dit que les photographies présentées lui rappellent un phénomène qu'il a eu occasion d'observer sur une glace de verre à laquelle aboutissait le pôle d'une pile: le verre restait net aux environs du contact, un dépôt se formait tout autour; il ne connaît d'ailleurs pas l'explication de ces apparences.


M. Trotter lit un mémoire sur la « construction géométrique d'une échelle à lecture directe pour galvanomètres à réflexion ». Dans le récent mémoire sur les galvanomètres de MM. Ayrton, Mather et Sumpner que nous avons précédemment analysé, on avait exprimé le désir que l'on pût obtenir une exacte proportionnalité entre la lecture sur la règle et l'intensité du courant. M. Trotter a résolu le problème. Supposons, dit-il, que l'on ait déterminé expérimentalement les courants nécessaires pour produire diverses déviations; considérons le plan de l'échelle, et traçons dans ce plan des rayons partant du centre du miroir et aboutissant à l'échelle soit 1, 2, 3, ... Ces rayons comptés à partir de l'azimut zéro, on marque sur le bord d'une bande de papier des distances proportionnelles aux intensités, soit a, b, c, d , les points de division ainsi obtenus, a correspondant au zéro; déterminons, sur les rayons zéro et un, deux points, équidistants du miroir, tels que leur distance soit égale à ab ; marquons sur la table par deux aiguilles la position de ces points, et fixons l'extrémité zéro de la bande de papier de telle façon que les points a et b coïncident avec les aiguilles; on tourne la bande de papier jusqu'à ce que le point c vienne sur le rayon 2; on fixe alors en ce point une aiguille et l'on continue à opérer de la même façon. On détermine ainsi un polygone; la limite commune des courbes inscrites et circonscrites à ce polygone répond à la question proposée; une échelle ainsi construite fournit des indications proportionnelles à l'intensité du courant. L'auteur montre que l'on peut tracer une famille de courbes résolvant le problème. M. Schwinburne demande si une échelle dont les points ne sont pas équidistants du miroir ne serait pas bien incommode en pratique, et si l'on n'obtiendrait pas d'aussi bons résultats, en divisant simplement une échelle plane en degrés proportionnels aux intensités. M. Trotter répond que le Dr Sumpner estime qu'il n'y a aucune difficulté dans l'emploi d'une échelle courbe; l'observation peut d'ailleurs se faire en employant une lumière parallèle, pour la mise au point simultanée dans toutes les parties de l'échelle.

M. Trotter décrit « un parallélogramme articulé pour instruments enregistreurs. » L'appareil est un parallélogramme de Watt modifié de telle façon qu'un point décrivant une droite, un autre décrit une conchoïde de Nicomède, qui se confond, dans le voisinage d'un certain point, avec un cercle osculateur le long d'un arc assez étendu. L'auteur estime que cette modification peut rendre service dans la construction des baromètres, ampères-mètres, et voltmètres enregistreurs.


SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 20 février 1890.

MM. Bailey et Hopkins : Action des températures élevées sur les oxydes. Les auteurs concluent que par l'action de températures très élevées sur l'oxyde de cuivre on obtient un sous-oxyde répondant à la formule Cu_2O . — **MM. Fowler et Grant** : Influence des différents oxydes sur la décomposition du chlorate de potasse. 1° Les oxydes acides (V_2O_5 , WO_3 , U_3O_8) provoquent le dégagement d'oxygène à basse température, il se dégage en même temps du chlore et il se forme un métavanadate, tungstate ou uranate :



2° le sesquioxyde de chrome donne un chromate, du chlore et de l'oxygène :



3° Les sesquioxydes de fer, de nickel et de cobalt, agissent comme l'oxyde de cuivre et le bioxyde de manganèse. L'oxyde n'est pas sensiblement altéré. 4° En présence de l'oxyde d'argent et du bioxyde de baryum, le chlorate de potasse agit comme réducteur et se transforme en perchlorate. — **MM. Cross et Bevan** : Action des hypochlorites sur les sels ammoniacaux. — **MM. Stanley, Kipping** : Action de l'anhydride phosphorique sur l'acide stéarique. Quand on chauffe vers 200° des poids égaux d'acide stéarique et d'acide phosphorique, il se produit la réaction :



M. Doxon : Semithiocarbazides. — **M. Tudor Can-dall** : Note sur la production de l'ozone par les flammes.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 16 janvier 1890

Nous n'avons à signaler dans cette séance qu'un travail de **M. Hermann-Munk** sur la sphère de vision et le mouvement des yeux.

Séance du 30 janvier 1890

M. Kronecker expose les résultats de ses recherches sur la théorie des fonctions elliptiques.

Séance du 6 février 1890.

M. Kronecker lit un mémoire sur la sommation de la série (ξ, η, ν, ω) .

Séance du 13 février 1890.

M. Auwers communique les recherches de **M. Scheiner** sur les spectres des étoiles du type I d'après les photographies spectrales exécutées à l'observatoire de Potsdam pendant les années 1888 et 1889. Les spectres des étoiles du type I sont caractérisés par les larges raies de l'hydrogène, les raies des autres métaux ne sont qu'assez faibles. Dans les spectres des étoiles : α d'Orion, ε d'Orion et β de Persée l'auteur a rencontré deux raies correspondant aux longueurs d'onde 448,14 et 447,4. La première se borne au spectre du soleil et appartient au magnésium, l'autre manque

au spectre solaire mais paraît être identique à celle que Copeland a découverte dans le spectre de la nébuleuse d'Orion. Aussi longtemps que ces raies se présentent seules, elles sont larges comme celles de l'hydrogène, mais dès que d'autres raies apparaissent, surtout celles du fer, elles deviennent plus faibles. Dans les spectres des étoiles du type I les raies sont bien limitées, mais il s'en trouve beaucoup, qui ne peuvent être identifiées à celles du spectre solaire, ou dont les intensités diffèrent de celles des lignes correspondantes du spectre solaire. Cela se rapporte surtout aux lignes du fer, par exemple pour α du Cygne, de sorte qu'il faut conclure que la vapeur de fer s'y trouve à des températures tout à fait différentes de celles qui régnent dans le Soleil. — **M. Beynstein** a photographié l'image qu'un point lumineux réfléchi par un petit miroir fixé à la plaque vibrante d'un téléphone, projette sur un tambour en rotation. Il a examiné de cette manière surtout la durée des courants d'induction donnés par un appareil à charriot de du Bois-Reymond. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de circuit secondaire la courbe monte et tombe momentanément, tandis qu'en présence d'un circuit secondaire les deux branches de la courbe sont égales. Sans circuit secondaire l'intensité du coup de fermeture est presque triple de celle du coup d'ouverture ; lorsqu'on intercale au contraire dans la bobine primaire un circuit secondaire libre d'induction, l'intensité des deux coups est presque la même. Ces expériences sont en concordance complète avec la théorie de l'induction donnée par **MM. Helmholtz** et du Bois-Reymond.

D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉ PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 7 mars 1890.

M. Rubens fait communication en son nom et en celui de son collaborateur **M. Ritter** de leurs expériences sur l'emploi du bolomètre pour la démonstration des vibrations électriques. Leur méthode a les deux grands avantages d'être très sensible et de se prêter à des mesures quantitatives. Les expériences se rapportaient surtout aux phénomènes de polarisation donnés par un réseau. Dans le petit tableau suivant φ donne l'angle que forment les fils du réseau avec la direction des oscillations, γ donne l'élongation du galvanomètre, donc, puisque le bolomètre mesure l'énergie, le carré de l'amplitude. Pour les oscillations réfractées on a :

φ	γ	$\frac{\sqrt{\gamma}}{\sin^2 \varphi}$
90	105	10,25
67,5	70	10,02
60	55,5	9,95

et pour les rayons réfléchis :

φ	γ	$\frac{\sqrt{\gamma}}{\cos^2 \varphi}$
0	104	10,20
22,5	82	10,55
50	59,5	10,25
45	25	10,12

On voit donc que, conformément aux formules de Fresnel, le rapport de l'amplitude au carré du sinus et du cosinus de l'angle φ est sensiblement constant. La méthode se prête même à une démonstration objective des effets du réseau.

D^r HANS JAHN.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance du 2 mars 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. **Pincherle**, Sur les systèmes récurrents de fonctions. — M. **Reina**, Sur les lignes conjuguées d'une surface.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. **Righi** rappelle ses expériences sur les ombres électriques, et donne la description des appareils et des dispositions qui lui ont permis de démontrer comment la convection électrique se produit suivant les lignes de force, même lorsque la dispersion est faite par une flamme ou par un métal chauffé au rouge. Dans tous les cas où il y a dispersion d'électricité, elle se produit par convection, et les particules en mouvement suivent les lignes de force du champ dans lequel elles se meuvent. En raréfiant l'air, on devrait obtenir des trajectoires s'éloignant de plus en plus des lignes de force, jusqu'à devenir presque rectilignes avec une grande rarefaction, comme il arrive pour les particules de matière radiante dans les tubes de Crookes. M. Righi se propose de vérifier s'il existe vraiment ce passage de l'une à l'autre des deux conditions extrêmes du phénomène. — M. **Pisati** continue ses recherches sur la propagation du flux magnétique dans le fer, ayant déjà reconnu que ce flux se propage comme la chaleur dans une barre chauffée à une extrémité. Avec de nombreuses observations, l'auteur a construit des tables et tracé des courbes, au moyen desquelles il se propose, dans une nouvelle note, de trouver : 1^o la loi des variations du flux d'une section à l'autre, lorsque le courant exciteur est constant ; 2^o la loi du flux dans une section donnée, lorsqu'on fait varier le courant exciteur. — M. **Boggio-Lera** étudie la relation qui existe entre le coefficient de compressibilité cubique, le poids spécifique et le poids tonique des métaux. Il a déterminé le coefficient de compressibilité de l'acier, de l'argent, de l'or et du platine, à l'aide de la théorie dynamique de la chaleur, et de quelques expériences d'Edlund sur les chaleurs spécifiques de ces métaux. M. Boggio-Lera, rappelant les résultats obtenus par Regnault, Everett et Amagat avec d'autres substances, trouve que le coefficient de compressibilité cubique d'une substance, est proportionnel au nombre de molécules qui entrent dans l'unité de volume, et à la variation de la distance entre deux molécules consécutives produite par l'unité de force. — M. **Magnanini** fait observer qu'il existe bien un grand nombre de mesures électromotrices pour divers métaux immergés dans différents liquides, mais qu'on n'a pas fait de recherches systématiques sur l'influence que le liquide peut exercer sur le phénomène. Le problème est très important, parce que, si la force électromotrice est produite, comme il paraît admissible, là où le liquide touche le métal, les forces électromotrices représentent cette portion de l'énergie chimique, dans la réaction du liquide sur le métal, qui est complètement transformable en énergie électrique. M. Magnanini, ne pouvant poursuivre ses recherches, donne une table des valeurs obtenues avec des métaux et des solutions différentes. Ces valeurs montrent bien comment la force électromotrice d'un métal varie avec la nature du liquide dans lequel il est immergé ; elles font voir aussi qu'on obtient les déviations les plus fortes avec les substances oxydantes, tandis que les plus petites se produisent avec les solutions alcalines. — M. **Nasini** présente le résumé de ses leçons sur l'analogie qui existe entre la matière à l'état gazeux et la matière à l'état de solution diluée. L'auteur s'occupe de la pression osmotique qui, selon Van't Hoff, devrait représenter pour les solutions ce que la pression est pour les gaz ; il trouve que cette pression doit être considérée comme un phénomène secondaire, qui accompagne le phénomène principal de l'entrée de l'eau dans les cellules de Pfeffer. M. Nasini

pense qu'on ne peut pas appliquer aux solutions les lois de Mariotte, Gay-Lussac, Avogadro, et que, si les solutions équimoléculaires ont une même pression osmotique, celle-ci varie pourtant suivant les expériences ; par hasard seulement elle peut égaler celle d'un gaz dans les mêmes conditions. La théorie de Van't Hoff est générale et fondée sur son hypothèse relative à la constitution des liquides, qui conduit à la démonstration *a priori* des lois de Raoult, pourvu que, admettant l'analogie entre les gaz et les solutions, on applique à ces dernières les lois et les formules qui sont vraies pour les gaz. M. Nasini reconnaît que la loi de Van't Hoff est la plus accessible pour les travaux de chimie, et celle qui fait le moins perdre de l'expérience. — M. **Anderlini** a étudié les dérivés que la *cantharidine* forme avec la phénylhydrazine et avec l'ammoniaque alcoolique. Il décrit les propriétés des dérivés obtenus, et donne des détails sur leur forme cristalline.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. **Capellini** décrit un *Crocodylien* fossile, trouvé dans la colline de Cagliari (Sardaigne) en 1868 ; il discute la ressemblance que ce fossile présente avec le *Tomistoma eggenburgensis* de Toulou et Kail, avec les restes du *Tomistoma* du miocène de Malte, et avec le *Tomistoma* qui vit à Bornéo et qui serait le descendant de ces espèces fossiles. Le *Tomistoma* de la Sardaigne forme une espèce nouvelle, que M. Capellini propose d'appeler *Tomistoma calaritanus* ; la découverte de ce reptile montre que le calcaire de Cagliari, qu'on rapportait au pliocène, doit être considéré comme d'origine miocène.

Ernesto Mancini.

ACADÉMIE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE DE TURIN

Séance du 8 février 1890

M. **Brusaferro**, recherchant les modes de transmission de la tuberculose bacillaire, fut amené dans quelques cas à incriminer les beurres fournis par les vaches pomélières. Il institua à ce sujet des expériences d'où il résulte que le beurre des vaches atteintes de tuberculose mamillaire contient les bacilles de Koch ; ceux-ci prolifèrent et déterminent des tubercules dans l'organisme où ils pénètrent par ingestion. Appuyant ces conclusions, MM. de Silvestri, Bertacchi, Volante, Perroncito et Boschetti disent que, pour supprimer ce mode de transmission de la maladie, il est nécessaire d'établir un service d'inspection des vacheries. Très souvent, d'après leurs observations, c'est par le lait que la tuberculose se propage. En le faisant bouillir on tue les bacilles. Mais, comme on ne porte pas à l'ébullition le lait dont on se sert pour faire le beurre, cet aliment, dès qu'il provient de vaches pomélières, devient dangereux. — M. **Perroncito** annonce qu'il a trouvé dans la maladie du cheval, dite de l'immobilité, un microbe différent du *bacterium pneumoniae crupone equi*. Ce microbe serait, d'après lui, l'agent spécifique de la maladie. — M. **Garetto** signale plusieurs cas d'avortement survenus à la suite de saignées pratiquées par des empiriques.

Séance générale annuelle (23 février 90).

Après les discours de MM. Perroncito et Silvestri, M. **Boschetti** présente le rapport de la commission nommée pour étudier la question de l'utilisation des animaux (et produits) tuberculeux. Il présente aussi une monographie bibliographique et critique sur les maladies des pays tropicaux qui atteignent l'homme et les animaux.

D^r F. BOSCHETTI.
Membre de l'Académie.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

MELCHIOR NEUMAYR

Le 29 janvier 1890 mourut, à l'âge de 44 ans, en pleine activité scientifique, M. Melchior Neumayr, professeur de paléontologie à l'Université de Vienne. On peut dire que c'est l'excès du travail qui l'a tué. Il ne lui a pas été donné d'achever son œuvre.

Neumayr était d'origine bavaroise; il fit ses études à l'Université de Munich, et s'adonna bientôt à la géologie, sous la direction d'Oppel, dont il fut un des plus brillants élèves. Après avoir été reçu docteur, il entra en 1868 comme volontaire à l'Institut géologique impérial de Vienne. En 1870 il y fut attaché à titre d'aide-géologue, mais quitta ce poste en 1872 pour s'établir comme « Privatdocent » à Heidelberg. L'année suivante il était rappelé à Vienne pour occuper à l'Université la chaire de paléontologie, qu'il conserva jusqu'à sa mort.

Les débuts de Neumayr dans la science furent marqués par quelques notes de paléontologie stratigraphique relatives aux terrains jurassiques des Alpes orientales et des Carpathes. Dès ces premiers travaux il fit preuve de cet esprit philosophique que l'on retrouve dans toutes ses œuvres. Marcou déjà, et d'autres, avaient fait ressortir les différences profondes qui existent entre les dépôts jurassiques de l'Angleterre, du bassin de Paris, de l'Allemagne et ceux du Midi et de la région des Alpes. Neumayr précisa ces différences, donna les noms de *province méditerranéenne* et de *province de l'Europe centrale* aux deux types et fixa d'une manière à peu près définitive leurs limites géographiques. Plus tard il fut amené à établir l'existence d'une *province boréale*. Ces trois provinces sont basées sur la répartition de quelques groupes de Céphalopodes, notamment sur celle de certains genres d'ammonites tels que *Phylloceras*, *Lytoceus*, *Simoceras*, *Amalteus*; aussi l'auteur porta-t-il pendant quelques années toute son attention sur l'étude approfondie de ces groupes. Ses belles recherches sur les *Phylloceras* du Dogger et du Malm lui permirent d'établir la filiation de la plupart des espèces de ce genre; il reconnut la présence de quatre séries évolutives parallèles, que l'on peut suivre depuis le Lias jusque dans le Crétacé. D'autres travaux de Neumayr portent sur les relations de descendance de genre à genre. En 1875, il résumait toutes nos connaissances sur le groupement des ammonites en familles et en genres en un travail d'ensemble, désormais fondamental pour toutes les recherches ultérieures.

L'étude des bassins lacustres dans lesquels se sont déposées les couches à Paludines de Slavonie permit à Neumayr de constater l'existence, au sein des niveaux successifs de ces dépôts, de séries de formes successives enchaînées les unes aux autres par des liens de descendance. Ces séries ascendantes de gastéropodes lacustres

se présentaient avec plus de netteté encore que les séries d'ammonites. L'étude de la faune des couches du même âge dans les îles de l'Archipel grec, entreprise à la suite d'un voyage en Grèce, lui fournit des résultats analogues. Ce sont aussi les observations rassemblées au cours de ce voyage qui l'amènèrent à affirmer l'immersion relativement récente de la partie orientale de la mer Méditerranée.

Dans les dernières années de sa vie, Neumayr s'occupa surtout à condenser les résultats de ses nombreux travaux. Il entreprit d'abord de réunir tous les documents que nous possédons sur l'extension géographique des terrains jurassiques et crétacés. Il put établir la disposition zonale des provinces zoologiques dont il avait autrefois démontré l'existence. L'ensemble de ses observations le porta à croire que les différences de faune d'une province à l'autre étaient dues à des différences de climat, qui se faisaient donc sentir à la surface du globe dès l'ère secondaire.

En après, Neumayr publia un livre de géologie à l'usage du grand public (1). Bien que ce soit un ouvrage de vulgarisation, le géologue de profession le consultera avec fruit et y trouvera à côté de précieux renseignements des vues générales exposées avec beaucoup de clarté et de simplicité. Dans ce livre Neumayr s'est attaché d'une manière toute particulière à répandre les doctrines de Suess sur la formation des chaînes de montagnes, des continents, des dépressions océaniques.

Dans les derniers jours de décembre 1888, enfin, parut le premier volume d'un ouvrage pour lequel Neumayr avait rassemblé des matériaux dès le commencement de sa carrière scientifique. Cet ouvrage a pour but de donner les preuves paléontologiques de la théorie de la descendance; il est intitulé *Die Stämme des Tierreichs* (les souches, les rameaux du règne animal). Tous les embranchements devaient être étudiés au point de vue de leur évolution dans le temps; le premier volume comprend, outre une introduction générale, les Protozoaires, les Anthozoaires, les Echinodermes et les Vets (Brachiopodes compris); le deuxième volume, dont le manuscrit était à peu près terminé, contiendra les Mollusques et les Arthropodes; la maladie, puis la mort, ont empêché Neumayr de mettre la main à la partie relative aux Vertébrés. Dans un prochain article nous chercherons à rendre compte des résultats auxquels est arrivé Neumayr dans son ouvrage; ceci nous donnera l'occasion d'apprécier, mieux que nous n'avons pu le faire dans cette courte notice, la méthode scientifique du paléontologiste viennois et les qualités de son exposition.

Émile HAUG.

NOUVELLES

PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES ET ÉLECTRIQUES
DU FER ET DE SES ALLIAGES

Dans le compte rendu de la Société royale de Londres (séance du 23 janvier 1890), publié dans notre numéro du 15 février, nous avons exposé les intéressantes expériences de M. Hopkinson sur les propriétés magnétiques des alliages de nickel et de fer. Ce savant montrait que la chaleur modifie ces propriétés et fait aussi varier la résistance électrique de l'alliage. Dans cette communication M. Hopkinson n'avait décrit qu'une partie de ses recherches sur la matière. La note suivante que nous recevons à ce sujet, leur apporte un précieux complément :

« J'ai examiné divers alliages que m'avait obligeamment

procure M. Riley de la Compagnie des aciers d'Ecosse. Je me borne à citer les résultats obtenus avec les échantillons les plus intéressants; ils renferment 2% pour cent de nickel. Comme la matière qui m'était fournie n'était pas magnétique à la température ordinaire, la perméabilité était faible, environ 1, 4, et l'induction était exactement proportionnelle à la force magnétisante. L'anneau chauffé restait non magnétique jusqu'à 700° ou 800°; refroidi jusqu'à - 51° dans un mélange réfrigérant contenant de l'acide carbonique solide, il devint magnétique. La figure 1 montre comment se comporte à 13° la courbe d'aimantation après ce refroidissement. Si l'on chauffe ensuite

(1) *Erdgeschichte*, 2 vol. in-8°. Leipzig, 1886, 1887.

l'échantillon considéré jusque vers 580°, il reste magnétique; à cette température toute aimantation cesse et demeure nulle quand on laisse le métal se

Châtelier, ingénieur en chef des mines. Le tableau ci-joint (fig. 4) traduit les faits qu'il a découverts au




Fig. 1.

refroidir jusqu'à la température du laboratoire. La figure 2 donne les valeurs de l'induction correspon-




Fig. 2.

dant à différentes températures, les abscisses représentent les températures; la force magnétisante est supposée égale à 6, 7. Dans la figure 3 elle a une valeur




Fig. 3.

différente 6, 4. Il résulte de là qu'à une température inférieure à 580° l'alliage existe sous deux états différents, également stables, l'un magnétique, l'autre non. Le changement de l'état non magnétique à l'état magnétique se fait à très basse température; le changement inverse vers 580°.

« Des faits analogues se produisent à un degré plus faible avec l'acier ordinaire; mais dans le passage de l'état non magnétique à l'état magnétique une quantité notable de chaleur est dégagée qui cause une élévation de température de l'air. »

D^r J. HOPKINSON.

Membre de la Société royale de Londres.

Il est intéressant de rapprocher des résultats de M. Hopkinson ceux qui se dégagent des recherches, résumées dans notre dernier numéro (page 120), de M. H. Le




Fig. 4.

sujet des variations qu'éprouve, aux températures élevées, la résistance électrique du fer et de ses alliages. Les résistances y sont exprimées en ohms et rapportées à des fils de 1 mètre de longueur et 0^m01 de diamètre. Les courbes montrent que :

1^o A 730° et 855° la résistance électrique du fer et des aciers proprement dits subit une brusque déviation, correspondant aux transformations allotropiques signalées dans le fer doux par M. Osmond;

2^o La proportion des matières étrangères alliées au fer ne modifie sensiblement pas les températures auxquelles se produisent les variations indiquées;

3^o La résistance de l'alliage fer manganèse à 13 0/0 subit un changement moins accentué, mais cependant très net vers 700°;

4^o La résistance de l'alliage fer et nickel à 25 0/0 se comporte très différemment suivant qu'il y a ou non oxydation de l'alliage. Dans le 1^{er} cas elle varie brusquement vers 550°, tandis que dans le 2^e elle ne subit aucun changement brusque. Il semble que dans le 1^{er} cas, l'oxydation porte sur le silicium, contenu en très petite quantité dans l'alliage.

5^o La résistance du nickel éprouve un changement brusque vers 340°.

6^o Celles du platine et du platine rhodié croissent proportionnellement à la température.

L. O.

DÉCOUVERTE D'UNE PLANÈTE ENTRE MARS ET JUPITER

Le 24 février, M. W. Luther a découvert à l'observatoire de Hambourg une nouvelle petite planète, la 289^e du groupe d'Astéroïdes qui circulent entre Mars et Jupiter; ce jour-là elle occupait la position suivante, à 11 h. 19 m. temps moyen de Paris :

Ascension droite..... 10 h 17' 37",6
Déclinaison..... + 14° 53' 20"

Son ascension droite diminue de 48" par jour et sa déclinaison augmente de 6'.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LE DRYOPITHEQUE ET L'ORIGINE DE L'HOMME

En 1856, E. Lartet annonçait à l'Académie des Sciences de Paris la découverte, dans les couches du terrain tertiaire de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), d'une mâchoire inférieure d'un singe venant se placer « avec des caractères supérieurs à certains points de vue, dans le groupe des Simiens qui comprend le Chimpanzé, l'Orang, le Gorille, les Gibbons et le petit singe fossile de Sansan (*Pliopithecus antiquus*). Il différerait de tous ces singes par quelques détails dentaires et, plus manifestement encore, par le raccourcissement très sensible de la face. La réduction des incisives, s'alliant à un grand développement des molaires, indique un régime essentiellement frugivore. Le peu que l'on connaît d'ailleurs de l'ossature des membres dénote plus d'agilité que d'énergie musculaire. On serait donc ainsi conduit à supposer que ce singe de très grande taille vivait habituellement sur les arbres, comme le font les Gibbons de l'époque actuelle ; aussi proposerai-je de le désigner par le nom générique de *Dryopithecus* (de *drus*, arbre, chène et *pithecus*, singe). » Lartet ajoutait que l'échantillon, qu'il faisait connaître, lui avait été remis par M. Fontan et il proposait alors de perpétuer le souvenir de la découverte, si importante pour la paléontologie, due à ce naturaliste éclairé, en désignant l'anthropomorphe fossile de Saint-Gaudens par l'appellation de *Dryopithecus Fontani* (fig. 1).

Le gisement dans lequel avait été découverte la mâchoire de *Dryopithecus* se trouve placé en contre-bas de la hauteur sur laquelle s'élève la ville de Saint-Gaudens et à une très faible distance du petit village de Valentine. Il est constitué par

un banc d'argile plus ou moins marneuse, suivant les niveaux que l'on considère. Cette argile est




Fig. 1. — Maxillaire inférieure de *Dryopithecus Fontani*, décrit par Lartet, vu de profil et réduit de 1/5.

exploitée pour la fabrication de tuiles et c'est pour cela que, depuis bien des années, les paléontologistes qui ont eu l'occasion d'aller à Saint-Gaudens ont pu se procurer quelques ossements mis de côté par les ouvriers. Les débris fossiles paraissent être assez abondants et si nos collections n'en renferment que quelques rares exemplaires, cela tient à ce que la couche au sein de laquelle ils sont contenus occupe la portion inférieure du gisement et que dans presque toute son étendue elle offre une composition telle qu'on ne saurait l'utiliser industriellement. Aussi lorsque les ouvriers l'atteignent durant le cours de leurs travaux, ils s'arrêtent, ne l'entament pas et se bornent à recueillir les quelques ossements qui apparaissent à sa surface.

Au point de vue de leur âge géologique les

couches de Valentine appartiennent à la portion supérieure de la partie moyenne du Tertiaire moyen. Elles sont postérieures à celles de Sansan et contemporaines de celles de Simorre (Gers) et de la Grive-Saint-Alban (Isère). On y rencontre des restes de Rhinocéros, de Porcins, de Cervidés. Le *Macrotherium* commun à Sansan s'y retrouve ainsi qu'à Simorre et le *Dinotherium* qui n'existait pas lors du dépôt de Sansan paraît y être très commun.

Depuis le moment où E. Lartet adressait à l'Académie la note que j'ai rappelé plus haut, nos connaissances concernant le Dryopithèque ne s'étaient point accrues. Mais tout dernièrement M. F. Regnault de Toulouse, qui depuis bien des années s'est occupé, avec beaucoup de succès, de faire des fouilles au sein des cavernes des Pyrénées, eut l'occasion de passer à Saint-Gaudens et il eut la bonne fortune de trouver chez un habitant de la ville, qui ne se doutait nullement de la valeur zoologique de l'objet qu'il possédait, un maxillaire inférieur de Dryopithèque dans un très bon état de conservation. C'est cet échantillon, qui lui fut gracieusement offert, que nous avons fait représenter, grâce à la bienveillance de M. Gaudry auquel nous en devons la communication (fig. 2 et 3).




Fig. 2. — Maxillaire inférieur de *Dryopithecus Fontani* communiqué par M. F. Regnault. Réduit de 1/5.

Comme on le voit, cette pièce est beaucoup plus complète que la première sur laquelle la partie antérieure faisait défaut, ce qui empêchait qu'on ne se rendit compte d'une manière exacte de la forme du menton et conséquemment de celle de la face. On avait cru noter que la canine, au lieu d'être proclive comme chez les singes, avait une position plus redressée, qui devait amener une disposition semblable des incisives et on concluait de ce fait que la face devait être raccourcie. Lartet, entraîné par ces suppositions, alla jusqu'à dire que sous le rapport du raccourcissement le *Dryopithecus* se rapprochait beaucoup du type nègre.

M. F. Regnault a remis à M. Gaudry, pour l'étudier, le nouveau maxillaire trouvé à Saint-Gau-

dens. Le savant professeur du Muséum a communiqué tout dernièrement à l'Académie des Sciences (1) le résultat de ses premières observations, qui sont venues modifier, d'une manière absolue, toutes les idées qu'on avait sur les rapports existant entre le Dryopithèque et l'homme.

« Ce qu'on remarque tout d'abord dans la nouvelle mâchoire inférieure de *Dryopithecus*, a dit le savant professeur du Muséum, c'est son allongement qui nécessairement coïncidait avec l'allongement de la mâchoire supérieure et, par conséquent, de la face. La face devait être aussi proéminente que celle du Gorille, plus proéminente que celle de l'Orang-Outang, du Chimpanzé, beaucoup plus proéminente que celle de la Vénus hottentote.

« Une seconde différence qui me frappe encore davantage est celle de la place laissée à la langue. C'est quelque chose assurément d'avoir une belle figure, mais il y a pour nous quelque chose de plus important, c'est d'avoir la puissance d'exprimer nos pensées par la parole. La comparaison de la mâchoire du *Dryopithecus* avec celle des autres grands singes et de l'homme me semble fournir un commencement d'indication pour ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la langue.




Fig. 3. — Maxillaire inférieur de *Dryopithecus Fontani*, communiqué par M. F. Regnault, vu de face. Réduit de 1/5.

« La langue humaine peut s'étendre beaucoup en largeur, parce que la mâchoire inférieure, en forme d'arc, laisse un grand espace entre les rangées des arrières molaires; elle s'étend aussi beaucoup en longueur, parce que la paroi du menton est très amincie; elle l'est quelquefois à un tel point qu'elle est translucide au-dessous des incisives; en outre

(1) Compt. rend. hebdomadaire Acad. Sc. Paris. 24 février 1890.

dans les races élevées, sa partie inférieure se porte en avant, formant un bombement très caractérisé dans la partie où s'insère le muscle nommé *houppé* du menton. Comme chacun peut le constater sur soi-même, l'extrémité antérieure de la langue est habituellement courbée en bas de sorte que l'avance de la partie antérieure du menton sert à lui laisser plus de place. (fig. 4).




Fig. 4. — Maxillaire inférieur d'homme actuel, vu de face. Réduit.

« Souvent, dans les mâchoires des races humaines les moins élevées dites prognathes, comme par exemple dans celle de la Vénus hottentote, le menton laisse un peu moins de place pour les




Fig. 5. — Maxillaire inférieur de Chimpanzé. Réduit.

mouvements de la partie antérieure de la langue et l'espace entre les arrière-molaires est un peu moins large; mais la différence n'est pas très grande.

« Chez le Chimpanzé, le bas du menton est porté en arrière; en outre, le ratelier cesse de former

l'arc, les deux rangées de molaires deviennent parallèles. La langue a donc moins de place pour s'allonger en avant, pour s'élargir en arrière (fig. 5).

« Chez l'Orang-Outang et le Gibbon, il y a proportionnellement moins d'intervalle que chez le Chimpanzé entre les mandibules; la langue est donc forcément plus étroite.

« Chez le Gorille, il en est de même. En outre, le menton s'est beaucoup épaissi et porté en arrière; le bas de la symphyse se prolonge jusqu'à l'aplomb des premières arrière-molaires. Ainsi la langue a moins de place en avant que dans l'Orang-Outang et surtout dans le Chimpanzé » (fig. 5 et 6).




Fig. 6. — Maxillaire inférieur de Gorille, vu de face. Réduit.

Chez le *Dryopithecus* l'intervalle entre les mandibules paraît avoir été resserré et nous trouvons là un point d'analogie très remarquable avec le Gorille et par conséquent la langue était étroite et la faculté du langage ne devait pas exister.

On se rendra facilement compte de ce fait en se rapportant aux figures, que nous avons jointes aux descriptions précédentes. Malheureusement nous ne pouvons apprécier d'une manière exacte le degré de ce rapprochement, la nouvelle mâchoire de *Dryopithecus* ayant été comprimée et assez déformée. Mais malgré tout, en considérant un maxillaire de Gorille et un maxillaire de *Dryopithecus* dans leur portion antérieure, vue de face, on ne peut qu'être très frappé de l'immense différence existant entre ces animaux. La symphyse du *Dryopithecus* est tellement allongée que l'esprit se reporte vers la disposition presque semblable qui existe chez certains porcins et nous pouvons dire qu'elle est plutôt celle d'un pachyderme que celle d'un anthropomorphe. Les différences paraissent encore bien plus grandes si nous éta-

blissons un parallèle avec le Chimpanzé ; et lorsque nous arrivons à l'homme, nous voyons qu'il existe une dissemblance absolue entre ce dernier et le singe de Saint-Gaudens. Les anthropomorphes actuels se rapprochent plus de l'homme que le Dryopithèque, qui possède des caractères très accusés d'infériorité. A celui que je viens de signaler et qui nous montre que le Dryopithèque avait un véritable museau, nous devons joindre ceux tirés de l'examen de la dentition. Sans entrer à ce point de vue dans une étude comparative détaillée, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que les molaires du Dryopithèque, au lieu d'être arrondies comme les molaires humaines, sont allongées d'avant en arrière et leurs éléments constitutifs ne se groupent pas de la même manière. Au point de vue de ses molaires, le Chimpanzé a plus d'analogies avec l'homme, tandis que le Dryopithèque en possède d'incontestables avec le Gorille. Le régime de ces animaux devait beaucoup se ressembler.

On voit par cette discussion qu'il faut absolument abandonner les idées que nous nous étions faites sur les ressemblances probables ayant dû exister entre le Dryopithèque et l'homme. L'intermédiaire entre ce dernier et les singes est encore à trouver et quant au Dryopithèque, comme l'a fait judicieusement observer M. A. Milne-Edwards, son attitude était plutôt quadrupède que bipède. Qu'il nous soit permis, en terminant cet exposé rapide des caractères du Dryopithèque ainsi que celui de ses affinités, de remercier M. Gaudry de l'amabilité avec laquelle il a bien voulu nous communiquer les différentes pièces que nous avons fait figurer.

M. F. Regnault a, durant le cours des recherches qu'il a exécutées au sein des cavernes des Pyrénées, trouvé dans la caverne de Malarnaud près Montseiron (Ariège) un maxillaire inférieur humain, qui était associé aux débris de la faune ancienne des cavernes, *Rhinoceros*, *Elephas*, *Ursus spelæus*, *Felis spelæa*, *Hyæna spelæa*, etc. (fig. 7).

J'ai donné une description de cette mâchoire dans le *Bulletin de la Société philomatique* (1889) et j'ai appelé l'attention sur les caractères très dégradés qu'elle possède. Elle correspond comme type à celle de la Naulette, trouvée en Belgique à un niveau semblable. « La mâchoire de la Naulette, a dit M. Topinard, a des proportions qui, non seulement, ne sont pas humaines, mais sont plus que simiennes ; cela tient à la fois à une augmentation

réelle de l'épaisseur et à une diminution réelle de la hauteur, la première étant exagérée par le déve-




Fig. 7. — Maxillaire inférieur d'homme trouvé dans la caverne de Malarnaud (Ariège).

loppement simultané des deux lignes oblique externe et oblique interne, qui se correspondent sur les deux faces de l'os. » J'ai recherché le rapport de l'épaisseur à la hauteur prise au niveau du trou mentonnier et j'ai trouvé (la hauteur étant prise pour 100) 60,42 pour le maxillaire de Malarnaud et 57,7 pour celui de la Naulette, d'où il résulte que si la mâchoire de la Naulette a des proportions non seulement pas humaines, mais encore plus que simiennes, celle de Malarnaud offre les mêmes caractères à un degré plus exagéré.

Le caractère de la mâchoire de la Naulette qui avait le plus frappé les anthropologues était l'absence de menton. L'angle de la symphyse sur cette pièce est de 94°. L'angle symphysaire de la mâchoire de Malarnaud est encore plus grand, plus bestial par conséquent. Il atteint 100°, la mâchoire étant abandonnée à elle-même, et 110°, la partie antérieure du maxillaire étant abaissée jusqu'à ce qu'elle se mette au contact du plan horizontal. Par conséquent la mâchoire humaine trouvée à Malarnaud est la plus dégradée, la plus simienne que nous connaissions. Il m'a paru intéressant, pour les lecteurs de la *Revue*, de reproduire son aspect lorsqu'on la considère de profil, afin qu'ils puissent établir un parallèle entre la mâchoire du Dryopithèque vue dans la même position et se rendre ainsi compte des différences colossales qui existent entre le plus dégradé des hommes préhistoriques et le singe fossile du Miocène moyen du Midi de la France.

D^r H. Filhol,

Sous-directeur à l'Ecole des Hautes-Etudes.

LA SYNTHÈSE DES SUCRES


De tous les principes immédiats qu'élabore le règne végétal, les plus universellement répandus sont sans contredit ceux qui résultent de l'union exclusive du carbone avec l'oxygène et l'hydrogène unis dans la proportion où ces éléments constituent l'eau H_2O ; quelle que soit la complication de leur molécule, ces produits, que leur composition autorise à désigner sous le nom d'*hydrates de carbone*, sont tous compris dans la formule générale $\text{C}^n\text{H}^{2n}\text{O}^n$.

A l'état insoluble, sous la forme de cellulose ou d'amidon, ils constituent soit le squelette même de toutes les plantes, soit une réserve alimentaire que le végétal utilise quand sa faculté d'assimilation n'est pas en rapport avec la rapidité de sa croissance; à l'état soluble, ils se rencontrent dans le suc cellulaire en quantité variable et quelquefois assez grande pour servir de base à quelque industrie, telle par exemple que la fabrication du sucre ou celle de l'alcool.


I

Les plus simples des hydrates de carbone sont les matières sucrées et particulièrement les *glucoses* $\text{C}^6\text{H}^{12}\text{O}^6$, dont les mieux connus sont la *dextrose*, la *lévulose* et la *galactose*; les autres peuvent être considérés comme résultant de la soudure de deux ou plusieurs molécules de glucoses, avec élimination d'eau.

Tels sont, parmi les *bioses* ou *biglucoses*, le sucre de canne et le sucre de lait, qu'on appelle souvent aussi *saccharose* et *lactose* :



parmi les *trioses* ou *triglucoses*, le *raffinose* et le *mélétose* :



Telles sont aussi les matières amylacées, *gommes*, *amidons*, *celluloses*, etc., qui paraissent répondre toutes à la formule $(\text{C}^6\text{H}^{10}\text{O}^5)^n$, mais dont le degré de polymérisation n est encore inconnu.

Quelques-uns de ces composés complexes ont pu être reproduits artificiellement à l'aide des glucoses : c'est le cas surtout des dextrines; tous se résolvent en un mélange de glucoses quand on leur ajoute les éléments de l'eau. Fait remarquable, ces deux réactions inverses s'effectuent dans des circonstances analogues, sous l'action des

acides énergiques : il y a là un rapprochement évident avec le phénomène réversible de l'éthérification, et la preuve d'un rapport intime entre les différents hydrates de carbone végétaux.

Citons enfin, pour mémoire, à côté des glucoses et de leurs produits de condensation, les *mannites* $\text{C}^6\text{H}^{14}\text{O}^6$, qui ne présentent pas la composition caractéristique des glucoses, mais peuvent les reproduire en perdant par oxydation deux atomes d'hydrogène.

Tous ces corps possèdent des propriétés chimiques semblables : ils renferment plusieurs fois le groupe CH^2OH ou CHOH qui caractérise la fonction alcoolique et, par suite, ainsi que l'a fait voir depuis longtemps déjà M. Berthelot, sont capables de s'unir à plusieurs molécules d'un acide quelconque. En outre, à cause sans doute du caractère électro-négatif que leur communique la grande quantité d'oxygène accumulée dans leur molécule, ils forment avec les oxydes métalliques des combinaisons plus stables que celles qui résultent de l'union des mêmes bases avec les alcools ordinaires. C'est en raison de cette propriété que quelques-uns de ces composés peu solubles, notamment les *sucrates* de chaux, de strontiane et de baryte, sont utilisés dans l'industrie pour extraire le saccharose des mélasses.


L'étude des hydrates de carbone n'est donc qu'un cas particulier de celle des glucoses, et l'on devra considérer comme imminente la synthèse de tous ces produits le jour où les glucoses eux-mêmes auront été obtenus de toutes pièces dans nos laboratoires. C'est pour ce motif que nous nous occuperons surtout ici de ces derniers.

II

On a coutume, dans l'étude des combinaisons du carbone, de représenter celles-ci par des figures schématisques qu'on appelle leurs *formules de constitution*. Ces formules, qui ne préjugent en rien la situation dans l'espace des atomes qui constituent telle ou telle molécule, offrent l'avantage de montrer immédiatement les relations qui existent entre plusieurs corps voisins, et souvent aussi de prévoir quelques-unes de leurs propriétés, non encore reconnues.


C'est ainsi que les formules de constitution admises pour la dextrose, la lévulose et leur produit d'hydrogénation commun, la mannite, font voir que cette dernière, renfermant six oxydryles OH, possède *six fois* la fonction d'alcool, et que la dextrose et la lévulose représentent

ses monoaldéhydes, primaire dans le premier cas, secondaire dans l'autre :



Cherchons s'il ne serait pas possible de fonder quelque méthode de synthèse sur ces premières indications théoriques.

Wanklyn et Erlenmeyer ont les premiers rattaché la mannite à l'un des carbures du pétrole. l'hexane normal C⁶H¹⁴, en montrant que, sous l'action de l'acide iodhydrique, elle se transforme en iodure d'hexyle ou hexane monoiodé C⁶H¹³I. Or, traite-t-on l'hexane par un halogène, le chlore ou le brome, puis par un alcali, tel que la potasse, on le transforme en un alcool monoatomique, si la substitution n'a porté que sur un seul groupe hydrocarboné de la molécule primitive :



Il suffirait évidemment de répéter cinq fois encore la même opération pour arriver à la mannite C⁶H¹⁴O⁶; malheureusement la molécule devient plus altérable à mesure qu'elle s'enrichit en oxygène, et, en pratique, il paraît impossible de passer de l'hexane hexachloré C⁶H⁶Cl⁶ à la mannite C⁶H⁸(OH)⁶.

La question présente donc, au point de vue chimique, cet intérêt tout spécial de ne pouvoir se résoudre par les méthodes classiques en usage pour effectuer la synthèse des alcools.


III

Au point de vue physiologique, la synthèse des sucres est peut-être plus importante encore. En effet, répandus à profusion dans tous les organes végétaux, ces composés paraissent être en rapport immédiat avec la fonction chlorophyllienne, qui est l'origine même de la matière organique, et, par conséquent, de la vie dans la nature.

Comment pouvons-nous concevoir leur production aux dépens de la matière minérale?

L'expérience montre que, dans le phénomène de l'assimilation, les feuilles vertes dégagent un volume d'oxygène égal à celui de l'acide carbonique qu'elles absorbent, et, comme d'autre part elles sont impuissantes à décomposer l'oxyde de carbone, il est vraisemblable que cet oxygène provient à la fois de l'eau et de l'anhydride carbonique : en d'autres termes on est conduit à admettre que la décomposition porte sur l'hydrate normal CO(OH)², qui, perdant deux atomes d'oxygène par molécule, laisse comme résidu un hydrate de carbone, isomère des glucoses.

La réaction se passerait conformément à la formule très simple :



dans laquelle n peut prendre toutes les valeurs possibles depuis l'unité.

Le premier terme de cette série d'hydrates de carbone serait l'aldéhyde méthylique CH²O qui, en raison de sa simplicité même, n'admet pas d'isomère; les autres résulteraient de la polymérisation progressive de cette aldéhyde, et on conçoit aisément que parmi eux se trouve un glucose C⁶H¹²O⁶.

Cette manière de voir, primitivement énoncée par Baeyer (1), reprise ensuite par Würtz, a été combattue par un grand nombre de physiologistes qui, observant que les aldéhydes exercent en général une action funeste sur la végétation, se refusaient à admettre la présence, même passagère, d'un pareil corps dans les tissus vivants.

Cette objection suffirait, en effet, à faire rejeter l'hypothèse de Baeyer, s'il était nécessaire que l'aldéhyde méthylique subsistât en nature pendant quelque temps après sa formation; elle n'a plus aucune valeur si l'on admet qu'elle se transforme immédiatement, et l'altérabilité extrême qu'elle manifeste au contact de la plupart des réactifs rend cette supposition des plus vraisemblables.

D'ailleurs, s'il est vrai que l'aldéhyde méthylique est le point de départ de la synthèse des sucres, si ceux-ci résultent réellement de la condensation de cette sorte d'hydrate de carbone élémentaire, on doit pouvoir retrouver dans les plantes quelque trace du passage des corps intermédiaires entre l'aldéhyde méthylique et les sucres, sous la forme d'un quelconque de leurs produits de transformation, et cela pour toutes les valeurs possibles de n . Or, c'est précisément ce qui a lieu.

L'auteur de cet article a réussi, il y a quelques années, à extraire de l'alcool méthylique des

(1) *Berichte*, III, 68 (1870).

feuilles de différentes espèces, par simple distillation avec l'eau (1); il est inutile d'insister sur les rapports évidents qui existent entre cet alcool et l'aldéhyde méthylque.

Les alcools polyatomiques ne sont pas moins répandus chez les plantes : la glycérine $C^3H^8O^3$, qui représente un trialcool, fait partie de tous les corps gras; les lichens renferment un principe particulier, l'érythrite $C^4H^{10}O^4$, qui possède la fonction de quadrialcool. L'arabinose $C^5H^{10}O^5$ et son isomère la xylose, qui tous deux dérivent des gommes, les glucoses proprement dits $C^6H^{12}O^6$ se rencontrent à peu près partout.

Enfin, la perséite $C^7H^{16}O^7$, particulièrement abondante dans les fruits du *Laurus perseæ*, constitue l'heptaalcool correspondant à un homologue supérieur des glucoses, non encore isolé, mais prévu par la théorie.

Il nous semble que cette succession régulière de polyalcools $C^nH^{2n+2}O^n$, accompagnés souvent de leurs aldéhydes $C^nH^{2n}O^n$, pouvait déjà servir d'appui très sérieux à l'hypothèse de Baeyer; les expériences qu'il nous reste à décrire vont affirmer davantage encore son exactitude.

IV


M. Grimaux le premier a fait voir l'analogie qui existe entre les glucoses et les alcools-aldéhydes inférieurs : en soumettant la glycérine



à l'action oxydante du noir de platine, il a réussi à la transformer en un corps qui réduit la liqueur de Fehling à la façon des glucoses et fermente comme eux sous l'action de la levûre (2).


Pour déterminer la véritable nature de ce produit, il est nécessaire de l'engager en combinaison avec la *phénylhydrazine* $C^6H^8Az^2$, réactif par excellence des aldéhydes et des acétones.

On sait que les glucoses, chauffés avec une dissolution d'acétate de phénylhydrazine, donnent naissance à autant de composés isomériques $C^{18}H^{22}Az^4O^4$, connus sous le nom de *phénylglucosazones* ou plus simplement de *glucosazones*, qui se forment d'après l'équation suivante :



Or, le produit d'oxydation de la glycérine donne dans les mêmes circonstances une osazone qui

répond à la formule $C^{12}H^{16}Az^4O$; il en résulte qu'il renferme un hydrate de carbone $C^3H^6O^3$, l'aldéhyde glycérique ou la dioxycétone,




peut-être un mélange de ces deux isomères.

Quelle que soit d'ailleurs sa structure moléculaire, à cause de la similitude de propriétés que l'on observe entre cette substance et les glucoses on doit la considérer comme un véritable sucre : c'est le premier par ordre de date des corps fermentescibles obtenus par synthèse.

Le poids moléculaire des glucoses est exactement double de celui de l'aldéhyde glycérique; on pouvait donc espérer, en polymérisant cette dernière, reproduire un véritable glucose : cette transformation prévue a été réalisée par MM. Fischer et Tafel en parlant, soit de l'aldéhyde glycérique elle-même, soit du bibrômure d'acroléine $C^3H^4Br^2O$ qui représente son éther bromhydrique saturé (1).

La découverte de l'aldol (aldéhyde oxybutyrique), par Wûrtz, nous a appris que certaines aldéhydes peuvent doubler leur molécule au contact de réactifs appropriés, en formant un nouveau corps à fonction mixte, qui est à la fois aldéhyde et alcool secondaire.



L'aldéhyde glycérique est susceptible de se modifier de même en présence des bases fortes : on constate alors que ses propriétés réductrices, d'abord très énergiques, s'atténuent peu à peu. Lorsque la liqueur ne précipite plus qu'à l'ébullition le tartrate cupropotassique, la polymérisation est achevée : l'aldéhyde glycérique (ou la dioxycétone) est convertie en un mélange de deux corps isomères des glucoses, que Fischer et Tafel ont appelés α et β *acrose*.

Le premier seul de ces sucres synthétiques a été isolé; pour l'extraire du mélange précédent, on chauffe le liquide, préalablement neutralisé, avec un excès d'acétate de phénylhydrazine : bientôt il se précipite des aiguilles jaunes de *phénylacrosazone* $C^{18}H^{22}Az^4O^4$ que l'on purifie par plusieurs cristallisations successives. Deux méthodes se


(1) *Comptes rendus*, CI, 1067 (1885).

(2) *Comptes rendus*, CIV, 4276 et CV, 1175 (1887).

(1) *Berichte*, XX, 4093, 2567 et 3388 (1887); *Ibid.*, XXII, 359 (1889).

présentent alors pour achever la préparation : ou bien on traite la phénylacrosazone par l'acide acétique et la poudre de zinc, ce qui donne de l'ammoniaque, de l'aniline et une base particulière, l'*acrosamine* $C^6H^{13}AzO^5$, que l'on décompose ensuite par l'acide azoteux; ou bien, ce qui est préférable, on transforme d'abord l'acrosazone en *acrosone* $C^6H^{10}O^6$ au moyen de l'acide chlorhydrique concentré, puis on soumet l'acrosone à l'action de l'hydrogène naissant.

Les formules suivantes indiquent la marche de ces réactions successives :



Les mêmes composés, c'est-à-dire l' α et le β acroses, ont été obtenus également avec le bibrôme d'acroléine, sous l'action de la baryte. Il est probable qu'ici le bibrôme $C^2H^2OBr^2$ se transforme d'abord en aldéhyde glycérique $C^3H^4O(OH)^2$ par substitution de deux oxydres aux deux atomes de brome, puisqu'il s'effectue une polymérisation semblable à celle dont nous venons de parler.

Ce second mode d'obtention des acroses équivalant donc théoriquement au premier.

Dans tous les cas, l' α acrose constitue un sirop incristallisable, de saveur sucrée, qui fermente avec la levure de bière, réduit à chaud la liqueur de Fehling, se combine comme toutes les aldéhydes avec la phénylhydrazine en donnant la phénylacrosazone $C^{18}H^{22}Az^4O^4$ isomérique de la phénylglucosazone, qui peut enfin fixer deux atomes d'hydrogène et se convertir en un alcool $C^6H^{14}O^6$, que les auteurs ont primitivement désigné sous le nom d'*acrite* et qui n'est autre que la mannite inactive par compensation.

Tous ces caractères sont ceux des sucres réducteurs en C^6 .

La seule propriété qui distingue les glucoses naturels des acroses est l'absence chez ceux-ci de tout pouvoir rotatoire; il n'y a pas lieu d'ailleurs de s'en étonner, car la synthèse des corps asymétriques ne donne jamais lieu qu'à des inactifs par compensation, et, de même que l'acide racémique de synthèse a pu être dédoublé en acides tartriques

actifs, de pouvoirs rotatoires inverses, nous allons voir bientôt que ces différents produits peuvent se résoudre en corps actifs identiques à ceux que nous offre la nature.

V

Il résulte de ce qui précède que la synthèse d'un glucose est enfin réalisée par des moyens purement chimiques. Mais, malgré l'importance considérable des recherches que nous venons d'analyser, elles laissent encore indécise une partie de la question, celle qui touche à la physiologie, à la production naturelle des sucres. Nous venons de voir la glycérine se convertir, par une sorte d'aldolisation, en un corps réducteur en C^6 ; mais quelle est l'origine de la glycérine chez les plantes, et comment expliquer, par ce qui précède, la formation des matières sucrées dont le poids moléculaire n'est pas un multiple exact de celui de l'aldéhyde glycérique, notamment de l'érythrite $C^4H^{10}O^4$, de l'arabinose $C^5H^{10}O^5$ et de la perséite $C^7H^{16}O^7$?

On doit à M. Kiliani une observation curieuse relative à la transformation des sucres en leurs homologues supérieurs : en traitant par l'amalgame de sodium un produit d'oxydation de l'acide arabinose-carbonique $C^6H^{12}O^7$, la lactone méta-saccharique $C^6H^6O^6$, cet auteur a obtenu une mannite, qui se trouve ainsi dérivée de l'arabinose, c'est-à-dire d'un corps en C^5 (1).

Cette réaction, considérée d'abord comme un fait isolé, a été tout récemment généralisée par M. Fischer : les acides que l'on obtient en oxydant les sucres à fonction d'aldéhyde se laissent tous réduire par l'amalgame de sodium; leur groupe acide CO^2H se trouve ramené à l'état d'un groupe alcoolique primaire CH^2OH , et ils se changent en un poly-alcool à fonction simple, en une mannite ou en un homologue des mannites (2).

Remarquons en passant que cette métamorphose était absolument inattendue, les acides proprement dits résistant d'ordinaire à l'action des agents réducteurs : il y a évidemment, chez les corps dont nous venons de parler, une sorte d'influence prédisposante à la réduction qu'il faut attribuer sans doute à la grande quantité d'oxygène qu'ils renferment.


S'agit-il donc de passer de l'arabinose $C^5H^{10}O^5$ aux glucoses $C^6H^{12}O^6$, on commencera par convertir l'arabinose en un nitrile au moyen de l'acide cyanhydrique; par l'hydrate de potasse on transformera ce nitrile en acide arabinose carbonique; on réduira ce dernier par l'amalgame de sodium à l'état de mannite, qui, enfin, en perdant deux

(1) *Berichte*, XX, 2710 (1887).

(2) *Berichte*, XXII, 2204 (1889).

atomes d'hydrogène, donnera un isomère des glucoses.

Les réactions se passent conformément aux formules suivantes :



La même méthode permettrait évidemment d'effectuer la synthèse d'une perséite en passant par l'intermédiaire d'un acide glucose-carbonique $\text{C}^5\text{H}^{15}\text{O}^8$, mais il faut bien remarquer qu'elle exige l'emploi de l'acide cyanhydrique, dont le rôle dans la synthèse végétale est encore plus que douteux : les réactions de Fischer paraissent être surtout des procédés de laboratoires, fort intéressants, sans aucun doute, mais incapables de donner la solution du problème physiologique que nous nous sommes posé au début.

Si d'ailleurs la synthèse naturelle des sucres s'effectuait ainsi, on devrait rencontrer dans les tissus végétaux quelques-uns de ces nitriles ou de ces acides relativement stables qui constituent les termes de passage nécessaires entre les différents sucres : jusqu'à présent ils n'y ont pas été signalés. Il nous faut donc chercher ailleurs la clef de ces métamorphoses, en même temps qu'une origine simple de l'aldéhyde glycérique, point de départ de toutes les recherches de M. Fischer.

Revenons à l'aldéhyde méthylique CH^2O , le premier hydrate de carbone, dont nous avons admis la formation possible dans les cellules chlorophylliennes, au moment même où s'accomplit la décomposition de l'acide carbonique. On obtient assez facilement ce corps, en solution aqueuse, par la combustion incomplète des vapeurs de l'esprit de bois, en présence de mousse de platine ou d'oxyde de cuivre. Si l'on évapore à froid une semblable dissolution, ou bien si on la traite par un léger excès d'ammoniaque, on voit se produire des composés qui renferment $\text{C}^3\text{H}^6\text{O}^3$ ou $\text{C}^3\text{H}^{12}\text{Az}^2$: ce sont le trioxyméthylène, l'homologue inférieur de la paraldéhyde, et l'hexaméthylène-amine.

Ces corps n'ont rien de commun avec les sucres ; mais leur existence montre combien l'aldéhyde méthylique se polymérise aisément et permet d'espérer, dans d'autres circonstances, une véritable aldolisation comme celle qui transforme l'aldéhyde glycérique en acrose.

Aussitôt après la découverte de l'aldol, Würtz avait pressenti l'importance que devait prendre plus tard l'aldéhyde méthylique dans l'étude et la synthèse des sucres, et il essaya d'appliquer à cette substance la méthode qui lui avait permis de polymériser l'aldéhyde ordinaire. Il n'y réussit pas : c'est qu'en effet l'aldéhyde méthylique, de même que l'aldéhyde glycérique, ne se modifie qu'en liqueur alcaline, alors que l'aldol prend seulement naissance au contact des acides (1).

Boutlerow essaya le premier de faire agir les alcalis sur l'aldéhyde méthylique ; en traitant ce corps par la baryte, il obtint, en même temps que du formiate de baryum, un produit qui paraît répondre à la formule $\text{C}^6\text{H}^{10}\text{O}^5$ des matières amyliques et qui a reçu le nom de *méthylénitane* (2).

Très éloigné encore des glucoses par l'ensemble de ses caractères, le méthylénitane représente déjà un produit de condensation stable de l'aldéhyde méthylique, car il ne peut plus régénérer cette dernière sous l'action de la chaleur, ainsi qu'il arrive avec le trioxyméthylène : c'est, en un mot, le premier hydrate de carbone que l'on ait pu obtenir à l'aide de l'aldéhyde méthylique.

Plus récemment, M. Loew reprit l'étude de cette réaction, et, en modifiant légèrement le procédé de Boutlerow, parvint à préparer d'autres produits de synthèse qui, cette fois, peuvent être considérés comme de véritables sucres (3).

Pour les obtenir, il suffit d'ajouter un excès de chaux éteinte à une solution d'aldéhyde méthylique, étendue de manière à contenir environ 3 % de son poids de substance active ; après quelques jours de repos, à la température ordinaire, on constate que l'odeur piquante de l'aldéhyde primitive a disparu et que le liquide précipite abondamment la liqueur de Fehling à l'ébullition : il renferme alors un isomère des glucoses que l'auteur a nommé *formose*, pour rappeler d'où il dérive.

On isole la formose de ses dissolutions brutes en saturant celles-ci par l'acide oxalique, qui sépare la chaux dissoute, et en reprenant le résidu par l'alcool, qui dissout la formose et laisse le formiate de calcium qui l'accompagne toujours.

Finalement on obtient un sirop incolore, fortement sucré, qui réduit la liqueur de Fehling à la façon des glucoses dont il possède du reste la plupart des propriétés : il brunît quand on le chauffe avec la potasse, donne un précipité avec le sous-acétate de plomb ammoniacal et avec l'alcoolate de baryte ; il forme une combinaison cristalline avec le chlorure de sodium, etc.

(1) *Comptes rendus*, t. LXXIV et LXXVI.

(2) *Annalen der Chemie*, CXX, 295.

(3) *Journ. für prakt. Chemie*, XXXIII, 321 et XXXIV, 54 ; *Berichte*, XXI, 274 et XXII, 470.

La formose, cependant, ne renferme pas de glucose proprement dit, au moins lorsqu'on la prépare à l'aide de la chaux : elle est incapable de fermenter en présence de la levûre et ne donne pas d'amidon lorsqu'on la fait absorber par une feuille vivante.

Remarquant en outre que, au contraire des glucoses, la formose ne donne pas d'acide lévulique quand on la chauffe avec l'acide chlorhydrique, Tollens a cru devoir écarter cette substance des sucres, sans indiquer d'ailleurs la raison de leur isométrie (1). Il nous est impossible de le suivre dans cette discussion, qui ne nous conduirait à aucun résultat précis : la formose dont nous venons de parler est en effet un mélange de plusieurs isomères et probablement aussi de plusieurs homologues.

En traitant une dissolution de formose brute par l'acétate de phénylhydrazine, à la température du bain-marie, Loew avait obtenu, dès le début de ses recherches, une combinaison paraissant répondre à la formule $C^{14}H^{22}Az^2O^3$, différente par conséquent des osazones glucosiques, qui renferment toutes quatre atomes d'oxygène.

Fischer a fait voir que ce composé est un mélange d'au moins trois osazones distinctes dont deux présentent certainement la même composition que les dérivés hydraziniques des glucoses naturels (2). Il suffit, pour séparer ces différents corps, de soumettre le produit brut à l'action des dissolvants neutres : l'éther ordinaire ou l'acétate d'éthyle s'emparent d'un premier produit, fusible à 144° , que l'auteur désigne sous le nom de *phénylformosazone* et qui renferme $C^{18}H^{22}Az^2O^3$ comme la phénylglucosazone ordinaire.

Le résidu peu soluble dans l'éther donne à l'analyse des résultats qui ne concordent avec aucune formule admissible : il représente donc encore un mélange.

Enfin, si l'on traite successivement l'osazone de Loew par l'eau bouillante et l'alcool, on arrive à en extraire un nouveau composé, isomérique aussi de la phénylglucosazone et qui fond comme elle à 204° - 205° . Fischer a démontré que ce produit est identique à la phénylacrosazone dérivée de l'aldéhyde glycérique; la formose renferme donc, parmi ses composants, une certaine quantité d'acrose $C^6H^{12}O^6$.

Ce dernier corps paraît se former plus aisément lorsque, dans la préparation de la formose, on remplace la chaux par des oxydes métalliques à réactions moins vives; c'est ainsi que Loew, en traitant une solution d'aldéhyde méthylrique par la

magnésie et le sulfate de magnésie, en présence de plomb grenailé, a pu obtenir une variété de formose qui fermente immédiatement au contact de la levûre en donnant, comme les glucoses véritables, de l'acide carbonique et de l'alcool.

Ce composé est encore identique à l'acrose de Fischer, dérivé de l'acroléine ou de l'aldéhyde glycérique.

En résumé, les bases alcalines transforment, à froid, l'aldéhyde méthylrique en un mélange de différents hydrates de carbone comparables aux sucres réducteurs : les uns sont isomériques des glucoses; les autres, non encore isolés, donnent des osazones moins riches en oxygène et renferment probablement des polymères moins complexes que les glucoses, mais compris comme ces derniers dans la formule générale $C^xH^{2x}O^x$. Rien alors n'est plus naturel que d'admettre aux dépens de l'aldéhyde méthylrique la formation momentanée de l'aldéhyde glycérique qui, comme dans les expériences de Fischer, se polymérise à son tour, sous l'influence de l'excès d'alcali, et se convertit en acrose.

VI

Toutes les recherches synthétiques que nous venons d'examiner conduisent au même corps, l' α acrose $C^6H^{12}O^6$, qui présente tous les caractères d'un glucose inactif; il ne restait plus, pour obtenir enfin un sucre identique à ceux que nous rencontrons chez les plantes, qu'à transformer l'acrose en ses isomères actifs; c'est ce que vient de réaliser M. Fischer, en profitant de toutes les réactions que nous avons exposées ci-dessus et dont la plupart ont été découvertes par lui.

Dans un mémoire magistral où la finesse des observations ne cède en rien à la rigueur du raisonnement (1), M. Fischer commence par rappeler que la *mannose* ou *séminose*, substance isomérique des glucoses, que l'on obtient en oxydant la mannite ou en traitant l'ivoire végétal par l'acide sulfurique étendu et bouillant, donne par oxydation un acide particulier, l'acide *mannonique*, qui présente la même composition que l'acide gluconique $C^6H^{12}O^7$. Ce corps, qui est dextrogyre, se combine avec l'acide arabinose-carbonique lévogyre en donnant un acide *racémomannonique*, inactif par compensation.

D'autre part l'auteur établit que l' α acrose ne peut être qu'un lévulose inactif; par suite l'acrite doit être une mannite inactive, et en effet, si on l'oxyde, on obtient d'abord une mannose inactive, puis un acide *racémomannonique*, identique au précédent, qui se trouve être ainsi préparé par synthèse.

(1) *Berichte*, XIX, 2573 et XX, 2641.

(2) *Ibid.* XXI, 989 et XXII, 359.

(1) *Berichte*, XXIII, 370.

Inversement, l'acide racémomannonique peut être dédoublé en ses composants actifs : il suffit pour cela de faire cristalliser ses sels de strychnine ou de morphine : on obtient séparément les mannates droit et gauche, très inégalement solubles, d'où il est facile ensuite d'extraire les acides.

Ceux-ci, réduits par l'amalgame de sodium, donnent les deux mannoses actives et les mannites droite et gauche ; la mannose droite, qui n'est autre que la mannose naturelle, donne avec l'acétate de phénylhydrazine un précipité de glucosazone ordinaire qui, enfin, par les procédés connus, peut être transformée en lévulose identique à celle que donne l'inuline ou le sucre de cannes.


Ajoutons que, à côté de ces produits, nous voyons apparaître leurs isomères optiques inconnus jusqu'à présent, par exemple la lévulose dextrogyre, qui reste comme résidu lorsqu'on soumet la lévulose

inactive à la fermentation alcoolique, la mannose lévogyre et la mannite correspondante, que l'on n'a encore rencontrées dans aucun organisme et dont on ne soupçonnait même pas l'existence.

La synthèse des glucoses est donc en tous points parallèle à celle des acides tartriques : impuissantes à produire directement des corps actifs, ainsi que l'a si judicieusement fait remarquer M. Pasteur, nos méthodes de laboratoire peuvent néanmoins donner des substances dédoublables, que les êtres vivants ou certaines actions physiques séparent et qui se trouvent alors identiques aux véritables principes immédiats naturels.

Le tableau suivant, emprunté presque sans modification au Mémoire de M. Fischer, résume tout l'ensemble des métamorphoses que nous venons de signaler et qui conduisent de la lévulose inactive à la lévulose gauche ordinaire.

LÉVULOSE INACTIVE OU α -ACROSE (SYNTHÈSE DIRECTE PAR L'ALDÉHYDE MÉTHYLIQUE OU L'ALDÉHYDE GLYCÉRIQUE)



La dextrose et ses dérivés, tels que l'acide gluconique et l'acide saccharique, n'ont pu être encore reproduits artificiellement ; sans nul doute ils le seront, dans un avenir très prochain, venant ainsi compléter la synthèse des sucres qui se rattachent à la mannite ordinaire.

La synthèse des *bioses*, *trioses* ou dextrines, paraît moins simple que celle des glucoses : nous ignorons, en effet, la structure moléculaire de la plupart de ces composés. Faut-il les considérer comme des aldols, des éthers mixtes ou des acétals ? L'avenir seul pourra permettre de choisir entre ces différentes hypothèses.

Quelques auteurs, entre autres MM. Musculus (1), Gautier (2), Schützenberger (3), Grimaux et Lefèvre (4), ont obtenu des polyglucoses incristallisables, de l'ordre des dextrines, en traitant la dextrose ou la galactose par les acides forts, dans des conditions spéciales. M. Grimaux pense même avoir réalisé la synthèse du maltose $C^{12}H^{22}O^{11}$ par une réaction de ce genre, mais les recherches dans cette voie sont encore trop peu avancées pour que nous insistions davantage.

Nous avons voulu simplement faire voir, dans cet exposé succinct, que la reproduction des

(1) Examinée en présence de borax.

(2) Solutions acétiques.

(1) *Berichte*, XIV, 850.

(2) *Bull. Soc. chim.*, XXII, 145.

(3) *Ibid.*, XII, 204.

(4) *Comptes rendus*, CIII, 146.

poly-alcools supérieurs est possible et que les méthodes employées à cet effet jettent un jour nouveau sur les phénomènes qui président à la synthèse naturelle des hydrates de carbone.

A ce double point de vue les travaux que nous venons de rappeler présentent un intérêt considérable; et s'il est vrai que jusqu'à présent ils n'ont pu donner que des sucres à 6 atomes de carbone,

on peut considérer comme proche le moment où la synthèse aura enfin reproduit tous les autres et fourni la solution définitive de l'un des problèmes les plus importants de la chimie organique et de la physiologie.

Léon Maquenne,

Aide-naturaliste au Muséum.

REVUE ANNUELLE D'ASTRONOMIE

Dans ces dernières années, l'Astronomie n'a pas enregistré de ces découvertes brillantes qui s'imposent à l'attention générale, telles, par exemple, que la découverte de Neptune par Le Verrier et de l'Analyse spectrale par Kirchhof et Bunsen. Toutefois, pour être d'un ordre plus modeste, les découvertes récentes n'en ont pas moins fait faire à la science de remarquables progrès.

Devant nous, l'Astronomie physique s'est développée rapidement, tandis que l'Astronomie de position, obligée par sa nature à rechercher surtout une précision de plus en plus grande, s'enrichissait avec plus de lenteur. Mais la photographie est venue lui offrir un procédé à la fois rapide et précis qui lui promet dans peu d'années un développement tout à fait inespéré.

En même temps, les méthodes d'observation se perfectionnent, les instruments deviennent de plus en plus puissants, et des observatoires se fondent dans tous les pays. Aussi serait-il difficile d'énumérer brièvement les progrès qui viennent d'être réalisés dans toutes les directions. Ayant récemment consacré un article aux Comètes dans cette Revue (1) nous nous limiterons pour le moment au système solaire en laissant même de côté ce qui a rapport à la Terre et à la Lune son satellite.

I. — SOLEIL

Depuis la découverte des taches solaires, on sait que le Soleil tourne sur lui-même en 25 jours $\frac{4}{5}$. beaucoup plus tard, on s'est aperçu que les taches voisines de l'équateur font un tour complet en moins de temps que celles des latitudes élevées, de sorte que la durée de rotation augmente quand on passe de l'équateur aux pôles.

M. Wilsing vient de déterminer la durée de la rotation du Soleil, non plus à l'aide des observations de taches, mais par celles des facules, dont la persistance était déjà connue. Contrairement à

toute attente, il a trouvé ainsi la même vitesse de rotation (25 j. 5 h. 28 m.) pour tous les points de la surface solaire. Ce résultat, très important au point de vue de la théorie physique du Soleil, montre que la loi de rotation, déduite du mouvement des taches, est bornée à une couche assez mince de l'enveloppe solaire, tandis que le gros de la masse tourne tout d'une pièce, sans doute avec la vitesse constante que révèle l'observation des facules.

On a remarqué de très bonne heure que le nombre des taches varie beaucoup d'une époque à une autre, mais c'est en 1851 seulement que fut faite, par Schwabe, de Dessau, la découverte capitale de la périodicité du nombre des taches. On sait que la période est de 11 ans $\frac{1}{3}$, mais on n'en connaît pas la cause. En 1889 a eu lieu un minimum, pendant lequel le Soleil est resté quelquefois près d'un mois sans présenter des taches. Maintenant, leur nombre va augmenter graduellement jusqu'en 1894, pour rediminuer ensuite jusqu'en 1900. La durée de cette période est assez incertaine, d'abord parce qu'on ne peut indiquer avec précision l'époque exacte d'un maximum ou d'un minimum; en outre, il paraît bien établi qu'il se superpose à la période principale de 11 ans $\frac{1}{3}$ d'autres périodes 6 ou 8 fois plus longues, sur lesquelles on n'aura de données certaines que lorsque les observations s'étendront sur un laps de temps plus considérable.

Les taches ne se montrent pas indistinctement sur tous les points de la surface du Soleil, mais elles se concentrent surtout sur deux zones, appelées quelquefois *zones royales*, situées de part et d'autre de l'équateur solaire, et comprises entre les latitudes de $\pm 5^\circ$ et $\pm 30^\circ$; en outre, la distribution des taches en latitude suit une loi liée à la période de 11 ans $\frac{1}{3}$: Un peu avant le minimum, il n'y a de taches que près de l'équateur solaire (entre $+5^\circ$ et -5°); à partir du minimum, les taches, qui avaient déserté depuis

(1) Voyez à ce sujet, p. 63 de la Revue (n° 3).

longtemps les hautes latitudes, s'y montrent brusquement, vers $\pm 30^\circ$; puis se multiplient un peu partout entre les limites de $\pm 5^\circ$ et $\pm 30^\circ$, jusqu'au moment du maximum, mais en moyenne, leur latitude diminue constamment jusqu'à l'époque du nouveau minimum. D'ailleurs, cet ordre général est parfois troublé et M. Spörer vient de signaler une perturbation considérable dans l'ensemble des taches, de 1672 à 1713, pendant près d'un demi-siècle : les taches furent alors excessivement rares et ne parurent que sur l'hémisphère sud du Soleil.

Depuis longtemps on a cherché si les taches solaires produisent sur la Terre des effets notables : c'est ainsi que W. Herschel essaya d'établir un rapport entre le prix du blé et le nombre des taches. La recherche de cette influence sur les phénomènes terrestres n'a donné de résultat que depuis la découverte de la périodicité des taches; mais le seul obtenu indiscutablement jusqu'ici, la relation avec le magnétisme terrestre, est de la plus haute importance.

On sait qu'en chaque lieu, la direction de l'aiguille aimantée n'est fixe qu'à *peu près*; en l'observant avec soin, on la voit varier presque continuellement. Parmi ces petits changements, il en est un qui se dégage sans peine, la variation diurne, ainsi appelée parce qu'elle se reproduit tous les jours et dont voici l'allure générale dans l'hémisphère nord : entre le lever du Soleil et une ou deux heures de l'après-midi, le pôle nord de l'aiguille se porte vers l'ouest; il revient ensuite vers l'est, passe par sa position moyenne vers 10 heures du soir et reste à peu près stationnaire pendant la nuit. L'amplitude de cette oscillation diurne, plus faible en hiver qu'en été, varie beaucoup d'un lieu à un autre; mais sa valeur moyenne, pour un lieu donné, croît et décroît assez régulièrement pendant une période de 11 ans, qui coïncide avec celle des taches solaires, de sorte que les maxima et les minima des oscillations magnétiques correspondent aux maxima et aux minima du nombre des taches.

Dans ces dernières années, on s'est aperçu que la dépendance est plus intime encore; dès qu'une belle tache se montre sur le Soleil, les perturbations de l'aiguille aimantée deviennent de plus en plus grandes. D'après les recherches que vient de publier M. Marchand, de l'Observatoire de Lyon, les régions principalement actives du Soleil sont celles où se trouvent des groupes de facules, et le passage d'une de ces régions par le méridien central (par suite de la rotation du Soleil) correspond au maximum d'intensité d'une perturbation magnétique, et réciproquement.

Des travaux récents ont prouvé l'existence, dans

les variations du magnétisme terrestre, d'une période d'environ 26 jours, coïncidant avec la durée de la rotation du Soleil; mais ici la concordance n'est pas aussi manifeste que pour la période de onze ans.

Enfin on a soutenu que l'état de la surface solaire est un facteur déterminant de notre météorologie terrestre, faisant sentir son influence sur la température, la pression barométrique, les pluies, les cyclones, les récoltes... Mais il résulte de l'ensemble des recherches faites sur ce sujet, que cette influence est au moins bien faible.

On avait pensé que le diamètre du Soleil pouvait varier, dans d'étroites limites, suivant son activité plus ou moins grande, manifestée par les taches et les protubérances; et certaines observations paraissaient prouver que ce diamètre est plus grand à l'époque du minimum des taches. Dans un grand travail, où il a mis en œuvre toutes les observations utilisables faites jusqu'ici, M. Auwers vient de prouver que ce diamètre ne présente ni changements périodiques, ni changements progressifs; et il n'y a particulièrement aucun rapport avec la période des taches. Pour l'aplatissement du Soleil, M. Auwers trouve $\frac{1}{4000}$.

Depuis plusieurs années on avait émis l'idée que la période des taches solaires règle les modifications de la Couronne, sorte de gloire lumineuse de nature inconnue, qu'on aperçoit autour du soleil pendant les éclipses totales. Cela se trouve confirmé par les observations de l'éclipse de Soleil du 1^{er} janvier 1889, qui a été totale dans la partie Ouest de l'Amérique du Nord et qui a été observée par diverses missions américaines munies de puissants instruments. On a obtenu de beaux dessins de la Couronne, qui a présenté un éclat exceptionnel, et qui ressemblait alors dans ses traits principaux à celles de 1867 et de 1878.

II. — MERCURE ET LES PLANÈTES INTRA-MERCURIELLES

Les plus grandes elongations de Mercure ne peuvent dépasser 29° . Plongée presque toujours dans les rayons du Soleil, cette planète est assez rarement visible à l'œil nu et seulement le soir quelque temps après le coucher du Soleil ou le matin avant son lever; aussi, Copernic, gêné par les brouillards de la Vistule, ne put jamais l'observer.

D'après les observations faites par Schröter, il y aura bientôt cent ans, on a admis jusqu'à ce jour que Mercure tourne sur lui-même en 24 heures environ; mais M. Schiaparelli vient d'annoncer (Voyez le premier numéro de cette Revue, p. 31) que, d'après ses observations, poursuivies de 1881 à 1889, cette durée de rotation est égale à la durée de révolution de la planète autour du Soleil, ou

88 jours : de même que la Lune par rapport à la Terre, Mercure présente donc toujours la même face au Soleil, toutefois avec une libration très forte. Comme l'intensité de la chaleur solaire est sept fois plus forte sur Mercure que sur la Terre, on peut juger par là ce que doit être la température qui règne sur la partie éclairée de la planète, tandis que l'autre partie, plongée dans une nuit sans fin, est à une température sans doute très basse.

Comment a-t-on pu admettre si longtemps une durée de rotation aussi éloignée de la vérité ? L'explication est facile : sous nos latitudes on ne peut jamais observer utilement Mercure dans la nuit complète, mais seulement dans le crépuscule, pendant peu de temps et à peu près aux mêmes heures ; or on retrouvait ainsi pendant plusieurs jours consécutifs les mêmes détails : il en résulte que la durée de rotation est ou bien voisine de celle de la Terre (ou une fraction aliquote de celle-ci), ou bien enfin très lente et presque insensible d'un jour à l'autre : la première hypothèse fut acceptée par Schröter et après lui par tous les astronomes, tandis que la dernière est la vraie.

La masse de Mercure est mal connue également, parce qu'on ne lui a pas trouvé de satellite ; comme cette masse est très faible, on ne peut la déduire avec précision des perturbations qu'elle produit sur les autres planètes. La comète d'Encke, lorsque sa théorie sera terminée, en fournira une valeur assez précise, car en 1838 et en 1878 elle s'est beaucoup rapprochée de Mercure.

Dès le commencement de sa carrière astronomique, Le Verrier s'occupa de la théorie de Mercure qui avait toujours présenté de grandes difficultés. Dans la suite, il reprit ce travail et l'ayant terminé, en 1859, il annonça que le mouvement du périhélie de cette planète présentait une accélération séculaire inexplicable par la loi de la gravitation universelle et en tenant compte des actions exercées par les planètes connues. Il se trouva conduit ainsi à admettre l'existence d'une ou de plusieurs planètes intra-mercurielles (1). c'est-à-dire plus voisines encore du Soleil et qui par suite ne peuvent être aperçues que lorsque, dans leurs conjonctions inférieures, elles passent devant le disque du Soleil, ou pendant l'obscurité des éclipses totales de Soleil. A diverses époques on avait vu passer devant le Soleil des corps ronds, opaques, se projetant en noir sur son disque, qu'ils traversaient beaucoup plus rapidement que des taches ordinaires. L'hypothèse de Le Verrier, qui rendait bien compte de ces passages en les attri-

buant aux planètes intra-mercurielles, fut acceptée avec enthousiasme et confirmée bientôt après par un autre passage du même genre, observé par le D^r Lescarbault, à Orgères. Au moyen des observations qui lui parurent les plus sûres, Le Verrier essaya de calculer l'orbite de la planète hypothétique, qui reçut le nom de Vulcain ; et il annonça comme possible un nouveau passage sur le Soleil, du 21 au 23 mars 1877. Mais la subtile planète fut cherchée en vain, et on se rejeta sur les éclipses totales de Soleil. Les astronomes les plus habiles la cherchèrent pendant les éclipses du 29 juillet 1878 et du 6 mars 1883, mais tous les efforts restèrent infructueux, et depuis lors la question des planètes intra-mercurielles est un peu tombée dans l'oubli.

Il faut ajouter que les calculs de Le Verrier, vérifiés par divers astronomes, ont été complètement confirmés ; et le mouvement anormal qu'il avait signalé dans le périhélie de Mercure attend encore une explication (1).

III. — VÉNUS

De toutes les planètes, c'est Vénus qui ressemble le plus à la Terre, dont elle se rapproche parfois beaucoup, car leur distance peut descendre à 0,25 en prenant pour unité la distance de la Terre au Soleil, comme on le fait ordinairement. Aussi est-elle parfois très brillante ; son éclat dépasse alors celui de toutes les autres planètes et des plus belles étoiles, et il n'est pas rare de l'apercevoir à l'œil nu en plein jour, surtout si l'on connaît à peu près sa position. Malgré son éclat, on n'a pu distinguer à sa surface des détails bien saillants, de sorte que sa durée de rotation ($23^h 21^m$) n'est pas très exactement connue. Cependant M. Stanley Williams y a vu en 1884 une bande noire étroite, assez longue, figurant comme l'embouchure d'une rivière.

On a pu croire pendant longtemps à l'existence d'un satellite de Vénus, signalé par divers astronomes, depuis Fontana en 1645, jusqu'à Horrebow en 1768 ; mais on ne l'a plus revu depuis cette dernière époque, malgré la puissance croissante des instruments.

Houzeau était arrivé à cette conclusion bizarre qu'on pourrait peut-être concilier un certain nombre d'observations de ce prétendu satellite, en admettant l'existence d'une nouvelle planète circulant entre Vénus et la Terre, et qu'il avait appelée Neith.

Il était plus rationnel de se demander, avec M. J. Bertrand, si ces observations ne se rapporteraient pas à certaines des petites planètes découvertes depuis. M. Stroobant, qui vient de faire une

(1) Voyez la *Notice sur les planètes intra-mercurielles*, par M. F. Tisserand (Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1882, p. 729-772).

(1) Voyez à ce sujet la remarque de M. Tisserand dans la Revue du 28 février dernier, page 127.

étude approfondie de cette question, n'admet la possibilité que pour Vesta, qui d'ailleurs ne s'est jamais trouvée à la distance voulue de Vénus; mais on peut croire que du côté des principaux astéroïdes il reste encore un supplément d'enquête à faire. Pour quelques observations, M. Strobobant a réussi à identifier le prétendu satellite avec de petites étoiles dont la planète se trouvait voisine, et sans doute les autres observations sérieuses, peu nombreuses du reste, trouveront un jour ou l'autre leur explication. Ainsi se trouve dissipé le mystère qui enveloppait cet énigmatique satellite de Vénus, dont la légende menaçait de se perpétuer.

IV. — MARS

Vu de la Terre, Mars se trouve à l'opposé du Soleil (ou, comme on dit, en opposition) tous les 26 mois environ; sa distance à la Terre peut alors descendre à 0,38 et c'est à ce moment qu'il se trouve, à tous égards, dans les meilleures conditions pour l'observation. L'opposition très favorable de 1877 conduisit à deux découvertes importantes : celle des deux satellites de Mars par M. Asaph Hall à Washington et celle des canaux de Mars, par M. Schiaparelli à Milan.

Tandis que Mars fait un tour sur lui-même en $24^h 37^m$, son satellite le plus voisin (Phobos) tourne autour de la planète en $7^h 39^m$; il en résulte ce cas unique dans tout le système solaire que pour un observateur placé sur Mars ce satellite se lève à l'Ouest, exécute son mouvement apparent de droite à gauche et se couche à l'Est. La rapidité de son mouvement constitue une objection sérieuse contre la théorie nébulaire, telle du moins que l'avait énoncée Laplace.

Certaines petites planètes passent parfois bien près de Mars, et M. Dubois pensait que les satellites de cette planète pouvaient être deux astéroïdes détournés de leur route par l'attraction de Mars. Mais M. H. Poincaré a montré, par deux ordres de considérations tirées de la Mécanique céleste, que cela est impossible.

Depuis les travaux de M. Schiaparelli (1) sur la topographie de Mars, cette planète est celle dont nous connaissons le mieux la surface. La comparaison des anciennes observations avec les récentes montre que les taches sombres de Mars sont fixes dans leurs positions relatives et invariables dans leurs contours généraux.

Outre les taches polaires, bien connues par leur éclat et leur étendue variable, la surface de Mars

se distingue en deux parties : 1^{re} la plus brillante, ce qu'on appelle *terres* ou *continents*, forme l'hémisphère boréal tout entier et une portion de l'hémisphère austral; elle est généralement de couleur jaune foncé ou orangé, variable d'un point à un autre; 2^o la région sombre, celle des *mers*, qui occupe la majeure partie de l'hémisphère austral, et dont la couleur générale gris de fer passe par toutes les gradations, du noir foncé au gris cendré. En outre, certaines régions mixtes situées souvent entre les continents et les mers, participent des caractères de ces deux parties.

Les taches polaires sont regardées, avec un certain degré de probabilité, comme offrant quelque analogie avec les glaces polaires de la Terre. L'obliquité de l'écliptique, pour un observateur placé sur Mars, est de $24^{\circ}52'$; ce qui donne aux saisons de Mars une succession analogue à celles de la Terre, mais dont la durée est à peu près deux fois plus longue, puisque l'année de Mars correspond à 687 de nos jours. — On a remarqué depuis longtemps que par l'effet de ces saisons les taches polaires de Mars subissent des variations périodiques analogues à celles que présentent sur la Terre les glaces polaires dans les saisons correspondantes; ainsi, lorsque l'hémisphère austral de Mars est dans la saison chaude, sa tache polaire diminue d'étendue sur ses bords, pour augmenter de nouveau quand revient la saison froide.

On a observé des changements de teinte sur les mers, et aussi sur les régions mixtes. Dans l'espace d'une même soirée, M. Perrotin a vu une région se couvrir et se découvrir tour à tour d'une sorte de brouillard rougeâtre, tandis que le reste de la planète continuait à se montrer avec la plus grande netteté. D'autre fois les limites des parties maritimes et des parties continentales se déplacent : par exemple, pour la région continentale appelée *Lybia*, M. Schiaparelli l'a vue envahie graduellement de plus en plus en 1879, en 1884 et en 1888; quoique cet envahissement ait été constaté dans un intervalle de 9 années, il croit que de pareils changements peuvent se renouveler à chaque révolution de Mars, mais ils passent inaperçus; la cause en est que Mars et la Terre ayant des durées de révolution très voisines, dans plusieurs soirées successives et aux mêmes heures Mars nous présente toujours à peu près la même région; par suite, en un lieu donné et pendant toute la durée d'une même opposition il n'est possible d'observer qu'une faible partie de la surface de Mars; et cette même partie ne sera pas observable pendant les oppositions qui suivront immédiatement.

Dans la même région *Lybia*, M. Schiaparelli a vu, de 1877 à 1882, une petite tache d'un blanc clair (*Nix Atlantica*) dont la blancheur était comparable

(1) M. Schiaparelli a résumé ses recherches dans une importante étude publiée dans le journal astronomique *Himmel und Erde* et dont l'*Astronomie* de 1889 a donné une traduction.

à celle des taches polaires et qui pouvait être de la même nature; elle présente des variations d'éclat et de forme et n'a pas été revue. Si son apparition dépend des saisons de Mars, on peut s'attendre à la revoir en 1892 et en 1897 et on sent de quelle importance serait son retour pour la connaissance de la constitution physique de la planète.

Enfin, dans la partie continentale se trouvent des bandes minces de même teinte que les taches sombres, de sorte que si celles-ci sont des mers, ces bandes peuvent être considérées comme des *canaux* : c'est le nom qui leur a été donné, sans rien préjuger d'ailleurs sur leur véritable nature. Un de ces canaux, beaucoup plus visible que les autres et qui a 200 à 300 kilomètres de large, se trouve déjà dans les dessins de Schröter et a été souvent observé depuis. Mais en 1877, M. Schiaparelli en a découvert un grand nombre, de 60 à 100 kilomètres de large, formant un véritable réseau qui enveloppe toutes les régions continentales.

Un caractère général de ces canaux c'est qu'aucun d'eux ne s'arrête court; ne forme de tronçon isolé : tout canal aboutit à une mer, à un lac ou à un autre canal. Ces canaux peuvent se couper deux à deux sous tous les angles possibles; leur longueur est très variable et certains d'entre eux suivent, sans irrégularité une ligne de grande étendue, qui embrasse plus du quart de la circonférence de la planète (5,400 kilomètres); la largeur d'un même canal peut varier avec le temps et cette variation s'étend simultanément sur toute sa longueur. Enfin les canaux peuvent devenir invisibles à certaines époques, et M. Schiaparelli ajoute avec toute réserve que, suivant ses observations, l'époque la plus favorable pour l'invisibilité des canaux est voisine du solstice austral de la planète, c'est-à-dire de l'époque où la région des canaux est en son hiver.

La plus remarquable transformation de ces canaux c'est celle de leur gémiation : elle consiste en ceci, qu'un canal simple peut, en quelques jours et même en quelques heures, être remplacé par un canal double, c'est-à-dire formé de deux bandes très voisines, ordinairement égales, parallèles, de même largeur et de même couleur, mais dont la distance varie beaucoup d'une gémiation à l'autre. Souvent une des bandes du double canal occupe exactement la place du canal primitif, mais en 1888 M. Schiaparelli a vu des gémiations qui ne suivaient qu'à peu près la direction générale et l'emplacement de l'ancien canal.

Quand deux ou plusieurs canaux se rencontrent, il se forme au point commun un petit lac ou nœud plus ou moins régulier qui se gémine comme les

canaux : de là résulte ordinairement un réseau de lignes où rien ne se distingue à cause de la grande quantité de détails.

On sait que le dédoublement d'un canal se produit simultanément sur toute sa longueur, mais le détail de cette transformation n'a pas encore été saisi. Fréquemment on a vu les deux lignes se dégager simultanément d'une nébulosité grise plus ou moins intense, allongée dans la direction du canal et qui paraît jouer un rôle essentiel dans la production des gémations; c'est comme une matière dans laquelle se prononcent des formes qui n'existaient pas, en quelque sorte comme des soldats dispersés irrégulièrement et qui peu à peu se forment en rangs et en colonnes.

Les gémations disparaissent à leur tour et sont remplacées par un canal simple, mais on ne sait pas encore comment s'effectue ce changement.

On voit que la cause productrice des gémations n'opère pas seulement le long des canaux, mais elle agit aussi sur les surfaces sombres de forme quelconque pourvu qu'elles ne soient pas trop étendues; et cette cause paraît exercer sa puissance même sur les mers permanentes.

Le caractère de ces phénomènes paraît être périodique, mais il faudra de nombreuses observations pour l'établir avec certitude : les prochaines pourront se faire dans l'opposition de 1892 qui aura lieu à peu près dans les mêmes conditions que celle de 1877.

Ces phénomènes, si différents de ceux que nous observons autour de nous, sont bien propres à imposer un frein à l'essor de notre imagination, quand elle veut appliquer à l'étude physique de Mars l'analogie tirée des faits que nous observons sur la Terre. Mais l'esprit humain est ainsi fait qu'il a besoin d'une explication, quelle qu'elle soit.

M. Fizeau a émis l'idée que les canaux de Mars pourraient être des crevasses dans des glaciers. Dans nos régions polaires, en effet, il se produit des changements incessants, tels que rides parallèles, crevasses, fentes rectilignes souvent très longues; dans la région du Groenland, M. Nordenskiöld a rencontré des phénomènes de ce genre tout à fait remarquables par leur importance. Sur Mars, l'étendue des glaciers doit être beaucoup plus grande, car l'échauffement du Soleil n'est que les $\frac{2}{3}$ de celui qu'il produit sur la Terre; en outre Mars ne paraît pas être protégé par une épaisse atmosphère; on pourrait donc admettre qu'il existe à sa surface des glaciers analogues aux nôtres, mais d'une tout autre importance, et dont les mouvements et les ruptures doivent être également plus prononcés.

Cependant cette hypothèse soulève de graves difficultés, car les canaux sont encore visibles

quand la tache polaire voisine, que l'on peut assimiler à nos glaces polaires, a été fortement réduite par la chaleur de l'été.

Quant au dédoublement des canaux, M. Meisel l'explique par une double réfraction à travers une couche cylindrique de vapeurs ; mais, étant donné ce que nous savons de la faible puissance réfractive de la vapeur d'eau, une telle explication est bien difficile à admettre ; d'ailleurs on ne voit pas pourquoi, par exemple, la gémination s'étendrait toujours sur toute la longueur de chaque canal.

V. — PETITES PLANÈTES

Cérés, la première des petites planètes, fut découverte le premier jour de ce siècle, le 1^{er} janvier 1801 ; la 5^e fut découverte en 1845 ; dès ce moment leur nombre s'accrut avec rapidité : la 100^e fut trouvée en 1868, la 200^e en 1879 ; aujourd'hui on en connaît 290 et on en découvre en moyenne 6 à 10 par an.

Le calcul des positions des petites planètes déjà découvertes et leur observation constituent pour l'astronomie actuelle une charge extrêmement lourde que certains astronomes paraissent disposés à ne plus accepter. Mais en cessant de suivre les astéroïdes connus, on tomberait aussitôt dans un inextricable désordre. En outre, ces astres, qui ont révélé des faits intéressants, peuvent rendre encore d'importants services : par exemple la planète ⁽²⁷⁹⁾ *Thule*, découverte en 1888, a le demi-grand axe de son orbite égal à 4,26 ; par suite elle peut se rapprocher beaucoup de Jupiter (leur distance peut descendre à 0,83) et fournir plus tard le moyen de déterminer sa masse avec une grande précision. D'autres, au contraire, se rapprochent assez de la Terre pour qu'on puisse déterminer avantageusement leur parallaxe et en déduire celle du Soleil avec une précision supérieure à celle que donnent les passages de Vénus sur le Soleil : telles sont les planètes ⁽¹²⁾ *Victoria* et ⁽⁸⁰⁾ *Sapho*, dont on a déterminé en quelque sorte directement les distances à la Terre en 1882 et en 1889, pour en déduire la distance de la Terre au Soleil.

On ne peut donc négliger les astéroïdes connus ; mais il est indispensable de coordonner les efforts de ceux qui les calculent et de ceux qui les observent ; il faudrait s'en tenir au strict nécessaire et avoir recours aux procédés qui permettent de multiplier rapidement les observations ; par exemple, tout ce qui accroîtra la puissance des instruments méridiens rendra de ce côté de grands services.

Les petites planètes qu'on découvre maintenant sont de plus en plus faibles et on peut croire que la partie principale de l'essaim est désormais

connue ; cependant par les découvertes successives, l'espèce d'anneau qu'elles forment se développe surtout vers l'extérieur, et il serait téméraire de rien affirmer à ce sujet, les astéroïdes éloignés ne nous ayant peut-être échappé que par la faiblesse qui résulte de leur grande distance au Soleil et à la Terre. Cet anneau est d'ailleurs loin de présenter partout la même densité ; il y a des lacunes qui se trouvent surtout aux distances où les perturbations de Jupiter seraient les plus fortes ; c'est donc à son action qu'il faut les attribuer. Ces planètes sont si petites que les instruments les plus puissants montrent la plupart d'entre elles sans disque apparent, comme un simple point : Vesta, la plus belle de toutes, aurait, d'après Mœdler, un disque de 0',64 à la distance 1, ce qui répond à un diamètre de 460 kilomètres. Mais des mesures récentes donnent des valeurs plus que doubles, de sorte que le diamètre de Vesta pourrait aller à 1000 kilomètres ; son volume serait alors $\frac{1}{2000}$ de celui de la Terre. M. Pickering a trouvé 513 kilomètres par le procédé photométrique, seul applicable dans la plupart des cas. Dans ce procédé on compare, à l'aide d'un photomètre, les éclats de l'astéroïde considéré et d'une planète telle que Mars dont le diamètre est bien connu. Si l'on admet que les deux planètes réfléchissent également la lumière du Soleil, du rapport des éclats on peut déduire le rapport des surfaces, puis celui des diamètres. On a trouvé ainsi pour certains astéroïdes des diamètres de 20 kilomètres à peine, et d'autres paraissent plus petits encore, de sorte qu'on n'est pas très éloigné des dimensions des gros bolides.

La méthode photométrique peut seule donner une idée des durées de rotation de ces petits corps sur eux-mêmes, en montrant des variations d'éclat dues aux différences de pouvoir réflecteur des diverses parties de chaque planète. Pour Vesta cette variation d'éclat est au moins très faible ; pour d'autres elle est hors de doute ; mais on n'a conclu encore aucune durée de rotation.

On ne possède que des données tout aussi vagues relativement aux masses des petites planètes. Le Verrier a montré que celles qui sont comprises entre les distances moyennes au Soleil 2,20 et 3,16 ont une masse totale plus petite que le quart de celle de la Terre, mais cette limite paraît bien supérieure à la réalité. En admettant en effet que les petites planètes aient toutes des pouvoirs réflecteurs égaux, Vesta formerait, en volume, $\frac{1}{5}$ de l'ensemble ; comme son diamètre peut monter à 1000 kilomètres, en supposant une densité moyenne égale à celle de la Terre, sa masse en serait $\frac{1}{2000}$; ce qui porterait la masse de l'essaim entier à $\frac{1}{400}$ de celle de la Terre.

VI. — JUPITER

Le fait le plus saillant observé sur Jupiter, c'est la présence d'une grande tache rouge, ovale, aperçue d'abord en 1878 et qui persiste encore. Dans l'intervalle son aspect a changé notablement : en 1881, les deux bouts étaient plus foncés que la partie moyenne ; cette différence n'existait plus en 1882 et la tache avait pâli ; en 1883 elle était plus faible encore, mais elle se montra bien nette en 1886. Ses dimensions paraissent avoir varié légèrement et ses observations ont conduit à des durées de rotation un peu différentes d'une année à l'autre mais s'écartant peu de $9^h 55^m 40^s$; certaines taches blanches ont donné un nombre très différent, $9^h 50^m 9^s$: on sait du reste depuis longtemps que les vitesses de rotation changent avec la latitude.

Les éclipses des satellites de Jupiter ont fourni un moyen précieux pour la détermination des longitudes et de la vitesse de la lumière, mais leur incertitude est telle que pour ces déterminations on doit leur préférer aujourd'hui d'autres méthodes. La cause fondamentale de cette incertitude est la variation lente de l'éclat du satellite au moment de sa disparition ou de sa réapparition. M. Cornu a imaginé d'observer non plus le moment, si difficile à saisir, où le satellite atteint l'extrême limite de visibilité, mais celui de son demi-éclat, que l'on détermine photométriquement. Cette méthode, développée par M. Obrecht, offre le double avantage d'augmenter la précision et de simplifier les calculs nécessaires pour utiliser les observations.

Quand ces satellites se projettent sur la planète, ils présentent des variations d'éclat considérables relativement à Jupiter ; même le 4^e satellite forme par moments sur la planète une tache noire qui a été prise quelquefois pour son ombre. Pour expliquer ces phénomènes M. Spitta les a reproduits artificiellement : Jupiter était représenté par un disque de carton blanc ou par une boule de plâtre, ayant l'un et l'autre $0^m 10$ de diamètre ; les satellites étaient figurés par de petits disques de $0^m 003$ de diamètre, peints en gris plus ou moins foncé ; le tout, fortement éclairé, était observé avec une lunette placée à 60 mètres. Il résulte de ces expériences que les variations relatives d'éclat, disparitions, réapparitions du 4^e satellite ont leur origine dans le faible pouvoir réflecteur de sa surface.

Avec un appareil du même genre mais dans lequel le satellite se déplaçait par rapport à la planète, M. André a étudié les phénomènes qui accompagnent les disparitions des satellites derrière le disque de Jupiter et leurs réapparitions ; il a pu reproduire le ligament brillant qui

prend naissance quand un satellite approche de la planète, et montrer que, comme le ligament noir des passages de Mercure, de Vénus, il a une origine purement instrumentale.

VII. — SATURNE

Le 6 mars 1889 un astronome amateur bien connu, M. le Dr Terby, de Louvain, remarqua sur l'anneau de Saturne un éclat blanc inaccoutumé, une sorte de tache brillante qui tranchait sur le restant de l'anneau et qui était située contre l'ombre projetée sur l'anneau par le globe de la planète. M. Terby se crut d'abord en possession d'un moyen de déterminer exactement la durée de rotation de l'anneau, sur laquelle on n'a que des données incertaines ; mais au bout d'environ trois heures la tache n'avait en rien changé de position. Signalée dès le 14 mars à divers observatoires, cette tache fut étudiée partout avec soin, mais beaucoup d'astronomes la cherchèrent en vain ; il paraît résulter de l'ensemble des observations que son éclat est variable et aurait passé par un maximum tout à fait insolite dans la première moitié de mars 1889. Ce qui confirme sa variabilité, c'est que dans la suite M. Céraski, de Moscou, a retrouvé dans ses notes un croquis de Saturne fait en 1884 et indiquant une région brillante sur l'anneau au point même indiqué par M. Terby. Cette tache, conservant toujours la même position par rapport au globe de la planète, ne peut faire partie intégrante de l'anneau, qui tourne dans son plan. On a voulu y voir un effet de contraste avec la plage noire contiguë : il existe en effet le long de l'ombre du globe une étroite bande blanchâtre difficile à apercevoir et que l'on pourrait attribuer à cette cause ; mais la région brillante vue par M. Terby le 6 mars était bien plus étendue, plus prononcée, et son existence n'a pas reçu d'explication plausible.

L'anneau de Saturne n'est pas formé tout d'une pièce, car dans ce cas il se détruirait rapidement ; on y distingue même trois parties concentriques, trois anneaux, et on admet généralement l'idée émise autrefois par Roberval qu'ils sont formés par des essaims de corpuscules voisins les uns des autres et circulant autour de la planète. Comme les anneaux principaux sont plus brillants que le globe de Saturne, M. Lockyer a pensé que cet excédent de lumière peut provenir de collisions entre les corpuscules ; dans ce cas le spectre de l'anneau présenterait les raies brillantes de vapeurs résultant des chocs ; le 2 février 1889 il a obtenu une photographie du spectre de ces anneaux et on y remarque en effet des traces de raies brillantes, mais dont l'existence demande à être con-

trôlée, car M. Huggins n'a trouvé, de son côté, que des raies appartenant au spectre du Soleil.

Ces anneaux présentent des changements, toujours faibles, difficiles à observer, mais nombreux et dont l'existence est bien certaine : ce sont tantôt la disparition ou le déplacement de certaines séparations entre les anneaux, d'autres fois une dissymétrie momentanée dans ces divisions, l'apparition de points de lumière déjà signalés par Messier, de parties un peu moutonnées, etc. ; sur tous ces changements on lira avec intérêt un Mémoire de M. Trouvelot, inséré au *Bulletin astronomique* (I, p. 527, et II, p. 15).

Enfin mentionnons, en terminant, les lueurs annulaires signalées par dom Lamey, concentriques à Saturne et extérieures aux anneaux : ces lueurs, au nombre de quatre, représenteraient les parties les plus visibles d'autant de nouveaux anneaux, qui seraient en relation avec les satellites, car leur maximum d'éclat concorde généralement avec le satellite le plus voisin.

S'il n'y a point là quelque illusion, l'étude de ces anneaux promet d'intéressantes révélations à la Mécanique céleste, et nous aurons sous les yeux la transformation lente d'un anneau nébuleux se résolvant en satellite.

VIII. — URANUS

Pour les planètes précédentes, les plans des orbites des satellites font, avec l'écliptique, des angles assez petits. Il n'en est pas de même pour Uranus, dont les satellites se meuvent au contraire dans un plan presque perpendiculaire à l'écliptique. Quant à la position de l'équateur, on la considère comme indiquée par de très faibles bandes sombres, parallèles, analogues à celles de Jupiter, mais difficiles à apercevoir et qui ont été vues rarement. En 1884, on avait conclu de quelques mesures que l'angle formé par l'équateur et le plan des orbites des satellites atteignait 41° , ce qui serait une autre anomalie ; mais il résulte d'observations faites en 1889 par M. Perrotin que cet angle est au contraire petit, 10° environ. Les bandes d'Uranus ne présentent pas toujours le même aspect ; elles varient en nombre et en largeur dans les diverses parties de leur circonférence : cette inégale distribution permettra peut-être de déterminer la durée de rotation de la planète, durée qui est inconnue.

Le spectre d'Uranus a été étudié en 1889 par M. Lockyer, qui a cru apercevoir des cannelures brillantes dont quelques-unes appartiendraient au carbone ; de son côté, M. Huggins a obtenu du même spectre et après deux heures de pose une

image photographique qui s'étend de F à N et sur laquelle on reconnaît distinctement toutes les raies principales d'un spectre solaire photographié sur la même plaque ; et il n'y a pas d'autres raies, ni lumineuses, ni noires. Cette photographie met donc hors de doute que la lumière de la planète, au moins pour la région du spectre de F jusqu'à N, est empruntée au Soleil.

IX. — NEPTUNE ET LES PLANÈTES ULTRA-NEPTUNIENNES

Des observations photométriques ont indiqué pour Neptune une petite variation d'éclat dont la période serait de $7^h 53^m$; telle serait alors la durée de rotation de la planète ; mais la variation d'éclat est très faible, si même elle existe ; cette durée de rotation ne mérite donc pas une grande confiance.

On a cru voir autrefois autour de Neptune un anneau, dont l'existence n'a pas été confirmée. Nous ne connaissons à cette planète qu'un seul satellite, découvert il y a plus de 40 ans. Il résulte des observations faites depuis lors, que son orbite éprouve des perturbations notables : M. Tisserand et M. Newcomb viennent de montrer, indépendamment l'un de l'autre, que ces perturbations s'expliquent en admettant que Neptune soit un peu aplati et que son équateur fasse un certain angle avec l'orbite de son satellite.

Tout le monde sait dans quelles remarquables circonstances a été découvert Neptune, dont la position fut déduite par Le Verrier des perturbations qu'il exerce sur Uranus. Le jour même où il annonçait à l'Académie la découverte de sa planète, le 5 octobre 1846, Le Verrier exprimait l'espoir qu'après trente ou quarante années d'observations de la nouvelle planète on pourrait l'employer à son tour pour découvrir celle qui la suit.

Mais dans la partie de son orbite où a été observé Neptune, son mouvement est conforme à la loi de l'attraction universelle, en tenant compte des actions des seules planètes connues. L'espoir de Le Verrier doit donc être reporté à une époque éloignée.

D'autres astronomes ont cherché si la position de la planète ultra-neptunienne ne serait pas indiquée par son influence sur les orbites des comètes ; mais de ce côté on n'a pu arriver non plus à une conclusion quelque peu certaine. Dans l'état actuel des choses il est probable que nous devons à la photographie astronomique la connaissance de la nouvelle planète, si elle existe.

G. Bigourdan,

Astronome adjoint à l'Observatoire de Paris.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques.

Appell (P.). — Sur les invariants de quelques équations différentielles. *Journal de Mathématiques*, 4^e série, t. V, 1889.

Le domaine des invariants, d'abord limité à l'algèbre supérieure, embrasse aujourd'hui toutes les parties des Mathématiques. L'introduction de cette notion d'invariant dans la théorie des équations différentielles linéaires constitue une des belles découvertes de Laguerre, dont les travaux d'Halphen ont montré depuis toute l'importance. Dans une série de mémoires et plus particulièrement dans le tome XXIV des *Mathematische Annalen*, M. Sophus Lie, se plaçant à un point de vue plus général, a montré que toutes les classes d'équations différentielles doit posséder une infinité d'invariants, sous certaines conditions qu'il serait trop long de rappeler ici. C'est à cet ordre d'idées que se rattache le Mémoire de M. Appell.

L'auteur considère d'abord les équations du premier ordre, où $\frac{dy}{dx}$ est égale à une fonction rationnelle de y , dont les coefficients sont des fonctions quelconques de la variable indépendante. Une telle équation ne change pas de forme quand on y change la variable indépendante et qu'on remplace la fonction inconnue par une fonction entière et linéaire de la nouvelle inconnue. M. Appell montre que toute équation rentrant dans ce type peut être ramenée à une forme canonique ; les coefficients de cette forme sont des invariants absolus et tous les autres peuvent s'en déduire très simplement. On peut dire que le travail de M. Appell est pour ce type d'équations ce qu'est le Mémoire couronné d'Halphen pour les équations linéaires.

Dans la seconde partie du Mémoire, M. Appell étudie les équations homogènes en $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$, et plus particulièrement les équations du second ordre et du second degré. Il paraît naturel d'étudier ces équations après les équations linéaires, car elles jouissent comme celles-ci de la propriété de conserver la même forme quand on fait un changement quelconque de variable indépendante et qu'on multiplie y par une fonction quelconque de cette variable. Ces recherches n'ont pas seulement un intérêt théorique. Elles permettent d'aborder l'étude des cas où l'intégrale générale d'une équation différentielle dépend algébriquement des constantes arbitraires.

E. GOURSAT.

Hirsch (J.), ingénieur en chef des ponts et chaussées, Professeur au Conservatoire des Arts-et-Métiers.

— Expériences sur les coups de feu des chaudières à vapeur. *Annales du Conservatoire des Arts-et-Métiers*, 2^e série, tome 1^{er}, 1839. Gauthier-Villars et fils.

Une chaudière a reçu un coup de feu lorsqu'en un point de la paroi la tôle a été portée au rouge ; cette chaudière est alors dans de mauvaises conditions : la qualité du métal a été altérée, les clouures voisines ont été plus ou moins désorganisées, la sécurité n'existe plus.

En raison même de la gravité que présentent les coups de feu et des dangers qu'ils peuvent faire naître, il y a une réelle utilité à étudier les circonstances de leur production, les conditions qui les favorisent, les moyens dont on dispose pour les éviter ; c'est ce qu'a fait M. Hirsch dans une longue série d'expériences.

La première partie du Mémoire donne la description et les résultats des recherches entreprises pour étudier l'intensité du flux de chaleur qui, dans une chaudière ordinaire, traverse la paroi au droit du coup de feu.

M. Hirsch trouve qu'aux allures ordinaires des générateurs fixes de l'industrie, la vaporisation au coup de feu ne dépasse pas 100 à 140 kgs d'eau froide par heure et par mètre carré de surface de chauffe.

Ce résultat obtenu, de nombreuses expériences ont été instituées pour étudier la transmission de la chaleur, soit à travers le métal, soit du métal à l'eau ; les conséquences de ces expériences sont exposées dans la seconde partie du Mémoire qui se termine par l'étude spéciale de l'influence des enduits gras.

Nous ne pouvons mieux faire que de citer les conclusions auxquelles parvient M. Hirsch :

1° Une tôle saine et continue, bien mouillée par l'eau de la chaudière, même exposée à un feu violent, ne prend en aucun de ses points une température assez élevée pour que sa solidité soit sensiblement altérée.

2° La viscosité de l'eau, même lorsqu'elle est portée à un degré assez élevé, n'empêche pas la tôle d'être bien mouillée et ne diminue pas notablement le pouvoir réfrigérant du liquide.

3° La transmission de la chaleur est plus ou moins gênée par la doublure des tôles ; une rivure, même bien faite, ne doit pas être exposée à un feu trop violent.

4° Une paille dans l'épaisseur d'une tôle, ou un défaut de contact intime entre les deux tôles d'une clouure, dans les parties du générateur exposées à un feu un peu intense, constituent une cause grave d'accident.

5° Le contact d'une maçonnerie réfractaire, même portée à une température élevée, ne présente pas de danger, si la tôle est continue et bien mouillée.

6° Tout enduit gras déposé sur la paroi interne de la tôle gêne fortement la transmission de la chaleur.

7° Lorsque l'enduit gras est constitué par un corps susceptible de se décomposer par la chaleur, le coup de feu est particulièrement à redouter. Les corps gras organiques, huiles de lin, de colza, etc. semblent, à cet égard, beaucoup plus dangereux que les corps gras minéraux.

Ces expériences de M. Hirsch jettent du jour sur la question des coups de feu, jusqu'ici fort obscure ; elles ont un haut intérêt pour les praticiens ; elles sont dignes à la fois du grand établissement où elles ont été faites et du savant professeur qui les a conduites.

II. L.

2° Sciences physiques.

Warburg (E.) Sur la théorie des éléments voltaïques et la polarisation galvanique (*Wiedemann's Annalen*, t. XXXVIII novembre 1889).

On sait que la force électromotrice d'une pile hydro-électrique varie avec la quantité d'air dissous dans le liquide électrolytique de la pile. M. Warburg a étudié cette influence de l'air dissous. La méthode expérimentale qu'il a suivie consiste à prendre deux tubes de verre remplis du même électrolyte et à y faire plonger deux électrodes du même métal. Un dispositif spécial permet de purger d'air l'électrolyte de l'un des tubes, et de faire dissoudre dans l'autre une quantité d'air variable. Un siphon capillaire, rempli de l'électrolyte employé, réunit les deux tubes par la partie supérieure. On mesure à l'électromètre la différence de potentiel entre les deux électrodes. L'appareil constitue une pile à air. Si l'on réunit par un conducteur métallique les deux électrodes de cette pile, elle donne un courant qui va de l'électrode à air à l'électrode à vide par le circuit extérieur.

Un des résultats les plus intéressants est celui que donnent les électrolytes formés d'un sel du métal qui

constitue l'électrode. La force électromotrice est dans ce cas très faible, et d'autant plus faible que la solution électrolytique est plus concentrée.

Les courants donnés par ces piles à air ne sont autre chose, d'après M. Warburg, que des courants dus à des différences de concentration. Les courants de concentration ont été étudiés par Helmholtz qui a montré que la force électromotrice d'un élément constitué par deux électrodes identiques plongeant dans deux solutions de même nature, mais de concentration différente, est proportionnelle au logarithme du rapport $\frac{m_1}{m_2}$, m_1 et m_2 étant les nombres de molécules

de sel dissoutes aux deux électrodes dans un même nombre de molécules d'eau. Prenons une pile à air, à mercure et sulfate de magnésie : si tout était symétrique aux deux électrodes, on n'aurait pas de courant. Mais d'un côté la solution est purgée d'air, de l'autre elle est aérée. Sous l'influence de l'oxygène dissous, ainsi qu'on peut le démontrer directement par des procédés purement chimiques, des traces de mercure se dissolvent dans l'électrolyte et en proportion plus ou moins grande, suivant la quantité d'oxygène contenue dans la solution. Dans le voisinage immédiat des électrodes on a donc une solution de sulfate de magnésie, mélangée d'un peu de sulfate de mercure ; mais ce sulfate de mercure présentera aux deux électrodes une concentration différente, d'où un courant. — Et ce courant ne dépendra pas de la quantité absolue de sel de mercure formé, mais seulement du rapport des quantités de sel formées aux deux électrodes : le courant sera d'autant plus grand que ce rapport sera plus différent de l'unité.

On conçoit donc que si l'électrolyte est un sel de l'électrode, on ait un courant insignifiant, car la concentration initiale est la même des deux côtés ; le sel produit par l'oxydation de l'électrode sous l'influence de l'air dissous est dans ce cas le même que le sel dont on a rempli le tube ; la richesse de la solution en sel du métal de l'électrode ne part plus de la valeur zéro, mais elle part d'une valeur déterminée, la même des deux côtés, et comme elle augmente des deux côtés de quantités très petites, le rapport des concentrations reste très peu différent de 1. Il restera d'autant plus voisin de 1 que la concentration initiale aura été plus grande. — Toutes les autres particularités du phénomène, soigneusement étudiées par l'auteur, s'expliquent également par ces considérations.

La conclusion est que la force contrélectromotrice de polarisation que développe le passage du courant dans le voltamètre peut être attribuée à la même cause. Dans le cas ordinaire du platine plongeant dans l'acide sulfurique, une petite quantité de platine se dissout à chaque électrode : le courant dépose à la cathode une partie du platine dissous, en dissout une nouvelle quantité à l'anode. Et le courant de concentration qui en résulte doit être beaucoup plus considérable que celui que donne l'élément à air, à platine et acide sulfurique ; car le dégagement d'hydrogène à la cathode peut contribuer à rendre la solution de platine plus diluée, avec beaucoup plus d'énergie que le simple éloignement de l'air ; et SO_4 naissant rendu libre à l'anode est plus actif que l'oxygène de l'air. Une partie au moins de la polarisation du voltamètre s'explique donc par les courants de concentration.

Bernard BRUNHES.

Violle et Vauthier. — Sur la propagation du son à l'intérieur d'un tuyau cylindrique (*Ann. de chimie et de physique*, 6^e série, t. XLIX, mars 1890).

Les mémorables expériences relatives à la propagation du son, effectuées à Paris de 1862 à 1866 par Régnault sur les canalisations qu'on installait alors pour l'eau et le gaz, ont laissé un certain nombre de points indécis. MM. Violle et Vauthier, ayant eu à leur disposition à Grenoble une conduite de 0^m,7 de diamètre

et d'une longueur de plus de 12 kilomètres, ont repris cette étude. Ils se sont servi des appareils même de l'illustre physicien et en ont contrôlé les résultats en effectuant une autre série d'expériences avec le tambour à levier de M. Marey, qui est d'un emploi plus sûr et permet d'aborder commodément les questions incomplètement résolues par Régnault.

Après avoir parcouru un certain nombre de fois le tuyau, l'onde produite par la détonation d'un coup de pistolet cesse d'exciter la sensation auditive, quoique l'oreille perçoive encore nettement l'ébranlement de l'air, et que l'énergie vibratoire demeure bien supérieure à celle des sons les plus faibles que l'oreille puisse entendre. Les habiles expérimentateurs sont parvenus à rendre compte de ce fait : c'est que l'onde, en se propageant, ne conserve pas une forme invariable. L'ébranlement, formé primitivement de plusieurs ondes, se fond graduellement en une onde unique, qui n'a plus d'action acoustique. Un ébranlement ne donne en effet naissance à la perception d'un son que s'il se compose de plusieurs vibrations, probablement d'au moins dix. Le sommet de l'onde se meut avec une vitesse uniforme, tandis que le front de l'onde, qui d'ailleurs reste toujours plan, part avec une vitesse plus grande, ralentit son allure et tend vers la même vitesse. Toute onde, complexe au début, tend vers une forme simple. Alors elle se propage en bloc avec une vitesse uniforme qui est la *vitesse normale* de propagation du son. Les nombres obtenus conduisent à assigner pour cette vitesse normale de propagation dans l'air libre, supposé sec et à 0°, la valeur 331^m,10 par seconde, avec une erreur probable inférieure à 0^m,10.

La vitesse reste la même, quelle que soit l'intensité de l'ébranlement initial : la charge de poudre n'importe pas. Le fait a été confirmé dans les expériences relatives aux sons musicaux. De plus, les différences de hauteur de ces sons sont également sans influence sur leur vitesse de propagation.

En remarquant la netteté avec laquelle le tuyau, alternativement ouvert ou fermé, accusait les deux modes différents de réflexion du mouvement sonore, MM. Violle et Vauthier ont été amenés à faire construire, pour manifester l'influence du mode de réflexion, un appareil de laboratoire, de dimensions restreintes, mais susceptible cependant de fournir des mesures précises.

Edgard HAUDRY.

Raoult (F. M.). — Sur les progrès de la cryoscopie. *Grenoble. Bregnat et Cie*, 1889.

M. Raoult résume dans cet ouvrage ses recherches sur la congélation des dissolutions, recherches qui l'ont conduit, comme on sait, à une méthode générale de détermination des poids moléculaires. Cette méthode, basée uniquement sur des faits d'expérience, sur des mesures nombreuses dans les dissolvants variés, a reçu une confirmation éclatante des travaux de M. Van't Hoff. Dans son beau mémoire sur les lois de l'équilibre chimique dans l'état dilué, gazeux ou dissous, le savant hollandais arrive à la loi de Raoult par des considérations théoriques, basées sur l'application de la loi d'Avogadro aux solutions diluées. Une exception se présentait cependant ; pour les solutions aqueuses des sels métalliques, la formule de Van't Hoff donnait des nombres qui ne concordent pas avec les résultats expérimentaux. M. Arrhenius a montré qu'on pouvait faire cesser ce désaccord en admettant que les sels métalliques en solutions aqueuses sont décomposés en leurs ions, et que, dans ce cas particulier, la loi d'Avogadro appliquée aux solutions, présente une exception analogue à celles qu'on rencontre, à l'état gazeux, pour le perchlorure de phosphore, l'hydrate de chloral, etc... C'est à la suite de ces recherches que MM. Paterno et Nasini ont pu dire : « La détermination du poids moléculaire basé sur l'abaissement du point de congélation est aussi légitime que celle qui est fondée sur la densité de vapeur. » Depuis lors, de nombreux travaux ont été

exécutés par cette méthode, qui prend une extension de plus en plus considérable, et conduit tous les jours à des résultats intéressants et nouveaux.

Georges CHARPY.

Flimm (W). — Synthèse de l'indigotine. *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft*, 1890, page 57.

L'indigo, matière colorante d'origine végétale, doit sa couleur et ses propriétés tinctoriales à l'indigotine, substance cristallisée et sublimable, qui n'existe pas toute formée dans la plante, mais qui prend naissance par dédoublement d'un glucoside particulier, incolore, l'indican.

Les plantes qui fournissent l'indican sont nombreuses et appartiennent à des familles assez diverses; cependant on n'exploite guère pour la préparation de l'indigo que certaines espèces du genre *Indigofera* (*Indigofera tinctoria*, *I. anil*, etc.), famille des Légumineuses, tribu des Papilionacées.


Indépendamment de tout l'intérêt que présente, au point de vue purement scientifique, la synthèse de l'indigotine pour en déterminer la constitution, il n'est pas étonnant qu'un grand nombre de recherches synthétiques aient été effectuées aussi dans le but d'obtenir industriellement la reproduction artificielle d'une matière colorante d'un prix assez élevé.

La synthèse dont il s'agit est la première réalisée au moyen d'un dérivé monosubstitué de la benzine; à ce titre elle présente un intérêt théorique, mais ne semble pas pouvoir entrer dans la pratique industrielle en raison de son faible rendement, et la belle synthèse de M. Baeyer réalisée par l'action de la soude sur un mélange d'acétone et d'aldéhyde orthonitrobenzoïque marque toujours le pas le plus important qui ait été fait dans cette voie.


M. Flimm a obtenu l'indigotine par fusion de la monobromoacétaniline



avec la potasse. L'auteur admet que dans cette réaction il se forme d'abord du pseudoindoxyle par condensation interne et transposition moléculaire :



et ce dernier s'oxydant donnerait naissance à l'indigotine :



Ce produit synthétique présente toutes les propriétés caractéristiques de l'indigotine naturelle; le rendement ne s'élève malheureusement pas à plus de 4 % du poids de l'aniline, résultat qui ne peut étonner puisqu'on sait que l'indigotine est attaquée par la potasse fondue avec mise en liberté d'aniline. H. GAUTIER.

3° Sciences naturelles.

Bouvier (L.). — Les Cétacés souffleurs. Thèse présentée au concours d'agrégation de pharmacie de Paris, imp. Le Bigot, Lille 1889, in-4°, 220 pages.

Travail de synthèse anatomique très complet; l'auteur y a joint ses observations personnelles sur deux cétacés (*Dauphin Marsouin* et *Balenoptère*). Ses observations ont porté sur la constitution de la peau, le larynx et la trachée, enfin les plexus et les sinus veineux, en particulier un très grand sinus situé dans l'épaisseur même du foie. L'auteur s'occupe aussi de la répartition

géographique des cétacés, de leur descendance, enfin de leurs parasites.

A. E. MALARD.

Bouvier (L.). — Système nerveux des Crustacés Décapodes, 1 pl. *Annales des sciences naturelles*.

Outre quelques faits importants pour la classification phylogénétique des Crustacés, ce mémoire renferme l'énoncé de deux lois suivant lesquelles semble s'être effectué le perfectionnement progressif du système nerveux chez ces animaux. — 1° La condensation des centres et des connectifs nerveux dans le sens longitudinal est inverse de la condensation dans le sens transversal; dans le sens longitudinal elle augmente à mesure qu'on se rapproche des brachyures; elle diminue au contraire dans le sens transversal. — 2° On passe de la forme macroure à la forme brachyure en trois temps; (A) Un ganglion abdominal se joint à la masse thoracique (Galathée-Pagure); (B) la chaîne abdominale se raccourcit et devient thoracique (Porcellane); (C) cette chaîne se réduit encore et entre en contact intime avec les centres de la région thoracique.

A. E. MALARD.

Harmonville (baron d'). — La Vie des Oiseaux, un vol. in-16 de 400 pages et 18 planches, Bibl. Scient. contemp. Paris, 1890, J.-B. Baillière et fils, éditeurs.

Les amateurs d'observations originales sur les mœurs et l'esprit des bêtes liront ce livre avec intérêt. Il est écrit sans prétention par un chasseur qui s'est consacré à l'étude des oiseaux. — Les recherches anatomiques et physiologiques ont pris depuis Cuvier une place prépondérante dans les préoccupations des naturalistes français et allemands. La simple observation des mœurs, qui, au siècle dernier, passionnait des savants tels que Buffon et Réaumur, de grands veneurs comme Georges Leroy, est aujourd'hui bien délaissée parmi nous. Elle peut cependant contribuer, dans une large mesure, à édifier cette science, à peine ébauchée, de l'intelligence, que Claude Bernard appelait avec raison la science du xx^e siècle. A ce titre l'ouvrage de M. d'Harmonville mérite d'être consulté; on y trouvera quantité de faits curieux, des scènes de la vie intime des oiseaux, observés sans esprit de système et dans le seul but de mieux connaître ces charmants hôtes de nos bois.

L. O.

4° Sciences médicales.

Hartmann et Gundelach. — Contribution à l'étude de la valeur sémiologique de l'hypoazoturie au point de vue du diagnostic et du pronostic des affections chirurgicales in *Annales de Gynécologie*, janvier 1890, p. 17.

Beaucoup d'auteurs, depuis les travaux de Romme-laere (de Bruxelles) considèrent l'hypoazoturie comme un signe de l'existence de la diathèse cancéreuse, et tout récemment encore, Raugier (Th. de Montpellier 1889) affirmait la gravité de cette hypoazoturie, gravité telle qu'elle devait suffire, suivant lui, pour contre-indiquer toute intervention chirurgicale. Des analyses multipliées, faites sur 43 malades, ont au contraire montré aux auteurs :

1° Que l'hypoazoturie peut exister en l'absence de tout vice cancéreux et qu'elle est toujours en rapport, chez les cancéreux comme chez les non cancéreux, avec une insuffisance de la nutrition.

2° Qu'elle n'a de gravité, au point de vue du pronostic opératoire, que dans les cas où elle est excessive; mais il existe alors un état cachectique et l'on n'a pas besoin de l'analyse des urines pour savoir que le malade se trouve dans des conditions de résistance défectueuse.

H. H.

Terrier (F.). — Remarques cliniques sur un cas d'obstruction du canal cholédoque. Cholédoxyntérostomie. *Revue de chirurgie*, décembre 1889, t. IX, p. 973.

Chez une malade présentant des accidents d'occlusion du canal cholédoque avec rétention biliaire, distension de la vésicule, accidents fébriles graves, M. Terrier obtint la guérison rapide de sa malade par l'établissement, en un temps, d'une fistule conduisant directement la bile de la vésicule biliaire dans la première portion du duodénum.

Cette opération, qu'ont pratiquée aussi Monastyrski, Kappler, Socin et Mayo Robson, a été faite, soit pour parer aux accidents déterminés par une oblitération du canal cholédoque, soit pour guérir une fistule biliaire.

L'avenir dira si les résultats définitifs sont aussi bons que paraissent être les résultats immédiats. En tous cas, cette opération faite avec plein succès dans un cas en apparence désespéré, honore le chirurgien qui y a eu recours et montre une fois de plus qu'il existe, quoi qu'on en dise, des chirurgiens en France, qui ne craignent pas d'user d'audace lorsque, leur diagnostic étant solidement établi, ils trouvent une indication à l'intervention.

D^r HARTMANN.

Heidenhain (L.). — Sur les causes des récidives cancéreuses locales après l'amputation de la mamelle (*Ueber die Ursachen der lokale Krebs-recidive nach Amputation Mammæ*) *Arch. f. Klin. Chir.*, 1890, Bd 9, Hft. 1, p. 97.

Pensant que les récidives locales ne sont que la conséquence du développement ultérieur d'éléments cancéreux dans la plaie opératoire, Heidenhain a cherché à établir par des faits la réalité de cette hypothèse.

L'examen anatomique de dix-huit pièces d'amputation de sein, ayant montré, dans douze cas, des fragments de la glande ou du néoplasme adhérents à la face superficielle du grand pectoral, fit prévoir, dans ces 12 cas, une récidive locale rapide. L'observation ultérieure de onze de ces malades, qui ont pu être suivies, donne actuellement les résultats suivants : huit sont déjà atteintes de récidive ou ont succombé, trois sont encore en parfaite santé. Quant aux six autres opérées que, d'après l'examen anatomique de la pièce, on pouvait déclarer guéries, aucune ne présente encore de récidive ; il est vrai que, dans deux cas, la date de l'opération est encore trop récente (janvier 1889) pour qu'on puisse rien présager au sujet de la repopulation du néoplasme.

La fréquence des récidives après l'ablation des cancers du sein a des causes multiples : 1° La facilité avec laquelle on laisse échapper des lobules glandulaires adhérents au fascia pectoral ; 2° l'extension de la prolifération épithéliale à des portions de la mamelle saine en apparence ; 3° le fait que des lymphatiques de la glande aboutissent par le tissu adipeux sous-mammaire au fascia pectoral, de sorte qu'un carcinome même encore complètement mobile au-dessus du muscle, absolument indépendant de celui-ci en apparence, est en réalité déjà parvenu par les voies lymphatiques au contact de ce muscle comme permet de le constater l'examen microscopique ; 4° la rapidité avec laquelle, sous l'influence des contractions musculaires, se disséminent dans l'épaisseur du muscle les cellules épithéliales qu'y ont apportées les lymphatiques.

De l'étude de ces faits résulte cette déduction pratique qu'il faut enlever, en même temps que la mamelle, une couche de la surface musculaire sous-jacente adhérente au fascia et que, même dans les cas où le cancer paraît adhérer à peine au muscle ou seulement au fascia, il faut enlever la totalité du grand pectoral.

D^r HARTMANN.

1° **Solowjeff** (Athanasius). — Zur Frage der Aetologie der akuten Peritonitis in *Centralblatt für gynæk.*, 1889, n° 3.

2° **Orth.** — Experimentelles über Peritonitis in *Centralblatt für chir.* 30 novembre 1889, p. 849.

3° **Bumm.** — De l'étiologie de la péritonite septique in *Annales de Gynécologie*, janvier 1890, p. 1.

4° **H. J. Waterhouse.** — Experimentelle Untersuchung über Peritonitis in *Arch. f. path. anat.*, février 1890, t. CXIX., fasc. II, p. 342.

Ces divers travaux ont tous trait au rôle des infections microbiennes dans la pathogénie des péritonites. Solowjeff étudie des péritonites infectieuses qu'il appelle mycosiques. Bumm distingue dans les péritonites septiques la péritonite à streptocoques, habituellement déterminée par l'infection puerpérale et la péritonite putride qui survient après la laparotomie et consécutivement à la perforation des organes creux de l'abdomen. Cette dernière variété est caractérisée par la présence d'un mélange de germes (bacilles et cocci) et par ce fait que son exsudat ne jouit nullement des propriétés infectieuses excessives de la péritonite à streptocoques ; son évolution clinique est du reste plus lente, et c'est peu à peu que la température s'élève parallèlement, en quelque sorte, aux progrès de la décomposition.

Grawitz, puis Lübbert, dans une série d'expériences, avaient cherché à établir que le péritoine sain et bien asséché supporte remarquablement le contact des microbes pyogènes, pourvu que l'on n'injecte avec eux ni un irritant chimique, ni un milieu de culture abondant ; mais le résultat de leurs expériences avait été contesté par Pawlowsky qui soutenait qu'en l'absence de tout irritant chimique les staphylocoques n'ont pas besoin d'être nombreux pour causer une péritonite purulente. La question restait donc indécise. Les travaux successifs d'Orth et de Waterhouse l'ont tranchée en faveur de Grawitz. Le péritoine sain jouit d'un pouvoir de résorption considérable et résiste à l'injection des cocci pyogènes ; mais il suffit d'une lésion minime de son tissu ou de la présence de matières infectieuses peu ou pas résorbables, pour que la péritonite éclate avec la plus grande facilité.

D^r HARTMANN.

Lépine. Professeur à la Faculté de médecine de Lyon. — Une Page d'histoire de la médecine : La Thérapeutique sous les premiers Césars. *Paris, F. Alcan*, 1890.

L'hygiène qui prévient les maladies, la thérapeutique qui les guérit sont, de toutes les branches de la médecine, celles qui offrent « l'intérêt le plus immédiat : » on peut dire d'elles, qu'elles sont nées avec la médecine même. Mais si, dès l'antiquité, furent posés des principes rationnels d'hygiène, comme le démontrent certains préceptes des religions, par contre la thérapeutique a donné longtemps libre carrière à l'imagination de ceux qui étaient ou se disaient médecins : produit de l'empirisme le plus grossier, il est intéressant et philosophique de rechercher à quelles époques et comment elle est devenue vraiment scientifique. C'est dans ce but que le Professeur Lépine (de Lyon) vient de publier une étude sur la « Thérapeutique sous les premiers Césars ». D'après Plinie et Dioscoride, il nous montre d'abord ce qu'était la matière médicale dans le premier siècle de notre ère, quelles superstitions fantastiques, pour ne pas dire plus, dominaient alors la pratique de la médecine. Il nous dépeint ensuite ce que fut l'avènement de Galien (131 ap. J.-C.), combattant et renversant les théories des dogmatiques, empiriques, méthodiques et autres sectes pour rétablir les anciennes doctrines d'Hippocrate, les étayant de ses connaissances anatomiques et physiologiques qu'il éleva au plus haut point pour l'époque, devenant ainsi le véritable fondateur de la thérapeutique rationnelle. — Cette trop courte analyse suffira, nous l'espérons, pour montrer combien est attrayante la lecture de cette « Page d'histoire de la médecine. » D^r E. DE LAVARENNE.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 mars 1890.

M. Emile Picard lit une notice sur les travaux de G. H. Halphen, membre de la section de Géométrie.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. E. Rouché : Sur la formule de Stirling. — M. Ch. Bioche : Sur les surfaces réglées qui passent par une courbe donnée. M. G. Dierckx a constaté le 4 mars, après une absence prolongée de taches solaires, une première tache dans la latitude exceptionnellement élevée de 63°. — M. Cornu, signalant le halo solaire remarquable qui a apparu le 3 mars, appelle l'attention sur l'importance de ces apparitions pour la prévision du temps.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — MM. Berthelot et Engel ont comparé au point de vue thermo-chimique l'arsenic amorphe avec l'arsenic cristallisé ; sous ces deux états allotropiques, l'arsenic dégage par sa combinaison avec le brome sensiblement la même quantité de chaleur. — M. A. Besson a étudié les combinaisons du gaz hydrogène phosphoré et du gaz ammoniac avec le chlorure de bore et le sexqui-chlorure de silicium. — Les dernières expériences de M. Joannis ont montré que la tension de dissociation du sodammonium est égale à la tension du gaz ammoniac au-dessus d'une solution saturée, non seulement à 0°, mais encore à -10° et à +30°. L'explication de M. Backhuys Roozeboom n'étant plus admissible M. J. Moutier propose de ces faits une théorie basée sur la considération de l'énergie libre. — Pour doser l'iode d'un iodure en présence du chlore et du brome, M. P. Lebeau déplace l'iode par une solution titrée de brome : la fin de la réaction est indiquée par la décoloration d'un peu de sulfate d'indigo surnaissant du sulfure du carbone où se dissout l'iode libre. — M. J. Fogh a étudié la chaleur de formation de l'hyposulfite de plomb. Il a étudié aussi les produits de la décomposition de ce sel par l'eau bouillante et obtenu comme principal produit du trithionate de plomb. — M. L. Astre a préparé l'iodure double de bismuth et de potassium généralement désigné sous le nom d'*iodure de Nicklès* ; ses analyses assignent à ce produit la formule $(BiI^2)^2 K$. — Poursuivant leurs recherches sur le pouvoir de dispersion des solutions salines, MM. Ph. Barbier et L. Roux montrent qu'il existe des relations simples entre ce pouvoir et le type chimique des sels dissous ; ainsi, la valeur de la fonction que les auteurs appellent *accroissement moléculaire de dispersion* est sensiblement constante pour tous les chlorures du type MCl ; cette valeur est double pour ceux du type MCl_2 . — M. D. Gernez s'est servi de la mesure du pouvoir rotatoire des solutions d'acide malique auxquelles on ajoute des quantités croissantes de molybdates alcalins, pour déterminer les combinaisons qui s'effectuent entre ces molybdates et l'acide malique. — Si dans une solution bouillante d'émétique additionnée de vert Poirier on verse une solution de tannin, il se forme un précipité de tannate d'antimoine, qui entraîne avec lui une proportion fixe de matière colorante. M. Guenez s'est assuré que cette réaction permet de doser volumétriquement le tannin en présence d'autres matières organiques. — Pour doser l'acétone dans les méthylènes, on emploie habituellement le procédé de Kræmer qui est basé sur la transformation de l'acétone en iodoforme ; M. Léo Vignon a constaté que pour doser avec exactitude de fortes proportions d'a-

cétone, il faut modifier les formules de Kræmer et opérer la série des réactions dans un ordre invariable. — M. L. Bourgeois, en chauffant de l'azotate de cuivre en tube scellé avec de l'urée, a reproduit la Gerhardtite, azotate basique de cuivre que l'on vient de trouver dans l'Arizona. — M. Th. Schlœsing expose la suite de ses expériences sur l'absorption de l'ammoniaque atmosphérique par les terres. La conclusion générale des diverses séries d'expériences est que la terre végétale nue, calcaire, acide ou neutre, riche ou humide, absorbe des quantités d'ammoniaque qui ne peuvent pas être négligées. L'humidité et l'ameublissement de la terre favorisent considérablement cette absorption.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. L. Ranvier a étudié la membrane mince qui recouvre le sac lymphatique rétrolingual de la grenouille ; il y a trouvé des fibres musculaires réticulées, dont le sarcolemme est en connexion intime avec un riche réseau élastique. Il a pu sur les préparations de cette membrane constater que les fibrilles musculaires se terminent par un disque épais. — Des expériences que M. A. Rommier a faites sur les fermentations du moût en présence de petites quantités de cuivre, il résulte que ce métal entrave la végétation de la levûre ellipsoïdale qui est remplacée par la levûre apiculée. — M. Laboulbène a déterminé l'insecte qui attaque depuis peu de temps la vigne en Tunisie et qu'on avait d'abord pris pour le Phylloxera : c'est le *Ligniperda francica* (Fabricius). — MM. Lannelongue et Achard ont trouvé que l'ostéomyélite infectieuse peut être causée par plusieurs espèces de microbes dont les principaux sont les *Staphylococcus pyogenes*, aureus et albus, et le *Streptococcus* de l'erysipèle.

Séance du 17 mars 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Maurice Lévy : Sur l'application des lois électrodynamiques au mouvement des planètes.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. A. Cornu a déterminé le mécanisme suivant lequel se produit sur les plaques photographiques le halo qui entoure l'image des points brillants ; la lumière, en traversant la couche sensible, se diffuse dans toutes les directions ; ceux des rayons qui subissent la réflexion totale sur l'autre face de la glace viennent former le halo. On peut supprimer le phénomène en enduisant cette face d'une couche absorbante dont le pouvoir réfringent soit égal à celui du verre. — De l'observation du phénomène optique connu sous le nom de *dénivellation* dans les ophtalmomètres, M. D. E. Sulzer tire une méthode pour déterminer le pôle d'un ellipsoïde à trois axes inégaux, par exemple, un œil astigmatique. — M. Ch. Pollack décrit un nouveau système d'accumulateurs électriques où il utilise le plomb spongieux ; la capacité est considérable et la charge se fait rapidement. — M. J. Fagh a étudié la chaleur de formation de l'hyposulfite double de plomb et de soude. — M. Ditte a reconnu que, si l'aluminium ne s'attaque pas par l'acide sulfurique, cela tient à ce que le métal se recouvre tout de suite d'une couche continue d'hydrogène ; si par un moyen quelconque, on empêche la formation de cette couche, l'aluminium est attaqué par l'acide sulfurique ; il l'est même par une solution de sulfate neutre d'alumine, qui se transforme en sulfate basique. — MM. Geisenheimer et F. Leteur signalent une nouvelle forme cristalline du chlorure d'ammonium ; ces cristaux con-

tiennent environ 1 % de ruthénium; ils ne constitueraient pourtant pas un sel double. — **M. Schützenberger**, en soumettant à l'effluve l'oxyde de carbone sec dans un tube de verre muni d'armatures à eau acidulée, a obtenu un sous-oxyde solide, qui renferme de l'hydrogène en quantité appréciable; étant données les conditions de l'expérience, il faut admettre que l'effluve électrique a entraîné de l'eau au travers du verre. — **M. J. Meunier** étudie les *acetals mono et dibenzoïques de la sorbite*. — **M. Haller** étudie les *camphorates de bornéols* à droit et gauche. — En 1880 **M. E. Demarcay** entreprit le premier d'appliquer l'éther acétylacétique à la synthèse organique et découvrit une méthode générale permettant d'obtenir un nombre presque illimité de substances à fonction acide. **M. Ch. Cloez** discute la formule développée qu'il convient d'attribuer, dans l'état actuel de nos connaissances, à l'acide *oxylétrique* de **M. Demarcay**. — **M. I. Ossipoff** a mesuré la chaleur d'hydratation de l'anhydride maléique. — **M. J. A. Müller** a pu, au moyen de la phénolphthaléine, facilement mettre en évidence le fait que les chlorhydrates d'amines et les sels d'acides gras dissous se dissocient lorsqu'on étend leurs solutions ou qu'on en élève la température. — A propos des recherches de **M. Schloesing** sur l'absorption de l'ammoniaque atmosphérique par les terres, **M. Berthelot** fait observer que les résultats des expériences de laboratoire ne sont pas directement applicables à la nature, car il y a en réalité échange réciproque d'ammoniaque entre l'air et la terre, des champs.

3^e SCIENCES NATURELLES. — **M. Léon Guignard** a suivi la formation et la différenciation des éléments sexuels qui interviennent dans la fécondation chez diverses Liliacées; il a constaté que, pour une même espèce, le nombre des segments chromatiques du noyau mâle est égal à celui du noyau femelle. Ce fait, signalé dans d'autres plantes et également chez divers animaux, paraît général. — **M. A. Prunet** a étudié la structure comparée des nœuds et des entre-nœuds dans la tige des dicotylédones. — **M. de Folin** ayant comparé la structure des roches nummulitiques aux enveloppes des Rhizopodes marins actuels, conclut à l'identité du mécanisme de formation; dans les deux cas, c'est une matière organique qui unit les particules minérales. — **M. Stanislas Meunier** a vérifié l'existence de cette matière organique dans les nummulites du calcaire grossier; il en a même fait l'analyse centésimale. Il l'a retrouvée identique dans les tests de différents fossiles des sables de Fontainebleau. — **M. J. Caralp** a étudié la structure d'un *Kersanton* qui a percé les premières couches jurassiques de l'Ariège; cette structure en fait un type de passage aux *Ophites*.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 18 mars 1890.

M. Budin lit un rapport proposant le carmin d'indigo comme matière colorante des paquets antiseptiques au sublimé et à l'acide tartrique, à délivrer aux sages-femmes. Adopté. — **M. Hervieux** lit un rapport sur un projet de décret relatif à la vaccine obligatoire à l'île de la Réunion. Après observations de **M. Roehard** qui fait remarquer les bons résultats obtenus de la vaccine obligatoire en Cochinchine de 1876 à 1886, l'Académie adopte les conclusions tendant à la création d'un office de vaccine animale, à l'obligation des vaccinations et revaccinations en cas de menaces d'épidémie. — **M. Chauvel** est élu membre titulaire.

Séance du 25 mars 1890.

M. Tarnier présente une malade atteinte, pendant une grossesse, de pigmentation de la peau à forme et à siège rares (poitrine, cuisses, ventre). — **M. Mesnet** fait une communication relative à l'autoglyphisme et

aux stigmates chez les hystériques en montrant la valeur de ces faits physiologiques au point de vue de l'histoire rétrospective de la sorcellerie. — **M. Motais** (d'Angers) expose un nouveau procédé opératoire de strabisme par avancement musculaire, à languette médiane adhérente. — **M. Villemain** lit au nom de **MM. Soles et Fromager** (de Bordeaux) une observation de tétanos traumatique grave, traité par le chloral à haute dose, la pilocarpine, les bains de vapeur, terminé par guérison.

D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 8 mars 1890.

MM. Dejérine et Letulle ont fait l'étude histologique d'un cas de la maladie de Friedreich dont l'un d'eux a déjà exposé les lésions au point de vue topographique. Cette maladie consiste essentiellement en une altération de la névrogie; c'est la *gliose* des cordons postérieurs de la moelle. Les vaisseaux et la pie-mère des parties altérées restent intacts. Cette constatation éloigne absolument la maladie de Friedreich du tabes et la rapproche de l'épilepsie que **M. Chaslin** a démontré être une *gliose* cérébrale. Ces deux maladies sont, l'une comme l'autre, héréditaires et peuvent être ramenées à un arrêt de développement des éléments ectodermiques. — **M. Lannelongue**, considérant l'analogie de la cachexie strumiprive expérimentale avec l'idiotie crétinoïde myxœdémateuse, a entrepris de guérir cette maladie en greffant sur le sujet une glande thyroïde d'animal. Il ne peut encore se prononcer sur les résultats de l'opération. — **M. E. Bataillon**, en étudiant la dégénérescence musculaire dans la queue des larves des Batraciens anoures, a constaté, conformément aux indications de **M. Metschnikoff**, que les leucocytes prennent une part considérable à la digestion de cet appendice. — **M. Netter**, en examinant un cas de méningite suppurée consécutive à un coup de revolver tiré dans la bouche, a reconnu que l'infection des méninges avait été produite par les pneumocoques de la salive, ceux-ci ayant suivi le trajet de la balle.

Séance du 15 mars 1890.

M. Luys, ayant fait une série d'expériences sur l'action psychique des aimants, affirme que chez les sujets hypnotisés le contact du pôle positif produit un état agréable; le contact du pôle négatif, un sentiment de répulsion. — **M. Dufourt**, après avoir donné pendant un certain temps une ration quotidienne de bicarbonate de soude à des lapins et à des chiens, a constaté chez ces animaux une augmentation du glycogène hépatique. — **M. Tuffier** a vu que les injections sous-cutanées d'urine stérilisée ne donnent lieu chez les animaux à aucun accident; chez l'homme, la pénétration de l'urine dans la cavité péritonéale, s'il n'y a pas intervention de microbes, n'est nullement mortelle. — **M. Kunckel** a observé chez les Acridiens d'Algérie une fonction particulière du jabot; l'insecte remplit cette poche d'air qu'il déglutit, et fait ainsi effort pour rompre sa vieille peau lorsqu'il mue. — **M. Mégnin** indique que les caractères des cultures obtenues par **M. Duclaux** avec l'*Epidermophyton galli*, sorte de favus qu'il a décrit sur la crête du coq, permettent de différencier ce parasite du favus des quadrupèdes.

Séance du 22 mars 1890.

M. Quinquaud présente un esthésiomètre à pointes, qui indique la pression au moyen d'un ressort. En étudiant avec cet appareil la sensibilité des lépreux, il a constaté que les divers territoires de la peau présentent de très grandes différences entre eux: on trouve des zones hyperesthésiques confinant à des zones anesthésiques. — **M. Toison** présente un manomètre aver-

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 21 mars 1890.

M. Carvallo communique les principaux résultats d'un travail qu'il a entrepris sur l'influence du terme de dispersion de Briot sur la double réfraction du *spath d'Islande*. Le résultat le plus saillant de ses recherches est, que la vibration lumineuse d'un rayon polairement rectiligne est, conformément à l'hypothèse de Fresnel et contrairement à celle de Mac-Cullagh et Neumann, dans un azimut perpendiculaire au plan de polarisation. Les développements de cette démonstration ont fait l'objet d'une thèse très remarquable soutenue devant la Faculté des Sciences de Paris et dont la *Revue* rendra spécialement compte. — M. Dufet présente au nom de M. Ch. Dubosq un appareil de Norremberg spécialement destiné à la projection des phénomènes optiques : polarisation des rayons lumineux, polarisation chromatique, polarisation elliptique, franges du compensateur de Babinet, etc... Une modification très simple permet de transformer l'appareil en microscope polarisant, où l'on peut aisément disposer un réticule ; il suffit de mettre un focus convergent à la place qu'occupait l'objet observé en lumière parallèle dans l'appareil de Norremberg. Le seul défaut de l'appareil est le peu d'étendue du champ. M. Dubosq fait un certain nombre de projections, en particulier il montre la transformation si curieuse du sulfate de chaux qui, bixé à la température ordinaire, devient uniaxe quand on le chauffe, les deux pôles se rapprochent, et les deux systèmes d'anneaux se confondent.

Lucien POINCARÉ.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS (1)

Séances des 24 janvier, 7, 14, 28 février et 7 mars 1890.

MM. Béhal et Auger ont étudié l'action du chlorure d'éthylmalonyle sur l'éthylbenzène en présence du chlorure d'aluminium. Ils ont obtenu de la m. diéthylbenzène et une diacétone, l'éthylidibenzoylméthane. — M. Lindet indique un nouveau procédé de préparation du raffinose fondé sur l'action de la chaux sur les mélasses de sucraterie. — MM. Le Bel et Weyer ont fait l'étude des formes cristallines du tétrabromure de carbone et du bromoforme, pour tâcher de déterminer jusqu'à quel point l'hypothèse du tétraèdre régulier servant de base aux démonstrations de M. Van t'Hoff se vérifie dans les formes cristallines. — M. Friedel a présenté de la part de M. Istrati un certain nombre de notes provenant du laboratoire de Bucharest. M. Istrati a constaté la formation de quinone perchlorée dans l'action de l'acide azotique fumant sur la benzène perchlorée, ainsi que la transformation de la benzène p. dichlorée en son isomère méta par l'action du peroxyde de plomb. — M. Pétricu a obtenu des dérivés aromatiques chlorés par l'action du chlore en présence du chlorure d'étain. — MM. Edeleano et Budistheano décrivent des acides aromatiques non saturés, obtenus par l'action des chlorures d'acides sur les aldéhydes. — M. Georgesco, en faisant réagir l'acide sulfurique sur le phénol tribromé, a obtenu des produits plus avancés de bromuration du phénol, ainsi qu'une francéine. — MM. Aubin et Quénot ont modifié les procédés de dosage de l'azote dans les engrais en précipitant les albuminoïdes par le tannin, et dosant l'azote dans la partie soluble et dans le précipité. — M. Meslans a obtenu le fluoroforme par l'action du fluorure d'argent sur l'iodoforme. — M. Chabré annonce avoir obtenu le même corps par le même procédé; MM. Guez et Meslans ont préparé de même le fluorol, en remplaçant l'iodoforme par le chloral. — M. Bigot a

obtenu le glycide par l'action du sodium sur la mono-chlorhydrine; il a étudié diverses chloracétines de la glycérine. — M. Ramsay envoie une note sur la dissociation du chlorure de sélénium, et la non-existence du sous-chlorure en vapeur. — M. Chabré apporte de nouvelles preuves à l'appui de l'existence et de la volatilité de ce composé. — M. Maquenne a étudié l'action réductrice des acides phosphoreux et hypophosphoreux sur l'acide sulfureux. Il montre qu'il se produit de l'acide hydrosulfureux comme produit intermédiaire. — M. A. Combes a obtenu dans l'action du chlorure de sulfuryl sur l'acétylacétone un produit de substitution où le chlore paraît être situé entre les deux groupes acétoniques. La saponification de ce composé fournit un corps possédant les propriétés des acides et paraissant réaliser une nouvelle fonction. — M. Gorgeu décrit de nouvelles expériences sur l'action réciproque de l'eau oxygénée et du peroxyde de manganèse.

Séance du 14 mars 1890.

M. Bourgeois présente des échantillons de nitrate basique de cuivre, identiques à la Gehrardite naturelle, obtenus par l'action de l'urée sur le nitrate de cuivre. — M. Cloez a étudié les conditions de la formation de l'acide oxytétrique, et décrit un éther diéthylthique de ce composé. — M. Tissier a converti le nitrile triméthylacétique en amine; il indique les propriétés de cette base et de ses sels. — M. Lindet a pu retirer des mélasses de sucrerie des saccharoses cristallisés, en précipitant les matières colorantes de ces mélasses par les sels de cuivre ou de mercure. — M. Béhal a obtenu deux combinaisons renfermant de l'antipyrine et du chloral ainsi que leurs éthers acétiques.

D^r HANRIOT,

Secrétaire général de la Société.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 13 mars 1890

Le Professeur W. C. Williamson a continué ses recherches sur l'organisation des plantes fossiles du terrain houiller (*coal-measures*). Il a pu montrer que le *Rachiopteris aspera* est le rachis foliaire ou petiole du *Lyginodendron*; le *Rachiopteris aspera* est donc une vraie fougère, bien qu'il possède une zone vasculaire exogène, dont les faisceaux contiennent à la fois des éléments ligneux et des éléments libériens, alternant avec des rayons médullaires et libériens. On sait que la moelle des Sigillaires et *Lepidodendron* se développe à l'intérieur d'un faisceau de trachées qui semble entièrement solide, et devient par la suite un organe très considérable et très visible. L'auteur a pu prouver qu'une moelle analogue se développe de la même manière à l'intérieur d'un gros faisceau vasculaire, qui occupe le centre des très jeunes tiges du *Lyginodendron*. De nouveaux détails ont été fournis également sur la structure de l'*Heterangium greivii*: cette plante présente dans sa structure un grand nombre de traits qui amènent à supposer qu'on pourra ultérieurement démontrer que c'est une fougère. L'auteur a découvert la tige de plantes d'un genre (*Bowmanites*) qu'on ne connaissait jusqu'à présent que par quelques fruits, et il a donné quelques détails nouveaux sur l'histoire des Calamites vraies. Il appelle aussi l'attention sur ce fait que tandis que les empreintes des larges sillons longitudinaux de la cavité médullaire centrale de ces plantes sont très fréquentes, on ne retrouve jamais d'empreintes des branches plus petites. — MM. Percy F. Frankland et Grace C. Frankland présentent une note sur la nitrification et son agent spécifique. Ils ont essayé d'isoler l'organisme nitrifiant; ont eu recours à diverses méthodes et après un très grand nombre d'expériences, ont réussi par la méthode de la dilution à obtenir un liquide de culture qui contenait $\frac{1}{1,000,000}$ de l'agent nitrifiant originel; il conserve

(1) Afin d'éviter les répétitions, nous éliminerons du Comptendu de cette Société les Mémoires présentés aussi à l'Académie des Sciences de Paris.

son pouvoir nutritif; inoculé sur de la gélatine, il ne se développe pas. Il apparaît sous la forme de nombreux bacilles caractéristiques à peine plus longs que larges; on peut les considérer comme des bacillo-cocci. Bien que ce bacillo-coccus refuse obstinément de se développer sur la gélatine, quand il est pris dans les dilutions étendues, il se développe très abondamment dans le bouillon; il faut souvent attendre trois semaines avant que cet organisme commence à croître et à se multiplier. Ses cultures dans le bouillon introduites dans des solutions ammoniacales y ont produit également la nitrification et dans des proportions qui ont été quantitativement déterminées.

Richard A. GREGORY.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 7 mars 1890.

Le Dr S. P. Thompson décrit un *réfractomètre de Bertrand* et démontre les avantages de cet instrument. Il est formé par un hémisphère en verre de 8 millimètres de diamètre environ, fixé à l'extrémité d'un tube; la face plane est à l'extérieur et fait avec l'axe un angle voisin de 3°. On éclaire l'un des côtés de la surface convexe de l'hémisphère par un miroir plan placé presque perpendiculairement à la face plane. On regarde l'hémisphère à travers une lentille, au foyer de laquelle se trouve une échelle divisée en dixièmes de millimètres placée à l'intérieur du tube. L'instrument peut être avantageusement employé dans le cas de liquides ou d'échantillons minéralogiques. Dans le premier cas, on enduit la face plane de l'hémisphère d'une couche du liquide à étudier et l'on regarde à travers la lentille pour déterminer le degré de l'échelle correspondant à la ligne de séparation de la lumière et des portions sombres du champ. Si l'on a, au contraire, affaire à un solide, on interpose entre l'échantillon et le verre une mince couche d'un liquide de grande densité et l'on procède comme précédemment. Une table construite d'avance fait connaître l'indice de réfraction. Dans le cas des corps opaques on opère de même. M. Blakesley demande avec quelle précision peut se faire la lecture et quelle sensibilité cette méthode permet d'atteindre. Le professeur Dunstan désire savoir si l'on pourrait appliquer ce procédé de mesure au cas des liquides volatils. M. Thompson répond que l'emploi de la lumière monochromatique du sodium permet d'apprécier un dixième de division. Quant aux liquides volatils, une lame de verre qui les recouvre suffit à retarder l'évaporation pendant le temps nécessaire à une mesure. — Le professeur Dunstan décrit un appareil pour la *distillation du mercure dans le vide* qu'il a inventé en collaboration avec M. W. Dymond. Cet appareil est analogue à celui de Clark, mais il est relativement plus petit et plus transportable; la portion du mercure qui reste non distillée est beaucoup plus faible. M. Dunstan signale un fait remarquable: pendant la distillation on voit apparaître dans la chambre de condensation des lueurs verdâtres qui deviennent beaucoup plus intenses si l'on approche de l'appareil une machine électrique en action; ou à affaire à une décharge électrique à travers la vapeur de mercure. Le professeur Thompson dit qu'il a lui-même inventé, pour distiller du mercure, une sorte de double baromètre facile à construire soi-même. — Le professeur S. V. Pickering lit un mémoire sur la *théorie de la pression osmotique et ses rapports avec la nature des dissolutions*. L'auteur établit qu'il existe des doutes très graves sur l'exactitude des prémisses sur lesquelles est fondée la théorie; si la théorie est exacte et non pas seulement un ensemble assez grossier d'hypothèses, on doit, dans le cas des dissolutions étendues, vérifier les faits suivants: 1° L'abaissement du point de fusion, suivant le poids moléculaire, doit être indépendant de la nature des sels dissous; 2° tout écart avec cette loi doit être dans un sens prévu par la théorie;

3° l'abaissement doit être indépendant de la nature du dissolvant; 4° l'abaissement doit être indépendant de la quantité du dissolvant (pour les solutions qui restent étendues); 5° quand la dissolution se concentre, l'écart avec la loi précédente doit être dans un certain sens déterminé par la théorie; 6° cet écart doit être régulier. Le professeur Pickering entreprend de démontrer par la discussion de nombreuses expériences que les faits observés sont en contradiction avec les six conséquences de la théorie qu'il vient d'énumérer. — M. T. H. Blakesley dit qu'il a écouté avec grand intérêt la communication de M. Pickering; lui-même, dans un ordre d'idées analogues, a été conduit par la lecture des Mémoires de Joule à faire sur ce sujet des expériences sur le volume des dissolutions salines. Plusieurs des résultats auxquels il est arrivé sont conformes à la théorie de Joule, mais d'autres sont, au contraire, en contradiction absolue avec cette théorie.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 6 mars 1890.

MM. Tilden et Bech: *Substances cristallines retirées des fruits des différentes espèces de Citrus*. Les auteurs étudient les corps solides qui se déposent des huiles récemment extraites de citron, limon et bergamote. Ils ont obtenu les produits suivants:

Essence de limon. C¹⁰ H¹⁴ O⁶ aiguilles jaunes fondant à 121°
Essence de citron C¹⁴ H¹⁴ O⁶ aiguilles jaunes fondant à 116°
Ess. de berg. formule non déterminée, prismes fondant à 270°

MM. Japp et Kilngemann: *Réduction des α dicétones*. Les auteurs étudient l'action de l'acide iodhydrique sur quelques corps, en particulier sur la phénanthraquinone. — M. Arthur Ling: *Etude sur les changements isomériques*. — *Dérivés halogénés des quinones*. — MM. Hautsch et Schnitter ont montré que lorsqu'on brôme la paradi-chloroquinone il se produit un changement isomérique et on obtient la métadi-chlorométadi-bromoquinone. — M. Ling confirme ces résultats. Il n'a pu réussir à préparer la paradi-chlorodibromoquinone. — M. Dixon: *Note sur un sel phénylique de l'acide phénylthiocarbamique*. — M. Werner: *Contribution à la chimie des Thiocarbamides*: Action du chlorure de benzyle et du bromure d'allyle sur la thiocarbamide, la phényl et diphenylthiocarbamide.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE SAINT-PÉTERSBOURG

Séance du 23 février

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Markow: Sur la transformation des séries peu convergentes en séries très convergentes.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. Gadolin lit un supplément à son mémoire sur la variabilité des vents. C'est à propos d'une note de M. Sresnewsky que M. Gadolin a été amené à faire des recherches supplémentaires. M. Sresnewsky a trouvé qu'il est possible dans des cas spéciaux d'appliquer à la répétition de la vitesse des vents la loi trouvée par Maxwell pour la répétition des vitesses partielles dans des gaz en repos. M. Gadolin montre que: 1° la loi de Maxwell ne peut pas servir comme expression générale, de la répétition des vitesses des vents, bien qu'elle puisse avec une certaine approximation paraître par hasard applicable à certaines années particulières; 2° la loi de Maxwell n'est pas la conséquence d'une telle loi de la répétition des projections des vitesses des vents coïncidant avec la loi de la probabilité, suivant laquelle les erreurs des observations doivent se répéter; 3° la loi qu'accepte M. Sresnewsky, bien qu'elle diffère de la loi de Maxwell, ne

satisfait pas aux observations. — M. Wild présente un travail de M. **Leyst** destiné au Répertoire pour la Mé-téorologie et intitulé : Sur la température du sol à Pawlowsk. M. Leyst a déduit des observations horaires la marche journalière de la température dans les couches supérieures du sol à Pawlowsk et calculé, d'après le résultat obtenu, les corrections à appliquer aux moyennes des trois observations par jour faites pendant dix années, pour les réduire à des moyennes vraies du jour. Il a constaté aussi à Pawlowsk, comme M. Wild l'avait fait à Saint-Petersbourg, une augmentation de la température moyenne du sol vers la profondeur (à Pawlowsk 10 fois), plus grande que celle qu'on observe généralement vers l'intérieur de la terre. M. Wild avait cherché à rendre compte de ce phénomène extraordinaire pour le cas spécial des observations à Saint-Petersbourg ; M. Leyst trouve une explication plus générale du fait dans les pluies d'été qui, à cette époque, amènent la chaleur dans les couches inférieures du sol beaucoup plus vite que le ferait la conduction ordinaire. — M. **Beketow** lit un mémoire sur la réduction des sels de *Cesium*.

O. BACKLUND,
Membre de l'Académie.

SOCIÉTÉS SAVANTES D'ODESSA

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — A la Société Impériale des Sciences techniques (6 février 1890), M. **Swirsky** a exposé une nouvelle méthode pour déterminer la forme des navires qui offre le moins de résistance par rapport à l'eau. Les expériences sur ce sujet sont possibles, si l'on choisit pour les effectuer des modèles de navires susceptibles de changer de forme en se déplaçant dans l'eau. La matière dont ils sont faits doit être telle que l'eau n'exerce sur elle aucune action physique ou chimique. Un mélange, en proportions convenables, de cire et de vaseline, satisfait à cette condition et permet de construire de petits bateaux dont il est facile de modifier les formes et d'étudier les résistances.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. **Fanatar** a annoncé à la Société des naturalistes de la Nouvelle Russie (8 février 1890) qu'il a isolé l'acide dilactique en faisant réagir l'acide oxalique sur la chaux dilactique de MM. Würtz et Friedel à 105°-106°. L'acide dilactique libre cristallise en prismes monocliniques ; sa molécule a été définie suivant la méthode cryoscopique de Raoult. L'auteur a préparé et analysé les sels d'argent, de zinc, de potasse (basique) et de calcium ; il a obtenu en outre l'éther méthylique neutre ; il a déterminé la molécule de ce corps d'après la densité de sa vapeur suivant la méthode d'Hofmann. Enfin il a constaté que, chauffé avec l'eau à 150°, l'acide dilactique ne se transforme pas en acide lactique ; en général il ne s'altère pas.

3^o SCIENCES MÉDICALES. — Le Dr **Fictine** (Société des Médecins de l'hôpital municipal d'Odessa, 24 janvier 1890) a pu extraire le bacille d'Eberth de la rate d'une femme atteinte de fièvre typhoïde. Au moyen d'une seringue de Pravaz il pratiqua la ponction pendant la dernière semaine de la maladie ; le sang ainsi obtenu fut ensemencé sur plaques de gélatine. Les colonies qui s'y développèrent, examinées dans toutes leurs propriétés, présentèrent les bacilles typhiques à l'état de pureté. Les lapins et souris, inoculés avec un centimètre cube de la culture de ces bacilles en bouillon, maigriront et succomberont au bout de quelques jours. Dans leur rate et leur foie, et, en outre, pour les souris dans l'encéphale et dans le sang, l'auteur ne trouva que des bacilles typhiques. En quelques autres cas M. Fictine a constaté dans le sang de la rate des streptocoques pyogènes et en général les microorganismes vulgaires de la suppuration. — Le même auteur a observé une culture pure de bacilles typhiques dans le pus d'un abcès du tissu cellulaire au milieu de la fesse gauche d'un malade atteint de fièvre typhoïde. L'abcès fut ouvert avec les précautions antiseptiques convenables pen-

dant la sixième semaine de la maladie, c'est-à-dire quand venait la convalescence. Le pus qu'il renfermait fut ensemencé sur des plaques de gélatine. Il en résulta bientôt des colonies de bacilles typhiques purs. Les animaux inoculés avec la culture succombèrent ; leurs organes n'offrirent à l'autopsie que le bacille typhique. On doit conclure de ce fait qu'au cours de la fièvre typhoïde les agents de cette maladie peuvent produire des abcès spécifiques en suivant un processus jusqu'à présent inconnu.

Dr Pierre HAUSNER.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 20 février 1890.

M. von **Hofmann** expose quelques expériences sur la dissociation des gaz par un courant d'étincelles. Il avait observé avec feu son ami M. Buff que l'acide carbonique est décomposé par l'étincelle, décomposition qui se traduit par un agrandissement du volume. Cette dissociation se poursuit jusqu'à une certaine limite, les gaz oxygène et oxyde de carbone se recombinaient alors avec une petite explosion. La décomposition et la recombinaison alternantes s'observent le mieux, d'après ses expériences récentes, si la distance des deux électrodes est de 2,5 à 3 millimètres et si l'étincelle d'un appareil de Ruhmkorff chargé par deux éléments de Bunsen et renforcé par une petite bouteille de Leyde passe à travers la colonne gazeuse à peu près dans un quart de sa hauteur. Pour cette expérience, on se sert avec succès d'électrodes mobiles. Ces électrodes consistent en un tube en U. D'un côté, ce tube est fermé et muni d'un fil en platine soudé dans le verre. On enveloppe cette branche du tube d'un autre fil en platine dont une extrémité se trouve vis-à-vis du fil soudé dans le verre, tandis que l'autre plonge librement dans le mercure de la cuve qui contient le tube rempli du gaz. Ce tube en U est rempli de mercure et le courant est fermé en plongeant l'un des pôles de la batterie dans le mercure de la cuve et l'autre dans la branche ouverte du tube. On peut démontrer la décomposition de l'acide carbonique en faisant passer un courant de ce gaz par un tube en verre contenant deux fils de platine entre lesquels le courant d'étincelles passe. Le gaz sortant du tube n'est plus absorbé en totalité par la lessive de potasse ; il reste un résidu moins absorbable, mais, inflammable par l'étincelle. La vapeur d'eau est décomposée de même. En laissant refroidir le tube après l'interruption du courant, on observe un résidu de gaz fulminant. Si, au contraire, le refroidissement a lieu pendant que le courant reste fermé, ce résidu n'est plus observé : les gaz se sont recombinaés sous l'influence de l'étincelle. Des dissociations tout analogues ont lieu si l'on fait agir sur de l'acide carbonique ou de la vapeur d'eau la décharge si lente d'un appareil de Siemens pour la préparation de l'ozone. Il faut en conclure que ces décompositions ne sont pas provoquées exclusivement par la chaleur, mais que l'électricité y joue un rôle important.

Séance du 27 février 1890.

M. **Roth** fait une communication sur les modifications des roches par le contact avec des roches éruptives.

Dr HANS JAHN.

Séance du 13 mars 1890.

M. **Hensen** envoie une communication sur les plantes recueillies l'été dernier par l'expédition de la fondation Humboldt. L'auteur donne, d'après 31 péches, des données numériques sur la richesse quantitative en petites plantes de la région qui s'étend depuis les îles Bermudes jusqu'au îles du Cap. Pour une profondeur de 200 mètres, elle fut en moyenne de

35 centimètres cubes par mètre cube. Contrairement à ce qui existe pour les ports, la richesse de la flore serait dans l'Océan relativement uniforme et ne varierait en quantité et en qualité que dans des zones éloignées. Quoiqu'il existe sous les tropiques une flore riche en espèces, elle y est quantitativement 8 fois moindre que dans le Nord. Ce ne serait pas la chaleur qui appauvrirait la flore tropicale mais le manque de substances nutritives, spécialement de corps azotés. La question de savoir si la vie serait possible lorsque toute la terre serait recouverte par l'Océan, se réduirait à connaître quelle serait alors dans l'eau marine l'abondance des substances azotées (AzH^3 et HNO_3). L'auteur expose ensuite l'harmonie qui existe entre la faune de la haute mer d'une part et la flore et les moyens d'existence d'autre part.

J. F. HEYMANS.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 2 mars 1890.

M. Brodhun présente un nouveau photomètre. La partie essentielle de cet appareil est un cube en verre formé par deux prismes rectangulaires dont les hypoténuses sont pressées l'une contre l'autre. Une partie de la surface de ces hypoténuses est polie avec un soin extrême, tandis que de l'autre partie on a ôté la couche superficielle du verre. Un écran qui forme le prolongement de la surface de jonction des deux prismes est illuminé par les deux sources de lumière qu'il s'agit de comparer. Deux miroirs parallèles placés convenablement projettent les images des deux surfaces de cet écran sur le cube en verre, de sorte qu'on voit l'un à côté de l'autre dans une loupe placée perpendiculairement à l'une des faces du cube. On déplace le tout le long d'une règle divisée en millimètres jusqu'à ce que les deux images montrent la même clarté. Pour étalon on se sert d'une petite lampe électrique à incandescence chargée par des accumulateurs. Si la différence de potentiel n'est pas trop grande (35 volts) et qu'on prenne soin que l'intensité du courant ne change pas, ces lampes sont d'une constance remarquable. Après 200 heures de fonctionnement non interrompu, l'intensité avait diminué à peu près d'un pour cent. A l'occasion de ces expériences on a fait l'observation curieuse que la résistance de la lampe diminue au lieu d'augmenter comme on aurait dû s'y attendre. — M. Lummer présente un appareil de M. Abbé (d'Inna) destiné à examiner des plaques planes-parallèles en verre. Le principe de cet instrument est le même que celui du réfractomètre interférentiel de Jamin. La différence de phases de deux rayons réfléchis à la surface antérieure et postérieure d'une plaque plane-parallèle est donnée par la formule connue :

$$X = \frac{2nd}{\lambda} \cos i$$

Cette différence de phases ne peut changer, si i , n et λ restent constants, que par suite d'un changement de z persistant d . Si les changements de d sont grands, on observe les cercles de Fizeau; mais s'ils ne sont que petits, les deux surfaces de la plaque sont presque rigoureusement parallèles, et l'on voit un système d'anneaux concentriques. En promenant la plaque devant l'objectif de la lunette astronomique, qui sert pour les observations, on reconnaît si toutes les parties sont de la même épaisseur ou non. Dans le premier cas, les anneaux ne changent pas de position; dans le second, on observe des dislocations. Il va sans dire que pour cet examen des plaques, il faut se servir de lumière monochromatique, par exemple d'une flamme colorée par du carbonate de sodium.

D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIOLOGIE DE BERLIN

Séance du 14 mars 1890.


M. J. F. Heymans communique le résultat de ses recherches microchimiques sur la myéline. Si l'on entoure de ligatures les extrémités et les ramifications des nerfs sciatiques de grenouilles ou de mammifères et qu'on les épuise ensuite par de l'eau distillée, on obtient par évaporation de l'eau un extrait aqueux qui ne se colore pas par l'acide osmique et ne présente pas de formations myéliniques dans l'eau. Les nerfs épuisés par l'eau se noircissent encore par l'acide osmique. Si on les épuise par de l'alcool à 40°, ils ne se colorent plus par l'acide osmique et l'évaporation de l'alcool laisse un résidu qui se gonfle dans l'eau et se noircit par l'acide osmique. Cet extrait comprend au moins du protogène, de la cholestérine et de la lécithine. De ces substances isolées, la lécithine seule se gonfle dans l'eau et se colore par la solution osmique. L'auteur conclut que par myéline il ne faut comprendre que la lécithine de la gaine médullaire des fibres nerveuses. Les formations myéliniques proviennent du gonflement de la lécithine accompagnée de la précipitation de celle-ci en membranes. — M. Goldscheider sur la sensibilité des extrémités articulaires. D'après cet auteur, les articulations jouent un rôle important dans le sens musculaire; elles procurent la sensation du mouvement et la sensation de la résistance. La sensation du mouvement a probablement son point de départ dans la capsule articulaire, la sensation de résistance dans l'extrémité osseuse. Pour démontrer la sensibilité des extrémités osseuses, M. Goldscheider a recherché si l'on peut provoquer des réflexes en excitant chez le lapin l'extrémité périphérique du tibia ou du quatrième métatarsien. Ce fut le réel et respiratoire qu'il utilisa à cet effet. L'os étant fixé, la capsule articulaire étant ouverte, il excita mécaniquement ou thermiquement la surface articulaire et observa une modification de la respiration. Cette réaction respiratoire survient encore si l'on résèque plus ou moins la surface articulaire; elle devient même plus intense, si l'on enlève l'extrémité osseuse jusqu'à la moelle. L'auteur en conclut que l'extrémité articulaire des os est sensible, au moins jusqu'au voisinage de la surface articulaire; il laisse toutefois indécis si la surface articulaire l'est elle-même. J. F. H.

J. F. H.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 6 mars 1890.

Le professeur E. Weyr présente un mémoire de M. Otokar Zecek de Prague sur l'inversion des séries.
— M. John Abel envoie un mémoire intitulé : *Détermination du poids moléculaire de l'acide cholatique, de la cholestérine, de l'hydrobilirubine*, par la méthode de Raoult. — MM. A. Smolka et A. Friedreich présentent un travail sur l'histoire de l'ammeline. Les auteurs décrivent deux nouvelles synthèses de l'ammeline en partant de la dicyandiamide ou de la biguanidine et de l'uréthane. Les formules qui représentent les deux réactions sont :



Le professeur **Gegenbauer** présente un mémoire intitulé : *Quelques propositions sur les fonctions $C_n^m(x)$* . — Le professeur **J. Pulug** envoie un travail : *Sur la mesure des températures dans des trous percés à côté d'une source saline*. L'auteur a étudié la distribution des températures dans des trous pratiqués au voisinage de sources salines à l'aide de téléthermomètres construits spécialement par lui dans ce but. Il a calculé ses observations par la méthode des moindres carrés, et a pu représenter la température t à une profondeur h au-dessous du sol par la formule :

$$t = 11^{\circ}459 + 13, 03182 (h - 30)$$

Il faut donc une variation de niveau de $32^{\circ}07$ pour une variation de 1° ; ces recherches ont été faites avec l'aide de l'administration prussienne, elles ont été très pénibles et très coûteuses. Il est à remarquer qu'à 2 kilomètres environ de profondeur, l'eau devrait atteindre la température d'ébullition; on peut de là tirer certaines conséquences relativement aux courants d'eaux. — Le **D^r Margule**, de Vienne, communique un mémoire : *Sur les oscillations périodiques de l'air chauffé*. Le recueil si complet que publie le professeur **Hann** des oscillations quotidiennes du baromètre ont conduit l'auteur à calculer les variations de la pression atmosphérique dues aux changements périodiques de la température de l'air. Il établit une relation entre les ondes de température et les ondes de pression. Les calculs se font comme l'a indiqué lord Rayleigh dans une courte note (Phil. Mag, 1890) pour le cas d'une sphère supposée à l'état de repos; si l'on suppose une sphère animée d'un mouvement de rotation on se trouve amené à des calculs analogues à ceux de Laplace relativement aux phénomènes des marées. — **M. Alois Lude** adresse un travail intitulé : *Recherches sur le mécanisme anatomique et physiologique des changements de coloration des poissons*. **M. Georges Pouchet**, dans un mémoire publié en 1872, a établi une relation entre la couleur des poissons et l'état de leur œil; il montra par quelle voie l'excitation de la rétine se transmet aux cellules pigmentaires; il coupa tantôt le nerf sympathique, tantôt la corde dorsale et observa les animaux en pleine lumière : bien que les poissons ne survécussent pas longtemps à l'opération, **M. G. Pouchet** put reconnaître que ceux auxquels il avait coupé la corde dorsale ne manifestaient aucun changement, tandis que ceux à qui l'on tranchait le sympathique devenaient plus foncés dans la partie supérieure du corps. L'auteur démontre l'exactitude de la théorie de **M. G. Pouchet** sur la transmission de l'excitation nerveuse par la voie du sympathique. On prend une truite dont les changements de coloration sont si visibles que Tschudi avait déjà surnommé cet animal le caméléon des poissons; deux électrodes sont enfoncées un peu avant la nageoire dorsale et sont attachées aux pôles d'une bobine d'induction de Dubois-Reymond; il en résulte une contraction des chromatophores sur la surface de la peau qui s'étend petit à petit, et en même temps un tétanos qui gagne l'ensemble du système musculaire. Quand l'animal s'est rétabli, on pratique une nouvelle section de la moelle à une distance de 1 centimètre environ en avant de la nageoire ventrale et on excite de nouveau. Il en résulte un tétanos qui se trouve limité par l'endroit sectionné; la contraction des cellules pigmentaires, par contre, se propage comme précédemment jusqu'à l'extrémité distale de l'animal. Après que l'on a ainsi montré que la moelle épinière n'est pas la voie par laquelle l'excitation se propage, on fait une incision plus profonde et on coupe le sympathique. Cette fois ce n'est plus seulement le tétanos qui se trouve arrêté et localisé par la section que l'on vient de faire, mais encore la contraction des cellules pigmentaires. On peut aussi montrer que les chromatophores foncés dépendent du système nerveux, en empoisonnant les animaux avec du curare. Ces expériences réussissent en entretenant la vie de l'animal par la respiration artificielle.

Séance du 13 mars 1890.

Par une lettre datée du 3 mars, **S. A. le Prince de Lichtenstein**, membre honoraire de l'Académie, fait savoir que, désirant encourager les recherches scientifiques relatives à l'Asie-Mineure, il fonde un prix annuel de cinq cents florins, qui sera pendant les six prochaines années, distribué par l'Académie aux travaux sur ce sujet, particulièrement aux travaux archéologiques. — **M. Bauer** adresse un mémoire fait dans son laboratoire par **M. van Bamberg** : *sur l'analyse des résines*. L'auteur a examiné quarante résines et a groupé les résultats dans un tableau faisant connaître la composition des corps étudiés. — Le **D^r Joseph Schaffer** envoie un travail intitulé : *sur l'examen de dents fossiles en lumière polarisée*. Outre quelques remarques sur l'émail de l'ivoire des éléphants, ce travail contient la preuve que les dents fossiles se comportent au point de vue de la réfraction, comme les ossements fossiles.

Emil Weyr,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance du 16 mars 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Favero** : Sur les racines des équations algébriques. — **M. Pincherle** : Sur quelques intégrales particulières des équations différentielles non homogènes. — **M. Reina** : Nouvelles recherches sur les lignes conjuguées d'une surface.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Nasini**, à propos d'un travail de **MM. Barbier et Roux** sur la dispersion des composés organiques, publié dans le dernier fascicule du *Bulletin de la Société chimique de Paris*, a fait remarquer que déjà en 1887 il s'était occupé de la question et qu'il avait reconnu que toutes les fois que dans la série aromatique l'on passe d'un composé à un autre immédiatement supérieur, la dispersion diminue d'une quantité à peu près constante. Le même fait a été établi avec une plus grande précision par le docteur **Tullio Costa** dans un mémoire publié l'été passé dans la *Gazzetta chimica italiana*. **M. Nasini** reconnaît à **MM. Barbier et Roux** le mérite d'avoir précisé la loi mathématique du phénomène, et en relève l'importance, parce que cette loi démontre ce qu'il avait toujours soutenu, savoir que, contrairement à certaines suppositions, la dispersion ne doit pas être regardée comme une propriété capricieuse et due au hasard. — **M. Ferrini** présente quelques remarques sur les expériences faites par **M. Pisati** pour étudier la propagation du flux magnétique dans le fer. Tout en reconnaissant l'importance théorique des résultats que ces expériences pourront donner, **M. Ferrini** fait observer qu'elles ne seront pas applicables à l'étude de la transmission du flux dans les machines dynamo-électriques; car, tandis que sur les barres, les faisceaux et les anneaux de **M. Pisati** l'hélice magnétisante avait une petite longueur, dans les dynamos, au contraire, elle entoure presque entièrement les deux branches de la machine. Cette disposition et la proximité de l'armure en fer destinée à recueillir le flux magnétique, s'opposent à la dispersion du flux dans l'air et, modifiant la disposition des lignes de force, doivent encore modifier la distribution du magnétisme à l'intérieur des barres. **M. Ferrini** espère que **M. Pisati** voudra répéter ses expériences en imitant les conditions d'une dynamo, pour rechercher les modifications ainsi apportées à la loi qu'il a énoncée.

3^o SCIENCES NATURELLES. — **M. Pigorini** entretient l'Académie des familles humaines qui, antérieurement à l'âge du fer, vivaient dans le nord de l'Italie, et qui avaient des usages funèbres absolument différents. Cette diversité doit être en relation avec la distribution géographique des *dolmens*, laquelle prouve l'existence de deux races et de deux civilisations différentes

quoique, à une certaine époque, contemporaines. M. Pigorini, s'appuyant sur les données de M. Undset relatives aux nécropoles à crémation, a reconnu qu'elles sont plus anciennes et plus nombreuses à l'est, tandis que les recherches de M. de Mortillet montrent que les *dolmens* appartiennent aux pays proches de l'Atlantique et du nord. La cause qui a empêché la diffusion des dolmens au centre et à l'est de l'Europe doit être recherchée, comme le prouvera un prochain mémoire de M. Pigorini, dans les immigrations des familles lacustres, qui possédaient l'usage du bronze et pratiquaient la crémation.

Ernesto MANCINI.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE NAPLES

Séance des 3 e et 11 janvier 1890

M. le secrétaire donne lecture d'une revision succincte des travaux présentés en 1889. — L'Académie décide de décerner un prix de 1000 francs à l'auteur du meilleur mémoire « sur l'exposition systématique des principes fondamentaux de la théorie des fonctions hyperelliptiques et abéliennes, suivant Klein et son école. » Les mémoires devront être présentés avant le mois de mars 1891. — La commission, composée de MM. de Martini, Albini et Trinchese propose d'insérer dans les comptes rendus une note de M. **Paladino** relative à un nouveau procédé pour les recherches microscopiques

sur le système nerveux central. L'auteur introduit de l'*iodure de palladium* dans les tissus. Ceux-ci prennent une coloration brun-jaunâtre ou café, ce qui permet de très bien voir les détails intimes de leur structure. La méthode est sûre et rapide : elle a mis en évidence des éléments qu'on n'avait pu observer jusqu'alors.

Séance du 1^{er} février 1890.

M. **Albini** lit une note sur la *mobilité des liquides visqueux non homogènes*. Il donne une explication *physique* du phénomène, que l'on observe au Dôme de Naples en mai et en septembre de chaque année. On prétend que le sang de saint-Janvier renfermé dans un flacon entre à un moment donné, en ébullition ! M. Albini reproduit ce phénomène avec du chocolat réduit en poudre impalpable et délayé dans de l'eau sucrée. — MM. Battaglini, Capelli et Fergola, proposent d'imprimer dans les comptes rendus le travail de M. **Contarino** sur la détermination de la composante horizontale de la force magnétique terrestre à l'observatoire de Capodimonte pendant l'année 1889. L'auteur a exécuté ses expériences d'après la méthode de Gauss exposée par Sabine dans le *Manual of instructions for magnetic Surveys*. — Le travail de M. **Mazzarelli** sur la glande de Bohnadsch est l'objet d'un rapport, qui conclut à son insertion.

FRANCESCO SINIGAGLIA,

Professeur à l'Institut royal de Naples.

COURRIER DE GENÈVE

La Suisse fournit chaque année un précieux contingent de découvertes aux sciences naturelles et médicales. Outre les nationaux, beaucoup d'étrangers, Russes, Polonais, Bulgares, Serbes, Grecs, Italiens et Brésiliens viennent travailler dans les laboratoires des Universités de Genève, Berne, Zurich, Bâle et Lausanne. La plupart de leurs recherches paraissent soit sous la forme d'ouvrages isolément publiés, soit sous celle de mémoires insérés dans les périodiques ou les bulletins des sociétés savantes de la Suisse. Nous proposons de rendre compte, dans cette *Revue*, des plus importants au fur et à mesure de leur apparition, nous traiterons aujourd'hui de ceux qui se rapportent à la physiologie et à la médecine.

1. Mentionnons tout d'abord les recherches de MM. **D'Espine** et de **Marignac** sur le *microbe de la diphtérie*. Ce travail qui vient d'être présenté à la Société médicale de Genève (1) y a fait sensation. Les auteurs ont recherché le Bacille de Lœffler dans le croup ou angine diphtérique. Sur 15 cas observés, dont 13 authentiques et 2 douteux, le bacille a été obtenu 14 fois en culture. Le meilleur moyen de le distinguer des microbes étrangers qui peuvent lui être associés dans les fausses membranes consiste, d'après MM. D'Espine et de Marignac, à l'inoculer au cobaye. Cet animal est au premier chef le réactif du Bacille de Lœffler. Quand on le lui inocule, il devient diphtérique : c'est alors exclusivement dans les fausses membranes qu'on trouve l'agent infectieux : il est facile de l'y voir en l'y colorant par le violet de gentiane. Au contraire il n'existe pas dans le sang. Ce double caractère est important pour assurer le diagnostic du Bacille.

Au cours de leurs recherches les auteurs ont constaté un fait d'un haut intérêt : ils ont reconnu que le lait constitue un excellent milieu de culture pour le Bacille de Lœffler : d'où cette conséquence pratique qu'il faut éviter l'usage du lait provenant d'établissements où règne la diphtérie.

MM. D'Espine et de Marignac ont fait en outre quelques expériences relatives à l'action des antiseptiques sur le microbe, et ils ont cherché à employer, en thérapeutique, ceux que notre organisme peut tolérer : c'est ainsi qu'ils ont été amenés à reconnaître les excellents résultats des irrigations salicylées à 1-2 0/0 répétées toutes les heures comme traitement curatif de la diphtérie. Ils conseillent le recours à ces irrigations dans un but prophylactique pour tous les cas d'angine en temps d'épidémie diphtérique.

2. Dans un tout autre ordre d'idées vient de paraître un travail remarquable de Mlle **Schlipoff** sur les *ferments digestifs*. Etudiant l'action de la pepsine sur diverses diastases des animaux, végétaux et bactéries, l'auteur a trouvé que tous ces ferments sont rapidement et énergiquement détruits par la pepsine. L'effet inverse n'existe pas : on ne constate aucune altération sensible de la pepsine pour les autres diastases : en leur présence, elle continue d'agir dans le liquide digestif, sans éprouver ni retard ni réduction d'activité. Mlle Schlipoff s'est assurée que c'est bien le ferment peptique, et non une substance dérivée de son action sur les albuminoïdes, qui détruit les diastases.

L'auteur estime que la digestion stomacale normale détruit en grande partie les diastases nocives de certaines Bactéries fréquentes dans la bouche, et s'oppose à l'accumulation exagérée de ptomaines toxiques dans l'intestin. La question est fort intéressante, mais pour la résoudre complètement, il faudrait étudier en outre l'influence que le suc gastrique exerce sur les divers microbes du tube digestif et sur leurs spores.

Ces critiques s'adressent aussi aux conclusions que l'auteur tire de ses expériences relatives à l'action de la bile sur les ferments. Ce liquide les modifie avec une énergie très inégale, suivant les animaux (bœuf, porc, chien, veau) d'où il provient. En général son effet est multiple : la bile favorise l'action de la diastase des graisses et celle de la pancréatine, mais non

(1) *Revue médicale de la Suisse Romande*, 1890 n° 1 2.

(1) *Arch. des sciences phys. et nat.*, t. XXII.

celle de la diastase que sécrètent les glandes de Brunner.

Ce qui mérite surtout d'être noté, c'est que la bile préserve de l'action destructive de la pepsine beaucoup de ferments solubles : la diastase dont il vient d'être question, le ferments inversif, l'émulsine, le ferment du *Carica papaya* et, en général, les diastases des bactéries. C'est là un résultat fort intéressant et dont devront tenir compte à l'avenir toutes les théories de la digestion.

3. Mlle Schipiloff est aussi l'auteur d'un travail très étendu sur la *rigidité calcécrique* (1). L'hypothèse d'un ferment fibrinoplastique comme cause de la rigidité lui paraît en désaccord avec tous les faits observés. Elle attribue en partie cet état particulier des muscles *post mortem* à la précipitation de la myosine provoquée par l'acidité du muscle. Deux autres causes, suivant elle, interviendraient aussi : la contraction des muscles au moment de la mort et leur raccourcissement imputable à leur élasticité.

4. Les effets physiologiques des courants électriques continuent de préoccuper les savants et les médecins. Au laboratoire du professeur Schiff, M. H. Jofé vient d'étudier l'action polaire de ces courants (2).

L'existence d'une excitation unipolaire pour les courants d'intensité physiologique minima a été prouvée par M. Barocelli qui conclut en théorie qu'une telle excitation doit être admise aussi pour les courants ordinaires de la pile dont l'intensité est plus forte. L'expression d'excitation unipolaire est juste dans le sens qui lui a été attribué d'abord par Chauveau ; l'éminent académicien désigne ainsi l'action exercée par une électrode, quand cette électrode est seule en contact avec le nerf ou le muscle, pendant que le courant qui part de ce point de contact dans tout son chemin vers l'autre électrode a une diffusion telle qu'on ne peut lui attribuer aucune action physiologique visible. M. Jofé a répété ces expériences et en a confirmé les conclusions pour les courants bipolaires et surtout pour les courants unipolaires. Quant à la question de savoir laquelle des deux formes d'application du courant, l'une ou la bipolaire donne une action physiologique plus énergique, l'expérience a montré que dans tous les cas sans exception l'application unipolaire a un effet beaucoup plus énergique que la bipolaire. L'effet du courant bipolaire convenablement affaibli peut être réduit à zéro, et le même courant

peut donner une contraction manifeste quand on le rend unipolaire, bien qu'on l'ait rendu encore plus faible en en augmentant la résistance. On pourrait expliquer la différence bipolaire par l'hypothèse que les deux pôles de la pile produisent dans le nerf deux formes différentes de mouvements moléculaires.

5. La sensibilité de la dentine a occupé M. J. Kandon (1). Cherchant à l'abolir ou à l'atténuer lorsqu'elle est excessive et pathologique, il a éprouvé dans ce but des agents variés. Ce sont les caustiques qui se sont montrés les plus actifs. L'acide arsénieux et le chlorure de zinc produisent aussi un effet très sédatif. Mais, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer, il convient le plus souvent de renoncer à l'emploi de ces substances. L'action combinée de l'acide phénique et de l'air chaud n'offre aucun de ces inconvénients : elle procure l'insensibilité immédiate. C'est assurément le procédé le plus avantageux.

6. Au laboratoire d'histologie et d'embryologie du professeur Eternod, M. E. Ultramaré a fait une intéressante étude de la *dentition de l'homme* (2). En suivant le développement de nos dents, il est arrivé à confirmer l'opinion d'Achy, qui les considère toutes, même les plus simples, comme bicuspidés à l'origine, le tubercule postérieur s'atrophiant ensuite dans les incisives et les canines. Cette conclusion mérite qu'on la signale en raison de l'appui partiel qu'elle apporte à la doctrine de la descendance.

7. M. Kochler a fait de très curieuses observations sur les *corpuscules reproducteurs* des *Murex brandaris* et *trunculus* (3). Chez ces mollusques, il a mis en évidence deux formes très distinctes d'organes dont l'une, qui est inerte, offre l'aspect de spermatozoïdes vermiformes, tandis que l'autre, mobile, figure des spermatozoïdes filiformes (spermatozoïdes). Si l'on ne prenait soin de suivre leur développement, on les considérerait toutes deux comme représentant des spermatozoïdes. Cependant ces deux sortes d'éléments sont très distincts dès leur apparition. Leur évolution ultérieure ne fait que rendre plus sensibles les différences qui les séparent. Les seconds sont en effet de véritables spermatozoïdes, tandis que les premiers ont la valeur morphologique d'ovules et communiquent à la glande génitale les caractères d'un organe hermaphrodite.

D^r CRISTIANI.

NOUVELLES

DÉCOUVERTE DE DEUX PLANÈTES ET D'UNE COMÈTE

On vient de découvrir deux nouvelles petites planètes, appartenant au groupe qui circule entre Mars et Jupiter, la première (239), a été aperçue par M. Charlois, à l'observatoire de Nice, le 10 mars ; l'autre (240) a été trouvée par M. Palisa à Vienne le 10 mars. Cette dernière paraît présenter un intérêt notable, car son mouvement apparent rapide permet de supposer qu'elle est une des plus voisines de la Terre.

M. Brooks, de Gênes (New-York), vient de décou-

vrir une comète, la première de l'année, observable le matin, quelque temps avant le lever du soleil. L'annonce de sa découverte est parvenue en Europe avec une observation faite à Cambridge (près de Boston) le 24 mars. A Paris l'état du ciel n'a pas encore permis de l'observer.

Ajoutons que deux comètes périodiques sont prochainement attendues ; ce sont d'abord la comète de Brorsen, puis celle d'Arrest : le calcul des positions de cette dernière a été effectué par M. Leveau, astronome à l'Observatoire de Paris.

(1) *Revue médicale de la Suisse Romande*, nos 8, 9 et 10, 1889.

(2) Voyez à ce sujet la note que M. Schiff a publiée sur ce sujet dans les *Archives des sciences physiques et naturelles* en 1888.

(1) *Archives suisses d'Odontologie*, 1889.

(2) *Ibidem*.

(3) *Recueil de zoologie suisse*, t. V, n° 1.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LA CONSTITUTION DES SOLUTIONS ÉTENDUES ET LA PRESSION OSMOTIQUE

Un certain nombre de corps plongés dans un liquide ont la propriété de disparaître complètement à la vue et de se répartir uniformément dans toute la masse de ce liquide sans troubler sa transparence. La constatation de ce fait se perd assurément dans le passé et il était connu depuis longtemps lorsque l'explication en a été tentée. Les Anciens assimilaient la dissolution à la fusion, tenant surtout compte de ce fait que le solide qui se dissout prend la forme liquide du dissolvant. Ce fut l'opinion acceptée au Moyen Age où l'on était assez peu expérimentateur; et l'idée passant dans la langue, nous parlons encore aujourd'hui de faire *fondre* du sucre dans de l'eau. Jusqu'à la fin du siècle dernier, la notion de solubilité n'a pu être dégagée d'un certain nombre de faits parallèles et la dissolution d'un sel dans l'eau ou celle d'un métal dans un acide n'étaient passablement distinguées.

I

Lorsqu'un acide mélangé d'eau agit sur un métal, il se fait une *réaction chimique* donnant lieu à un sel, qui d'ailleurs pourra être soluble dans l'eau, et donner ainsi l'illusion d'une action simple, d'une dissolution directe du métal. On réserve maintenant le nom de solution à la répartition uniforme d'un corps dans un liquide sans qu'il y ait de réaction chimique, au moins connue.

Ainsi définie, la solubilité est un des faits scientifiques les moins bien classés; et l'on se demande souvent si cet acte si général et si important dans ses applications est de nature physique ou chi-

mique. De toute évidence, et comme de nombreux faits le démontreront plus loin, c'est une action mixte; considérée sous ce jour, elle a donné dans ces dernières années les résultats les plus importants qui aient été acquis depuis longtemps.

Le point de départ de tout progrès est dans l'expérimentation et voici les expériences d'où sont sorties les idées les plus récentes touchant non seulement la solubilité, mais encore la physique des combinaisons chimiques. Ces expériences vont paraître, sans doute, bien éloignées du sujet que nous traitons.

En 1877 Traube examina les échanges de matière qui ont lieu entre une solution de sel enfermée dans une vessie ordinaire et de l'eau pure dans laquelle cette vessie est plongée. Il constata que le sel traverse difficilement la membrane, alors que l'eau y entre en telle abondance qu'elle la fait gonfler fortement. Plus tard, le botaniste Pfeffer (1) voulut se rendre compte du rôle des échanges qui ont lieu, à travers les enveloppes des cellules, entre l'eau que les végétaux puisent dans le sol et les sucs plus ou moins riches en matières salines que les cellules contiennent. Comme préparation à ses travaux il fut amené à étudier un certain nombre de parois poreuses artificielles, perméables aux liquides. Au cours de ces recherches il trouva une membrane particulière jouissant de propriétés fort remarquables. On sait que les vases poreux en faïence dégourdie employés pour les piles, étant remplis d'une solution quelconque et placés dans

(1) *Osmotische untersuchungen*. Leipzig, 1887.

l'eau pure, laissent aussi bien pénétrer l'eau à l'intérieur que sortir la solution. Il n'en est plus de même quand on leur fait subir la préparation imaginée par Pfeffer. Dans ce cas, des vases de pile d'environ dix centimètres de haut sont soigneusement lavés aux acides et aux alcalis, puis rincés jusqu'à ce que l'eau qui en sort soit pure. Tous ces traitements se font sous pression réduite, afin que les réactifs ou l'eau traversent la paroi qui devra être aussi poreuse que possible. Les vases de pile sortant de l'eau et essuyés au papier buvard sont remplis d'une solution à 3 % de sulfate de cuivre et, dix minutes après, placés debout dans une solution au même titre de ferrocyanure de potassium. Les deux liquides cheminent dans la terre poreuse en sens inverse et se rencontrent vers le milieu de la paroi où ils produisent un précipité de ferrocyanure de cuivre gélatineux formant une sorte de membrane interne très délicate, mais protégée en tout point par un revêtement solide de faïence.

C'est un fait bien connu que les membranes se laissent traverser par l'eau ou d'autres liquides par osmose; mais l'action n'est pas rigoureusement unilatérale, elle diffère en cela de celle qui se produit dans la membrane chimique que nous venons de décrire; celle-ci, se laissant traverser librement par l'eau pure, a la propriété de ne pas laisser passer la moindre quantité de matière saline : on l'a nommée paroi *hémiperméable*.

Après avoir minutieusement rincé les vases préparés, on y fixe par un solide bouchon un tube à deux branches permettant de les remplir avec les liquides qu'on étudie et de les mettre en communication avec un manomètre à air libre. En prenant les plus grands soins, c'est à peine si sur cent préparations on obtient deux parois *hémiperméables* continues, sans bulles, ni fissures et capables de rendre des services. Lorsque dans l'intérieur d'un vase préparé on introduit une solution saline à 1 % ou 2 % jusqu'à remplir toute la cavité du vase, y compris les tubes reliés au manomètre, et qu'on plonge l'appareil dans de l'eau distillée, l'eau seule, comme nous l'avons dit, peut circuler à travers la membrane, si elle est parfaite (fig. 1). Il est facile de constater qu'elle entre dans le vase clos pour diluer le sel et cela malgré la pression qui se produit comme conséquence de son entrée dans un vase rigide et déjà




Fig. 1. Appareil de Pfeffer.

plein. La pression à laquelle les solutions salines font équilibre peut atteindre plusieurs atmosphères.

C'est la *pression osmotique*; on la désigne souvent par Π . Cette pression croît lentement pendant quelques heures et finit par atteindre un état d'équilibre. La pression osmotique dans chaque cas est parfaitement fixe et définie.

Le fait de la pression ou tension osmotique existe, mais à première vue paraît inexplicable. On se demande, puisque la paroi hémiperméable laisse librement passer l'eau en tous sens, pourquoi l'eau extérieure à la pression normale entre dans un vase exactement rempli de solution sous cette même pression. Dans ces conditions aucune action ne devrait s'établir quand on immerge le vase de Pfeffer, car si la tension de l'eau s'accroît, par hypothèse, dans le vase interne, elle peut en sortir aussitôt à travers la paroi hémiperméable et rétablir l'équilibre. Mais c'est précisément ce paradoxe apparent qui permet d'attribuer la pression osmotique aux molécules salines seules, en éliminant la pression du liquide, ainsi que M. Van't Hoff l'a montré. L'eau extérieure est évidemment à la pression atmosphérique, mais le vase à osmose a été rempli à la même pression, non pas d'eau, mais d'une solution dans laquelle ce dissolvant et les molécules salines ont chacune une fraction de la tension totale, comme cela a lieu pour les mélanges gazeux. Dès lors l'eau intérieure n'est pas en réalité à la même pression que celle qui se trouve à l'extérieur et cette dernière entre dans le vase jusqu'à ce que l'équilibre de pression de l'eau, *intus et extra*, soit établi. L'excès de pression qui se produit ainsi, c'est-à-dire la pression osmotique Π , n'est donc plus attribuable qu'aux molécules des corps dissous. On trouve une image fidèle de cette théorie dans l'expérience de cours si connue qui consiste à plonger un vase de pile clos et rempli d'acide carbonique dans une cloche d'hydrogène. L'hydrogène traverse aisément la paroi, et tend à se mettre en équilibre de pression de part et d'autre; l'acide carbonique ne pouvant sortir aussi vite, la pression croît à l'intérieur.

Entre deux solutions il peut se faire des échanges d'eau, des variations de la concentration conduisant à un équilibre; cette observation a permis à un botaniste encore, M. de Vries (1), de trouver les concentrations de solutions salines pour lesquelles il y a « équilibre osmotique », en se servant de cellules végétales. Si l'on taille une tranche d'un végétal herbacé assez mince pour quelle puisse être vue au microscope dans toute son épaisseur, de nombreuses cellules se montrent coupées; mais, dans le nombre, d'autres mieux situées restent intactes contenant leurs sucs salins, revêtues de

(1) Eine methode zur analyse der Turgorkraft. Pringsheim's Jahrb. XIV.

leurs enveloppes et jouant, grâce à la couche cuticulaire du protoplasma, le rôle de parois hémiperméables. Il y aura, comme le dit M. de Vries, des échanges liquides par voie de « plasmolyse » si sur le porte-objet du microscope on mouille une semblable préparation avec la solution aqueuse d'un sel à 1, 2, 3, 4.... $n\%$; les cellules intactes prendront de l'eau aux solutions les plus étendues et on les verra se gonfler, tandis qu'au contraire elles se contracteront pour les solutions d'un rang plus élevé dans la série, auxquelles elles céderont de l'eau. Dans la série des concentrations celle pour laquelle il n'y aura aucune variation de turgescence sera en équilibre osmotique; et, si plusieurs sels sont examinés de cette façon, on aura par tâtonnement les concentrations nécessaires pour équilibrer osmotiquement le suc cellulaire d'une plante donnée. On aura le *coefficient isotonique* de la solution. Le coefficient isotonique varie assurément avec l'espèce végétale employée; mais toutes ces valeurs ne diffèrent que par une constante; de sorte qu'en rapportant les résultats obtenus pour divers corps à un sel dont on connaît déjà la pression osmotique pour la concentration isotonique, la pression osmotique pour ces corps se trouve déterminée. On peut donc faire très aisément par une simple observation microscopique les déterminations si importantes de pression osmotique.

Depuis longtemps certes on a étudié en botanique les phénomènes d'osmose; mais la connaissance exacte des variations de concentration des milieux salins en rapport avec la pression osmotique est peut-être de nature à modifier bien des idées sur l'hydrostatique des êtres vivants, les mouvements d'eau dans les végétaux, et les sécrétions, surtout pathologiques, des animaux et de l'Homme.

II

M. J. H. Van't Hoff, d'Amsterdam (1), a été frappé de l'importance de ces phénomènes osmotiques, dont l'intensité se mesure par atmosphères et qui se prêtent à des évaluations suffisamment exactes. Il est arrivé, au moyen d'une hypothèse, à les expliquer et à édifier une théorie physico-chimique des solutions et même des combinaisons, qui fait chaque jour de nouveaux progrès et dont il est difficile aujourd'hui de prévoir l'influence sur les théories chimiques actuelles.

Bernoulli, puis Clausius plus tard, dans sa théorie cinétique des gaz, ont admis que ceux-ci sont formés de petites particules ou molécules animées d'un rapide mouvement de translation. Ces molécules chemindraient indéfiniment, si le gaz

n'était contenu dans une enveloppe quelconque. Enfermées, elles viennent sans cesse heurter la paroi et leur choc incessant produit cette poussée continue qu'on nomme la pression du gaz. Si l'on diminue de moitié le volume d'une masse gazeuse donnée, sa pression augmente du double, parce que le même nombre de molécules frappant une surface moindre y développe une pression plus grande. C'est la loi de Mariotte, d'après laquelle le volume d'un gaz parfait est en raison inverse de la pression.

M. Van't Hoff a fait, comme nous l'avons dit, une application heureuse de ces idées aux solutions. Il admet que lorsque les solutions sont *très étendues*, elles sont analogues aux gaz parfaits. Alors, comme dans le cas de ceux-ci, les molécules chimiques provenant du sel dissous se meuvent librement dans le dissolvant, frappant la paroi du vase et donnant lieu aux phénomènes de *pression osmotique* qui sont aux solutions ce que les pressions ordinaires sont aux gaz et vapeurs.

Cela n'est pas simplement une vue de l'esprit, car on a pu constater avec surprise que la formule bien connue :

$$(A) \quad p v = RT \quad \text{ou} \quad R = \frac{p v}{T} \quad (1)$$

qui représente les lois de Mariotte, Gay-Lussac et Avogadro et définit l'état d'un gaz, est numériquement applicable aux solutions. En effet si l'on prend une quantité de gaz égale au poids moléculaire, c'est-à-dire au poids de matière gazeuse occupant le même espace que deux volumes d'Hydrogène H^2 , soit $22^{l}33$ et que dans la formule (A) ci-dessus p représente comme d'usage la pression en grammes par centimètre carré, v le volume en centimètres cubes et T la *température absolue* (2), la formule permet de calculer la valeur de la constante R . Prenons en effet comme exemple l'oxygène à 0° et à 760° . Dans ces conditions le poids du litre étant $1^{gr}437$, le volume occupé par la molécule sera $\frac{32}{1437} = 22^{l}26$. Sous la pression normale de l'atmosphère, l'effort en grammes par centimètre carré sera 1033^{gr} et comme en température absolue $0^\circ = 273$, on trouve, en effectuant :

$$R = \text{constante} = \frac{1033 \times 22,26}{273} = 84500.$$

(1) p = pression; v = volume; T = température absolue; R représente une constante.

(2) La contraction que subissent les gaz en se refroidissant est, pour chaque degré, $\frac{1}{273}$ de leur volume; de sorte que par un refroidissement continu, s'ils ne se liquéfiaient pas; et si leur loi de contraction restait la même, leur volume compté à partir de 0° serait nul à -273° . Ce nombre, très important en physique, est l'origine de l'échelle des *températures absolues* dans laquelle $0^\circ = 273^\circ$; 25° , par exemple, deviendrait : $273+25 = 298^\circ$.

* (1) *Zeitschrift für Physikalische Chemie*, 1887, t. I, p. 481.

On aurait le même résultat pour d'autres gaz : la constante tirée de l'équation des gaz est donc 84700. Si, au lieu de prendre un gaz, on part d'une solution, on arrivera au même résultat par la même formule, pourvu qu'on prenne la *pression osmotique* II aux lieu et place de la pression gazeuse.

Nous pouvons en effet refaire le calcul pour une solution avec les documents de Pfeffer, qui a trouvé que le sucre dissous dans les rapports de 1 de sucre à 100 d'eau, à 14°, donnait une pression osmotique de 0^{atm}671 dans son appareil.

La molécule de sucre de canne, c'est-à-dire la quantité de cette matière correspondant à la formule C¹²H²²O¹¹ qui, selon les lois de la chimie, occuperait, si on pouvait la volatiliser, le même espace que H², est 342^{gr}. La solution de 1^{gr} de sucre dans 100^{gr} d'eau occupe un espace de 100^{cc}6; celle de 342^{gr} occuperait donc 34403^{cc}. Ce volume de 34403 est celui qu'occupe la *molécule-gramme* pour la concentration énoncée de 1 : 100. Pour cette concentration, la pression II de 0^{atm}671, évaluée en grammes par centimètre carré, est 0^{atm}671 × 1033 = 693^{gr}. Quant à la température à introduire dans la formule (A) elle sera 14° + 273° = 287°, pour compter en températures absolues.

Les valeurs ainsi définies donnent :

$$R = \frac{693 \times 34403}{287} = 83100.$$

C'est encore la constante moléculaire des gaz; bien qu'elle soit un peu faible, ce que les erreurs inhérentes à ces expériences suffisent à expliquer largement.

En général les solutions étendues de substances solides ou liquides dans des solvants quelconques vérifient l'équation (A); et en acceptant R = 84700, on peut calculer avec cette équation, faite primitivement pour représenter l'équilibre des gaz, la pression osmotique II que donnera un liquide mixte à diverses températures :

$$(B) \quad II = \frac{84700 (273 + t)}{v}$$

D'ailleurs les corps qu'on peut étudier sous la forme de solution et de gaz donnent pour leur pression gazeuse *p*, et leur pression osmotique II, le même nombre,

Les solutions suivent donc bien les mêmes lois que les gaz. Voici le résumé de ces lois :

1° Pour une même température, à concentration moléculaire égale, c'est-à-dire quand le même nombre de molécules occupe le même espace, les divers corps en solution ont la même pression osmotique. C'est bien là cette *loi d'Avogadro* pour les gaz qui veut que pour une même pression et

une même température les gaz contiennent le même nombre de molécules dans le même espace.

2° Gay-Lussac a montré que lorsqu'on chauffe un gaz, il augmente de $\frac{1}{273}$ de son volume par degré ; mais s'il est dans un espace clos, le volume ne pouvant varier, c'est la pression qui s'accroît. Cette loi est contenue dans la formule (A) mise sous la forme :

$$p = \frac{RT}{v}$$

qui montre que la pression *p* pour une masse donnée est en raison directe de la température absolue et en raison inverse du volume, comme l'exige la loi de Mariotte.

Continuons à assimiler les solutions aux gaz ; les expériences suivantes prouvent que nous en avons le droit :

On augmente la quantité de gaz dans un espace donné : la pression croît (Mariotte). On augmente la quantité de matière dissoute dans un certain espace, c'est-à-dire la concentration, la pression osmotique croît (Pfeffer et Van't Hoff). Soit une solution de sucre à 15° :

C concentration en sucre %	II Pression osmotique correspondante, en millimètres de mercure	II C
1 %	535 ^{mm}	535
2 %	1016	508
2.74 %	1518	554
4 %	2082	521
6 %	3075	513

La pression osmotique est donc bien proportionnelle à la concentration, aux erreurs d'expérience près.

On constate de même que, pour une même solution, la pression osmotique croît, avec la température, de la quantité prévue par la loi de Gay-Lussac :

		Observée	calculée
Sucre	32°	Pression osmotique = 544	512
	14°	— = 510	
Tartrate de sodium	37°3	— = 983	907
	13°3	— = 908	

La similitude de la pression des gaz et de la pression osmotique est donc expérimentalement établie. L'analogie des molécules gazeuses se mouvant dans l'espace et des molécules de matière dissoute se mouvant dans les solutions étendues, est complète.

De même qu'il n'est pas de question relative aux gaz dans laquelle on puisse faire abstraction de la température, du volume et de la pression, de même tous les faits connus relatifs aux solutions étendues viennent se grouper peu à peu autour de la théorie fondée sur la pression osmotique.

La valeur moyenne acceptée pour la constante R est 84700.

M. Raoult, dans ses remarquables recherches sur le point de congélation des solutions étendues, a établi une relation entre l'abaissement de cette valeur et les *poids moléculaires*. Les résultats acquis par ce savant ont été rattachés bientôt à la *théorie cinétique* des solutions et les abaisséments du point de congélation permettent maintenant de calculer la pression osmotique et vice-versa.

En désignant par $T_0 - T_1$ l'abaissement total du point de congélation, par V le volume spécifique du dissolvant, par L la chaleur latente de fusion de ce même dissolvant, par T, E, II, respectivement la température absolue, l'équivalent mécanique de la chaleur et la pression osmotique produite par le corps dissous, on a relié les deux phénomènes par la formule.

$$(C) \quad T_0 - T_1 = -\frac{1}{E} \cdot \frac{T}{L} \cdot V \cdot II.$$

Dans la formule (A), R = 84700, soit sensiblement le double de la valeur de l'équivalent mécanique : 2E ou 42500×2 dans le système d'unité adopté. En rapportant à une molécule *m* de corps dissous, on aura, d'après la formule précitée de la pression osmotique :

$$\frac{H V m}{T} = 84700 = 2E \quad \text{ou} \quad \frac{H}{E} = \frac{2T}{m} \cdot \frac{1}{V}.$$

Par substitution dans la formule (C), Il vient :

$$T_0 - T_1 = \frac{2T^2}{L m} \cdot v.$$

De plus, comme le rapport du volume spécifique V du dissolvant au volume spécifique *v* du corps dissous représente la concentration $\frac{r}{100}$ en matière dissoute, on arrive à $T_0 - T_1 = \frac{2T^2}{L} \cdot \frac{r}{100} \cdot \frac{1}{m}$.

M. Raoult a donné pour l'abaissement *moléculaire* de congélation *t* la formule $t = (T_0 - T_1) \frac{m}{r}$, d'où l'on a tiré, en tenant compte de ce qui précède, la formule pratique :

$$t = 0,02 \frac{T^2}{L}.$$

Par une voie analogue les abaisséments de tension de vapeur des solutions, de M. Raoult, ont été rattachées à la pression osmotique et permettent d'en calculer la valeur. On le voit, il n'y a plus à discuter les preuves : il y a un nombre considérable de corps qui en solution vérifient la formule des gaz : par la pression osmotique directe de M. Pfeffer, par le coefficient isotonique de M. de Vries, par la diminution de tension des solutions de M. Raoult, par l'abaissement du point de congé-

lation du même auteur. N'y eût-il que quelques cas bien observés au lieu de cette abondance de preuves, la relation serait établie.

III

Les corps qui suivent la loi de Van't Hoff régulièrement sont toutes les substances organiques, en général tous les corps non conducteurs (qui ne sont pas des électrolytes). Mais les sels — tous électrolytes — ont paru un instant faire exception à la règle. Pour satisfaire à cette loi, il fallait, afin de mettre d'accord l'expérience et la théorie, introduire un certain coefficient qu'on a désigné par *i* et qui pouvait varier de 1 à 4 dans la formule (A). On avait ainsi :

$$(D) \quad pV = iRT$$

C'était là un expédient.

M. Svante Arrhénius dans diverses publications a traité cette question et levé complètement les difficultés à l'aide d'une théorie qui lui est propre : celle de la dissociation des électrolytes. La formule des gaz (A) est applicable aux vapeurs stables ; mais depuis longtemps on a constaté qu'il y a des vapeurs, telles que le chlorhydrate d'ammoniaque, l'iode, etc..., pour lesquelles la densité ne correspond pas à la formule établie par voie chimique. On trouvait à ces corps des densités de vapeur anormales. Ces faits ont été expliqués depuis longtemps déjà par la *dissociation* qui transforme aux températures élevées AzH^3 , HCl en $AzH^3 + HCl$, I^2 en $I + I$ etc.

Les solutions obéissent, comme on l'a vu, aux lois des gaz, leurs anomalies, d'après M. Arrhénius, doivent être aussi celles que les gaz subissent ; dès lors les sels dont la pression osmotique ne conduit pas à la constante 84700 sont *dissociés*. Tout le monde se souvient de l'interprétation classique de l'électrolyse par Grothus. Pendant que le courant passe dans une solution conductrice, une sorte de permutation par glissement se fait (fig. 2), qui conduit à chaque pôle ces fractions particulières de



Fig. 2.

molécules salines que l'électricité sépare et que Faraday a nommé des *ions*.

(1) *Zeitschrift für physikalische Chemie*, 1887-1889. *Lumière électrique*, 1889.

Le métal va au pôle négatif (—) : c'est un *ion* positif; le reste de la formule, quel qu'il soit, stable ou non, se rend au pôle positif (+); c'est, d'après la règle des attractions et des répulsions électriques, l'*ion* négatif.

Dans cette manière de voir il faut un certain effort ou force électromotrice pour accomplir la séparation. Pourtant on sait que, déduction faite de la résistance d'un liquide, entre électrodes de même métal que le sel dissous, la moindre force électromotrice suffit pour transporter un corps simple. M. Arrhénius, complétant une hypothèse de Clausius, admet que dans une solution saline étendue les sels sont *naturellement dissociés en leurs ions*. Le moindre courant qui traverse le liquide suffit pour capter les *ions libres* qui passent auprès du fil conducteur : ce n'est pas un travail de décomposition, mais d'ordination. Selon cet auteur, et contrairement à ce que les chimistes ont toujours admis, dans une solution *étendue*, de KCl, par exemple, il n'y pas de molécules de KCl, mais un nombre égal d'ions, de K et de Cl doués de charges électriques contraires et se mouvant en tous sens comme les molécules des gaz.

Mais suivant la pensée de l'auteur, il ne faut pas se représenter ces ions, *chargés, actifs*, comme des particules très petites des éléments K et Cl que nous connaissons à l'état isolé et qui ne sont sans doute que des agrégats très condensés des ions électrolytiques. Ce sont ces *ions libres* qui trans-

portent l'électricité et qui possèdent l'activité chimique.

Telle est donc la constitution d'une solution *très étendue* de sel : pour une dilution extrême, à la limite, tous les ions seraient libres. Cette solution est comparable à un gaz parfait. Mais, si elle devient de moins en moins étendue, une partie des ions se combine de nouveau et on a des liquides mixtes contenant un nombre de plus en plus grand de molécules combinées KCl, $\text{SO}^1 \text{K}^2$, $\text{AzO}^3 \text{Na}$... Ces solutions seront dans la situation de vapeurs présentant une densité variable avec la température, elles seront en voie de *dissociation en ions* présentant pour chaque concentration, et, à concentration moléculaire égale, pour chaque espèce de sels, un *coefficient de dissociation* particulier qu'on sait déterminer maintenant et qui n'est autre chose que *i* de la formule (D).

Nos idées sur la nature intime des solutions viennent, comme il est aisé de le constater, de faire un grand progrès : elles sont sorties de la phase des hypothèses sans contrôle; on peut les soumettre au calcul. Sur ce point on a encore beaucoup à apprendre; mais on a déjà, pour étudier les solutions étendues, des faits et des formules solides; il y a beaucoup à en espérer, car leur étude est désormais reliée à la physique générale.

A. Etard.

Répétiteur à l'Ecole Polytechnique.

NOUVELLE THÉORIE DU MÉCANISME DES SENSATIONS LUMINEUSES

La lumière est un phénomène subjectif. Sa cause externe consiste dans le mouvement d'un fluide dont les ondulations se mesurent en millions de millimètres et dont la durée s'évalue en trillions de seconde.

Comment ces infimes ondulations de l'éther peuvent-elles agir sur nos centres nerveux? Un intermédiaire, collecteur spécial des vibrations externes, est nécessaire; c'est l'organe du sens de la vision; sa délicatesse doit être exquise, puisqu'il vibre sous l'influence de mouvements d'une extrême exigüité.

Très compliqué chez les animaux supérieurs, ce transformateur des vibrations éthérées prend parfois une structure très simple dans les espèces qui occupent les degrés inférieurs de l'échelle zoologique. Chez certains êtres, l'œil n'est plus représenté que par une simple tache noirâtre, qui se distingue à peine du reste du tégument. Mais cette « tache pigmentaire, » dernier vestige de l'œil, correspond à la partie sensible de notre rétine.

Ce qui dégénère surtout, chez l'invertébré, ce sont les parties accessoires, comme celles qui, dans l'œil humain, concourent à l'accommodation et à la formation des images nettes sur l'écran sensible. Aussi, chez beaucoup de ces animaux, la vision reste-t-elle confuse, au point qu'une guêpe peut se ruer sur la tête d'un clou, croyant frapper une mouche de son aiguillon.

Mais les propriétés visuelles fondamentales persistent, alors même que déjà l'organe oculaire a subi de profondes dégradations. Paul Bert a le premier démontré que certains crustacés (les Daphnies) savent apprécier les différences d'éclairage et distinguer les couleurs. Les Daphnies ne constituent pas une exception. Nos expériences sur le *Pyrophorus noctilucus* et celles de Lubbock et de Graber ne sauraient laisser aucun doute à ce sujet.

Bien plus, des animaux dépourvus d'yeux, tels que les larves de certains insectes, les myriapodes aveugles, les vers de terre sentent réellement les différences de clarté et peut-être même les couleurs.

Des observations analogues ont été faites sur des vertébrés (Grenouilles, Caméléons, Tritons) et ont conduit à penser que la peau est impressionnable par la lumière. Nos recherches sur les Protées et sur les Pholades mettent hors de conteste l'influence de cette fonction particulière du tégument, que nous appellerons *vision dermatoptique*.

D'ailleurs n'était-il pas théoriquement vraisemblable que la peau pût jouir parfois de propriétés analogues à celles de notre œil? L'embryologie ne nous fait-elle pas connaître *ab ovo* l'évolution de cet organe et ne nous apprend-elle pas que notre rétine n'est qu'un retour, vers l'extérieur, de l'épiderme en partie englobé par l'embryon pour former le système nerveux?

C'est de l'épiderme que vient toute sensibilité, et cela se conçoit, car ce sont les parties les plus extérieures qui, les premières, doivent acquérir la propriété de réagir sous l'influence des excitants du milieu ambiant.

En définitive, l'œil, réduit à ce qu'il a de fondamental, doit donc présenter chez le vertébré, comme chez l'invertébré, de grandes analogies avec le tégument; dès lors, on peut supposer que le nécessaire de la vision, c'est-à-dire la sensation de clarté et de couleur, si merveilleuse qu'elle soit et si mystérieuse encore, peut être plus simple qu'on ne le suppose généralement.

I

On comprendra maintenant l'importance considérable que l'on doit attacher à l'étude d'un organe tel que l'œil, réduit à son état primitif, originel, tégumentaire, chez un animal adulte, non seulement capable de voir par la peau, mais encore d'écrire lui-même ses impressions chromatiques ou lumineuses.



Fig. 1.

Cette bête singulière est la Pholade dactyle (fig. 1), mollusque marin que l'on rencontre sur divers points de nos côtes, sur les rivages de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée. Sa coquille très fragile, gracieusement échancrée, laisse à nu une partie du corps. Élégalement ouvragée, cette frêle cuirasse semble plutôt une coquette parure destinée à soutenir les organes, qu'un moyen de défense. Aussi, la Pholade, qui craint fort le crabe et d'autres redoutables carnassiers marins, vit-elle en recluse, murée dans des trous profonds creusés dans le roc ou dans l'argile et d'où elle ne

peut plus sortir dès qu'elle y a grandi. Elle ne liyre aux hasards du dehors qu'une partie de son manteau, c'est-à-dire de sa peau transformée en un long tube flexible et contractile (S, fig. 1) creusé de deux canaux adossés l'un à l'autre comme les canons d'un fusil de chasse. Cette sorte de trompe, c'est le *siphon* : il sert à introduire dans les branchies et les organes digestifs l'eau et les animalcules qu'elle contient par l'une de ses ouvertures; et à rejeter par l'autre l'eau qui a servi à la respiration et les déchets de la nutrition. L'orifice d'entrée est garni d'une élégante couronne de tentacules ramifiés comme les branches d'un corail, petits appareils tactiles d'une sensibilité extrême. Quand on les excite, ils ferment l'ouverture du siphon en ramenant leurs extrémités libres vers le centre de celle-ci, et l'animal prévenu rétracte brusquement son siphon en lançant une véritable trombe d'eau sur l'agresseur.

Mais ce n'est pas seulement par le tact que l'innofensif animal est averti du danger ou renseigné sur les phénomènes extérieurs qui l'intéressent.

Il voit, imparfaitement il est vrai, mais il voit par toute la surface du siphon, seule partie de l'animal qui puisse sortir de sa prison pour veiller sur ce qui se passe au dehors.

Si l'on place des Pholades arrachées de leur demeure dans un grand vase rempli d'eau de mer, on ne tarde pas à les voir allonger considérablement ce siphon.

Elles restent ainsi, pendant de longues heures, paresseusement étendues, aspirant et rejetant l'eau qui sert à la respiration et à la nutrition.

Leur attitude reste la même pendant le jour et pendant la nuit, à la lumière comme à l'obscurité. Mais, vient-on à modifier subitement les conditions d'éclairage, aussitôt le siphon se rétracte brusquement, comme si l'on touchait les organes tactiles dont nous avons parlé. Il suffit de peu de chose : un mouvement rapide de la main interceptant pendant un court instant la lumière incidente, un nuage de fumée qui passe, une allumette éclatant dans l'obscurité, sont autant de causes suffisantes pour produire cette contraction.

Cette sensibilité à la lumière n'est pas répandue seulement à la surface du siphon, mais encore sur toutes les parties du tégument, qui ne sont pas recouvertes par la coquille : on la constate jusque sur la paroi interne des canaux du siphon : mais elle est surtout marquée dans les points les plus fortement colorés en brun par le pigment, comme le bout qui porte les tentacules.

Dans toutes les régions excitables par la lumière, on ne rencontre aucun point du tégument assez différencié pour être comparé, par exemple, à l'œil d'un pecten, et c'est à tort que l'on avait autrefois

signalé la présence d'organes oculaires à la base des tentacules.

Toutefois, sur le siphon, mais là seulement, la surface tégumentaire n'est pas uniforme; elle est comme chagrinée et présente de nombreuses saillies ou élevures en forme de papilles, disposées en séries annulaires très rapprochées les unes des autres.

La plupart, à l'état frais, sont légèrement étran-glées à leur base d'insertion. Leur bord libre, aminci, ondulé et comme trifolié est tourné vers le bout du siphon et paraît plus pigmenté que les sillons qui séparent les papilles. Quand le siphon se contracte, ces reliefs papilliformes s'imbriquent comme les tuiles d'un toit, ou mieux encore, comme les écailles d'un cône de pin.

Ces reliefs du tégument, en recueillant des radiations dont l'incidence n'est pas normale à la paroi du siphon, servent sans doute à la vision dermatoptique, mais on ne peut les considérer comme des yeux, puisque d'autres parties du manteau, qui en sont dépourvues, présentent la sensibilité à la lumière. D'autre part, l'examen microscopique de leur structure nous montrera bientôt qu'ils sont construits avec les mêmes éléments que le reste de la peau. Celle-ci représentera donc l'écran sensible, la rétine de notre œil, mais il ne pourra se former à sa surface aucune image nette, et la lumière réfléchie par les corps opaques ne sera pas concentrée par le merveilleux appareil optique, qui donne à notre vue sa grande perfection. Aussi la Pholade peut-elle dans certains cas être surprise par l'approche d'un ennemi qu'elle n'a pu voir.

Si l'on place un de nos mollusques bien sensible dans une cuvette de verre à fond plat, suspendue au-dessus d'un fond noir, dans un endroit bien éclairé, on provoquera une contraction toutes les fois qu'entre la source lumineuse et l'animal on fera passer un corps quelconque, par exemple un pain à cacheter tenu au bout d'une aiguille. Mais la Pholade restera indifférente si vous promenez ce même petit signal, fût-il blanc et bien éclairé, entre le fond noir et la face inférieure non éclairée du mollusque. On observe le même phénomène dans certaines altérations des milieux réfringents de notre œil : le malade peut distinguer encore ses doigts quand il les interpose entre l'œil et la lumière d'une fenêtre, alors qu'il ne peut en saisir ni les contours ni les mouvements dans toute autre condition.

Pourtant la sensibilité dermatoptique est considérable, car il suffit, avec l'éclairage direct, d'une faible modification de l'intensité pour obtenir un effet très net. Nous avons dit plus haut que le passage d'un simple nuage de fumée de tabac pouvait provoquer une contraction. Il en sera de

même lorsque l'on interposera un verre dépoli, même très clair, entre une Pholade et la lumière du jour pénétrant par une fenêtre. Inversement si, après avoir laissé l'animal étendre son siphon derrière la glace, on enlève celle-ci brusquement, il se produit un mouvement de rétraction.

C'est bien la lumière, dans ces diverses expériences, qui est le véritable excitant, car on ne peut admettre que le passage d'un pain à cacheter ou l'interposition d'un verre dépoli au-dessus d'un animal plongé dans l'eau de mer et éclairé par la lumière diffuse du jour modifie assez son état thermique pour provoquer de semblables effets.

D'ailleurs, si dans l'obscurité on approche de la surface de l'eau un ballon de verre enduit de noir de fumée et rempli d'eau bouillante, aucun mouvement ne se produit, tandis que la lueur d'une allumette à un mètre de distance fait éclater la contraction. De plus, nous verrons bientôt que les radiations infra-rouges et ultra-violettes du spectre solaire et du spectre électrique sont sans action sur la sensibilité de la peau de la Pholade.

Analysons maintenant les phénomènes extérieurs par lesquels la Pholade nous révèle la sensation lumineuse qu'elle a ressentie. Lorsque l'on touche au moyen d'une aiguille la surface du siphon, en quelque point que ce soit, on remarque d'abord deux sortes de mouvements bien distincts. Si la pression a été légère, il se fait au point touché une dépression du tégument, qui va en s'irradiant autour de ce point, de façon à déterminer un enfoncement bien circonscrit, dû évidemment à la mise en jeu d'éléments contractiles superficiels. L'excitation a-t-elle été portée sur plusieurs points assez rapprochés, situés suivant l'axe longitudinal et d'un seul côté, la contraction superficielle peut alors être assez prononcée et assez étendue pour imprimer au siphon tout entier une direction curviligne à concavité tournée vers le point excité. Si les excitations mécaniques ont été portées suivant la circonférence du siphon, c'est un étranglement annulaire qui se produit. L'expérience démontre donc déjà, à la superficie du siphon, l'existence d'éléments contractiles longitudinaux et annulaires que l'on peut faire contracter isolément.

Mais, si au lieu de toucher légèrement le siphon, on l'excite plus fortement, la contraction locale superficielle est bientôt suivie d'une rétraction brusque, totale, violente de tout l'organe, bien différente de celle que l'on observait dans les cas précédents. Au lieu d'une aiguille, on peut prendre pour excitateur un fin pinceau lumineux et on obtient les mêmes résultats.

Si le siphon est éclairé d'un côté seulement, il s'incurve lentement vers le foyer de lumière et l'on provoque ainsi un véritable *héliotropisme animal*. A

ce moment, si l'on rapproche brusquement le foyer lumineux, aussitôt le siphon se redresse tout entier par une brusque contraction totale.

Il n'est donc pas douteux que, dans ces expériences, deux systèmes contractiles différents sont successivement entrés en action sous l'influence d'un accroissement d'éclairage.

II

Structure du siphon. — L'étude microscopique de la structure du siphon apporte une nouvelle preuve de l'existence et de l'indépendance de ces deux systèmes contractiles. Elle fait aussi connaître la nature des éléments qui les composent.

Sur une coupe transversale de la partie moyenne de la moitié du siphon, d'une épaisseur d'un centième de millimètre, on distingue la section du canal expirateur de la cloison et de la paroi extérieure (fig. 2). Laissons de côté la description détaillée



Fig. 2. — Coupe microscopique transversale de la moitié du siphon comprenant le canal expirateur. (Microphotographie)

lée de cette coupe, pour ne considérer qu'un segment de la paroi extérieure de l'un des canaux (fig. 3), cette paroi étant identique à elle-même dans tous les autres points.

De dehors en dedans nous rencontrons :

1° Une couche externe divisée en deux zones : la zone superficielle (a) est formée de cellules de l'épiderme remplies de fines granulations brun noirâtre (*cellules épithéliales pigmentées*) présentant sur toute la surface la même forme générale et les mêmes caractères. Cette zone est extérieurement protégée par une cuticule transparente. La zone profonde (b) de la couche externe est formée de fibres lisses longitudinales et transversales de nature musculaire (Voyez fig. 5).

2° Une couche neuro-conjonctive (c) renfermant des cellules nerveuses formant entre elles un plexus dont les mailles sont soutenues par des éléments conjonctifs.

REVUE GÉNÉRALE, 1890.

3° Une mince couche (d) de petits faisceaux longitudinaux de fibres musculaires.




Fig. 3. (Microphotographie)

4° Une couche (f) de fibres musculaires circulaires plus fines, identiques à celles de la zone (b) de la couche externe.

5° Une rangée de petits faisceaux longitudinaux de fibres musculaires.

6° Les grands faisceaux musculaires longitudinaux (g et h).

Si l'on pénètre plus profondément dans l'épaisseur de la paroi, on rencontre les mêmes couches, mais en ordre inverse; seulement la face interne du siphon est revêtue de cils vibratiles.

Les fibres superficielles (b) de la couche externe



Fig. 4. (Microphotographie)

sont bien de nature musculaire et contractile, car leurs caractères sont identiques à ceux de la 4° zone

qui seule est susceptible de produire les ébranlements du siphon dont nous avons parlé. On ne pourrait d'ailleurs sans admettre la nature musculaire des éléments de la couche (b) expliquer les dépressions localisées et l'héliotropisme dont il est question plus haut.

Si l'on examine, à un plus fort grossissement, (fig. 4 et 6) les saillies papilliformes, on peut reconnaître que leur structure ne diffère pas sensiblement de celle du reste du tégument.



Fig. 5. — (Microphotographie).

Les cellules épidermiques pigmentées sont accolées les unes aux autres et ne présentent dans leur



Fig. 6. — Coupe oblique des papilles (Microphotographie).

forme aucune différence fondamentale. Mais ce qu'il importe de constater, c'est que leur terminaison

interne, au lieu de former une membrane basale homogène, se continue directement avec les fibres musculaires transversales et longitudinales de la zone musculaire sous-jacente.

Les fibrilles de cette zone vont se jeter en partie dans la 4^e couche après avoir traversé la couche neuro-conjonctive et en partie aussi dans celle-ci. Enfin de grandes travées de fibres conjonctives de soutènement se dirigent en rayonnant d'une face à l'autre de la paroi du siphon où elles se terminent en bouquet. Dans l'épaisseur du siphon, elles concourent à former les gaines des muscles longitudinaux : c'est le squelette, la charpente fibreuse et élastique du siphon.

Mécanisme de la contraction du siphon. — Ces quelques données anatomiques et les observations physiologiques préliminaires, que nous connaissons, nous permettent de comprendre maintenant pourquoi nous avons vu se produire selon les circonstances deux contractions distinctes, l'une qui peut être localisée et l'autre qui est caractérisée par un mouvement d'ensemble du siphon.

Lorsque la lumière exerce son action sur les éléments épithéliaux pigmentés, elle y détermine des modifications qui ont pour effet de provoquer la contraction des fibres contractiles avec lesquelles elles se continuent. Les éléments nerveux de la couche neuro-conjonctive sont ébranlés. Cet ébranlement nerveux est communiqué aux ganglions situés à la base du siphon ; de ceux-ci part l'excitation réflexe qui met en mouvement les grands muscles longitudinaux.

En somme les choses se passent comme si l'on touchait mécaniquement l'épiderme. L'excitation mécanique que remplace par l'influence lumineuse, qui peut également faire jouer l'amorce, c'est-à-dire la cellule épithéliale. Celle-ci provoque dans la fibre musculaire qui la continue l'explosion du potentiel accumulé pendant le repos. La fibre musculaire ébranle à son tour le système nerveux.

Ce mécanisme est bien différent de celui que l'on a admis jusqu'à présent pour expliquer les sensations, puisque le système nerveux n'est influencé que très secondairement et mécaniquement. La vision dermatoptique se produit donc ici par un véritable phénomène mécanique tactile se passant dans l'intérieur même du tégument.

Dans cette comparaison de la sensation lumineuse avec un phénomène tactile rien ne peut choquer nos idées, puisque l'on sait qu'il suffit d'exercer sur notre œil une légère pression pour provoquer un phosphène brillant, dans l'obscurité la plus complète.

Sous ce rapport encore la peau de la Pholade peut se comparer à notre rétine ; aussi donnerons-nous à ses couches superficielles le nom de *rétine dermatoptique*.

Celle-ci renferme les éléments dermatoptiques composés des trois segments: épithelial, musculaire et neural. Les deux premiers forment le système avertisseur.

III

Analyse physiologique expérimentale. — L'analyse physiologique va nous permettre maintenant d'appuyer sur de nombreuses preuves expérimentales notre nouvelle théorie du mécanisme de la vision. Mais, avant de produire les documents graphiques fournis par l'animal écrivant lui-même ses propres impressions, voyons rapidement comment on doit disposer l'expérience.

La Pholade en expérience est fixée sur une planchette par son extrémité inférieure. Ce support est immergé avec l'animal dans une cuvette pleine d'eau de mer à faces parallèles, de manière que l'extrémité du siphon soit dirigée vers la surface du liquide. L'extrémité libre du siphon est reliée au stylet d'un tambour récepteur de Marey (T. fig. 7) qui transmettra à un tambour enregistreur semblable les moindres mouvements de cet organe. Ce second tambour (S) est muni d'un stylet qui inscrit tous les mouvements transmis par le tambour récepteur sur un cylindre (cy) revêtu d'un papier enduit de noir de fumée.




Fig. 7. — Appareil enregistreur des mouvements provoqués par l'action de la lumière sur le siphon de la Pholade. — B, chambre noire; E, pile; M, métrologue; S, tambour de Marey; T, tambour récepteur; O, obturateur; f, fil; ch, cheminée; cy, cylindre; cl, cloison; c₂, cylindre enregistreur; o, orifice de la chambre noire.

La cuve de verre contenant l'animal est enfermée dans une petite chambre noire (B) percée seulement d'une fenêtre et d'un petit orifice supérieur (o) pour laisser passer le fil (f) qui rattache le bout du siphon au stylet du tambour récepteur (T).

La petite fenêtre s'ouvre juste en face du siphon, dont on veut explorer la sensibilité à la lumière. Elle peut être ouverte ou fermée pendant un temps plus ou moins long au moyen d'un obturateur.

Celui-ci est construit de telle sorte qu'au moment précis où la fenêtre s'ouvre, un circuit électrique, dans lequel est interposé un signal (S) et un métrologue (M), se trouve fermé. Pendant tout le temps que la fenêtre reste ouverte le signal inscrit, en fractions de seconde, le temps précis

pendant lequel la lumière tombe sur le siphon.

Une petite cheminée en tôle (ch) munie d'un bec de gaz à régulateur permet de donner à la chambre noire la température voulue.

Les expériences se font dans une pièce obscure où l'éclairage du siphon peut être fourni, soit par le soleil au moyen d'un héliostat, soit par la lumière électrique, soit enfin par une lampe à gaz munie d'un régulateur. Cette lampe, dont l'intensité doit être réglée une fois pour toutes, peut glisser sur une longue planchette graduée placée devant la fenêtre. Ce dispositif est très avantageux pour la détermination de l'influence des excitations par des intensités lumineuses différentes.

Devant la petite fenêtre on peut disposer soit des cuves à faces parallèles, renfermant des solutions colorées ou athermanes, soit des verres colorés, des prismes, etc. (1).

L'expérience étant ainsi disposée, la Pholade va pouvoir écrire elle-même les impressions qu'elle éprouve sous l'influence de l'excitation lumineuse. Bien plus, si ce que nous avons dit de l'autonomie du système avertisseur est exact, le siphon seul, détaché du corps de l'animal et séparé par conséquent des ganglions situés à la racine des canaux, pourra se contracter et cette contraction dissociée pourra être inscrite sur le cylindre de l'appareil enregistreur.

En effet, si après avoir laissé un siphon sectionné à sa base reposer pendant un temps suffisant à l'obscurité, on l'excite par la lumière, il se contracte encore et l'on peut répéter l'expérience un grand nombre de fois, pendant plusieurs jours consécutifs, quand on s'est placé dans des conditions favorables.

Pour faire écrire ce lambeau de manteau détaché du corps de l'animal, il suffira de le fixer avec une épingle par son extrémité inférieure sur la planchette immergée dans la cuve à faces parallèles et d'accrocher avec un hameçon son extrémité terminale au fil du tambour récepteur.

C'est ainsi qu'avec un éclairage d'une durée de 2 secondes, fourni par une lampe de 10 bougies, placée à 0°60 de l'obturateur, nous avons obtenu le tracé de la figure 8. Cette courbe (2) montre que




Fig. 8.

le raccourcissement du siphon isolé est le résultat d'une contraction unique, régulière, lente, progressive comme celle que l'on provoque par une légère excitation localisée de sa surface sur une Pholade entière. Elle est bien manifestement produite par la seule contraction du système avertisseur. Est-ce à dire pour cela que les grands muscles longitudinaux, qui permettent à l'animal entier de grands mouvements volontaires, ont perdu toute contracti-

bilité? En aucune façon, et il est facile de démontrer que cette propriété est restée intacte. Ce qui manque, c'est l'excitation motrice ou réflexe, dont le point de départ est dans les ganglions restés dans le tronc de la Pholade.

Prenons un autre siphon détaché et excitons-le d'abord par la lumière, nous obtenons un tracé en tout semblable au précédent par ses caractéristiques.

Remplaçons maintenant l'excitation réflexe absente par une courte excitation galvanique, sans faire intervenir la lumière, nous obtenons une courbe (fig. 9) absolument différente de la première. Cette fois le retrait du siphon s'est mani-




Fig. 9.

festement produit en deux temps, il y a eu deux contractions successives : la première brusque, énergique, est celle des muscles longitudinaux centraux ; la seconde superposée à celle-ci est au contraire plus faible, plus lente, régulièrement progressive : c'est celle du système avertisseur.

Bien plus, si l'on fatigue une Pholade entière dans l'obscurité par des décharges électriques successives, le pouvoir réflexe du ganglion nerveux et la contractilité des grands muscles centraux s'épuise : on n'obtient plus alors, malgré l'intégrité anatomique de l'animal, par l'excitation lumineuse même intense, que la contraction du système avertisseur, qui se fatigue moins vite dans ces conditions. Inversement, si l'on excite par l'électricité un siphon détaché et exposé à la lumière, on obtient une contraction unique, celle des grands muscles longitudinaux, le système avertisseur étant contracté d'avance ou épuisé par l'action prolongée de la lumière (fig. 10). Si maintenant,



Fig. 10.

au lieu d'un siphon détaché, on excite par la lumière une Pholade entière, on pourra obtenir, au lieu d'une contraction unique, deux contractions successives nettement accusées dans les tracés des figures 11 et 12. Mais, on remarquera immédiatement que, à l'inverse de ce que nous observons dans le tracé de la figure 9, la double contraction commence par celle du système avertisseur, dont nous avons indiqué plus haut les caractères.

(1) Pour les éclairages de très courte durée, nous nous sommes servi avec avantage de l'ingénieux obturateur imaginé par M. Chavanon.

(2) Pour l'interprétation exacte des renseignements fournis par la méthode graphique, il est important de savoir que la grandeur des aires circonscrites par les courbes varie avec la taille de l'animal, la longueur du siphon, sa vigueur personnelle. La personnalité de ce mollusque ne s'accuse que par la quantité de travail, mais non par la nature de ce travail.

Ces faits expérimentaux démontrent de la manière la plus nette le mécanisme fonctionnel des mou-



Fig. 11.

vements produits par l'excitation lumineuse, dont nous avons donné déjà l'explication, en nous basant




Fig. 12.

sur l'observation anatomique et physiologique.

Il est donc bien établi que non seulement la Pholade voit sans yeux, mais qu'elle peut encore écrire ses impressions visuelles. On est frappé, en outre, de l'analogie existant entre le mécanisme qui produit la contraction réflexe du siphon et celui qui préside à la contraction de l'iris, quand un rayon lumineux vient frapper notre rétine.

Mais on peut encore pousser plus loin la comparaison en recherchant jusqu'à quel point la sensibilité de la peau d'un mollusque peut se rapprocher de celle de notre rétine.

IV

Malgré son état d'imperfection, la Pholade peut-elle, comme nous, saisir le passage d'un éclair? Quelle est la durée minima nécessaire pour provoquer chez elle une sensation lumineuse? Peut-elle comme nous distinguer de faibles clartés? Sait-elle percevoir les intensités diverses d'une lumière qui s'éloigne ou se rapproche et mesurer la valeur de ces intensités? Enfin cet aveugle, cet être sans yeux véritables, peut-il discerner les couleurs? Voit-il les mêmes nuances que nous? Leur spectre visible est-il plus restreint ou plus étendu que le nôtre? Est-il, comme pour nous, continu, passant sans transition sensible d'une teinte à une autre? C'est encore la pholade qui va répondre en écrivant ce qu'elle ressent (1).

Durée de l'éclairage. — Un éclairage instantané peut-il impressionner la Pholade? D'un grand nombre d'expériences faites avec l'ingénieux

obturateur de M. Chavanon on peut conclure que, dans de bonnes conditions, avec une lampe de dix bougies, placée à 0°30, la durée minima de clarté sensible n'excède pas $\frac{2}{100}$ de seconde. Mais, à cette limite inférieure, il est très probable que la sensation provoquée dans la rétine dermatoptique n'est pas perçue par les centres nerveux ganglionnaires de la Pholade, car on observe seulement la contraction du système avertisseur.

Parfois cependant, cette contraction de l'avertisseur peut-être, au bout d'un temps prolongé, suivie de la contraction réflexe des grands muscles longitudinaux. Celle-ci est alors remarquable par sa brusquerie, son instantanéité, qui la fait ressembler absolument à la détente d'un ressort (fig. 13 et 13 bis).






Fig. 13.

Fig. 13 bis. — (Continuation de la figure précédente).

Les figures 14 et 15 montrent, en outre, que l'animal pourra apprécier la durée de l'éclairage puisque déjà, avec un écart de $\frac{1}{100}$ de seconde,

Fig. 14 ($\frac{2}{100}$ me).

on obtient une différence dans l'amplitude de la contraction et dans la durée de la période latente, pour le système avertisseur.

Fig. 15 ($\frac{3}{100}$ me).

Intensités. — La lampe de dix bougies étant placée à une distance (d) de 0.60 centimètres, par exemple, de l'obturateur, si l'on fait deux excitations lumineuses, d'une même durée de 2 secondes, à une heure d'intervalle, on aura deux tracés identiques (siphon isolé). Mais, si on éloigne de plus en plus la lampe, on voit peu à peu aug-

(1) A la température de 15° la Pholade possède une sensibilité et une résistance suffisantes pour se prêter, en été, à toutes les opérations. Il faut avoir soin dans les expériences comparatives de laisser entre chaque essai un repos d'au moins 15 minutes.

menter la durée de la période latente et diminuer l'amplitude de la courbe (fig. 16, 17, 18, 19). Pour




Fig. 16 ($d = 0^m, 70$).

éviter les perturbations produites par la fatigue dans les expériences en séries, il est préférable de




Fig. 17 ($d = 0^m, 80$).

placer alternativement la lampe à 100 centimètres et à 40 centimètres. Dans ces conditions, nous avons




Fig. 18 ($d = 6^m, 90$).

trouvé que lorsque l'éclairage devenait 100 fois plus faible, l'amplitude de la courbe devenait dix fois




Fig. 19 ($d = 4^m, 00$).

moindre et la durée de la période latente environ deux fois plus longue.

Minimum d'intensité perceptible. — On trouve, en éloignant la lampe jusqu'à ce que la lumière ne donne plus qu'une contraction imperceptible, que la lueur la plus faible, capable de provoquer une sensation, est égale à $1/400^{me}$ de bougie.

La Pholade peut donc, comme nous, distinguer de faibles clartés et apprécier avec une grande précision la valeur des intensités lumineuses.

V

Vision dermatoptique des couleurs. — Si l'on fait tomber sur l'ouverture de l'obturateur successivement les différentes zones du spectre solaire ou du spectre électrique, on constate que l'on peut provoquer des contractions du siphon isolé ou de la Pholade entière par toutes les radiations colorées que notre œil peut voir. La Pholade voit donc les mêmes couleurs que nous.

Comme nous, elle est insensible aux radiations ultra-violettes et infra-rouges, ce qui démontre que les contractions observées ne sont dues ni à des radiations chimiques, ni à des radiations calorifiques. On peut encore s'assurer que ces dernières n'ont aucune influence sur les phénomènes en question en interposant sur le trajet des radiations lumineuses actives une cuve remplie d'une solution d'alun concentrée. On obtiendra, avec la même radiation, avant et après l'interposition de la solution athermane, la même courbe. Au contraire, le plus léger déplacement du prisme, lorsque la Pholade est éclairée par des radiations franchement vertes, par exemple, suffira pour provoquer une contraction dans le jaune-vert. *Notre mollusque voit donc bien les couleurs, puisqu'il sait distinguer jusqu'aux nuances.*

S'agit-il ici d'une différence d'intensité lumi-




Fig. 20 (jaune).

neuse ou d'une véritable sensation chromatique? En étudiant les caractères des figures 20, 21, 22,




Fig. 21 (vert).

23, 24 obtenus avec une même source lumineuse et des verres colorés de différente nature, au




Fig. 22 (bleu).

moyen d'un siphon isolé, si on ne tient compte que de l'amplitude et de la durée de la période

latente, on peut être tenté de croire que l'intensité lumineuse seule entre en jeu. Mais on remarque




Fig. 23 (violet).

immédiatement que la forme de ces contractions n'est pas la même que celle des tracés 14 à 18.




Fig. 24 (rouge).

Avec les radiations colorées, la différence caractéristique porte sur la rapidité de la contraction, qui diminue progressivement du jaune au rouge. Ce simple changement dans le jeu du système avertisseur suffit pour modifier profondément le phénomène réflexe, qui prend naissance dans les ganglions sensoriels de la Pholade entière et aussi la contraction des muscles centraux qui nous en révèle l'existence. Pour chaque radiation colorée, la Pholade entière donne une courbe caractéristique résultant de l'action combinée du système avertisseur et du système moteur central du siphon. Dans les courbes qui expriment la sensation du jaune, du vert, du bleu (25, 26, 27, 28, 29)




Fig. 25 (jaune).

la contraction de l'avertisseur se confond presque avec la contraction réflexe qui la suit de très




Fig. 26 (vert).

près, sauf avec les radiations rouges. Il est possible aussi qu'une radiation, comme celle du violet, ne provoque que le mouvement du système avertisseur : dans ce cas, il y a sensation, mais non perception.

Des expériences que nous venons de rapporter il résulte que la notion d'intensité est fonction,




Fig. 27 (bleu).

pour un même individu, de l'amplitude du mouvement de l'avertisseur et que la sensation de




Fig. 28 (violet).

couleur est déterminée surtout par la rapidité de ce mouvement, comme dans l'audition la hauteur




Fig. 29 (rouge).

d'un son est fonction de la rapidité des vibrations sonores et son intensité de l'amplitude de celles-ci.

VI

L'ensemble de tous ces faits fournis par l'observation et l'expérimentation prouve que les propriétés physiologiques de la peau de notre mollusque se rapprochent singulièrement de celles de l'œil humain. La comparaison peut être poussée plus loin encore.

Déjà dans l'œil de certains invertébrés, les éléments fondamentaux de la vision présentent une grande analogie de structure avec les éléments dermatoptiques de la peau du siphon de la Pholade. Dans une coupe microscopique de l'œil de l'écrevisse on rencontre (fig. 30) de dehors en dedans : 1° une couche transparente et réfringente, qui représente la cuticule de la couche externe de notre rétine dermatoptique ; 2° une couche formée de cellules à pigment, en continuité avec des fuseaux striés qui vont se jeter dans une agglomération d'éléments nerveux formant le ganglion optique. Cette disposition rappelle de tous points les trois parties constituant l'élément dermatoptique situées au-dessous de la cuticule : le

segment épithélial pigmentaire, le segment musculaire, le segment neural.




Fig. 30.

Fig. 30. — Coupe de l'œil de l'écrevisse fortement grossi (d'après Huxley). — *a*, cornée; *b*, zone sombre externe; *c*, zone blanche externe; *d*, zone sombre moyenne; *e*, zone blanche interne; *f*, zone sombre interne; *cr*, cônes cristallins; *g*, ganglion optique; *sp*, fuseaux striés.

Bien plus, la striation des fuseaux de l'œil de l'écrevisse, qui sont actuellement considérés comme les homologues des cônes et des bâtonnets de notre rétine, est un caractère morphologique très général de ces éléments constitutifs de notre rétine. Ce caractère important permet de les comparer aux fibres musculaires et cette interprétation anatomique est d'autant mieux justifiée que Engelmann et Von Deren Strort ont démontré que les cônes et les bâtonnets sont contractiles. Pour établir une homologie morphologique complète entre la peau de notre mollusque et la rétine d'un vertébré, il était nécessaire de démontrer que dans celle-ci, comme dans l'œil de l'écrevisse, il y a continuité entre le segment pigmentaire et les bâtonnets optiques. Or, c'est précisément ce qui ressort nettement des recherches histologiques que nous avons récemment entreprises avec M. Renaut sur les rapports des franges pigmentaires et des bâtonnets dans la rétine du caméléon et de la lamproie (fig. 31, 32).

L'anatomie et la physiologie comparée concordent donc pour établir que notre théorie de la vision dermatoptique peut s'appliquer au mécanisme de la vision chez l'homme, dont on n'avait pu jusqu'à présent donner aucune explication satisfaisante.

La vision est ainsi réduite à un phénomène tactile et nous montrerons plus tard que ce mécanisme sensoriel est très général.

Grâce à la physiologie comparée, cette science

née d'hier, on pourra appliquer à d'autres sens qu'au goût cette conception philosophique formu-



Fig. 31. — Coupe microscopique de la rétine du Caméléon, montrant la continuité des cônes (*cn*) et des franges pigmentaires (*fp*) (Microphotographie).

lée au XII^e siècle par saint Thomas d'Aquin : *Ergo non debet poni alter sensus præter tactum*. Mais, il




Fig. 32. — Coupe microscopique de la rétine d'une Lamproie, montrant la continuité des cônes (*cn*) et des franges pigmentaires (*fp*) (Microphotographie).

n'aura pas fallu moins de huit siècles pour transformer l'hypothèse du philosophe en vérité scientifique.

Raphaël Dubois,

Professeur
à la Faculté des Sciences de Lyon.

LA VITESSE DE PROPAGATION DES MOUVEMENTS DANS UN FLUIDE INDÉFINI

Les recherches faites par H. Hugoniot et publiées, après sa mort, dans le *Journal des Mathématiques pures et appliquées* (1), élucident d'une façon complète un problème, depuis longtemps posé par les physiciens, mais dont la solution rigoureuse n'était connue que dans des cas très particuliers.

I

On sait comment l'étude du son, celle de la lumière, ont conduit à considérer les vitesses de la propagation d'un ébranlement dans une masse fluide. Pour les calculer, il fallait supposer des conditions assez simples pour que toutes les circonstances du mouvement fussent mises immédiatement en évidence.

C'est ainsi qu'afin d'obtenir la vitesse du son dans une conduite cylindrique, on exige que chaque tranche, située dans une section droite de la conduite, reçoive un déplacement d'ensemble et que l'ébranlement produit donne lieu à de faibles dilatations. Ces hypothèses étant vérifiées, le mouvement tout entier peut être prévu; une tranche quelconque, dont la distance à l'origine de la conduite est x , prend, après un certain temps t , le mouvement qu'avait d'abord subi la première tranche; le rapport $\frac{x}{t}$ demeure constant, quelle que soit la tranche considérée et c'est lui qu'on regarde comme représentant la vitesse de propagation du mouvement dans la conduite.

Dans cette théorie, rien n'autorise à penser qu'un ébranlement déterminé à une extrémité de la colonne gazeuse se propage encore avec une vitesse constante, s'il s'accompagne d'un changement notable de pression. Il est possible, même en ce cas, de connaître le mouvement qui prend naissance, si le gaz était primitivement au repos; et ce résultat est donné par un premier mémoire de H. Hugoniot; cependant, après qu'il s'est fait une ou plusieurs réflexions dans la conduite, le mouvement qui leur succède n'est point en général de ceux que l'on sait calculer et la vitesse avec laquelle il se propage demeurerait, comme conséquence, impossible à évaluer. Il y a plus: le mode de raisonnement, employé pour définir et se représenter cette vitesse de propagation dans les cas simples, convenait mal dès qu'il fallait imaginer pour

elle une expression variable à chaque instant et cette difficulté de principe est néanmoins inévitable.

Des circonstances analogues se sont présentées dans l'étude de la lumière; c'est seulement lorsqu'il s'agit des ondes planes ou sphériques que l'on avait une définition immédiate de leur vitesse de propagation et en même temps l'expression de cette vitesse, qui est une constante.

Les conditions nécessaires au succès de la méthode étaient toujours les suivantes:

1° Que le mouvement fût entièrement connu, exprimé par des formules analytiques explicites.

2° Que chaque point du fluide, après un intervalle de temps, variable d'ailleurs avec sa position, reproduisit exactement le mouvement déterminé d'abord à l'origine, c'est-à-dire que la vitesse de propagation cherchée fût une constante.

II

Les choses se présentent sous un aspect tout différent, si l'on veut définir la vitesse de propagation comme il est fait dans les Mémoires déjà cités.

Pour préciser, imaginons une masse fluide, séparée en deux parties par une surface S ; d'un côté de cette surface, il existe un mouvement A , l'un quelconque de ceux que la masse fluide peut recevoir; de l'autre, par suite de conditions convenables, un second état B a pris naissance. Hugoniot dit qu'il y a propagation de ce dernier mouvement, lorsque, à un instant très proche de celui



que l'on considérerait, la masse fluide est encore animée des mouvements A et B , la surface de séparation s'étant changée seulement en une autre, S_1 , très voisine de la première. Cela étant, par un point de S menons la normale à cette surface: une portion très petite de cette normale est interceptée entre S et S_1 , et le rapport de cette longueur à l'intervalle de temps qui s'est écoulé pendant le changement survenu, est la vitesse de propagation du mouvement B , aux dépens du mouvement A . Cette vitesse peut varier, on le voit, avec le point choisi sur S , elle peut aussi se modifier avec le temps, mais cette généralité n'en rendra pas le calcul plus difficile.

Voici maintenant les principes auxquels se rattache toute cette question:

(1) *Journal des Mathématiques*, dirigé par M. Jordan, 1887 et 1888.

La continuité ne peut être troublée en aucun point de la masse fluide et, comme conséquence, les vitesses et les pressions qui répondent aux états de mouvement A et B sont égales en tous les points de S. Telles sont les relations qui doivent être satisfaites sur cette surface et se conserver lorsqu'elle a été remplacée par une autre, très voisine. Elles sont particulières aux deux mouvements que l'on considère et définissent la surface de l'onde. Il en est d'autres, au contraire, qui traduisent seulement les propriétés générales du fluide et conviennent à tous les états qu'il peut prendre; ce sont des équations aux dérivées partielles. Or, ces dernières, jointes aux précédentes, donnent par une analyse presque élémentaire, l'expression de la vitesse de propagation cherchée. On en conclut d'abord la proposition suivante :

La vitesse de propagation d'un mouvement dans un fluide est déterminée par l'état du fluide; elle ne change point, quelle que soit la nature du mouvement qui s'y propage, pourvu qu'aucune discontinuité ne se produise.

Afin de bien saisir la signification de ce résultat, il faut remarquer d'ailleurs qu'étant donné un état de mouvement A, tout autre mouvement B, compatible avec les propriétés du fluide ou, ce qui est la même chose, avec les équations différentielles qui les représentent, n'est pas nécessairement susceptible de se propager aux dépens de A. Un phénomène plus compliqué peut prendre naissance et c'est un point que mettent en lumière les recherches antérieurement faites par Hugoniot dans un cas plus simple.

III

Il est facile de s'en rendre compte, quand les mouvements dont il s'agit s'effectuent par tranches parallèles, dans une conduite cylindrique. Les portions du fluide animées des mouvements A et B sont séparées d'abord par une tranche S; un troisième mouvement y prend aussitôt naissance et se propage, d'un côté aux dépens de A, de l'autre aux dépens de B. Cette modification curieuse offre les plus grandes analogies avec les phénomènes que l'on désigne sous le nom de réflexions et qui se produisent dans des circonstances un peu différentes.

Quant à l'expression mathématique de la vitesse de propagation, elle présente un intérêt spécial, en raison du petit nombre d'éléments qu'elle fait intervenir. En effet, si la conductibilité du fluide pour la chaleur est négligeable, comme on le va supposer, il y a une relation caractéristique et connue entre la densité ρ et la pression p , de sorte

que, l'une de ces quantités étant donnée, la seconde s'en déduit par une loi générale :

$$p = f(\rho).$$

Soit maintenant N la vitesse d'un point appartenant à la masse fluide et situé sur la surface S, cette vitesse étant comptée normalement à la surface. La vitesse de propagation V s'exprime, au point considéré, de cette manière :

$$V = N \pm \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$$

et cela, quel que soit l'état initial du fluide, quel que soit aussi le mouvement qui s'y propage. Ces circonstances, propres à chaque cas particulier, n'interviennent pas explicitement; elles sont nécessaires pour déterminer la densité et par suite la pression, ainsi que la vitesse N au point dont il s'agit; mais si l'on imagine que ces éléments soient obtenus d'une façon quelconque, la vitesse de propagation V s'en déduit par la même formule dans tous les cas possibles.

Cette formule, au reste, était bien connue, lorsqu'il était question des mouvements simples dont l'étude peut être faite immédiatement; mais ici les conditions qui déterminent le mouvement peuvent être quelconques; le mouvement qui prend naissance peut être inconnu; si l'état primitif du fluide est donné, la vitesse de propagation l'est par cela même. En outre, ni la viscosité du fluide, ni des forces appliquées en chacun de ses points et dépendant uniquement de la position et de la vitesse de ce point ne peuvent changer l'expression générale de la vitesse de propagation.

La méthode indiquée s'étend même à tous les mouvements régis par un système d'équations aux dérivées partielles du second ordre, notamment à ceux qu'il faut étudier dans la théorie de l'élasticité ou dans celle de la lumière. J'ajoute qu'il se produit dans ces derniers cas une circonstance particulière fort importante. Les équations qui s'y rattachent ayant tous leurs coefficients constants, les valeurs de la vitesse de propagation sont entièrement déterminées pour chaque direction normale à la surface S. Les formules obtenues sont d'accord avec celles que donnent la considération des ondes planes et le principe d'Huyghens, mais pour les déduire des équations différentielles, base des recherches sur ce sujet, les procédés sont directs et n'impliquent aucune hypothèse.

R. Liouville,

Répétiteur à l'Ecole Polytechnique

LES POLYNÉVRITES ⁽¹⁾

Il n'est souvent rien de plus intéressant ni de plus instructif en médecine, que de suivre la marche des idées, de rechercher les causes de la direction qu'on leur voit prendre.

Si l'on étudie, par exemple, l'histoire des maladies du système nerveux pendant ces trente dernières années, où Charcot et l'École de la Salpêtrière ont élevé ce superbe édifice de la Pathologie nerveuse contemporaine, on est frappé de voir quelle énorme part, dans la genèse de ces maladies, est faite aux centres nerveux, relativement à celle attribuée aux nerfs périphériques; mais, on en saisit bientôt le pourquoi dans ce fait que l'évolution considérable qui s'accomplit alors, avait son impulsion première dans les Mémoires cliniques de Duchenne (de Boulogne), qui par une sorte d'intuition géniale avait esquissé toute la pathologie de la *moelle*, puis dans les recherches anatomophysiologiques qui suivirent l'immortelle découverte par Broca de la première *localisation cérébrale*, celle du langage articulé, dans la troisième circonvolution frontale gauche. Et si dès lors, on voit, avec les Hitzig, les Ferrier, les Vulpian, les Brown-Séquard, les Charcot, etc., etc., physiologie, anatomie pathologique, médecine expérimentale et clinique se prêter un mutuel concours dans la solution des problèmes soulevés, on voit aussi expérimentateurs et cliniciens diriger vers les centres nerveux toutes leurs recherches relatives à ces problèmes. Pour préciser : toutes les fois qu'une altération de la motilité ou de la sensibilité est observée, la première idée qui vient à l'esprit est de rechercher quelle lésion des centres peut bien lui avoir donné lieu, les nerfs périphériques (en dehors des cas de névrites localisées, d'ordre spécial, par compression ou à *frigore*), étant considérés comme de simples agents de transmission.

Ainsi s'explique comment passèrent presque inaperçus les travaux de Duménil (de Rouen) (2) qui rapportait « à une lésion nerveuse périphérique toute une série de paralysies atrophiques généralisées », montrant ainsi que « les nerfs pouvaient s'altérer primitivement, sans modification antérieure de leurs centres trophiques ». Mais, c'était à l'époque où l'anatomie pathologique (Luys, Vulpian et Prévost) venait de prouver que, dans les

cornes antérieures de la moelle, au niveau des cellules multipolaires, se trouve le centre trophique des fibres motrices; où fut érigé à l'état de dogme, « que toute destruction des cellules motrices des cornes antérieures entraîne à sa suite une atrophie musculaire, et inversement, que toute atrophie musculaire (non traumatique) relève d'une altération médullaire ». Et alors, on rapporta à une origine spinale, non seulement l'atrophie musculaire progressive, la paralysie infantile, etc., etc., mais encore les *paralysies* survenant dans le *cours* ou la *convalescence* des *maladies aiguës*; et ces idées étaient si bien ancrées dans l'esprit des pathologistes, qu'Erb, Remak et autres n'hésitèrent pas, contrairement à l'opinion de Charcot, à assigner une pathogénie médullaire à la paralysie saturnine, bien qu'elle paraisse un type de paralysie périphérique. Du reste, les autopsies étaient-elles négatives quant aux lésions spinales, mais positives quant aux lésions des nerfs, on invoquait, pour expliquer ces dernières, un trouble dynamique des cellules de la colonne grise antérieure, et ainsi se trouvait conservé dans son entier le rôle pathogénique de la moelle.

Cependant, dans l'esprit du plus grand nombre, en France surtout, grâce aux travaux de Lanceux, puis de Gombault, de Déjerine, etc. etc. la paralysie saturnine était considérée comme dépendant d'une névrite périphérique; mais elle avait un rang à part, lorsque l'on reconnut que n'étaient pas rares certaines formes pathologiques « à modalités cliniques variables, à étiologie multiple », qui coïncidaient avec des altérations névritiques plus ou moins étendues, plus ou moins intenses, alors que l'intégrité de la moelle était complète. Bientôt s'établit la relation de cause à effet, et alors fut reconnue l'autonomie du système nerveux périphérique, réclamée déjà par Duménil, il y a vingt-cinq ans.

Ce qu'est aujourd'hui cette autonomie, les résultats qu'elle a produits, c'est ce que vient d'exposer récemment Mme Déjerine-Klumpke, dans un travail remarquable (1) où, mettant au service de son expérience propre un esprit profond d'analyse, l'auteur a placé sous nos yeux un tableau aussi exact que complet de l'état actuel de la science en la matière. En l'étudiant avec soin, on verra quelle place, de plus en plus grande chaque jour, prend le système nerveux périphérique dans la pathologie nerveuse, avec quelle rapidité il y a conquis cette place.

(1) Mme Déjerine-Klumpke : *Des Polynévrites en général et des paralysies et atrophies saturnines en particulier*. Paris, Félix Alcan, 1889.

(2) Duménil (de Rouen). — *Paralysie périphérique etc., etc.* *Gazette hebdomadaire*, 1864, etc. Contribution pour servir à l'histoire des paralysies périphériques et spécialement de la névrite. *Gazette hebdomadaire*, 1866.

(1) Mme Déjerine-Klumpke. *loc. cit.*

Rien de plus facile, du reste, que de se rendre compte de l'intensité de ce mouvement. On sait aujourd'hui que, relativement à l'étiologie des polynévrites, une part à peu près égale est dévolue aux maladies infectieuses aiguës et aux maladies toxiques. Or, en 1880, la Faculté donnait parmi les sujets de Thèses au Concours d'agrégation : « Des Paralysies dans les maladies aiguës » ; Landouzy fit à ce propos un Mémoire remarquable dont on peut dire sans exagération qu'il devançait de beaucoup son époque ; on y trouve ce principe de pathologie générale qu'il n'y a « de la part des maladies aiguës, derrière toutes ces paralysies, qu'une question d'affinités organiques, de déterminations et de *localisations morbides* ». Ce n'est qu'en s'appuyant sur l'analyse des faits cliniques, en interprétant ces faits, en procédant en quelque sorte par exclusion, que l'auteur put justifier sa manière de voir sur les *localisations névritiques*. Ainsi, dans la fièvre typhoïde, « l'existence d'une *névrite* » lui paraissait « *seule* pouvoir fournir la raison d'une localisation étroite de la paralysie », de même dans le choléra, dans la variole, dans le rhumatisme aigu, dans la tuberculose sur laquelle il insistait tout particulièrement en rappelant « combien étaient fréquentes les névrites douloureuses des phthisiques ». Cette opinion qui pouvait alors paraître très osée est aujourd'hui vérité indiscutable ; — à l'observation, si remarquable à tous les points de vue, faite par Joffroy, de névrites sans lésion médullaire dans un cas de variole grave, à celle analogue de Eisenhor (de Hambourg) chez un tuberculeux, étant venues depuis lors se joindre de nombreuses preuves anatomiques. — Six années plus tard, en 1886, « des Paralysies toxiques » sont traitées dans un nouveau Concours d'agrégation ; Brissaud donne sur ce sujet un Travail dont l'éloge n'est plus à faire ; il montre comment les substances toxiques agissent plus sur les nerfs périphériques que sur les centres ; le chapitre le plus considérable de son Mémoire est consacré aux paralysies par *névrites périphériques* ; preuves anatomiques en main, il peut démontrer la part énorme que prennent ces névrites dans la pathogénie des paralysies toxiques. Quel chemin parcouru ! Depuis lors, les faits se sont accumulés et le travail de Mme Déjérine-Klumpke vient de placer définitivement les polynévrites dans le cadre nosologique.

Ce terme de Polynévrites s'applique parfaitement à l'ensemble, ou mieux aux ensembles symptomatiques qu'il a pour but de définir ; il dépeint la nature « essentiellement polymorphe » (Raymond) de ces affections, dont la symptomatologie varie suivant la topographie des altérations névritiques, et dépend « non seulement de l'ex-

tention et de la gravité de la lésion nerveuse périphérique, mais encore de son siège, de sa localisation et de la fonction des nerfs (sensitifs, moteurs, mixtes ou trophiques) qu'elle affecte. »

Cette variabilité, nous la retrouvons aussi bien dans le siège, que dans l'étendue, que dans la marche des lésions. En effet, si, à la rigueur, on peut diviser les Polynévrites en deux classes comprenant, l'une les formes *sensitives*, l'autre les formes *motrices*, il n'en est pas moins vrai que, dans la grande majorité des cas, on se trouve en présence de formes *mixtes* dans lesquelles on observe égalité des troubles moteurs et sensitifs, ou bien prédominance, absolue ou plus ou moins accentuée, des uns ou des autres. Ainsi, même aux deux extrémités de l'échelle, dans la polynévrite alcoolique, sensitive par excellence, les troubles moteurs sont fréquents ; dans la polynévrite saturnine, type de forme motrice, M^{me} Déjérine-Klumpke a démontré l'existence presque constante de troubles sensitifs. — D'autre part, la polynévrite peut « se localiser à un membre, à un segment de membre, à un ou plusieurs troncs nerveux, ou à un groupe musculaire indépendamment de son innervation périphérique, » ou se généraliser avec summum moteur ou sensitif, et cela, soit en suivant une marche plus ou moins lente, soit en affectant une allure rapide, rappelant alors l'évolution des maladies infectieuses aiguës.

C'est même dans ce dernier cas, et dans celui-là seulement, que la Polynévrite, « revêtant les allures de la paralysie ascendante aiguë », affecte un caractère de gravité tel qu'elle peut entraîner rapidement la mort, car presque toujours elle constitue une affection curable, dans un laps de temps qui varie suivant l'intensité et l'étendue des lésions névritiques.

Celles-ci se présentent généralement « sous les traits bien connus de la névrite parenchymateuse : segmentation de la myéline, prolifération des noyaux des segments inter-annulaires, disparition du cylindre-axe, atrophie plus ou moins complète des fibres nerveuses, » avec un maximum d'intensité dans les ramuscules nerveux terminaux ; beaucoup plus rarement ce sont les lésions d'une névrite « interstitielle, inflammatoire, aiguë » que l'on observe.

Nous n'avons pas ici à entrer dans l'analyse étiologique de ces altérations ; cela nous entraînerait dans la description des nombreuses variétés cliniques qui en dépendent et dont il nous aura suffi d'esquisser l'ensemble ; non plus que dans les questions de diagnostic, les unes indiscutées aujourd'hui, les autres encore soumises à controverse ; mais, ce qu'il nous faut dire, c'est que certaines affections, comme la paralysie générale

spinale antérieure subaiguë de Duchenne, comme la paralysie ascendante aiguë de Landry, ne semblent être « qu'une modalité clinique de la névrite multiple », que chaque jour voit s'étendre le domaine des Polynévrites, à mesure que leur marche, leur évolution, leurs caractères cliniques sont mieux observés, à mesure surtout que leur étiologie est mieux connue.

En même temps que les observations se multipliaient, en effet, les Polynévrites de causes obscures, indéterminées devenaient plus rares, et aujourd'hui que dans l'immense majorité des cas, ces causes peuvent être établies, on est en droit de se demander si le temps est bien éloigné, où disparaîtraient complètement ces formes décrites par Leyden sous le nom de *spontanées*.

On sait maintenant quelle part énorme revient, dans cette étiologie, aux maladies infectieuses à évolution aiguë ou chronique. Au premier rang, la diphtérie qui, bien qu'elle localise le plus souvent ses effets au voile du palais, n'en est pas moins susceptible de les généraliser sous forme de paralysies; puis la fièvre typhoïde dans le cours de laquelle Pitres et Vaillard ont pu suivre l'évolution de la névrite, depuis le simple état congestif qui ne se manifeste pendant la vie que par des troubles de la sensibilité, jusqu'à l'altération profonde du nerf qui produit, suivant son intensité, des troubles de la motilité avec ou sans atrophie; la variole, le choléra, la fièvre infectieuse rhumatismale, l'impaludisme, l'infection puerpérale. Dans l'ordre chronique : la tuberculose, principalement dans sa forme lente, la syphilis, la lèpre, au cours de laquelle s'expliquent par les névrites, les anesthésies, les ulcérations, les gangrènes.

Non moins grande est l'influence des maladies toxiques. Tout d'abord apparaît l'intoxication saturnine comme la plus fréquente, comme celle dont les effets sont les mieux connus, et dont l'étude a servi de base aux travaux de Mme Déjérine-Klumpke; puis l'alcoolisme (Lancereaux) se faisant remarquer par l'intensité des troubles successifs qu'il détermine, par cet ensemble de symptômes à forme ataxique que Déjérine a distingué du tabès vrai sous le nom de *nervo-tabès périphérique*; l'intoxication mercurielle dont Letulle, dans un Mémoire remarquable, a prouvé anatomiquement l'influence sur les nerfs; enfin les intoxications oxy et sulfo-carbonées. De ce groupe nous devons rapprocher les névrites par auto-intoxication, observées dans le cours du diabète, de la goutte, du rhumatisme chronique (Pitres et Vaillard).

D'autre part, l'influence des névrites périphériques sur la production de certaines dermatoses (vitiligos, ecthymas, gangrènes), a été mise hors de doute depuis les travaux de Leloir. Enfin, dans le tabès, Déjérine propose d'expliquer nombre de troubles dont les lésions spinales semblent impuissantes à rendre compte, par des lésions névritiques indépendantes, dont l'étiologie se confond vraisemblablement avec celle de la sclérose des cordons postérieurs.

Dans certains cas, néanmoins, la cause reste encore inconnue comme dans le bérubéri; ou bien, on se voit obligé d'invoquer le surmenage, le froid, sachant bien cependant, depuis la découverte des microbes pathogènes, que leurs effets « ne jouent plus dans le développement des maladies aiguës, que le rôle d'une cause occasionnelle, prédisposante, mettant l'individu en état d'opportunité, de réceptivité morbide ».

Quant aux moyens mis en œuvre par ces diverses causes, connues ou inconnues, pour produire les altérations névritiques, c'est là encore un vaste champ à explorer. « S'agit-il, dans les névrites infectieuses, d'une action directe, pathogène, des microbes sur les nerfs? » Quel est le mode d'action des substances dans les névrites toxiques? Pourquoi telle substance préfère-t-elle tel groupe de nerfs, respecte-t-elle tel autre? Quel est le procédé par lequel sont produites les névrites des maladies dyscrasiques? Autant de problèmes dont la solution n'est peut-être pas éloignée, car après les belles expériences de Charrin sur la maladie pyocianique, de Roux et Yersin sur le bacille diphtérique, il semble que toute la question sera bientôt ramenée à l'influence des substances toxiques sur les nerfs; que celles-ci soient de provenance microbienne, qu'elles aient été introduites dans l'économie par intoxication, qu'elles s'y soient produites et accumulées par déviation de la nutrition.

Quoi qu'il en soit de ces desiderata, les affections des nerfs périphériques occupent dès maintenant une place considérable dans la pathologie nerveuse; mais, ce que seront les limites exactes de leur domaine, comment elles l'acquerront aux dépens de celui des affections des centres, c'est là ce que, vraisemblablement en raison du courant établi, la clinique et l'anatomie pathologique ne tarderont pas à déterminer.

D^r E. De Lavarenne.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Labouret (Ch. M. de), capitaine d'artillerie de la Marine. — **Emploi et fonctionnement du diapason dans les appareils balistiques enregistreurs.** *Mémorial de l'Artillerie de la Marine*, 26^e année, 2^e série, t. XVIII, 1^{re} livraison de 1890. Imprimerie nationale.

Les diverses expériences que nécessitent l'examen des explosifs ou l'étude de la marche des projectiles et de leurs effets, consistent, la plupart du temps, à relever la courbe sinusoïdale tracée sur une plaque noire par un diapason mobile et vibrant. Le diapason est relié à une masse qui reçoit un mouvement, conséquence du phénomène étudié; la courbe tracée donne les circonstances de ce mouvement et permet ainsi de remonter aux lois du phénomène.

Lorsqu'on emploie ce procédé pour l'étude de la perforation des plaques de blindage par des projectiles enregistreurs, il se présente une difficulté; les deux tracés correspondant aux deux branches du diapason, tracés destinés à se contrôler, ne concordent pas et l'on en est réduit à prendre la moyenne des résultats qu'ils fournissent.

M. de Labouret s'est proposé de rechercher quelle était l'approximation que pouvait fournir cette méthode et s'il n'y avait pas lieu de la modifier; il était dans les meilleures conditions pour se livrer à ces importantes recherches par sa situation d'adjoint du général Sébert au laboratoire central de la Marine.

Par une très longue série d'expériences, bien imaginées, bien conduites et dont le *Mémorial* donne tous les résultats, il est arrivé à déterminer les causes de la non-concordance des deux tracés, puis il a étudié de près la loi des vibrations, et a reconnu que, pour les deux branches, elles sont à phases concordantes à partir du déclenchement de la branche libérée en dernier lieu; il a montré ensuite que l'espace parcouru au moment du déclenchement pouvait être pris comme moyenne des valeurs lues par les deux plumes et a indiqué enfin comment l'on pouvait augmenter la précision des mesures soit à l'aide des lectures par demi-vibrations, soit à l'aide des relevés par points.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail trop technique de ces divers résultats, mais ce que nous venons de dire suffit, il nous semble, pour faire comprendre l'intérêt scientifique et pratique du Mémoire de M. le capitaine de Labouret.

L. O.

Vogel (H. C.) et **Scheiner**, astronomes à l'Observatoire de Potsdam. — **Des intermittences périodiques de l'éclat d'Algol, Prometheus**, n^o 16, 1890.

Pour expliquer les variations périodiques de l'éclat de certaines étoiles, les astronomes les ont souvent attribuées à l'interposition de satellites obscures. Cette hypothèse a surtout été faite pour *Algol* (β Perset), mais jusqu'à ces derniers temps n'avait jamais été démontrée. MM. Vogel et Scheiner viennent d'en vérifier la justesse pour *Algol*. L'emploi du spectroscope leur a permis d'y reconnaître une étoile double, dont les deux astres offrent un éclat inégal. La masse de l'étoile relativement obscure n'est guère inférieure à celle de l'étoile brillante. Celle-ci a un diamètre de 1,775,000 kilomètres. Celui de son satellite est de 1,225,000 kilomètres. La distance qui sépare les deux astres est de 52,500,000 kilomètres. Tous deux gravitent autour d'un centre commun. Suivant qu'ils nous

apparaissent en conjonction ou en opposition, ils nous offrent le maximum ou le minimum d'éclat.

C. VAN MUYDEN (de Berlin).

2^{es} Sciences physiques.

Galitzine. — **Sur le rayon d'activité des forces moléculaires.** *Zeitschrift für physikalische Chemie*, Octobre 1889.

Plusieurs théories physiques, notamment la théorie de la capillarité de Laplace, reposent sur l'hypothèse que l'action exercée par une molécule sur les molécules voisines devient négligeable à partir d'une certaine distance ρ , qu'on appelle *rayon d'activité*. Rien n'est encore connu en ce qui concerne la grandeur de ce rayon d'activité; ni sa grandeur absolue, ni même sa grandeur relative pour les différents corps. M. Van der Waals a été conduit à émettre sur ce sujet deux hypothèses; ou bien le rayon d'activité est constant pour tous les corps, ou bien il est proportionnel au rayon des molécules. Le savant hollandais n'a d'ailleurs pu déterminer d'après les résultats expérimentaux à laquelle de ces deux hypothèses on devait donner la préférence.

M. Galitzine reprend la question de la façon suivante: il démontre que la pression moléculaire interne d'un liquide, K (pression produite par l'action attractive qu'exercent l'une sur l'autre les molécules situées dans le voisinage de la surface) et la tension superficielle S , peuvent se représenter par les formules

$$K = r \int_0^{\rho} \psi(r) dr$$

$$S = \frac{1}{2} r \rho \int_0^{\rho} \psi(r) dr,$$

c étant une grandeur proportionnelle au carré de la densité du liquide, ρ le rayon d'activité et ψ une fonction inconnue représentant l'action de deux molécules l'une sur l'autre. On déduit immédiatement de ces deux expressions:

$$\rho = \frac{S'}{K} \text{ constante.}$$

Au moyen de cette formule, M. Galitzine calcule la valeur de ρ pour les différents éthers de la série grasse. Ce calcul montre que le rayon d'activité est sensiblement proportionnel au poids moléculaire du corps considéré:

$$\rho = m \text{ constante.}$$

Ce résultat conduit à une conclusion intéressante. Supposons que la force qui s'exerce entre deux molécules de masse m situées à une distance r soit représentée par l'expression

$$F = K m^2 \frac{1}{r^n};$$

la valeur limite de cette force, lorsque r sera égale au rayon d'activité, sera représentée par $\epsilon = K m^2 \frac{1}{\rho^n}$,

d'où on déduit $\rho = m^{\frac{2}{n}}$ constante.

Mais on a trouvé d'autre part $\rho = m$ constante. Il faut

donc que $n = 2$. Par conséquent, conclut M. Galitzine, la force qui s'exerce entre deux molécules est inversement proportionnelle au carré de leur distance, et la loi de la gravitation s'applique aux actions moléculaires.

Georges CHARPY.

Roberts-Austen (Chandler). — **Les Alliages.**
Traduction française de Gustave-Richard. — *Gauthier-Villars*, 1890.

Cette intéressante brochure est la reproduction de trois leçons professées par M. Roberts-Austen devant la Société des arts de Londres. L'auteur y résume les principaux faits acquis sur la constitution des alliages, question relativement peu étudiée jusqu'à ces derniers temps, mais qui a reçu un grand développement par les travaux de MM. Mathiessen, Roberts-Austen, Guthrie, Le Châtelier, Osmond, Hopkinson, etc....

Les alliages peuvent s'obtenir soit par compression énergique du mélange des limailles, comme l'a montré M. Wallther-Spring, soit par dépôt électrolytique; mais le seul procédé pratique consiste à fondre ensemble les métaux que l'on veut allier. Dans cette opération on peut, presque toujours, observer un dégagement ou une absorption de chaleur. L'étude de ces phénomènes tend à faire admettre qu'il peut, dans certains cas, se produire des combinaisons en proportions définies, mais que, le plus souvent, la constitution d'un alliage présente de grandes analogies avec celle d'une dissolution. Il faut cependant signaler une distinction, c'est qu'il est impossible de décomposer un alliage métallique en ses constituants par le passage d'un courant électrique, c'est-à-dire de réaliser le phénomène correspondant à l'électrolyse d'une solution. Ces essais ont été faits, naturellement, sur des alliages liquides. En étudiant le passage d'un courant à travers les alliages solides, on a pu constater, par les variations du pouvoir conducteur, l'existence de certains composés bien définis des métaux, et de plus mettre en lumière ce fait extrêmement important que, dans certains alliages, les métaux subissent des modifications allotropiques. Ces modifications peuvent se produire par l'addition de quantités très faibles d'un métal étranger, et changent complètement les propriétés physiques du métal considéré. C'est probablement en se basant sur l'observation de faits analogues que les alchimistes cherchaient à transmuter les métaux. Un fait très curieux et qui n'est pas encore complètement élucidé, est l'influence du volume atomique du métal ajouté sur la modification des propriétés mécaniques. Les expériences faites jusqu'à ce jour semblent établir que les éléments à volume atomique considérable diminuent beaucoup la ténacité des métaux auxquels on les ajoute, tandis que les éléments à faible volume atomique augmentent au contraire cette ténacité. On s'explique ainsi l'influence qu'exercent sur les propriétés du fer la présence de petites quantités de carbone ou de chrome d'une part, de phosphore, de soufre ou d'arsenic d'autre part.

Les deux premiers chapitres du livre de M. Roberts-Austen sont consacrés à l'étude des faits rappelés ci-dessus. Le troisième traite des couleurs des métaux et des alliages envisagés par rapport à leurs applications aux arts.

Georges CHARPY.

3° Sciences naturelles.

Bornet (MM. Ed.) et **Flahault** (Ch. F.). — **Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques.** *Actes du Congrès de Botanique tenu à Paris au mois d'août 1889*. Paris, 1890.

On rencontre souvent sur les plages, à marée basse, des coquilles rejetées par la mer, et couvertes de taches vertes ou verdâtres; tantôt un grattage avec l'ongle enlève ces taches qui sont alors dues à des

thalles de jeunes algues, fixées là comme sur un substratum quelconque; tantôt au contraire, un grattage même violent n'enlève point la couleur verte, qui est alors plus profonde, intérieure, et due au thalle d'une algue perforante. Des éclats de la coquille, assez minces pour être transparents et détachés perpendiculairement à sa surface, montrent des canalicules creusés dans toutes les directions et souvent anastomosés; ce sont les galeries formées par ces algues perforantes. On comprend que le thalle de l'algue, en se propageant dans la coquille par la corrosion qu'il produit, finit par en amener la destruction totale, et soit l'un des facteurs principaux de la disparition des coquilles dans les baies tranquilles où elles sont à l'abri du roulement des vagues. D'ailleurs, depuis plus de quarante ans les zoologistes et les géologues ont décrit les canaux rameux qui traversent les coquilles, les polypiers, etc., et ont attribué leur formation à des plantes perforantes; mais M. Lagerheim (1885) et M. Hariot (1887), étaient jusqu'ici les deux seuls auteurs ayant trouvé une plante produisant ces galeries.

MM. Bornet et Flahault ont étudié dix genres de plantes perforant des coquilles, dont six nouveaux; quatre appartiennent aux algues vertes, quatre aux algues bleues et deux aux champignons. Cette étude est particulièrement difficile, par suite du mélange des espèces et de l'entrelacement de leurs thalles, la séparation des fragments pour l'étude sur le vivant n'en donne jamais que de très petites portions encombrées de poussières calcaires. Aussi les auteurs ont-ils souvent employé le liquide de Pérenyi, qui fixe le protoplasme et décalcifie les coquilles.

La nouvelle algue verte, *Gomontia polyrhiza*, est la plus curieuse des espèces décrites, principalement par



Chaque article Fig. 1. — *Gomontia* (Bornet et Flahault). possède des chromatophores para-riétaux de un à cinq noyaux.

Quelques-uns des articles se reniflent en une masse plus ou moins irrégulière et à protoplasme abondant, qui s'isole de plus en plus des articles contigus par d'épais bouchons de cellulose; puis leurs points d'attache se changent en rhizoïdes, et dès lors ces sporanges vivent d'une vie propre pendant assez longtemps comme des organismes autonomes. Leur contenu se transforme soit en zoospores à deux cils, soit en spores immobiles. Les zoospores sont de deux sortes : des petites et des grosses; seules les grosses germent et se développent en un filament qui se cloisonne à mesure qu'il s'allonge. Les spores immobiles donnent naissance à des sporanges semblables aux précédents et pourvus de rhizoïdes; si la coquille est vieille, un ou plusieurs crampons pénètrent dans son intérieur, s'y étalent en filaments et produisent une plante nouvelle. D'autres fois, ces spores grossissent, se divisent en plusieurs (2-8) corps immobiles, qui se développeront à leur

tour en sporange; mais pour les auteurs ce dernier phénomène n'est qu'un moyen accidentel de défense de la plante contre les conditions défavorables. Le genre *Gomontia* devra former une tribu particulière dans la famille des Syphonocladées.

Parmi les autres espèces décrites, *l'Hyella coarctata* est aussi curieuse parmi les algues bleues que le *Gomontia* parmi les algues vertes. MM. Bornet et Flahault considèrent d'ailleurs la connaissance des plantes perforantes comme restant encore très incomplète.

Camille SAUVAGEAU.

4° Sciences médicales.

Routier. — Cancer du rectum. Résection par la voie sacrée. *Rev. de chir.*, décembre 1889, t. IX, p. 961.

Contre les cancers du rectum qui sont trop bas pour être enlevés par la laparotomie comme ceux de l'oméga iliaque et trop haut pour être extirpés par l'anus, Kraske a imaginé en 1885 d'agir par une voie artificielle créée au niveau du sacrum qu'on résèque dans un temps préliminaire à l'ablation du néoplasme. M. Routier, qui, dans un cas, a employé avec succès son procédé, le conseille parce qu'il permet d'enlever des néoplasmes placés très haut sur le rectum et les ganglions voisins, parce qu'il fait espérer la possibilité de la cure radicale et surtout parce que, conservant le sphincter, il n'entraîne pas cette infirmité dégoûtante de l'incontinence des matières qui suit et a rectotomie, et l'établissement des anus artificiels, iliaques ou lombaires.

D^r HARTMANN.

Metchnikoff (Elie). — Le charbon des pigeons, (*Annales de l'Institut Pasteur*, 25 février 1890.)

M. Metchnikoff continue ses études sur les causes de l'immunité naturelle ou conférée; on sait que l'éminent microbiologiste fait jouer un rôle très important dans l'immunité contre les microbes à certaines propriétés inhérentes à quelques espèces cellulaires de l'organisme qui prennent le nom de *phagocytes* pour indiquer leur nouvelle fonction; de ce nombre sont les leucocytes. Une première étude avait déjà été faite à propos du bacille du *Rouget du porc*, bacille dont l'absorption et la destruction par les phagocytes est facilement observée. Dans cette seconde étude, M. Metchnikoff a choisi la bactérie charbonneuse, qu'il a expérimentée sur le pigeon, parce que cet animal avait été choisi par ses contradicteurs, entre autres par Baumgarten, pour réfuter les assertions de l'auteur sur la phagocytose.

M. Metchnikoff avant d'exposer le résultat de ses propres expériences résume les connaissances acquises sur le charbon des pigeons; comme ses prédécesseurs, il a constaté que les pigeons jouissaient d'une faible réceptivité pour le charbon, mais que la bactérie charbonneuse voyait son activité être notablement renforcée par le passage à travers l'organisme du pigeon au point d'arriver à tuer les poules, animal réfractaire au charbon dans les conditions ordinaires. M. Metchnikoff expose ensuite ses expériences nouvelles; toute la discussion de la phagocytose repose sur ce fait: savoir si les bactéries englobées par les phagocytes sont mortes ou vivantes; l'auteur a pu, par un procédé ingénieux, isoler plusieurs phagocytes avec une bactérie qu'ils avaient absorbée, et en semant cette substance il a vu la bactérie se développer; aussi est-il en droit de tirer de son travail les conclusions suivantes:

1° L'immunité des pigeons pour le charbon n'est que relative;

2° Les bactéries peuvent se multiplier dans l'organisme et les humeurs des pigeons;

3° Le nombre des bactéries extra-phagocytaires

mortes est beaucoup moindre que celui des bactéries intra-phagocytaires mortes;

4° Les phagocytes des deux espèces sont capables d'englober les bactéries vivantes et virulentes;

5° Le virus charbonneux se renforce dans l'organisme des pigeons.

En résumé, de ces expériences il résulte que la phagocytose joue un rôle important dans la lutte de l'organisme contre l'invasion bactérienne sans qu'on puisse affirmer que d'autres éléments n'interviennent pas également dans la lutte.

D^r H. DUBIEU.

Gamalié (N.) Sur l'exaltation de la virulence du bacille morveux. (*Annales de l'Institut Pasteur*, 25 février, 1890.)

Les expériences de M. Gamalié montrent que le bacille de la morve suit les lois générales qui régissent l'augmentation ou la diminution de la virulence observée par d'autres micro-organismes, les lésions locales devenant d'autant plus importantes que la résistance de l'animal est plus grande, ou la virulence plus atténuée.

Le bacille de la morve qui est plus virulent pour le lapin est exalté par ses passages à travers le spermophile au point de pouvoir tuer le lapin par l'injection sous-cutanée; dans cette modification, la clinique de la maladie change également et au lieu d'une affection à tumeurs inflammatoires (tubercules), on voit une septicémie caractérisée par l'hyperémie de la rate et de nombreux bacilles dans le sang du cœur. M. Gamalié définit le sens des modifications apportées à la virulence ou à la résistance de l'animal par le nom de *généralisation septicémique*.

D^r H. DUBIEU.

Lagrange (Docteur F.) — L'hygiène de l'exercice chez les enfants et les jeunes gens. 1 vol. in-18, F. Alcan, Paris 1890.

Ce volume est la suite de la *Physiologie des Exercices du corps*, que le même auteur a publiée il y a deux ans. Celui-ci est l'application à un cas particulier des théories générales que M. Lagrange a fondées sur une longue suite de patientes observations. Nous n'avons pas à parler ici des préceptes hygiéniques, des règles pratiques formulées dans cet ouvrage. Mais la partie théorique contient des faits nouveaux intéressants pour la physiologie.

Nous signalerons particulièrement le rapport que l'auteur a établi entre l'apparition d'un précipité uratique dans les urines et la courbature qui succède à l'effort chez l'homme non entraîné: tandis que chez l'homme entraîné, la fatigue poussée à ses limites extrêmes ne fait jamais apparaître ce précipité, jamais non plus la courbature ne succède chez lui à cette fatigue. La liaison entre les deux faits est pour l'auteur absolue, il n'a jamais constaté d'exception. Il est à regretter que M. Lagrange n'ait pas analysé chimiquement le phénomène, et qu'il ait constaté simplement la présence ou l'absence d'urates précipités dans les urines. Il y a pourtant là incontestablement l'indication d'une loi; les physiologistes qui voudront étudier l'influence du travail musculaire sur l'excrétion de l'azote sont prévenus d'avoir à s'enquérir si leur sujet est ou non en état d'entraînement, et pour reconnaître cet état, ils ne pourront mieux faire que s'en rapporter aux signes diagnostics donnés par M. Lagrange. L'explication théorique que celui-ci a donnée du fait nous paraît par contre fort contestable. Il suppose une réserve azotée dont la destruction même constituerait l'acte essentiel de l'entraînement. Nombreuses sont les objections que soulève cette théorie; mais après tout elle n'est donnée que comme une hypothèse, indépendamment de laquelle les faits gardent leur valeur.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

A l'occasion des fêtes de Pâques, la Société de Biologie, la Société française de Physique, la Société de Chimie de Londres, l'Académie des Sciences de Berlin, la Société de Physique de Berlin, l'Académie royale des Lincei, l'Académie des Sciences de Turin n'ont pas tenu, pendant ces fêtes, leurs séances ordinaires.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 24 mars 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Mittag-Leffler communique une transcendante remarquable, découverte par un de ses élèves, M. Fredholm. — M. Z. Elliot : Sur les invariants d'une classe d'équations du premier ordre. — M. O. Callandreau a continué les études de M. Tisserand sur la capture des comètes. — M. Mascart donne à l'Académie des renseignements sur l'observatoire astronomique et météorologique qui vient d'être fondé à Tananarive. — M. Ch. Antoine a étudié les relations qui existent entre le volume, la pression et la température de divers vapeurs, en analysant les travaux de Regnault, de Hirn et de Zeuner sur ces vapeurs. — M. Mascart propose, pour lire directement les indications du dynamomètre de transmission, un système optique composé d'une lentille fixée à une distance calculée de l'arbre et entraînée avec lui; cette lentille donne : une image fixe pendant un temps suffisant, si la rotation est lente; une série d'images superposées, rendue continue par la rétine, si la rotation est rapide. Les indications ainsi fournies peuvent être enregistrées photographiquement. — M. Leduc propose pour régulariser le mouvement des machines, dont le travail est soumis à des variations subites et considérables, le système suivant : le régulateur est muni d'une dynamo auxiliaire, dont la mise en jeu est déterminée par le mouvement même de l'embranchage qui établit un contact électrique; la régulation commence ainsi avant que la différence de résistance se soit transmise jusqu'à la machine, à cause du temps perdu de cette transmission.

2^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — M. James Moser qui a signalé récemment les variations considérables que subit le pouvoir conducteur de l'air plus ou moins raréfié, a constaté au contraire pour le pouvoir inducteur que celui-ci ne varie pas avec le degré de la raréfaction. — M. Berthelot a repris les expériences de M. Schützenberger sur la condensation de l'oxyde de carbone au moyen de l'effluve; en entourant d'un manchon d'air sec l'électrode d'eau acidulée, il s'assure que cette électrode ne cède au travers du verre aucune trace d'eau; le produit brun de condensation ne s'en forme pas moins, mais décomposé par la chaleur à l'abri de l'air, il n'abandonne pas une proportion d'hydrogène supérieure à un millième. — Electrolysant un mélange d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique, Buff a démontré que les deux corps se décomposent en proportions constantes, quelle que soit l'intensité du courant; M. L. Houlléveigne a trouvé que cette loi s'applique au mélange de deux sels en dissolution aqueuse, mais les chiffres trouvés expérimentalement semblent s'en écarter, à cause de la réaction du sulfate de cuivre sur le zinc déposé. — Pour préparer les betaines, M. E. Duvillier indique que le meilleur procédé consiste à faire réagir un éther iodhydrique sur le sel de zinc des acides amidés en présence d'oxyde de zinc. — M. G. Arachequesne décrit la façon dont il a modifié le procédé de Krämer, basé sur la transformation en iodoforme de l'acétone, pour doser exactement ce produit dans les mélanges où il se trouve en grande proportion.

— Pour doser rapidement la matière grasse du lait, M. Lezè fait bouillir celui-ci avec deux fois son poids d'acide chlorhydrique, puis neutralise par de l'ammoniaque diluée; tout le beurre est alors mis en liberté et vient surnager le liquide; il suffit alors de lire le volume qu'il occupe. — M. Schloësing répond aux observations présentées par M. Berthelot à son travail sur l'absorption de l'ammoniaque atmosphérique par les terres, que les faits avancés par lui sont des faits d'observation bien établis et que toute discussion est inutile.

3^{re} SCIENCES NATURELLES. — M. Louis Mangin a trouvé dans diverses membranes cellulaires végétales une substance distincte de la cellulose et de la pectine, et qui joue un rôle important; il lui a donné le nom de *callose* parce qu'elle forme les cals des tubes cribreux libériens. — M. L. Ranvier a étudié la contraction musculaire sur les fibres striées rubanées qu'il a décrites dans la membrane rétrolinguale de la grenouille; ces fibres étant tendues sous la lamelle couvre-objet, il les excite par un choc d'induction très faible, et observe avec un fort grossissement; il a vu que les disques épars seuls se raccourcissent en s'élargissant, tandis que les autres éléments de la fibrille s'étirent. — En étudiant le développement des éponges siliceuses, M. Yves Delage a constaté que les cellules ciliées qui pointent tout autour de l'embryon au stade *Morula* rentrent plus tard à l'intérieur et constituent l'endoderme de l'animal adulte. — M. Kunkel d'Herculais a constaté chez le *Stenonotus maroccanus* (sauterelles d'Algérie) l'existence d'une ampoule que l'animal fait saillir entre sa tête et son prothorax; cette ampoule, gonflée par le liquide sanguin, sert à faire éclater les coques ovigères, la membrane d'enveloppe à la mue, etc. — M. Cotteau donne la diagnose de six échinides fossiles du Mexique, que leurs caractères paléontologiques doivent faire considérer comme crétacés. — En expérimentant sur les animaux, MM. Joly et B. de Nabias ont constaté que l'hydrogène arséné agit sur le sang en dissolvant l'hémoglobine et en transformant une partie de celle-ci en méthémoglobine. — M. Gamaléia stérilise par la chaleur des cultures du microbe du choléra, a vu leurs propriétés se modifier suivant la température à laquelle elles ont été portées; chauffées à moins de 70°, elles sont très toxiques et provoquent la diarrhée; chauffées à une température supérieure, elles ne provoquent plus de diarrhées, sont tolérées à des doses bien plus considérables et sont encore vaccinantes. — M. Bouchard insiste sur la différence entre les diastases toxiques, qui se détruisent par la chaleur, et les substances vaccinantes, qui y résistent entièrement. — D'une étude d'ensemble faite par M. Munier-Chalmas sur le bassin de Paris, il résulte que le gypse apparaît chaque fois que les dépôts affectent le caractère saumâtre; il manque dans les dépôts correspondants d'origine lacustre. Dans certaines couches, la silice a remplacé le gypse par pseudomorphose. — MM. Michel Lévy et Munier-Chalmas décrivent les nouvelles formes de silice cristallisée trouvées par M. Munier-Chalmas dans le bassin de Paris et nommées par lui *quartzine* et *lucécite*. — Des expériences de M. Thoulet, il résulte que pour diverses substances, ponce, corail, coquilles calcaires, etc., l'eau de mer possède un pou-

voir dissolvant bien plus faible que celui de l'eau dans les mêmes conditions. — **M. G. Rolland** s'appuyant sur les faits qu'il a observés à El Goleah, combat l'opinion qui veut que le dépôt des dunes sahariennes, en des points déterminés, soit provoqué par l'humidité du sous-sol en ces points; c'est au contraire la dune qui emmagasine l'eau, après s'être formée sous l'influence du relief. — **M. Chevalier** envoie divers renseignements sur un tremblement de terre à Shang-Hai et les mouvements des boussoles pendant le phénomène.

Séance du 31 mars 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. de Jonquières** montre, par l'analyse d'un ouvrage posthume de Descartes (*De solidorum elementis*), que l'illustre philosophe avait connu, dès sa jeunesse, et rédigé avec précision tous les principes et les théorèmes de la polyédrométrie élémentaire, tels qu'on les trouve aujourd'hui dans les *Traité*s les plus complets. — Les théorèmes relatifs à la statique graphique des arcs élastiques ont jusqu'à présent négligé les déformations de l'ordre de la tension longitudinale et de l'effort tranchant; **M. B. de Fonviolat** montre que, pour tenir compte de ces quantités, il suffit de remplacer dans les théorèmes précédents les forces fictives parallèles, appliquées aux divers éléments de la fibre moyenne, par des forces fictives parallèles aux premières et appliquées aux divers éléments des trois lignes conjuguées. — **M. G. Bigourdan** : Observation de la nouvelle comète Brooks (à 1890) à Paris. **MM. G. Rayet** et **L. Picart** : Observations de la comète Brooks (21 mars 1890), à Bordeaux. — **M. Charlois** : Observations et éléments de la nouvelle planète (289), découverte à l'observatoire de Nice, le 10 mars 1890. — **M. Spærer** : Sur la position de la tache solaire du 4 mars.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — **M. R. Colley** expose une interprétation physique approximative des équations différentielles du mouvement de l'électricité dans les deux circuits des bobines d'induction. — **M. André Le Châtelier** a trouvé qu'à une même température la valeur de l'érouissage des métaux va constamment en décroissant sous l'influence du recuit, et tend vers une valeur limite d'autant plus faible que la température a été plus élevée. — **M. Daniel Berthelot**, cherchant une relation entre les fonctions chimiques des corps et leurs conductibilités électriques, a trouvé que les conductibilités des trois acides oxybenzoïque sont très distinctes, décroissent dans l'ordre ortho, méta, para et diffèrent de celles des phénols correspondants. — **M. B. Walter** cite des déterminations d'indices de réfraction qui contredisent la loi de M. Doumer selon laquelle les pouvoirs réfringents moléculaires des sels seraient des fonctions du nombre des valeurs de leurs éléments métalliques. — **M. P. Schutzenberger** expose que dans les tubes à effluve où il condense l'oxyde de carbone, il faut admettre le passage de l'eau à travers le verre, puisque des dispositions particulières ont été prises pour s'opposer à l'introduction de l'eau par la pompe employée pour extraire l'acide carbonique. **M. Berthelot** fait remarquer, à ce propos, que de petites quantités d'humidité, adhérentes à la paroi interne du verre, ont pu s'accumuler dans le tube par le fait de la grande masse du mercure et de la répétition de ses refoulements. — **M. J. Fogh** explique par la thermo-chimie les réactions de l'hyposulfite de soude sur les sels d'argent. — Par l'analyse d'un objet en métal datant de près de 4000 ans avant notre ère, **M. Berthelot** avait établi que l'âge du bronze a été précédé d'un âge du cuivre. **M. V. Marciano** montre que l'étude de la métallurgie précolombienne au Vénézuëla conduit à la même conclusion. — **M. Ph. Guye**, partant de l'hypothèse de **MM. Le Bel** et **Van t'Hoff**, relative aux valences tétraédriques du carbone, étudie les modifications que la substitution fait subir à leur équilibre, et les variations corrélatives de leur symétrie et leur pouvoir rotatoire : 1^o toutes les

fois que par le fait d'une substitution, le centre de gravité de la molécule reste des mêmes côtés des plans de symétrie du carbone, le pouvoir rotatoire du dérivé substitué ainsi obtenu conserve le même signe; 2^o si la substitution éloigne le centre de gravité des places de symétrie de la molécule, elle augmente en même temps le pouvoir rotatoire; 3^o si elle déplace le centre de gravité d'un côté de l'un des plans de symétrie à l'autre côté, elle entraîne le changement de sens du pouvoir rotatoire. — **M. Meslans** applique les récentes découvertes de **M. Moissan** à la préparation du fluorforme; il indique les propriétés de ce corps. — **M. P. Cazeneuve**, étudiant les phénols sulfoconjugués du camphre ordinaire, a reconnu que c'est l'oxhydride de l'acide sulfurique qui se fixe sur le noyau aromatique pour le transformer en phénol.

3^o SCIENCES NATURELLES. — **M. Ranvier** expose une méthode nouvelle pour observer au microscope les éléments et les tissus des animaux à la température physiologique. Il plonge dans un courant d'eau chaude préparation et microscope muni d'un objectif à immersion. — **MM. Georges Pouchet** et **Beauregard** décrivent le squelette et surtout la tête d'un cachalot récemment échoué à l'île de Ré. — **M. Verneuil** présente des moulages de pieds bots phlébétiques; à la suite de certaines phlébites et causées par elles, il a observé certaines difformités des pieds et des orteils dont la formation dans ces conditions n'avait pas encore été signalée. — **M. L. Cuenot** montre que chez deux animaux du même genre, les *Aplysia depilans* et *punctata*, le sang présente des différences remarquables de composition. Chez le premier il est coloré par un albuminoïde coagulable par l'alcool, tandis que chez le second il contient une hémocyanine incolore. Il a en outre recherché chez ces animaux l'origine des amibocytes. Il en attribue la production à la crête de l'aorte, renfermée dans le péricarde. — **M. Léon Guignard**, poursuivant ses investigations sur le rôle essentiel des noyaux sexuels dans la fécondation, décrit l'accouplement du noyau mâle au noyau femelle chez le *Lis Martagon*. — **M. G. de Lagerheim** signale l'*Uredo Viala* comme un nouveau parasite dangereux de la Vigne. — **M. Termier** décrit la série des roches éruptives du Mézenc et du Meygal et constate l'existence de l'argyrite dans les phonolithes du Velay. — De nombreuses analyses de quelques roches du Nord de la France, surtout de diverses craies, **M. Henri Bursault** conclut que la composition chimique n'intervient pas seule pour modifier l'aspect des roches sédimentaires; ni le phosphate de chaux, ni la magnésie ne produisent le durcissement. La cause du durcissement de la craie est bien plus physique que chimique. — **M. A. Julien** énumère les résultats de ses recherches sur le carbonifère marin du Plateau central.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 2 avril 1890.

MM. Raimbert (de Chateaudun) et **Diday** (de Lyon) sont élus membres associés nationaux.

M. le Président annonce la mort du Professeur Trélat et lève la séance en signe de deuil.

Séance du 8 avril 1890.

M. Heckel (de Marseille) adresse une note sur les propriétés physiologiques de la noix de Kola. Il a observé qu'après épuisement de la caféine par le chloroforme, la poudre de Kola conserve encore une action très sensible sur l'élément musculaire (suspension de la fatigue) avec très faible excitation nerveuse. Cette poudre contient donc d'autres principes que la caféine, très actifs et non encore isolés; du reste, elle agit à doses très faibles: ainsi des officiers français ont pu franchir 72 kilomètres en 12 heures, en n'absorbant, à doses fractionnées, qu'une quantité de poudre correspondant

à 0,15 de caféine. De plus, elle empêche l'essoufflement, ainsi que l'ont constaté les membres du Club-Alpin français dans leurs grandes ascensions; elle empêcherait même le mal de montagne et régulariserait la circulation aux grandes altitudes. Il regrette, depuis 6 ans qu'il l'a proposé, de n'avoir pu encore en avoir fait adopter l'usage dans l'armée. **M. Colin**, répond qu'on ne peut l'adopter avant que la chimie en ait parfaitement défini les principes actifs. — **M. G. Gautier** lit un travail relatif au traitement des fibromes intra-utérins par la galvano-caustique chimique intra-utérine et monopolaire de l'utérus. — **M. Lesage** présente un travail sur l'origine microbienne du choléra infantile. Il a isolé un micro-organisme (rencontré aussi dans le choléra nostras) bacille dans les bouillons et dans l'intestin, microcoque sur les surfaces sèches de culture, se cultivant à 38° sur gélose, ne se décolore pas par la méthode de Graham, sécrétant une substance alcaline, à odeur d'aubépine, analogue à celle sécrétée par le bacille virgule. Cette substance est toxique, tue à la dose de 4 à 5 milligrammes en produisant l'algidité et les lésions intestinales du choléra. Elle peut être isolée des viscères, des muscles des animaux morts du choléra jusqu'à la 4^{me} série. Elle existe également dans l'urine, ce qui explique comment Bouchard a produit le choléra expérimental avec l'urine des cholériques. En collaboration avec **M. Winter**, **M. Lesage** a isolé cette substance du microbe pathogène du choléra infantile ainsi que du bacille virgule de Koch; celle-ci a produit dans les deux cas le choléra expérimental.

D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 29 mars 1890.

M. Laguesse a continué ses recherches sur le développement de la rate. Il a constaté que chez l'embryon de la truite, les vaisseaux de la rate se forment par des vacuoles creusées dans le tissu aréolaire dont l'organe est composé; ces vacuoles se mettent en communication avec la veine centrale de l'organe, et se tapissent d'un endothélium provenant de cette veine. Lours parois donnent alors naissance à des éléments figurés libres, semblables à des leucocytes, qui sont entraînés par le sang. C'est là le début de la fonction hématopoïétique de la rate. — **M. Verdin** présente: 1° un sphymographe chronométrique construit par lui sur les indications de **M. Jaquet** de Bâle; cet appareil donne un tracé analogue à celui du sphymographe de Marey, et en plus le tracé des secondes; 2° un *pneumographe* construit par lui en collaboration avec **M. Tata** de Bombay; cet appareil est mis en mouvement par le courant d'air inspiré ou expiré au moyen d'un dynamomètre spécial. — **M. Laborde** a étudié la force musculaire des animaux auxquels on a enlevé le cerveau; ces recherches lui ont montré que la vigueur musculaire reste entière malgré l'incoordination; dans les premiers moments seulement après l'opération, la force est amoindrie, sans doute sous l'influence du shok.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 27 mars 1890.

SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. G. R. Bryan**. Sur la stabilité d'un sphéroïde de liquide parfait en rotation. L'auteur discute les conditions de stabilité par rapport aux variations d'un type général qui peut s'exprimer en termes d'harmoniques sphériques; son but est de rechercher si la condition de Riemann est suffisante pour assurer la stabilité dans d'autres déplacements que les déplacements ellipsoïdaux. Les résultats qu'il a trouvés s'accordent avec ceux de Riemann, Basset et autres; ils démontrent que le sphéroïde de Mac Laurin, s'il est formé de liquide absolument dénué de viscosité, est parfaitement stable, si son excentricité est infé-

rieure à 0,9323867. Si l'excentricité dépasse cette limite, la forme sphéroïdale devient instable et le liquide prend la forme d'un ellipsoïde.

SCIENCES NATURELLES. — **MM. J. N. Langley** et **W. Lec Dickinson**. Sur la paralysie progressive des différentes classes de cellules nerveuses du ganglion cervical supérieur. Le but de ce travail est de déterminer si les cellules nerveuses sont paralysées toutes ensemble ou successivement et dans un ordre défini. La méthode employée consiste à utiliser l'action paralysante de la nicotine; a) on en injecte dans une veine en quantité insuffisante tout d'abord pour occasionner la paralysie complète du sympathique cervical, on en injecte successivement de nouvelles doses et on note l'ordre dans lequel disparaissent les effets normalement produits par l'excitation du sympathique cervical; b) on injecte une quantité de nicotine suffisante pour déterminer la paralysie complète du sympathique cervical, puis on l'excite à courts intervalles et on note l'ordre de réapparition des effets normaux de chaque excitation. D'une manière générale, les excitations du minima sympathique cervical chez le chien déterminent la paleur des lèvres et des gencives; les excitations faibles et les excitations d'intensité moyenne, la paleur et consécutivement la rougeur; les excitations fortes, comme Dastre et Morat l'ont montré, la rougeur d'emblée; mais l'étendue et la durée de l'effet primitif et de l'effet secondaire, lorsqu'il y en a un, varient d'un chien à l'autre. Les effets de ces excitations chez le lapin et le chat sont aussi indiqués. Les faits montrent que chez les divers animaux la nicotine fait disparaître presque simultanément la plupart des effets de l'excitation du sympathique cervical.

Richard A. GREGORY.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 21 mars 1890.

M. Herbert Tomlinson étudie le point critique de Villari, dans le fer et le nickel. Villari a montré que la perméabilité magnétique du fer est augmentée par une traction longitudinale, pourvu que la force magnétique ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle une traction produit au contraire une diminution de la perméabilité. La valeur de la force pour laquelle une traction ne produit aucun changement dans la perméabilité est connue sous le nom de point critique de Villari. L'auteur ne croit pas que l'on ait observé jusqu'à présent un point critique analogue pour le nickel; il a, par l'étude de l'aimantation temporaire, découvert dans ce corps un point tout à fait comparable. Les expériences ont été faites en déterminant par la méthode balistique l'induction produite par les morceaux en expérience, les morceaux étant soumis à des charges connues. Pour le fer recuit, la valeur critique de la force décroît quand la charge croît, et le point critique de Villari est beaucoup plus bas pour l'aimantation temporaire que pour l'aimantation totale. Avec une charge de 4 kilos, 7 sur un fil de 1^{mm} de diamètre, la valeur de la force produisant le point temporaire est de 28 unités C. G. S. Pour une force magnétisante donnée, il y a généralement deux valeurs de la charge qui n'ont aucun effet sur l'aimantation temporaire. Avec le nickel, la valeur critique de la force est beaucoup plus grande, 114 unités C. G. S. pour une charge de 10 kilos sur un fil de 0^{mm}8 de diamètre. — **M. Sheldford Bidwell** dit que le professeur Thomson, s'appuyant sur le changement de longueur produit par l'aimantation, a prévu l'existence d'un point de Villari dans le cobalt comprimé, et ce fait a été vérifié expérimentalement. En appliquant un raisonnement analogue au cas du nickel, on ne devrait pas s'attendre à trouver un point de Villari, que sir W. Thomson et le professeur Ewing ont d'ailleurs cherché en vain dans ce cas. Dans des expériences, encore inachevées, il a examiné la façon dont se com-

porte le nickel, soumis ou non à une charge, quand il est sous l'action de forces magnétisantes variables. Le métal se contracte dans tous les cas quand il est aimanté. — Le *prof. S. P. Thompson* décrit un *prisme de Bertrand*. L'appareil se compose essentiellement d'un prisme à réflexion totale en spath, qui montre à l'œil nu les anneaux et les croix que l'on observe en lumière convergente dans un polariscope. Si l'on remplace le spath par du quartz, la double réfraction de cette substance étant très faible, on ne voit plus guère directement les anneaux, mais en projection on aperçoit encore des traces très visibles de ces anneaux. — *M. T. Mather* examine les formes des bobines mobiles employées dans les instruments de mesure électrique; il recherche quelle est la forme à donner à la section horizontale des bobines des galvanomètres du type d'Arsonval, électrodynamomètres, wattmètres, etc. Se donnant une période constante et un moment d'inertie constant par rapport à l'axe de rotation, il montre que la meilleure forme de la section pour les instruments de zéro est composée de deux cercles tangents à la direction du champ produisant la déviation, au point autour duquel la bobine est mobile; dans les instruments ordinaires du type d'Arsonval, on n'emploie que 45 % environ du moment de la déviation. *M. C. V. Boyss* dit qu'il a lui-même été conduit à donner à ses instruments des formes semblables. — *M. Agerton* fait aussi observer que le professeur Perry et lui-même ont montré à la Société des arts un wattmètre où la bobine avait une forme analogue et qui donnait un moment de déviation égal à 95 %, du maximum.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Séance du 1^{er} mars 1890

Le comte d'Espiennes envoie un mémoire sur la climatologie de la Belgique. Le point où l'on observe le froid le plus vif est, comme on sait, non pas la Baraque Michel, mais bien plutôt Ville-du-Bois, près Vielsalm, à une altitude inférieure de 275 mètres à celle de la Baraque. L'explication suivante du phénomène paraît très rationnelle. L'air refroidi sur les Hautes-Fagnes, et devenu plus dense par ce fait même, descend la pente qui s'étend de ces sommets à Ville-du-Bois, continue de rayonner en descendant et arrive plus froid qu'à son point de départ. Toutefois, aucune expérience directe n'était encore venue confirmer cette explication. D'où l'intérêt des observations suivantes de l'auteur, réalisées à Sey près Ciney : « Observant, dit-il, la répartition des dégâts occasionnés par la gelée sur les arbres, lors du terrible hiver 1879-1880, j'ai été frappé de ce que presque tous les arbres détruits se trouvaient dans le fond des vallées, tandis que ceux qui étaient sur les pentes ou sur les sommets des collines étaient épargnés. Pour en rechercher les causes, j'ai entrepris simultanément des observations thermométriques et anémométriques sur les sommets des collines, sur les pentes et dans les fonds des vallées adjacentes. Ces recherches n'ayant lieu que par des temps calmes, pour mieux apprécier la direction suivie par les courants aériens, je me servais de petits morceaux de bougies allumés, placés sur le sol, et dont l'inclinaison de la flamme me donnait d'une manière très précise la direction et l'intensité du plus faible courant d'air. Il résulte de l'ensemble de mes observations que : 1^o pendant les nuits des temps calmes et serains (condition absolument nécessaire à la production du phénomène) l'air, en se refroidissant, s'écoule, dès le coucher du soleil, du sommet des collines vers le fond des vallées, et qu'arrivé dans celles-ci, il en suit le cours plus ou moins rapidement selon l'inclinaison de la pente. Les sommets deviennent alors le siège de véritables appels d'air dont la température est relativement fort élevée par rapport à celle des versants et des vallées; 2^o la plus basse température minima dans un pays accidenté

aura toujours lieu (lors des situations atmosphériques indiquées plus haut) dans les vallées et principalement dans celles dont la pente est faible ou presque nulle; et, dans ce cas, si un obstacle quelconque vient à barrer la vallée, tel qu'un bois, un remblai, etc., l'air froid descendu des hauteurs avoisinantes, entravé dans sa circulation, vient s'accumuler en amont de l'obstacle et y former, si l'on peut ainsi dire, de véritables marais d'air, qui peuvent atteindre, même en été, la température de 0 degré et même moins, le rayonnement pendant la stagnation de l'air continuant à en abaisser la température. C'est en ces points où se produisent, pendant les nuits calmes et claires, ces brouillards intenses, en forme de nappes blanchâtres de quelques mètres à peine d'épaisseur, que, malgré la chaleur développée par la condensation des vapeurs et l'abri qu'elles apportent au rayonnement, la gelée détruit presque chaque année, au printemps ou même en été, les pommes de terre, le seigle en fleur, les légumes des jardins potagers et, lors des hivers exceptionnels, les arbres fruitiers. Au point de vue agricole, on doit donc éloigner les cultures délicates de ces emplacements qui sont toujours très nuisibles pour toute espèce de végétation, étant souvent pendant les journées d'été de véritables fournaies, et de véritables glaciers les jours suivants.

M. l'abbé Renard présente une notice sur les cristaux de phillipsite du centre du Pacifique. Après avoir montré, dans une précédente communication, l'existence, dans les argiles sous marines de cet océan, de cristaux microscopiques de phillipsite dont il a déterminé les formes cristallographiques et la composition chimique il fait connaître les conditions bathymétriques et les associations minérales de ces cristaux zéolithiques. Il conclut qu'ils sont formés par l'action des eaux marines sur les produits volcaniques basiques, qui tapissent le lit de l'océan dans cette région du Pacifique.

F. F.
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE SAINT-PETERSBOURG

Séance du 11 mars.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — *M. Bortkevitch* présente un mémoire sur « la mortalité et la longévité de la population de la Russie d'Europe » où il donne une nouvelle formule pour le calcul approximatif de la vie moyenne et critique certaines méthodes de statistique, surtout celle qui pour la détermination de la vie moyenne se sert de la moyenne arithmétique des nombres inverses des coefficients de la natalité et de la mortalité. Les calculs portent sur les données de la statistique décennale (1874 à 1884) concernant la population grecque-orthodoxe de la Russie d'Europe. — *M. Netchoghin* présente un mémoire sur la division de l'angle en trois parties égales, par approximation, en basant ses calculs sur les données des mathématiques spéciales.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — *M. Chklar* présente une nouvelle application du microphone pour avoir l'armée de l'approche de l'ennemi sur terre et sur mer.

3^o SCIENCES NATURELLES. — *M. Th. Schmidt* lit le rapport sur sa mission géologique en Suède; cette mission avait pour but la comparaison des formations siluriennes des îles Esel et Gotthland (dans la Baltique). — *M. Goldberg* présente un mémoire sur le « développement des ganglions nerveux chez le poulet », dont voici les conclusions : 1) Les ganglions rachidiens et céphaliques se forment au dépens de l'ectoderme (chez le poulet, la bécasse et le tétard). 2) Le rudiment des ganglions rachidiens et de certains ganglions céphaliques est visible sur une coupe 35 heures après l'incubation; il apparaît alors

comme une masse cellulaire entre l'ectoderme, le tube médullaire et la protovertèbre. 3) Tous les ganglions rachidiens se développent d'après le même type; la masse cellulaire dont on vient d'esquisser la formation envoie un prolongement en bas, vers l'espace triangulaire compris entre l'ectoderme, la protovertèbre et le tube médullaire; ce prolongement forme, en s'agrandissant, après la destruction des protovertèbres, le ganglion rachidien ayant la forme d'un ovoïde. 4) Les racines des nerfs sortent du tube médullaire (les antérieures ou ventrales avant les postérieures ou dorsales, c'est-à-dire vers la fin du 3^e jour) sous forme de fibres excessivement fines; les fibres de la racine postérieure traversant la masse même du ganglion tandis que les antérieures sans y pénétrer suivent son bord inférieur; en dehors du ganglion les deux racines se réunissent en une seule tige nerveuse. 5) Chaque ganglion rachidien correspond par sa situation à un segment du tube médullaire (neurone). 6) Les ganglions céphaliques se forment de deux façons différentes : a) soit au dépens de la masse cellulaire déjà décrite comme les ganglions rachidiens; les ganglions de la région de l'oreille : *cellulaire* et de *gasser* (3^e paire), le ganglion *otique* (8^e paire), le ganglion d'*Andersch* (9^e paire), etc. b) soit immédiatement au dépens de la paroi des vésicules cérébrales, comme par exemple le ganglion *général* ou les ganglions des nerfs optiques (3^e jour de l'incubation). 7) Les ganglions sympathiques apparaissent le 4^e jour de l'incubation, sous forme d'amas cellulaires situés sous la racine antérieure (ou ventrale), et qui se détachent nettement au milieu des cellules mésodermiques environnantes. Ces ganglions accompagnent le nerf dans son trajet ultérieur. Les rameaux anastomotiques des ganglions n'apparaissent que beaucoup plus tard.

Séance du 25 mars 1890.

M. Imchenetski présente une note sur la signification géométrique de la formule d'Euler pour l'expression approchée des quadratures. — M. Backlund présente un exemplaire de son « rapport préliminaire sur les travaux astronomiques faits par l'expédition de Timain (dans le nord-est de la Russie), pendant l'été 1889. » extrait des Mémoires du Comité géologique. — M. le D^r Soupronnenko fait don à l'Académie des collections zoologiques et anthropologiques réunies par lui dans l'île de Sakhalin.

O. BACKLUND,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 20 mars 1890.

SCIENCES NATURELLES. — M. A. Fleischmann, de Erlangen, communique un travail sur la parenté des Rongeurs avec les Marsupiaux. M. Fleischmann décrit spécialement chez ces deux ordres de mammifères les identités, les transitions et les analogies du système dentaire, de l'angle du maxillaire inférieur, du processus coronoïde, du condyle glénoïdal, de la forme et de la structure de l'estomac, de la disposition des organes urogénitaux, du nombre, disposition et structure des mammelles, de la disposition du larynx, de la forme extérieure et de la structure de l'encéphale, de la disposition des nerfs spinaux et surtout des formes embryonnaires. L'auteur conclut qu'au point de vue phylogénétique tous les organes des Rongeurs dérivent de ceux des Marsupiaux et qu'on peut expliquer logiquement chez les espèces actuellement vivantes les variations de formes à l'aide des dispositions ancestrales. Une parenté analogue existerait entre les Insectes et les Chauves-souris d'une part et les Marsupiaux carnivores d'autre part. L'auteur développera cette thèse dans une communication ultérieure.

J. F. HEYMANS.

SOCIÉTÉ DE PHYSIOLOGIE DE BERLIN

Séance du 28 mars 1890.

M. E. Salkowsky : L'eau chloroformée est antiseptique, tue les êtres et les ferments organisés, mais n'aurait aucune action sur les ferments inorganisés. De la levure de bière mise à digérer avec de l'eau chloroformée donne en quantité relativement considérable un sucre lévogyre et fermentescible, tandis que de la levure traitée par de la vapeur d'eau ne donne pas de sucre par la digestion dans l'eau. A côté du sucre se forment encore des produits de décomposition des substances albuminoïdes, comme la leucine, la tyrosine, la xanthine. Du foie broyé mis à digérer avec de l'eau chloroformée donne également une plus grande quantité de produits de décomposition que le foie stérilisé par la vapeur d'eau. Il en est de même du muscle. De sorte que l'auteur conclut à la présence constante de ferments dans les tissus animaux. — M. S. Rosenberg démontre une nouvelle réaction de l'acide urique, plus sensible que celle du murexide. L'acide urique donne avec l'acide phosphotungstique en milieu alcalin une coloration bleue intense, encore sensible dans une solution à 1 pour 80.000. Dans l'urine des carnivores et dans celle de l'homme l'acide urique est seul cause de la coloration bleue; celle des herbivores contient différentes substances qui produisent la même coloration qu'il faut d'abord éliminer. — M. Goldscheider a fait sur le sens du goût les mêmes recherches que Oehrwall et est arrivé également à la conclusion que les différentes saveurs sont perçues par des terminaisons nerveuses différentes. — D'après les recherches de M. Argutinsky le travail musculaire s'accompagnerait d'une élimination plus grande de substances azotées. M. J. Munck a repris l'étude de cette question; d'après lui l'organisme qui a à sa disposition une quantité suffisante de substances nutritives et d'oxygène accomplirait son travail musculaire en consommant seulement des substances hydrocarbonées. Si l'alimentation est insuffisante, ou s'il y a une dyspnée, alors les substances albuminoïdes sont entamées et le travail musculaire s'accompagne d'une élimination plus grande de corps azotés.

J. F. HEYMANS.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 20 mars 1890.

Le président M. Stephan présente un mémoire sur la conductibilité calorifique des dissolutions salines. — Le D^r Niemelowicz a entrepris des recherches sur le Bromalglycérique et l'acide tribromopropionique. Si l'on fait agir l'acide sulfurique et l'acide bromhydrique sur la glycérine, suivant la température et la quantité de brome employée, la glycérine se transforme en bromalglycérique (α et β , tribromopropion aldéhyde) et en acide tribromopropionique correspondant. Comme produits accessoires on obtient un polymère liquide du dibromure d'éthylène. La constitution du bromalglycérique a été déduite de l'action de la potasse étendue qui fournit, comme produits de la décomposition, l'acide formique, l'acide bromhydrique et le dibromure d'éthylène dissymétrique. L'auteur indique également un procédé qui permet d'obtenir facilement à l'état de pureté le bromalglycérique et l'acide tribromopropionique. — M. C. Claus a étudié l'organisation de Cyprides. La science a fait aujourd'hui des progrès considérables, qui permettent d'appliquer à ces êtres des procédés d'étude bien préférables à ceux employés par les anciens auteurs. M. Claus fait des coupes durcies et colorées suivant les méthodes connues; il a ainsi examiné successivement : le système nerveux, les organes de la vision, le squelette, l'appareil digestif, les organes de sécrétion, et de reproduction.

Emil WEYR,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE NAPLES

Séance du 8 février 1890.

M. Ogliarolo a réalisé en collaboration avec M. E. Rosini l'acide orthonitrophénylcinnamique et l'hydrophénylcarbostirile. Ces nouveaux composés correspondent à l'acide orthonitrocinnamique et au carbostirile; ils ont été préparés en faisant agir l'orthonitrobenzaldéhyde sur le phénylacétate sodique et en réduisant par l'amalgame de sodium le nouvel acide orthonitrophénylcinnamique qui en résulta.

Séance du 1^{er} mars 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Reina étudie la *Théorie des normales à une surface*. Il démontre plusieurs théorèmes importants de géométrie différentielle relatifs aux normales à une surface quelconque. En appelant conjuguées deux directions d'éléments linéaires infiniment petits dans le plan tangent d'une surface en un point, lorsqu'il y a coïncidence avec les directions de deux diamètres conjugués de la conique indicatrice de Dupin en ce point, M. Reina montre que la plus petite distance des normales à une surface menée par les extrémités d'un élément linéaire infiniment petit, est parallèle à la direction conjuguée de cet élément, de sorte que la direction conjuguée à celle d'un élément est donnée par l'intersection de la surface avec le plan conduit par la normale à une extrémité de l'élément, et par sa plus petite distance de la normale à l'autre extrémité. En supposant la surface à courbure positive, en considérant la normale en un point et le conjugué harmonique de ce point par rapport à deux centres de courbure principaux appartenant à cette normale, M. Reina trouve deux théorèmes relatifs aux perpendiculaires à la normale, lesquelles sont symétriques par rapport aux sections principales, et passent par ce point conjugué harmonique. En variant de position sur la surface la locale de son conjugué harmonique, construit comme nous venons de le dire, il constitue une seconde surface conjuguée de la première. Or l'auteur démontre que la surface conjuguée d'une autre surface donnée est le lieu des lignes de rétrécissement (*stringimento*) des surfaces réglées constituées par les normales à la surface donnée le long de ses *lignes caractéristiques*. (Sur ces lignes l'auteur a présenté un travail aux *Lineei*, Vol. V, fasc. 21.) Le système des normales à la surface conjuguée coïncide avec le système des normales à la surface donnée, lorsque celle-ci est à courbure moyenne constante; dans ce cas la surface conjuguée est à courbure négative et lesdites lignes de rétrécissement (*stringimento*), qui se trouvent sur elle

sont des signes asymptotiques; par conséquent si la surface donnée est à courbure moyenne constante positive et si l'on construit la surface conjuguée correspondante, ces deux surfaces sont telles que les normales à l'une le long des lignes caractéristiques coupent l'autre le long des lignes asymptotiques, et en outre l'angle compris entre les lignes caractéristiques qui se coupent en un point de l'une est égal à l'angle entre les lignes asymptotiques au point correspondant de l'autre. — M. Fergola donne lecture d'un rapport sur une note de M. Angelitti sur une modification à la méthode dite de Talcott pour déterminer la latitude géographique. M. Angelitti propose une modification utile montrant qu'on peut éviter l'usage de la vis micrométrique et ce en remarquant tout simplement les instants dans lesquels les deux étoiles du couple, qu'il faudrait observer avec la méthode ordinaire, passent par un même fil de réticule, quelques minutes avant ou après leur culmination. On sait que la méthode de Talcott exige une grande perfection de l'appareil micrométrique; c'est pour cela que M. Angelitti propose une méthode qui le supprime.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Angelitti étudie les variations de la déclinaison magnétique observées à Capodimonte en 1888. — M. E. Scacchi fait connaître les caractères cristallographiques des fluosilicates de molybdène. Il s'agit de trois sels récemment découverts par M. Mauro. — M. Ogliarolo présente une note de M. Puiti sur la synthèse des Asparigines. C'est une importante contribution à complète connaissance de toutes les Asparigines qu'en théorie l'on peut prévoir.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Bassini donne lecture d'un rapport sur une Note de M. Meschinelli relative à quelques instruments provenant de plusieurs habitations lacustres de l'Europe. En ces dernières années on a extrait de plusieurs habitations de lacs (*lacustri*) des instruments en bois très curieux. Ce sont des espèces de pirogues, longues de moins d'un mètre et avec deux parties mobiles au centre. A l'étranger ces instruments ont été étudiés par MM. Hildebrandt, Hausmann, Merkel, Beschmann et Munro. M. Meschinelli s'occupe de ceux rencontrés en Italie dans la vallée Fontega. On les a tenus tour à tour pour viviers de poissons, trappes à poissons, à loutre, à castor, et enfin on a supposé qu'ils étaient des modèles de barques pour faciliter la pêche. M. Meschinelli refait l'histoire de la question avec beaucoup de clarté et d'ordre et conclut que les instruments rencontrés en Italie étaient très probablement des trappes à oiseaux. — M. Licopoli expose un procédé pour observer au microscope certaines semences provenant des fouilles de Pompéi.

FRANCESCO SINIGAGLIA.

LE BANQUET DE LA SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Le 27 mars dernier, la Société de chimie de Londres a fêté dans un banquet de 150 couverts le cinquantième de sa fondation. Le Président, M. W. J. Russell, a rappelé à cette occasion les origines de la savante compagnie et les principales découvertes qui marqueraient les premières années de son existence. Sa création fut décidée par 25 chimistes parmi lesquels Grove et Playfair. Ils commencèrent par la doter d'un bulletin où, sous le nom de *Mémoires et Extraits*, ils publièrent à la fois des recherches originales et l'analyse des principaux travaux chimiques de l'étranger. Bien que paraissant irrégulièrement, ce bulletin obtint un grand succès. Le haut intérêt, tantôt spéculatif, tantôt pratique, des mémoires qui, dès ses débuts, y furent insérés, explique la rapidité de sa renommée. Sans doute la chimie a bien progressé depuis l'apparition de son premier volume, où Clark essayait de titrer la dureté d'une eau. Mais, quoique dépassant aujourd'hui, quantité de mémoires publiés par la Société méritent encore d'être consultés, soit en raison de leur grande valeur in-

trinsèque, soit aussi parce qu'ils permettent de mesurer le progrès qu'ils ont provoqué. Telles furent, dans le 2^e volume du bulletin, les recherches célèbres de M. Muspratt et von Hoffmann relatives à la préparation de l'aniline par la nitrobenzine. La découverte du coton-poudre, consignée dans le 3^e volume (1817) attira sur la Société l'attention des praticiens. Alors furent créés à Londres 3 laboratoires pour les recherches originales de chimie. Les découvertes qui en sortirent, publiées par la Société, intéressèrent le public: MM. Abel et Roumey y faisaient connaître la composition chimique de l'eau de Trafalgar square et de Cheltenham; M. Mansfield indiquait l'intérêt scientifique et pratique du goudron, jusqu'alors regardé comme un produit sans valeur. Il montrait toute l'importance, pour la théorie et l'application, de l'étude chimique de la benzine. Tous ces travaux et bien d'autres jetèrent sur la Société un grand éclat. C'est à eux surtout qu'elle dut sa prospérité naissante. Il était juste de le rappeler en célébrant la cinquantième année de sa fondation.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

EDMOND HÉBERT

Edmond Hébert, le chef de l'Ecole française de Géologie, s'est éteint le vendredi 4 avril à l'âge de 78 ans. Il était né en 1812 à Villefargeau (Yonne) où son père, ancien soldat de la République et de l'Empire, dirigeait une ferme importante. Après d'excellentes études au collège royal d'Auxerre, Hébert, qui se destinait au professorat, dut, pour avoir les ressources matérielles suffisantes, passer par la dure existence de maître d'études. Enfin en 1833 ses efforts furent couronnés de succès et il entra à l'Ecole normale supérieure. A sa sortie en 1836, il fut envoyé comme régent de physique au collège de Meaux. Il se fit remarquer par sa fermeté qui lui valut d'être rappelé en 1838 comme surveillant général à l'Ecole normale pour y maintenir la discipline. Il y resta jusqu'en 1857.

C'est à partir de 1840, époque à laquelle il fut nommé directeur des études, qu'il s'adonna à la Géologie. Jusque là il s'était consacré à l'enseignement de la Physique, enseignement qui d'ailleurs avait été fort remarqué. Mais la vie sédentaire ne lui convenait pas et ce fut par raison de santé qu'il entreprit ses premières courses géologiques qui furent suivies de tant d'autres dont les résultats eurent une si grande importance sur le développement de la Géologie en France. Il réunit ainsi une collection de fossiles qu'il rangea au point de vue stratigraphique et qui servit non seulement à son enseignement, mais encore à ses travaux de recherches et à ceux de ses élèves. Ce laboratoire, largement ouvert à tous les géologues fut pour ainsi dire le berceau de son Ecole.

L'année 1857 date dans l'existence d'Hébert, car au mois de février il soutint sa thèse; en mars il est chargé de cours à la Sorbonne, et en octobre il est nommé titulaire de la chaire de Géologie. Son enseignement, alors qu'il n'était que chargé de cours, avait été tellement remarqué que le Ministre de l'Instruction publique le nomma titulaire contre le vœu émis par la Faculté, qui présentait M. d'Archiac, membre de l'Institut. A la Sorbonne, Hébert créa un nouveau laboratoire qui, dès le début, fut fréquenté par un très grand nombre d'élèves. Aussi, lorsque M. Duruy, donna à l'enseignement supérieur une impulsion toute nouvelle par la création de l'Ecole des hautes études, le laboratoire d'Hébert fut-il immédiatement en état de fournir le personnel enseignant qu'exigeait, pour la Géologie, la nouvelle réforme.

L'enseignement qu'il donna, à la Sorbonne, dura plus de vingt ans. Il ne consistait pas seulement en leçons publiques, toujours riches en documents nouveaux puisés presque uniquement dans les faits observés par Hébert et rarement publiés par lui, mais encore en excursions qu'il dirigea lui-même et durant lesquelles il faisait bénéficier ses élèves de son immense savoir. En 1875, il dut renoncer à ces excursions, et à partir de 1885 il eut souvent recours à l'obligeance de M. Vélain pour achever son cours.

L'accueil bienveillant qu'Hébert faisait à tous ceux qui s'occupaient de Géologie eut pour le moins autant d'influence que son enseignement sur l'Ecole française. Il avait su ainsi grouper autour de lui beaucoup de bonnes volontés et provoquer chez les jeunes l'ardeur des recherches originales; aussi les thèses qui sortirent de son laboratoire sont-elles nombreuses et embrassent-elles toutes les parties de la Géologie.

L'œuvre scientifique d'Hébert est considérable et il serait impossible, ici, même d'énumérer tous ses travaux. Je me contenterai d'en donner un rapide aperçu.

Ses mémoires sur le Paléozoïque sont peu nombreux, mais quelques-uns sont d'une très grande

importance. A la suite de voyages en Bretagne, en Normandie et dans le Cotentin, il établit l'existence entre les Gneiss et le Cambrien, d'un terme nouveau, l'*Archéen* occupant la même position stratigraphique que le *Huronien* dans le Canada. Il démontra l'existence à cette époque d'un rivage qui correspond à un système de plissement de l'écorce terrestre, dont M. M. Bertrand a depuis établi la présence dans la partie septentrionale de notre globe. Dans l'Ardenne, il rapporta définitivement au Dévonien les dépôts du *Gédinien*, considérés jusque-là comme appartenant au Silurien.

Le Jurassique du Bassin de Paris fournit à Hébert un très grand nombre d'observations qui se trouvent résumées dans un important mémoire intitulé : *Les mers anciennes et leurs rivages dans le Bassin de Paris*. Plus tard, Hébert chercha par de nombreuses notes à démontrer que les Cévennes, la région subalpine et la Provence avaient été émergées après le dépôt du Corallien et étaient devenues un continent sur lequel n'avait pu se déposer le Jurassique supérieur. Il eut à cette occasion à soutenir une violente polémique avec l'Ecole qui admettait que l'on avait affaire à un faciès corallien qui se développait successivement, de l'Oxfordien jusqu'au Portlandien.

Lorsqu'Oppel découvrit le Tithonique, Hébert entreprit des voyages dans les Carpathes, la Moravie, les Alpes et les Cévennes à la suite desquels il crut pouvoir dire que les couches qui le constituent appartiennent à des termes nouveaux de la série crétacée, termes qu'il groupait sous le nom d'*Infrancécomien*. Ces dépôts, d'après lui, se seraient formés dans des dépressions auxquelles les couches à *Terebratula Moravica* auraient servi de rivage. Cette manière de voir fut vivement attaquée par une école pour qui ces dépôts représentaient les équivalents pélagiques du Portlandien et du Kimmeridien, tandis que les récifs coralliens n'en seraient qu'un faciès latéral.

Les travaux d'Hébert sur le terrain Crétacé sont des plus remarquables. Dans les premiers qu'il ait fait paraître, il montra les analogies du Crétacé de Mauléon et de Gensac avec celui de Maëstricht. Puis il parvint à établir, dans la masse de craie du Bassin de Paris, des divisions, d'abord contestées, mais aujourd'hui unanimement adoptées, qui sont toutes basées sur la présence de faunes spéciales, notamment sur celle de différentes espèces de *Micraster*.

Le bassin de Paris, si riche en horizons tertiaires a été l'objet de nombreuses études dans lesquelles Hébert établit les relations stratigraphiques de tous ces horizons entre eux. C'est ainsi qu'il introduisit la notion de faciès latéraux pour le terrain tertiaire. Il établit le premier que les couches lacustres de Champigny sont l'équivalent du Gypse et que les calcaires lacustres de Provins représentent les couches marines du Calcaire grossier supérieur. Il rechercha encore en dehors du bassin de Paris le prolongement des niveaux qu'il y avait si bien reconnus et put ainsi montrer que la mer tongrienne s'étendait encore en Angleterre, en Belgique, dans le nord de l'Europe, la vallée du Rhin jusqu'à Bâle, puis dans le Cotentin et l'Aquitaine. Il fit de même pour la mer de l'Eocène moyen. Il parcourut la Hongrie et toute la France méridionale, cherchant à établir entre ces bassins tertiaires et celui de Paris une comparaison qui fut une de ses principales préoccupations.

Je m'arrêterai là dans l'analyse de l'œuvre stratigraphique d'Hébert; mais que de notes il faudrait citer, tant leur importance a été grande au point de vue scientifique!

Les travaux d'Hébert au point de vue purement paléontologique, sont peu nombreux. Ils traitent du *Gastornis* et du *Coryphodon*, mais ces mémoires sont faits de main de maître.

Cette vie de travail si péniblement commencée s'acheva pour Hébert dans des conditions véritablement dignes d'envie. L'Académie des Sciences l'avait élu en 1877 membre de la section de Minéralogie. En 1878 il avait été acclamé président du congrès géologique international et par trois fois la société géologique l'avait élu son président. Ses collègues de la

Faculté des Sciences l'avaient choisi pour doyen en 1886 et 1889. La fatigue seule le força de résigner ces dernières fonctions que ses collègues eussent été heureux de lui voir garder plus longtemps, tant ils avaient apprécié son tact et sa modération. Enfin il eut auprès de lui jusqu'à son dernier moment une compagne dévouée qui savait prendre part à tous ses travaux et lui alléger le poids de la vieillesse.

Hébert ne laisse après lui que des regrets, car ce fut un vrai savant et un parfait honnête homme.

J. BERGERON.

NOUVELLES


SYNTHÈSE DE L'ACIDE GLUCONIQUE ET DE LA DEXTROSE

En terminant l'exposé des recherches entreprises par Fischer et Loew sur la synthèse des sucres, nous émettions l'avis, dans le dernier numéro de la *Revue*, que la reproduction artificielle de la dextrose suivrait sans doute de près celle de la mannite et de la lévulose. Notre attente n'a pas été longue, car, au moment même où notre article était sous presse, M. Em. Fischer annonçait, par l'organe des *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft* (1), qu'il était enfin parvenu, par la transformation de l'acide mannonique en acide gluconique, à passer de la série des mannoses synthétiques à celle de la dextrose.


Pour bien faire comprendre la possibilité d'une pareille réaction, comparons d'abord les propriétés optiques des sucres dérivés de la mannite à leur constitution moléculaire.

On sait, d'après les travaux de MM. Le Bel et Van't Hoff, que le pouvoir rotatoire des matières organiques est dû à la présence, dans leur molécule, d'un ou plusieurs atomes de carbone asymétriques, c'est-à-dire liés à quatre groupes monovalents distincts; l'inverse n'est pas d'ailleurs rigoureusement nécessaire.

Or, la formule de la mannite montre quatre atomes de carbone présentant ce caractère; désignons-les par les symboles (1), (2), (3) et (4).



La lévulose,



à cause de sa fonction d'acétone, ne possède plus que trois atomes de carbone dissymétriques, et cependant elle régénère immédiatement la mannite par hydrogénation, c'est-à-dire par une synthèse partielle, qui ne saurait seule faire apparaître l'activité optique. Le groupe (4) de la mannite est donc par lui-même inactif. Des considérations analogues conduiraient aux mêmes conséquences touchant l'acide arabinose-carbonique, l'acide mannonique droit et les mannoses correspondantes. L'inactivité du groupe (4) est donc un caractère commun à tous les corps précédents, qui explique la facilité avec laquelle ils se laissent convertir en mannites. La dextrose et l'acide gluconique peuvent aussi être changés en mannite, mais moins

aisément que la mannose ou l'acide mannonique: il semble qu'il y ait dans ce cas transposition moléculaire (sans doute d'ordre stéréochimique) en même temps que réduction, et la dextrose nous apparaît comme un isomère physique des mannoses, présentant avec ceux-ci les mêmes rapports que l'acide tartrique actif avec l'acide racémique, ou mieux que l'acide racémique avec l'acide tartrique inactif.

Si la première hypothèse, en effet, était exacte, on devrait pouvoir dédoubler la mannose en deux dextroses, ou l'acide mannonique en deux acides gluconiques isomères. L'expérience ne justifie pas cette prévision; elle s'accorde au contraire très bien avec la seconde hypothèse, car l'acide mannonique droit se change sous l'action de la chaleur, au moins partiellement, en acide gluconique ordinaire, de même que dans les expériences classiques de M. Jungfleisch on voit l'acide mésotartrique donner naissance à l'acide racémique, ou inversement.

Le mode opératoire adopté par M. Fischer consiste à chauffer les acides en question avec un excès de quinquoline, vers 140°. Après séparation de la base, par la baryte et un courant de vapeur d'eau, on obtient un mélange de mannonate et de gluconate de baryum que l'on transforme en sels de brucine: le mannonate de brucine, à peu près insoluble dans l'alcool, peut être séparé presque quantitativement à l'aide de ce réactif. Quant au gluconate resté en dissolution, on le ramène à l'état de sel barytique, puis on le transforme par la phénylhydrazine, à 100°, en phénylhydrazide facile à purifier par cristallisation.

La phénylhydrazide est enfin décomposée par la chaux, ce qui fournit un gluconate de calcium identique à celui qui dérive de la dextrose.

Pour convertir l'acide gluconique ainsi obtenu en dextrose, il suffit de le traiter par l'amalgame de sodium; le produit qui se forme a été identifié au sucre d'amidon par son point de fusion (140° - 146°), par son pouvoir rotatoire (+ 52°) et par l'examen de ses combinaisons avec la phénylhydrazine ordinaire ou la diphenylhydrazine, qui paraît être le meilleur réactif connu jusqu'ici pour caractériser sûrement la dextrose.

Ce dernier travail vient compléter de la manière la plus brillante les premières recherches de M. Fischer; aujourd'hui tous les corps en C⁶ qui se rattachent à la mannite ont été reproduits par synthèse totale. Espérons que bientôt nous pourrions enregistrer des résultats du même ordre dans la série de la dulcité et de la galactose, dont la dérivation est encore entièrement ignorée.

L. MAQUENNE.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

(1) Numéro du 24 mars, p. 779, t. XXIII.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LES PROBLÈMES DE LA CHIMIE MODERNE

A PROPOS DU DISCOURS PRONONCÉ PAR M. VICTOR MEYER AU XLII^e CONGRÈS
DES NATURALISTES ET MÉDECINS ALLEMANDS

On me demande de divers côtés de rendre l'impression produite dans le monde scientifique français par la publication du discours que le très-estimé chimiste Victor Meyer a solennellement prononcé au XLII^e Congrès des naturalistes et médecins allemands tenu à Heidelberg. Puisqu'on m'y convie, je dirai donc ce que j'en pense, n'exprimant ici que ma manière de sentir personnelle, également éloignée de l'indifférence de ceux qui ne voient dans ce discours que des opinions isolées, propres à leur auteur et dont il ne convient pas de s'émouvoir davantage, aussi bien que de la pensée de ceux qui croient que la science allemande tout entière accepte la responsabilité de ce discours, qu'elle ignore volontiers tout ce qui ne porte pas son estampille, et de parti pris, oublie les noms de ceux qui ont apporté les idées mères et les solutions les plus générales, pour se préoccuper plutôt des découvertes de détail, surtout si celles-ci flattent son amour-propre national.

Non, le savant et ingénieux chimiste qui a obtenu les premiers corps nitrés de la série grasse, qui a découvert le thiophène et ses dérivés, et qui nous a mis en possession des nouvelles méthodes qui nous permettent de prendre aujourd'hui facilement des densités de vapeur aux températures élevées de la fusion de la porcelaine, ne s'est certainement pas laissé aller à un sentiment de partialité indigne d'un homme qui consacre sa vie au culte de la vérité. Son discours a une autre raison d'être et une autre portée; il nous montre que

tandis que nous restons en communion d'idées avec les savants des autres nations, le sentiment, les conceptions allemandes, l'esprit germanique s'éloignent de plus en plus de nos conceptions et de notre esprit. Ce ne sont point seulement les questions sociales et politiques qui nous séparent à cette heure faute de nous entendre peut-être, mais non faute de vouloir nous juger équitablement.

I

a. — Sans remonter aux anciens, pas même aux alchimistes dans cette *revue des progrès et des problèmes de la chimie moderne*; sans parler des célèbres philosophes, physiciens ou mécaniciens des xvi^e et xvii^e siècles qui créèrent la méthode expérimentale et la physique moderne, il convient cependant d'établir en quelques grandes lignes, les principes qui depuis un siècle environ servent de bases fermes à la chimie de notre temps. Pour juger de la solidité de l'édifice et tenter d'élever encore ses vieilles murailles, il est bon d'en sonder d'abord les fondements. Les bases de la chimie de notre temps sont les suivantes :

1^o *La notion fondamentale des éléments irréductibles, ou corps simples* de Lavoisier.

2^o *La loi des proportions définies* de Proust (1).

3^o *L'hypothèse des atomes* de Dalton ou plutôt *la loi des proportions multiples* qui en est l'expression expérimentale ;

(1) Et non comme on l'a écrit *Proust*, qui est le nom du chimiste anglais auteur de l'hypothèse que les poids atomi-

4° *La loi des combinaisons des gaz ou loi des volumes* de Gay-Lussac;

5° *La notion de l'égalité du nombre de molécules dans les mêmes volumes de vapeur ou de gaz*, et comme conséquence la *mesure des poids moléculaires relatifs*, Loi d'Avogadro et d'Ampère.

6° *La loi de l'égalité approximative des chaleurs spécifiques atomiques* de Dulong et Petit.

7° *La théorie des radicaux*, c'est-à-dire, conception que certaines *aggrégations atomiques complexes* peuvent sans se disjoindre passer d'une combinaison à une autre à la façon des corps simples. Elle est de Gay-Lussac, Dumas et Liebig.

Tels sont les fondements de l'édifice à peu près inébranlés de nos théories modernes. De sa structure notre pays peut à bon droit revendiquer sa large part. Les générations actuellement vivantes en sont parties comme d'une citadelle solide à l'attaque des problèmes nouveaux soulevés par l'expérience de notre temps. Mais la science d'aujourd'hui, avec raison très fière de ses conquêtes, ne saurait oublier qu'elle procède de ce passé, qu'il y a quelque chose, beaucoup peut-être, de idées des grands hommes que je viens de nommer dans chacune de nos conceptions présentes, et que ce n'est pas du phlogistique de Becker et de Stahl que sont issues les découvertes modernes d'un Kékulé, d'un Baeyer ou d'un W. Hofmann.

b. — *Envisager les actions chimiques et la chaleur qui en dérive comme des modalités du mouvement* est le problème le plus ancien peut-être, et le plus moderne aussi de notre science. Il ne remonte pas simplement à Robert Mayer; il n'a pas été agité seulement par Clausius, Helmholtz, Joule et Van t'Hoff cités par V. Meyer. Avant eux, Bacon, Descartes, Euler, Huyghens, Bernouilli et les physiciens célèbres du XVII^e siècle avaient déjà conçu la chaleur et la lumière comme un mode du mouvement. Daniel Bernouilli avait exprimé clairement cette pensée et en avait calculé les conséquences. Il considère la partie des forces vives qui paraît s'anéantir dans le choc des corps imparfaitement élastiques comme emmagasinée dans ces corps à l'état de chaleur. D'après lui les gaz sont formés de petites particules matérielles semblables, animées de mouvements rectilignes rapides, et la tension des fluides élastiques résulte du choc de leurs molécules contre les parois. Il existe une relation entre les pressions et la tension des gaz, la vitesse de translation et de rotation, la masse et le nombre de leurs molécules. Bien longtemps après, mais avant R. Mayer, Séguin écrivait en 1839 dans son livre sur les *Chemins de*

fer (p. 380) le passage caractéristique qui suit: «La première idée qui frappe lorsqu'on considère la liaison des phénomènes de la génération du mouvement avec la production de la chaleur c'est que la quantité de puissance mécanique que peut développer une masse donnée de vapeur est relative à sa différence de densité et de température en la considérant dans les deux états consécutifs où elle se trouve avant et après la production du mouvement. Je crois aussi avoir remarqué qu'il existe une sorte de rapport entre la quantité de chaleur nécessaire pour la faire passer de l'un à l'autre de ces états et la quantité de force produite. Mais si V. Meyer pouvait oublier les prédécesseurs de Robert Mayer (tout ceci date déjà d'un peu loin), dans l'étude moderne et l'histoire des idées plus récemment acquises et acceptées sur la nature ou sur la mesure des actions chimiques, ne convenait-il pas de citer aussi les noms de M. Berthelot et de Thomsen? Certes s'il est un corps de doctrine un peu complet sur la nature mécanique de l'affinité, un ensemble de documents qui nous aide à la calculer d'une façon précise par la mesure des quantités de chaleurs de combinaisons qui en résultent, n'est-ce pas le bel ouvrage qui porte le titre d'*Essai de mécanique chimique fondée sur la thermo-chimie*? Il est sorti des mains du plus illustre des chimistes de notre temps; V. Meyer a oublié de le dire et de le nommer.

c. — Le développement de la théorie de la structure des corps, cette base solide qui a servi d'assises au fier édifice de la chimie organique moderne, comme s'exprime V. Meyer, est d'après lui le second, sinon le plus important problème qui se pose aux chimistes de nos jours. Quels sont ceux, nous dit-il, qui ont réussi surtout à dégager l'infiniment simple de la complication en apparence inextricable des composés du carbone? Deux hommes illustres: A. W. Hofmann, par ses travaux mémorables sur les bases organiques azotées; Kékulé, par sa doctrine de la tétra-atomicité du carbone, et sa remarque géniale de l'aptitude que possède cet élément de former des chaînes, ouvertes ou fermées en soudant ses propres atomes à eux-mêmes.

Certes nul plus que l'auteur de ces lignes n'est prêt à admirer l'œuvre colossale de W. Hofmann et sa puissante aptitude à la généralisation. Mais si, comme il convient de le reconnaître, par ses recherches sur les ammoniacques composées, il a vivement éclairé, élargi nos idées sur la structure des corps organiques, n'eût-il pas convenu, à propos de ses beaux travaux sur les amines, de citer à côté de son nom celui de l'auteur de la découverte même de l'idée mère, Adolphe Wurtz? Il a glissé de la plume de V. Meyer le nom de celui qui, un an avant le début des recherches de W. Hofmann, découvrait les ammoniacques

iques sont tous des multiples exacts de celui de l'hydrogène. Proust est le chimiste français, émule célèbre et contradictoire de Berthollet.

organiques et disait si clairement déjà en 1849 :

« Si l'on prend un des composés hydrogénés les plus simples, l'ammoniaque, on peut remplacer dans cet alcali une molécule d'hydrogène par une de méthyle, d'éthyle, d'amyle, etc... et l'on observe une série de composés qui ont une analogie frappante de propriétés avec l'ammoniaque elle-même... Je les désignerai sous la dénomination générale d'*ammoniaques composées*. »

Mais avant Wurtz même, deux hommes avaient déjà éclairé, transformé nos idées relativement à la structure des corps organiques. Les premiers, ils avaient considéré les molécules comme des édifices complets dont toutes les parties se font mutuellement équilibre, combattant en ce point les théories dualistiques de Lavoisier et de Berzélius alors florissantes en Allemagne. C'était Dumas d'abord, puis Laurent. C'est d'eux avant tout que procède l'idée moderne de la structure moléculaire unitaire et il nous paraissait juste de le rappeler.

d. — Il est vrai qu'aujourd'hui la notion de *structures* s'est spécialisée, et qu'on la fait procéder directement de l'*atmicité* des éléments. Ce pouvoir attractif variable avec chaque atome, à pôle unique ou multiple suivant la nature de l'élément, c'est là, dit avec raison V. Meyer, l'une des énigmes de la chimie moderne. Qu'est-ce que l'*atmicité*, qu'entend-on par *valence*? C'est, dit Kekulé, la propriété de chaque atome simple d'attirer à lui pour se saturer 1, 2, 3, *n*, atomes de chlore ou d'hydrogène, ou leurs équivalents en oxygène, soufre, azote, etc... Et de même que quatre atomes d'hydrogène sont aptes à se souder à un atome de carbone, deux atomes de ce dernier élément peuvent s'unir entre eux par deux de leurs huit points d'attraction pour former la chaîne, le squelette carboné de la molécule auquel viendront s'attacher en les complétant, en les saturant, 6 atomes d'hydrogène ou leurs équivalents.

Telle est, en effet, l'une des conceptions qui ont le plus servi aux progrès de la chimie moderne.

Mais est-il bien équitable d'en laisser tout l'honneur au célèbre chimiste que nous venons de nommer?

En 1828 déjà, J. B. Dumas dans l'Introduction de son *Traité de chimie appliquée aux arts* exposait (p. LXXIV) les principes de sa classification des métalloïdes. Il la fondait surtout sur l'aptitude de chacun des volumes ou atomes de ces éléments à s'unir à 1, 2, 3, 4 volumes ou atomes d'hydrogène. Certes il ne prononçait point le mot d'*atmicité*, mais ce penseur de génie ne devançait-il pas ainsi de près de quarante années les conceptions plus modernes de Couper et de Kekulé? Plus tard s'introduisit dans notre science d'une façon plus formelle et plus spéciale la notion de l'*atmicité* et de la saturation réciproque des atomes. Mais cette notion ne

sortit pas d'un coup, comme la Minerve antique, du cerveau du Jupiter moderne, car il convient de rappeler qu'elle eut un long et pénible enfantement, et qu'elle passa par les trois phases successives suivantes avant d'arriver à l'*infiniment simple* de notre temps :

1° Graham, Williamson, Berthelot, Wurtz étudiant les combinaisons de l'acide phosphorique, de l'acide sulfurique, de la glycérine, du glycol, de l'acide lactique etc., établirent la notion fondamentale de la polyatmicité ou polybasicité des acides et des alcools.


2° Williamson et Wurtz surent rattacher ensuite cette polyatmicité des molécules tout entières à la polyatmicité des radicaux spécifiques qui entrent dans leur structure : phosphoryle, sulfuryle, glycéryle, éthylène, etc.

3° Enfin l'on étendit aux éléments eux-mêmes la notion de la non saturation des radicaux, et cette belle conception est due à la fois à Wurtz (saturation successive de l'azote dans les ammoniaques composées) à Couper (1) et à Kekulé. Mais si ce dernier

(1) L'anglais A. S. Couper a publié en 1858 aux *Annales de chimie et de physique* (t. LIII, p. 469) un mémoire très important ayant pour titre *Sur une nouvelle théorie chimique*. C'est là qu'apparaissent, pour la première fois, nos formules modernes de chimie organique où les atomes de carbone liés entre eux par deux de leurs atmicités servent de support, de lien, au reste de la molécule. Couper donne dans ce curieux mémoire les formules modernes du gaz des marais, de l'hydrure d'éthyle, de l'éthylène, du glycol, de la glycérine, du glucose, de l'acide tartrique, etc. Nous extrayons de ce travail quelques courtes citations qui montrent toute la profondeur où avait alors déjà atteint la pensée de Couper :

« L'affinité de degré, dit-il, (l'atmicité actuelle) peut n'avoir « qu'un degré; cependant elle peut avoir et en a généralement plus « d'un (l'atmicité variable actuelle) ... »

« Le carbone possède deux caractères qui le distinguent « particulièrement : 1° Il entre en combinaison avec des « nombres égaux d'équivalents d'hydrogène, de chlore, d'oxy- « gène, de soufre, etc. 2° Il entre en combinaison avec lui- « même. Cette seconde propriété est, je crois, signalée ici « pour la première fois. Cette affinité, l'une des plus énor- « gique parmi celles que possède le carbone, n'est peut- « être inférieure qu'à celle qu'il a pour l'oxygène.



L'oxygène O est exprimé ici en équivalent et vaut 8 pour Couper; l'auteur ajoute : « On remarquera que l'atome de carbone boné situé entre les deux autres étant chimiquement combiné avec chacun d'eux, son pouvoir de combinaison est réduit à 2 pour l'hydrogène, l'oxygène (O = 8) etc... Une des « forces de combinaison s'exerce sur un élément de carbone « d'un côté et une seconde sur un élément de carbone de « l'autre. »

Couper termine enfin son remarquable mémoire en montrant que l'azote trivalent peut unir aussi les diverses parties de la molécule carbonée et y jouer le rôle que nous lui attribuons aujourd'hui dans les séries pyridique et cyanique.

Couper mourut peu de temps après avoir écrit ce beau mémoire. Mais l'histoire de la science doit le reconnaître comme le véritable inventeur de nos idées modernes sur la structure dite rationnelle des corps organiques fondée sur la tétroatmicité du carbone et son aptitude à se souder à lui-même.

a eu le mérite d'avoir plus particulièrement tiré les conséquences ingénieuses et générales que l'on sait de la tétratomicité du carbone, et de son aptitude à se saturer lui-même pour former des chaînes ouvertes ou fermées, convient-il d'oublier cette incessante fermentation d'idées, cet enfantement laborieux qui procède de Dumas jusqu'à lui, en passant par Couper, l'inventeur trop oublié de notre système de schématisation moderne? Et peut-il être juste d'admettre que cette belle conquête est le fruit de l'effort de celui-là seul qui vint à temps pour être enfin compris et prendre la tête de la vaillante légion qui l'a suivi!

e — D'ailleurs cette notion moderne de la structure des corps organiques ou minéraux était comme en germe dans la notion autrement solide de la substitution de Dumas; et s'il est injuste d'attribuer à W. Hofmann (assez riche en travaux et en gloire!) l'idée des ammoniacs composés, il l'est plus encore de dire que c'est de ses études (des études d'Hofmann) que procède la pénétration de la claire conception des substitutions dans la conscience des chimistes. Je pense que V. Meyer reste seul aussi de son opinion, même dans son pays, lorsqu'il déclare que les recherches de W. Hofmann sur les ammoniacs organiques dépassent en portée la découverte fondamentale de la substitution. Car outre que cette découverte des ammoniacs composés unie à celle des radicaux (deux notions déjà classiques en 1849), est virtuellement contenue dans l'idée plus générale des substitutions et l'on ne saurait douter que les progrès de la chimie organique moderne dérivent surtout de ce concept des substitutions qui nous semble aujourd'hui si simple. Lorsqu'en 1842, Dumas osa annoncer que les éléments électro-négatifs de Berzélius peuvent dans les molécules organiques remplacer un ou plusieurs atomes d'hydrogène sans changer rien au type, à la texture des molécules... que les propriétés des corps tiennent moins à leur composition élémentaire qu'à l'arrangement réciproque de leurs parties... que dans l'édifice d'une molécule organique chaque atome subit de chacun des autres une modification qui vient altérer ses propriétés fondamentales, tel l'exemple des substitutions chlorées où le chlore perd tout ou partie de ses aptitudes caractéristiques, etc... Berzélius en Suède, et avec lui tous les chimistes de l'Allemagne, s'insurgèrent contre ces folies. Mais la grande vérité s'imposa petit à petit aux esprits. Sa clarté devint comme l'aurore des jours nouveaux. Elle a fait plus pour les progrès de la chimie que la conception des ammoniacs composés de Wurtz et d'Hofmann. Elle a plus avancé notre science que n'ont fait les générations d'hommes qui ont ensuite péniblement suivi le sillon magistralement tracé par le grand initiateur.

f — De cette structure des molécules, telle que nous la comprenons aujourd'hui, dérive la conception des organes moléculaires. C'est une des plus curieuses et des plus utiles conquêtes de la chimie de notre temps d'avoir démontré que chaque corps est non seulement structuré d'une façon particulière, mais que chacun des radicaux ou membres de la molécule apporte à l'édifice et y conserve ses aptitudes propres. Cette idée elle-même dérive de la notion des fonctions multiples établie par M. Berthelot d'abord, dans ses mémorables recherches sur les éthers de la glycérine, puis par Wurtz dans ses travaux sur l'acide lactique. Elle se rattache indirectement à la conception des radicaux de Dumas et surtout de Liebig. Depuis, cette notion des radicaux spécifiques, ou organes de la molécule, a fait son chemin et nous savons aujourd'hui facilement reconnaître dans un corps le carbozyle, l'orhydryle, le sulphydryle, le carbonyle, l'oxéthyle, l'amidogène, le cyanogène, etc., et distinguer chacune des aptitudes propres ou fonctions que ces organes apportent avec eux. Certes si V. Meyer avait cité les noms glorieux auxquels il faut rattacher avant tout la paternité de cette belle conception, il n'aurait diminué en rien le mérite de ceux qu'il rencontre seuls sous sa plume : Erlenmeyer, Kolbe, Boutlerow, Odling et Kékulé.

g — Ces notions sur la structure imaginative ou schématique des molécules devaient devenir un jour insuffisantes. Il n'est pas de chimiste, en effet, qui croie que les corps sont construits comme nous les représentons à cette heure sur le papier, leurs atomes tous placés sur un même plan. La stéréochimie, ou chimie des corps dans l'espace, est née de ce besoin de voir par la pensée les corps tels qu'ils peuvent être réellement, et d'expliquer mécaniquement, et par le calcul, certaines de leurs isoméries et de leurs aptitudes, telles que leur instabilité, leur dissociation, leur pouvoir rotatoire. Il convient avec V. Meyer de rapporter surtout l'honneur des efforts faits dans ce sens à MM. Le Bel et Van t'Hoff; peut-être convient-il seulement de reconnaître que quelques essais avaient été déjà tentés avant eux par Laurent et par Gaudin. Mais encore ici, l'on peut se demander si ces idées nouvelles sur la structure des corps dans l'espace seraient même nées à cette heure sans les travaux de Pasteur, relatifs aux rapports de la structure géométrique des cristaux, d'acides tartrique et malique avec leurs pouvoirs rotatoires; et ne fallait-il pas dans un exposé même rapide de ces doctrines et des problèmes de la chimie moderne citer le grand nom de ce profond penseur?

h — L'une des plus fortes idées de notre temps, dit à bon droit V. Meyer, c'est la démonstration que les propriétés des éléments sont fonctions périodiques

de leurs poids atomiques. Elle est due surtout à ce titan de la science russe : Demetrius Mendeleeff. Nous ne saurions que souscrire à ce jugement. Il nous sera permis seulement de citer ici à côté des noms de Newland et de Lothar Meyer, ceux de Gladstone, de Dumas, de Chancourtois, de Lecoq de Boisbaudran et de Crookes, qu'il ne nous convient pas d'oublier avec le chimiste allemand.

i — La loi dite des fonctions périodiques de Mendeleeff nous conduit tout naturellement à l'analyse spectrale. Il est remarquable que la première confirmation expérimentale des idées de Mendeleeff ait été donnée par la découverte du gallium de M. Lecoq de Boisbaudran, et que celle-ci procède à son tour de considérations théoriques sur les rapports réguliers aperçus entre les longueurs d'ondes des lumières émises par les éléments appartenant à une même famille naturelle. Les noms de Kirchhoff et de Bunsen, les inventeurs de la spectroscopie cités par V. Meyer, sont si populaires, et si hauts placés dans l'esprit des chimistes, que ce ne sera pas diminuer leur gloire que de citer à côté d'eux ceux des hommes qui ont préparé ou prévu cette grande découverte : Fraunhofer, Wollaston, Talbot, Brewster, Iwan, Masson, Foucault. Les premiers avaient vu les raies du spectre et reconnu celles de ces raies qui caractérisent l'hydrogène, le carbone et le sodium; les seconds avaient montré, avant les travaux des savants d'Heidelberg, que l'étincelle électrique éclatant entre des pôles formés de métaux divers donnait des raies caractéristiques de ces métaux. Certes l'explication du renversement des raies solaires, et par conséquent le moyen d'appliquer ces études à la constitution chimique des astres appartient à Kirchhoff; la méthode d'analyse spectroscopique est bien sortie des mains des deux célèbres collaborateurs, et Bunsen l'a pour ainsi dire consacrée par sa grande découverte du césium et du rubidium; mais n'est-il pas à propos encore ici de rappeler ce vieil adage des physiciens: *natura non facit saltus*.

k — Les rapports qui se reproduisent régulièrement entre les poids atomiques des éléments, rapprochés de la périodicité et du retour régulier de leurs propriétés génériques, aussi bien que la remarque de la multiplicité des raies spectrales de la plupart des corps simples, sont bien faits pour nous amener à mettre en doute le postulat moderne de la spécificité absolue des corps simples, et faire renaître cette vieille hypothèse qu'une matière unique, ou peut-être un petit nombre de matières spécifiques, forment par leur association en états d'équilibre très stables la multitude de nos corps prétendus simples actuels. C'est bien encore là un des grands problèmes que se pose la chimie

de notre temps. V. Meyer l'indique en passant; mais il ne cite à cet égard ni les idées si personnelles de M. Crookes sur les *méta-éléments*; ni même celles que M. Berthelot a exposées avec sa grande autorité dans les *Origines de l'alchimie* (p. 315), d'après lesquelles les divers éléments actuels pourraient être regardés comme formés d'une même matière distinguée seulement par la nature des mouvements qui animent ses particules, *l'état actuel de chaque corps simple étant comme l'une des racines ou solutions déterminées et réelles de l'équation fondamentale de ce mouvement* et le poids seul de la matière restant invariable à travers les diverses transformations mécaniques que pourrait subir le système de ces particules. De même V. Meyer passe sous silence les conceptions d'Helmoltz et de William Thompson sur les anneaux tourbillonnants d'éther et les atomes tourbillons, aussi bien que cette vue, encore bien nouvelle, d'après laquelle la matérialité elle-même de l'éther disparaîtrait, remplacée par la simple aptitude à transmettre le mouvement ou la force partant d'intersections géométriques de l'espace; tout cela (même cette dernière conception de la matière, quelle que soit sa bizarrerie, sa nouveauté et la forme sous laquelle on l'a présentée) ne méritait-il pas au moins une courte mention dans un exposé des problèmes de la chimie moderne?

l — Il est difficile aux chimistes d'aujourd'hui de ne pas parler des merveilles de la synthèse organique. V. Meyer n'y a pas manqué. « Il semble, dit-il, qu'il n'y ait plus rien d'impossible dans cette voie, depuis la préparation artificielle de l'alizarine par Græbe et Liebermann, de l'indigo par Baeyer, de la conicine par Ladenburg, de l'acide urique par Horbaczewski et par Behrend, depuis que Fischer et Kiliani ont éclairé la chimie du groupe des sucres, etc... »

Sans doute ce sont là de belles conquêtes : aucun chimiste sensé ne saurait le méconnaître. Mais il sera permis de dire à un esprit, construit peut-être de molécules différentes de celui dont il analyse ici les jugements, que ce sont là de *grandes et belles découvertes de détail*. Le savant illustre qui a le premier largement ouvert la voie aux synthèses organiques, alors que la possibilité même de construire artificiellement les corps produits par les plantes ou les animaux était niée par presque tous les chimistes, entre autres par Gerhardt, ce savant n'est-il pas M. Berthelot? Celui qui a montré la voie où devait s'engager Fischer pour arriver à la synthèse des sucres, de la mannite et de la pinite n'est-ce pas encore M. Berthelot à peu près comme M. Kékulé ouvrit un peu plus tard le chemin qui conduisit à la production artificielle de l'alizarine? Et n'est-ce pas un signe de la différence de voir et

de sentir qui nous sépare de l'honorable chimiste allemand, que de nous étonner, quand il s'agit de synthèses, de lui voir omettre, sans aucun doute bien involontairement, le nom du fondateur même de la synthèse organique : M. Berthelot ? Dans une mesure plus restreinte, ne sent-on pas aussi qu'il y a quelque injustice à ne pas citer ici en passant MM. Friedel et Crafts ; et la valeur de leur *méthode de synthèse* si ingénieuse, si générale et si prolifère, le cède-t-elle à la découverte isolée de la concine, de l'acide urique ou même de l'alizarine artificielles ?

m — Et cependant V. Meyer, que semblent frapper surtout les succès pratiques, étiquettables, les réalisations de détail, plus peut-être que les idées génératrices d'où ils sont éclos, conclut enfin lui-même, et avec raison : « Ce n'est ni par des découvertes isolées, ni par les succès de la synthèse, que la chimie organique fera le plus de progrès. *Ce qu'il nous faut, c'est une méthode qui nous permette d'individualiser les corps.* » — Ici nous ne saurions trop être de son avis. Il est, en effet, très désirable que des méthodes nouvelles permettent aux chimistes de distinguer et de séparer ces nombreuses espèces qui partout intimement réunies composent les corps naturels, inertes ou vivants, substances complexes, mélangées souvent entre elles en grand nombre et que nous ne savons comment extraire et *individualiser* lorsqu'elles ne cristallisent ou ne se volatilisent point : matières humiques, albuminoïdes, celluloses, corps colorants naturels, hydrocarbures à poids moléculaires élevés, etc. En ce sens la méthode cryoscopique de M. Raoult a fait faire à la chimie moderne un pas important en permettant de déterminer les grandeurs moléculaires des corps solubles définis, et V. Meyer, il faut le reconnaître, lui rend amplement justice. Mais que cette méthode nouvelle d'individualisation qu'il réclame avec raison vienne à être découverte, qu'elle fasse arriver à des résultats nouveaux, inattendus, qu'elle permette d'accumuler mémoires sur mémoires, etc., s'il nous est permis de juger de ce qui arriverait par ce qui s'est déjà cent fois passé, n'y a-t-il pas lieu de croire que ceux qui pensent et jugent comme V. Meyer oublieraient vite le véritable initiateur ; ce travail d'agrandissement, de remplissage, de généralisation peut-être, sera bientôt pris pour la découverte elle-même. Entassant chaque jour avidement cette monnaie de bilion, on défendra bientôt àprement ce bien acquis avec ténacité, ce bien personnel et non sans valeur, il faut le reconnaître : mais il aura suffi de quelques générations, d'une peut-être, pour en méconnaître le véritable, le premier auteur, le bienfaisant donataire. Cette manière d'agir, d'oublier vite le passé d'apprécier surtout la découverte faite au jour le jour, de la jauger à l'aune et non de la peser, a son

intérêt et son utilité ; elle augmente le relief et le courage des jeunes ; elle pousse aux travaux de détail d'où surgissent parfois des idées neuves ; elle simplifie, au bénéfice du temps présent, l'histoire de la science ; mais elle n'est pas sans inconvénients, elle a ses injustices : elle empêche de voir de haut, d'envelopper du regard et de juger les grandes lignes ; elle fait perdre de vue les idées génératrices ; elle ne développe point l'esprit de généralisation.

II

Nous venons d'exposer la suite des idées que l'état actuel de la chimie a fait naître dans l'esprit du chimiste allemand, et donné ses appréciations et les nôtres. Avec quelques autres desiderata relatifs aux applications modernes aux besoins et de l'industrie et de l'agriculture, tels sont, à cette heure, d'après V. Meyer, les problèmes posés à la chimie de notre temps.

Nous pensons, quant à nous, que cette énumération est très incomplète. Revenons en effet un instant sur nos pas.

Il semble évident que la question la plus haute, la plus délicate, qui puisse hanter l'esprit des philosophes de la nature est celle-ci : Qu'est-ce que la matière : Qu'est-ce que la force ? Ce problème capital n'est pas seulement au fond de la pensée des spéculatifs tels que Schelling qui écrivait : « Ce n'est que pure illusion de l'imagination de penser qu'il reste quelque chose, on ne sait quoi, après que nous avons dépouillé un objet de tous les attributs qui lui appartiennent. » Non ; les plus grands physiciens expérimentateurs ont été poursuivis de cette préoccupation. La matière est-elle bien comme nous la concevons, une chose faite de particules finies, insécables, absolument résistantes et impénétrables, douées de propriétés ou plutôt de mouvements auxquels les substances visibles, tangibles, devraient leur manière d'être spécifique, leur mode de réagir et sans lesquels mouvements on peut concevoir cependant que cette matière pourrait être ? Ou bien est-elle, comme l'ont pensé Clerk Maxwell et William Thompson, formée d'un éther doué de masse dont les tourbillons formeraient les atomes la matière ordinaire ? Ou bien faut-il, acceptant le sentiment d'hommes d'un ordre tout à fait supérieur, le P. Boscovich, Ampère, Faraday, Hirn peut-être lui-même, refuser de séparer les idées de matière et de force ? L'opinion de Faraday à cet égard est ainsi reproduite par Tyndall : « Que savons-nous de l'atome, si ce n'est sa force ? Vous imaginez un noyau *a* et vous l'entourez d'une force *m*. Pour moi l'*a* s'évanouit et la substance est constituée par la force. En effet quelle notion pouvons-nous concevoir de ce noyau *a* indépendant de ses forces ? Quelle idée reste-t-il à laquelle nous puissions sus-

prendre notre jugement d'un *a* indépendant des forces connues ? »

Dans un *exposé des problèmes de la chimie contemporaine*, ce problème des problèmes, ne méritait-il pas d'être au moins signalé ?

Ne convenait-il pas aussi, abandonnant, si l'on veut, les hauteurs de la philosophie fondamentale que nous venons de laisser entrevoir, d'aborder peut-être la grave question soulevée naguère par M. Crookes de la définition même des éléments ou corps simples ? Lorsque le poids d'un métalloïde ou d'un métal, indécomposables par les forces physiques ou chimiques actuelles, reste constant en passant par l'ensemble de ses différents composés, et lorsque les raies que ce métalloïde ou ce métal donne dans la flamme ou dans l'arc électrique diffèrent par leurs longueurs d'onde de celles que donnent tout autre radical, on admet généralement aujourd'hui que ce corps est simple. Suivant les observations de Crookes et de Nordenskiöld, il ne paraît pas cependant en être tout à fait ainsi. Crookes prenant la terre d'ytria la divise par un grand nombre de fractionnements successifs en cinq ou six constituants nouveaux : $G\alpha$, $G\beta$, $G\gamma$, etc... qui ont tous le même poids équivalent comme oxydes, qui ont tous le même spectre dans l'arc électrique, *mais dont le spectre phosphorescent et certaines propriétés chimiques délicates diffèrent sensiblement*. Crookes ne regarde donc pas nos éléments actuels, définis par les propriétés que je rappelais ci-dessus, comme le dernier état de la différenciation de la matière à laquelle nous conduisent notre pensée et même nos expériences. Les corps simples représenteraient, suivant lui, les états d'équilibre qu'une matière primitive, le *protyle*, tendrait à prendre et à garder avec une grande stabilité. Nos éléments modernes seraient de véritables édifices complexes dont des radicaux, ou parties constitutives, peuvent être quelquefois détachés ou distingués même par nos moyens d'action actuels. Qu'ils soient ou non de même poids ou de même structure, ils restent de même nature intrinsèque, sans être identiques entre eux (1).

En ce qui touche à l'affinité, sans doute il est intéressant de se demander si les valences de chaque atome, considérées comme on le fait généralement aujourd'hui, sont uniques ou multiples ; si leur nombre est invariable, quelles que soient les conditions et les réactions que l'atome subit de l'extérieur ; si les pôles d'attraction que ces valences représentent occupent un point unique sur l'atome matériel, ou s'ils ont une grandeur appréciable ; si

la direction de ces attractions est absolue par rapport aux paramètres de l'atome et si elle influe sur les groupements à venir ; si cette propriété attractive, simple ou multiple suivant les cas, dépend de la forme primitive de l'atome matériel insécable, de la façon dont y est agrégée la substance pleine dont il est construit (ce qui nous paraît à peu près impossible, étant donnée la petitesse de l'atome relativement à la molécule) ou bien si cette action dépend des tourbillonnements de l'éther en certains points de sa surface, tourbillonnements déterminés par la forme géométrique ou par les mouvements de la matière atomique... Mais qui ne voit qu'on ne saurait aborder directement ces problèmes de haute dynamique alors qu'on ne connaît rien de la vraie structure des corps dans l'espace ? Qui ne sent et ne sait que pour faire un progrès dans ce sens il ne nous reste que l'observation qualitative et plus encore *quantitative* des faits ? et où trouver ces observations et ces méthodes (en dehors de la conception même de l'atomicité), si ce n'est dans la suite des travaux mémorables que M. Thomsen, et surtout M. Berthelot ont faits pour mesurer l'affinité et le travail chimique ? Peut-on aujourd'hui dans un *Exposé* des problèmes et des acquisitions de la chimie moderne oublier les idées fondamentales et les lois (sans compter l'immense provision de faits) réunies dans cet ouvrage fondamental de *L'Essai de mécanique chimique fondée sur la thermo-chimie* ? Peut-on en parlant de la nature et de la mesure de l'affinité, oublier que c'est M. Berthelot qui le premier donna le moyen précis de définir et de mesurer méthodiquement ce que l'on appelait autrefois vaguement de ce nom d'*affinité*, en mesurant les actions calorifiques qu'elle provoque ? Enfin lorsqu'il s'agit du mécanisme des combinaisons et des décompositions, peut-on négliger aussi de citer les travaux mémorables et les idées si claires, si simples de Ch. Sainte-Claire-Deville et de son Ecole sur la dissociation, l'une des conditions fondamentales de l'action réciproque des corps ? Ces phénomènes de dissociations nous ont montré cette affinité non plus comme une force propre, spécifique, suivant les cas positive ou nulle, qui est ou n'est pas apte à telles combinaisons ou substitutions, mais comme provoquant des équilibres instables, relatifs, des réactions inverses et complémentaires que modifient les conditions extérieures de température, de pression, d'action mécanique, de temps, etc. Ces travaux mémorables ont classé l'affinité comme la chaleur, la lumière, la pesanteur au rang des autres phénomènes d'ordre mécanique. Tout ceci ne paraît pas avoir frappé M. V. Meyer ; ou du moins, il oublie Deville comme il l'a fait de Berthelot.

Un problème de moindre envergure, mais d'un

1) C'est, avec les expériences délicates de Crookes en plus, l'idée déjà assez ancienne des *ultimates* ou *atomcules* qui par leurs arrangements divers constitueraient l'atome chimique. Toutefois cette idée des *ultimates* est plus que celle de Crookes rapprochée de l'hypothèse de l'unité de la matière.

intérêt bien grand encore, est celui du rapport qui existe entre les propriétés des corps et leur structure : j'entends les propriétés physiologiques, aussi bien que physiques et chimiques. Aujourd'hui la recherche de la structure des corps, telle que la conçoit l'école atomique, consiste à établir expérimentalement les fonctions multiples d'une même molécule, et à réunir ensuite en un corps de formule, dite formule de constitution, et suivant les lois des valences réciproques des éléments, les différents rouages ou organes caractéristiques de chacune des fonctions découvertes dans la molécule entière. Ainsi un corps se conduit-il comme un acide bibasique, que la chaleur ou les alcalis dédoublent en benzène et acide carbonique, nous le construisons avec un noyau benzénique central auquel viennent, par substitution, se souder en position, *o*, *m*, ou *p*, les deux carboxyles CO_2H correspondant à la bibasicité que l'on a expérimentalement reconnue. Si dans la molécule un radical méthyle peut être enlevé par saponification, ou bien si l'on y reconnaît un atome d'hydrogène étherifiable, les radicaux OCH_3 ou OH , viendront figurer dans l'édifice. Si la substance présente les caractères d'un acétone, d'une amide, le carbonyle CO unissant deux groupes électropositifs carbonés, l'amidogène AzH^2 ou l'imidogène AzH , chacun d'eux unis à des radicaux positifs ou négatifs, viendront se placer dans notre schéma. Par cet ingénieux et fort utile procédé, nous construirons notre molécule, en tenant compte des lois générales de l'atonicité des éléments, et inscrivant dans sa formule les signes caractéristiques des diverses fonctions que nous aurons successivement reconnues. Elles apparaîtront toutes dans la formule représentative complète dite de constitution, de là cette possibilité de construire schématiquement sur un plan, une molécule qui est en réalité dans l'espace. Mais qui ne voit que nous ne saurions tirer ainsi de cette représentation que ce que nous y avons inscrit? Qu'il y a loin de cette prétendue constitution, qui n'est réelle que relativement à notre conception actuelle des fonctions et des organes moléculaires, à la vraie formule de structure faite dans l'espace et aux conséquences qu'on en tirerait théoriquement et mathématiquement si la réelle structure était connue! Alors seulement il nous serait permis de nous poser utilement mille questions que nous voient nos schémas modernes, nécessaires il est vrai, mais essentiellement transitoires et relatifs : Quelles lois générales président à ces équilibres? Chaque atome, quel que soit sa distance, réagit-il sur tous les autres dans une même molécule, ou bien son action se fait-elle sentir seulement sur l'organe immédiat ou le radical auquel il appartient? Ces parties de la molécule, aptes à se trans-

porter d'une combinaison à l'autre, sont-elles en repos relatif? Les atomes dont elles sont constituées sont-ils fixes, oscillent-ils autour de leur centre de gravité, ou, comme nous le pensons, roulent-ils rapidement sur leur axe à la façon de toupies, emmagasinant et conservant ainsi d'une façon insensible au thermomètre, et jusqu'à ce qu'il se produise un nouvel équilibre matériel, leur énergie latente? Ces atomes, quels qu'ils soient, sont-ils mis en rapport entre eux par des atmosphères d'éther condensées, et celles-ci tourbillonnent-elles autour de leurs axes? Ces tourbillons d'éther sont-ils la cause de leur atonicité simple ou multiple? Font-ils naître, lorsqu'ils viennent au contact, une sorte de force élastique qui empêche les atomes de se joindre comme nous le pensons avec M. Le Bel? — Autant de questions qui se posent à l'esprit et que commence à aborder la science moderne avec Arrhénius, Le Bel, Van t'Hoff, Le Chatelier, Meyer lui-même.

D'autre part, quelles relations existent entre la structure des corps et leurs propriétés physiques ou physiologiques? Comment cette structure, comprise telle qu'elle est, ou même telle que nous la schématisons, peut-elle agir sur nos sens ou sur nos tissus? Voici l'acide phényl-orthosulfonique, c'est un antiseptique puissant : il ne l'est plus si, le chauffant légèrement, nous le transformons en acide phényl-métasulfonique. Comment expliquer que les composés qui dérivent de l'oxydation des ortho- et méta-polyphénols soient vivement colorés, alors que leurs isomères en position para sont des quinones incolores? Comment peut-il se faire que les nombreuses essences répondant à la composition $\text{C}^{10}\text{H}^{16}$ agissent sur le sens de l'odorat de façon si différente ; que l'essence de rose, de lavande et de copahu, par exemple, aient même composition centésimale et même poids atomique? Comment l'arsénite de potasse qui contient 37 % d'arsenic est-il un poison redoutable, alors que le cacodylate de potasse qui en contient 42 %, et qui est aussi soluble que l'arsénite, reste inoffensif? etc., etc. A toutes ces questions, il convient de répondre que la matière agit sur nous par la transmission de ses mouvements et cette transformation de l'énergie ambiante qui résulte de sa structure, bien plus que par la nature spécifique de ses atomes élémentaires. Ne voilà-t-il pas autant de questions qui méritaient, semble-t-il, d'être au moins posées, devant un congrès de médecins et de naturalistes, dans l'énumération des problèmes que soulève la chimie contemporaine.

Ce n'est pas tout. Le grand mystère, celui dont la solution passionne les hommes plus encore que tous ceux que nous venons d'énumérer, celui dont on brusque et affirme la solution tant on désire

l'atteindre, c'est le mystère de la vie. Qu'est-ce qu'un être vivant? Organise-t-il sa substance suivant une loi spéciale? Est-il le développement continu et géométrique, est-il comme la moyenne des deux courbes que représente sa double lignée ancestrale? Le *quid ignotum* qui dirige son développement et ses actes est-il exclusivement propre à la vie; ou bien toutes ses énergies, y comprises la sensation et la pensée, sont-elles des formes de l'énergie matérielle empruntée aux corps bruts et transformée dans le moule de son organisation spéciale? Faut-il, avec Schelling, affirmer que « la matière brute est la semence de l'univers où se trouve enveloppé tout ce qui se manifeste dans l'évolution ultérieure? » Faut-il suivre Tyndall, lorsque présidant à Belfast, en 1874, le Congrès de l'Association britannique, il prononçait ces paroles : « Voici l'aveu que je crois devoir faire devant vous. Quand je jette un regard en arrière sur les limites de l'expérience, je discerne au sein de cette matière la promesse et la puissance de toutes les formes et de toutes les qualités de la vie. » Ne voilà-t-il pas en effet, le problème palpitant à poser, sinon à résoudre, devant un congrès de médecins et de naturalistes solennellement réunis?

V. Meyer ne l'a pourtant pas tout à fait oublié; il semble avoir entrevu le côté biologique de la science chimique, et à cet égard il s'exprime comme il suit : « En admettant que l'on réalise un jour la synthèse de l'albumine, que nous sommes loin encore de la conception de la nature des corps organisés !.. Mais arriverons-nous jamais à pénétrer le mystère de l'assimilation qui en dépit de sa simplicité se présente à nous sous l'aspect le plus énigmatique? Le chimiste agira sagement en ne posant pas prématurément le pied dans le domaine de la biologie, alors que tant de grands problèmes de son ressort n'ont pas été abordés. » Certes on ne pouvait s'attendre à cette dernière conclusion dans la patrie des Liebig, des Wœhler, des Ludwig, des Hoppe Seyler! Quel est l'esprit curieux des grands problèmes philosophiques ou physiologiques qui ne s'intéresse à cette heure d'une curiosité sans cesse croissante, au magnifique développement que les sciences biologiques ont prises depuis cent ans sous l'influence des découvertes de Lavoisier, sur les causes de la chaleur animale; de J. B. Dumas, sur l'origine de l'urée, des graisses, la circulation de la matière chez les êtres vivants et bruts; de Boussingault, sur le développement des animaux et sur les lois de la chimie appliquée à l'agriculture; de Berthelot, sur l'assimilation de l'azote par le sol et les plantes; de Pasteur surtout, et de ceux qu'il ne m'est pas permis de nommer ici, sur la nature des virus, des vaccins, des diastases, sur les matières chimiques actives ou très actives produites par les

cellules libres ou vivant en tissus! Nous le demandons! était-ce bien le lieu et le moment, dans une assemblée de médecins réunis pour écouter le dernier mot de la science, de jeter ces paroles de découragement et d'impuissance: *le chimiste agira sagement en ne posant pas prématurément le pied dans le domaine de la biologie?*

III

Dans cet exposé des grands problèmes de la chimie moderne, M. V. Meyer nous paraît avoir fait une part suffisante à ses compatriotes: il a quelquefois oublié les autres. Pourtant quatre noms français sont cités honorablement par lui et certes nous ne les renierons pas: ce sont ceux de J.-B. Dumas, de Leblanc, l'inventeur de la soude artificielle, de MM. Le Bel et Raoult. Mais il a négligé, en parlant des ammoniacs composés, de nommer Wurtz; en traitant de l'affinité et du mécanisme de l'action chimique. Il n'a songé ni à Ch. Sainte-Claire-Deville ni à Berthelot; à propos de la structure des molécules, il a méconnu Gerhardt, Laurent, Wurtz; en parlant de la nature des éléments, il a négligé les noms de William Thompson, Maxwell, Faraday, Crookes; en traitant de la synthèse, il ne croit pas devoir même nommer Berthelot ou Friedel; à propos des albuminoïdes, il n'a garde de se souvenir de Schützenberger; en parlant de la vie, il oublie Pasteur. Tous ces noms glorieux, et bien d'autres qu'il serait facile de citer, ne semblent donc se rattacher pour lui à aucun des problèmes posés ou résolus par la chimie moderne puisqu'ils ne viennent pas sous sa plume. Disons-nous que c'est parti pris? Nous ne le croyons certainement pas, M. V. Meyer voit, comme nous ne le disions en commençant, avec passion, les objets présents, immédiats, les découvertes qui l'ont frappé dans les journaux de la veille ou de l'avant-veille, les théories, les idées militantes du jour. Ce grand tableau qui se déroule devant d'autres yeux, de l'histoire graduelle et logique des découvertes, de leur genèse à partir des idées fondamentales de la chimie moderne, de leurs relations entre elles, au milieu des variations apparentes et des défaillances des théories nouvelles semble lui échapper quelquefois ou du moins ce tableau reste vague devant lui. Avez-vous vu dans son atelier un maître ouvrier préoccupé de son travail du jour? Attentif, consciencieux, perfectionnant les rouages de sa mécanique, il tâtonne, calcule, arrive peu à peu, laborieusement, à construire l'objet qu'il a rêvé: Pendant qu'il travaille ainsi silencieux, heureux dans son petit domaine, content de sa journée, allant et venant entre les murs de son atelier, sûr de lui, de ses aides, de ses instruments, de son succès partiel, le soleil au dehors est monté sur l'horizon, il a éclairé la ville et la campagne, il a fait éclore les fleurs et adouci

les fruits, il a tout animé, réchauffé, transformé, reproduit, il a élevé le nuage et séché la pluie, petit à petit; le soir est venu, puis la nuit a succédé aux ombres du crépuscule. Autour de cet homme consciencieux, honnête, qui travaille ainsi patiemment depuis l'aube, un grand phénomène naturel s'est produit, la terre a tourné d'un jour, l'humanité a fait un pas..... le maître ouvrier est resté inconscient de tout ce qui dépassait les murs de son petit domaine, heureux et fier d'avoir enfin atteint l'objet immédiat de ses préoccupations.

Nous avons fini. Puissent ces lignes, si elles venaient à tomber sous les yeux du célèbre chimiste allemand, lui montrer qu'il est des concessions qu'on ne saurait demander, des omissions qu'on ne saurait commettre, sans fausser l'histoire et froisser les consciences. Sans doute chaque

pays à quelque tendance à célébrer surtout ceux qui l'ont honoré; on les connaît mieux, on apprécie mieux leurs idées et leur œuvre; mais il y aurait de l'ingratitude dans cette admiration exclusive. Felicitons-nous, après tout, que la pensée ne soit pas coulée partout dans le même moule; de la diversité et du choc des jugements et des idées, la vérité se dégage tôt ou tard plus complète et plus sereine. Il est fort heureux que l'on voie et sente ailleurs différemment que dans la savante et glorieuse patrie des J. Liebig, des W. Hofmann, des Baeyer, des V. Meyer. Mais quelle qu'elle soit, il est libéral et haut d'aimer cette vérité pour elle-même et tout entière, qu'elle vienne de la rive droite ou gauche du Rhin, du Danube ou de la Vistule.

Armand Gautier,

Membre de l'Académie des Sciences.

LA CONTRACTION DES MUSCLES STRIÉS

Un des phénomènes les plus curieux que l'on rencontre dans l'étude de la machine animale, est certainement la propriété qu'ont les muscles de se contracter sous l'influence de certaines excitations. Ce fait a depuis longtemps provoqué la sagacité des physiologistes et des anatomistes; aussi les tentatives d'explication ne manquent-elles pas. Un grand nombre d'entre elles nous viennent d'Allemagne, mais jusqu'à ces derniers temps, aucune d'elles ne reposait sur une base sérieuse; trop de théorie et pas assez d'observation. C'est à M. le professeur Ranvier que revient l'honneur d'avoir décrit d'une façon précise les modifications qui se produisent dans un muscle entrant en contraction; M. d'Arsonval a trouvé la première explication scientifique du phénomène.

Avant de décrire les résultats auxquels sont arrivés ces deux expérimentateurs, il nous paraît indispensable d'indiquer en quelques mots quelle est la constitution des muscles.

Un muscle tel que le biceps par exemple se compose de fibres musculaires très fines, mais cependant encore visibles à l'œil nu. Supposons que par un procédé quelconque, nous soyons arrivés à isoler une de ces fibres sur une lame de verre et que nous venions à la regarder au microscope avec un grossissement suffisant; nous verrons une striation transversale très remarquable. Sur un muscle convenablement tendu, cette striation est d'une régularité parfaite, ainsi que l'a démontré M. le professeur Ranvier. Quelle est l'origine de cet aspect si particulier? En traitant la substance du muscle par certains réactifs tels que l'alcool étendu, et la dilacérant sur une lame de verre à l'aide d'aiguilles, on constate que la fibre musculaire se dé-

compose en un grand nombre de fibrilles élémentaires, comme un écheveau de fil peut se diviser en brins. Le muscle de l'aile de l'hydrophile est particulièrement favorable à cette expérience. Regardons une de ces fibrilles à l'aide d'un fort grossissement; elle nous offrira l'aspect représenté par la figure 1, c'est-à-dire une succession de disques




Fig. 1. Fibres musculaires striées (hydrophile). — a, sarcoplasme; b, membrane de Krause. (Les éléments sarcoeux sont bien visibles.) Dans A, les noyaux oblongs des corpuscules musculaires sont indiqués; dans B, le sarcoplasme est anormalement écarté du contenu musculaire. (Les disques contractiles sont seulement indiqués, ainsi que les éléments sarcoeux.) (Klein et Variot.)

alternativement clairs et obscurs; chaque disque clair est de plus partagé en deux par un disque sombre très mince. On conçoit dès lors comment la juxtaposition de ces fibrilles peut donner sa striation à la fibre musculaire.

C'est sur cette constitution bien établie que sont basées les diverses théories de la contraction mus-

culaire. Le problème se compose de deux parties :

1^{re} Quelles sont les modifications de forme qui se produisent dans la fibrille musculaire au moment de la contraction ?

2^{re} Quelle est la cause de ces modifications ?

La première partie semble être des plus simples ; cependant elle a donné lieu aux opinions les plus diverses, et n'a été résolue que par M. Ranvier à la suite de laborieuses et patientes recherches.

Nous ne pouvons rapporter ici les différentes expériences tentées, mais nous allons rapidement citer les meilleures ; elles feront bien comprendre la difficulté de la question et nous mèneront aux derniers travaux de M. Ranvier.

Si l'on arrache une patte à un hydrophile et qu'après avoir enlevé la carapace chitineuse, on dépose le petit muscle qu'on y trouve dans une goutte du sérum s'écoulant de la blessure faite à l'animal, on obtient une préparation de muscles admirablement striés. Ces muscles conservent la

propriété de se contracter spontanément sur la lame de verre pendant qu'on les observe au microscope. On voit comme des ondes parcourir les fibres dans leur longueur, la striation devenant plus fine aux points où se produit la contraction ; il semble que l'on n'ait qu'à observer pour voir quelles sont les modifications de forme. Malheureusement on a affaire à des fibres et non à des fibrilles ce qui rend l'observation de ces dernières très difficile ; de plus, aussitôt que l'on emploie un fort grossissement pour distinguer les disques, le déplacement des fibres au moment de la contraction fait changer le point à chaque instant, il est impossible de suivre un disque dans ses transformations. En face de cette difficulté M. Ranvier songea à utiliser la propriété qu'a l'acide osmique de fixer instantanément les éléments vivants dans leur position. Il fit ainsi au moyen d'injections d'acide osmique dans des muscles de lapin, des préparations de muscles dans les divers états de tension, de contraction et de relâchement. Ces expériences le conduisirent à cette conclusion que la partie active de la fibrille musculaire est le disque sombre épais, c'est lui qui en diminuant de hauteur produit le raccourcissement du muscle. Ce résultat ne fut pas admis par tous les physiolo-

gistes ; il fallait pour achever de convaincre, faire voir cette modification de forme sur le muscle vivant au moment de sa contraction, et c'est à quoi M. Ranvier est arrivé dans un travail communiqué à l'Académie des Sciences le 24 mars 1890.

L'organe sur lequel ont porté les observations est la membrane mince qui recouvre le sac lymphatique rétrolingual de la grenouille. Cette membrane contient dans son épaisseur des faisceaux musculaires d'une grande minceur, un certain nombre d'entre eux n'est probablement composé que d'une seule rangée de fibrilles et à l'aide d'un bon objectif à immersion on peut y suivre la succession des disques épais, disques clairs, et disques minces.

On décapait une grenouille, et enlevant avec soin la membrane rétrolinguale, on la place dans de l'eau salée à 7,5 pour mille sur une lame de verre de forme spéciale. Une rainure creusée dans le verre circonscrit un espace circulaire sur lequel

on place la membrane qu'on peut tendre à l'aide d'un anneau de platine entrant dans la rainure. L'espace central est d'ailleurs un peu en contrebas pour éviter les compressions (fig. 2). On place aux deux extrémités d'un diamètre des languettes de papier (e, e') d'étain qui ser-

viront d'électrodes pour provoquer les contractions, et on recouvre avec une lamelle, et on borde avec soin à la paraffine. Cela fait, à l'aide d'un bon objectif à immersion, on observe les disques d'une fibrille se trouvant dans la direction des languettes de papier d'étain. Pour mettre ces électrodes en communication avec la bobine d'induction, il suffit de déposer sur elles deux petites masses de plomb percées d'un trou au travers duquel passe un fil de platine replié en dessous (fig. 3). On peut ainsi à vo-




Fig. 2. — A, porte objet électrique ; e, électrodes de papier d'étain ; p, masses de plomb servant à établir le contact des fils conducteurs de l'appareil électrique avec les électrodes.



Fig. 3. — B, une des masses de plomb de la figure 2.

lonté examiner les fibrilles à l'état de relâchement ou de contraction ; il n'y a pas de déplacement, la membrane étant bien fixée par l'anneau de platine.

M. Ranvier a pu ainsi vérifier l'exactitude de ses premières expériences, c'est le disque épais qui est

la partie active du muscle ; au moment de la contraction il devient plus mince ; sa forme qui est celle d'un cylindre allongé tend vers celle de la sphère.

Ces observations s'accordent parfaitement avec l'explication donnée par M. d'Arsonval de la contraction musculaire. On se rappelle les travaux de M. Lippmann sur la variation de forme qu'éprouve la surface de séparation du mercure et de l'eau acidulée, lorsque les deux côtés de cette surface se trouvent à des états électriques différents. M. d'Arsonval a étendu ces recherches à d'autres liquides et a fait voir que le phénomène était général. Chaque fois qu'il y aura des corps liquides ou semifluides juxtaposés, il se produira des variations de forme de la surface de séparation, lorsque les deux côtés seront à des états électriques différents.

En particulier nous pouvons appliquer ce fait à la limite des disques sombres et clairs, et la question sera complètement résolue le jour où il sera démontré qu'il se produit des variations électriques entre les disques clairs et sombres, lorsque l'on excite un muscle. Sans que cette démonstration soit encore faite d'une façon indiscutable, il suffit de songer à la complexité des phénomènes chimiques qui se passent dans l'intimité des organes, pour comprendre que cette hypothèse n'a rien d'in vraisemblable. Les expériences de M. d'Arsonval où il a construit en quelque sorte des muscles artificiels tendent d'ailleurs à la justifier.

D^r Georges Weiss,

Professeur agrégé
à la Faculté de Médecine.

REVUE ANNUELLE DE BOTANIQUE

En essayant de réviser les récents progrès de la Botanique, nous ne saurions songer à signaler tous les travaux qui s'y rapportent. Nous indiquerons seulement les plus importants, insistant de préférence sur ceux qui cette année ne seront point l'objet d'articles spéciaux dans ce Recueil.

I

Parmi les divers membres des végétaux, un certain nombre sont *endogènes*, c'est-à-dire se constituent à l'intérieur des tissus et apparaissent bientôt tout formés à travers les déchirures de ceux-ci ; ces membres, tels que les racines et un certain nombre de bourgeons, ont donné lieu à de nombreuses recherches. Les résultats contradictoires obtenus jusqu'ici ne permettaient pas de formuler avec netteté les conditions de cette origine et le mécanisme de la sortie.

MM. Van Tieghem et Douliot (1) ont repris cette étude en l'étendant à presque toutes les familles végétales. Le mémoire qu'ils viennent de publier, après trois ans de recherches patientes, ne comprend pas moins de six cents états de développement répartis dans 40 planches, et les auteurs annoncent « qu'on en a dessiné plus de mille et préparé, comparé et analysé 20 fois autant », ce qui représente une moyenne de 18 ou 19 espèces ou états de développement étudiés par jour pendant 3 ans !

C'est donc un véritable monument que ce travail, dont les résultats peuvent cependant être formulés en quelques pages, tant est simple la loi de développement que les auteurs ont trouvée.

Examinons d'abord l'apparition des racines à

(1) Recherches comparatives sur l'origine des membres endogènes dans les plantes vasculaires, *Ann. Sc. nat.*, 7^e série, t. VIII, 1889.

l'extérieur. Quand ces organes ont constitué toutes leurs régions caractéristiques : coiffe, écorce, cylindre central, au sein des tissus du membre générateur, elles n'ont plus qu'à perforer l'écorce de celui-ci pour se faire jour au dehors. On admettait jusqu'ici, que la sortie de la racine a lieu par un phénomène purement mécanique : elle refoule peu à peu et déchire les tissus qui la recouvrent. D'après MM. Van Tieghem et Douliot, les choses se passeraient autrement. Suivant eux, la racine pousse le plus souvent devant elle, une couche plus ou moins épaisse du membre générateur (fig. 1),



Fig. 1. — Racine de *Zamia Yalissii*, p, poche ; ep, épiderme ; ec, écorce ; c, cylindre central ; en, endoderme.

qui demeure vivante et se cloisonne en s'étendant progressivement. Cette couche sécrète le liquide diastatique qui digère le tissu extérieur, en absorbe les produits solubles et les transmet à la racine sous-jacente en ne conservant pour elle que ce qui est nécessaire à sa propre croissance. Les auteurs

désignent cette couche sous le nom de *poche digestive*, ou simplement de *poche*. Les diverses racines peuvent présenter à cet égard de grandes différences : tantôt la poche entoure toute la racine, tantôt elle n'existe qu'au sommet, tantôt enfin elle manque et c'est la racine elle-même qui digère les tissus pour sortir.

L'existence de cette poche, étrangère à la racine proprement dite, amène les auteurs à modifier la nomenclature adoptée jusqu'ici pour distinguer les régions de l'extrémité de la racine. Conservant le nom de *coiffe* pour tous les tissus qui en protègent le sommet, sans distinction d'origine ; ils reconnaissent, dans cette coiffe, deux parties d'origine différente : la *calyptré* et la *poche*, étrangère à la racine, et procédant de la même origine que l'écorce et le cylindre central et recouvrant immédiatement le point végétatif. La *calyptré* est souvent revêtue d'une *poche*, étrangère à la racine, et persistant un temps plus ou moins long en dehors de celle-ci.

Si l'on compare entre elles les diverses racines des plantes, on constate alors, d'après MM. Van Tieghem et Douliot, que la coiffe peut être formée, à tout âge, d'une poche (*Lemma*) ou seulement d'une calyptré (Crucifères, Lycopodiacees, Fougères) ou enfin, comme c'est le cas le plus ordinaire, d'une poche et d'une calyptré. La distinction de ces deux parties d'origine différente dans la coiffe de certaines racines, avait déjà été faite par M. Lemaire (1), et les auteurs ont seulement vérifié, en changeant les termes, les résultats que M. Lemaire avait nettement établis et que MM. de Janczewski et Reinke avaient soupçonnés.

La digestion des tissus du membre générateur par la poche de la jeune racine, est une des parties originales du mémoire. M. Reinke, et plus récemment M. Vönhöbne ont fait remarquer que la destruction du tissu cortical qui recouvre la jeune racine a lieu souvent par un phénomène chimique qu'ils ont nommé *résorption*. MM. Van Tieghem et Douliot sont plus affirmatifs ; d'après eux, il y a digestion sous l'influence des diastases sécrétées par la poche (fig. 2) et absorption consécutive des produits de digestion, d'abord par la poche, puis par la jeune racine. Des affirmations aussi catégoriques exigeaient quelques développements. Quelles sont les diastases sécrétées par cette poche ? Comment les auteurs ont-ils pu les mettre en évidence ? Par quels moyens se sont-ils assurés que les produits de digestion sont absorbés par les racines ? Le lecteur chercherait vainement une réponse à ces questions dans le mémoire de MM. Van Tieghem et Douliot.

Examinons maintenant l'origine des radiculles et des racines latérales.




Fig. 2. — Racine latérale de *Ruyschia souroubea*, p, poche.

Chez les Phanérogames, le péricycle simple (fig. 3) se cloisonne d'abord en direction tangentielle dans un nombre de cellules pair ou impair, formant la *plage rhizogène*, puis l'assise interne (fig. 4 et 6) se cloisonne à son tour en laissant, sur la plage rhizogène, une rangée de cellules non cloisonnées, for-



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.

Fig. 3, 4 et 5. — Développement d'une radiculle d'*Hypericum pyramidatum* et (fig. 6) d'une racine latérale de *Cenchrus tribuloides*, p, poche; ep, épiderme; ec, écorce; c, cylindre central; e, épistèle; en, endoderme; pe, péricycle.

mant l'épistèle. On a alors trois assises superposées en direction radiale : la rangée externe forme l'épiderme aux dépens duquel se constituera la ca-

(1) Recherches sur l'origine et le développement des racines latérales chez les Dicotylédones. *Ann. Sc. nat.* 7^e série, t. III, 1886.

lyptre; la rangée moyenne développe l'écorce et la rangée interne constitue le cylindre central de la jeune racine (fig. 3). Si le péricycle comprend plusieurs assises, l'assise externe seule fournit les trois régions de tissus signalés plus haut.

Cette origine est générale chez les Phanérogames (fig. 3 à 6 et 7, 8) à l'exception de certaines Monocotylédones où l'épiderme et l'écorce ne se séparent pas (Pontédériacées, *Pistia stratiotes*). Elle est aussi la même pour les radicules naissant sur la racine principale et les racines latérales, ou pour ces dernières lorsqu'elles se développent sur la tige.

Pendant l'évolution des diverses régions de la racine ou de la radicule aux dépens d'une seule assise du péricycle, l'endoderme s'accroît et forme une ou plusieurs assises qui enveloppent la jeune racine et forment, autour de son sommet, la *poché digestive* déjà décrite plus haut (Crucifères et beaucoup de Capparidées, Papavéracées, etc.).

Chez les Cryptogames vasculaires, l'ensemble des tissus de la racine latérale procède d'une cellule de l'endoderme et le péricycle sous-jacent forme seulement la base de la racine. Les Cryptogames vasculaires diffèrent essentiellement des Phanérogames, à l'exception des Lycopodiacées, par la différenciation très précoce de l'endoderme, par l'origine uni-cellulaire et endodermique des radicules, qui, chez les Phanérogames, sont d'origine pluricellulaire et péricyclique.

Au cours de leur travail, MM. Van Tieghem et Douliot ont eu l'occasion de constater que la règle posée autrefois par M. Van Tieghem sur l'arrangement des radicules comportait de nombreuses exceptions; ils formulent alors la loi suivante: si la racine-mère a plus de deux faisceaux ligneux, les radicules forment autant de rangées que de faisceaux ligneux; elles sont *isostiques*; s'il y a deux faisceaux seulement dans la racine-mère, les radicules sont en nombre double des faisceaux, c'est-à-dire *diplostiques*. Tandis que chez les Monocotylédones et les Cryptogames vasculaires, les racines sont toujours *isostiques*, les Dicotylédones présentent des racines *isostiques* ou *diplostiques*, avec exception pour les Ombellifères, Araliacées, Pittosporées.

Tels sont les principaux résultats du mémoire de MM. Van Tieghem et Douliot.

La méthode employée dans ces recherches n'est pas nouvelle, c'est la méthode générale utilisée en anatomie pour observer le développement d'organes ou d'individus trop volumineux pour être observés directement. Elle consiste à pratiquer chez des individus de la même espèce, placés dans les mêmes conditions, des coupes minces passant au milieu des organes à étudier; on soumet ces

coupes à l'action de réactifs destinés à enlever les substances qui gênaient l'observation et à colorer, de manières différentes, les régions que l'on veut étudier. En comparant entre elles les diverses coupes ainsi préparées, on admet qu'elles représentent chacune, un des stades de l'évolution que l'un des individus aurait parcouru, si l'on ne l'avait pas tué pour l'étudier: c'est ce que l'on appelle *suivre le développement*. Pour que cette méthode fournisse des résultats défiant toute critique, plusieurs difficultés doivent être surmontées: il faut comparer des objets comparables, c'est-à-dire des coupes orientées toutes de la même façon, dans une région donnée de l'organe; il faut s'assurer, en outre, que les réactifs employés n'ont pas altéré la nature, la forme ou l'arrangement des régions que l'on veut observer. On aurait désiré savoir comment les auteurs ont triomphé de ces difficultés.

La comparabilité des coupes est en effet difficile à obtenir quand on étudie l'évolution des membres endogènes; ces organes se développent en des points qu'il est impossible de déterminer rigoureusement, car aucun caractère extérieur ne vient indiquer l'endroit où ils naissent. En outre, le début de leur évolution a lieu, le plus souvent, dans une région où la différenciation des tissus est incomplète, de sorte que les points de repère qui permettent, dans une tige ou une racine adulte, de fixer souvent la limite de l'écorce et du cylindre central sont défaut; cela a lieu surtout dans la tige où il est impossible parfois de tracer, même à l'état adulte, cette ligne de démarcation.

A quel caractère les auteurs reconnaissent-ils qu'une coupe passe par l'axe de l'organe en voie d'évolution? Comment établissent-ils la correspondance entre les assises cellulaires de l'organe générateur et celles de la racine, lorsque la différenciation n'est pas accomplie? MM. Van Tieghem et Douliot disent, il est vrai, que la coupe est axiale quand l'écorce ne présente au sommet qu'une assise cellulaire, mais c'est là une pétition de principe, puisque dans les *très jeunes* racines, les limites de l'écorce sont à déterminer par l'examen même des coupes qu'il faut orienter. Une critique de la méthode était d'autant plus nécessaire dans ce mémoire, que, par le procédé d'éclaircissement des coupes qu'ils ont employé, les auteurs se sont volontairement privés d'un moyen de contrôle, délicat, il est vrai, et peu employé jusqu'ici: la nature et les modifications du contenu cellulaire. MM. Van Tieghem et Douliot n'ont observé que l'arrangement des files cellulaires.

Les nombreux dessins qui accompagnent leur mémoire ne sont pas probants et ne représentent pas exactement les préparations dont ils devraient être la copie scrupuleuse; les auteurs n'ont pas

échappé au défaut fâcheux de la plupart des anatomistes, en accentuant plus vigoureusement les lignes qu'ils croient être les limites des régions de tissus. Si l'on jette les yeux sur les figures reproduites ci-contre (fig. 7 et 8), on peut constater en

fications nécessaires qu'elles paraissent imposer avant d'être acceptées définitivement.

II

La circulation des matières nutritives dans les plantes vasculaires est une des questions les plus controversées, surtout en ce qui concerne les courants dont le liber est le siège. Étudions cette question en examinant le mémoire que M. Lecomte (1) vient de publier.

Le courant du liber, désigné à tort sous le nom de sève descendante ou de sève élaborée n'était pas encore nettement localisé; le sens de ce courant, la nature des matériaux qui le composent, exigent la connaissance minutieuse du liber et des tissus de l'écorce : ainsi s'expliquent les nombreux travaux dont ce tissu a été l'objet. Néanmoins, dans cette étude si souvent entreprise, M. Lecomte a pu obtenir des résultats nouveaux et rectifier bon nombre de faits déjà connus.

Les éléments caractéristiques du liber sont les tubes criblés, formés de cellules placées bout à bout et séparées les unes des autres par des cloisons transversales ou obliques, dont la membrane paraît perforée d'une multitude de trous lui donnant l'aspect d'un crible : d'autres cloisons placées latéralement détachent, de chaque tube criblé, des cellules aplaties très petites, appelées cellules compagnes et remarquables par les dimensions considérables de leur noyau. Les cribles occupent les parois transversales ou obliques et parfois même les parois longitudinales paraissent perforés pendant la période de végétation active; mais à l'époque du repos végétatif, ces cribles se ferment par la formation de bouchons, nommés bouchons calleux, constitués par une substance très différente de la cellulose. Le contenu des tubes criblés est très riche en matières albuminoïdes emprisonnant des grains d'amidon semblables à l'amylo-dextrine et l'on y trouve un noyau qui disparaît habituellement de très bonne heure.

M. Lecomte a démontré la nécessité d'étudier les matériaux frais ou conservés dans l'eau sucrée pour l'observation, si importante au point de vue physiologique, du contenu des tubes criblés. L'examen des matériaux secs convient seulement pour la topographie du liber; l'emploi de l'alcool absolu qui fixe et coagule les matières protéiques, présente des inconvénients. L'action de l'alcool, signalée d'abord par M. Fischer chez la Courge, a été observée par M. Lecomte sur un grand nombre de plantes; en variant les expériences, cet auteur a pu déterminer à volonté et en des places diverses la formation de ces bouchons mucilagineux dont la




Fig. 7 et 8. — Formation des racines latérales de *Pardantus Chinensis*, p, poche; ep, épiderme; ec, écorce; c, cylindre central; e, épistème; en, endoderme; pe, péricycle.

effet l'existence de traits forts et de hachures qui marquent les diverses régions de la racine. Ces hachures et ces traits forts n'existent pas dans les préparations; ce sont les auteurs qui les ont marquées et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles confirment les conclusions émises; — on se demande même, en face de certains dessins (fig. 1, 2 et 8), pourquoi le trait fort passe en un endroit plutôt qu'en un autre. Sur quels indices les auteurs se sont-ils appuyés pour marquer les traits forts et les hachures dont les préparations n'offrent pas trace? C'est ce que la lecture très attentive du mémoire ne peut faire découvrir.

En discutant la question des cellules initiales du sommet de la racine des Légumineuses, MM. Van Tieghem et Douliot repoussent l'opinion professée par MM. Russow, de Janczewski, Flahault, Eriksson, d'après laquelle, dans cette famille, les racines auraient, au sommet, un groupe d'initiales commun aux diverses régions des tissus; et ils affirment l'existence d'initiales distinctes pour la calyptré, l'écorce et le cylindre central. A quels caractères reconnaît-on une cellule initiale? Pourquoi y a-t-il tantôt une, tantôt plusieurs cellules initiales? Les explications étaient d'autant plus nécessaires que les auteurs, comme on l'a vu plus haut, ne peuvent invoquer en faveur de leur opinion ni la nature du contenu cellulaire, ni l'état des noyaux.

On ne peut donc que regretter, dans ce remarquable mémoire, l'absence d'une critique de la méthode, car elle diminue l'importance des résultats publiés et affaiblit la valeur des objections que les auteurs ont adressées à leurs devanciers. Mais l'autorité du savant éminent qui a dirigé ces recherches, ne peut que grandir à la suite des véri-

(1) Contribution à l'étude du Liber des Angiospermes, Ann. sc. nat. 7^e série t. X, p. 193, 1889.

présence avait été utilisée par Nägeli, pour fixer le sens du courant nutritif dans les tubes criblés.

Les tubes criblés sont-ils vivants? Cette question a été tranchée en faveur de la négative par des considérations purement spéculatives : la disparition précoce du noyau dans ces éléments. Certains botanistes admettent, en effet, que la disparition du noyau dans une cellule qui en était pourvue est un signe de mort pour celle-ci. Comme le fait remarquer avec beaucoup de raison M. Lecomte, on n'a jamais songé à contester la vitalité des globules rouges de l'homme, quoique le noyau n'y apparaisse pas, à l'état adulte, sous l'aspect d'un corps figuré. Que la disparition du noyau change les conditions de vie de la cellule et supprime chez elle notamment les phénomènes de cloisonnement ou de division, nul n'y peut contredire, mais rien ne prouve que la cellule soit morte. Les observations de M. Lecomte l'amènent à une conclusion différente. D'abord la disparition du noyau n'est pas aussi précoce qu'on le croit et, dans bien des tubes criblés, cet auteur a pu retrouver le noyau niché dans la couche pariétale du protoplasme; en outre, avant sa disparition comme corps figuré, le noyau perd la propriété de fixer les réactifs colorants, ce qui empêche de le distinguer; lorsqu'il disparaît enfin, sa substance semble être disséminée dans la couche pariétale du protoplasme. Pour M. Lecomte, les tubes criblés, arrivés à la période d'activité, se composent d'une couche pariétale de protoplasme se continuant au niveau des cribles, et d'une grande vacuole centrale, renfermant des substances albuminoïdes en dissolution. Parmi les raisons qui militent en faveur de cette opinion, signalons la continuité du revêtement protoplasmique des tubes avec le contenu des cellules compagnes qui sont manifestement vivantes, ainsi que les mouvements observés dans le contenu des tubes criblés et qui sont analogues à ceux qu'offrent les cellules munies de noyaux. Les tubes criblés sont donc des éléments vivants et leur fonction conductrice est liée à leur vitalité.

Les données relatives au rôle du liber dans la circulation, sont vagues et peu nombreuses; elles consistent seulement dans l'observation des bourrelets qui se forment au-dessus de la dénudation corticale annulaire de certaines tiges; mais la part que prennent les diverses régions de l'écorce à la formation des bourrelets n'avait pas encore été précisée. D'après les observations de M. Lecomte, dans les tiges dépouillées d'un anneau complet d'écorce jusqu'au cambium, le diamètre de la tige s'accroît beaucoup plus au-dessus de la blessure qu'au-dessous; cet accroissement de diamètre est dû surtout à l'écorce, c'est-à-dire à toute la région extérieure au cambium, et dans celle-ci, le liber

manifeste un accroissement bien supérieur à celui du parenchyme cortical.

Le développement exagéré du liber au-dessus de la décortication, montre que ce tissu est plus riche que le parenchyme cortical en substances capables d'être utilisées pour l'accroissement. Si donc on enlève l'écorce extérieure au liber, en laissant ce dernier aussi intact que possible, le courant des matériaux nutritifs, qui circulent dans ce tissu, ne sera pas interrompu et l'accroissement en diamètre ne pourra se réaliser; c'est ce que montrent les expériences réalisées par l'auteur sur le Sureau noir, la Vigne vierge, le Tilleul, où les bourrelets formés au-dessus et au-dessous de la décortication, sont de même dimension et entièrement formés par du liège. Dans ce cas, on constate que l'amidon s'accumule en plus grande quantité dans le parenchyme cortical situé au-dessus de la blessure que dans le tissu situé au-dessous. Ces résultats permettent à M. Lecomte de conclure que les tubes criblés conduisent seulement les matières albuminoïdes, tandis que l'amidon et d'autres composés ternaires contenus dans le parenchyme diffusent d'une cellule à l'autre, par une série de dissolutions et de précipitations successives.

Le sens du courant peut être fixé, d'abord par la situation des bourrelets au voisinage des décortications annulaires, et aussi par la situation des corps figurés, grains d'amidon, globules albuminoïdes; on peut constater que, dans une tige, les corps figurés sont placés au-dessus du crible et que, par suite, le courant est dirigé de haut en bas; mais ce sens n'est pas constant et peut varier aux diverses époques de la végétation. Ainsi dans de jeunes pousses souterraines de Ronce, l'accumulation des corps figurés existe à la face inférieure des cribles et le courant se dirige de la base vers le sommet de la tige. On voit combien le terme de sève descendante est défectueux.

Le mécanisme de ces courants est difficile à établir; dans un petit nombre de plantes (Vigne, Courge) il y a réellement perforation des cribles, de sorte que l'auteur a pu observer, au travers de ceux-ci, des filaments ou des boutons muqueux manifestant le passage du contenu d'un tube dans un autre. Mais chez la plupart des plantes, les cribles ne sont pas réellement perforés, comme on l'a cru pendant longtemps, et le passage des matériaux a lieu par un phénomène de filtration que favorisent les variations de température et les différences de tension.

III

Le noyau cellulaire a pris depuis vingt ans, une importance capitale dans l'histoire de la genèse des individus ou des tissus. Les beaux travaux de

MM. Strasbûrger, Flemming, Guignard, Treub, etc., ont établi le rôle prédominant du noyau dans la division des cellules et dans la formation de l'œuf. Il n'est pas inutile de rappeler brièvement la constitution de cet organe fondamental de la cellule. Le noyau ou cytoplasme est formé par un mélange de matières albuminoïdes encore mal définies, malgré les analyses que l'on a publiées ; on peut y distinguer à l'état de repos : 1° une charpente chromatique formée par un ou plusieurs filaments de substance nommée *nucléine* qui fixe énergiquement les réactifs colorants ; ces filaments sont contournés sur eux-mêmes de manière à former une pelotte un peu lâche ; 2° les intervalles des replis de la charpente chromatique sont remplis d'un liquide appelé *suc nucléaire*, qui ne fixe pas ou fixe difficilement les matières colorantes ; dans le suc nucléaire nagent un ou plusieurs corps arrondis, les *nucléoles*. Tout cet ensemble est entouré d'une membrane propre, la *membrane nucléaire*.

C'est à la charpente chromatique, que le noyau doit la part prépondérante qu'il prend dans les phénomènes de division ; les segments dont elle se compose peuvent en effet se séparer chacun, par une scission longitudinale, en deux fragments égaux de manière à former deux nouveaux noyaux ayant la même quantité de nucléine et le même nombre de segments.

L'étude des phénomènes de la fécondation a excité au plus haut degré l'attention des histologistes, qui espèrent découvrir, dans les transformations successives du noyau, la raison des différences de propriété entre l'œuf et la cellule végétative normale. On sait déjà que les cellules mâles et femelles communiquent à l'œuf des propriétés nouvelles qu'on ne rencontre pas dans les cellules des organes végétatifs. Avec la transmission des propriétés héréditaires, l'œuf acquiert et imprime à l'individu sorti de lui, une puissance de variation plus ou moins grande qu'on n'observe pas dans les cellules végétatives, puisque les individus produits par le bouturage et le marcottage perpétuent sans changement, non seulement les caractères héréditaires, mais encore ceux que l'adaptation ou la culture ont introduits. On comprend tout l'intérêt d'une comparaison entre la structure de l'œuf et celle des cellules végétatives.

Longtemps on a cru que l'œuf résulte de la fusion de deux cellules, l'une mâle l'autre femelle, mélangeant intimement leur protoplasme et leur noyau ; mais une étude plus attentive a montré que cette copulation a lieu seulement entre les noyaux. La fécondation exige-t-elle la copulation des noyaux et le mélange plus ou moins intime des charpentes chromatiques ? ou réside-t-elle seule-

ment dans la présence côte à côte, au sein de la masse protoplasmique femelle, du noyau mâle et du noyau femelle ? La solution de cette question exigeait l'observation suivie du développement des noyaux avant, pendant et après la fécondation. C'est cette étude que vient de faire M. Guignard et que nous allons résumer d'après ses travaux (1) et ceux de M. Stasbûrger (2).

Dans le grain de pollen des Angiospermes, chez le *Lis*, par exemple, on distingue deux cellules, l'une végétative, l'autre reproductrice ; le noyau végétatif, après avoir pénétré le premier dans le tube pollinique, ne tarde pas à disparaître dans la masse protoplasmique générale. Au contraire la charpente chromatique du noyau générateur devient plus lâche et manifeste, au moment de la division indirecte du noyau, les 12 segments dont elle se compose ; chacun de ceux-ci se dédouble longitudinalement dans la plaque nucléaire et il se constitue ainsi 2 noyaux générateurs, ayant chacun 12 segments chromatiques et emportant avec eux la moitié du protoplasme de la cellule génératrice.

Le noyau femelle, développé dans le sac embryonnaire, présente une analogie complète avec le noyau mâle ; en effet dans le sac embryonnaire du *Lis*, le gros noyau primaire est formé de 12 segments chromatiques ; il se dédouble, par scission longitudinale des segments en 2 noyaux d'abord semblables à l'origine ; l'un d'eux se dirige au fond du sac pour former les antipodes ; l'autre au sommet, sous le micropyle, pour former l'appareil sexuel. Mais tandis que dans les 4 noyaux qui forment ce dernier, le nombre des segments chromatiques reste constant et égal à 12 ; les 4 noyaux inférieurs, qui formeront les cellules antipodes, montrent une augmentation de la substance nucléaire et le nombre des segments est plus considérable, il est souvent de 20 à 24. Ainsi se différencient déjà les deux groupes cellulaires du sac, le groupe sexuel, auquel appartient l'oosphère, présentant un nombre de segments chromatiques égal à celui des noyaux mâles.

Au moment de la fécondation, le tube pollinique, qui s'est insinué jusqu'au contact du sac embryonnaire, à côté ou entre les deux synergides, se renfle un peu à son sommet, le noyau mâle le plus rapproché traverse la membrane et va rapidement s'accoler au noyau de l'oosphère, le second noyau générateur reste dans le tube pollinique ou à son extrémité et se dissocie le plus souvent assez rapidement ainsi que les noyaux des synergides. D'après M. Guignard, le protoplasme du noyau géné-

(1) *Études sur les phénomènes morphologiques de la fécondation.* Bull. Soc. Bot. de France, 1889.

(2) *Über Kern- und Zelltheilung*, 1888.

rateur fertile ne paraît pas l'accompagner au moment de sa sortie du tube pollinique et de son accolement au noyau femelle.

Quand il pénètre dans l'oosphère, le noyau mâle est plus petit que le noyau femelle, à cause de la condensation de la charpente chromatique qui ne renferme, dans ses interstices, qu'une faible quantité de substance nucléaire; mais, au bout d'un certain temps, ce noyau grossit peu à peu en se nourissant aux dépens du protoplasme de l'oosphère: il prend alors les caractères d'un noyau au repos et devient semblable au noyau femelle en conservant cependant une taille plus faible. C'est seulement au bout de quelques jours que la membrane de chaque noyau disparaît, les substances nucléaires se mélangent et les nucléoles disparaissent; le noyau de l'œuf est formé et la fusion des segments chromatiques n'a pas encore eu lieu; cependant il est encore impossible à cet état de compter ceux-ci. Mais bientôt, quand les phases de la division du noyau se produisent, et que les segments chromatiques s'orientent pour former la plaque nucléaire, on peut constater qu'ils sont au nombre de 24.

Cet apport égal d'éléments mâles et femelles dans la formation de l'œuf est-il constant? Les observations combinées de MM. Strasbûrger et Guignard tendent à le montrer. Dans le *Fritillaria meleagris*, il y a également 24 segments chromatiques dans l'œuf et 12 segments dans le noyau mâle et le noyau femelle. Dans l'*Alstrœmeria psittacina*, il existe 8 segments dans le noyau mâle, 8 dans le noyau femelle, et le noyau de l'œuf présente, comme chez l'*Agraphis*, 46 segments chromatiques.

La parité des segments chromatiques dans les noyaux mâle et femelle au moment de la fécondation, soupçonnée d'abord par M. Strasbûrger et démontrée directement par M. Guignard dans le noyau de l'œuf, paraît donc être la règle chez les Phanérogames. Le même phénomène a été observé, quoique moins souvent, chez les animaux, d'après les observations de MM. Van Beneden sur l'*Ascaris megalocephala*, où chaque noyau sexuel offre 2 segments chromatiques, et de M. Carnoy sur le *Coronilla robusta* avec 4 segments et 8 dans le *Spiroptera strumosa*, etc.

Cependant cette loi n'est peut-être pas générale, car M. Platner a observé, chez l'*Arion empiricorum*, une inégalité dans le nombre des segments chromatiques, à l'avantage des noyaux femelles. Il serait intéressant de rechercher, dans les nombreux exemples de fécondation croisée, si la parité des segments chromatiques se maintient dans l'œuf de l'hybride ou du métis, et si l'on ne rencontrerait pas déjà dans l'œuf des différences qui attestent l'influence prépondérante de l'un des parents sur

le produit de la fécondation croisée. L'habileté bien connue de MM. Guignard et Strasbûrger nous réserve encore bien des surprises dans le domaine si intéressant de l'embryogénie.

IV

L'utilisation des détritits organiques et de l'humus, par les végétaux tels que les essences forestières, dans un sol non amélioré par la culture, ne laissait pas que d'embarrasser les physiologistes. La découverte, par M. Frank, d'un singulier phénomène de symbiose entre les racines des Cupulifères et le mycélium de certains champignons, a permis d'expliquer comment les essences forestières fixent une assez grande quantité d'azote dans un sol dépourvu de nitrates, renfermant ce corps seulement à l'état de composés organiques non assimilables par les racines.

Quand on arrache des racines de Hêtre, d'Aulne, de Noisetier, croissant dans un sol riche en humus, on est frappé par l'abondance des ramifications et par leur aspect coralloïde. À l'examen microscopique, ces racines se montrent revêtues d'un manchon assez compact, enveloppant l'extrémité et formé entièrement par un feutrage de filaments mycéliens; à la face interne de ce manchon, les filaments s'insinuent plus ou moins profondément entre les cellules de l'écorce sans perforer l'endoderme. À l'extérieur, ces filaments se continuent avec ceux qui cheminent entre les débris de feuilles. La présence de ce manteau de mycélium autour de l'extrémité de la racine amène l'avortement des poils radicaux et détermine la réduction plus ou moins complète de la coiffe; en outre, il excite l'activité des tissus et provoque la formation de nombreuses radicules qui donnent à l'ensemble, l'aspect coralloïde caractéristique. M. Frank a montré que cette association n'est pas due au parasitisme, car le tissu des racines envahies reste sain: c'est un phénomène de symbiose dans lequel les racines fournissent au champignon des hydrates de carbone qu'il ne peut fabriquer, et reçoivent de lui en échange, les matières azotées qu'il a assimilées dans les substances organiques du sol. M. Frank a proposé de nommer *mycorrhizes* cette association du champignon et de la racine en un organe particulier capable d'assimiler les matières humiques.

Ces singulières formations ont été d'abord décrites chez les Cupulifères, les Conifères, les Ericacées et les Orchidées, mais elles peuvent se rencontrer chez presque toutes les familles. Ainsi M. Schlicht (1) a publié récemment un mémoire dans

(1) Beiträge zur Kenntniss der Verbreitung und der Bedeutung der Mycorrhizen. *Landwirth. Jahrbücher*. XVIII, Band., p. 478, 1889.

lequel il donne la liste de quatre-vingt espèces réparties dans vingt-sept familles, dont les racines ont offert des mycorhizes. Par contre, certaines espèces du même genre n'en présentent jamais; parmi les plantes citées, notons le Fraisier, la Carotte, le *Mentha arvensis*, qui, lorsqu'elles sont cultivées dans les jardins, n'offrent pas de mycorhizes, tandis que celles qu'on a recueillies dans une terre riche en humus, ont présenté ces formations. L'état de symbiose entre les racines et les champignons du sol n'est donc pas indispensable à la plante, il ne se développe que dans un terrain riche en matières organiques. On comprend tout l'intérêt de ces découvertes au point de vue de la nutrition des plantes.

A quelles espèces appartiennent les champignons des mycorhizes? sont-elles spécifiquement distinctes ou bien la symbiose peut-elle être réalisée par les champignons très divers qui croissent sous le couvert des forêts? Les recherches entreprises tendent à montrer, qu'à ce point de vue, les caractères génériques ou spécifiques sont indifférents. En effet, M. Reess a déjà démontré la continuité des filaments mycéliens de certaines mycorhizes avec les fructifications d'une tubercacée, l'*Elaphomyces granulatus* et tout récemment, M. Noack (1), a établi que le mycélium de plusieurs Basidiomycètes peut entrer en relations symbiotiques avec les racines des plantes: tels sont parmi les Gastéromycètes, les *Geaster fimbriatus* et *formicatus* qui se rencontrent principalement dans les forêts de Conifères et parmi les Hyménomycètes, diverses espèces des genres *Agaricus*, *Cortinarius*, *Lactarius*.

Les caractères spécifiques disparaissent donc dans ce consortium qu'on appelle mycorhizes; ce sont les caractères physiologiques de nutrition qui déterminent l'association: les cellules de l'hyphe, capables d'assimiler les matières organiques azotées du sol, contractant alliance avec les cellules de la racine qui reçoivent les hydrates de carbone élaborés par la fonction chlorophyllienne.

Mais si l'importance de cette symbiose est rendue probable par l'examen anatomique, il reste encore à faire connaître, au point de vue physiologique, la nature des emprunts faits au sol par les mycorhizes et les échanges qui existent entre les deux organismes juxtaposés.

V

Parmi les substances fondamentales de la membrane, la cellulose, la plus anciennement connue, se présente à des états physiques très différents, susceptibles d'être ramenés, par des actions chimiques spéciales, à une même forme, définie princi-

palement par la solubilité dans le réactif cupro-ammoniacal et par la coloration bleue ou violette qu'elle prend sous l'influence des réactifs iodés (acides et sels minéraux concentrés). La distinction proposée par M. Freymy, des variétés de cellulose sous le nom de cellulose ordinaire, paracellulose et métacellulose, ne pourra bientôt plus être admise à la suite des travaux publiés sur cette substance. Laisant de côté des recherches en cours d'exécution, que j'ai commencées depuis plusieurs années, je résumerai les résultats des observations de MM. Hoffmeister et Reiss.

M. Hoffmeister (1) propose une nouvelle méthode de dosage de la cellulose, destinée à remplacer la méthode de Weende, depuis longtemps employée dans l'analyse des fourrages. Il soumet les tissus à une macération à froid dans l'acide chlorhydrique, plus ou moins concentré, additionné de chlorate de potasse; quand ceux-ci ont pris une teinte jaune clair, ce qui arrive ordinairement au bout de 24 heures, on lave à l'eau, puis à l'ammoniaque étendue et tiède, et l'on obtient après filtration, si la macération a duré assez longtemps, un résidu blanc que l'auteur considère comme de la cellulose pure, le mélange chloré ayant oxydé et rendu soluble les matières azotées, l'amidon, etc.

Comparant ses résultats à ceux de la méthode de Weende, il constate que son procédé fournit un rendement plus considérable de cellulose, et il attribue ces différences à la destruction partielle que la cellulose subit sous l'action de l'alcali employé dans la méthode de Weende. La cellulose obtenue se comporte en effet, vis-à-vis des solutions froides de soude caustique (de 1 à 5 %), de manières différentes; une partie se dissout, l'autre reste insoluble. La proportion de cellulose dissoute dans la soude caustique est variable, celle du son se dissout dans la proportion de 49/100; la cellulose des membranes de Pomme de terre 36/100, enfin la cellulose du *Cetraria Islandica* est entièrement dissoute.

La cellulose dissoute dans les alcalis caustiques manifeste les réactions ordinaires avec les réactifs iodés et se dissout dans le réactif cupro-ammoniacal; cependant, d'après M. Hoffmeister, la cellulose soluble dans les solutions alcalines faibles manifeste difficilement la coloration avec le chloroiodure de zinc.

En somme, M. Hoffmeister distingue, dans la cellulose brute, un certain nombre de variétés, caractérisées par leur solubilité dans des solutions alcali-

(1) Die Rohfaser und einige Formen der Cellulose, *Landw. Jahrbücher*, t. XVII, 1888, p. 241, und Die Cellulose und ihre Formen, *Landw. Jahrb.*, 1889, t. XVIII, p. 767.

(1) *Bot. Zeit.*, 1889 p. 389.

lines plus ou moins concentrées et repousse, pour cette raison, l'emploi de la méthode de Weende.

M. Th. Pfeiffer (1) critique les conclusions de M. Hoffmeister, en montrant que la destruction de l'amidon n'est pas complète au bout de six jours de macération dans le mélange chloré. Il fait remarquer avec beaucoup de raison, que ni la composition centésimale du produit, ni la formation de sucre fermentescible ne peuvent permettre à l'auteur d'affirmer, dans le résidu, l'existence de la cellulose pure.

C'est sans doute pour répondre à ces critiques que M. Hoffmeister vient de modifier, dans un second mémoire, son procédé d'analyse. Il fait macérer les tissus dans l'acide acétique du commerce, à la température de 95°, en y ajoutant un peu d'acide chlorhydrique dans tous les cas où la présence de l'amidon a été constatée; il montre ensuite la concordance de cette seconde méthode avec celle qu'il avait d'abord préconisée et donne, dans une série de tableaux, la répartition des formes solubles et insolubles de la cellulose, dans les tissus du blé et de l'orge aux diverses périodes de la végétation. D'après M. Hoffmeister la proportion de cellulose facilement soluble (1 %) diminue graduellement, avec l'âge, dans les tiges, les feuilles, les racines, tandis que la cellulose soluble dans les solutions concentrées (3 %) augmente; c'est l'inverse qui a lieu pour le fruit de l'orge.

M. Hoffmeister est-il bien sûr de ne dissoudre que la cellulose dans la soude caustique? A-t-il vérifié si la cellulose brute non soumise au mélange chloré, est aussi facilement soluble dans les alcalis? Cela n'est pas probable. On peut remarquer que l'auteur paraît ignorer la présence des composés pectiques dans les plantes et cependant les analyses faites par de nombreux chimistes, ont montré l'importance de ces corps. Ce sont eux, sans aucun doute qui expliquent les résultats contradictoires que l'auteur a obtenus en comparant les réactions caractéristiques des diverses formes solubles de la cellulose. La question mérite donc de nouvelles recherches et les chimistes auraient tort de renoncer à l'emploi de la méthode de Weende qui seule donne jusqu'à présent des résultats comparables.

Terminons en signalant les principaux résultats

d'un mémoire important de M. Reiss (1) sur la nature de la cellulose de réserve contenue dans les graines; cette substance acquiert, comme on le sait, dans le Dattier et surtout dans les *Phytelphas*, une dureté telle qu'on peut l'employer sous le nom d'ivoire végétal aux mêmes usages que l'ivoire ordinaire. D'après M. Reiss, les hydrates de carbone de réserve qui, dans les graines forment les cloisons fortement épaissies de l'albumen ou des cotylédons, sont formés par l'amyloïde ou la cellulose réserve.

La cellulose réserve, possédant d'ailleurs souvent les caractères de la cellulose normale, s'en distingue par sa transformation en hydrates de carbone solubles, la *séminine* et plus tard la *séminose*. La *séminine* est un hydrate de carbone soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, déviant à gauche le plan de polarisation; elle se transforme en un sucre appartenant au groupe des glucoses, la *séminose* qui dévie à droite le plan de polarisation et se caractérise par la formation de cristaux d'hydrazone lorsqu'on le traite par de la phénylhydrazine acétique.

Dans les graines, la cellulose réserve ne se rencontre que dans l'albumen; au moment de la germination, les cloisons se dissolvent par la transformation successive en *séminine* et en *séminose*, ce dernier corps paraissant directement employé pour la nutrition des jeunes tissus. On peut observer ces phénomènes dans les graines de *Phytelphas monocarpa*, *Phoenix dactylifera*, *Allium Cœpa*, *Coffea arabica*, etc.

L'amyloïde existe, à l'exclusion de la cellulose réserve, dans les graines de Pivoine, de Capucine, de Cyclamen, etc., et il se distingue de la cellulose réserve parce qu'il ne fournit pas de séminine.

Ces recherches intéressantes complètent l'ensemble des faits que nous possédons déjà sur la digestion des matériaux de réserve.

L. Mangin.

Professeur au Lycée Louis-le-Grand.

(1) Ueber die Natur der Reserve cellulose und über ihre Auflösungsweise bei der Keimung der Samen. *Landw. Jahrb* 1889, t. XVIII, p. 711.

NOTA. — Toutes les figures de cet article sont tirées des *Annales des Sciences naturelles*, 7^e série, t. VIII, 1889. Recherches comparatives sur l'origine des membres endogènes, (par MM. Van Tieghem et Douliot).

(1) *Biederm. Centralblatt.*, t. XVIII, p. 318.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Carvallo, professeur au lycée Saint-Louis. — **Résolution numérique des équations algébriques transcendantes.** Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris. Avril 1890. Gauthier-Villars.

C'est la méthode, indiquée en 1837 par le professeur Graeffe, de Zurich, que M. Carvallo vient de rendre plus complète et plus précise.

Cette méthode consiste à prendre pour inconnues auxiliaires, au lieu des racines x de l'équation donnée, des puissances de plus en plus grandes de x . On calcule ainsi des transformations successives de l'équation primitive: en $x^2, x^4, \dots, x^{2^n}$, et on s'arrête lorsque x est assez grand pour que, dans l'échelle des racines, rangées par ordre de grandeur absolue décroissante, chaque racine soit négligeable, au degré d'approximation des calculs, par rapport à celle qui vient avant.

Seulement Graeffe s'était borné à déterminer les racines réelles et les modules des racines imaginaires quand ces quantités diffèrent les unes des autres.

M. Carvallo montre avec quelle facilité la méthode se prête au calcul de l'argument aussi bien que du module des racines imaginaires, et au calcul des racines multiples. De plus, avec un soin qu'on ne saurait trop approuver en vue des applications pratiques, il prend la peine d'indiquer le mode et la disposition des calculs, de sorte qu'un esprit, même peu familier avec la méthode, puisse, sans effort inutile et sans tâtonnement, calculer, avec une approximation demandée, les racines d'une équation.

Quant aux équations transcendentes, il s'agit de calculer toutes les racines comprises dans un cercle de rayon donné, et l'auteur y arrive en développant, suivant la formule de Taylor, le premier membre de ces équations. On s'arrête dans ce développement, quand les termes qui suivent sont devenus négligeables; et les termes conservés forment le premier membre d'une équation algébrique qu'on résout par la méthode précédemment indiquée.

De Longchamps, (G.) Professeur de mathématiques spéciales au lycée Charlemagne. — **Essai sur la géométrie de la règle et de l'équerre.** Ch. Delagrave. Paris, 1890. Un volume in-8, broché.

Sous son titre modeste, le nouveau volume de M. G. de Longchamps présente un réel intérêt; c'est un chapitre de *Géométrie pratique*; de cette science difficile, délicate, qui a donné lieu à de très nombreux travaux, mais qui n'a pas encore été constituée en corps de doctrine.

Après avoir dans la première partie abordé ce qu'on pourrait appeler la théorie de cette nouvelle géométrie et étudié successivement les transversales, les problèmes fondamentaux du premier degré, les questions se rapportant aux coniques, aux cubiques, aux cubiques unicursales circulaires ou non circulaires, aux quartiques unicursales, M. G. de Longchamps traite dans la deuxième partie les problèmes d'arpentage et les ap-

plications à l'art de la guerre; toutes les questions relatives à la détermination de la largeur d'une rivière, à la prolongation d'un alignement au delà d'un obstacle, aux points, aux droites ou aux figures inaccessibles, y sont examinées; un certain nombre de problèmes soulevés par le tir des projectiles et la guerre de sièges y sont l'objet d'une étude spéciale; le volume se termine enfin par divers exercices sur les bassins, les courants maritimes, le passage entre des postes fortifiés. — Toutes ces applications sont traitées avec l'élégance qui caractérise les travaux du savant professeur du lycée Charlemagne; son livre est agréable à lire et de nature à plaire à tous ceux qu'intéressent les ingénieuses solutions géométriques. L. O.

2^{re} Sciences physiques.

Mathias (E.). — **Sur la chaleur latente de vaporisation des gaz liquéfiés.** Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris. Avril 1890. Gauthier-Villars.

On ne possédait jusqu'à présent sur la chaleur de vaporisation des gaz liquéfiés que des mesures peu nombreuses effectuées par Regnault, Favre et M. Chappuis. Il était fort intéressant d'étudier la variation de cette quantité avec la température, et particulièrement d'approcher du moment où tout le liquide disparaît nécessairement, de poursuivre les expériences jusqu'au voisinage du point critique. M. E. Mathias, à qui l'on doit déjà de remarquables travaux sur les gaz liquéfiés,




Fig. 1. (Disposition de l'appareil de M. Mathias.)

publiés en collaboration avec M. Cailletet, a entrepris cette difficile recherche, et vient de présenter les résultats obtenus dans une thèse soutenue devant la Faculté des sciences de Paris.

La méthode employée par l'auteur est très ingénieuse; c'est une méthode calorimétrique à température constante. Le réservoir R (fig. 1) qui renferme le gaz liquéfié est placé dans un calorimètre, auquel le liquide emprunte la chaleur nécessaire à sa vaporisation (1). Mais, au lieu de laisser refroidir le calorimètre, ce qui changerait continuellement les conditions de l'expérience, on verse pour ainsi dire, à chaque instant une quantité de chaleur connue, suffisante pour maintenir la température rigoureusement constante. Le thermomètre calorimétrique ne sert plus que d'appareil thermoscopique; on a tous les avantages d'une méthode de réduction au zéro. La vaporisation du liquide se fait à la température ambiante sous une pression réglée par

(1) La figure est extraite des *Annales de chimie et de physique*, (Paris 1890). Gauthier-Villars.

un robinet à pointe B et aussi voisine que l'on veut de la pression de la vapeur saturée; toutes les corrections sont ainsi évitées. Pour obtenir une quantité de chaleur connue, M. Mathias se sert d'un flacon contenant de l'acide sulfurique tombant goutte à goutte dans le calorimètre; il a, au préalable, étudié avec le plus grand soin la quantité de chaleur dégagée par la dissolution d'un poids déterminé d'acide dans l'eau. Les seules mesures à faire sont donc la pesée du flacon, et la pesée du réservoir contenant le liquide qui se vaporise. La précision de la méthode dépend de la détermination de la chaleur de dissolution de l'acide; au bout de deux ans, M. Mathias a prié un chimiste bien connu pour son habileté dans ce genre de recherches, M. Petit, de mesurer cette chaleur, sur l'échantillon qui avait servi aux expériences; il a retrouvé les mêmes nombres à $\frac{1}{2000}$ près.

Pour obtenir des valeurs de la chaleur latente à diverses températures, il suffit de profiter de la variation annuelle de la température (de 2° à 22° au laboratoire d'enseignement physique de la Sorbonne où ont été faites les expériences); si l'on veut dépasser la température de 22°, on chauffe la salle d'expériences; les mesures se font comme précédemment; le seul inconvénient de la méthode est d'obliger l'expérimentateur à subir les hautes températures obtenues.

Les mesures faites par M. Mathias ont porté sur l'acide sulfureux, le protoxyde d'azote, et plus particulièrement sur l'acide carbonique. Les gaz ont été obtenus à l'état de grande pureté, et analysés avec soin. Pour l'acide carbonique, l'auteur a poussé les mesures jusqu'au point critique; il a pu constater que la chaleur de vaporisation tend rigoureusement vers zéro quand on s'approche de ce point; la formule de Clapeyron permet donc d'affirmer qu'au point critique la vapeur saturée et le liquide ont exactement même densité; MM. Cailletet et Mathias avaient établi ce fait dans des expériences antérieures.

Le mémoire de M. Mathias se termine par d'intéressantes considérations sur les chaleurs spécifiques de la vapeur saturée et du liquide.

On conçoit aisément que, malgré la simplicité théorique de la méthode, on doive dans de semblables recherches rencontrer de sérieuses et même de dangereuses difficultés; M. Mathias a su en triompher avec la plus grande habileté; son travail apporte une précieuse confirmation aux idées théoriques, et contribuera beaucoup à éclairer la question encore un peu obscure de l'état de la matière au voisinage du point critique.

LUCIEN POINCARÉ.

Tomasi (Donato), Docteur ès sciences. — *Traité des piles électriques*. Piles hydro-électriques. Accumulateurs. Piles thermo-électriques et pyro-électriques. Un vol., in-8° de 680 pages avec 139 fig. dans le texte. Prix 12 francs. Georges Carré, éditeur, 58, rue Saint-André-des-Arts, Paris.

3° Sciences naturelles.

Lepsius (Dr Richard). — *Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten*. 1^{re} Band, Lief. 2, in-8, Stuttgart, Engelhorn, 1889. (*Handbücher zur Deutschen Landes- und Volkshunde*).

En 1887, M. le professeur Lepsius a commencé la publication d'un ouvrage d'ensemble sur la géologie de l'Allemagne. Le deuxième fascicule de cet excellent manuel, qui vient combler une lacune importante dans la littérature spéciale, comprend deux parties: la première termine la description du massif schisteux rhénan (*Nieder rheinisches Schiefergebirge*) par un chapitre consacré aux roches éruptives très variées, comme nature et comme âge, que l'on rencontre dans la région (p. 253-338); la seconde a trait aux chaînes jumelles (Vosges et Forêt-Noire) qui bordent la haute vallée du Rhin (*Ober rheinisches Gebirgssystem*); après un court aperçu orographique, M. Lepsius y passe successive-

ment en revue les roches cristallines fondamentales, les terrains paléozoïques, le Permien et le Trias (p. 341-438). Des coupes nombreuses et bien choisies, d'abondantes indications bibliographiques et plusieurs tableaux augmentent encore la valeur du texte. Ajoutons que cette utile publication n'a malheureusement pas d'équivalent, jusqu'à ce jour, en ce qui concerne la géologie de notre pays.

EMM. DE MARGERIE.

Wiedersheim (R.). *Professeur d'anatomie humaine et comparée à l'Université de Fribourg-en-Brisgau*. — *Manuel d'anatomie comparée des Vertébrés*, traduit sur la 2^e édition allemande par G. MOQUIN TANDON, professeur de zoologie et d'anatomie comparée à la Faculté des Sciences de Toulouse, un vol. Paris, C. Reinwald, 1890.

Le *Manuel d'anatomie comparée* du savant professeur de Fribourg se distingue par la préoccupation constante que montre l'auteur d'établir, autant que faire se peut, pour chaque groupe d'organes (téguments, squelette, muscles, système nerveux, etc.), étudiés dans la série des Vertébrés, les lois qui paraissent avoir présidé à leur développement. Aussi peut-on dire que ce manuel répond réellement à son titre. C'est bien là l'Anatomie comparée telle que la créa Cuvier, cette science qui ne s'arrête pas à la comparaison trop souvent stérile des formes actuelles, mais qui recherche dans l'étude des êtres disparus l'origine des organes dont le développement est aujourd'hui complet ou l'histoire de ceux qui nous sont parvenus à ce point modifiés ou atrophiques qu'ils restent pour nous autant d'énigmes, si nous nous contentons de l'examen sans portée des types actuels. La *Paléontologie* en un mot tient dans cet ouvrage la place qui lui revient de droit.

D'autre part, M. Wiedersheim, partant de ce principe que l'ontogénie présente dans l'évolution de l'individu la répétition des différentes étapes de l'évolution de l'espèce, — s'aide également des notions si variées que fournit l'embryologie. Depuis un certain nombre d'années les progrès de la technique microscopique ont permis d'acquiescer sur le développement des données assez précises qu'on ne saurait négliger d'utiliser. Mais on sait combien est prudent de se tenir en garde en ces matières contre des déductions trop hâtives, au milieu des multiples conditions qui interviennent et troublent parfois profondément la marche normale de l'évolution individuelle. Aussi tout en rendant pleine justice au soin qu'a pris l'anatomiste allemand de tenir compte des difficultés du problème, ne saurions-nous trop engager le lecteur encore inexpérimenté à se méfier en règle générale des déductions basées sur l'ontogénie. Les vues théoriques qui en naissent sont toujours séduisantes, mais elles sont aussi bien souvent éphémères, comme peut s'en rendre compte celui qui a suivi avec quelque soin le mouvement scientifique dans ces dernières années.

M. Wiedersheim a eu la bonne fortune de rencontrer dans son traducteur M. Moquin-Tandon un savant que nous ne saurions trop féliciter de la clarté et de l'élégance avec lesquelles il a su mettre en notre langue les pages intéressantes de ce livre. De nombreuses figures bien choisies, d'excellents tableaux récapitulatifs complètent les descriptions; et l'éditeur en conservant la forme condensée de l'édition allemande a pu réunir en un volume très maniable imprimé avec beaucoup de soin et de luxe les nombreux documents accumulés par l'auteur.

Dr H. BEAUREGARD.

Perrier (Rémy). *Recherches sur l'anatomie et l'histologie du rein des Gastéropodes Prosobranches*. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris, Avril 1890.

Dans sa forme primitive, l'appareil urinaire des Prosobranches paraît se composer de deux organes symétriques et identiques au point de vue anatomique et au point de vue physiologique, comme cela a lieu pour les Acéphales. Ces deux organes, les reins, consistent

chacun en un sac communicant, d'une part avec le péricarde, d'autre part avec l'extérieur. La symétrie absolue n'est jamais réalisée chez les Prosobranches. Seule, la Fissurelle possède deux reins et deux orifices symétriques, mais là même, le rein gauche est considérablement réduit et ne communique pas avec le péricarde. Chez la Patelle, ce rein gauche passe à droite du péricarde.

Chez l'Haliotis et les Trochidés (Hétéronéphridés), le rein gauche en communication avec le péricarde se transforme en un organe de réserve dont l'auteur décrit la structure, et auquel il donne le nom de sac papillaire, le rein droit fonctionnant seul comme organe dépurateur. Les Neritidés et la plupart des Monotocardes ont un seul rein et un seul orifice excréteur.

Au point de vue de la structure, on remarque une division bien marquée de la masse glandulaire du rein des Monotocardes en deux organes distincts : le rein proprement dit, et la glande néphridienne, sorte de glande vasculaire sanguine en communication avec l'oreillette. Les fonctions de la glande néphridienne semblent être celles d'un organe de réserve, et peut-être d'une glande lymphatique. La glande néphridienne, d'ailleurs, se divise nettement en deux portions, l'une vasculaire sanguine (glande hématiche), l'autre purement sécrétrice (glande néphridienne) : cette glande néphridienne des Monotocardes représente, pour M. R. Perrier, le rein gauche des Diotocardes.

Le rein proprement dit forme une masse homogène chez les Téniglosses; il se sépare en deux lobes plus ou moins séparés chez les Sténoglosses (méronephridiens) et même différenciés chez les Muricidés (pynconéphridiens).

Au point de vue histologique, on rencontre deux types de cellules glandulaires rénales :

1° Des cellules ciliées avec ou sans granulations;

2° Des cellules vacuolaires, avec sels tenus en suspension dans le liquide de leur vacuole sphérique. Au fur et à mesure que cette vacuole grossit, les sels contenus dans son intérieur se condensent en une ou plusieurs grosses concrétions. Cette vacuole est ensuite expulsée de la cellule et tombe dans la cavité urinaire entourée d'une mince couche de protoplasma qui la fait apparaître sous la forme d'une vésicule sphérique. C'est là un mode particulier d'excrétion, très intéressant, en ce qu'il montre bien le rôle important joué par les vacuoles, rôle signalé par M. Ranvier dans toutes les glandes mérocrines.

A.-Eug. MALARD.

4° Sciences médicales.

Hafkine. — Maladies infectieuses des Paramécies. *Annales de l'Institut Pasteur*, mars 1890.

Jusqu'ici on ne s'est guère occupé des maladies microbiennes que chez les êtres supérieurs; cependant, il est bien à penser que chez les êtres situés au bas de l'échelle animale, même unicellulaires, de pareilles maladies peuvent être observées; et il est bien probable que l'étude de ces maladies chez ces animaux nous fera des révélations intéressantes susceptibles de généralisation, car nous voyons là dans toute sa simplicité la lutte du microbe contre la cellule. Nous ne pouvons suivre M. Hafkine dans le détail de ses intéressantes expériences et nous devons nous contenter d'en résumer les principaux résultats.

Trois espèces de microbes attaquent la paramécie : deux espèces sont des spirilles et ne s'attaquent qu'au nucléole; l'autre a une forme bacillaire et ne s'attaque qu'au noyau. Une fois la paramécie envahie par ces organismes, il ne faut pas croire qu'elle meure de suite, et, tant qu'il reste un peu de protoplasma, on peut espérer la voir se débarrasser de ses parasites. Les phénomènes qui se passent dans la paramécie infectée sont les mêmes que l'on observe dans une paramécie non infectée, soumise à l'inanition, de sorte que la mort paraît résulter de la consommation par le

microbe du contenu cellulaire. Un point intéressant à noter est que les microbes sont strictement localisés sur l'organe atteint, noyau, ou nucléole, et la conséquence en est que si l'infusoire vit dans un milieu très nutritif, il pourra se débarrasser de son parasite par une simple division; mais, pour que la guérison arrive à la suite de ce phénomène, il faut que le parasite soit passé à l'état de spore dans la cellule mère. Toutes ces études sont fort intéressantes et l'on pourra certainement en les poursuivant en tirer quelques conclusions générales.

D^r H. DUBIEF.

Vincent (D^r H.). — Sur la présence d'éléments semblables aux Psorospermies dans l'Epithélioma pavimenteux. — *Extrait des comptes rendus de la Société de Biologie*, 1890.

Depuis que les études microbiologiques ont démontré le caractère parasitaire de plusieurs maladies infectieuses, il paraît conforme à la plus légitime induction d'attribuer à toutes les maladies virulentes un contagium animé. Mais c'est en général parmi les végétaux de la famille des Bactéries qu'on a coutume de chercher ce contagium. Des travaux récents de MM. Barriar, Malassez et Albarran ont cependant fait voir que des parasites très différents des Bactéries, beaucoup plus élevés dans l'échelle des êtres et qu'on ne saurait hésiter à classer parmi les animaux, peuvent, au même titre que les microbes proprement dits, constituer les agents spécifiques de certaines affections. Telles semblent être les Grégarines décrites tout dernièrement par M. Wickham dans la maladie de Paget du Mamelon et sur lesquelles




Fig. 1 et 2. — ps, Psorospermies; n, noyau de la cellule c, dans laquelle la Psorospermie est enkystée.

nous avons eu soin d'appeler l'attention de nos lecteurs (1).

M. H. Vincent vient de faire, dans le même ordre d'investigation, une observation intéressante. A l'intérieur des cellules d'épithéliomes pavimenteux de diverses origines, il a constaté la présence de coccidies à différents stades d'évolution. La technique employée pour les déceler ne semble laisser aucun doute sur la nature de ces psorospermies. Faut-il leur attribuer, comme l'auteur incline à le faire, la production des épithéliomes? Nous ne croyons pas qu'on en ait le droit absolu avant d'avoir reproduit ces néoplasmes par l'inoculation pure des parasites à des sujets d'abord bien portants. Tous les zoologistes savent que les grégarines sont fréquentes dans certains viscères, foie, rate, etc., de plusieurs mammifères, rat et lapin, par exemple, alors que ces animaux paraissent absolument sains. Il est pourtant difficile de concevoir qu'un parasite puisse, en dehors des cas de symbiose, se multiplier dans un organisme sans y déterminer quelque désordre. Aussi ne suffit-il pas, pour juger ces questions, de bien observer les faits; l'expérimentation, peut seule, dans chaque cas particulier, conduire à la solution du problème.

L. O.

(1) Voyez à ce sujet la *Revue* du 15 février, page 88.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

L'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, l'Académie des Sciences de Berlin, les Sociétés de Physique et de Physiologie de Berlin, l'Académie des Sciences de Vienne n'ont pas encore repris leurs séances ordinaires suspendues à l'occasion des fêtes de Pâques.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 8 avril 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **MM. G. Rayet, L. Picart et Courty** : observations de la comète Brooks (19 mars 1890) faites au grand équatorial de l'Observatoire de Bordeaux. — **M. E. Viennet** : éléments et éphémérides de la comète Brooks. — **Mlle D. Klumpke** : observations de la comète Brooks (19 mars 1890) faites à l'Observatoire de Paris. — **M. Maurice Lévy** montre que la formule qu'il a donnée dans sa communication du 17 mars dernier, pour représenter l'action entre deux particules électriques en mouvement, résume, au point de vue mathématique, toutes les théories proposées jusqu'ici. Il suffit pour les obtenir d'attribuer diverses valeurs à la constante numérique arbitraire α qui entre dans cette formule. Elle explique complètement le mouvement du périhélie de Mercure, pour une valeur de α qui ne cadre avec aucune des théories antérieures.

2^e SCIENCES PHYSIQUES. — **M. H. Deslandres** a cherché à étendre aux spectres de bandes les lois que M. Rydberg a posées pour les spectres de lignes; avec une dispersion suffisante les bandes se divisent de même que les lignes en doublets ou en triplets dont les intervalles suivent une loi pour un corps donné; mais ces lois sont plus complexes que celles des lignes; elles s'expriment par des fonctions à trois paramètres au lieu d'un seul. — A propos de la communication de M. Cornu sur les halos des plaques photographiques, **MM. Paul et Prosper Henry** rappellent qu'ils font usage depuis longtemps pour supprimer ce phénomène d'une couche de collodion à la chrysoidine à l'envers des glaces. — **M. E. Branly** a étudié l'action des radiations lumineuses sur les conducteurs électrisés, en employant comme source lumineuse, au lieu de l'arc voltaïque habituel, les étincelles fournies par une bobine de Ruhmkorff; ces radiations, qui sont plus riches en rayons très réfrangibles, font disparaître d'un conducteur poli, non seulement l'électricité négative, mais aussi l'électricité positive, moins rapidement, il est vrai. — **M. E. Péchard** a montré que l'acide phosphorique peut se combiner à 3, 4, 5 et 6 équivalents d'acide métallotannique; aujourd'hui, il étudie l'acide phosphotrimétallotannique et ses sels. — **M. M. Vèzes** a obtenu un chloroplatinate nitrosé de potassium, en traitant à chaud une solution concentrée de platinonitrite de potassium par un excès d'acide chlorhydrique. — **M. Louis Henry** a combiné l'acide cyanhydrique à l'aldéhyde formique en solution aqueuse et obtenu ainsi le nitrile glycolique; ce dernier corps, traité par l'acide chlorhydrique fumant, donne l'acide glycolique.

3^e SCIENCES NATURELLES. — **M. R. Lépine** a montré que le diabète consécutif à l'ablation du pancréas doit être attribué vraisemblablement à la disparition d'un ferment destructeur du glucose que le pancréas fournissait au sang. De nouvelles expériences viennent de lui montrer que ce ferment destructeur existe dans la lymphe du canal thoracique. Cette lymphe en effet provenant d'un chien normal et injectée à une chienne privée de son pancréas, a diminué considérablement la glycosurie.

Séance du 14 avril 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. G. Fouret** : Construction du rayon de courbure des courbes triangulaires symétriques, des courbes planes anharmoniques et des lignes asymptotiques de la surface de Steiner. — **M. A. E. Pellet** donne une formule pour la rectification approximative d'un arc de courbe. — La méthode de **M. Lévy** pour déterminer les constantes fondamentales de l'aberration et de la réfraction exige l'emploi d'un double miroir plan installé dans une position donnée par rapport à la lunette; **MM. Lévy et Puiseux** établissent la théorie du système optique ainsi formé. — **M. Tacchini** résume des observations solaires faites à l'Observatoire royal du Collège Romain pendant le premier trimestre de 1890 (voir p. 234). — **M. Em. Marchand** envoie le résumé des observations qu'il a faites à Lyon sur les taches solaires pendant 1889.

2^e SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Ditté** montre que l'acide azotique attaque l'aluminium de la façon qu'il a déjà exposée pour l'acide sulfurique; de même encore que le sulfate neutre, l'azotate neutre est transformé en azotate basique par l'aluminium en présence de l'eau. — **M. A. Recoura** obtient un dégagement continu d'acide bromhydrique gazeux en faisant passer un courant d'acide sulfhydrique dans du brome. — **Wurtz et Graham**, réduisant des sels de palladium par l'acide hypophosphoreux, ont constaté un dégagement d'hydrogène. **M. R. Engel** démontre que cet hydrogène provient de la décomposition de l'eau par l'acide hypophosphoreux, que le palladium obtenu dans la réaction transforme en acide phosphoreux par une action de présence. — Par diverses expériences, **M. P. Cazeneuve** prouve que l'action décolorante du noir animal et des divers charbons consiste bien moins dans une absorption que dans une oxydation des matières colorantes. — Des recherches poursuivies par **M. Jungfleisch** sur les acides camphoriques, il résulte qu'il existe plusieurs acides droits et gauches, se correspondant deux à deux, et plusieurs acides optiquement neutres, inactifs par nature ou bien résultant du mélange d'un droit et d'un gauche. — **M. G. Massol** a étudié au point de vue thermochimique les divers malonates de potasse, en les comparant aux oxalates correspondants. — Pour extraire le raffinose des mélasses, **M. L. Lindet** purifie d'abord ces mélasses, puis il utilise la différence de solubilité du raffinose et du saccharose dans les alcools éthylique et méthylé.

3^e SCIENCES NATURELLES. — **M. L. Ranvier** a étudié les éléments anatomiques qui se présentent dans la sérosité péritonéale normale de divers mammifères; la paroi abdominale étant ouverte au thermocautère pour éviter toute effusion de sang et de lymphe, on trouve dans cette sérosité des globules rouges et des globules blancs diversement modifiés. — **M. Kunckel d'Aerouais** explique comment les acridiens peuvent chasser leur sang dans l'ampoule cervicale; c'est en remplissant leur jabot d'air dégluti qu'ils déplacent ce liquide. — A propos de la production artificielle de la soie, **M. Emile Blanchard** rappelle que depuis 25 ans il avait attiré l'attention sur la possibilité de cette production. — **M. Cassedebat** a trouvé dans les eaux d'alimentation de la ville de Marseille un bacille qui res-

semble beaucoup au bacille typhique, mais en diffère par quelques caractères. — **M. V. Babes** a reconnu dans le sang des bœufs de Roumanie atteints d'hémoglobinurie un microorganisme spécifique qui se présente sous forme de corpuscules arrondis dans les globules rouges. — Etudiant la composition de l'urine chez les hystériques, **MM. Gilles de la Tourette et Cathelineau** ont constaté que les urines sont normales chez ceux qui présentent des stigmates sans accidents, que chez ceux qui présentent des attaques, etc., le rapport des phosphates terreux aux phosphates alcalins est inverse du rapport normal. — **M. H. Parinaud** propose de remplacer, pour corriger le strabisme, la section du tendon musculaire par le débriement de la capsule de Tenon. — **M. B. Renault** décrit sous le nom de *Lycopodiopsis Derbyi* un nouveau genre de Lycopodiacees trouvé dans le terrain houiller du Brésil. — **M. Ch. Contejean** a fait des expériences pour chercher le mécanisme suivant lequel se sont formées les impressions des cailloux tertiaires de la chaux, près Montbéliard. Il a reproduit les différentes variétés de ces impressions en faisant agir une eau faiblement acidulée sur les points de contact de ces galets calcaires. **L. LAPICQUE.**

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 13 avril 1890.

M. Ball : Sur le délire de la persécution. — **M. Robert** : Sur l'épidémie de grippe qui a sévi en 1889-90 dans la garnison de Verdun. — **M. Doleris** après avoir institué le traitement de la métrite du corps et du col de l'utérus par l'écouvillonnage (1884), puis par le curetage (1886), et enfin par le drainage antiseptique (1888), montre que les causes d'échec viennent 1° de ce que l'on renferme sous le nom de métrites des affections qui dépassent la muqueuse utérine; 2° des déviations de la matrice. Le curetage n'a d'effet immédiat que sur la muqueuse; le cautére la tue et à son action succède de la sclérose atrophique, souvent de l'atésie, et par suite la stérilité. — **M. Rochard** lit son rapport sur l'avis demandé par la Commission de la Chambre, à propos d'un projet de loi autorisant le travail des femmes pendant la nuit dans les usines et ateliers; ses conclusions, adoptées à l'unanimité, considèrent cette autorisation comme des plus graves pour la santé des ouvrières.

Séance du 22 avril 1890.

M. G. Sée, à propos de la note de **M. Heckel** sur la *noix de Kola* (voir *Revue*, n° 7, p. 218), insiste sur ce fait qu'elle n'agit que par la *cafféine* et la *théobromine*. — **M. Glénard** (de Lyon) expose les résultats objectifs de l'exploration du foie dans le diabète; il en déduit la parenté du diabète avec l'alcoolisme et la lithiase biliaire, la gravité des symptômes de diabète croissant avec la gravité de l'altération objective du foie. — **M. Germonprez** traite les fractures de calcanéum par écrasement (fréquentes chez les ouvriers en bâtiments) par la réduction aidée d'applications chaudes. — **M. Guenziot** présente un fœtus de huit mois atteint de dégénérescence kystique des reins (glomérules); et un fœtus anencéphale, dont la tête est complètement déformée par des brides amniotiques.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 19 avril 1890

M. Magnan relate le suicide curieux d'une aliénée qui s'est enfoncé une épingle dans le cœur; la mort est survenue par hémorragie intrapéricardique. —

MM. Combemal et Dubiquet ont étudié l'action physiologique du ferrocyanure de potassium; ce sel, ingéré par la voie stomacale, est peu toxique; il est vomitif et diurétique; il s'élimine à l'état de ferricyanure. — **M. Féré** a mesuré le temps d'association dans divers états cérébraux; ce temps peut s'allonger indéfiniment, dans le cas de fatigue nerveuse, par exemple. — **M. Mégnin** a observé chez les chiens une épizootie semblable à l'influenza; dans un cas, il a trouvé une pleurésie purulente avec streptocoques. — **MM. Courmont et Rodet** ayant fait des cultures du microbe des ostéo-myélites juxta-épiphysaires ont trouvé indifféremment le *Staphylococcus pyogenes aureus* ou l'*albus*. — **M. Giard** a cultivé le bacille des talitres lumineux, les cultures ne sont pas phosphorescentes, mais les talitres inoculés le deviennent. — **MM. Roger et Charrin** ont constaté que le sérum du lapin, animal réfractaire au charbon symptomatique, présente vis-à-vis du bacille des propriétés bactéricides moins marquées que le sérum du cobaye, qui prend facilement la maladie. Néanmoins, chez les animaux vaccinés, les propriétés bactéricides du sérum sont accrues d'une façon notable. — **M. d'Arsonval**, qui avait constaté par la photographie l'existence d'une troisième bande du spectre de l'hémoglobine dans la région ultraviolette, a pu observer directement cette bande au moyen d'un dispositif spécial.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 18 avril 1890.

M. A. Cornu étudie le phénomène connu sous le nom de *halo photographique*. Lorsqu'on prend l'image photographique d'un point très brillant sur une couche très impressionnable fixée à une lame de verre, on obtient généralement autour de l'image 0 une couronne plus ou moins intense. Ce phénomène, très fâcheux pour les épreuves artistiques, plus fâcheux encore pour les recherches astronomiques, est dû à la diffusion de la lumière au point 0 par la couche sensible, en contact intime avec le verre. Les rayons ainsi diffusés atteignent la seconde surface du verre, ceux qui forment avec elle un angle assez grand se réfléchissent totalement et vont former sur la surface antérieure une plage brillante, limitée par un cercle ayant pour centre le point 0; l'intensité décroît d'ailleurs rapidement vers l'extérieur, et le phénomène observé ressemblera à un halo. **M. Cornu** démontre par diverses expériences très simples l'exactitude de l'interprétation qu'il propose. Pour faire disparaître le halo, il suffit d'empêcher la réflexion sur la seconde surface du verre; à cet effet on enduit le revers des plaques d'un vernis ayant exactement même indice de réfraction que le verre et l'on rendra ce vernis très absorbant pour les rayons chimiques, de façon que ces rayons ne puissent pas aller se réfléchir à la surface de séparation du vernis et de l'air. — **M. d'Arsonval** présente divers appareils de mesures pratiques: 1° Un *saccharimètre* ordinaire où l'on peut disposer un solénoïde, et dans lequel on introduit du sulfure de carbone ou du verre lourd; la rotation du plan de polarisation, suivant la valeur du champ magnétique, permet d'utiliser l'appareil comme *ampéremètre*. 2° Un *spectrophotomètre*, où la différence d'intensité, entre les deux spectres, est due à l'admission, dans les deux systèmes réfringents, d'une quantité de lumière limitée par une fente d'épaisseur variable. 3° Un *colorimètre* où, comme dans les instruments de ce genre, on obtient l'égalité de deux teintes, en faisant varier l'épaisseur de l'un des liquides traversés par la lumière, mais où un spectroscopie à vision directe permet d'égaliser l'intensité des bandes d'absorption fournies par des corps tels que l'hémoglobine.

LUCIEN POINCARÉ.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 27 mars 1890

SCIENCES PHYSIQUES. — MM. A. Reinold et A. W. Rucker : Sur les membranes sombres de savon. Quelques expériences antérieures publiées par les auteurs dans les *Philosophical transactions* (1883 et 1886) avaient montré que la partie sombre d'une pellicule de savon se forme parfois avec une sorte de « convulsion ». Non seulement elle s'étend avec une extraordinaire rapidité, mais le bord de la zone sombre est violemment agité et de larges taches noires apparaissent dans la partie colorée de la pellicule. Leurs recherches actuelles établissent que lorsqu'on s'arrange de telle sorte que la partie sombre de la membrane se forme rapidement, elle a une plus grande épaisseur que lorsqu'elle se forme lentement, comme cela a lieu normalement. L'épaisseur de la région mince des membranes antérieurement étudiées variait de 7 μ à 14,5 μ ; dans les membranes formées rapidement cette épaisseur varie de 12 à 25 μ . L'épaisseur de la partie noire des membranes formées lentement ne varie pas, aussi longtemps que dure la membrane. En 30 minutes d'observation, on a vu une membrane formée rapidement tomber de 18,6 μ d'épaisseur à 16 μ ; dans d'autres cas, cette épaisseur s'est accrue; dans d'autres enfin elle est restée constante. La conclusion, c'est que les particularités de ces membranes formées rapidement sont dues probablement à ce que leurs épaisseurs sont celles des membranes d'épaisseur instable (de 10 à 50 μ , et au-dessus), et que cette instabilité à son tour tient aux changements de tension superficielle déterminés par un renouvellement rapide de la surface. — M. Robert H. Scott : sur les variations de la température dans les îles Britanniques de 1869 à 1883. — MM. Charles A. Carus-Wilson rapporte les expériences qu'il a faites pour déterminer la nature de la résistance d'une barre d'acier à la rupture par traction longitudinale. Il a constaté que pour évaluer la résistance de la barre à une section donnée, il ne faut pas considérer celle d'une section à angle droit avec l'axe, mais celle d'une section à 45°; c'est en effet dans cette direction que la résistance à la rupture par action transversale est maxima. Il semblerait donc que la résistance dont il faut triompher est la résistance même de l'acier à la section. On a fait des expériences pour déterminer si la résistance de l'acier à la section est à sa résistance à la traction dans la relation exigée par cette théorie; elles ont montré que la résistance à la section est en moyenne 3 pour 100 de la moitié de la résistance à la traction. — Lord Rayleigh mesure la quantité d'huile nécessaire pour empêcher les mouvements du camphre sur l'eau. On a déjà montré que le mouvement de petits morceaux de camphre à la surface de l'eau est d'autant plus aisé à mettre en évidence qu'on observe une plus rigoureuse propreté. L'eau sur laquelle les expériences ont été faites occupait une surface circulaire de 84 cm. de diamètre; l'huile d'olive arrivait sur l'eau au moyen d'un fil de platine convenablement arrangé. Dans une expérience il a fallu 0,81 mg d'huile pour arrêter presque les mouvements du camphre. L'épaisseur de la membrane d'huile était donc de 1,63 micro-mill. A la suite d'une série d'expériences, on a pu établir que pour arrêter les mouvements du camphre, il suffisait d'une membrane de 1,6 micro-mill. — Le professeur J. J. Thomson et M. G. H. C. Searle déterminent V, rapport de l'unité électromagnétique à l'unité électro-statique.

Séance du 17 avril 1890.

1° SCIENCES PHYSIQUES. — MM. A. W. Rucker et M. F. G. Thorpe : Note préliminaire sur les additions à faire à la carte magnétique de quelques régions des îles Britanniques. Les auteurs ont fait porter leurs recherches sur les îles de l'Ouest, la côte ouest de l'Ecosse, et une partie du Yorkshire et du Lincolnshire. Ils

avaient montré antérieurement qu'il existe de puissantes forces horizontales perturbatrices qui, du détroit d'Islay, de lona et de Tirce exercent leur action dans la direction de l'ouest. Les observations faites l'été dernier à Bernara, la plus méridionale des Hébrides, ont montré, que dans cette région la force horizontale perturbatrice est dirigée vers le sud. De l'ensemble des observations, il résulte qu'il existe un centre d'attraction magnétique près de la mer, au sud des Hébrides et à l'ouest de Tirce. Sur l'une des cartes présentées à la Société en 1889, les auteurs avaient entouré d'une ligne de démarcation un district de 40 milles de large sur 150 de long; ce district appartient au Yorkshire et au Lincolnshire; ils avaient exposé les raisons qui les portaient à admettre qu'il existait entre les deux lignes qui le limitaient une ligne ou un centre d'attraction; les observations faites dans 35 stations additionnelles confirment cette conclusion. Dans toutes les stations (à une seule exception près), situées à l'intérieur de ces lignes où à leur voisinage : les forces perturbatrices horizontales sont dirigées vers le centre du district; les forces perturbatrices verticales dirigées de haut en bas sont plus grandes au centre du district qu'à ses limites.

2° SCIENCES NATURELLES. — M. W. R. F. Wildon : Sur les variations de certains Crustacés Décapodes et en particulier du *Crangon vulgaris*, Galton, Quellet, etc. ont étudié la fréquence des variations de grandeur de certains organes chez l'homme, chez certaines plantes et chez les mites. L'auteur a recherché à déterminer la fréquence de ces variations dans une espèce vivant à l'état sauvage, il a constaté qu'elles obéissent à la loi des erreurs; comme c'est le cas lorsque les animaux ont été soumis à l'action de la sélection naturelle. Pour pouvoir comparer les organes d'un individu avec ceux d'un autre individu de taille différente, on a exprimé leur longueur en fractions de la longueur du corps de l'animal. On a mesuré la longueur totale de la carapace, la distance du bord postérieur de la carapace à la face antérieure de l'épine médiane; la longueur du sixième anneau abdominal, et la longueur du telson. Les individus mesurés étaient tous des femelles adultes recueillies en différents endroits très éloignés les uns des autres. La longueur moyenne de la carapace des spécimens recueillis dans le détroit de Plymouth était de 250,52 millièmes de la longueur du corps; pour les échantillons recueillis à Soulhat cette longueur était de 248,50 et pour ceux recueillis à Sherness de 247,51; non seulement la longueur moyenne de la carapace varie d'une variété locale à l'autre, mais aussi l'étendue des variations de longueur. Cependant la fréquence des variations dans les trois cas observés peut s'exprimer par une courbe d'erreur. Des résultats analogues ont été obtenus par la mensuration de séries considérables d'organes et de parties d'organes de *Pandalus uniolianus* (deux races) et de *Palaemon serratus* (une race). — Professeur J. Jeffery Parker : Observations sur l'Anatonie et le développement de l'Apteryx. L'auteur a examiné un certain nombre d'embryons des trois espèces communes d'Apteryx. Les caractères observés qui montrent que l'Apteryx provient d'un oiseau capable de voler sont : la présence d'une membrane alaire ou palagium, de pterylos et d'apteria, de remiges et de grandes rectrices, l'existence de deux facettes articulaires à la tête de l'os carré, d'un pygostyle, d'acromion, d'os procoracoïde et d'acrocoracoïde à l'état rudimentaire; c'est aussi l'attitude pendant le sommeil, l'extrême variabilité du sternum et de la ceinture scapulaire, leur éburnation qui indique la dégénérescence, la présence occasionnelle d'un sillon médian ou d'un bréchet rudimentaire sur le sternum, l'apparition précoce des caractères propres à l'oiseau dans la structure du bassin, celle des caractères typiques de l'oiseau dans la structure et le développement de la colonne vertébrale et de l'os de la hanche, le fait que le cerveau traverse un stade de cerveau d'oiseau où il possède des lobes optiques latéraux et les


rapports du muscle sous-clavier. D'autre part l'absence totale des rectrices plaide contre cette manière de voir. Voici les caractères qui indiquent un type moins spécialisé que celui des Oiseaux actuels : les caractères du crâne cartilagineux et du pelvis, la présence d'un opercule dans les premiers stades du développement et d'un os procoracoïde bien marqué. Les caractères suivants font de l'Apteryx un être plus spécialisé que tous les autres oiseaux ; ce sont la rapidité avec laquelle les membres prennent la position qu'ils conserveront, l'apparition tardive et l'état rudimentaire de la partie hyoïde de l'os de la langue, la position des narines, le mode particulier de développement de la partie respiratoire des fosses nasale et l'absence totale de clavicales.

R. A. GREGORY.


SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 20 mars 1890.


M. G. W. Judd lit un mémoire sur les preuves fournies par les recherches pétrographiques des modifications chimiques sous l'influence des fortes pressions. — M. Meldola traite de la formation des dérivés de la triazine. La méthode proposée par l'auteur consiste à faire réagir un dérivé benzylidénique d'une amine sur un sel d'un composé diazoïque. En partant de la benzylidène- β -naphthylamine et du chlorure de diazobenzol, il a obtenu la diphenyl- $1-\alpha\beta$ -naphtotriazine



sous forme d'aiguilles blanches fusibles à 193°-194°. Ce composé présente les caractères d'une base faible. — M. Ruhemann : Contribution à la connaissance de l'acide muïque. L'acide dichloromuïque se transforme plus facilement en acide hydromuïque



au moyen de l'étain et de l'acide chlorhydrique qu'en employant l'amalgame de sodium. Il semble à l'auteur que, contrairement à l'assertion de Limpricht, on obtient le même acide dibromoadipique quand on fait réagir le brome sur l'acide hydromuïque, que ce dernier soit préalablement dissous dans l'eau ou bien dans l'acide acétique. Le dibromoadipate d'éthyle traité par la potasse alcoolique perd 2HBr et se saponifie en donnant un nouvel acide isomère de l'acide muïque, l'acide isomuïque, qui par oxydation se convertit en un mélange d'acides oxalique et succinique. La nature de ces produits d'oxydation rend très vraisemblable la formule de constitution :



pour ce dernier acide.

— M. M. Heycock et Neville : Le poids moléculaire des métaux en dissolution. Dans des communications précédentes les auteurs ont indiqué les résultats de leurs observations sur la solidification des dissolutions sodiques de certains métaux. Ils donnent maintenant un tableau des abaissments atomiques de la température de solidification de l'étain après dissolution de poids variables d'argent, d'or, de cuivre, de nickel, de sodium, de palladium, de magnésium, de zinc, de plomb, de cadmium, de mercure, de bismuth, de calcium, d'indium, d'aluminium et d'antimoine.


Dans la plupart des cas, l'abaissement atomique est un nombre très voisin de 3 ; c'est d'ailleurs à ce nombre que l'on arrive dans la théorie de Van't Hoff. Si l'on admet que, dans ce cas, comme dans ceux observés par M. Raoult, l'abaissement produit sur la température de solidification d'un dissolvant par la dissolution d'une molécule de substance reste le même quel que soit le

corps dissous, il en résulte que les molécules de la plupart des métaux sont du même type, c'est-à-dire renferment le même nombre d'atomes. Or le zinc qui se trouve dans cette liste présente à l'état gazeux une molécule monoatomique ; il est donc très probable que la plupart des métaux sont dans le même cas et que leur molécule renferme un seul atome. Pour l'aluminium l'abaissement atomique est très voisin de la moitié de la valeur moyenne, ce qui semble indiquer que sa molécule est diatomique. L'indium et le mercure donnent aussi des abaissments sensiblement plus faibles.


Séance du 3 avril 1890.

Linder et Picton : Sur les sulphydrates. Les auteurs trouvent que les sulfures métalliques récemment précipités contiennent presque toujours de l'hydrogène sulfuré ; ce sont en effet des sulphydrates. Si au lieu de faire passer le courant de gaz sulfuré dans la solution de sel métallique on verse lentement celle-ci dans une solution aqueuse d'acide sulhydrique, en absence d'un excès d'acide, on peut obtenir une solution et en chasser l'excès d'hydrogène sulfuré par un courant d'hydrogène. Les solutions ainsi obtenues sont précipitées par l'addition de sels métalliques et l'on peut expliquer ainsi ce fait bien connu que les sulfures se précipitent mieux d'une dissolution à laquelle on a ajouté un chlorure alcalin. En traitant de l'hydrate cuivrique en suspension dans l'eau par l'hydrogène sulfuré, on obtient rapidement le composé $7\text{Cu}^2\text{S}^4$, H^2S^4 qui se dissout à la longue en formant une solution brun clair. Les auteurs ont également obtenu avec le mercure le composé répondant à la formule 31Hg^4 , H^2S^4 .


— Horace Brown et Harris Morris : Recherches sur la germination de quelques graminées. Les auteurs étudient la relation qui unit l'embryon à l'endosperme et les changements qui s'y produisent pendant la germination. Ils concluent que l'endosperme peut être considéré comme une réserve de matériaux, et que l'embryon, après en avoir été détaché, peut être cultivé dans des milieux nutritifs appropriés. Cette étude montre aussi que l'épithélium qui était considéré comme un tissu absorbant, sécrète pendant la germination un dissolvant de la cellulose qui attaque les cellules de l'endosperme. — Meldola et Hughes : Formation des dérivés de l'indol en partant du dibromo- α -naphthol ; l'action de l'acide nitrique fumant sur le dibromo- α -naphthol permet d'obtenir le composé.



l'action de l'aniline sur ce corps donne un produit cristallisé rouge auquel les auteurs attribuent la formule



et ce produit traité par la potasse étendue donne naissance au bromo-hydroxy-indol.



— Vernon : Action de l'acide chlorhydrique sur le bioxyde de manganèse, tétrachlorure de manganèse : L'auteur étudie la solution brune qui se forme par l'action de l'acide chlorhydrique sur le bioxyde de manganèse. Il conclut à l'existence du corps Mn Cl^4 , s'appuyant sur ce que à une température suffisamment basse la dissolution s'effectue sans dégagement de gaz. La quantité de gaz dégagée varie d'ailleurs d'une façon continue avec la température, et l'on ne peut par suite admettre la formation à des températures intermédiaires de composés tels que Mn^2Cl^2 ou Mn^3Cl^3 .

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Dans la séance du 1^{er} mars dont nous avons analysé les travaux dans le précédent numéro de la *Revue*, M. Folie a prononcé l'éloge de deux académiciens récemment décédés : Hirn (1) et Buys-Ballot. Nous extrayons de son discours les passages suivants :

« C'est surtout son zèle pour les doctrines spiritualistes qui excita Hirn à combattre la théorie cinétique des gaz, dans laquelle il craignait de voir comme une attaque directe contre l'existence en soi de la force ; son mémoire sur ce sujet, que notre Académie a eu l'honneur de publier, témoigne de cette préoccupation ; la partie la plus importante de ce travail est, en effet, celle où sont exposées des considérations métaphysiques d'une très haute portée sur l'essence de la matière et de la force. L'histoire scientifique de Hirn est liée de la manière la plus intime à celle de la théorie mécanique de la chaleur. Il se rangea tout d'abord parmi les adversaires de la théorie de R. Mayer ; et ce furent les expériences mêmes qu'il institua dans l'intention de la renverser, qui le convertirent et firent de lui l'un de ses plus fervents adeptes. Plus tard, il combattit également l'axiome de Clausius, en vertu duquel la chaleur ne peut passer d'elle-même d'un corps à un autre corps plus chaud ; et l'expérience sur laquelle est fondée son objection est si ingénieuse, et semble si bien corroborer celle-ci, que l'on conçoit qu'il ait cru renverser complètement l'axiome de Clausius. Aussi celui-ci, dans sa réponse, péremptoire du reste, déclare-t-il que des objections présentées avec ce caractère de netteté et de précision, loin d'enrayer le développement de la science, ne font, au contraire, qu'y contribuer. Il en est de même des expériences que Hirn imagina pour combattre, longtemps après, la théorie cinétique des gaz. Elles sont très ingénieuses, et, je pense, irréprochables ; et c'est seulement l'analyse mathématique au moyen de laquelle il les interpréta que j'ai cru devoir combattre, et que Clausius a combattu également avec beaucoup plus d'autorité. Cet industriel, cet ingénieur, ce physicien distingué, dont les travaux ont enrichi les autres, a terminé sa carrière dans une noble médiocrité. Lorsque des revers de fortune l'atteignirent, nul doute qu'il n'eût pu obtenir en France une position honorable et lucrative. Mais il était trop fortement attaché à son Logelbach, où il avait poursuivi, pendant une longue série d'années, à côté de tous ses autres travaux, des observations météorologiques sur le climat de l'Alsace, qui ont fait l'objet de nombreuses publications et auxquelles on peut rattacher son *Etude sur une classe particulière de tourbillons* (1878). Au bruit des malheurs de Hirn, les savants s'émurent, et un appel fut adressé par eux au gouvernement français (quelques-uns d'entre nous s'en souvenaient avec émotion) pour qu'il assurât à cet illustre enfant de la France *Potium cum dignitate*. Cette prière fut écoutée, et Hirn put continuer la série de ses observations météorologiques à l'aide d'un subside annuel qui lui fut octroyé par le gouvernement français. Peu d'hommes ont fait sur moi une impression aussi vive et aussi durable ; on subissait à première vue, en sa présence, un ascendant particulier ; non cet ascendant banal qu'exerce sur ses disciples un savant qui manie heureusement les formules ou les symboles, les appareils ou les instruments d'observation, ni même encore cet ascendant plus profond qu'impose un penseur, mais un ascendant plus vif et plus intime, celui qu'une âme supérieure imprime à une autre âme. Car, bien au-dessus du savant, il y avait en Hirn l'homme dans l'épanouissement complet de ses plus nobles facultés, l'intelligence et l'âme. »

« Un autre associé de l'Académie, qui a également les titres les plus grands à une mention spéciale dans le *Bulletin*, est Buys-Ballot, l'éminent météorologiste

d'Utrecht, l'un des pères de la météorologie moderne, dont la mémoire sera perpétuée à jamais par la loi qui porte son nom. C'est lui aussi qui installa le premier les signaux avertisseurs de tempête, qui n'existent malheureusement pas encore sur nos côtes belges. Les principaux travaux, très importants, de Buys-Ballot concernent l'influence du soleil sur la température de l'atmosphère, de la lune sur le temps, les écarts des éléments météorologiques avec leurs valeurs normales, la distribution des températures sur le globe et les observations synchroniques. Ses atlas des routes nautiques sont fort appréciés, et la météorologie maritime lui doit de grands progrès. Il fut un ardent promoteur des congrès météorologiques dont l'action a donné un si puissant élan aux observations, et auxquels on semble ne plus songer aujourd'hui. Le comité permanent des Congrès météorologiques, dont Buys-Ballot fut le président, s'est même dissous récemment. On ne peut que regretter l'absence d'une association météorologique internationale qui contribuerait à unifier les méthodes d'observations, à découvrir les lois encore peu connues de la marche des dépressions et à faire avancer la solution du problème de la prévision du temps. »

Séance du 5 avril 1890.

MM. Folie, Lagrange et De Tilly lisent leurs rapports sur deux notes de M. Ronkar ; la première est relative à l'épaisseur de la croûte solide du globe, que l'auteur estime ne pouvoir être supérieure à la centième partie du rayon de la terre, en admettant même que le coefficient de la nutation diurne ne soit qu'un demi-dixième de seconde d'arc ; or il résulte d'un très grand nombre de déterminations que ce coefficient est environ trois fois plus fort, en sorte que la valeur précédente assignée à l'épaisseur de la croûte terrestre aurait une limite supérieure. La seconde note de M. Ronkar est la suite de celle qu'il a publiée dans le bulletin de décembre 1889, et à laquelle se rapporte celle dont le général Liagre a donné lecture dans la séance de mars (1). Dans son rapport sur cette dernière note, M. Lagrange a cru devoir répondre à quelques objections formulées par le général. L'impression des deux notes de M. Ronkar a été votée, sur les avis conformes des commissaires. — M. Folie lit sa réponse à la note du général Liagre relative à la nutation diurne. Il a déjà été question, dans notre numéro du 28 février, de la réplique verbale que MM. de la Vallée Poussin et Folie avaient donnée au Secrétaire perpétuel. Nous croyons superflu d'y revenir ici. Notons toutefois une expérience curieuse que M. Folie a faite à Liège avec M. Ronkar, pour démontrer la possibilité de l'indépendance mutuelle entre le noyau et l'écorce solide du globe dans les mouvements à courte période, possibilité nécessaire à l'existence de la nutation diurne. Dans un cylindre contenant de l'huile on plonge un ballon de verre qu'on équilibre de manière qu'il ne touche pas le fond du cylindre. Imprime-t-on au cylindre un mouvement de rotation alternatif très rapide, le ballon reste immobile ; lui imprime-t-on un mouvement lent, le ballon suit ce mouvement. Or le cylindre, le ballon et l'huile représentent la croûte solide, la partie solide et la partie fluide du noyau du globe. Les théorèmes de mécanique énoncés par M. Ronkar sont donc confirmés par une expérience fort simple.

M. Delbœuf fait une communication du plus haut intérêt sur l'*Étendue des effets curatifs de l'hypnotisme*. Sur deux parties symétriques du corps d'un sujet hypnotisé, les deux bras ou les omoplates par exemple, l'auteur a pratiqué deux brûlures aussi égales que possible. L'une d'elles fut l'objet de la suggestion qu'elle ne s'enflammerait pas ; l'autre fut abandonnée à la nature et servit, pour ainsi dire, de témoin. La suggestion se réalisa. M. Delbœuf cite en outre une personne, qui depuis 19 jours avait été frappée de paralysie du côté droit du corps et était absolument incapable de

(1) Voyez la *Notice nécrologique* que la *Revue* lui a consacrée le 30 janvier 1890, page 62.

(1) Voir le numéro du 15 avril de la *Revue*.

mouvoir la jambe, sous l'effet d'une seule suggestion, elle a recouvré le mouvement du membre et a pu marcher. L'auteur, tant de ses observations que de ses expériences, a tiré la conclusion suivante : l'hypnose soustrait en partie l'être pensant à l'influence du monde extérieur et lui laisse par cela même la liberté de s'occuper du monde intérieur. Il reprend alors sur les organes de la vie végétative un empire qu'il semblait avoir abdiqué, mais qu'il a seulement confié à des appareils auxquels il a appris autrefois à les gouverner sans lui. C'est ainsi qu'il peut à nouveau régler les vaso-moteurs, les glandes, les muscles lisses, etc. Jusqu'où peut s'étendre ce pouvoir? C'est sur cette question que roulait la lecture du mois d'avril. Un malheureux qui, atteint de syphilis en 1874, en était arrivé déjà en 1884 à une cécité presque complète, vint un jour — c'était à la fin de 1887 — solliciter M. Delbœuf de le traiter par l'hypnotisme. Il s'était fait soigner par les plus hautes sommités de la science ophtalmologique, et, entre autres, par le professeur Fuchs, qui avait diagnostiqué une rétinite syphilitique avec névrite rétrobulbaire; mais malgré les remèdes les plus énergiques, sa vue n'avait été qu'en s'abîmant. C'est au point que, lorsqu'il vint trouver M. Delbœuf, il ne pouvait se conduire ni même trouver une porte dans un corridor clair, qu'en se tenant aux murs, et qu'il n'aurait pu dire si une fenêtre par où le jour entraînait ronds ou carrés. M. Delbœuf — qui ne veut rien nier *a priori* — entreprit cette cure inraisonnable. Comme il n'est pas médecin, il eut recours à la collaboration de deux spécialistes, MM. Nuel et Leplat, respectivement professeur et assistant du cours d'ophtalmologie à l'Université de Liège. En faisant pendant huit mois consécutifs agir la suggestion successivement sur les différents méridiens et les différents parallèles du champ visuel, il finit par rendre à l'infortuné une vision presque centrale, qui lui permit de se diriger sans peine dans la rue, de prendre des notes et de faire son commerce. Ayant réussi avec ce malade, M. Delbœuf entreprit de traiter par une méthode analogue un autre quasi-aveugle, atteint d'une kératite interstitielle parenchymateuse, et il eut un égal succès. Si l'on songe combien l'œil paraît être un organe indépendant du reste de l'organisme, et combien étaient graves les lésions précitées, il serait téméraire, conclut M. Delbœuf, d'assigner des limites au pouvoir de la volonté dans l'état hypnotique. Certes, elle ne peut rendre la vie à ce qui est mort, mais elle peut sans contredit ramener la vie dans ce qui est en voie de mourir, et expulser des éléments morbides qui, d'ordinaire, résistent à toute médication.

M. De Heen étudie la loi qui unit la variation de la tension des vapeurs à la température absolue. Dans un travail antérieur l'auteur avait démontré que l'on peut déduire comme conséquence nécessaire de diverses relations, la loi suivante : si l'on considère plusieurs liquides pris à la température d'ébullition, la variation de la tension de leurs vapeurs, pour un accroissement de température infiniment petit, multipliée par leur température absolue d'ébullition donne un produit constant. Si l'on représente par $\frac{dp}{dt}$ la variation de la tension

de la vapeur avec la température, et par T la température absolue d'ébullition on a : $T \frac{dp}{dt} = \text{constante}$. A

l'époque où M. De Heen avait formulé cette relation, les éléments que l'on possédait étaient encore trop incomplets pour en permettre une vérification directe satisfaisante; car les températures absolues d'ébullition des liquides sur lesquels on avait opéré étaient peu différentes les unes des autres. M. Barus a comblé cette lacune en déterminant la température d'ébullition de différents métaux sous diverses pressions. Ces déterminations ont permis à M. De Heen de vérifier sa relation pour des valeurs de T variant de 123° à 307°.

F. F. Membre de l'Académie.

SOCIÉTÉS SAVANTES D'ODESSA

1^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — A la Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie (4 avril 1890), M. Tanatar communique un nouveau procédé de préparation de l'acide maléique fondé sur l'action de l'anhydride phosphorique sur l'acide fumarique. Un mélange d'acide fumarique et de Ph^2O_5 donne par distillation l'anhydride maléique, que l'on purifie ensuite par cristallisation dans le chloroforme. On obtient ainsi des quantités d'anhydride maléique pur qui équivalent presque complètement aux matériaux employés. Il est donc possible de transformer entièrement l'acide fumarique en son isomère, l'acide maléique. Cette méthode de préparation de l'acide maléique est plus simple et donne des résultats meilleurs que celle de M. Pictet et même que celle de M. Antchütz, fondée sur l'action du chlorure d'acétyle sur l'acide maléique ou l'acide fumarique.

2^o SCIENCES NATURELLES. — Le professeur Kamienski (Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie; 4 avril 1890), présente une monographie des *Utriculariées*, et insiste sur les caractères des *Biovularia* qui doivent, selon lui, constituer un genre distinct, à côté des *Utricularia* : sur la lèvres inférieure de leur corolle se développe, au lieu d'éperon, une simple protubérance sacciforme; dans l'ovaire, à la place d'un placenta central portant un grand nombre d'ovules, se trouvent seulement deux ovules adhérents, dont un seul se développe; l'autre s'atrophie; enfin le fruit, au lieu d'être formé d'une capsule multiovulaire, est un akène. Jusqu'à présent l'auteur a décrit deux espèces du genre *Biovularia*.

3^o SCIENCES MÉDICALES. — A la société des Médecins de l'hôpital municipal d'Odessa (18 mars 1890), M. Tictine présente ses recherches cliniques et bactériologiques relatives à deux cas de *méningite spécifique pendant la fièvre typhoïde*. Le premier est celui d'un jeune homme de seize ans entré à l'hôpital dix jours après le début de la maladie; on constata qu'il était atteint de fièvre typhoïde. Il demeura sans connaissance jusqu'à sa mort, qui arriva six jours après son entrée. A l'autopsie, intestins, ganglions mésentériques et rate, offrirent les lésions caractéristiques de la fièvre typhoïde. Encéphale et méninges étaient en état d'hyperhémie et d'œdème. Tous ces viscères servirent à ensementer des plaques de gélatine: seuls rate, foie, reins et encéphale donnèrent des cultures. On y trouva à l'état pur le bacille d'Eberth. Sur quelques coupes du cerveau l'auteur trouva le bacille d'Eberth; il était surtout abondant dans la pie-mère; il y en avait moins dans la matière cérébrale immédiatement au-dessous de la pie-mère. L'abondance du microbe et de nombreux leucocytes migrants dans la pie-mère, jointe à l'œdème de cette séreuse permet de conclure que la méningite aiguë, survenue au cours de la fièvre typhoïde, a eu pour cause le bacille spécifique de cette dernière maladie. Le second cas observé par M. Tictine se rapporte à un malade entré à l'hôpital après sept jours de fièvre typhoïde; dès son entrée il perdit connaissance et quelquefois il délira, sans intermittence de lucidité, jusqu'à sa mort arrivée 20 jours après son admission. A l'autopsie furent constatées les lésions de la fièvre typhoïde et, en outre, celles de la méningite purulente. Tous les viscères furent ensementés sur gélatine. Celles qui reçurent le suc de la rate, le contenu de la vésicule biliaire, l'écorce de l'encéphale, le corps strié, le bulbe, le cervelet et le pus de la pie-mère, donnèrent des cultures pures d'un bacille en tout identique à celui d'Eberth. Des coupes de toutes les parties du cerveau montraient l'inflammation de la pie-mère; dans cette séreuse on n'a rencontré qu'en petite quantité le bacille d'Eberth. De l'ensemble de cette observation semble résulter que la méningite purulente a été provoquée par le microbe même de la fièvre typhoïde.

D^r Pierre HAUSNER.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance des 13 et 20 avril 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Tacchini présente le résumé des observations solaires faites, pendant le premier trimestre de 1890, à l'observatoire du Collège Romain. En comparant les résultats obtenus, avec ceux qu'il avait exposés dans une note précédente, on voit que la période de calme continue pour les premiers mois de 1890. Les taches sont toujours plus petites, et le 6 mars, on put en voir une qui se trouvait à une distance extraordinaire, pour la période actuelle, de l'équateur du Soleil. Du 16 janvier au 5 mars, les taches et les facules manquèrent complètement. Les protubérances suivent, dans leur diminution, le phénomène des taches. — M. Millosevich donne les résultats des observations qu'il a faites, à l'équatorial du Collège Romain, de la petite comète découverte par M. Brooks le 19 mars 1890 :

1890, mars 27, 15^h 27^m 58^s. R. C. R.

$$\alpha \left\{ \begin{array}{l} 21^{\text{h}} 10^{\text{m}} 36^{\text{s}}, 14 \text{ (9.641 n)} \\ 21 \text{ } 10 \text{ } 36, 33 \text{ (9.641 n)} \end{array} \right\}$$

coordonnées

$$\delta \left\{ \begin{array}{l} + 8^{\circ} 50' 41", 7 \text{ (0.750)} \\ + 8 \text{ } 50 \text{ } 39, 2 \text{ } 0.750 \end{array} \right\}$$

La première position a été obtenue avec l'étoile 5404 du catalogue de Greenwich, et la seconde position, avec l'étoile 5406 du même catalogue. — M. Cavalli apporte une contribution à la théorie des transmissions téléodynamiques. Rappelant les travaux déjà parus sur ce sujet, qui s'appuient sur une grande rigueur scientifique ou sur quelque hypothèse plus ou moins rationnelle, M. Cavalli traite la question à l'aide du procédé géométrique, dont il montre la simplicité et l'exactitude. — M. Bianchi. Sur les groupes de substitutions linéaires à coefficients entiers complexes. — Sur une classe de représentations équivalentes de la sphère sur un plan. — M. Del Re. Sur les coupes de formes bilinéaires. — M. Bigiavi. Equations différentielles linéaires à coefficients doublement périodiques.

2^{de} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Cantone, qui avait déjà étudié la déformation du fer par effet de la magnétisation, a continué ses recherches sur le nickel. Il disposait un noyau ellipsoïdal de ce métal à l'intérieur d'une spirale, dans laquelle on faisait passer un courant. L'ellipsoïde, au passage du courant, éprouvait des raccourcissements qui, lorsque la force magnétisante n'était pas trop grande, sont proportionnels au carré de la force, comme la théorie permet de le prévoir. En mesurant les variations de volume de l'ellipsoïde sous l'action magnétisante, M. Cantone a reconnu que ces variations sont très petites, et qu'elles accusent toujours une augmentation en volume du nickel. — Sur les particularités présentées par les solutions de borax en présence de la mannite, plusieurs recherches furent accomplies par Vignon, Bouchardat, Klein et Dunstan. — M. Magnanini a voulu déterminer la constitution de ces solutions et la nature de la substance acide qui s'y formerait, en étudiant leur conductibilité électrique. En effet, tandis que l'acide borique présente une grande résistance au passage du courant, cette résistance devient vingt fois moindre, lorsqu'on ajoute de la mannite à la solution. M. Magnanini donne des détails sur ses expériences, sur les valeurs obtenues et se propose d'examiner et de discuter, dans une Note suivante, les résultats de ses recherches. — M. Garibaldi établit une comparaison entre l'activité de la chromosphère du Soleil et la déclinaison magnétique, montrant la coïncidence des deux phénomènes dans l'ensemble et dans les détails, sauf quelque petite différence due à des actions que nous ne connaissons pas encore. Les tables des observations et un diagramme, montrent que la période (1879-1889) entre les deux minimums des taches est de dix années et six mois; et que la période des variations déclino-

ques est de dix années et cinq mois. M. Garibaldi remarque encore que certaines fois il n'y a pas de relation entre le nombre des taches et l'activité magnétique, et il observe que, dans ces cas, aux maximums anormaux des variations magnétiques, répond un plus grand développement des protubérances solaires. — M. Grablovitz décrit un marégraphe facile à transporter, dont il s'est servi pour mesurer les mouvements de la mer dans le port d'Ischia. L'appareil se compose d'un mouvement d'horlogerie, dont le tambour accomplit un tour en six heures; d'un cylindre enregistrant les mouvements d'un flotteur lenticulaire en bois de hêtre; et d'un manchon en zinc, où le flotteur peut exécuter ses mouvements, et qui forme l'étui de l'appareil lorsqu'on ne s'en sert pas. Des tracés obtenus avec ce marégraphe présentent, pour le port d'Ischia, non seulement l'oscillation de 13^m 3/4, décrite dernièrement par M. Grablovitz, mais encore d'autres oscillations plus petites qui, variables de niveau, sont isochrones et durent 1^m 32^s en moyenne. — M. Montessus a prouvé que les tremblements de terre se produisent pendant le jour et pendant la nuit avec la même uniformité. — M. Agamennone remarque que les observations faites en Italie ne suivent pas cette loi générale, examine toutes les secousses relevées en Italie en 1889, trouve confirmée l'anomalie relevée par M. Montessus, analyse les causes des perturbations, et insiste sur la nécessité d'établir les observatoires sismologiques loin des centres peuplés et à l'abri de l'action du vent et des écarts de la température.

3^{de} SCIENCES NATURELLES. — M. Emery communique les résultats de ses recherches sur le développement du carpe des Batraciens anoures. Il a trouvé que la pièce regardée généralement comme radiale comprend un élément central fusionné avec le véritable radial. L'ébauche de l'intermédiaire unit le central à l'extrémité du cubitus, mais elle ne devient jamais cartilagineuse. Le doigt radial des Anoures n'est pas le pouce, mais un propollex et le scaphoïde des auteurs est son carpal. Chez le *Pelobates* M. Emery a trouvé une ébauche rudimentaire d'un doigt ulnaire, correspondant au petit doigt de l'anatomie humaine et au dernier orteil du pied des Anoures. Le développement considérable du propollex et du préhailux chez les Anoures fait supposer que leurs membres dérivent d'un type à six doigts. L'auteur s'occupe ensuite du propollex des Rongeurs dont il a trouvé un rudiment cartilagineux chez le lapin adulte, et dont il a suivi le développement chez ce même animal. Les observations montrent que l'os qui se trouve dans l'aponévrose palmaire de beaucoup de Rongeurs, ainsi que le sésamoïde radial d'autres Mammifères, est bien un rudiment de propollex. Toutefois il ne pense pas que les Mammifères primitifs ni aucun Amniote aient jamais possédé plus de 5 doigts bien développés. Lorsque chez les Mammifères, il existe une saillie en rapport avec le rudiment de squelette du propollex, ce n'est pas une disposition primitive, mais un organe nouveau qui s'est développé sans un rudiment préexistant. La main et le pied des Vertébrés terrestres semblent dériver de nageoires à un grand nombre de rayons dont les premiers et les derniers en rang ont disparu successivement, par réduction. C'est ainsi que se sont formés le type à six rayons des Anoures et celui à cinq des Urodèles et des Amniotes. Un nombre plus grand n'a pu exister que chez des Anamniens terrestres primitifs, encore inconnus. Le pisiforme et le sésamoïde radial sont les résidus de rayons disparus; ils se trouvent encore en rapport avec leurs muscles qui sont devenus les extenseurs et fléchisseurs du carpe. — M. Coppola a fait des recherches pour établir si les combinaisons inorganiques du fer, non élaborées par les végétaux, peuvent être assimilées par l'organisme, ou si elles sont éliminées sans se joindre à l'hémoglobine comme on le croit généralement, même en admettant l'action thérapeutique du fer dans les anémies, les chloroses etc. Des expériences furent exécutées sur

des coqs, dont la crête se prête très bien à un facile examen du sang. On donnait à ces oiseaux de la patée chimiquement préparée sans fer qui au contraire est abondant dans la nourriture ordinaire. Les recherches, et de délicates analyses, ont fait voir que l'élimination du fer continue, même quand ce métal manque dans la nourriture, et que dans ce cas le sang subit une profonde altération histologique. Les altérations viennent à disparaître lorsqu'on recommence à donner du fer aux oiseaux ; au commencement il est assimilé en grande quantité, même sous forme de combinaison inorganique. M. Coppola se propose de traiter ses

recherches sur divers animaux, et de poursuivre dans un Mémoire plusieurs questions relatives à l'assimilation et au rôle du fer dans l'organisme. — MM. Jussari et Panasù ont étudié, à l'aide de la réaction de Golgi, la terminaison des nerfs dans la muqueuse de la langue des mammifères (souris, lapin, chat, chevreau). Ils donnent la description détaillée du réseau formé par ces nerfs, des ramifications et de la structure qu'ils présentent sur leur parcours, et de la pénétration des filets nerveux dans les papilles.

Ernesto MANCINI.

NOTICES NÉCROLOGIQUES

ULYSSE TRÉLAT

Le douloureux retentissement qui a suivi, dans le monde des sciences, la mort inopinée du professeur Trélat, se prolongera longtemps encore. Chaque jour montre mieux la grande perte que vient d'éprouver la Faculté de Médecine de Paris.

Né à Paris le 13 août 1828, Ulysse Trélat était le fils du Dr Trélat, médecin distingué de la Salpêtrière qui fut ministre des travaux publics en 1848. Sans hésitations, il entra dans la voie où s'était illustré son père et dès 1849, à l'âge de 21 ans, nous le voyons interne des hôpitaux. Cinq ans après il présente sa thèse de doctorat (*Des fractures à l'extrémité inférieure du fémur*). Procureur en 1856, il était agrégé l'année suivante à l'âge de 28 ans. Sa thèse de concours (*De la nécrose phosphorée*) fut des plus remarquées.

En 1860 il était nommé chirurgien des hôpitaux. A partir de cette époque commence son enseignement clinique qui débute à la Maternité et se continue à l'hôpital Saint-Antoine, à Saint-Louis, à la Pitié, à Necker et à la Charité. Il avait été nommé professeur de Pathologie chirurgicale à la Faculté en 1872, à 43 ans, et deux ans après l'Académie de Médecine lui ouvrait ses portes.

La série des publications que laisse Trélat montre combien variées étaient les ressources de son intelligence. Nous ne citons que les principales : *Sur l'ulcère tuberculeux de la langue*, *Sur la staphylochorrhée*, *la palatoplastie et la cheilo-plastie*, *Fistules vésico-vaginales*, *De la valeur des opérations plastiques sur le palais et de l'âge auquel il convient de les pratiquer*. Trélat développait dans cette étude des considérations ingénieuses sur l'éducation anté et post-opératoire.

Tout récemment encore il donnait aux *Annales de Gynécologie* une étude sur le Prolapsus utérin et prenait une part active aux discussions de la Société de chirurgie sur les diverses affections utérines.

On doit également à Trélat des études critiques sur la construction de l'Hôtel Dieu, des hôpitaux, les Maternités, les Eloges de Velpeau, Wurtz, une introduction à un Cours d'Anatomie appliquée aux beaux-arts 1863, une introduction à un Cours d'Hygiène appliquée à l'architecture, etc.

La chaire de clinique chirurgicale à la Charité et la croix de commandeur de la Légion d'honneur récompensaient dans ces dernières années les rares mérites de Trélat.

Ce qu'il fut comme professeur, notre génération ne l'oubliera pas de sitôt. Le moindre sujet prenait sous sa puissante originalité un intérêt particulier. Maintes fois aussi nous l'avons entendu s'élever à la plus réelle éloquence. Chaque année il s'attachait spécialement à quelques unes des questions à l'ordre du jour, les étudiait à fond, puis, après une méditation prolongée, développait devant ses élèves les considérations que cette étude lui avait suggérées. Il avait le secret des définitions et des comparaisons heureuses. Au cours de sa leçon il se levait volontiers et traçait au tableau des figures simples et claires, ou par une mimique des plus

exactes reproduisait un jour le parler spécial des divisions palatines, une autre fois la démarche caractéristique des luxations congénitales, puis après avoir intéressé et instruit son auditoire, sans perdre un instant son attention, il s'arrêtait en disant : « Morale » et la conclusion se dégageait courte et saisissante sous forme d'axiome. On s'éloignait confiant dans la doctrine qu'un judicieux examen des faits avait dictée à cet esprit supérieur.

A l'Académie de Médecine comme à la Société de Chirurgie dont il suivait assidûment les séances, c'était la même sûreté de jugement. Son intervention dans les discussions forçait l'attention et ce n'est pas trop, croyons-nous, que de placer Trélat à côté de Malgaigne parmi les meilleurs critiques que notre siècle ait produits dans les sciences médicales.

Sa conversation était captivante, spirituelle et jamais banale. Un de ses mérites était de savoir écouter et tous ceux qui l'ont souvent approché se sont bien rendu compte qu'il s'instruisait auprès des jeunes, les laissant parler pour fixer définitivement dans sa mémoire ce qui lui paraissait bon à retenir de leur exubérante bibliographie.

Trélat n'a pas seulement brillé dans l'enseignement théorique, il fut un très habile chirurgien. Son adresse s'exerçait plus volontiers sur les opérations délicates comme la palatoplastie où il excellait. Sa chirurgie était essentiellement propre et bien qu'antérieure par la date de ses premiers travaux à la grande ère antiseptique, nous l'avons vu ne pas douter de la méthode nouvelle et se faire une seconde manière pour rester à la tête du mouvement.

Chaque année il donnait la statistique intégrale des opérations pratiquées dans son service. Le résultat s'améliorait dans des proportions surprenantes, grâce à la sévérité de sa pratique. Il n'en était que plus intéressant de le voir, à la reprise de son cours, faire une sorte d'examen de conscience quand il en arrivait au chiffre de la mortalité. Il serait de près toutes les conditions de réussite ou d'insuccès, ne cherchant aucunement à se disculper, voulant le mieux quand il avait le bien.

Même de son vivant, on remarquait que les ouvrages de longue haleine manquaient à son œuvre. Chacun produit selon sa nature et le domaine scientifique s'enrichit d'autant plus que les contributions sont diverses. Les bulletins de l'Académie, de la Société de Chirurgie et de tant d'autres Sociétés, montrent d'ailleurs quelle fut l'activité d'esprit de notre Maître.

L'espace me manque pour dire ce que fut l'homme, d'une absolue probité professionnelle et d'un patriotisme élevé. Dès nos premiers désastres, en 1870, il quittait Paris, allait organiser les ambulances de province, puis se portait en avant et tenait campagne jusqu'à la fin de la guerre à l'armée de la Loire.

Les magnifiques obsèques du Dr Trélat ont montré quels unanimes regrets le suivaient dans sa mort trop prompt. Il laisse à ses élèves le souvenir d'un enseignement de la plus haute valeur.

Dr André CASTEX.

EUGÈNE PELIGOT

Eugène Peligot, grand officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie des Sciences, né à Paris en 1811, y est mort le 15 avril dernier. Il fut un des élèves les plus distingués de Dumas. Entré à l'École Centrale en 1829, il y fut nommé professeur en 1838, occupa ensuite avec éclat au Conservatoire des Arts et Métiers, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à celui de 78, la chaire de *chimie appliquée aux arts*, devint successivement Essayeur à la Monnaie, Contrôleur, puis Directeur des Essais à ce même Etablissement, membre du Conseil d'Hygiène, de la Société d'Agriculture et de la Société d'Encouragement, qui l'élit secrétaire perpétuel. Ces différentes compagnies le chargèrent de nombreux rapports sur les applications de la chimie à l'hygiène, l'agriculture et l'industrie. En 1852, l'Académie des Sciences accueillit l'éminent chimiste dans sa section d'économie rurale.

Tant de titres et d'honneurs étaient la récompense de nombreuses et importantes découvertes. Celle qui rendit tout d'un coup célèbre le nom de Peligot, en l'associant à celui de Dumas, résulta de leurs recherches sur l'esprit de bois (1836). En démontrant que ce corps se comporte, dans ses réactions, comme l'esprit de vin, seul terme alors connu de la série aujourd'hui presque indéfinie des alcools, le maître et l'élève ouvraient, en quelque sorte, une voie nouvelle : ils introduisaient pour la première fois dans la chimie la notion féconde de *fonction alcoolique* et par là même faisaient prévoir l'existence d'une multitude de composés analogues.

Les produits organiques d'origine végétale attirèrent ensuite l'attention de Peligot. Ses travaux sur les sucres le conduisirent à définir, mieux qu'on ne l'avait fait avant lui, les propriétés de ces hydrates de carbone et à séparer nettement les saccharoses des glucoses. Il fit voir que ces deux sortes de sucres se distinguent par des réactions propres et précisa les conditions dans lesquelles les premiers donnent naissance aux seconds. En étudiant les transformations que les bases fortes leur font subir, il découvrit le sucrate de chaux, employé, en raison de sa solubilité, dans l'extraction du sucre. Ce remarquable travail fut ainsi l'origine d'une véritable révolution dans l'industrie sucrière. Peligot trouva aussi les sucrales de baryum et de strontium insolubles dans un excès d'hydrate de baryte. Cette propriété a été utilisée plus tard par Dubrunfaut ; c'est sur elle que repose l'industrie actuelle de la sucraiterie.

La science agronomique devait aussi bénéficier des recherches de l'habile chimiste : avec la collaboration de Decaisne, Peligot essaya de suivre chez les plantes la formation des sucres et des principes immédiats du même groupe. Il montra que chez la Betterave le sucre est presque exclusivement localisé dans la région souterraine. La partie de la souche, située au-dessus du sol, — c'est la tige, — n'en contient guère ; mais elle renferme une bien plus forte proportion de sels et de matières azotées. Le premier, Peligot entreprit de doser ces composés dans les divers organes de la plante, — racine, tige, pétiole, limbe, — aux différents stades de son évolution. C'était poser le principe d'une méthode féconde que MM. Dehérain et Aimé Girard ont depuis portée à sa perfection. Dès 1839 elle conduisit Peligot à reconnaître la formation du saccharose dans la feuille, — découverte des plus importantes pour la physiologie. Quant aux quantités absolues de sucre contenues dans la racine, les dosages montrèrent qu'elles peuvent varier considérablement d'un pied à un autre : d'où la nécessité de bien choisir les graines à ce point de vue. — Dans la Canne à sucre le saccharose s'accumule en grande quantité dans la tige en compagnie de principes immédiats qui, pendant l'extraction du sucre, donnent naissance aux mélasses. Peligot montra qu'on pouvait réduire d'une façon considérable la production de la mélasse et augmenter par là même le rendement en sucre.

C'étaient là des résultats d'un haut intérêt théorique et pratique. Peligot ne cessa de les étendre. Il perfectionna les procédés de l'analyse, — minérale et organique, — et les appliqua à déterminer la composition des végétaux. Chose curieuse, tandis qu'il faisait vivre les plantes terrestres dans un sol très riche en sels sodiques et pauvre en potasse, l'organisme refusait opiniâtrement la soude, et fixait au contraire dans ses tissus une abondante quantité de sels potassiques. Ces derniers sels paraissent surtout abondants dans les membranes cellulaires ; il est facile de les y trouver après incinération. La science est encore impuissante à expliquer cet apparent caprice des végétaux terrestres à l'égard de deux métaux aussi voisins que le potassium et le sodium. Le fait n'en est pas moins important : il faut savoir gré à Peligot de l'avoir nettement établi. L'agronomie lui doit aussi d'intéressantes observations sur la constitution chimique des feuilles, notamment du mirier, et les variations d'ordre chimique corrélatives des métamorphoses chez le ver à soie.

Dans le monde minéral, Peligot a attaché son nom à l'histoire de l'uranium et de ses composés. En 1789 Klaproth avait découvert dans la *pechblende* un corps qu'il décrit alors comme un nouveau métal et désigna sous le nom d'*urane*. Peligot reconnut en 1847 que ce prétendu corps simple était en réalité un oxyde. En traitant le chlorure correspondant par le sodium, il réussit à isoler le vrai métal ; il lui donna le nom d'*uranium*. La portée philosophique de ce résultat fut surtout sentie lorsque la connaissance plus approfondie des éléments permit de les classer en familles et en genres. On sait, à ce sujet, l'intéressante discussion à laquelle a donné lieu le poids atomique de l'uranium, quand M. Mendeleeff constitua ses *séries périodiques*. On avait rapproché l'uranium du fer et du chrome en lui attribuant 120 comme poids atomique. Or ce poids ne s'accordait pas avec la densité trouvée 18,4. Pour faire disparaître cette anomalie, M. Mendeleeff proposa de doubler le poids atomique alors admis et de ranger l'uranium loin du fer et du chrome, à côté du molybdène et du tungstène. Zimmermann confirma bientôt cette interprétation : il prit la densité de vapeur du chlorure uraneux et la trouva d'accord avec la formule UCl_4 , seule conforme à la loi périodique de Mendeleeff. Cette formule fut dès lors substituée à l'ancienne notation UCl_2 .

Indépendamment de l'intérêt théorique attaché à sa découverte, Peligot en montra bientôt l'utile application. L'uranium donne en effet deux sortes de composés principaux, répondant aux formules générales UR^3 et UR^6 (nouvelles notations $U=240$) :

$URCl_4$ correspond à $(UO^2)^+$ = uranyle et oxyde

UO^3 auquel ne correspond d'ailleurs pas de chlorure UCl^3 — (on ne connaît que UCl^3).

Les premiers, qualifiés d'*uraneux*, sont verts ; les seconds, dits *uraniques*, sont jaunes. Peligot indiqua la façon de les employer à la fabrication des verres colorés et fluorescents. Il fut ainsi amené à étudier les phénomènes chimiques qui se produisent dans la fabrication du verre et contribua puissamment au progrès de cette industrie.

Tous ces travaux offrent le double mérite d'avoir été bien conçus et très habilement exécutés. Aussi M. Schœdler a-t-il pu dire, en adressant à Peligot un dernier adieu, au nom de l'Académie des Sciences : « L'œuvre entière de notre confrère restera debout ; c'est qu'il y a mis tous ses soins, toute sa conscience. Nulle part on n'y trouve l'art de faire valoir toute l'importance d'une découverte, ni de laisser dans l'ombre ce qui prête à la critique. La bonne foi, le noble culte de la vérité s'y décèlent partout ; partout se voit la marque de la modération, de la droiture, de l'honnêteté absolue. »

LOUIS OLIVIER.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LA PROPHYLAXIE INTERNATIONALE DU CHOLÉRA

L'épidémie de choléra qui règne en ce moment en Mésopotamie, et qui menace l'Europe, appelle de nouveau l'attention du monde savant sur cette terrible maladie, qui depuis soixante ans a ravagé six fois le monde et dont on peut prévenir le retour, en prenant les mesures dont la science contemporaine a démontré l'efficacité.

Nous avons fait bien du chemin depuis 1832. Il suffit, pour le constater, de relire les journaux de médecine du temps, et les livres écrits sur le choléra, lors de sa première invasion. Les doctrines médicales qui régnaient à cette époque empêchèrent de tirer de cette formidable épidémie les enseignements qu'elle comportait et qui auraient permis peut-être d'en prévenir le retour.

Pour les sectateurs de Broussais, dont le système était alors à son apogée, le choléra n'était qu'une gastro-entérite. Ceux-là même qui, vaincus par l'évidence, se refusaient à admettre une inflammation chez des malades cyanosés, froids, sans pouls et ressemblant à des cadavres, ceux-là même qui avaient la notion vague d'une intoxication, niaient résolument la contagion et rejetaient par conséquent tout moyen sérieux de prophylaxie. Il a fallu que l'expérience fit son œuvre et que la doctrine physiologique s'écroulât, pour qu'on revint à des idées plus saines.

Lorsque le fléau revint quinze ans après visiter l'Europe, on observa sa marche avec plus d'impartialité, et on ne tarda pas à reconnaître que son itinéraire était le même que la première fois. On le vit s'avancer encore de proche en proche, s'ar-

rêtant par intervalles pour revenir sur ses pas paraissant sommeiller parfois pendant de longs intervalles, pour se réveiller ensuite, mais allant toujours devant lui, en suivant les courants humains et sans jamais dépasser leur vitesse.

On put étudier également son mode de propagation et constater que, quand il éclatait dans une ville, ce n'était pas comme les orages qui l'inondent en un instant dans toutes ses parties, mais à la façon des incendies multiples et par petits foyers disséminés, s'étendant les uns vers les autres, pour se rejoindre et l'embraser tout entière. Enfin, on put arriver à remonter, dans la plupart des cas, à l'étincelle qui avait allumé chacun de ces foyers, et reconnaître qu'ils avaient presque toujours, pour point de départ, un malade venu d'une contrée en proie à l'épidémie et qui en avait apporté le germe à l'endroit où on voyait la maladie éclater.

La notion de contagion s'imposait ainsi d'une façon irrésistible, et les épidémies survenues depuis cette époque n'ont fait que la confirmer, en multipliant les preuves de la transmission et en montrant que le fléau marche de plus en plus vite, depuis qu'il a à sa disposition les chemins de fer et les navires à vapeur.

Enfin, les doctrines qui règnent aujourd'hui sont venues donner leur sanction à cette étiologie qui a reçu sa dernière consécration par la découverte du bacille du choléra.

Il reste encore un certain nombre de points obscurs dans son histoire; mais les faits princi-

paux sont démontrés et permettent de recourir à une prophylaxie sérieuse et efficace. Je vais donc exposer brièvement ces faits, qui ne sont plus contestés.

Originaire de l'Inde, le choléra a, pour territoire endémique, un immense quadrilatère limité par le Brahmapoutra et le Mahamuddi, parcouru par le Gange et ses affluents. Il en franchit à chaque instant les frontières, pour se répandre sur les pays voisins, et, de loin en loin, il prend son essor et se répand sur le reste du monde. Il a déjà ravagé six fois l'Europe. Les trois premières épidémies ont causé en France 346.478 décès, sur une population moyenne de 35.339.536 habitants. Les dernières ont été moins meurtrières, mais l'exemple de l'Espagne, si cruellement maltraitée à la dernière invasion, nous prouve qu'il serait imprudent de nous fier à cette bénignité apparente.

Le choléra prend habituellement sa course à la suite de ces grands pèlerinages de l'Inde qui réunissent parfois plus d'un million de fanatiques. Il apparaît souvent aussi à la Mecque, pendant le pèlerinage annuel au tombeau du Prophète. Dans ces agglomérations, il éclate avec une violence qu'on ne peut comparer qu'à celle d'un incendie; puis les fêtes terminées, les pèlerins se dispersent dans tous les sens, répandant partout la maladie sur leur passage. Parfois ce sont les armées en marche qui la propagent ainsi. C'est ce qui arriva en 1831, lorsqu'elle entra en Pologne, avec l'armée russe dirigée contre Varsovie. Aujourd'hui, ce sont les bateaux à vapeur, les chemins de fer qui la transportent d'habitude, ce qui explique la rapidité de ses allures. A la première invasion, le choléra a mis dix-huit ans pour nous arriver de l'Inde; à la seconde, il ne lui a fallu que trois ans pour parcourir le même itinéraire, et à la troisième, il lui a suffi de quelque mois pour gagner le centre de l'Europe et le nouveau monde; mais, quelle qu'ait été sa vitesse, *jamais il n'a franchi une distance dans un temps plus court que celui qui est nécessaire à l'homme pour la parcourir.*

Le choléra n'a pas une direction fatale comme celle d'un ouragan. Il ne marche pas invariablement de l'est à l'ouest, comme on l'a cru, en le voyant toujours nous venir de l'Inde. Il rayonne dans tous les sens, en marchant souvent à l'encontre des vents régnants et des moussons, et revient parfois sur ses pas, suivant la direction des courants de voyageurs qui le transportent.

La présence d'un malade n'est pas nécessaire pour provoquer son éclosion. Le germe qui le transmet peut être apporté par du linge, des vêtements, des objets de mobilier souillés par les déjections des cholériques, qui recèlent et transmettent le principe de la contagion dans la majorité des cas.

Ce principe appartient à la classe des micro-organismes qu'on a déjà trouvés dans un certain nombre de maladies infectieuses et qui sont vraisemblablement la cause de toutes les affections du même genre. Depuis longtemps, on en avait aperçu dans les selles des cholériques. Virchow en 1848, Facini en 1854, Niedzwiedzki en 1874, avaient vu et décrit des microbes auxquels ils attribuaient la spécificité cholérigène; mais leurs indications avaient passé inaperçues, lorsqu'en 1883, le D^r Koch fut envoyé à Alexandrie, par le gouvernement allemand, pour y étudier le choléra qui venait d'éclater en Égypte. Il trouva, dans les déjections des malades et dans l'intestin des cadavres, un organisme particulier, le *bacille-virgule* auquel il a donné son nom et qui a été également reconnu par les jeunes savants de la mission française, MM. Strauss, Roux, Nocard et Thuillier, envoyés à Alexandrie dans le même but que M. Koch et à la même époque.

La *bacille virgule* se rencontre dans les petites masses blanchâtres que renferment les selles riziformes; mais il n'est pas toujours facile de l'y reconnaître au milieu des bactéries vulgaires parmi lesquelles il est plongé. On ne le distingue nettement que dans les cas de choléra foudroyant. Il apparaît alors avec autant d'abondance que dans une culture où il serait à l'état de pureté. MM. Roux et Strauss l'ont vu à Toulon, dans ces conditions, et MM. Cornil et Babès l'ont également trouvé, neuf fois sur dix, chez les cholériques qu'ils ont eu l'occasion d'observer à Paris en 1884.

Les *bacilles virgules* ont une longueur de 1 μ , 5 à 2 μ , 5 et une épaisseur de 0 μ , 5 à 0 μ , 6. Ils sont un peu courbés en arc; leurs bords sont lisses et leurs extrémités mousses. Ils sont animés de mouvements très vifs, même après qu'ils ont été colorés par le violet de méthyle. On peut les cultiver sur la gélatine et sur l'agar-agar, comme l'ont fait MM. Cornil et Babès; ils se multiplient sur le lait, le linge humide, la pomme de terre, la carotte, les choux crus, le pain mouillé; mais la dessiccation les tue rapidement, tandis que le froid ne les détruit pas. A dix degrés au-dessous de zéro, ils restent vivants, mais inactifs. Ils meurent au-dessus de 65°. La température qui leur convient le mieux est comprise entre 30° et 40°.

D'après ce qui précède, il n'est pas permis de douter de la présence à peu près constante du bacille virgule dans l'intestin des cholériques; mais il n'est pas encore absolument démontré qu'il soit la cause de la maladie. Il n'existe que dans les selles. Jamais on ne l'a trouvé ni dans le sang ni dans aucun viscère. C'est là une objection d'une incontestable valeur et qui laisse encore planer quelques

doutes sur la spécificité cholérigène du bacille de Koch.

Cette incertitude n'a pas une importance capitale au point de vue de la prophylaxie. Quelle que soit la nature du principe toxique qui cause la maladie, on connaît son mode de propagation, et cela suffit. On sait qu'il réside surtout dans les déjections, qu'il a les eaux pour véhicule habituel, qu'il s'y conserve longtemps et peut ainsi se propager à de grandes distances. L'importance de ce mode de transmission a été mise hors de doute dans l'épidémie de 1884. L'Académie de Médecine adressa à cette occasion, à tous les médecins des départements envahis par le fléau, un questionnaire auquel la plupart d'entre eux s'empressèrent de répondre. Elle reçut cent quatre-vingt-trois dossiers qu'elle confia à l'examen d'une Commission dont M. Marey fut nommé rapporteur (1). Le résumé de cette grande enquête a jeté le plus grand jour sur l'étiologie du choléra et démontré que, dans un très grand nombre de cas, il avait été transporté d'une localité dans l'autre, ou répandu dans les différents quartiers d'une ville, par un ruisseau contaminé, par une source, par une nappe d'eau que des malades avaient souillée de leurs déjections. Cependant, ce n'est pas seulement avec les boissons que les germes de la maladie s'introduisent dans l'organisme; ils y pénètrent également par les voies respiratoires, lorsqu'ils sont desséchés et transportés sous forme de poussière par l'air atmosphérique. Ce mode de transmission paraît en désaccord avec ce que j'ai dit plus haut de la promptitude avec laquelle la dessiccation fait périr le *bacille-virgule*; mais j'ai fait mes réserves au sujet du rôle que joue ce dernier dans une multitude de cas et la rapidité avec laquelle la maladie se propage ne peut s'expliquer que par la dissémination de ses germes dans l'air ambiant.

Le choléra est, en effet, la maladie épidémique qui a les allures les plus vives, la puissance de diffusion la plus grande, la période d'incubation la plus courte. C'est aussi celle qui tue le plus vite. Vingt-quatre heures lui suffisent parfois pour accomplir son évolution. C'est le type des fléaux dont l'agent de transmission semble avoir des ailes. Les hommes de mon âge se souviennent encore de sa première apparition en Europe et de la façon dont il fondit sur nous, dans les premiers mois de 1832. On apprit coup sur coup qu'il était en Angleterre, à Calais et à Paris; en trois bonds il

était arrivé au centre de la France, et quelques mois après il en avait fait le tour.

Tous ces faits sont indispensables à connaître, pour se rendre compte du degré d'efficacité des mesures auxquelles on peut recourir, pour prévenir une nouvelle invasion du fléau.

Les moyens à lui opposer sont de trois sortes. On peut l'arrêter à la frontière du pays, en lui barrant la route; on peut l'empêcher de s'y développer, en assainissant les villes qu'il rencontre sur son passage et en détruisant immédiatement ses foyers primitifs; on conçoit enfin qu'on puisse arriver à rendre les habitants inhabiles à le contracter, par une vaccination préventive, si toutefois on parvient à la découvrir un jour; mais ce préservatif est encore à trouver. Les recherches à son sujet n'ont produit jusqu'ici que des déceptions. Je ne veux pas reproduire ici la triste histoire des vaccinations opérées en Espagne, en 1885, par le D^r J. Ferran de Tortosa et qui ont eu pour dernier épisode le désastre de Cambrils. Ce sont de ces choses sur lesquelles il faut jeter un voile; ceux qui désireraient le soulever, n'ont qu'à lire le rapport de la commission française envoyée sur les lieux et présidée par le D^r Brouardel (1), ainsi que celui du D^r Van Ermengem (de Bruxelles) (2). Cette campagne néfaste ne doit pas décourager les savants honnêtes et sincères, ni les détourner de la voie dans laquelle la médecine s'est une première fois égarée.

La question a du reste été déjà reportée sur le terrain scientifique par un jeune savant russe, le D^r Gamaleïa. Élève de M. Pasteur et initié à sa méthode, il s'est inspiré des expériences de son maître sur le virus rabique, pour tenter d'arriver par la même voie à la vaccination anticholérique. Après s'être assuré que les cultures ordinaires du bacille cholérique n'ont que très peu d'action sur le cobaye, il a réussi à renforcer leur virulence, en les faisant passer par le corps des pigeons. Il a vu ces animaux succomber rapidement et a retrouvé le bacille dans leur sang. Après quelques passages, ce liquide devient tellement virulent, qu'il suffit d'en injecter une ou deux gouttes, pour tuer en quelques heures les pigeons et les cobayes.

M. Gamaleïa dit avoir reconnu de plus que ce virus, si promptement mortel, devenait sans effet sur les pigeons, lorsqu'on leur avait préalablement

(1) La Commission était composée de MM. Bergeron, Besnier, Brouardel, Legouest, Pasteur, Proust, Rochard, et Marey rapporteur. Le rapport a été inséré dans le *Bulletin de l'Académie de médecine* de 1884 et publié chez G. Masson en 1885.

(1) Rapport sur les essais de vaccination cholérique entrepris en Espagne par M. le D^r Ferran, présenté au Ministère du Commerce, par MM. Brouardel, Charrin et Albaran. Paris, G. Masson, 1885.

(2) Rapport sur le système d'inoculation anticholérique du D^r Ferran, par M. Van Ermengem de Bruxelles (*Moniteur belge* 13 juillet 1885).

inoculé une culture ordinaire non virulente du choléra.

Si les faits énoncés par M. Gamaleia étaient confirmés par des expériences ultérieures, ce serait un premier pas fait vers la découverte de la vaccination anticholérique; mais ils sont en désaccord avec tout ce qui a été observé jusqu'ici. Les savants les plus autorisés ont toujours échoué quand ils ont voulu inoculer le choléra aux animaux. Les savants français de la mission égyptienne ont pourtant réussi une fois sur une poule; mais personne n'a jamais pu trouver le *bacille virgule* dans le sang. Il faut donc rester sur la réserve, en attendant les nouvelles recherches auxquelles le savant russe a promis de se livrer et c'est ce qu'a fait M. Pasteur lorsqu'il a communiqué le travail de son élève à l'Académie de Médecine (1).

Les mesures d'assainissement sont d'un ordre plus pratique. L'avenir de la prophylaxie sanitaire leur appartient; mais le présent leur échappe encore. Lorsque nous serons parvenus à convaincre les populations de l'importance de l'hygiène; lorsque nous leur aurons persuadé qu'il dépend d'elles de diminuer leur mortalité d'un quart, en assainissant leurs villes; quand les administrations locales, sous la pression de l'opinion publique, auront pris les mesures et voté les fonds nécessaires pour accomplir cette œuvre de transformation sur toute l'étendue du territoire; alors nous pourrions attendre les épidémies de pied ferme. Elles pourront entrer sur notre sol, mais elles n'y germeront pas. Seulement il faut, pour arriver là, du temps et de l'argent. L'Angleterre prétend y être parvenue, mais elle y a mis un demi-siècle et dépensé cinq milliards. Or, les épidémies n'attendent pas et jusqu'au moment où l'hygiène aura terminé son œuvre, il ne reste aux nations que les fléaux menacent, d'autre ressource que les mesures de police sanitaire internationale.

De tout temps, les peuples ont cherché à se garantir de l'invasion des maladies exotiques. C'est contre la peste que les nations de l'Europe se sont d'abord prémunies, et les ravages effrayants qu'elle y a faits depuis le VI^e siècle jusqu'au XVIII^e ne sauraient justifier la rigueur des mesures qu'on a prises contre elles au moyen âge et même dans des temps plus rapprochés de nous. L'épidémie de Marseille de 1720, et celle de Noia en 1815, ont été les derniers exemples de ces calamités dans lesquelles la peur fait oublier tout sentiment d'humanité et porte les populations à des actes de férocité inexcusables.

La loi du 3 mars 1822 qui constitue encore la base de notre police sanitaire et l'ordonnance royale qui suivit de près la promulgation de cette loi, donnent une idée de la façon dont on comprenait encore la prophylaxie à cette époque et de la terreur que les épidémies inspiraient. La plupart des articles de la loi de 1822 ont la peine de mort pour sanction pénale; les moindres infractions sont punies des travaux forcés, ou d'amendes considérables. Cette loi avait été votée, il est vrai, sous l'impression de la peur que l'épidémie de fièvre jaune de Barcelone, survenue l'année précédente, avait causée dans notre pays; mais sa sévérité exagérée la rendait inapplicable et devint le point de départ d'une campagne qui eut pour effet d'en annuler l'application. Les médecins furent les premiers à se prononcer contre ces rigueurs inutiles, et, la doctrine médicale régnante lui venant en aide, la contagion des maladies épidémiques fut représentée comme un dangereux préjugé, les mesures de préservation comme un reste des superstitions du moyen âge. J'ai dit plus haut comment, sous l'empire de ces idées, le choléra de 1832 avait tranquillement parcouru son cours. Il sembla même leur donner raison, par la bizarrerie de sa marche. La promptitude avec laquelle elle s'effectuait, la facilité avec laquelle le fléau bondit par-dessus les cordons sanitaires et franchit les obstacles qu'on lui opposait; sa disparition rapide, et ses caprices apparents; l'immunité inexplicable d'un grand nombre de localités placées sur sa route, toutes ces anomalies habilement exploitées par les anticontagionistes leur donnèrent gain de cause. Les quarantaines et les lazarets tels qu'ils existaient alors prétaient du reste largement le flanc à toutes les critiques.

L'anarchie la plus complète régnait dans leur organisation. Chaque pays, chaque port avait ses règlements spéciaux et les appliquait à sa guise; partout la façon dont on traitait les provenances suspectes était révoltante. La malpropreté, l'insalubrité des lazarets, l'insouciance barbare avec laquelle on y entassait pêle-mêle les malades et les suspects, l'indifférence brutale qu'on montrait à leur égard excitaient partout les justes réclamations du commerce et des voyageurs.

Ce régime n'avait pas changé depuis le moyen âge. Il n'était plus compatible avec l'adoucissement des mœurs et les progrès de l'hygiène; aussi tomba-t-il en désuétude et, lorsqu'au bout d'une vingtaine d'années, on comprit la nécessité de revenir à des mesures de protection, on reconnut en même temps qu'il fallait faire subir au système sanitaire de profondes modifications. L'initiative partit de la France et l'institution des médecins sanitaires du Levant fut le premier pas fait dans la voie des

(1) Note de M. Gamaleia sur la vaccination préventive du choléra asiatique lue à l'Académie de Médecine par M. Pasteur, le 21 août 1888. (*Bulletin de l'Académie de Médecine*, t. XIX, p. 306.)

réformes rationnelles (1). Elle eut lieu en 1847 et fut suivie d'un adoucissement considérable dans le régime des quarantaines; mais de pareilles mesures ne peuvent porter leurs fruits qu'à la condition d'être acceptées par les nations qui ont la même situation géographique et les mêmes intérêts; aussi, à la suite de l'épidémie de choléra de 1849, le gouvernement français fit-il appel à toutes les puissances de l'Europe et provoqua-t-il la réunion, à Paris, d'une Conférence internationale destinée à jeter les bases d'un système sanitaire uniforme. Elle s'assembla en 1850. Douze États s'y firent représenter (2) et l'entente s'établit facilement entre les délégués. Un projet de convention et de règlement sanitaire fut adopté; mais, quand on le soumit à la ratification des gouvernements, le Portugal et la Sardaigne furent les seuls à donner leur adhésion au projet. La convention et le règlement sanitaire annexé furent mis en vigueur par le décret du 27 mai 1853 qui devint la règle des pratiques sanitaires de notre pays (3).

Une nouvelle invasion du choléra vint, quelques années après, provoquer la réunion d'une nouvelle Conférence internationale. Il avait pris cette fois la voie la plus courte pour nous arriver. A la suite du pèlerinage de la Mecque de 1861, il fut importé en Egypte par les hadjis, traversa la Méditerranée et éclata en Europe avec une promptitude qui donna à réfléchir aux puissances dissidentes. La France prit encore l'initiative de provoquer une nouvelle Conférence, qui se réunit à Constantinople en 1866. Toute l'Europe s'y fit représenter; mais elle n'aboutit pas plus que la première. En 1874, le gouvernement austro-hongrois en convoqua une troisième. Elle eut lieu à Vienne. Composée presque exclusivement de médecins, elle se montra unanime sur les questions scientifiques; mais, quand on en vint à l'application, une scission des plus tranchées s'établit au sein de la conférence. Les peuples du Midi, placés sous la menace incessante des épidémies, s'entendirent pour réclamer des mesures de préservation sérieuses, tandis que les populations du Nord, moins exposées à l'importation, ne songèrent qu'à sauvegarder les intérêts de leur commerce maritime. L'Angleterre

était à la tête de cette campagne. Elle eut 'gain de cause.

La Conférence se sépara en laissant à chaque puissance la liberté de choisir le système qui convenait le mieux à ses intérêts. La France profita de l'occasion pour reviser son organisation sanitaire. Le comité consultatif d'hygiène publique fut chargé de ce travail et nomma une commission qui elabora le *Règlement de police sanitaire maritime du 22 février 1876* (1). Ce document remarquable est surtout l'œuvre de Fauvel auquel il fait le plus grand honneur.

La Conférence de 1874, bien qu'elle n'eût pas abouti à une entente, avait cependant porté ses fruits. Les idées qui y avaient été échangées avaient provoqué la création du *Conseil supérieur de santé de l'Empire Ottoman* et du *Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte*. Tous deux avaient le caractère international; tous deux admettaient dans leur sein les représentants des nations européennes intéressées dans la question; tous deux enfin étaient dirigés contre le choléra. Celui d'Alexandrie placé sur sa nouvelle route, à la sortie du défilé maritime que forme la mer Rouge, avait des pouvoirs très étendus et une grande indépendance. Il percevait des droits sanitaires, administrait son budget et avait sous ses ordres les directeurs des offices d'Alexandrie, Rosette, Damiette, Port-Saïd, Suez, Tor, Souakim et Massouah. Il a répondu à l'attente des gouvernements qui l'avaient institué. Pendant dix-sept ans, de 1865 jusqu'en 1883, il a fait bonne garde contre les provenances de l'Extrême-Orient et contre le pèlerinage de la Mecque et il a préservé l'Europe de l'invasion du choléra; mais alors est survenue l'occupation de l'Egypte par les Anglais. Leur premier soin a été d'affranchir leur commerce des entraves que le conseil d'Alexandrie lui imposait. Depuis longtemps, ils s'efforçaient d'y combattre l'influence française; devenus les maîtres, ils s'empressèrent de l'annuler en y faisant entrer leurs créatures. Dès le commencement de 1883, il n'existait plus que de nom. Le désordre de l'administration était à son comble et les mesures sanitaires tombaient en désuétude, malgré les protestations de la France qui, pendant six mois, n'a pas cessé de prédire que ces imprudences allaient attirer le choléra en Egypte d'abord et en Europe ensuite. Pendant six mois ce cri d'alarme a retenti sur les bords du Nil, transmis par notre consul et par notre médecin sanitaire, sans parvenir à se faire écouter.

Enfin, au mois de juin 1884, nous apprîmes que

(1) Six postes furent créés en 1847. Fauvel fut envoyé à Constantinople, Burguieres à Smyrne, Prus à Alexandrie, Willemín au Caire, Suquet à Beyrouth et Amstein à Damas. On en a depuis augmenté le nombre.

(2) Les puissances suivantes furent représentées à la conférence : France, Autriche, Deux-Siciles, Espagne, États Romains, Grande-Bretagne, Grèce, Portugal, Russie, Sardaigne, Toscane, Turquie.

(3) Décret impérial portant promulgation de la convention sanitaire internationale conclue entre la France, la Sardaigne et diverses autres puissances maritimes (27 mai 1853). (*Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène public de France*, 1872, t. I, p. 6.)

(1) Voyez le texte de ce Règlement dans le *Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique*, t. V, p. 4, Paris, 1873.

toutes les mesures sanitaires avaient été supprimées à Suez, le 25 du même mois le choléra était à Damiette, le 26 à Mansourah, le 27 à Port-Saïd, le mois suivant au Caire et de là dans toute l'Égypte.

Sous l'influence de la terreur qu'inspira cette nouvelle, toutes les puissances qui ont un littoral méditerranéen s'empressèrent de fermer leurs ports et de renchérir sur la rigueur des mesures sanitaires, mais il était trop tard. Lorsque le choléra est en Égypte, l'Europe ne peut plus y échapper. Toutes les précautions n'aboutirent qu'à retarder sa venue et le 14 juin 1881, on le vit tout à coup éclater à Toulon. Ce fut le point de départ de l'épidémie qui a parcouru la France, l'Algérie, l'Italie, l'Espagne, et s'est montrée terrible dans ce dernier pays. Sur une population de 16.972.480 habitants, on a compté du 3 février au 31 décembre 1886, 338.685 cas et 119.620 décès, ce qui donne une proportion de 7 pour 1.000 pour la population tout entière et de 18 pour 1.000 si l'on ne tient compte que de la partie du territoire visitée par le fléau. Jamais le choléra n'a fait de semblables ravages en France. La plus forte mortalité n'y a jamais dépassé 3 pour 1.000. L'épidémie dont je parle n'a cessé qu'à la fin de 1887; c'est la Sicile qui a été atteinte en dernier lieu.

Depuis cette époque, nous n'avons pas cessé de réclamer la réorganisation du Conseil sanitaire d'Alexandrie et le rétablissement des mesures qui nous ont si longtemps protégés. Les nations du Midi de l'Europe font comme nous des vœux pour qu'une entente internationale s'établisse. Le roi d'Italie en a pris l'initiative il y a quatre ans et est parvenu non sans peine à réunir, au printemps de 1883, une Conférence à laquelle trente-six Etats se sont fait représenter. La France y figurait dans la personne de son ambassadeur M. Decrais et de trois médecins délégués: MM. Brouardel, Proust et J. Rochard. La première séance eut lieu le 20 mai, à la Consulta, et l'Assemblée, sur la proposition de M. Decrais, décida qu'il y avait lieu de confier l'étude des questions purement scientifiques à l'examen d'une commission technique composée des médecins et des hygiénistes désignés par leurs gouvernements. Au sein de cette commission, les trois délégués français eurent à lutter à la fois contre les tendances des peuples du Midi qui s'élevaient avec énergie contre toute réduction des quarantaines et contre les prétentions de l'Angleterre qui réclamait leur abolition complète et revendiquait, pour ses navires, le droit de passer librement et sans examen à travers la mer Rouge et le canal de Suez, qu'ils eussent ou non le choléra à leur bord. Nous sommes parvenus, à force de persévérance, à faire prévaloir des opinions conciliatrices, et nos con-

clusions ont été votées par la conférence. Elles représentaient le minimum des sacrifices qu'il faut imposer à la navigation et au commerce, pour sauvegarder la santé des populations et réaliser un progrès considérable sur les exigences du passé; mais elles maintenaient une surveillance rigoureuse dans la mer Rouge pour les provenances de l'Inde, des dispositions spéciales en vue du pèlerinage de la Mecque et continuaient à infliger la quarantaine aux navires qui avaient le choléra à leur bord (1).

Ces dernières conclusions, qui avaient été adoptées malgré l'opposition véhémement des délégués anglais, ont fait échouer la Conférence. Elle s'est séparée après avoir reçu les procès-verbaux de la commission technique, afin de laisser le temps aux représentants des différentes puissances d'en conférer avec leurs gouvernements. Dans son opinion, ce n'était qu'un ajournement et elle avait fixé le 20 novembre de la même année pour se réunir de nouveau. Depuis cette époque, il n'en a plus été question. Les choses en sont restées dans l'état où les a mises l'occupation de l'Égypte par les Anglais. Leurs navires, infectés ou non, continuent à traverser librement la mer Rouge et le canal de Suez, et l'Europe continue à vivre dans la crainte perpétuelle d'une nouvelle invasion.

Toutefois, ce n'est pas de ce côté que le fléau nous menace en ce moment. Il a repris la route qu'il avait suivie lors de ses deux premières invasions, et c'est sur sa frontière de l'est que l'Europe doit avoir aujourd'hui les yeux. En 1830, comme en 1849, le choléra nous est venu de l'Inde par la Perse et la Mésopotamie, en traversant la mer Caspienne, ou en franchissant la frontière qui sépare la Russie de la Perse, dans la direction de Tiflis. C'est encore par là que nous avons à craindre de le voir nous arriver. Depuis dix mois, il ravage la Mésopotamie. Après avoir décimé Bagdad, au mois d'août 1889, il a remonté le cours de l'Euphrate et du Tigre, gagné le golfe Persique et envahi le sud de la Perse. De là, il menace les trois mers voisines. Du côté de la Méditerranée et de la mer Noire, les communications sont si difficiles et si lentes qu'il n'y a guère de craintes à concevoir; mais le danger est beaucoup plus sérieux du côté de la mer Caspienne, en raison des communications incessantes de tous les points de son littoral, avec les ports de la Russie.

Au mois d'octobre 1889, on annonça l'apparition du choléra à Recht et cette nouvelle excita, en France, les inquiétudes les plus légitimes. Cette ville est, en effet, la clef de la situation. C'est de là

(1) Pour ces conclusions, voyez : *Protocole et procès-verbaux de la Conférence sanitaire internationale de Rome*. Rome, 1883.

que sont parties les épidémies de 1830 et de 1846 et lorsque le fléau y apparaît, la situation devient très critique pour la Russie et pour l'Europe. Heureusement ce bruit sinistre fut presque aussitôt démenti. Il en fut de même de celui qui courut au mois de janvier dernier et d'après lequel le choléra avait éclaté à Astrakan et remontait le cours du Volga, les fausses alertes ne se sont pas renouvelées. La terrible maladie n'a pas passé la frontière. On avait lieu de craindre qu'elle ne la franchît au prin-

temps et qu'elle continuât sa route vers l'Occident, comme elle l'a déjà fait deux fois ; mais ces appréhensions ne se sont pas justifiées. Le choléra sommeille en ce moment sur les bords de l'Euphrate. Il faut espérer que les chaleurs ne le réveilleront pas. La Russie a du reste pris les mesures nécessaires et la vigilance qu'elle a montrée n'a pas encore été mise en défaut.

Dr Jules Rochard,

Membre de l'Académie de Médecine.

LA « CENTRAL VALVE ENGINE » DE M. WILLANS

Cette machine est verticale. Elle a été spécialement construite en vue d'obtenir de grandes vitesses de rotation et elle trouve son application rationnelle toutes les fois qu'il s'agit de transmettre la force sans l'intermédiaire de courroies ou de câbles : par exemple, dans le cas de ventilateurs, pompes centrifuges, machines dynamo-électriques, etc.

Les machines Willans sont construites pour marcher à des vitesses variant de 300 à 700 tours par minute. Lorsqu'on prévoit une augmentation de travail, il y a avantage à s'en tenir au nombre de tours minimum, car on trouve une économie à augmenter la pression en chaudière, et à marcher à un nombre de tours relativement petit.

Ces machines n'ont pas d'enveloppe de vapeur ; en général elles sont aussi dépourvues de condenseur ; suivant les cas, on les construit à un, deux, ou trois cylindres. Les premières — les machines

monocylindriques — sont à simple effet ; la vapeur travaille sur la face supérieure du piston, tandis que la face inférieure communique avec l'atmosphère.

Quant aux compound, on ne peut pas dire que ce soient rigoureusement des machines à simple effet. Il est vrai que la vapeur ne travaille directement que sur les faces supérieures des pistons. Mais pendant la course ascendante la vapeur renfermée dans les réservoirs intermédiaires se détend, en agissant sur la face inférieure du petit piston, s'il s'agit d'une compound à deux cylindres, du petit et du moyen, s'il s'agit d'une machine à triple expansion. Chaque réservoir produit donc un travail de détente pendant la course ascendante, et dans l'é-




Fig. 1. — Machine Willans.



Fig. 2. — Distributeur de vapeur.

valuation du travail de la machine il faut tenir compte des diagrammes qui s'y rapportent.

On emploie le dispositif à deux cylindres lorsque la pression absolue en chaudière est supérieure à

6 kilogrammes. Entre $8^{\text{h}},50$ et $11^{\text{h}},20$, on a recours à la triple expansion. La machine à cause de sa grande vitesse, occupe très peu de place.

Le rapport du travail indiqué au travail mesuré au frein varie, d'après M. Willans, de 0,85 à 0,90.

La figure 1 représente une machine à triple expansion, qui, à la vitesse de 450 tours, développe 40 chevaux. La figure 3 représente le détail de la partie supérieure. Les trois pistons, sont montés sur une tige creuse R dans la paroi de laquelle on a ménagé des orifices. A l'intérieur de cette tige R se meut une tige (fig. 2) ou distributeur de vapeur, commandée par un excentrique *i*. Nous avons donc trois cylindres en flèche, se succédant par ordre de grandeur, le cylindre à haute pression au-dessus des deux autres. Sur le distributeur sont montés de petits pistons, ou soupapes cylindriques, *a, b, c, d, e, f, g*. L'excentrique n'est pas placé sur l'arbre, mais sur le bouton de la manivelle; cette disposition était nécessaire, du moment où les lumières d'admission et d'échappement étaient ménagées dans la tige du piston; ainsi le distributeur est pourvu par rapport à R d'un mouvement relatif dépendant du calage de l'excentrique *i*.

La vapeur arrivant de la chaudière traverse une soupape d'admission commandée par un régulateur centrifuge spécial, et pénètre dans la chaudière *h*.




Fig. 3. — Détail de la partie supérieure.

Supposons que le piston *S*, soit au plus haut point de sa course. La soupape *g* du distributeur ne permet pas à la vapeur de pénétrer directement à l'intérieur de la tige R. Mais elle y pénètre par les orifices 1 pour en sortir par les orifices 2, car

la soupape *f* se trouve immédiatement au-dessous de ces dernières. Ainsi la vapeur est admise dans le cylindre à haute pression.

Tandis que la tige R s'abaisse, la soupape *f* s'élève dans son mouvement relatif, et ferme peu à peu les orifices 2; la fermeture est complète lorsque le piston *S*, a parcouru les $3/4$ de sa course. Toutefois la fin de l'admission a lieu un peu auparavant; il suffit pour cela que les orifices 1 aient pénétré dans le collier de couvercle du petit cylindre. Ces colliers de couvercle des cylindres sont de véritables presse-étoupes, à garniture métallique formée d'anneaux de fonte forcés de l'extérieur vers l'intérieur.

Il est clair que le commencement de la détente dépend de la position des orifices, et que, pour une tige R donnée, il suffit, si l'on veut faire varier le degré d'admission, de soulever ou d'abaisser la garniture du collier. Ce moyen est des plus simples.

Pendant que le piston *S*, continue à descendre, la soupape *f* s'élève au dessus des orifices 2. Or la soupape *e* ferme d'une façon permanente la communication entre les orifices 3 et 4. Il s'en suit que la vapeur peut, par les orifices 2 et 3, pénétrer dans l'espace intermédiaire qui sert de premier réservoir *l*₁; et c'est ainsi que se fait l'échappement pendant la course ascendante de la tige R.

La machine pourrait se composer seulement de ces organes: il suffirait de supprimer les pistons ainsi que les soupapes correspondantes, pour avoir la machine monocylindrique à simple effet.

Mais on comprend aisément que le réservoir *l*₁ peut servir à son tour de chapelle d'admission pour le cylindre moyen. Au début de la course descendante qui va suivre, la vapeur pénétrera, par les orifices 4, à l'intérieur de la tige creuse, et elle s'en échappera par les orifices 5 pour agir sur la face supérieure du piston moyen. L'admission cessera lorsque les lumières 4 se trouveront masquées par la garniture du collier de couvercle du cylindre moyen. Puis, lorsque la tige commencera de nouveau à s'élever, la vapeur, par les lumières 5 et 6, s'échappera dans le second réservoir *l*₂. Si ce réservoir communique avec l'atmosphère, et que le troisième cylindre n'existe pas, on aura la machine compound.

Si au contraire la machine est à triple expansion, la vapeur, au troisième coup de piston, pénétrera dans le grand cylindre par les lumières 7 et 8, et lorsque la tige R s'élèvera de nouveau, elle s'échappera par les orifices 8 et 9 dans la chambre de décharge *l*₃. On voit qu'il faut trois coups de piston pour que la vapeur parvienne de la chapelle *h* à la chambre de décharge.

Notons que la pression sur le collier d'excen-

trique est toujours dirigée dans le même sens, car la vapeur qui remplit la chapelle *h* exerce constamment son action sur la soupape *g*. Pour qu'il en soit de même au bouton de manivelle, on a monté un cylindre guide où se meut un piston S. Le poids des pistons est considérable ; de plus, l'action de la vapeur sur leurs deux faces est très différente. L'énergie de ces pièces est absorbée en partie pendant la course ascendante grâce au matelas d'air comprimé en *l*₄ par le piston-guide S ; ainsi les chocs dus au mouvement alternatif sont complètement amortis. L'air pénétre




Fig. 4. — Diagrammes d'indicateur.

dans le cylindre S par les lumières 10, lorsque ce cylindre est au bas de sa course. Cet air restitue à la descente du piston le travail accumulé, sauf un certain coefficient de rendement.

Chaque cylindre est muni d'une soupape de sûreté *k*, qui s'oppose aux dégâts que l'eau condensée sous le couvercle pourrait occasionner. De même, il y a dans le cylindre-guide une sou-

pape qui se soulève quand la pression de l'air devient trop considérable ; enfin des purgeurs sont ménagés dans la chambre de décharge et dans les réservoirs.

La chambre *l*, où tourne la manivelle, reçoit, par la conduite *m*, un mélange d'huile et d'eau.

Si on voulait actionner un arbre à plusieurs manivelles, il faudrait monter sur chacune d'elles une machine identique à celle que nous venons de décrire.

La figure 4 montre les diagrammes d'indicateur relevés pendant un essai à triple détente sur les pistons et les réservoirs. Il faut compter les diagrammes des réservoirs dans l'évaluation de la puissance.




Fig. 5. — Diagrammes totalisés.

Sur la figure 5, ces diagrammes sont réunis. Suivant les abscisses on compte les volumes de la vapeur, et suivant les ordonnées, la pression exprimée en livres par pouce carré.

M. Willans fournit pour ses machines des chaudières du type locomobile, avec tubes de 45 millimètres de diamètre. On les essaye à 210 kilogrammes par centimètre carré, pour fonctionner à des pressions de 10^k, 5 et 4^k, 2.

La machine Willans a été expérimentée avec le plus grand soin, et ces expériences ont donné des résultats remarquables, surtout au point de vue des grandes vitesses. Les épreuves principales ont été effectuées à la vitesse de 400 tours, bien qu'on atteigne pratiquement 500 tours par minute.

L'eau d'alimentation était pesée avant chaque essai dans une cuve, au moyen d'une balance

contrôlée. La machine commandait une dynamo, et on la faisait marcher jusqu'à ce que l'eau atteignît dans la chaudière un niveau repéré sur le tube indicateur. On commençait alors l'expérience; l'eau prise à la cuve était injectée dans la chaudière au moyen d'une pompe commandée par une chaudière spéciale. Lorsque le niveau de l'eau s'était élevé à 10 ou 12 millimètres au-dessus du repère, on cessait l'alimentation, et on continuait l'essai jusqu'au moment où l'eau était revenue à son niveau initial. Ainsi l'on mesurait exactement le poids d'eau d'alimentation; un compteur permettait de connaître le nombre de tours correspondant.

La pression en chaudière était, autant que possible, maintenue constante pendant chaque essai. De fait, les variations ont rarement atteint $0^k,140$ par centimètre carré. Le degré d'humidité de la vapeur était mesuré par la méthode calorimétrique. Enfin, les diagrammes étaient relevés au moyen de l'indicateur Crosby.

La machine Willans, sans condenseur et sans enveloppe, marchant à triple expansion avec une pression d'admission moyenne de $11^k,9$, et un degré de détente de 6,4, consommait, pour une puissance de 40 chevaux, seulement $8^k,29$ d'eau par




Fig. 6. — Diagramme relevé avec l'indicateur Richards.

cheval indiqué et par heure. C'est un résultat splendide. Il est vrai que la machine n'a pas d'en-




Fig. 7. — Diagramme relevé avec l'indicateur Crosby.

veloppe, mais chacun des cylindres est protégé contre le refroidissement à l'une de ses extrémités

par le cylindre supérieur, et la tige creuse est maintenue chaude par la vapeur qui la traverse.

Pour terminer, nous donnerons quelques détails sur l'indicateur Crosby, dont l'emploi a été rendu nécessaire à cause des grandes vitesses de la machine Willans. Cet appareil est remarquable par la légèreté de ses organes (fig. 8). Le piston est aussi mince que possible. Il porte sur son pourtour




Fig. 8. — Indicateur Crosby.

des cavités rectangulaires et sphériques, dont la calotte est dirigée vers la tige, et qui, se remplissant de vapeur pendant la marche, diminuent le frottement contre la surface intérieure du cylindre. La tige est creuse, tant pour l'alléger tout en conservant la rigidité voulue, que pour le montage des ressorts, sur lesquels nous reviendrons plus loin.

Le crayon est porté par un guidage, ressemblant à celui de Thompson, et donnant un mouvement rigoureusement perpendiculaire à la ligne atmosphérique. Toutes les parties de ce mécanisme sont en acier trempé; les articulations jouent dans des douilles du même métal.

Deux dispositions sont essentiellement différentes de celles des autres indicateurs; ce sont les ressorts faisant équilibre à la pression de la vapeur, et le mouvement de retour du tambour à papier.

Les premiers sont faits d'un seul fil d'acier (fig. 9) enroulé de manière à former un double filet.

Le haut seulement porte une tête à quatre ailettes pour être fixé au couvercle; dans le bas est brasée



Fig. 9. — Ressort de l'indicateur.

une sphère portant dans une rotule fixée au piston. Cette disposition a l'avantage, d'une part, de faire porter l'effort du ressort rigoureusement au centre du piston, de manière à éviter tout coincement de cet organe contre la surface intérieure du cylindre; et, d'autre part, de supprimer l'inertie de la tête inférieure des anciens ressorts, dont le poids s'ajoute à celui du piston.

Quant au tambour à papier, il porte, au lieu du ressort à spirale, un ressort à boudin pour le ramener à sa position primitive. Le ressort en spirale, en effet, a l'inconvénient d'exercer sur le cordeau relié à la tête du piston de la machine une tension inégale et proportionnelle à sa tension propre. Comme tout cordeau, malgré toutes les précautions, conserve une certaine élasticité, la tension n'est pas la même durant toute la course du piston, quand il est actionné par le ressort en spirale. Cet inconvénient peut occasionner des erreurs dans le tracé du diagramme. Le ressort à boudin a la propriété de conserver une tension égale pen-

dant toute la durée de la traction du cordeau. Suivant la vitesse, il peut être bandé plus ou moins au moyen d'un écrou placé au bas du tambour.

Ces deux modifications sont de la plus haute importance.

Ces détails, que nous empruntons à la communication faite par M. Walther-Meunier en 1885 au congrès des ingénieurs en chef des associations de propriétaires d'appareils à vapeur, suffisent à faire comprendre les qualités de l'indicateur Crosby, dont l'emploi est indispensable pour les machines à grande vitesse. Au point de vue pratique, ces qualités sont mises en évidence par les figures 6 et 7, où sont reproduits les diagrammes relevés avec les indicateurs Richards et Crosby sur une machine à soupapes *Sulzer*, marchant à 130 tours. On voit que les effets de l'inertie sont ici complètement annulés.

Francesco Sinigaglia,

Professeur
à l'Institut Royal de Naples.

UNE NOUVELLE CAUSE DE MOBILITÉ DE L'ÉCORCE TERRESTRE

Une des questions les plus intéressantes et aussi les plus controversées de la géologie contemporaine est assurément celle des traces d'anciens rivages maritimes, qu'on observe à diverses hauteurs sur les côtes et les fjords de la Scandinavie, de l'Écosse et, en général, des régions circumpolaires. Tantôt ce sont de véritables dépôts de plages, formés de graviers avec coquilles marines, ou des terrasses de cailloux, régulièrement entassés au débouché de quelque ancien torrent dans la mer. Tantôt il s'agit de cannelures horizontales, découpées dans la roche vive, où se révèle le séjour prolongé d'une mer qui affleurerait la côte à ce niveau, et dont la surface était exposée à se congeler fréquemment, de sorte que les alternatives de gel et de dégel, combinées avec celles de la marée, faisaient éclater la pierre en y taillant, à la longue, des incisions rectilignes, dites *Strandlinien*.

Longtemps on a essayé d'expliquer ces dépôts, qui tous datent de l'époque quaternaire, en admettant qu'alors le niveau de la mer se tenait plus haut que de nos jours; mais dans ce cas le phénomène ne devrait pas être exclusivement localisé dans les régions circumpolaires et les anciennes plages devraient se retrouver, sur nos côtes, à des hauteurs égales à celles qu'elles atteignent en Norvège. Il n'en est rien; les traces d'anciens

rivages cessent complètement au sud avec la mer du Nord et, de plus, elles occupent des niveaux d'autant moins élevés qu'on s'éloigne davantage du pôle. Ce n'est qu'en Scandinavie qu'on les voit à des hauteurs de cent et même de deux cents mètres. Cette loi n'est pas moins manifeste en Amérique, où les traces d'anciens rivages, visibles à quinze mètres d'altitude sur la côte atlantique au voisinage de New-Haven, s'observent à trente mètres près de Boston, à soixante-cinq mètres sur la côte de l'État du Maine entre Portland et Mont-Désert, à cent cinq ou cent vingt mètres sur les bords du lac Champlain, à cent cinquante mètres aux environs de Montréal, enfin montent jusqu'à quatre cent cinquante mètres dans la baie d'Hudson et le Groënland.

Puisque les traces de rivages s'abaissent ainsi d'une manière continue depuis les régions circumpolaires jusqu'aux latitudes tempérées, il semble impossible d'attribuer le fait à un changement survenu dans l'équilibre même de la mer, car il est évident que ce changement se fût fait sentir dans la même mesure à New-Haven et au Canada. Il paraît donc nécessaire de faire intervenir un mouvement propre du sol et d'admettre que, dans ces parages, l'écorce terrestre ait subi un relèvement en masse, d'amplitude toujours croissante avec la latitude.

D'autre part, un pareil mouvement, s'accomplissant avec une telle régularité, à la fois en Europe et en Amérique, réclame une cause adéquate, qu'il est bien difficile d'indiquer; car ce relèvement en masse ne peut, d'après son allure, être mis en rapport avec aucun phénomène orogénique concomitant. On a donc été porté à le mettre en doute, d'autant plus que, dans une même région, les niveaux des diverses terrasses marines ne sont pas toujours concordants. A la vérité, ce défaut de concordance pourrait à la rigueur s'expliquer par l'influence de cassures préexistantes, limitant certains paquets susceptibles d'obéir, moins bien ou mieux que d'autres, à l'action soulevante. Encore serait-il inexplicable que cette différence de mouvement eût toujours respecté, comme c'est le cas, l'horizontalité des terrasses. En tout cas le phénomène, dans cette hypothèse, devient très compliqué et la cause générale qu'il faut faire intervenir demeure très mystérieuse et difficile à justifier, surtout pour ceux qui, par principe ou par traditions d'école, répugnent aux soulèvements en masse.

Dans ces conditions, un savant distingué, M. A. Penck, professeur de géographie à l'Université de Vienne, avait imaginé, vers 1883 (1), de recourir à une explication, assurément imprévue et ingénieuse, qui, nous l'avouons, nous a semblé pendant quelque temps propre à donner la véritable clef du phénomène. M. Penck faisait observer qu'il existe partout la relation la plus étroite entre le développement des traces d'anciens rivages et celui des glaciers quaternaires, tels qu'on peut les reconstituer sans le moindre doute à l'aide des moraines, des blocs erratiques et des surfaces polies ou moutonnées. Plus le régime glaciaire a été autrefois intense dans les latitudes élevées, plus les terrasses marines sont abondantes en même temps qu'elles montent davantage au-dessus du niveau de la mer. En Europe, par exemple, les plus hautes s'observent en Scandinavie, non dans les parties tout à fait septentrionales, mais bien sous les parallèles de 60 à 63 degrés, c'est-à-dire juste au voisinage de la région du maximum de relief. Cette région est le centre de l'ancien glacier qui couvrait autrefois toute la contrée, et dont la place est encore marquée par les champs de neiges et de glaces les plus vastes que le pays ait conservés. En Amérique comme en Europe, on peut dire que l'amplitude du phénomène des terrasses est absolument proportionnelle à celle des anciens glaciers,

si bien que, les deux ordres de faits étant rigoureusement concomitants, il est impossible de ne pas reconnaître entre eux une relation de cause à effet.

Comment cette relation doit-elle être formulée? Quelques-uns ont pensé à faire intervenir, comme cause de dépression, le poids des énormes masses de glace qui, à de certains moments, étaient superposés au sol des pays du nord. Ils ont admis que ce poids pouvait suffire pour déprimer la croûte terrestre sous-jacente et que celle-ci, se relevant ensuite, à mesure que disparaissait la charge additionnelle des glaces quaternaires, aurait ainsi chassé la mer du territoire envahi à la faveur de la dépression antérieure. Mais une telle hypothèse exige, de la part de l'écorce solide, une flexibilité qu'il est bien difficile de lui concéder. Si mince qu'on suppose cette croûte, c'est par plusieurs dizaines de kilomètres que doit se compter son épaisseur et dès lors l'addition de quelques centaines, voire de quelques milliers de mètres de glaces, ne peut pas en affecter sensiblement l'équilibre. De plus, voudrait-on même admettre la possibilité de cette action, que la solidarité des diverses parties de l'écorce ne permettrait pas au phénomène de se localiser étroitement, comme il le fait, dans les lieux autrefois occupés par les glaces, sans s'étendre *le moins du monde* sur les pays immédiatement voisins, que les glaciers ne recouvriraient pas.

C'est pourquoi M. Penck a cherché une autre cause, et il a cru la trouver dans l'attraction exercée par les glaces sur les masses d'eau avoisinantes. On sait qu'à la surface du globe, tout élément du relief exerce sur les objets environnants, par exemple sur le fil à plomb, une attraction propre, indépendante de l'action générale de la terre. Il en résulte, quand le relief est suffisamment brusque, une déviation plus ou moins sensible de la verticale. Dès lors la surface des eaux tranquilles, toujours perpendiculaire à la direction du fil à plomb, en doit être affectée et ainsi il est certain qu'au voisinage de côtes abruptes, précédant un massif montagneux, la mer doit être élevée par attraction d'une certaine quantité. A en croire plusieurs savants allemands, notamment M. Ph. Fischer, il est des parages où ce relèvement pourrait dépasser plusieurs centaines de mètres.

Mais ce qu'une ligne de relief produit, une masse de glaces, qui vient à se superposer au sol, le produit aussi, avec cette seule différence que la glace, à cause de sa moindre densité, a besoin d'être plus épaisse pour déterminer le même effet d'attraction qu'une masse égale de terre ferme. On entrevoit donc clairement, dans l'existence des grands gla-

(1) *Swankungen des Meeresspiegels; Jahrbuch der geograph. Gesellschaft in München*, VII. — Voir aussi notre conférence du 1^{er} mars 1886, sur le niveau de la mer, dans le *Bulletin de la Société géologique de France*, 3^e série, XIV, 368.

ciers quaternaires, une cause de relèvement du niveau des mers voisines, cause qui a cessé avec la disparition des glaces et on s'explique ainsi sans peine cette proportionnalité que l'expérience révèle entre les deux ordres de faits.

Tandis que M. Penck arrivait à cette idée en Allemagne, un géologue américain, M. Warren Upham, était conduit à une conclusion tout à fait semblable par l'étude de la vallée de la Rivière Rouge du nord, dans l'Etat de Minnesota. A la fin de l'époque quaternaire, cette vallée était occupée par une nappe d'eau, qui s'étendait dans le Canada jusqu'au lac Winnipeg, sur environ mille kilomètres de longueur. Au moment de sa plus grande extension, cette nappe lacustre (que les géologues des États-Unis ont désignée sous le nom de Lac Agassiz, en mémoire du grand savant qui a tant contribué à édifier la théorie glaciaire) avait une profondeur variable entre 60 et 180 mètres. Sa disparition n'a pas été régulièrement progressive; mais l'abaissement du plan d'eau a eu lieu par saccades et, à trois reprises différentes, le niveau de la surface est demeuré stable assez longtemps pour permettre la formation de terrasses continues de sables et de graviers littoraux. On a pu suivre ces terrasses presque sans interruption, sur près de 230 kilomètres.

Or c'est une chose remarquable que ces trois terrasses, témoins des étapes successives de l'assèchement du lac, ne soient pas horizontales et que, de plus, leurs distances mutuelles, comptées suivant un plan vertical, aillent en croissant vers le nord.

Pour expliquer ce phénomène, M. Warren Upham a songé à invoquer l'action attractive exercée par le front de l'immense masse de glaces qui formait alors, au nord du Minnesota, une barrière contre laquelle venaient s'arrêter les eaux venant du sud. Il est évident, d'une part, que l'attraction devait être d'autant plus forte qu'on était plus près de la barrière, ce qui expliquerait le relèvement progressif des terrasses, d'autre part qu'elle diminuait d'intensité à mesure que décroissait l'épaisseur de la calotte glaciaire, ce qui semble bien justifier la moindre inclinaison des terrasses inférieures, comparée à la pente de la plus élevée des trois.

Ces déductions paraissaient si satisfaisantes; rapprochées de celles de M. Penck, elles donnaient, semble-t-il, une explication, si claire et si simple, de l'allure affectée par les terrasses quaternaires, que nous n'avions pas hésité à les proposer à l'adhésion de nos collègues de la Société géologique de France (1). Mais depuis lors, un membre distingué

de l'Institut géodésique de Berlin, M. Erich de Drygalski, a fait paraître une note importante (1), où, avec le secours de l'analyse mathématique, la question de la déformation des mers par attraction était envisagée sous un jour nouveau. L'auteur y prouvait, à l'aide de calculs que personne n'a démentis, qu'on avait beaucoup exagéré l'action attractive des lignes de relief, qu'en particulier les faits observés en Amérique ne pourraient être expliqués que par l'hypothèse d'une calotte glaciaire ayant au moins *neuf mille mètres* d'épaisseur; qu'il en faudrait à peu près autant pour rendre compte de l'altitude des terrasses en Ecosse et en Scandinavie; en un mot que l'attraction glaciaire, bien que réelle, était complètement insuffisante pour justifier les surélévations aujourd'hui constatées.

D'un autre côté, le fait de l'étroite relation qui unit les terrasses et les anciens glaciers n'en subsiste pas moins dans toute sa force, impliquant toujours le même rapport de causalité. Seulement il est clair que ce rapport demande à recevoir une autre expression.

En réfléchissant à cette difficulté, M. de Drygalski (2) a eu tout récemment l'heureuse idée de faire intervenir une circonstance qui, jusqu'alors, était demeurée complètement inaperçue; nous voulons parler des changements qui ne peuvent manquer de s'accomplir dans l'état thermique du sol d'une région, suivant qu'elle est ou qu'elle n'est pas recouverte par les glaces.

En effet supposons deux corps en possession de la même provision de chaleur, mais dont l'un rayonne librement dans un espace à la température de zéro, tandis que l'autre est recouvert d'une enveloppe de glace, suffisante pour ne pouvoir fondre entièrement. Les lois connues de la physique ne laissent aucun doute sur ce qui va se passer. Il se fera, dans le premier corps, un vif échange de chaleur au profit du dehors, et la surface de ce corps sera constamment à une température plus élevée que le milieu ambiant. C'est ce que savent bien, d'ailleurs, les météorologistes, qui toujours remarquent que la température d'un sol est supérieure à la moyenne de l'air environnant. Au contraire, le corps recouvert de glace aura sa surface constamment maintenue à zéro; mais, si le froid extérieur devient plus intense, il pourra arriver que cette température de zéro pénètre, dans l'intérieur du sol, jusqu'à une certaine profondeur.

Dès lors, qu'une région primitivement couverte de glaces vienne un jour à être débarrassée de ce manteau; le rayonnement interrompu va se réta-

(1) *Bulletin de la Soc. géol. de France*, 3^e série, XIV, p. p. 368, 524.

(1) *Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*, 1887.

(2) *Bewegungen der Kontinente zur Eiszeit*, Berlin, 1839.

blir, et les couches superficielles du sol, longtemps maintenues à zéro, vont se réchauffer d'autant plus qu'en général il régnera, dans l'air ambiant, une température moyenne sensiblement supérieure à celle de la fusion de la glace. C'est ainsi, par exemple, que l'ancien centre de diffusion des glaces, en Scandinavie, occupe une contrée où passe aujourd'hui l'isotherme de *six degrés*.

Or tout corps qui se réchauffe se dilate du même coup. Il faudra donc de toute nécessité que la région débarrassée de glaces occupe un volume plus considérable, et comme elle n'en peut conquérir que sur l'atmosphère, elle subira un *gonflement*, nul aux points où cessait autrefois la nappe glaciaire, et atteignant son maximum là où cette nappe avait sa plus grande épaisseur. Au contraire, un pays que les glaces viendraient à envahir devrait se contracter, ce qui entraînerait une diminution de son altitude et, par suite, un empiétement de la mer sur sa surface. On comprend ainsi sans peine que la mer, au moment du grand développement des glaces, ait occupé, relativement à la terre ferme, un niveau plus élevé qu'aujourd'hui, et qu'ensuite le gonflement progressif de la région, débarrassée de son manteau glaciaire, ait chassé les eaux marines à une certaine distance, relevant les anciens cordons littoraux en proportion de la dilatation survenue.

Dira-t-on qu'il s'agit d'un mouvement, réel à coup sûr, mais insignifiant en valeur absolue ? À cela M. de Drygalski oppose une réponse qui nous semble péremptoire. Il rappelle d'abord que le coefficient de dilatation linéaire du verre, qui peut servir d'exemple pour les matières rocheuses, est, pour un seul degré centigrade, de 81 à 84 millièmes de la longueur initiale. Cela posé, revenons à ces anciennes plages américaines qui, depuis la côte de New-Haven jusqu'à Montréal, se relèvent de 150 mètres pour une distance totale de 504 kilomètres. Si nous imaginons qu'un arc linéaire de longueur double, soit de 1008 kilomètres, s'allonge seulement de 4 mètres, c'est-à-dire de *quatre millièmes* de sa longueur initiale, cet arc devra prendre au milieu une flèche de *cent cinquante mètres*, c'est-à-dire précisément la surélévation constatée ; car il est aisé de s'assurer que, dans un triangle rectangle où les côtés de l'angle droit ont respectivement 504.000 et 150 mètres, l'hypoténuse est longue de 504.002 mètres. En résumé, une dilatation linéaire *vingt fois plus petite que celle du verre pour un degré* suffirait à expliquer la surélévation des plages canadiennes.

Assurément ce calcul ne peut prétendre à une absolue rigueur ; car il s'agit, dans l'espèce, non de l'allongement d'un arc superficiel, mais de la dilatation cubique d'un massif de terre-ferme, qui

subit un certain gonflement en masse. Néanmoins, il nous semble résulter très clairement de ces considérations que la surélévation observée est assurément *du même ordre* que celle à laquelle doit donner lieu le changement d'état thermique.

Nous remarquerons aussi que cette explication rend très bien compte d'un fait particulier aux terrasses marines, et que tous les observateurs, sans excepter M. Penck, ont été forcés de reconnaître : c'est que ces terrasses se sont produites, non à l'époque de la plus grande extension glaciaire, mais vers le milieu de la période de retraite des glaciers. Il ne suffirait pas, pour se tirer de cette difficulté, de prétendre que, la mer du Nord se trouvant supprimée de fait par la jonction qui s'opérait entre les mers de glace de l'Ecosse et celles de la Scandinavie, les terrasses ne pouvaient se former qu'après la reconstitution de cette mer. À ce moment il est certain que l'épaisseur de la masse altitante avait assez diminué pour être moins que jamais capable d'amener, dans le niveau de la mer, une surélévation de 200 mètres. Au contraire, la chose se concilie sans peine avec l'hypothèse d'une intumescence par dilatation ; elle atteste seulement que l'immersion de la contrée, par suite de l'invasion des glaces, avait dû être encore plus considérable, puisque même au milieu de la phase de recul des glaciers, la mer conservait encore un niveau supérieur de 200 mètres à ce qu'il est aujourd'hui.

Enfin un autre fait, également constaté par M. Penck, trouve dans cet ordre d'idées sa complète justification. Le savant professeur de Vienne, en étudiant les vicissitudes du régime glaciaire dans les massifs alpins, a démontré que toute phase d'avancement des glaciers avait eu pour corollaire une diminution de l'activité des cours d'eau, dont les vallées s'étaient en partie comblées, tandis qu'aux phases inter-glaciaires correspondaient des périodes d'érosion, pendant lesquelles les fleuves avaient remanié leurs alluvions. M. Penck y voyait la preuve que le niveau de la mer, qui règle la chute disponible, s'était relevé dans le premier cas, abaissé dans le second et cela par suite de l'inégale attraction du massif pourvu ou débarrassé de glaces. Mais rien ne se concilie plus facilement, à nos yeux, avec l'hypothèse thermique, qui comporte des dilatations et des contractions successives. Pendant les phases de progrès des glaces, le massif montagneux devait se contracter. Donc sa pente diminuait et comme c'est elle qui règle l'activité des cours d'eau, celle-ci ne pouvait manquer de subir une diminution correspondante. Au contraire, le gonflement qui suivait la disparition des glaces, rétablissait la pente générale

primitive, et par conséquent ressuscitait l'érosion endormie.

En résumé, il nous semble qu'il n'est plus besoin de chercher, ni des mouvements plus ou moins compliqués et difficilement explicables du sol, ni des effets d'attraction dus aux glaces quaternaires. L'intumescence d'une région abandonnée par les glaces devient la cause principale du phénomène ; et quelques causes accessoires qu'on y puisse associer (l'attraction, réduite à de justes proportions, sera certainement du nombre), le mystère des anciennes terrasses marines nous semble désormais éclairci. Il est réduit, dans ses traits généraux, à n'être qu'une simple conséquence de la reprise du rayonnement, longtemps empêché par la présence d'une nappe de glace à température invariable.

Ainsi, en dehors des mouvements orogéniques, dus au plissement et à la compression latérale de l'écorce terrestre, il existe pour cette écorce une autre cause de mobilité, qui réside dans les changements que subit l'état calorifique de la surface. Mais ces changements se produisent ailleurs que dans les régions soumises au régime glaciaire et M. de Drygalski a parfaitement entrevu l'application qu'on en peut faire aux alternatives d'émersion et d'immersion par lesquelles certaines contrées ont si souvent passé dans les temps géologiques.

Si une nappe océanique suffisamment épaisse ne joue pas identiquement le même rôle qu'une couverture de glace à température invariable, il n'en est pas moins vrai qu'elle a pour effet de placer le fond qui la supporte dans des conditions calorifiques tout autres que les régions continentales du voisinage. Lors donc que, par suite de mouvements orogéniques qui changent la disposition des bassins, la mer abandonne les parages qu'elle occupait antérieurement, l'effet thermique, consécutif de cette émigration, doit entraîner un changement d'état du sol, capable de provoquer des mouvements de faible amplitude, dont l'effet viendra s'ajouter à celui du mouvement principal. L'histoire géologique enregistre assez de petites oscillations du niveau de la mer, dans un bassin déterminé, pour que cette considération, qui tend à en expliquer quelques-unes, demande à n'être pas perdue de vue. Elle s'applique d'ailleurs, non seulement aux pays abandonnés ou reconquis par la mer, mais encore à tous ceux dont la surface subit des changements calorifiques notables.

Enfin nous remarquerons, toujours avec M. de Drygalski, que le même ordre de considérations rend compte du fait, signalé par M. Faye et divers autres observateurs, relativement à un excès d'attraction qui se fait sentir sur les aires océaniques et que mettent en évidence les oscillations du pen-

dule. M. Faye attribuait cet excès à ce que l'écorce devait être plus épaisse sous les mers et il cherchait la cause d'un tel surcroît dans le contact prolongé de l'eau froide qui tapisse le fond des océans. A ses yeux, la chaleur constamment enlevée à la croûte par les mers froides qui la baignent avait dû faciliter, sous les mers, le progrès de la consolidation du noyau liquide.

A l'époque où ces considérations furent développées par l'éminent astronome, nous avions cru devoir en combattre l'application, parce qu'il nous semblait impossible qu'une action réfrigérante, localisée au sommet d'une écorce de cinquante ou soixante kilomètres de puissance, fût susceptible de se faire sentir de proche en proche jusqu'à la base. Mais nous devons reconnaître que la question change complètement de face, si au lieu d'invoquer un accroissement d'épaisseur, on se borne à parler du *surcroît de densité* que doit produire la contraction par refroidissement des roches. Il est clair en effet que le fond des grands océans, où, grâce à l'afflux des eaux polaires, se maintient sans cesse une température voisine de zéro, est dans des conditions peu différentes de celles qui caractérisent les contrées glaciaires. La surface de la croûte solide y est donc plus froide et, par conséquent, plus contractée qu'ailleurs, d'où résulte nécessairement une densité plus forte. C'est justement le fait constaté par M. Faye, sans qu'il soit besoin, pour expliquer l'excès d'attraction, de recourir à une dépression du niveau des mers, qui rapprocherait leur surface du centre attirant.

Du reste, notre but ne saurait être ici de soumettre la thèse de M. de Drygalski à une discussion approfondie. Nous avons seulement voulu la faire connaître aux savants français, afin de mettre en lumière tout ce qu'il y a d'original, de nouveau et en même temps de simple, dans cette manière si naturelle de concevoir le phénomène des anciens rivages, phénomène demeuré bien problématique, et sur lequel, en particulier, la sagacité de M. Suess s'est encore récemment exercée sans résultat (1).

Nous n'ajouterons qu'un mot, pour indiquer une heureuse application qu'il semble légitime de faire de cette théorie. Tout le monde sait que les contrées circumpolaires ont seules le privilège des *ffjords*, c'est-à-dire des découpures longues et étroites, par lesquelles la mer pénètre dans le cœur d'un massif montagneux, en conservant des profondeurs qu'il est absolument impossible d'attribuer à l'érosion marine. En toute hypothèse, les *ffjords* sont certainement d'anciennes vallées terrestres originellement creusées à l'air libre et que la mer

(1) V. *Antlitz der Erde*, 3^e fascicule.

a envahies à la suite d'un changement survenu dans l'altitude de la contrée. Or, ce fait s'explique à merveille, si l'on admet que, formées à une époque où la température du pays était beaucoup plus élémente, les vallées des fjords aient été ultérieurement noyées sous les glaces, ce qui d'ailleurs ne peut faire aucun doute, vu l'existence des moraines et des roches polies. A ce moment le refroidissement du pays par contraction l'a fait plonger sous les eaux marines et les vallées ont été noyées sous plusieurs centaines de mètres d'eau. Puis les glaces se sont retirées, mais seulement en partie; car il est évident que le régime actuel, par exemple dans le massif scandinave, est plus sévère que celui qui a précédé l'établissement des grands glaciers; et voilà comment l'eau des fjords recouvre encore aujourd'hui une partie des versants sur lesquels devait ruisseler librement l'eau des pluies

antéquatennaires. Si (ce qui semble peu probable les conditions thermiques des temps pliocènes étaient destinées à réparer quelque jour, il est à croire qu'avec l'évanouissement des glaces scandinaves, on verrait se produire un gonflement du sol, qui peut-être assècherait complètement le fond des fjords actuels.

Mais arrêtons-nous ici. La géologie a bien assez à faire d'expliquer le passé, sans qu'il faille risquer des prévisions d'avenir et, pour la satisfaction de hasarder une prophétie, nous nous reprocherions de compromettre le crédit d'une doctrine qu'il nous plaît tout spécialement de signaler aux géologues, comme l'une des conceptions les plus ingénieuses et les plus originales qui aient vu le jour dans ces derniers temps.

A. de Lapparent.

LES NOUVELLES EXPÉRIENCES DE M. O. LODGE SUR LES RADIATIONS ÉLECTRIQUES

Le professeur O. Lodge continue ses recherches (1) sur les ondulations électriques et perfectionne chaque jour ses dispositions expérimentales, décrites dans notre numéro du 28 février dernier (2). L'excitateur, qui produit dans l'espace la vibration électromagnétique, était trop compliqué; il le simplifie en employant comme source vibrante un corps de forme géométrique définie, une sphère, un ellipsoïde, deux sphères réunies par un conducteur transversal non interrompu. Le conducteur, une sphère par exemple, est placé entre les boutons de deux bouteilles de Leyde, réunis eux-mêmes aux pôles d'une forte bobine de Rhumkorff. Des étincelles éclatent entre la sphère et les bouteilles, elles chargent et déchargent alternativement ce conducteur; des oscillations se produisent qui excitent des ondulations se propageant tout à l'entour. Suivant les cas, les bouteilles sont diversement disposées: les armatures extérieures peuvent être réunies, ou bien, on peut, au contraire, les laisser isolées. Le résonnateur est constitué par un corps conducteur, de forme identique à l'excitateur réuni au sol, et dont on tire des étincelles par la pointe d'un canif tenu à la main.

Au lieu d'une seule sphère, on peut prendre une

rangée de sphères disposées comme l'indique la figure (fig. 1); une série d'étincelles éclatent et les ondulations apparaissent. Dans les comptes rendus de la Société mathématique de Londres, le profes-




Fig. 1. — Disposition des sphères employées par M. Lodge pour produire la résonance électrique.

seur J. J. Thomson a traité analytiquement le problème des oscillations électriques provenant d'une sphère parfaitement conductrice; il établit que la valeur de la longueur d'onde correspondante est un peu plus faible qu'une fois et demi la longueur du diamètre.

(1) Voyez le journal anglais *Nature* du 20 mars, p. 162.

(2) Voyez la *Revue*, p. 127.

M. Lodge emploie des sphères de 12 centimètres de diamètre. Si l'on admet que dans l'ensemble des vibrations produites, l'excitateur rend prédominantes ses propres vibrations, on voit que l'on obtiendra par ce procédé des oscillations électriques de faible période (17 centimètres au plus comme longueur d'onde); ce calcul soulève, il est vrai, de nombreuses difficultés; la Revue (1) les a signalées, nous n'y insisterons pas; avouons toutefois que les dispositions adoptées par M. Lodge ne semblent pas particulièrement propres à les écarter.

On peut diminuer le diamètre des sphères excitatrices, les étincelles resteront encore visibles dans le résonnateur. Cette rangée de sphères isolées produisant ainsi des radiations électromagnétiques sous l'influence de la décharge d'une bobine, présente de grandes analogies avec les molécules d'une substance phosphorescente donnant, sous la même influence naissance à des vibrations lumineuses.




Fig. 2. — Coupe transversale d'un œil de mouton (portion périphérique de la rétine), d'après Klein et Variot.

a, couche interne de la sclérotique; — b, lamelles suprachoroidiennes (pigmentées); — c, d, couches de la choroïde; — e, épithélium pigmenté de la rétine; — f, couche des bâtonnets; — g, les cônes; — h, couche externe à noyaux; — i, couche granulée externe; — j, couche interne à noyaux; — k, couche granulée interne; — l, couche des cellules ganglionnaires, avec les fibres radiales ou fibres de Müller entre les cellules; — m, la couche des fibres nerveuses.

que des fibres nerveuses capables de trans-

mettre ces impressions à quelque centre cérébral.

Ces sphères, ces cylindres sont analogues aux bâtonnets et aux cônes que les naturalistes nous montrent dans la rétine (fig. 2); on peut imaginer que les bâtonnets et les cônes sont eux-mêmes des résonnateurs, sensibles aux vibrations de courte période qui constituent les radiations lumineuses; les physiologistes ont mesuré les dimensions de ces éléments: elles sont de l'ordre de grandeur qui correspondrait à de tels résonnateurs. La rétine serait donc constituée par des fibres (fig. 3), jouant pour la vision le rôle que les fibres de Corti jouent pour l'audition; l'excitation se transmettrait ensuite par un mécanisme encore inconnu.

On pourrait objecter à cette manière de voir que les éléments rétinien ne sont pas des conducteurs: mais leur indice de réfraction est très élevé et la théorie prévoit que les corps fortement réfringents doivent se comporter comme des conducteurs; d'ailleurs tout le monde admet aujourd'hui depuis Boll et Küss que la rétine est le siège de phénomènes chimiques; on peut donc considérer les bâtonnets et les cônes comme des conducteurs électrolytiques et M. Lodge trouve avec de tels conducteurs des résultats identiques à ceux qu'il rencontre avec des conducteurs métalliques.

Ces hypothèses sont fort séduisantes et vraiment suggestives; mais, disons-le bien, ce sont de pures hypothèses qui auraient grand besoin d'être appuyées par quelques expériences concluantes; malgré tout elles ne sont pas inutiles; elles devancent un peu les faits, mais elles guident l'expérience; les bons esprits sont prudents, ils ne se laissent pas égarer par leur guide; l'erreur des autres importe peu.



Fig. 3. — Diagramme des éléments rétinien (d'après Klein et Variot).

2, fibres nerveuses; — 3, cellules ganglionnaires; — 4, couche granulée interne; — 5, couche interne à noyaux; — 6, couche granulée externe; — 7, couche externe à noyaux; — 8, la membrane limitante externe; — 9, les bâtonnets et les cônes.

Lucien Poincaré.

Agrégé préparateur à la Sorbonne.

(1) Voir l'article de M. Guillaume dans le N° 3 de la Revue (30 janvier 1890) et celui de M. Brillouin dans le N° 5 (15 mars 1890).

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques.

Léauté (H) *membre de l'Institut.* — Sur une condition de bon fonctionnement des installations mécaniques comportant des transmissions par liens rigides ou flexibles. *Journal de l'Ecole Polytechnique*, 59^e cahier, 1889.

Les installations mécaniques à grande vitesse, dont l'emploi se généralise de plus en plus, donnent lieu assez fréquemment à des irrégularités de mouvement et à des chocs d'un caractère tout spécial, qui en compromettent la durée et peuvent même dans certains cas en rendre le fonctionnement impossible. Les constructeurs ont cherché à remédier à ces inconvénients en équilibrant avec soin les pièces en mouvement et en donnant à tout l'ensemble mécanique la plus grande souplesse possible, de manière à atténuer toutes les trépidations et à rendre moins destructeurs les à-coups qu'ils ne pouvaient éviter : dans ce but, ils se sont attachés principalement à supprimer les liens rigides et à les remplacer par des accouplements parfaitement élastiques. Mais les dispositions qui en résultent, pour ingénieuses qu'elles soient, sont généralement coûteuses et quelquefois d'une application délicate.

M. Léauté s'est proposé, dans un mémoire très court, mais fort important, de rechercher quelle était la cause exacte de ces phénomènes, et dans quels cas, les irrégularités de mouvement dont il vient d'être question étant réellement à redouter, il devenait nécessaire de recourir à des dispositions spéciales. Etudiant successivement toutes les jonctions qui peuvent devenir le siège d'ébranlements pendant la marche, il est arrivé fort habilement, par la considération de ce qu'il appelle la *caractéristique cinématique* du système considéré, à formuler deux règles très simples qui suffisent à donner la solution pratique du problème et peuvent servir de guide aux constructeurs. Le nouvel ordre d'idées dans lequel est entré M. Léauté paraît appelé à jouer un rôle fort important dans l'étude des installations mécaniques, quand il s'agit de transmissions à grande vitesse, et il nous paraît à l'avenir devoir marcher de pair avec les considérations ordinaires de résistance auxquelles on a seulement égard aujourd'hui.

BÉRARD.

Tisserand (F.), *membre de l'Institut.* — *Traité de Mécanique céleste. t. I. Perturbations des Planètes.* Paris 1889. Gauthier-Villars et fils, in-4^e, 474 pages.

Les astronomes ont accueilli avec joie le projet annoncé par M. Tisserand, il y a quelques années, de publier un nouveau *Traité de Mécanique céleste*. La Science en effet, a bénéficié, depuis Laplace, des travaux d'astronomes comme Bessel, Hansen, Delaunay, Le Verrier..., de géomètres tels que Gauss, Poisson, Jacobi, Cauchy.... Comment se reconnaître au milieu de tous les travaux accumulés ? Comment les classer et faire la part de ce qu'il y a de plus utile pour l'Astronomie ? Ce grand et difficile travail devait effrayer les courageux les plus robustes. M. Tisserand est en train de l'accomplir pour le plus grand profit de la science. Tous les astronomes lui en seront reconnaissants.

Il est dit dans la Préface que les travaux de Lagrange et de Jacobi forment la base théorique de l'ouvrage ; pour la pratique, l'auteur a jugé utile de se conformer aux méthodes éprouvées de Le Verrier, en faisant aussi une place aux méthodes de Hansen souvent appliquées

par les astronomes dans ces derniers temps. L'ouvrage est donc placé sous les meilleurs auspices, pour les astronomes aussi bien que pour les géomètres.

Le ch. I (de la loi de la gravitation universelle tirée des observations) indique les inductions qui ont conduit Newton à la loi de l'attraction entre le soleil et les planètes, entre celles-ci et leurs satellites, en particulier la terre et la lune, et de là à la loi générale. M. Tisserand observe que les comètes qui sillonnent l'espace dans tous les sens apportent un complément à la démonstration de la généralité de la loi. Enfin, il montre que les données d'observation qui nous sont fournies par les étoiles doubles, si elles ne prouvent pas en toute rigueur l'universalité de la loi de gravitation dans les différents systèmes stellaires, la rendent du moins très probable. Cette dernière question, objet de beaux travaux de MM. Bertrand, Darboux et Halphen, est destinée à devenir classique.

Les astronomes et les géomètres sont tellement habitués aujourd'hui à assimiler une planète à un point matériel que les cas où il est nécessaire de tenir compte des dimensions d'un corps céleste paraissent plutôt exceptionnels. Cela vient de ce qu'un globe a la propriété d'attirer un point extérieur comme si toute la masse était réunie au centre du globe, théorème dû à Newton et qui au jugement de M. Adams, l'illustre astronome anglais, paraît avoir éclairci les doutes qui pouvaient subsister dans l'esprit de Newton sur la loi de la gravitation encore plus que la connaissance des mesures géodésiques de Picard.

En résumé, le problème des perturbations des planètes, que nous admette la loi de la gravitation, ne paraît plus dépendre de la Analyse.

M. Tisserand établit (Ch. II à VIII) les équations différentielles du problème sous diverses formes (nous citerons la forme symétrique due à M. Radau), fait une étude complète du cas où le nombre des corps est réduit à deux, et expose magistralement les recherches de Lagrange sur le problème des trois corps. C'est une idée heureuse : le mémoire de Lagrange avait été presque oublié, et cependant il contient la meilleure part de ce qui a été trouvé depuis l'illustre auteur sur l'intégration rigoureuse du problème des trois corps.

Si les efforts pour pousser plus loin la solution du problème des trois corps n'ont pas abouti, la raison en est qu'il n'existe pas d'autres intégrales que les quatre connues depuis Clairaut. En terminant un article du *Journal des Savants* (août 1759) par ce défi : « Et maintenant intégre qui pourra », Clairaut avait deviné juste. MM. Bruns, de Leipzig, et Poincaré viennent de démontrer l'impossibilité de nouvelles intégrales, soit algébriques, soit uniformes et analytiques.

Puisqu'il n'y a pas lieu de songer à intégrer rigoureusement les équations différentielles du mouvement des planètes, même quand ces planètes se réduisent à deux, on a recours à des méthodes d'approximation répondant aux besoins de l'Astronomie ; l'une d'elles, la plus fréquemment employée, est la méthode de la variation des constantes arbitraires.

Avec le Ch. IX commence donc l'exposition des méthodes d'approximation. Chemin faisant, l'auteur explique avec précision plusieurs termes usités dans la pratique des calculs et sur lesquels il importe que l'on soit fixé. Quelques lecteurs feront peut-être la remarque que M. Tisserand ne se prononce pas sur les réserves faites dans ces dernières années relativement à la convergence des séries employées en Mécanique céleste et pourront s'en étonner. Après avoir partagé cet étonnement, nous croyons que M. Tisserand a pris un bon

parti : la question n'est pas encore mûre, et il faut attendre que les recherches si importantes de MM. Gyl-dén, Lindstedt, Poincaré aient porté leurs fruits. D'ailleurs, si les séries ne sont pas convergentes absolument, comme disent les géomètres, elles convergent dans leurs premiers termes, et par analogie avec ce qu'observe, (Laplace *Calcul des probabilités. Remarque générale sur la convergence des séries*), la divergence ne doit pas empêcher l'usage de ces séries, en n'employant que leurs premiers termes.

Avant de s'occuper de l'importante question du développement de la fonction perturbatrice, M. Tisserand consacre un certain nombre de chapitres à des recherches et à des études préliminaires. Les transcendentes de Bessel, les nombres de Cauchy, certaines formules de Hansen, la convergence des séries du mouvement elliptique, les coefficients appelés souvent coefficients de Laplace et dépendant du rapport des grands axes de la planète troublante et de la planète troublée, sont successivement passés en revue, avec indication des recherches les plus récentes.

Le développement de la fonction perturbatrice est exposé en conformité avec les travaux de Le Verrier (ch. XVIII à ch. XXII), et la découverte de Neptune (ch. XXII) sert admirablement d'illustration aux formules de Le Verrier.

Après avoir initié le lecteur aux méthodes de la Mécanique céleste et l'avoir habité aux développements et aux approximations, l'auteur juge le moment venu de dévoiler les difficultés et la beauté du problème dont la solution réclamait un travailleur de génie comme Le Verrier.

Si les chapitres précédents révèlent les qualités du géomètre, la clarté, la rigueur et l'élégance, le chapitre sur la découverte de Neptune est l'œuvre d'un astronome consommé. Ce n'était pas chose facile de faire pénétrer le lecteur dans les détails d'une discussion numérique ; on ne raisonne plus sur des symboles algébriques susceptibles de représenter les données d'une question avec une exactitude absolue, mais sur des nombres entachés des erreurs d'observation. Un géomètre pur goûterait peu ce genre de discussion ; mais ceux qui aiment à manier les nombres et à les discuter pourront peut-être deviner là leur vocation astronomique.

Les six derniers chapitres contiennent, pour une bonne part, l'exposition de recherches importantes qui appartiennent en propre à M. Tisserand. Ils fixent de la manière la plus heureuse l'état actuel de la science en ce qui concerne quelques-unes des plus hautes questions : le théorème de Poisson sur l'invariabilité des grands axes des orbites planétaires, les expressions générales des inégalités séculaires, etc...

Le nouveau Traité de Mécanique Céleste, ne tardera pas, comme le prévoyait M. Seeliger, l'un des secrétaires de la Société astronomique internationale, à se trouver entre les mains de tous les astronomes. Ce sera pour l'auteur la digne récompense de ses efforts et un honneur pour la science française.

O. CALLANDREAU.

2° Sciences physiques.

Carvalho. (E). — Influence du terme de dispersion de Briot sur les lois de la double réfraction. Thèse pour le doctorat ès sciences mathématiques présentée à la Faculté des Sciences de Paris, 1890.

Sous ce titre, M. Carvalho a présenté à la Faculté des Sciences de Paris un travail des plus intéressants ; le titre annonce bien le contenu du mémoire ; peut-être pourrait-on cependant le trouver un peu modeste, il ne fait pas immédiatement prévoir les remarquables conséquences auxquelles est amené l'auteur : c'est la seule critique que l'on puisse adresser à M. Carvalho.

Quand un rayon lumineux est polarisé, la vibration

lumineuse est rectiligne, perpendiculaire au rayon et, d'après l'expérience bien connue de Fresnel et Arago, s'effectue constamment dans le plan de polarisation P ou dans un plan perpendiculaire. Jusque-là aucune expérience n'avait permis de résoudre la question ainsi posée ; il semblait même qu'elle fût insoluble ; les deux hypothèses paraissaient expliquer également tous les phénomènes observés. Fresnel et d'autres physiciens supposent la vibration perpendiculaire à P , Neumann et Mac Cullagh admettent qu'elle est dans le plan P lui-même. L'étude de la dispersion dans un milieu biréfringent a conduit M. Carvalho à trancher le différend et à donner définitivement gain de cause à Fresnel. La démonstration est très simple. L'auteur s'appuie uniquement sur des principes qu'admettent aussi bien les partisans de Neumann que ceux de Fresnel : ne rien demander d'autre à ses adversaires qu'ils ne vous demandent eux-mêmes est assurément un moyen habile pour entraîner la conviction. Ce résultat est le point saillant du travail, mais en route M. Carvalho a rencontré de fructueux champs de recherches qu'il a parcourus avec profit ; nous ne pouvons malheureusement l'y suivre ; il est préférable de tâcher ici de donner une idée de la démonstration d'un fait aussi important ; nous chercherons surtout à dégager nettement les principes fondamentaux.

Quelque idée que l'on se fasse d'un rayon lumineux, on doit admettre que le phénomène dépend en un point et en un instant donné du temps et de la position du point ; dans l'hypothèse moléculaire, on dira que l'élongation u de la molécule vibrante dépend des coordonnées x, y, z , et du temps t ; mais cette hypothèse est simplement destinée à faciliter le langage, on pourrait la sacrifier, les résultats demeureraient identiques. Si l'on a affaire à un rayon polarisé, une seule coordonnée x reste à considérer, le phénomène dépendra d'une seule équation différentielle liant l'élongation u à x et à t . Mais cette équation n'est pas quelconque : des expériences incontestables imposent certaines conditions. Les phénomènes d'interférences exigent qu'elle soit linéaire ; le fait qu'un état permanent peut être atteint, montre que les coefficients en sont constants ; l'absence de dispersion dans le vide et l'existence de deux vitesses égales et de signes contraires entraîne cette conséquence que dans le vide l'équation se réduit à deux termes d'un même ordre pair de dérivation. M. Carvalho admet que cette équation est de la forme

$$\frac{d^2u}{dt^2} = A \frac{d^2u}{dx^2}; \text{ c'est là une hypothèse, mais elle est à coup sûr d'un ordre très général; en outre, toutes les théories optiques l'ont toujours admise. Dans un milieu où il y a dispersion, ou les radiations de différentes longueurs d'onde ne se propagent pas avec la même vitesse, il conviendra d'ajouter des termes de la}$$

forme $\frac{d^p u}{dx^p dt^p}$; si l'on cherche, en partant de là, comment varie l'indice de réfraction n , c'est-à-dire le rapport des vitesses dans le milieu et dans le vide, avec la longueur d'onde λ , on est conduit à la formule de dispersion

$$\frac{1}{n^2} = a + \sum b \lambda^{-p+2} n^{q-2}, \text{ où les exposants } p \text{ et } q$$

ont mêmes valeurs que les indices correspondants de l'équation différentielle ; or l'expérience montre d'une façon certaine, et M. Carvalho le prouve très nettement, que la formule de dispersion doit contenir un terme λ^2 , proportionnel au carré de la longueur d'onde ; dans l'équation différentielle lui correspond nécessairement un terme en u . Le terme λ^2 (terme de Briot) dépend donc de l'élongation elle-même. Considérons maintenant les deux rayons en lesquels se décompose un rayon pénétrant dans un milieu biréfringent ; dans l'hypothèse de Fresnel, la vibration ordinaire est toujours perpendiculaire à l'axe optique, quel que soit l'angle du rayon avec l'axe, tandis que la vibration extraordinaire se déplace depuis l'axe jusqu'à la posi-

tion perpendiculaire, quand l'angle du rayon avec l'axe varie de 90° à 0° . Si l'hypothèse est vraie, le coefficient c devra garder constamment une certaine valeur c_0 pour le rayon ordinaire; il devra au contraire croître depuis une valeur plus petite c_1 jusqu'à la valeur c_0 pour le rayon extraordinaire, quand l'angle avec l'axe décroît de 90° à 0° . L'hypothèse de Neumann entraîne des conséquences exactement inverses. Les mesures d'indices qu'a faites M. Carvallo à 90° , 30° et 0° de l'axe, par la méthode goniométrique ordinaire pour le spectre visible, par la méthode de M. Mouton pour les radiations calorifiques, ne laissent aucun doute : les valeurs de c sont dans l'ordre prévu par la théorie de Fresnel.

Parmi les nombreux résultats auxquels l'auteur est arrivé en passant, les plus généraux et les plus intéressants ont rapport aux méthodes d'interpolation employées dans les sciences d'observation ; il fait une étude critique très approfondie des méthodes de Cauchy et de Gauss ; par une extension donnée aux formules si avantageuses de Cauchy, il les adapte à la méthode des moindres carrés en conservant tous leurs avantages de commodité. Il donne ensuite des raisons nombreuses, les unes pratiques, les autres théoriques en faveur de la méthode de Cauchy, étendue, s'il est nécessaire, par une légère modification, au cas où les observations n'ont pas toutes la même précision.

En terminant son important travail, M. Carvallo montre comment l'étude de la dispersion permettrait de trancher une question capitale qui reste encore irrésolue, l'éther est-il incompressible ou au contraire infiniment compressible ? en d'autres termes, les vibrations sont-elles rigoureusement dans le plan de l'onde ou font-elles avec lui un très petit angle, comme le suppose par exemple la théorie de M. Sarrau ? L'auteur ne se prononce pas, mais l'habileté et l'ingéniosité dont il vient de donner la preuve parviendront sans doute un jour à résoudre le problème. Lucien POINCARÉ.

Carl Barus. — Mesure des températures élevées. *Bulletin of the United States Geological Survey*. 1 vol. de 300 pages, 1889.

Le gouvernement des Etats-Unis a fait publier depuis 1879, sous le titre de *Bulletin of Geological Survey*, un grand nombre de mémoires relatifs soit à la constitution géologique des Etats-Unis, soit à la géologie et à la paléontologie générales.

M. Carl Barus donne aujourd'hui dans ce recueil une étude sur la mesure des hautes températures qu'il présente comme une introduction à des recherches sur les constantes physiques des roches.

Après avoir rappelé les nombreuses méthodes de pyrométrie qui ont été proposées jusqu'ici, M. Barus conclut de leur étude que la meilleure de toutes est la méthode thermo-électrique. Proposée tout d'abord par Pouillet, puis par Becquerel, elle a reçu récemment des perfectionnements importants par les travaux de M. Le Châtelier qui lui a donné une forme précise et pratique. Le couple proposé par ce savant, formé de platine et de platine rhodié, permet de mesurer les températures élevées jusqu'au point de fusion du platine, avec une erreur qui ne dépasse pas 20° C. Les recherches très soignées et très étendues que M. Barus consacre à l'étude des couples thermo-électriques, à leur calibrage soit au moyen de bains de vapeur de températures connues, soit par comparaison avec le thermomètre à air à réservoir de porcelaine, confirment complètement les résultats obtenus par M. Le Châtelier, qui peuvent se résumer ainsi : Les alliages de platine subissent à haute température des modifications allotropiques analogues à celle qu'éprouve le fer vers 700° . Par suite de cette modification, la force électromotrice des couples formés avec des alliages de platine ne peut pas se représenter en fonction de la température par la formule à deux termes de Tait. Il faut, soit employer une formule à trois termes, soit prendre successivement deux formules différentes à deux termes, l'une s'appliquant aux

températures inférieures à la température de transformation, l'autre aux températures supérieures.

Dans la deuxième partie de son mémoire M. Barus propose une nouvelle méthode de pyrométrie, fondée sur la viscosité des gaz. Dans une masse gazeuse en mouvement, il se produit par suite du passage des molécules à travers des couches animées de vitesses différentes une transformation de force vive sensible en chaleur, à laquelle on a donné le nom de frottement interne des gaz. Le coefficient de frottement interne des gaz ou viscosité peut se mesurer, comme l'ont fait voir Meyer et Maxwell, soit en observant les oscillations d'un disque métallique autour d'une tige métallique qui le traverse en son centre, soit en mesurant le volume de gaz qui passe sous une pression donnée à travers un tube capillaire de dimensions données. C'est ce dernier dispositif que M. Barus a employé pour étudier l'influence de la température sur la viscosité des gaz. Il a pu démontrer et vérifier qu'entre la viscosité à 0° η_0 et la viscosité à t° on a la relation

$$\eta_t = \eta_0 (1 + \alpha t)^{\frac{2}{3}}$$

c'est-à-dire que la viscosité est proportionnelle à la puissance $\frac{2}{3}$ de la température absolue. On obtient ainsi, une nouvelle méthode pyrométrique qui permet, soit de faire des mesures absolues, soit de faire des mesures différentielles. Il suffira, dans ce cas, de comparer les vitesses d'écoulement d'un gaz à travers deux tubes capillaires, l'un froid, l'autre porté à la température que l'on veut mesurer. Georges CHARPY.

Gautier (Armand), membre de l'Institut, professeur à la Faculté de médecine, et **Mourgues, (L.)** — Les alcaloïdes de l'huile de foie de morue. Paris. G. Masson, 1890.

Ce remarquable travail a été présenté et accueilli avec intérêt à l'Académie de médecine. Il réalise un progrès certain dans nos connaissances relatives à l'action thérapeutique de l'huile de foie de morue.

L'étude commence par l'examen sommaire des diverses variétés d'huile de foie de morue. Leur mode d'obtention, leurs qualités, leurs propriétés physiques et chimiques, leur essai, sont exposés avec des détails suffisants pour en faire une monographie fort intéressante et sans longueurs.

Les auteurs exposent ensuite les méthodes employées pour isoler les principes actifs dont ils ont reconnu l'existence dans ce précieux médicament. Parmi ces principes actifs, ils signalent trois ammoniacs composés, la butylamine, l'amylamine, l'hexylamine, connues depuis longtemps déjà ; et trois nouvelles bases du même genre, une dihydrotoluidine, base liquide ; l'oselline, solide, amorphe ; et la morrhuline, constituée par un liquide huileux. Une partie de ces dernières bases se rencontre dans l'huile de foie de morue sous forme de lécitines. La dihydrotoluidine, l'oselline et la morrhuline sont également combinées à des acides dont l'un, l'acide morrhinique, a été découvert et étudié par MM. Gautier et Mourgues.

L'étude de l'action physiologique de ces divers composés est faite avec soin et permet d'interpréter justement l'action stimulante, tonique et reconstituante de l'huile de foie de morue.

La butylamine produit, chez les animaux, de la fatigue, de la stupeur, des vomissements, un certain degré de parésie : elle excite l'urination. A faible dose, elle excite la sécrétion rénale ; à haute dose, elle est, à la fois, convulsivante et paralysante ; à dose moyenne, elle plonge les animaux dans une sorte de somnolence avec paresse musculaire ; l'intelligence est conservée. Elle n'est tonique qu'à dose assez élevée.

L'amylamine est une base très active, excitant à faible dose les réflexes et la sécrétion urinaire, provoquant, à dose forte, du tremblement convulsif, puis des convulsions et la mort. L'hexylamine agit à peu près

de la même manière, mais avec une intensité beaucoup moindre.

La dihydrotoluidine est toxique à assez faible dose; elle produit une diminution notable de la sensibilité; un tremblement et des convulsions qui intéressent d'abord les muscles de la face, puis s'accroissent et se généralisent si la dose est un peu forte. On observe des périodes d'excitation très vite suivies de dépression profonde, avec insensibilité et paralysie musculaire affectant principalement les membres postérieurs.

L'oselline est faiblement active; elle détermine, à dose suffisamment élevée, de la dyspnée, de la stupeur, des convulsions et la mort.

La morhuine est l'un des principes les plus actifs de l'huile de foie de morue; c'est également l'une des bases les plus abondantes; elle forme un peu plus du tiers de la totalité des alcaloïdes de l'huile. Une cuillerée à soupe en renferme 2 milligrammes 25, qui correspondent à environ 3 milligrammes de chlorhydrate. C'est un puissant stimulant des fonctions de nutrition et de désassimilation, qui entraîne une énergique mouvement compensateur d'assimilation, comme le démontre la surexcitation de l'appétit chez les animaux soumis à son influence. Elle possède une action diurétique extrêmement accentuée et elle excite, en même temps, la diaphorèse et l'exonération intestinale. Cette base n'est toxique qu'à dose relativement élevée.

L'acide morhuïque, qui existe dans l'huile de foie de morue en proportion de plus d'un gramme par litre, possède également des propriétés diurétiques extrêmement marquées; les animaux sur lesquels on l'expérimente émettent des quantités d'urine qui correspondraient à environ 2400 centigrammes, en une demi-heure, pour un homme adulte; leur appétit est, en même temps, très vivement excité.

Les auteurs tirent de leurs longues et patientes recherches les conclusions suivantes. L'huile de foie de morue agit par ses corps gras, éminemment assimilables, grâce à leur état physique spécial (saponification partielle qui leur fait attribuer à l'action des ferments hépatiques), à leur légère acidité et à la dissolution d'une certaine quantité de produits biliaires qui en facilitent l'émulsionnement. Et, en effet, l'huile de foie de morue pure et bien préparée s'émulsionne avec la plus grande facilité lorsqu'on l'agite avec de l'eau ne tenant en dissolution que des traces d'alcalis ou de carbonates alcalins; c'est un admirable aliment gras et un *aliment protecteur* qui ne saurait être remplacé par des graisses ou des acides gras liquides, bien inférieurs au point de vue de leur digestibilité et de leur assimilation.

Par sa richesse en phosphore qui s'y trouve à l'état d'acide phosphorique et surtout d'acide phosphoglycérique dans les lécithines et d'autres combinaisons organiques, l'huile de foie de morue est un énergique réparateur qui offre, à l'économie, le phosphore sous sa forme la plus facilement et la plus spécifiquement assimilable; ce qui explique la façon dont ce médicament lutte avec efficacité contre la désassimilation du phosphore dans un grand nombre de cachexies. L'iode et le brôme, que renferment en petite quantité les huiles de foie de morue, ne sont pas non plus étrangers à son action thérapeutique; et il est noté que ces corps y existent à l'état de combinaisons organiques et non pas d'iode ou de brôme métalliques.

Mais, c'est surtout par ses alcaloïdes et son acide morhuïque que l'huile de foie de morue agit comme excitant du système nerveux, accélérant la dénutrition et provoquant une assimilation qui ressemble, pour employer une comparaison imagée, à l'élimination des anciens matériaux usés ou avariés de l'organisme et à leur remplacement par des matériaux neufs et de bonne composition. Cette réparation puissante est expliquée par l'assimilation facile et rapide des principes phosphorés et des matières grasses, ainsi que par l'action spécifique de l'iode et du brôme.

Dr Gabriel POUCHET.

3° Sciences naturelles.

Lechartier (G.). — Sur l'incinération des matières végétales. *Annales de Chimie et de Physique*, 6^e série, t. XIX, p. 421.

Le dosage des éléments minéraux que renferment les produits agricoles exige nécessairement une incinération préalable, dont l'effet est de détruire les combinaisons mixtes, de nature étherée ou autre, que ces principes contractent avec la matière organique et que les réactifs de la voie humide ne sauraient détruire entièrement (1). Or, l'action de la chaleur sur les composés du soufre et du phosphore, en présence d'un excès de carbone ou de gaz réducteurs, peut donner lieu à des pertes par volatilisation dans le dosage de ces éléments, d'où l'emploi de méthodes spéciales dans la préparation des cendres.

M. Lechartier a voulu se rendre compte, par une série d'essais systématiques, de l'importance des erreurs que l'on fait commettre en négligeant ces précautions, et il a reconnu que, dans la carbonisation pure et simple de substances végétales telles que la paille, les topinambours ou le blé, une portion importante du soufre se trouve entraînée par les gaz ou les vapeurs goudroneuses qui se dégagent au début de l'incinération; la perte atteint parfois jusqu'à un millièème du poids de la matière calcinée. Il est donc indispensable, lorsqu'on se propose de doser le soufre dans des mélanges riches en matières organiques, de comburer ces vapeurs en les faisant passer, par exemple, ainsi que le recommandent MM. Berthelot et André, sur une colonne de carbonate de soude pur chauffé au rouge sombre (*loc. cit.*).

Les mêmes produits volatils ne contiennent qu'une trace insignifiante de phosphore, et on arrive à d'excellents résultats dans le dosage de cet élément, en opérant sur des cendres préparées par incinération à l'air libre, sans précaution spéciale.

M. Lechartier conseille seulement d'arroser la matière avec un peu de lait de chaux pure avant de procéder à la calcination; les cendres deviennent ainsi moins fusibles et la masse carbonisée, plus poreuse, brûle mieux que dans les conditions ordinaires.

LÉON MAQUENNE.

Chevrel (René). — Sur l'anatomie du système nerveux grand sympathique des Elasmobranches et des Poissons osseux. *Thèse pour le Doctorat en sciences naturelles, présentée à la Faculté des Sciences de Paris.*

Le sympathique des Poissons a été étudié fréquemment, mais presque toujours d'une manière incidente, et nous n'avons guère sur ce sujet d'autre travail d'ensemble que celui de Stannius qui remonte à 1849. C'est ce qui a décidé M. R. Chevrel à reprendre cette étude. Ses recherches n'ont pas porté sur moins de 85 espèces, dont 70 pour les Poissons osseux représentant 32 familles sur les 49 que compte le traité classique de Moreau sur les Poissons de France; les 17 familles restantes sont exotiques ou composées d'animaux trop petits pour que la dissection puisse en être fructueuse.

Dans ces recherches délicates le procédé opératoire acquiert une importance capitale. Celui que M. Chevrel a eu l'heureuse fortune de trouver ne laisse rien à désirer entre des mains expérimentées; il consiste à faire agir à sec sur la région à explorer, préalablement dégagée autant que possible, une solution d'acide osmique à 1%; on recouvre d'eau et on lave dès que la colora-

(1) Berthelot et André, *Ann. Chim. Phys.*, 6^e s., t. XV, p. 119.

l'on noire menace de se généraliser. J'ai vu moi-même nombre de préparations de M. Chevreul où sur le fond blanc du tissu conjonctif se détachaient en noir intense des filets nerveux de 1/30 de millimètre, dont les ganglions se laissaient aisément distinguer par leur faible coloration bistrée. — Le cadre de cette brève analyse ne me permet pas de suivre l'auteur dans le détail des faits qu'il a patiemment accumulés. Voici seulement quelques-uns des points principaux :

Téléostéens. — Contrairement à l'opinion générale, chez tous les Poissons osseux, le sympathique se continue antérieurement jusqu'au trijumeau dont il reçoit les premières racines, et cette première portion est presque toujours logée dans un canal osseux percé dans la grande aile du sphénoïde.

Chaque cordon présente dans sa région céphalique cinq ganglions qui reçoivent leurs racines respectivement du trijumeau, du facial, du glosso-pharyngien, du pneumogastrique et du grand hypoglosse.

Dans la région abdominale, les deux cordons peuvent rester distincts, mais toujours unis par quelques anastomoses transversales, ou bien se souder en un seul dans la région postérieure (Blenniides, Lophiides, Triglides) ou même dans toute l'étendue de l'abdomen (Physostomes apodes).

Dans la région caudale, les deux cordons sont toujours distincts, unis par des anastomoses et enfermés dans le canal hamal d'où ils sortent postérieurement en se recourbant en anse pour aller se terminer dans le *plexus caudal* découvert par M. Chevreul ; il est formé essentiellement par les branches ventrales des derniers nerfs rachidiens et innerve la nageoire caudale.

Les ganglions du sympathique non seulement reçoivent leurs racines des nerfs rachidiens correspondants, mais encore leur envoient à leur tour des filets qui sont surtout développés pour les nerfs se rendant aux muscles des nageoires.

Elasmobranches. Le système sympathique des Elasmobranches est beaucoup plus réduit que celui des Téléostéens. Non-seulement les deux portions terminales, céphalique et caudale, font entièrement défaut, mais encore les ganglions de la portion abdominale sont indépendants les uns des autres et ce n'est que dans la région antérieure qu'ils sont parfois unis par de très fins filets longitudinaux dans lesquels on peut voir tout au plus le rudiment du cordon longitudinal si développé chez les Téléostéens et les autres Vertébrés.

Enfin l'auteur a étudié chez les Elasmobranches les singuliers petits corps qui pour Leydig représentent les capsules surrénales des Vertébrés supérieurs. Ces *corps suprarenaux*, au nombre de 16 à 18 de chaque côté chez la Roussette, entourent chacun une artère intercostale et sont en relation d'autre part avec la veine cardinale. D'ordinaire accolés aux ganglions sympathiques, ils en sont parfois à une certaine distance. Comme ils ne reçoivent réellement aucun filet nerveux, comme par leur structure ils sont identiques aux *long corps intermédiaires* impairs, qui n'a, lui, aucune connexion avec le système sympathique, l'auteur se refuse à admettre leur identité avec les capsules surrénales des Mammifères. Mais il hésite à conclure d'une manière absolue ; la caractéristique de son travail est, en effet, une grande prudence, parfois excessive, dans les conclusions et une absence presque complète d'interprétation que d'autres pourraient regretter à notre époque de généralisation à outrance.

Tel qu'il est, le mémoire de M. Chevreul constitue une œuvre d'une rare conscience. Poursuivi opiniâtrement pendant plusieurs années, basé sur un ensemble imposant de dissections des plus minutieuses ; c'est un excellent travail d'anatomie descriptive, un guide sûr capable d'éviter de longs tâtonnements à ceux qui voudront étudier maintenant toutes les questions ayant trait au sympathique, à sa structure, à son développement, à ses fonctions.

Georges PRUVOT.

4^e Sciences médicales.

F. Terrier. — Remarques cliniques et anatomiques sur deux tumeurs vasculaires du cuir chevelu in *Revue de chirurgie*, 1890, janvier, p. 47.

Chez le premier malade, l'*anévrisme cirsoïde* était formé non seulement par une dilatation des artères, artérioles et capillaires artériels, mais encore par la dilatation des veines, veinules et capillaires veineux ; les capillaires proprement dits prenaient aussi part à la dilatation générale. L'examen histologique fait par M. Malassez montra que tous les vaisseaux dilatés, veines ou artères, présentaient des lésions manifestes de leurs tuniques moyennes, parfois hypertrophiées, plus souvent atrophiées et remplacées par un abondant tissu conjonctif.

Chez le deuxième malade, la *tumeur cirsoïde* était sous la dépendance d'une communication artério-veineuse des plus nettes, véritable *anévrisme artério-veineux* constaté après ablation de la tumeur. Cliniquement existait au centre de la tumeur un point, dont la compression directe avec l'extrémité du doigt provoquait l'arrêt de tout battement et de tout bruit.

Aussi M. Terrier se croit-il en droit d'affirmer que les dilatations artérielles et veineuses résultent de la facile circulation artério-veineuse, soit directement (anévrisme artério-veineux), soit par les capillaires dilatés eux-mêmes (anévrisme cirsoïde vrai) ; dans les deux cas, la tumeur cirsoïde présente les mêmes caractères objectifs et fournit les mêmes symptômes. Le seul signe distinctif consiste dans l'arrêt brusque des phénomènes morbides par la compression d'un point très circonscrit de la tumeur, permettant, lorsqu'on le constate, d'affirmer l'existence d'une communication artério-veineuse directe.

D^r HARTMANN.

Roux et Nocard. — A quel moment le virus rabique apparaît-il dans la bave des animaux enragés ? *Annales de l'Institut Pasteur*, mars 1890.

Est-il nécessaire que les phénomènes graves de la rage se soient manifestés pour que la morsure d'un chien enragé soit virulente ; ou bien la salive de ce chien est-elle déjà dangereuse avant que l'accès de rage proprement dit se soit montré ? La question à résoudre revient à ceci : A quel moment le virus rabique apparaît-il dans la bave des animaux enragés ?

Pour arriver à la solution du problème, MM. Nocard et Roux ont institué un certain nombre d'expériences. Pour rendre sûrement leurs chiens enragés, les expérimentateurs injectent dans la chambre antérieure de l'œil un peu de l'émulsion du bulbe d'un animal enragé ; par cette méthode, un chien prend sûrement la rage en vingt jours au plus ; la température était prise chaque jour, et, à partir du moment où on constatait une élévation thermométrique, on recueillait la bave et on l'injectait à des cobayes et à des lapins. Dans ces conditions, on peut constater que la salive des animaux est virulente deux et trois jours avant l'apparition des symptômes de la rage.

La période qui s'étend entre le moment de l'inoculation et celui où apparaissent les symptômes rabiques présente une longueur qui semble en rapport avec le point de l'inoculation ; on peut même supposer des cas où l'animal mourra de la rage sans que la bave soit virulente, la mort survenant avant que la propagation du virus aux glandes salivaires ait pu se faire.

Du travail de MM. Nocard et Roux, il résulte qu'un chien peut présenter tous les signes extérieurs de la santé, manger, être gai et caressant comme à l'ordinaire et porter dans sa gueule le virus de la rage. Si ce chien mord ou lèche une personne, il pourra lui communiquer la maladie alors qu'il ne semble pas l'avoir lui-même.

D^r H. DUBIEF.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 21 avril 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Paul Painlevé** : Sur une transformation des équations différentielles du premier ordre. — **M. G. Fouret** : Construction du rayon de courbure de certaines classes de courbes, notamment des courbes de Lamé et des paraboles et hyperboles de divers ordres. — Dans la dernière séance, **MM. Lœwy** et **Puiseux** avaient exposé la théorie du système optique formé par un miroir plan installé devant l'objectif d'un équatorial et mobile autour d'un axe : aujourd'hui, ils étudient le système obtenu en remplaçant le miroir unique par deux surfaces réfléchissantes taillées sur un même bloc de verre en forme de prisme; ils déterminent les conditions dans lesquelles cet appareil peut commodément servir à la mesure précise des distances. — **M. G. Le Cadet** : Observations de la comète Brooks (19 mars 1890) faites à l'équatorial coudé de l'observatoire de Lyon. — **M. A. Ricco**, comparant le nombre des taches solaires en 1889 avec le nombre des taches dans les années précédentes, conclut que le minimum a été franchi à la fin de cette année; la tache de très haute latitude de mars 1890 le confirme dans cette opinion. — **M. H. Poincaré** rectifie l'analyse que Maxwell a donnée de la loi électro-dynamique de Weber, principalement en ce qui regarde les courants non fermés. — **M. Darboux** présente le tome II des « Œuvres de Fourier. »

2^{es} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. E. Bouty**, étudiant la résistance de la lame mince de mica d'un condensateur, dans le cas où les deux armatures sont en communication permanente avec les deux pôles d'une pile, a trouvé que cette résistance est infinie. — **M. J. Borgman** a étudié dans quelques conditions particulières les actions mécaniques des courants alternatifs. — **M. Léon Devaureix**, pendant six voyages consécutifs sur un même navire en fer a observé les perturbations subies par les boussoles. Elles sont attribuables à l'aimantation inégale que prennent les diverses pièces métalliques de la coque, sous l'influence des chocs et trépidations. L'écart tend vers une valeur fixe pour un navire donné. — **M. E. Renou** adresse le relevé des halos et parhélies observés au parc Saint-Maur pendant ces dix-sept dernières années. — La chaleur de formation de l'hydroxylamine n'avait pas été déterminée jusqu'ici avec une certitude satisfaisante; **MM. Berthelot** et **André** ont résolu la question en décomposant l'azotate d'hydroxylamine cristallisée en ses éléments par l'action de la chaleur; ils montrent comment la connaissance de la mécanique chimique de ce corps éclaire l'étude de ses nombreux dérivés. — **M. G. Geisenheimer** prépare le bioxyde d'iridium en chauffant dans un creuset de platine de l'iridate de potasse avec un mélange de chlorure et de bromure de potassium en proportion définie. — **M. A. Gorgeu**, étudiant l'action de l'eau oxygénée sur les oxydes du manganèse, a reconnu que cette action est très complexe; elle varie suivant le degré d'oxydation de l'oxyde et peut être oxydante, réductrice ou nulle suivant le cas. — **M. de Forcrand** a étendu aux alcools tétratomiques les recherches faites antérieurement par lui sur la combinaison des alcools avec le potassium et le sodium; il a formé l'érythrate de soude et déterminé sa chaleur de formation. — **M. A. Berg** a étudié les dérivés chlorés des amyliames.

3^{es} SCIENCES NATURELLES. — On sait que dans la fermenta-

tion alcoolique du marc interverti, avec les levures usuelles, le glucose est détruit plus rapidement que le lévulose. **MM. U. Gayon** et **E. Dubourg** ont constaté que chaque espèce de levure exerce cette sélection d'une façon plus ou moins marquée, caractéristique pour chaque espèce; ils ont trouvé quelques espèces qui font fermenter le lévulose plus rapidement que le glucose. — Les expériences de **MM. G. Linossier** et **G. Roux** leur ont montré que le champignon du muguet produit la fermentation alcoolique dans les solutions sucrées, mais cette fermentation est lente et la teneur en alcool du milieu de culture est toujours faible. De plus, on trouve une quantité notable d'al déhyde, qui résulte d'une oxydation de l'alcool déjà formé par le champignon. Les caractères de cette fermentation rapprochent le muguet des Mucorinées. — A propos de la note de **MM. Gilles** de la Tourette et **Cathelineau** sur la nutrition dans l'hystérie, **M. Bouchard** rappelle que lui-même dans son enseignement et **M. Empereur** dans son livre publié en 1875, avaient déjà signalé le ralentissement de la nutrition dans cette maladie. — **M. Stanislas Meunier** appelle l'attention sur la structure bréchiforme des météorites tombées le 1^{er} décembre 1889 à Jelica (Serbie).

M. Hermite, président, fait part à l'Académie de la mort de **M. Peligot**.

Séance du 28 avril 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Emile Picard** : Sur une classe d'équations différentielles dont l'intégrale générale est uniforme. — **M. E. Cosserat** : Observation de la comète Brooks (19 mars 1890) faite à l'Observatoire de Toulouse.

2^{es} SCIENCES PHYSIQUES. — Dans de précédentes communications, **M. Sarrau** a vérifié, en se servant de données expérimentales relatives à l'acide carbonique, une équation analogue à celles qui ont été proposées par **M. Van der Waals** et par **Clausius** pour représenter la relation entre la pression, le volume et la température absolue. Il donne aujourd'hui une nouvelle vérification de cette formule, appliquée à l'azote gazeux. En fixant par tâtonnement la valeur de constantes relatives à l'azote qui entrent dans la formule, il a obtenu une série de valeurs qui concordent avec les chiffres trouvés expérimentalement par **Regnault** et par **M. Amagat**. — Généralisant leurs travaux antérieurs, **MM. J. Macé de Lepinay** et **Ch. Fabry** exposent une théorie de la visibilité des franges d'interférence qui s'applique à tous les appareils producteurs de franges. — **M. Stoltow** a fait voir que si l'on éclaire par les radiations de l'arc voltaïque la plaque négative d'un condensateur à air, la déperdition produite entre les deux plaques un courant mesurable avec un galvanomètre sensible. En éclairant par les décharges d'une bobine de **Ruhmkorff**, **M. Edouard Branly** a vu le disque positif perdre aussi sa charge. Il avait déjà signalé le fait avec une autre disposition. — **MM. Berthelot** et **André** ont déterminé les chaleurs de formation et de combustion de divers principes azotés, dérivés de matières albuminoïdes, tels que la glycollamine, la leucine, la tyrosine, l'acide hippurique, etc. — **M. Léo Vignon** a déterminé les quantités de chaleur dégagées par l'action des acides et des alcalis caustiques sur la laine et le coton. — **M. P. Schutzenberger**, en soumettant à l'effluve dans un tube scellé des vapeurs de benzène pure et sèche, obtient un produit de condensation qui est oxygéné. Il trouve là une nouvelle preuve de la perméabilité du verre pour l'eau, l'oxygène du produit ne pouvant provenir que de l'eau des armatures à eau

acidulée. Il a obtenu les mêmes faits, en opérant sur l'acétylène. — **M. L. Amat** a étudié les phosphites et le pyrophosphite de plomb. — **M. de Forcrand** expose la suite de ses recherches sur les érythrales alcalins, et en particulier les combinaisons de l'érythrite avec les alcoolates alcalins. — **M. C. Vincent**, en faisant tomber goutte à goutte du toluène sur de l'oxyde de plomb chauffé à environ 300°, obtient une grande quantité de benzène. Aux températures plus élevées, on obtient très peu de benzène; le produit principal est la stilbène, comme l'ont montré MM. Belir et Van Dorp. — **M. A. Pagnoul** communique les résultats de ses expériences sur les variations de la quantité d'azote dans les terres nues ou cultivées. Ces expériences ont été faites dans des vases où la terre était arrosée et drainée. L'azote des récoltes et celui des eaux de drainage a été mesuré. Dans tous les cas, il y a eu de l'azote emprunté à l'air, très peu dans le cas de la terre nue; l'eau a entraîné de l'azote nitrrique, moins dans la terre cultivée que dans la terre nue; les récoltes enlevées, il reste encore pour la terre qui a été cultivée un gain considérable d'azote.

3° SCIENCES NATURELLES. — **M. Ant. Magnin** ayant observé un grand nombre de pieds d'*Anemone ranunculoides* envahis par l'*Ecidium leucospermum*, a trouvé que la plupart de ces individus étaient complètement stériles et que les autres portaient des fleurs plus ou moins avortées; il note que chez ces derniers, les étamines résistent mieux à l'atrophie que les carpelles. — **M. Ch. Deperet** décrit une tortue de terre de grande taille qu'il a découverte dans les limons rouges miocènes supérieurs du mont Léberon. Cette tortue serait l'ancêtre de la *Testudo perpinnata*. — **M. A. F. Marion** décrit sous le nom de *Gomphostrobus* un confère prototypique du Permien de Lodève: Ce *Gomphostrobus* se rattache aux Salisburieés d'où sont issus les Taxinées. — **MM. Apostoli et Laquerrière** ont étudié l'action microbicide du courant galvanique, ils ont constaté que cette action, qui est très nette, est due au dégagement d'acides et d'oxygène au pôle positif. — **M. Raymond Triper** signale l'existence de l'endocardite tuberculeuse.

M. Léauté est élu membre de la section de Mécanique.

L. LAFICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 29 avril 1890.

MM. Heckel et Germain Sée : Discussion de priorité relativement à leurs travaux sur les substances dites d'épargne en général, la caféine, la noix de kola en particulier. — **M. Bertrand** a employé avec succès le glycérolé boriqué et les lavages boriqués saturés dans le traitement local des pustules varioliques de la face. — **M. Forné** présente un travail sur la contagiosité de la lèpre, exposant que cette maladie longtemps cantonnée chez les tribus indigènes de la Nouvelle-Calédonie, a atteint la race blanche (4 cas en décembre 1889) et cite un fait indiscutable de transmission, après 4 ans d'un séjour dans une tribu atteinte de lèpre, chez un condamné libéré, belge d'origine, jusque là indemne. — **M. Lancereux** lit un rapport sur des observations de filariose dues : 1° A **M. Maurel** desquelles il résulte que la filariose peut rester longtemps à l'état latent, l'état général des sujets atteints demeurant excellent. 2° A **M. Pedro de Magalhaes** (de Rio) qui d'après un décès survenu à la suite d'une opération, antiseptiquement conduite, pour un épanchement chyleux de la tunique vaginale, attire l'attention sur la grande susceptibilité des lymphatiques envahis par la filariose et la gravité des opérations qui en résulte. — **M. Gariel** lit un rapport sur les travaux de **M. Gréhan** relatifs aux accidents dus aux produits de combustion du gaz d'éclairage. La respiration des produits de combustion totale d'un becargant ne détermine que de l'anoxémie; mais, si la combustion est incomplète, l'acétylène et l'oxyde de carbone produits détermi-

nent rapidement des accidents d'intoxication, d'où la nécessité absolue d'évacuer les produits de combustion des poêles et becs à gaz ordinaires. — **M. Ledentu** présente une tumeur du ligament tubo-ovarien, très rare, enlevée chez une femme de 23 ans, déterminée histologiquement par **M. Letulle**, cystofibrôme végétant. Guérison rapide. — **M. Périer** communique deux observations de corps étrangers des voies digestives : 1° Chez un homme de 36 ans, extraction d'une cuiller à café en ruolz arrêtée dans l'estomac : boutonnière, extraction avec des pinces, suture, guérison. 2° Chez une fillette de 10 ans, extraction d'un bouton de manchettes en os, avalé, resté fixé dans la partie supérieure de l'œsophage, empêchant la déglutition des aliments solides : œsophagotomie externe, sutures, vomissements ayant souillé la plaie, enlèvement des sutures, pansement au chloral, alimentation exclusive par lavements de peptones, guérison en 5 semaines. — **M. Polaillon** présente un cas de grossesse extra-utérine chez une femme de 26 ans, sur laquelle il pratiquait la salpingectomie pour ce qu'il croyait une salpingite; il a trouvé, libre dans la cavité péritonéale, un fœtus de 2 mois 1/2 mort depuis plusieurs mois; la trompe rompue contenait le placenta. Guérison. Certaines ovaro-salpingites simples ne seraient-elles pas causées par le développement anormal d'un œuf? — **M. J. Bæckel** (de Strasbourg) relate une observation de laparotomie pour occlusion intestinale chronique chez un homme de 30 ans. L'obstacle (dû à une torsion du mésocolon très allongé), enlevé, impossibilité (ce qui est assez fréquent), de réduire l'intestin : entérostomie de 6 centimètres qui permet l'évacuation des gaz et des matières, affaissement de l'intestin, suture intestinale, réduction de l'intestin, suture abdominale, guérison absolue en 15 jours, maintenue depuis 3 ans.

Séance du 6 mai 1890.

M. Verneuil fait une communication sur la grippe au point de vue chirurgical. Des faits observés pendant l'épidémie, il résulte : 1° que la grippe engendre des inflammations suppuratives, généralement peu graves primitivement, mais pouvant le devenir par propagation directe ou par infection purulente, devant être traitées par les moyens opératoires appropriés qui ont donné des résultats variables suivant l'état général du sujet; 2° qu'en dehors des opérations d'urgence, aucune autre opération ne doit être tentée avant rétablissement complet (dont l'époque, par suite de la longue convalescence et des rechutes fréquentes et graves, est difficile à préciser), en raison des accidents mortels observés, même pour des opérations peu graves, dans le cours de cette période; 3° que la grippe, à titre de maladie intercurrente, semble exercer une influence pyogénique sur les blessures et opérations; ce dernier point, les opinions des chirurgiens ne concordant pas, demande à être élucidé par de nouvelles observations. — **MM. Van den Corput** (Bruxelles) et **Moncorvo** (Rio) sont élus membres correspondants étrangers.

D^r DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 26 avril 1890.

M. Charrin a cherché à déterminer d'une façon précise l'influence que la vaccination du sujet exerce sur le développement du virus inoculé. Il a constaté qu'après inoculations de quantités égales de virus, cette quantité diminuait graduellement chez le sujet vacciné, tandis qu'elle augmentait indéfiniment chez le sujet non vacciné. Mais en outre, il vient de constater, en observant le bacille pyocyanique, une modification dans la qualité même du virus; en effet, quand ce bacille a passé par un organisme vacciné, il est devenu, au moins temporairement, incapable de produire de la pyocyanine dans ses cultures. — **M. Féré** a étudié la toxicité de l'urine des épileptiques; il a constaté, pour l'urine sécrétée pendant les heures précédant un accès,

une augmentation du pouvoir toxique, mais surtout du pouvoir convulsivant, l'urine diurne pouvant alors contrairement à la règle se montrer beaucoup plus convulsivante que l'urine de la nuit. Au cours de ses expériences, il a noté chez plusieurs lapins des accidents tropiques à longue échéance. — **MM. Gilles de la Tourette et Cathelineau** ont trouvé que l'hypnotisation diminue la quantité de tous les excréta urinaires en même temps que la quantité de l'urine. — **M. Georges Pouchet** signale le fait suivant : on observe des Copépodes qui continuent à vivre et à se mouvoir même avec agilité, malgré la présence dans leur organisme de parasites énormes par rapport à leur taille. — **M. Charpentier** a constaté que l'appréciation du poids soulevé par une main est influencée par l'effort que l'autre main exerce au même moment. — **M. Verdin** présente un sphymyographe à transmission perfectionné.

Séance du 3 mai 1890

M. Féré a essayé sans succès l'élongation des nerfs dans trois cas d'hémichorée. — **M. Onanoff** signale l'intérêt que présente comme moyen de diagnostic le réflexe bulbo-caverneux, c'est-à-dire la contraction brusque des muscles ischio et bulbo-caverneux produite par une excitation mécanique du gland. Il indique le procédé d'exploration de ce réflexe et ses variations en rapport avec l'état de la moelle. — **M. Jules Mascarel** a obtenu d'excellents effets dans le traitement de la paralysie faciale périphérique, en excitant par un courant faradique faible successivement les diverses branches du facial; une aiguille de platine est piquée dans la direction du trou stylo-mastoidien, l'autre électrode est piquée successivement dans les diverses régions de la face. — **M. Charpentier**, sur ses expériences relatives à la sensation du poids, construit une théorie physiologique de la sensation de l'effort. — **M. Poncet** a étudié la teneur en micro-organismes de l'eau de la source de la Grande-Grille (Vichy). La quantité de germes contenue dans l'eau recueillie à la source est de 4 à 9 par centimètre cube; l'eau conservée en bouteilles en renferme environ 1500 pour le même volume. — **M. Roger** a fait des expériences pour déterminer l'influence des paralysies vaso-motrices sur l'évolution de l'érysipèle chez le lapin. Si on arrache le ganglion cervical supérieur d'un côté, l'oreille du côté lésé paraît d'abord plus atteinte que l'autre, mais elle guérit plus vite et mieux. **M. Roger** a constaté directement que la section du sympathique accroît notablement la diapédèse; c'est donc probablement à un phagocytisme actif qu'il faut attribuer les phénomènes. — **M. Phisalix** distingue deux sortes de glandes cutanées chez la salamandre terrestre; les unes, spécifiques à réaction acide, les autres muqueuses à réaction alcaline. **M. Gilbert** est élu membre de la Société. — **L. LAPICQUE**.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 2 mai 1890.

M. Paul Janet communique les résultats de ses recherches sur l'aimantation transversale des conducteurs magnétiques (1). Un courant qui traverse un corps à trois dimensions donne naissance à un champ magnétique qui comprend aussi bien l'intérieur que l'extérieur du conducteur; si ce conducteur est magnétique, il peut s'aimanter; **M. Janet** a traité par le calcul cette question compliquée, et est arrivé à des résultats très généraux et très intéressants; dans le cas particulier des cylindres circulaires ou elliptiques, il est parvenu à résoudre complètement le problème. Il projette les spectres obtenus 1° avec un conducteur cylindrique de section circulaire; dans ce cas les lignes de force sont circulaires, aucun phénomène magnétique ne se manifeste à l'extérieur, mais si la barre est

coupée en deux par une section longitudinale, on peut mettre en évidence les extrémités libres des filets solénoïdaux; 2° avec un conducteur cylindrique de section elliptique; dans ce cas il existe une distribution superficielle du magnétisme sur le contour du cylindre. — **M. L. Poincaré** fait au nom de **M. Mathias** une communication sur la chaleur de vaporisation des gaz liquéfiés; il décrit les expériences dont la *Revue* a rendu compte dans son dernier numéro (page 245). — **LUCIEN POINCARÉ**.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séances du 28 mars et du 11 avril 1890.

M. Wladesco a retiré des produits supérieurs des esprits de bois diverses acétone parmi lesquelles la méthyléthylacétone et la méthylpropylacétone. — **M. Klobb** décrit des permanganates doubles d'ammoniaque et de divers métaux. — **M. Cloez** a constaté que l'acide oxytétrique est identique à l'acide mésoconique. — **M. F. Jean** présente un nouvel appareil, l'olféoréfractomètre qui permet de différencier les diverses huiles et graisses d'après leurs indices de réfraction. — **M. Couturier** a obtenu le dipropylène C^6H^{12} par l'action de l'acide sulfurique concentré sur la pinacone. — **M. Genvresse** a étudié des dérivés bromés et chlorés de l'éther carbacétique. — **M. Carnot** indique les détails du dosage du manganèse par précipitation au moyen de l'eau oxygénée, ainsi que de la séparation du nickel et du cobalt par le même réactif.

Séances du 25 avril et du 3 mai

M. Lespiau présente un ébullioscope permettant de déterminer les poids moléculaires d'après la méthode de **M. Raoult**. — **M. Gorgue** décrit de nouvelles expériences relatives à l'action de l'eau oxygénée sur le protoxyde de manganèse. — **M. Genvresse** a obtenu des combinaisons de l'acétylacétone avec les aldéhydes. — **M. Béal** décrit un isomère de la chloralimide. — **M. Monnet** envoie une note et des échantillons d'une nouvelle matière colorante, la cyclamine. — **M. Villon** indique un procédé pour la décoloration des tannins industriels. — **M. Ehrmann** expose des idées nouvelles sur la constitution des matières colorantes phénoliques ou quinoliques. — **M. Zune** présente un réfractomètre destiné à l'étude des corps gras. — **D^r HANRIOT**.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 24 avril

SCIENCES PHYSIQUES. — **M. W. N. Shaw** décrit un dispositif qu'il a imaginé pour étudier l'écoulement de l'air et qui est analogue au dispositif du quadrilatère de **Wheatstone** pour l'étude de l'écoulement de l'électricité. L'appareil consiste en deux boîtes pleines d'air réunies par un tube. A l'intérieur est placé un indicateur qui se compose de deux très petites aiguilles à coudre plantées parallèlement dans un morceau de moelle de sureau; les aiguilles portent de très légères plaques de talc à l'une de leurs extrémités, le tout est en équilibre sur la pointe d'une aiguille très fine et constitue ainsi un indicateur très sensible des courants d'air. Le courant d'une boîte à l'autre est produit par un brûleur à gaz; les variations de ce courant correspondent à ceux de la force électromotrice d'une batterie; l'ouverture du circuit du galvanomètre correspond à l'ouverture du tube qui réunit les deux tubes, lorsqu'aucun courant ne traverse le galvanomètre, il n'y a pas d'écoulement d'air dans ce tube, ce qu'on peut aisément constater à l'aide de l'indication décrite ci-dessus. **M. Shaw** a comparé les effets d'une ouverture circulaire et d'une ouverture rectangulaire et il a constaté que la loi de la proportionnalité des accès se vérifiait. Il a également démontré expérimentalement que l'absence d'écoulement est indépendante de la hauteur totale. — **M. Shelford Bidwell** expose les effets de la tension sur

(1) Ces recherches ont été présentées comme Thèse à la Faculté des sciences de Paris; la *Revue* donnera une analyse du mémoire de **M. Janet**.

les changements magnétiques de longueur des fils de fer, de nickel et de cobalt. En 1886, il avait communiqué à la Société quelques expériences relatives aux allongements et aux contractions magnétiques des fils de fer sous tension. (Proc. Roy. Soc. n° 243, 257). Il donne maintenant les résultats d'une série d'expériences qui ont été déterminés d'une manière continue les changements de longueur subis par un fil de fer tendu pendant que la force magnétique croissait graduellement depuis une valeur très petite jusqu'à 375 unités c. g. s. environ. Des expériences semblables ont aussi été faites sur un fil de nickel et sur une bande mince de cobalt, métaux qui n'avaient jamais été étudiés sous tension. L'auteur a constaté que la tension diminue l'allongement magnétique du fer et que si la force magnétique est plus petite, la contraction se produit sous l'influence de la tension. Dans les champs faibles la contraction magnétique du nickel est diminuée par la tension. Dans les champs de plus de 140 ou 150 unités, la contraction en est augmentée par la tension jusqu'à un point critique qui dépend de la force du champ : elle diminue pour les tensions plus fortes. La contraction magnétique du cobalt (pour les champs magnétiques jusqu'à 500 unités c. g. s. et les pressions qui vont jusqu'à 772 kg. par cent. carré) n'est pas sensiblement modifiée par la tension. — **M. C. V. Boys** expose ses recherches sur la chaleur de la lune et des étoiles. Le radio-micromètre qu'il a construit (V. pour sa description *Philosophical transactions* 1889) possède une grande supériorité sur toutes les piles thermo-électriques pour la mise en évidence et la mesure des petites quantités de chaleur ; il vient de l'utiliser pour l'étude de la chaleur de la lune et des étoiles ; il a construit pour cet usage un télescope (le miroir de verre argenté a 16 pouces d'ouverture, 67-8 pouces de foyer) disposé de telle sorte, que quelle que soit la direction dans laquelle il est pointé, le foyer des rayons émanés d'une étoile se trouve toujours à la surface réceptrice du radio-micromètre. **M. Boys** a constaté que dans le cas de la nouvelle lune, la chaleur va diminuant depuis le voisinage du bord convexe jusqu'au bord concave et que la partie sombre ne rayonne pas d'une quantité de chaleur sensible au radio-micromètre. Des résultats analogues ont été obtenus pour la lune à son premier quartier ; le maximum de chaleur se trouve sur le disque même de la lune et non sur le limbe. A la pleine lune, ce maximum est au centre ; et le côté de la lune qui a été exposé au soleil de 7 à 14 jours n'est pas plus chaud que celui qui a été seulement exposé de 0 à 7 jours. **M. Boys** n'a observé aucune déviation de l'aiguille dans les nombreuses expériences qu'il a faites sur les planètes et les étoiles ; et cependant le radio-micromètre est sensible à la flamme d'une bougie placée à 3,084 yards.

Séance du 1^{er} mai 1890.

1^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. J. Hopkinson** a étudié les propriétés magnétiques de divers alliages de nickel et de fer, dont voici la composition centésimale :

	Ni	C	Mn	S	P	Si
A....	0.97	0.42	0.58	0.03	0.04	
B....	4.7	0.22	0.23	0.014	0.03	traces
C....	4.7	0.27	0.37	0.03	6.04	
D....	22.0					
E....	24.5	0.27	0.85	0.01	0.04	0.02
F....	30.0					
G....	33.0	0.28	0.50	0.01	0.02	
H....	73.0	0.18	0.30	0.01	0.01	

Les expériences faites sur l'échantillon A à diverses températures ont montré que la force coercitive est plus considérable et le maximum d'induction plus élevé que dans le fer à peu près pur. L'échantillon B présente deux températures critiques, l'une où il cesse d'être magnétique si la température s'élève, l'autre 150° C. au-dessous de laquelle il redevient magnétique.

Entre ces deux températures, la substance peut exister à l'état magnétique ou à l'état non magnétique. L'échantillon C présente les mêmes caractères, mais à une température plus basse. L'échantillon D n'a pas été examiné en aussi grand détail, mais ses propriétés magnétiques sont analogues à celles de l'alliage E. Cet alliage qui a été étudié depuis des températures inférieures à 0° jusqu'à 589° C. peut exister à deux états qui sont stables tous deux, l'un magnétique, l'autre non magnétique. Il passe de l'état non magnétique à l'état magnétique, si la température s'abaisse un peu au-dessous de 0 ; la substance ne peut passer de l'état magnétique à l'état non magnétique que si la température s'élève à 580° C. Le passage de l'état magnétique à l'état non magnétique a lieu à basse température pour l'échantillon F, la substance a des caractères magnétiques très différents de ceux de l'échantillon E. Pour l'échantillon G les températures de changement d'état sont très voisines l'une de l'autre. La température critique de l'échantillon H est à 600° et elle est la même pour l'abaissement ou pour l'élévation.

2^o SCIENCES NATURELLES. — Le prof. **J. Burdon Sanderson** a étudié à l'aide de la photographie la durée des phénomènes qui se produisent dans le muscle pendant la période d'excitation latente. Il s'est servi pour cette étude des muscles gastrocnémiens et sartoriens de la grenouille. Les expériences faites sur ce dernier muscle ont démontré que l'intervalle entre l'excitation et le commencement de la contraction est de $\frac{1}{100}$ de seconde. On ne s'est servi du muscle gastrocnémien que pour la mesure du retard de l'excitation indirecte : l'intervalle entre l'excitation et le commencement de la contraction varie de 0,0025 à 0,0035 de seconde. Dans le muscle la réponse électrique commence à 0,004 seconde et est au maximum à environ 0,012 seconde après l'excitation le nerf étant excité à 12 mm. du muscle. Si l'on déduit le temps de la transmission le long du nerf, on voit que le temps qui s'écoule entre l'excitation et la réponse est de 0,0035 seconde. La réponse électrique est donc contemporaine de la réponse mécanique, elle ne la précède pas. — **MM. Charles A. Ballance et S. G. Shattock**, présentent une note sur des recherches expérimentales sur la pathogénie du cancer ; la méthode qu'ils emploient consiste à rechercher s'il existe dans les tumeurs malignes un micro-organisme que l'on puisse cultiver artificiellement. Les résultats sont jusqu'à présent négatifs, mais les expériences sont continuées. Il se peut cependant que le parasite n'appartienne pas au groupe des protophytes, mais à celui des protozoaires et dans ce cas on s'expliquerait aisément les difficultés de la culture artificielle. — Le Dr **A. M. Patterson** a étudié le développement du système nerveux sympathique chez les mammifères ; il a fait porter ses recherches sur des embryons de rat, de souris, de lapins, et sur des embryons humains. Il a commencé ses recherches à ce moment du développement où le système sympathique est bien visible. Les principales conclusions auxquelles il est arrivé sont que le système sympathique chez les mammifères est d'origine mésoblastique, qu'il se forme *in situ* dans le tissu cellulaire qui entoure l'ascite embryonnaire, et qu'il est d'abord entièrement indépendant du système nerveux cérébro-spinal. Il est d'abord uniforme et sans segments et ressemble sous ce rapport aux organes qui se trouvent dans l'aire viscérale, le système vasculaire et le système digestif avec lesquels il affecte d'étroites relations tant au point de vue des fonctions qu'à celui de la structure. Ce n'est que secondairement qu'il s'unit à certains nerfs spinaux grâce au développement des derniers des *rami communicantes* blancs ; il présente alors des ganglions irrégulièrement dispersés. De la tige principale naissent des prolongements qui forment les nerfs périphériques non médullaires, les plexus, et les ganglions, ainsi que les portions médullaires des corps surrénaux.

Richard A. GREGORY.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES


Séance du 18 avril 1890.

Le professeur Rücker communique les résultats des mesures magnétiques qu'il a récemment effectuées en collaboration avec M. Thorpe. Ce mémoire a déjà été lu à la Société royale de Londres et la *Revue* en a rendu compte (p. 250). — M. Whipple fait remarquer le grand intérêt de ce travail, qui signale pour la première fois une relation entre la déviation magnétique et la constitution géologique. — M. Bla Kesley lit un mémoire de M. Osmond sur une théorie du magnétisme permanent. L'auteur établit que le fer existe sous deux états physiques différents : l'un doux ou fer α , l'autre dur ou fer β . La variété β n'est pas magnétique, on l'obtient par échauffement, martelage à froid, ou électrolyse, tandis que la variété α se produit par un recuit prolongé. M. Osmond considère une barre d'acier comme constituée par un mélange intime des deux variétés, le fer β formant une sorte de canevas non magnétique entremêlé de molécules de fer α polarisables et mobiles. Après le déplacement produit quand on place la barre dans un champ magnétique, les molécules polarisées ne reprendront pas leur position, empêchées qu'elles seront par le canevas formé du fer β ; on obtiendra ainsi un aimant permanent. La méthode graphique permet d'établir que le magnétisme permanent sera maximum, quand les deux variétés seront en égale quantité. Si la proportion de carbone ou de manganèse est considérable, tout devra se passer comme s'il n'y avait plus que la variété β , et l'acier ne sera pas magnétique. — M. Schwinburne dit que la théorie proposée devrait rendre compte de l'augmentation d'induction qui se produit quand le circuit d'un aimant permanent est fermé. D'après des expériences récentes qu'il a effectuées, la perméabilité dans une certaine direction est différente, après l'aimantation de ce qu'elle était auparavant, dans une direction perpendiculaire à la première. — M. Ayrton fait remarquer que la théorie de M. Osmond n'explique pas l'influence considérable que produit sur l'aimantation du fer la présence d'une proportion, même très petite, de tungstène.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES


Séance du 17 avril 1890

MM. Thorpe et Tutton : *Oxyde phosphoreux*. Les auteurs ont repris soigneusement l'étude de l'oxyde phosphoreux; leurs résultats sont les suivants. L'oxyde phosphoreux fond à $22^{\circ}5$. Il se volatilise sans altération dans une atmosphère d'acide carbonique ou d'azote à 173° , il cristallise par fusion dans le système monoclinique. Le poids moléculaire déduit de la densité de vapeur et de la méthode de congélation de Raoult conduit à la formule P^{106} . L'eau froide agit lentement sur l'oxyde phosphoreux, contrairement à l'opinion reçue. Au bout de plusieurs jours il ne s'est dissous qu'une petite quantité du corps donnant naissance à de l'acide phosphoreux $P^{85}H^3$. L'eau chaude agit très violemment, en donnant naissance à du sous-oxyde rouge, de l'acide phosphorique et du phosphure d'hydrogène spontanément inflammable. Les alcalis agissent d'une façon analogue. Avec l'alcool on obtient de l'acide diéthylphosphoreux d'après l'équation :



L'oxyde phosphoreux se transforme spontanément à l'air en anhydride phosphorique et l'oxydation est rendue apparente, sous de faibles pressions, par la production d'une traînée lumineuse. L'oxyde fondu brûle avec beaucoup d'éclat dans l'oxygène. Par suite de cette action il peut se produire des explosions assez violentes dans la distillation de l'oxyde phosphoreux. L'oxyde

phosphoreux possède une action physiologique très marquée, et c'est probablement à lui que l'on doit rapporter l'action du phosphore sur la fonction glycogénique du foie, ainsi que la carie de la mâchoire qu'on rencontre chez les ouvriers employés à la fabrication des allumettes. — M. A. Pedler : *Action du chlore sur l'eau en présence de la lumière et action de la lumière sur certains composés acides du chlore*. Ces expériences ont été faites à Calcutta où l'intensité de la lumière est telle qu'une solution aqueuse de chlore, entre en effervescence quand on l'expose au soleil. La combinaison du chlore avec l'hydrogène se produit d'autant plus rapidement que la solution est plus étendue. Quand il y a moins de 100 molécules d'eau pour une de chlore, l'action est à peine sensible, même au soleil des tropiques. Une dissolution très étendue (à environ 700 molécules d'eau pour une de chlore) donne à la lumière solaire la réaction



à la lumière diffuse il se forme de l'acide hypochloreux et de l'acide chlorique. — M. A. Pedler : *Note sur l'explosion de l'hydrogène sulfuré et du sulfure de carbone avec l'air et l'oxygène*. Dans l'explosion d'un mélange d'air et de vapeur de sulfure de carbone, une portion de l'azote peut être oxydée et il se forme divers composés, entre autres des cristaux des chambres de plomb. — M. A. Pedler : *Action de la lumière sur le phosphore : quelques propriétés du phosphore amorphe*. — F. S. Kipping. *Action de l'anhydride acétique sur les acides gras*. L'auteur a pu obtenir par l'action de l'anhydride phosphorique sur l'acide stéarique l'acétone stéarique et avec l'acide heptylique la dihexylacétone ($C^{14}H^{32}O$).

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 20 mars 1890

M. Kronecker : Sur la théorie des fonctions elliptiques.

Séance du 27 mars 1890.

M. Klein expose une méthode pour l'examen des propriétés optiques de cristaux entiers ou de fragments de cristaux. Il les enveloppe d'une résine ou d'un baume ayant sensiblement la même réfrangibilité que les cristaux à examiner.

Séance du 10 avril 1890.

M. de Bezold expose quelques théorèmes sur la thermodynamique de l'atmosphère. Il s'occupe en premier lieu de l'influence exercée par le mélange de couches d'air à des températures différentes et presque saturées de vapeur d'eau, sur la formation des brouillards et des nuages. Hutton avait attribué à ce phénomène une influence trop grande, Wettstein l'avait trop négligée. Hann avait démontré l'influence du mélange, mais en même temps il prouvait que l'expansion adiabatique joue un rôle plus considérable. D'après M. Bezold des considérations thermodynamiques, basées sur des méthodes graphiques, démontrent que le mélange d'air chaud saturé de vapeur d'eau, avec de l'air froid non saturé, peut causer beaucoup plus facilement des condensations que celui d'un courant d'air froid saturé de vapeur d'eau avec une couche d'air chaud non saturé. Les quantités d'eau condensée sont très petites; l'action des expansions adiabatiques et du refroidissement direct l'emporte de beaucoup. Si l'on mèle, par exemple, sous une pression de 700 mm., de l'air à 0° et à $+20^{\circ}$ saturé de vapeur, on n'obtient que 0,75 gr. d'eau pour chaque kg. du mélange qui aura une température finale de $+11^{\circ}$. Un refroidissement direct de $+20^{\circ}$ à $+10^{\circ}$, 2, ou de $+20^{\circ}$ à $+18^{\circ}$, 4 par une expansion adiabatique, suffirait pour produire la même quantité d'eau. Si l'air contient des particules d'eau suspendues, une évaporation et un abaissement de température peuvent se produire sous l'influence d'un courant d'air chaud. Si l'air est saturé mécaniquement mais non hygroscopiquement, l'abaissement peut se produire, même si l'air chaud qui entre est sa-

turé de vapeur. Si au contraire l'air froid est aussi saturé de vapeur, l'air chaud qui entre doit être sec. Il faut en conclure que des mélanges d'eau liquide et d'air non saturé doivent se refroidir, et que ce refroidissement doit être d'autant plus sensible que l'air est plus éloigné de son point de saturation, et que la quantité d'eau est plus grande. C'est ce qui explique que la couche limite d'un brouillard ou d'un nuage se dissout à une température plus basse que les couches supérieures ou inférieures à cette limite; ce fait a été observé à plusieurs reprises dans des voyages en ballon.

D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 18 avril 1890.

M. Planck expose les résultats de ses calculs sur la différence de potentiel entre des électrolytes binaires. Il suppose que les molécules dissoutes ne sont soumises qu'aux forces osmotiques et électrostatiques. Les solutions sont tellement diluées que toute action chimique est exclue. D'après les recherches de Kohlrausch, les ions ont des mobilités spécifiques. Il pose cette mobilité pour

$$K = 52, Na = 32, Li = 24, H = 272, Cl = 54.$$

Supposons à présent une solution d'acide chlorhydrique en contact avec de l'eau pure. Les ions positifs c'est-à-dire l'hydrogène, émigreront à cause de leur plus grande mobilité, de sorte qu'une charge électrostatique se forme, chaque gramme d'hydrogène emportant avec lui 9628 unités d'électricité. Grâce à cette charge électrostatique il y a une attraction exercée sur les particules du chlore restées en arrière, qui se manifestera par une différence de potentiel. D'après les calculs de Planck cette différence de potentiel entre deux solutions contenant un nombre quelconque de substances est donnée par la formule :

$$\varphi_1 - \varphi_2 = (0,02507 \log \xi) \text{ volt,}$$

ξ dépend du rapport des concentrations totales des ions de même charge, donc du rapport des deux sommes :

$$\frac{c_1 + c_2 + c_3 + \dots}{c + c_1 + c_2 + \dots} = \frac{C_1}{C_2}.$$

Posant pour l'énergie totale et le volume total des ions positifs U_1 resp. V_1 et les mêmes grandeurs avec l'indice 2 pour les ions négatifs, nous aurons :

$$\frac{\log \frac{c_2}{c_1} - \log \xi}{\log \frac{c_2}{c_1} + \log \xi} \cdot \frac{c_2 \xi - c_1}{c_2 - c_1 \xi} = \frac{u_2 \xi - u_1}{v_2 - v_1 \xi}.$$

Si C_1 est égal à C_2 nous aurons :

$$\xi = \frac{u_1 + v_2}{u_2 + v_1}.$$

Et si, en outre, nous supposons que dans chaque solution il n'y a qu'une substance dissoute et que les deux substances ont le même anion, nous aurons :

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 0,02507 \log \frac{u_1 + v_1}{u_2 + v_1}.$$

Planck a comparé les valeurs calculées d'après cette formule avec les différences de potentiel que Nernst a observées directement :

Observation	Calcul
HCl NCl...	+0,0284
HCl NaCl...	+0,035
HCl HCl...	+0,040
NaCl NaCl...	+0,0040
NaCl HCl...	+0,0069
NaCl HCl...	+0,0025

La concordance entre les deux colonnes est en effet surprenante.

D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIOLOGIE DE BERLIN

Séance du 25 avril 1890.

M. J. F. Heymans : Sur les fibres myéliniques et amyéliniques. Des nerfs fixés par l'acide osmique ne se décolorent plus ni par l'alcool à froid ou à chaud ni par l'éther; la myéline ou lécithine est demeurée insoluble, le protagon et la cholestérine au contraire se dissolvent encore dans l'alcool à chaud. Les fibres nerveuses fixées ainsi par l'osmium et desquelles le protagon et la cholestérine ont été extraits ne présentent pas de réseau dans la gaine myélinique; la lécithine n'imprègne donc pas seulement les trabécules du réseau névrokératinique. Les nerfs de la rate chez les ruminants, les nerfs cardiaques sympathiques du chien, les rameaux périphériques du ganglion cervical supérieur du lapin sont constitués presque exclusivement par des fibres myéliniques. Les *rami communicantes* sont formés exclusivement par des fibres myéliniques et celles-ci perdent la myéline au niveau des cellules ganglionnaires. D'après l'auteur les fibres amyéliniques sont rectilignes et sans anastomoses entre elles; elles sont constituées par une partie cylindre-axile homogène, entourée d'une gaine protoplasmique qui est probablement close à sa périphérie par une membrane limitante. La fibre amyélinique ne se noircit pas par l'acide osmique et ne donne pas directement dans l'eau des formations myéliniques. Les fibres du nerf olfactif du brochet sont toutes amyéliniques et constituées probablement d'après le même type que les fibres amyéliniques du système sympathique. — M. W. Corol de New-York communique les résultats d'une étude comparée qu'il a faite sur les manomètres de Fick, de Gad, de Hürthle et de l'auteur. Le manomètre de Hürthle est un tambour de Marey en petit; celui de Fick, un petit tambour de Marey avec un ressort métallique; celui de Gad un petit tambour de Marey dans lequel la membrane de caoutchouc est remplacée par une membrane métallique; celui de Corol un tube de caoutchouc entouré de fil de soie. La pression sanguine moyenne, les variations respiratoires ainsi que les variations périodiques du sigmographe de Mayer s'enregistrent facilement par ces manomètres, comme elles l'étaient déjà par le manomètre à mercure. Mais les manomètres inscriraient en outre fidèlement les différentes phases de la variation de la pression qui accompagne l'onde sanguine. A ce point de vue des expériences de contrôle, dans lesquelles des variations de pressions connues furent produites avec des vitesses connues, démontrèrent que le manomètre de Gad donne des courbes exactes dans une plus grande étendue que les autres manomètres. Toutefois l'appareil qui enregistrerait exactement à chaque moment la pression qui existe dans une artère traversée par les ondes sanguines, est actuellement encore à construire. Les expériences de M. Corol démontrent en outre qu'en principe la transmission par l'air, quand il s'agit de variations brusques de la pression, est supérieure à celle par des liquides.

J. F. HEYMANS.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 17 avril 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. E. Weiss discute les résultats de diverses observations sur la comète téléscopique découverte par Brooks le 20 mars 1890. Des éléments calculés, il résulte que la comète atteindra au commencement de juin lors de son passage au périhélie son maximum d'éclat, quatre fois environ celui qu'elle avait au moment de sa découverte; elle disparaîtra pendant l'automne au milieu des rayons solaires et reparaitra de nouveau. Vers la fin de l'année et en janvier 1891, son éclat sera redevenu égal à l'éclat primitif. — Le D^r Oppenheim adresse des observations sur l'orbite de la comète 1846, VIII.

2^e SCIENCES PHYSIQUES. — M. Anton Lampa communique des remarques sur la théorie de l'électricité atmosphérique proposée par M. Arrhénius. Les recherches récentes relatives aux effets de la lumière ultraviolette sur les corps chargés d'électricité ont suggéré à M. Arrhénius une théorie de l'électricité atmosphérique. D'après lui, l'air atmosphérique serait rendu bon conducteur par une illumination de radiations ultraviolettes et l'électricité négative qui charge la surface de la terre pourrait s'écouler à travers l'air ainsi éclairé; l'électricité des orages aurait pour origine une décharge semblable à celle que l'on observe avec un plateau de métal brillant chargé négativement et subitement éclairé. Cette ingénieuse théorie donne lieu à de nombreuses objections, les substances qui forment la surface terrestre ne sauraient être assimilées à des métaux brillants. Si on répète les expériences de décharge par l'illumination, en remplaçant le métal par divers minéraux ou végétaux, les résultats observés sont différents; tandis qu'un éclaircissement de 5 secondes fait perdre complètement sa charge à un plateau de zinc, un éclaircissement de 30 secondes diminue à peine la déviation d'un électromètre mis en relation avec l'une des substances que l'on rencontre sur le sol. — M. Albert von Obermayer communique des expériences sur des effets de pression produits par des décharges électriques continues. Si l'on décharge par une ou plusieurs pointes l'électricité fournie par une machine à double influence, contre un plateau de cuivre vertical, on constate que l'on peut maintenir sur ce plateau des feuilles de papier pesant jusqu'à 2,200 grammes. — M. J. Hann : Sur le maximum de pression de novembre 1889 dans le milieu de l'Europe, remarques générales sur les maxima barométriques. L'auteur a dressé des cartes des éléments atmosphériques; il a utilisé particulièrement les résultats fournis par les nouvelles stations à grande hauteur sur les Alpes et aussi les données obtenues au Pic du Midi et au Puy-de-Dôme; il discute en détail les observations, et en tire diverses conséquences relatives aux mouvements généraux de l'atmosphère; en particulier il établit qu'il y a lieu de distinguer, comme le fait d'ailleurs M. Teisserenc de Bort, les cyclones et anticyclones dynamiques et thermiques. — M. Grünvald présente des considérations sur le spectre de l'hydrogène et sur la composition de l'hydrogène. Balmer a montré que les longueurs d'onde d'une partie des radiations du spectre de lignes de l'hydrogène ($H_2, H_3, H_4, H_5, \dots$) sont liées par une relation simple :

$$\lambda = h \frac{m^2}{m^2 - 4} \quad (m = 3, 4, 5, 6, \dots)$$

h étant une constante indépendante de m ; si l'on pose $m = n + 2$, on voit que l'on aura

$$\frac{1}{\lambda_1} : \frac{1}{\lambda_2} : \frac{1}{\lambda_n} : \dots : \frac{1}{\lambda_n} : \dots = 1 - \frac{4}{3^2} : 1 - \frac{4}{4^2} : 1 - \frac{4}{5^2} : \dots : 1 - \frac{4}{(n-2)^2} \dots$$

Si l'on admet que cette relation entre les longueurs d'onde correspond à une relation analogue relative au groupement des atomes qui constituent la molécule d'hydrogène, on arrive à une idée simple sur la constitution de cette molécule. On peut aussi conclure de là des conséquences sur la constitution des constellations, en supposant une analogie entre la disposition des étoiles qui les constituent, et la disposition des atomes formant la molécule. — M. H. Paschke et A. Smitu étudient la Lobeline. C'est un alcaloïde huileux qui s'extrait du *Lobelia inflata*. On fait digérer la plante dans de l'eau acétifiée à une douce chaleur, puis on concentre et l'on filtre, on obtient un corps ayant la saveur du tabac. De l'étude des composés, particulièrement des sels fournis par cet alcaloïde, les auteurs concluent que l'on doit ranger la lobeline, dans la

série aromatique. — M. Tschermak communique des considérations sur le groupe des chlorites. Il a étudié cristallographiquement et optiquement ces minéraux; il confirme les vues émises par M. Mallard sur l'unité de cristallisation des chlorites et montre l'analogie avec la forme de la Biotite.

3^e SCIENCES NATURELLES. — M. Janosic adresse un mémoire intitulé : « Remarques sur le développement du système génital. »

Emil WEYR, Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance du 4 mai 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Tacchini a réuni en quatre tableaux trimestriels les valeurs de la fréquence relative de tous les phénomènes solaires observés pendant l'année 1889. Les deux hémisphères du soleil ont été divisés en zones de dix en dix degrés; les moyennes concernent les protubérances, les facules, les taches et les éruptions solaires. On reconnaît de cette manière que les phénomènes solaires furent toujours plus fréquents dans l'hémisphère austral, avec cette particularité, que la zone du maximum des protubérances reste toujours entre les parallèles — 40° et — 50°. Les protubérances se montrèrent à des latitudes élevées, où l'on n'observe jamais nifacules, ni taches, ni éruptions. On trouve encore des zones qui présentent seulement des facules, tandis que dans les zones des taches, les facules ne manquent jamais. — M. Millosевич entretient l'Académie de l'orbite de la petite planète (264) Libussa, orbite qu'il avait déjà calculée en deux oppositions; dans la troisième opposition il a retrouvé la planète très peu éloignée du lieu qu'il lui avait assigné par le calcul. M. Millosевич donne les corrections à apporter aux éléments de la planète, en tenant compte des perturbations causées par Jupiter et par Saturne sur son mouvement. — M. Bianchi : Sur une classe de groupes fuchsien, réductibles en groupes modulaires. — M. Marcolongo : Sur les géodésiques tracés sur les quadratiques qui n'ont pas de centre. — M. Ciani. Sur les surfaces algébriques symétriques.

2^e SCIENCES PHYSIQUES. — M. Oddone donne la description des expériences qu'il a faites à l'Institut de Physique de Rome pour déterminer si les liquides diélectriques changent de volume, comme M. Quincke l'avait annoncé sous l'action des forces électriques. M. Oddone s'est servi de l'appareil de M. Quincke légèrement modifié; il produisait l'électrisation des liquides avec une machine de Holtz, ou avec la décharge d'une batterie, et il examinait les variations du liquide contenu dans un tube capillaire, à l'aide d'un microscope à micromètre oculaire. Les liquides soumis à l'électrisation furent les huiles de colza, d'amandes et d'olive, l'éther, le chloroforme. Or les recherches de M. Oddone démontrent que, sous l'action des forces électriques, les liquides ne changent pas de volume; les dilatations que l'on peut observer, sont causées par la chaleur produite, soit par les polarisations successives des molécules en mouvement, soit par le passage de l'électricité à travers un diélectrique imparfait. — MM. Ciamician et Silber, qui avaient déjà publié leurs recherches sur l'apiol, montrant son analogie avec le saphrol, décrivent dans une nouvelle note les analogues que l'apiol présente avec l'eugénol et les transformations de ces trois substances traitées avec de la potasse alcoolique; transformations que MM. Ciamician et Silber ont découvertes en même temps que M. Eykmann, dont les travaux ont été communiqués à la Société chimique de Berlin. — M. Magnanini, poursuivant ses recherches sur la conductibilité des solutions d'acide borique en présence de mannite, établit que dans ces solutions il existe une combinaison acide des deux substances, dans le rapport de trois molécules d'acide borique pour une molécule de mannite. Cette combi-

naison existe seulement en présence de ses produits de décomposition, et elle est dissociée par l'eau. La quantité est fonction, à température constante, du volume et des quantités d'acide borique et de mannite mises en présence, et elle reste déterminée pour ces substances par les lois de l'équilibre chimique. De manière que des quantités différentes d'acide borique et de mannite étant données, dissoutes dans un certain volume d'eau, la conductibilité électrique reste déterminée par les mêmes lois. C'est un résultat intéressant parce qu'il permet une nouvelle application de la conductibilité électrique des solutions à l'étude de leur constitution. — **M. Augeli** rapporte les réactions qui lui ont permis d'obtenir la diméthyléthylène-diamine, substance isomère de la tétraméthylène-diamine ; et dans une deuxième note il s'occupe des produits de condensation de l'*α*-acétylpyrrol avec le benzyl. — **MM. Zatti et Ferratini** communiquent leurs recherches sur les dérivés acétilliques de l'indol. — **M. Costa** a déterminé, à l'aide de la méthode cryoscopique de Raoult, le poids moléculaire du bichlorure de soufre. Il a trouvé, avec des solutions dans l'acide acétique et dans le benzol, que le poids moléculaire correspond parfaitement à la formule SCl_2 . De cette manière ne peut plus subsister la supposition que le bichlorure de soufre nesoit autre chose qu'une solution de chlore dans le protochlorure. **M. Costa** a déterminé encore le pouvoir de réfraction du bichlorure de soufre, et a trouvé que le soufre et le chlore présentent la même réfraction atomique,

autant dans le protochlorure que dans le bichlorure.

3^e SCIENCES NATURELLES. — **M. Magini** appelle l'attention des savants qui s'occupent de biologie, sur un nouveau fait histologique qu'il a découvert dans le lobe électrique de la torpille adulte. **M. Magini** a vu que toutes les grandes cellules nerveuses motrices présentent le karioplasme et le nucléole déplacés d'une manière excentrique, et orientés précisément dans la direction des nerfs électriques ; tandis que dans les torpilles très jeunes (dont le lobe et l'organe électrique ne sont pas encore complètement développés) les cellules motrices présentent le karioplasme et le nucléole au centre même de la cellule. Ces faits ont conduit l'auteur à penser que le déplacement des cellules motrices et du lobe électrique coïncide avec le commencement de l'excitation. Il a étudié les cellules motrices nerveuses de la moelle épinière de plusieurs animaux (chiens, chats, grenouilles) empoisonnés avec des narcotiques (morphine, éther, chloroforme) ou avec des excitants énergiques (strychnine, courants électriques) et il a reconnu que dans les cellules des animaux narcotisés se trouvent en plus grand nombre les nucléoles centraux tandis que dans les cellules motrices des animaux violemment excités on trouve, au contraire, plus nombreux les nucléoles excentriques. **M. Magini** ajoute des observations sur ces faits et sur la relation qu'ils peuvent avoir avec la fonction de certaines cellules.

Ernesto MANCINI.

COURRIER DE BERLIN

Notre compatriote **M. Émile Berliner**, Hanovrien récemment établi à Washington, vient d'apporter au phonographe un perfectionnement des plus intéressants. Il a cherché à construire un appareil destiné

à branes dont il aurait inscrit les vibrations (1). C'est ce principe aussi qui, après l'invention du téléphone Bell, a guidé Edison. **M. Berliner** s'est servi de cette idée fondamentale et l'a beaucoup développée. Il a imaginé,




Fig. 1. — Appareil récepteur des sons. (On produit les sons à l'embouchure d'un cornet relié par un tube de caoutchouc à la membrane vibrante.)

d'abord à enregistrer, puis à reproduire, en les amplifiant, tous les sons, — musicaux ou articulés.

Disons tout de suite que l'inventeur rend pleine justice à ses illustres devanciers **Leon Scott**, **Charles Cros**, **Edison**. Le phonatographe de **Scott** date de 1857. **Cros** émit en 1877 l'idée qu'on pourrait l'appliquer à faire vibrer et par conséquent chanter les mem-

pour la rendre tout à fait pratique, de nombreuses dispositions qu'il est important de signaler.

Dans le phonographe d'**Edison** et le graphophone de **Bell** et **Tainter**, appareils à peu près identiques, la sur-

(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 3 décembre 1877.

face sur laquelle se produit l'inscription est un cylindre, — actuellement de cire, dans lequel le style de la membrane parlante trace un sillon plus ou moins profond. En outre cette surface même intervient pour fournir le travail mécanique nécessaire à la reproduction des sons. — Il en est autrement dans le *grammophone* imaginé par M. Berliner. En réalité cet appareil est double : il se compose d'un récepteur (fig. 1) et d'un système reproducteur (fig. 2), isolés l'un de l'autre et constituant deux instruments différents.

Cette disposition permet de ne demander au récepteur aucun travail mécanique appréciable : son rôle

couche d'alcool que débite goutte à goutte un flacon situé au-dessus de l'appareil.

Le graphique obtenu, il restait à le creuser dans le zinc en procédant à la manière des aquafortistes. Mais il fallait recourir dans ce but à un agent nouveau, les acides dont se servent les graveurs donnant naissance à des dégagements de bulles gazeuses nuisibles à la netteté des traces. M. Berliner a employé l'acide chromique et en a obtenu des résultats admirables. Il est arrivé à produire ainsi des planches qui représentent de véritables *phonogrammes* (fig. 3), remarquables par la réunion de ces deux propriétés jusqu'alors jugées in-




Fig. 2. — Appareil reproducteur des sons.

se borne à enregistrer la forme et l'amplitude des vibrations. Aussi la membrane parlante peut-elle être beaucoup plus mince, partant plus sensible que celle du phonographe. M. Berliner la fait en mica. Le style qu'elle commande est au contraire très dur : c'est un alliage d'osmium et d'iridium. Quant à la surface où se fait l'inscription, par cela même qu'elle n'a pas d'autre fonction, elle peut aussi être bien plus délicate que celle de l'appareil d'Edison. C'est, au lieu d'un cylindre de cire, une couche plane et parfaitement horizontale d'un vernis très fin déposé sur un disque de zinc. Ce disque est, au moyen d'une manivelle, animé d'un mouvement tel que le style y grave une spirale. Les spires produites pendant qu'on émet un son devant l'appareil offrent au microscope des ondulations très marquées. Le vernis qui les présente est peut-être la partie essentielle du grammophone. Il résiste à l'action des agents chimiques les plus énergiques. En même temps il est si léger que le moindre contact suffit pour l'enlever. Nous ne saurions mieux le comparer qu'à la fleur si délicate qu'on observe sur certains fruits tels que les raisins ou les prunes. M. Berliner l'a obtenu en dissolvant de la cire d'abeille dans la benzine : le liquide s'évapore et laisse sur le zinc une couche bien homogène et pour ainsi dire impalpable.

Ici l'inventeur du grammophone a eu à résoudre une difficulté imprévue : la poussière ambiante se déposait sur la plaque et sur le style et s'imprimait dans le vernis, ce qui faussait l'inscription des sons. A cet inconvénient M. Berliner a obvié de la façon suivante : pendant l'opération il recouvre son vernis d'une mince

compatible : finesse et solidité. Chacune de ces planches coûte à peu près trois francs. Quelques connaissances techniques étant nécessaires pour les préparer, M. Berliner entreprend d'instituer dans ce but des ateliers spéciaux.




Fig. 3. — Phonogrammes des voyelles.

L'appareil reproducteur (fig. 2), tout à fait distinct du récepteur que nous venons de décrire, est fort simple, ce qui permet de le vendre à un prix peu élevé. Il revient à une centaine de francs. C'est en quelque sorte une boîte à musique. Il se compose : 1° d'un plateau circulaire et horizontal susceptible de rotation; sur lequel on dépose la planche; 2° d'un style et d'une membrane semblables à ceux du récepteur; 3° enfin d'un cornet acoustique destiné à renforcer les sons.

Pour les produire il suffit de placer la pointe du style à l'origine du tracé gravé dans la planche, et d'imprimer à celle-ci un rapide mouvement de rotation au moyen d'une manivelle ou d'un mécanisme d'horlogerie. Le style suit la rainure, qui est ondulée, et son extrémité supérieure, agissant sur la membrane, la contraint de reproduire exactement les vibrations de la membrane réceptrice. Les vibrations se transmettent à l'air du cornet acoustique et produisent ainsi des sons identiques à ceux qui ont impressionné l'appareil récepteur, avec cette seule différence, intéressante à noter, que l'intensité des sons reproduits est très supérieure à celle des sons originaux. Elle remplit, par exemple, toute une salle de théâtre où des centaines de personnes peuvent l'entendre simultanément. Au contraire la voix du phonographe ne devient assez forte que lorsqu'on s'applique le cornet acoustique à l'oreille,

procédé qu'on ne saurait employer dans le cas d'une nombreuse assemblée.

Chose plus importante encore, M. Berliner reproduit à l'infini ses phonogrammes par les procédés photomécaniques. Il peut aussi les agrandir par les mêmes procédés, amplifier de la sorte les rainures de la planche et renforcer d'autant les sons de son appareil. Rien enfin n'est plus facile que d'imprimer les planches, comme on fait maintenant pour l'eau-forte et la gravure au burin, d'expédier un nombre illimité d'épreuves à la clientèle et de les transformer en phonogrammes par la photogravure.

Le grammophone reproduit déjà très fidèlement la musique, mais, pour ce qui est de la parole, laisse encore à désirer. Il faut considérer qu'il n'est qu'à ses débuts : tout fait prévoir que dans un prochain avenir il atteindra un haut degré de perfection. G. VAN MUYDEN.

NOUVELLES

SYNTHÈSES DE LA NÉPHÉLINE, L'AMPHIGÈNE ET LA SODALITE

M. C. Friedel, de l'Institut et M. G. Friedel, élève-ingénieur des mines, viennent de présenter à la Société chimique de Paris (25 avril 1890) un travail des plus intéressants sur la synthèse de trois silicates naturels : *néphéline*, *amphigène* et *sodalite*.

Les deux premiers de ces minéraux avaient déjà été reproduits par voie ignée. MM. C. et G. Friedel sont parvenus à les préparer par voie aqueuse, en soumettant le mica à l'action des alcalis et des silicates alcalins en présence de l'eau. Que l'on chauffe par exemple ce minéral à 500° avec une dissolution de potasse, il se forme des cristaux de *néphéline*, dont la formule, si longtemps douteuse, se trouve ainsi définitivement fixée : Na_2O , 2SiO_2 , Al_2O_3 . Que l'on remplace la potasse par un silicate alcalin, ce sont de beaux cristaux d'*orthose* qui prendront naissance; que l'on prolonge enfin cette dernière expérience en ayant soin de diminuer la quantité de silicate alcalin, on obtiendra des cristaux quadratiques d'*amphigène* : 4SiO_2 , Al_2O_3 , K_2O .

MM. C. et G. Friedel ont de plus constaté que l'attaque du mica par la soude est encore possible en présence du chlorure de sodium. Il se dépose alors une combinaison double de chlorure de sodium et d'un silicate d'alumine et de soude, bien cristallisée, qui n'est autre que la *sodalite*. C'est la première fois que ce minéral est reproduit par synthèse.

Ces reproductions de minéraux présentent un grand intérêt, non seulement en raison de la lumière qu'elles jettent sur les formules encore douteuses de certains d'entre eux, mais aussi par la grande analogie qui doit exister entre les conditions de ces réactions synthétiques et le mode de formation naturel d'un grand nombre de silicates.

L'ÉQUATION DES FLUIDES

Depuis longtemps les physiciens se sont préoccupés de rechercher la forme générale d'une fonction caractéristique pour les corps gazeux et liquides, reliant entre eux les trois éléments suivants : la pression (p), le volume (v) et la température ($T = 273^\circ + t$). Parmi les diverses tentatives faites dans cette voie, on se rappelle qu'en 1885, M. Sarrau, de l'Institut, proposait l'équation suivante :

$$\left(p + \frac{K\varepsilon^{-T}}{(v + \beta)^2}\right)(v - \alpha) = RT,$$

où toutes les lettres autres que p , v , et T représentent des constantes. Une première vérification avait été basée sur les expériences de M. Amagat relatives à la compressibilité de l'acide carbonique.

M. Sarrau vient de faire connaître à l'Académie des Sciences une vérification bien plus remarquable encore. Les valeurs numériques des constantes relatives à l'azote ont été d'abord déterminées au moyen des données expérimentales les plus récentes de M. Amagat sur la compressibilité de ce gaz; ces données concernent des recherches exécutées entre 17° et 101° , sous des pressions comprises entre 750 et 3000atm .

Les valeurs numériques des constantes relatives à l'azote étant ainsi fixées, M. Sarrau a pu calculer les variations de compressibilité aux basses pressions, ainsi que la température critique (-142°) et la pression critique (32^{atm} , 9) de ce gaz. Ces résultats sont confirmés d'une manière remarquable autant par les mesures de Regnault sur la compressibilité, que par celles de Wroblewski et Olzewski relatives aux constantes critiques de l'azote : température critique $= -143^\circ$ à -146° , pression critique 33^{atm} , 6 à 35^{atm} , 0.

Une extrapolation dans des limites aussi étendues est sans précédent dans les sciences physiques et il faut en conclure avec l'éminent professeur de l'Ecole Polytechnique que ces résultats ne témoignent pas moins en faveur de la justesse des vues théoriques que de l'habileté des expérimentateurs.

Ph. A. GUYE.

ERRATUM. — Dans l'article de M. Arm. Gautier, publié dans notre dernier numéro, page 227, note 1, au lieu de :

	$\text{C}\begin{array}{l} \text{H-OH} \\ \\ \text{H} \end{array}$
Le propylglycol est :	$\text{C}\begin{array}{l} \\ \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
lisez	$\text{C}\begin{array}{l} \text{H-OH} \\ \\ \text{OH} \end{array}$
Le propylalcool est :	CH_3
	CH_3

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LA MACHINE A VAPEUR (1)

HISTORIQUE. — QUESTIONS PENDANTES. — RÔLE DE LA THERMODYNAMIQUE

Les premiers essais d'application mécanique de la force de la vapeur d'eau, ou, du moins, les premiers arrivés jusqu'à nous, sont ceux de Héron qui, 200 ans environ avant l'ère chrétienne, décrit plusieurs appareils destinés à mettre, par la chaleur, des fluides en mouvement.

Pendant les dix-huit siècles qui suivent, l'humanité ne garde aucune trace des efforts probablement faits dans le même sens et, au commencement du XVII^e siècle, on en est encore à peu près à l'*œolipyle* de Héron. A ce moment, Salomon de Caus, à Francfort, emploie la force élastique de la vapeur pour élever l'eau et a ainsi la première idée des machines à épuisement.

Il faut arriver ensuite à Hautefeuille en 1678, pour trouver un progrès notable; il propose une machine à alcool où le liquide *« s'évapore et est condensé tour à tour sans qu'il s'en perde. »* C'est le premier exemple d'un corps parcourant périodiquement un cycle fermé. Deux ans après, Huyghens utilise la force expansive de la poudre à canon dans un moteur où, pour la première fois, figure un cylindre et un piston.

Mais à la fin du XVII^e siècle des progrès capitaux se réalisent et vers l'année 1700, en Angleterre

d'une part, en France de l'autre, les premières machines à vapeur *industrielles* apparaissent.

En Angleterre, Thomas Savery utilise pratiquement des pressions de plusieurs atmosphères; il établit une machine sans cylindre ni piston dans laquelle il emploie l'eau froide pour produire la condensation; la chaudière communique avec deux récipients dont l'un se remplit d'eau par suite du vide dû à la vapeur condensée, pendant que l'autre se remplit de vapeur; le procédé d'alimentation sous pression est des plus ingénieux et les robinets de jauge indiquant le niveau de l'eau dans la chaudière sont imaginés.

Au même moment, Denis Papin en France obtient des résultats plus considérables encore; il réalise le mouvement alternatif d'un piston placé dans un cylindre en injectant de la vapeur dans le cylindre et en condensant cette vapeur par de l'eau froide projetée extérieurement sur les parois; il est ainsi le créateur de la machine à vapeur à piston. En même temps il fait voir qu'en vases clos la température de l'eau bouillante s'élève avec la pression de la vapeur, il invente la soupape de sûreté, emploie un robinet distributeur à rotation continue, propose un fourneau à flamme renversée pour rendre la combustion plus complète, imagine une chaudière à carneau central pour augmenter la surface de chauffe et montre que l'on peut se servir des machines pour faire tourner des arbres de couche alors que, jusqu'à

(1) L'article qui suit constitue la majeure partie d'une préface écrite par M. Léauté pour la traduction française, faite par M. Ed. de Billy, Ingénieur des mines, du *Traité des machines à vapeur* de notre éminent collaborateur M. Sinigaglia, pr. au Reale Instituto de Naples. Cette traduction va paraître sous peu chez Doin. Il en sera rendu compte dans la Revue.

La Direction.

lui, on les avait uniquement employées à opérer des épuisements.

Denis Papin a été l'un des plus grands parmi ces inventeurs dont nous avons à rappeler les noms; c'est lui qui, le premier, a réalisé une machine à feu à double effet et à deux corps de pompe; c'est lui qui a eu l'idée des machines à haute pression, sans condensation; c'est lui enfin qui a été le véritable créateur du bateau à vapeur.

A partir de Denis Papin, la machine à vapeur existe en fait, mais elle est encore fort loin d'être d'un emploi avantageux; elle est dangereuse, dépense beaucoup, s'arrête souvent; Newcomen, profitant à la fois des idées de Papin et de celles de Savery, la rend pratique; il emploie le condenseur par injection, met une couche d'eau sur le piston afin d'empêcher les fuites, sépare la pompe de la machine et groupe tout l'ensemble, de façon très avantageuse pour l'épuisement des mines, en plaçant à la partie supérieure un balancier relié d'un côté au piston et de l'autre à la tige de pompe.

La machine de Newcomen a un grand succès et, pendant soixante ans environ, est employée sans autre perfectionnement que celui de Potter et de Beighton pour la manœuvre des soupapes, et que celui de Beighton pour l'emploi de l'eau de condensation comme eau d'alimentation.

Mais en 1769, Smeaton reprend l'étude de cette machine, en construit un grand nombre, détermine les proportions les plus convenables à donner à leurs éléments, fait de nombreux essais pour connaître leur rendement, les perfectionne sur divers points et en rend l'emploi tout à fait général.

A ce moment même, les premiers travaux de Watt apparaissent; grâce à lui, les inventions capitales se succèdent sans interruption et la machine à vapeur, telle qu'elle existe encore aujourd'hui, à double effet, à mouvement de rotation, à détente, avec enveloppe, condenseur séparé, volant et régulateur, est créée de toutes pièces.

C'est la machine de Newcomen qui fixe tout d'abord l'attention de Watt; par une longue série d'expériences très précises, il constate qu'elle utilise seulement une très faible portion de la chaleur; il cherche alors, en déterminant toutes les causes de perte, à les éviter; il reconnaît ainsi que ces pertes doivent être surtout attribuées à l'abaissement de température subi par la vapeur dans le cylindre, que cet abaissement est dû au refroidissement extérieur et à la condensation par l'eau froide; il remédie à la première cause par la chemise de vapeur, il fait disparaître la seconde en séparant le condenseur du cylindre; puis, comme dans ce condenseur, il faut enlever l'air, la vapeur condensée et l'eau d'injection, il place une pompe qui les aspire à la fois.

En même temps, le grand inventeur ferme le cylindre, ouvert jusqu'alors par le haut et que l'air vient refroidir intérieurement à chaque course; il est alors conduit au double effet, et pour pouvoir l'appliquer à sa machine à balancier, il construit le parallélogramme articulé qui transforme un mouvement de rotation alternatif en un mouvement sensiblement rectiligne. Préoccupé ensuite de la régularisation du mouvement, il imagine la détente pour diminuer les chocs aux extrémités de la course et se trouve ainsi amené à faire une économie de vapeur dont il comprend tout de suite l'importance. Il emploie enfin le régulateur à boules pour faire varier la dépense du fluide moteur proportionnellement au travail effectué.

A côté de ces progrès fondamentaux, chemise de vapeur, condenseur séparé, pompe à air, double effet, parallélogramme articulé, détente, régulateur, Watt accumule les perfectionnements pratiques; il enveloppe toutes les parties en contact avec la vapeur par de mauvais conducteurs; il lubrifie le piston par un corps gras; il fait passer la tige dans une boîte à étoupes; il place sur la chaudière le tube de niveau et le manomètre; il construit enfin l'indicateur qui servira désormais à mesurer le travail produit sous le piston.

Dès lors, la machine à vapeur existe telle que nous l'avons encore aujourd'hui; les contemporains et les successeurs de Watt la perfectionneront comme détails, la rendront plus parfaite comme exécution, ils ne la modifieront pas dans son essence; tous les efforts vont converger pour l'appliquer aux grands problèmes qu'offre l'industrie; le XVIII^e siècle a été le siècle d'invention, le XIX^e est le siècle d'application.

Au point de vue de la locomotion, les machines d'Evans, contemporain de Watt, sont successivement remplacées par les machines à vapeur d'Hancock, par les locomotives de Trevithick et enfin, par celles de George Stephenson, l'un des plus grands hommes qu'ait eus la mécanique.

Au point de vue de la navigation, les essais du marquis de Jouffroy pour la propulsion des bateaux sont bientôt suivis de ceux de Fulton qui réalise un navire à vapeur et fait la première application des nouvelles machines à la marine de guerre. A la même époque les Stevens créent toute une flotte.

Les applications de toutes sortes se produisent ainsi coup sur coup et Watt peut, lui-même, voir le monde transformé par sa découverte. Au moment où il meurt, en 1819, les chemins de fer de Stephenson transportent des marchandises, tandis que le premier steamer transatlantique vient d'aller d'Amérique en Europe.

Nous ne pouvons songer à suivre ici, dans leur détail, les perfectionnements successifs qui, depuis

cette époque jusqu'à aujourd'hui, ont amené la machine à vapeur, la locomotive, la machine marine, à leur état actuel. Ces perfectionnements ont été innombrables ; les uns ont été consacrés par l'expérience, d'autres ont été abandonnés, d'autres sont encore en discussion ; tous les organes de la machine, depuis les foyers et les chaudières jusqu'aux appareils de distribution, aux cylindres, aux condenseurs, aux régulateurs... ont été modifiés d'une multitude de façons ; nous laisserons de côté ces transformations de dispositifs, si intéressantes qu'elles puissent être, pour signaler uniquement les questions sur lesquelles se porte en ce moment l'attention des Ingénieurs.

Ces questions, ou, du moins, les principales d'entre elles, lorsque, faisant abstraction des problèmes particuliers, on se place à un point de vue général, sont relatives aux points suivants : hautes pressions, grandes vitesses, détentes successives, chemises de vapeur, surchauffe, compression, vapeurs autres que la vapeur d'eau.

Nous dirons un mot de chacune d'elles.

Les *hautes pressions* présentent ce premier avantage de conduire à des dimensions moindres pour les machines ; de plus, elles permettent la suppression du condenseur et donnent ainsi une notable simplification.

Leurs inconvénients sont de favoriser les condensations à l'admission et, surtout, d'entraîner, à l'échappement, une perte considérable de chaleur ; on peut, dans certains cas, utiliser cet échappement en lançant la vapeur dans la cheminée et produisant ainsi un tirage forcé ; c'est ce qui a lieu dans les locomotives. Les hautes pressions se généralisent de plus en plus et l'Exposition de 1889 a mis en relief la tendance de l'industrie à en adopter l'emploi.

Les *grandes vitesses* contribuent, comme les hautes pressions, à réduire les dimensions des moteurs ; elles présentent en outre de grands avantages pour la régularité du mouvement ; elles correspondent enfin à une notable économie de calorique en atténuant, comme l'ont montré des expériences récentes, le refroidissement par les parois ; mais elles exigent des matériaux excellents et une exécution très soignée car les pièces fatiguent beaucoup.

La fixation du *degré de détente* à prendre dans chaque cas peut prêter encore à la discussion ; si l'on s'en remettait à la théorie seule, on admettrait d'une façon générale les grandes détentes ; la pratique, au contraire, conduit aux détentes modérées ; les condensations à l'admission et le travail de la contre-pression augmentent d'importance relative avec la détente et limitent ainsi le degré d'expansion à adopter.

A ce point de vue, les machines à *détentes successives*, depuis les compound à deux cylindres jusqu'aux machines à triple et à quadruple expansion présentent des avantages. Bien qu'a *priori* ce système semble peu économique, puisque les chutes de pression d'un cylindre à l'autre éloignent de la réversibilité, il se trouve qu'en fait, l'influence des parois, dont le rôle est prépondérant au point de vue des pertes de chaleur, est diminué d'importance et qu'on réalise, en total, un gain notable. Mais s'il paraît certain que la détente par cascade évite des pertes, surtout dans le cas de hautes pressions, elle présente des inconvénients dans les machines à régime variable et l'on est d'ailleurs très loin d'être fixé sur la meilleure manière de réaliser cette détente. Vaut-il mieux deux cylindres ou plus de deux ? Quelles doivent être leurs propositions relatives ? Faut-il, comme on l'admet généralement, pratiquer la détente au petit cylindre ? Ce sont là autant de questions qui ne sont pas résolues et il serait même imprudent d'affirmer, d'une façon absolue, pour tous les cas, la supériorité des compound sur les machines simples.

Les *chemises de vapeur* constituent peut-être encore un problème plus obscur, bien qu'il ait été l'objet de nombreux et importants travaux. Le principe lui-même n'est pas en question ; l'enveloppe donne lieu, quand il n'y a pas surchauffe, à une économie considérable, mais on est loin d'être fixé sur le meilleur dispositif à appliquer. Il semble certain qu'on ne doit pas faire passer préalablement dans l'enveloppe la vapeur des cylindres, mais faut-il préférer, comme cela paraît probable, l'enveloppe à circulation à l'enveloppe de vapeur stagnante ? Convient-il de placer une chemise sur chaque cylindre ou sur le grand seul ? Quelle doit être la température de la vapeur à l'intérieur de l'enveloppe ? Tous ces points ne sont pas encore complètement fixés et l'on n'a même, sur certains d'entre eux, aucune indication sérieuse.

La *surchauffe*, préconisée par Hirn, à la suite d'études justement célèbres, est certainement l'un des meilleurs moyens dont on dispose pour améliorer le rendement des machines ; elle agit dans le même sens que la chemise de vapeur, mais produit des économies plus fortes ; malheureusement, elle s'est heurtée à certaines difficultés pratiques et exige de grandes précautions ; il est malaisé d'en régler le degré ; tantôt elle est poussée trop loin, les lubrifiants se brûlent et les surfaces grippent, tantôt elle est trop faible et ne donne aucun résultat. D'autre part, les surchauffeurs sont des appareils gênants et coûteux.

La *compression de la vapeur* à la fin de la course a pour effet de diminuer et même de faire disparaître les pertes de chaleur dues aux espaces morts ;

par contre, elle a l'inconvénient de rendre plus faible le travail par coup de piston et de contribuer de la sorte à augmenter les dimensions de la machine. Son utilité est incontestable dans le cas des grandes détentes, mais on ne connaît pas encore le degré de compression qui correspond au meilleur rendement. Quoi qu'il en soit l'action simultanée de la compression et de la surchauffe est susceptible de donner, peut-être, dans la suite, de bons résultats.

Tandis que l'attention des ingénieurs se porte sur les questions précédemment énumérées, l'ingéniosité des inventeurs s'exerce sur les divers organes de la machine afin d'en améliorer le fonctionnement. Les foyers sont munis de grilles appropriées au combustible, de distributeurs de charbon; leurs formes sont mieux étudiées, la combustion s'y fait dans de meilleures conditions. L'arrivée de l'air est l'objet de recherches intéressantes, le tirage forcé semble appelé à jouer un rôle important. Les chaudières sont modifiées dans le but, soit d'augmenter la surface de chauffe, soit d'assurer la sécurité. Les détendeurs, appliqués depuis quelques années, permettent de régulariser les hautes pressions et en facilitent ainsi l'emploi. Les distributeurs de vapeur, dont l'importance est de premier ordre pour le fonctionnement économique des machines, reçoivent des perfectionnements ayant pour objet d'équilibrer les organes mobiles, de varier la détente, de fermer et d'ouvrir brusquement les orifices d'introduction et d'évacuation, de diminuer les espaces nuisibles. Les régulateurs sont mieux adaptés aux nouvelles conditions dans lesquelles fonctionnent les moteurs; on les fait agir de préférence sur la détente et, dans le cas des grandes vitesses, ils sont placés dans le volant même de la machine. Les résistances passives sont l'objet d'expériences prolongées qui montrent combien les lois du frottement dans les machines sont encore peu connues et quels progrès on peut réaliser de ce côté. Enfin, il n'est pas jusqu'aux formes qui ne donnent lieu à des études soutenues, soit pour mieux grouper les organes, soit pour solidariser les points d'appui sur des fondations que l'on peut rendre élastiques afin d'amortir les vibrations.

La machine à vapeur se plie désormais à toutes les exigences et devient une sorte d'outil universel: servo-moteur, petit cheval. Le mode d'action de la vapeur lui-même est changé dans certains cas et Giffard crée l'injecteur pour alimenter la chaudière pendant que l'éolipyle de Héron, transformée peu à peu, donne le turbo-moteur que l'on a pu voir fonctionner à la dernière Exposition.

Ainsi toutes les parties de la machine, tous les éléments qui la constituent, se perfectionnent suc-

cessivement; les résultats déjà obtenus sont considérables et tandis que la machine de Watt consommait environ 20 kilogrammes de vapeur par cheval et par heure, les machines d'aujourd'hui peuvent n'en dépenser que six ou sept. Et cependant il est permis de se demander si l'on marchera indéfiniment dans cette voie, si la vapeur d'eau ne sera pas abandonnée, partiellement au moins, et si, dans certains cas, les machines à autres fluides ne constitueront pas l'un des progrès de l'avenir. Les belles expériences de du Trembley sur l'éther et le chloroforme n'ont pas, il est vrai, donné de résultats pratiques; tous les essais qui ont été faits sur l'ammoniac, le sulfure de carbone, l'acide sulfurique..., etc., ont, jusqu'ici, été frappés de stérilité, mais il serait imprudent d'affirmer que des inventeurs plus heureux ne réussiront pas dans cette voie; les bonnes machines à vapeur d'eau, bien qu'elles soient très perfectionnées, n'ont qu'un très faible rendement calorifique; on nous permettra d'insister sur ce point.

Lorsqu'on se place à un point de vue purement théorique, lorsqu'on considère une machine *parfaite*, la fraction de la chaleur dépensée qui se transforme en travail, est absolument fixe, du moment où les températures extrêmes entre lesquelles fonctionne la machine restent constantes; quel que soit le moteur, quel que soit le fluide intermédiaire, ce rendement théorique maximum ne varie pas; c'est là un des points fondamentaux de la thermodynamique.

Mais si l'on en concluait qu'il ne saurait y avoir intérêt à remplacer l'eau par un autre corps, on commettrait une erreur capitale; d'une part, en effet, la nature du fluide, si elle n'a pas d'action sur le rendement théorique maximum, en a une sur le cycle obtenu et l'on peut espérer trouver un corps donnant un cycle plus avantageux que ceux réalisés jusqu'à ce jour; d'autre part, les machines parfaites n'existent pas, le rendement théorique maximum est une pure conception de l'esprit et les qualités du moteur, aussi bien que la nature du fluide, interviennent dans le rendement réel.

Un rapprochement bien souvent fait entre les machines à vapeur et les machines à gaz est intéressant à rappeler ici, bien que ces deux moteurs ne fonctionnent pas entre les mêmes limites de température.

Les machines à vapeur les plus perfectionnées que construit l'industrie actuelle consomment lorsqu'elles sont dans les meilleures conditions de rendement 0^m900 de charbon par heure et par cheval soit à peu près 7.600 calories; or, une machine à gaz ordinaire brûle, dans le même temps et pour le même travail, environ un mètre cube de gaz, correspondant à 5.000 ou 5.500 calories; le rendement

thermique de la machine à gaz, si imparfaite encore aujourd'hui, est donc supérieur de près de moitié à celui des meilleures machines à vapeur; le résultat est péremptoire.

Certes, d'autres conditions sont à considérer dans la pratique et le rendement thermique n'est pas le seul élément dont il faille tenir compte; l'économie de chaleur est importante, mais l'économie d'argent l'est encore plus et le prix de revient de la calorie est souvent plus intéressant que son bon emploi; la sécurité, elle aussi, est une question fondamentale, et qui, dans la plupart des cas, prime toutes les autres; le poids du moteur joue un rôle prépondérant dans certaines applications comme, par exemple, dans les locomotives, les machines marines et les aérostats; en un mot, de nombreuses conditions pratiques viennent, dans chaque problème particulier, fixer les qualités que doit avoir la machine et peuvent contribuer ainsi à la détermination du fluide à adopter.

Pour ces diverses raisons, les machines à vapeurs autres que la vapeur d'eau sont susceptibles d'avoir une réelle utilité, mais, en restant même au point de vue spécial de la bonne utilisation de la chaleur, elles peuvent présenter un haut intérêt; l'infériorité relative de la machine à vapeur sur ce point tient, en effet, surtout à deux causes; d'une part, une forte proportion de la chaleur produite dans le foyer n'arrive pas à la chaudière; d'autre part, les calories reçues par cette chaudière et non abandonnées au condenseur sont transformées partiellement en travail; or le coefficient de transformation ou *coefficient économique* ne dépasse pas 0,30 parce que l'écart des températures extrêmes de la chaudière et du condenseur est relativement faible. Ces deux raisons seules font perdre environ 80 calories sur cent; si l'on tient compte alors de l'imperfection du cycle, c'est-à-dire des condensations, des pertes de chaleur, des étranglements, ... etc., si l'on y ajoute l'effet des frottements et des résistances passives de toutes sortes, on arrive à s'expliquer comment les machines à vapeur les plus parfaites utilisent une si faible proportion de la chaleur dépensée.

Pour remédier utilement à cette situation, il faut agir sur les deux causes principales que nous venons de signaler; or, c'est précisément ce que font les moteurs à gaz; ils diminuent la perte inutile des calories du foyer puisque ce dernier agit directement sur le fluide moteur et ils augmentent le coefficient économique puisqu'ils suppriment la chute de température entre le foyer et la chaudière. Et c'est à cette double raison qu'est dû leur meilleur rendement thermique.

Les considérations qui précèdent montrent les avantages que présentent les moteurs à gaz au

point de vue du bon emploi de la chaleur; mais, comme nous l'avons dit, beaucoup d'autres éléments interviennent et l'on aurait tort d'en conclure la supériorité absolue de ces moteurs sur la machine à vapeur. Ce que nous avons voulu établir, c'est que les essais pour remplacer la vapeur par un autre fluide peuvent être utiles et qu'il n'est pas déraisonnable de penser que les machines thermiques telles que les moteurs à gaz, les moteurs à air chaud, les machines à vapeurs autres que la vapeur d'eau et, surtout, les machines à vapeur combinées, sont susceptibles de constituer l'un des progrès de l'avenir.

En somme, dans l'état actuel, la machine à vapeur d'eau, malgré la perfection incontestable à laquelle elle est parvenue, est fort loin de la machine théorique; il en est de même d'ailleurs de tous les moteurs thermiques et l'on comprend avec quelles réserves il est permis d'appliquer la Thermodynamique à l'étude de ces moteurs.

La Thermodynamique a joué un rôle important pour la machine à vapeur, et les travaux de Joule, de Rankine, de Clausius, de W. Thomson, de Hirn, de Zeuner, de Dwelshauvers-Déry, ... en ont éclairé le fonctionnement; mais on a voulu quelquefois trop obtenir; la Thermodynamique repose, comme toutes les théories, même les mieux assises, sur certaines hypothèses restrictives indispensables pour qu'on puisse aborder les questions; or ces hypothèses sont à une telle distance de la réalité, les phénomènes qui se produisent dans un moteur se rapprochent si peu des simplifications faites, qu'à vouloir étendre, sans précautions, les conclusions de la théorie à la pratique, on serait exposé aux plus graves erreurs. Certes, la Thermodynamique a rendu de grands services aux mécaniciens; elle constitue un moyen d'étude puissant, mais à la condition de ne l'appliquer aux phénomènes réels qu'*a posteriori*, après l'expérience; on ne peut songer à se servir uniquement d'elle pour calculer *a priori* les éléments d'une machine et déterminer les phénomènes thermiques qui s'y produiront; la théorie « générique » ainsi comprise, ne conduit qu'à des conséquences erronées; il n'existe qu'une seule voie à suivre, expérimenter d'abord et analyser ensuite les résultats des expériences. C'est ce qu'a professé Hirn, le véritable fondateur de ce qu'il a appelé la théorie « pratique » de la machine à vapeur; c'est ce qu'a fait Hallauer dans ses travaux sur la méthode calorimétrique; c'est ce qui rend si intéressants les beaux développements qu'a donnés M. Dwelshauvers-Déry à la méthode de Hirn.

H. Léauté.

de l'Académie des Sciences.

L'ANÉMIE PERNICIEUSE D'ORIGINE PARASITAIRE

Depuis quelques années, l'attention des médecins s'est portée sur certaines formes graves de l'anémie, spécialement caractérisées par leur accentuation progressive et leur tendance à une issue funeste : c'est ce qu'on a appelé l'*anémie pernicieuse*.

Il ne s'agit pas, comme pourrait le faire supposer cette expression, d'une affection simple et bien limitée, d'une entité morbide, comme on disait autrefois : l'anémie pernicieuse correspond, en réalité, à tout un groupe nosologique, dont les manifestations offrent un certain nombre de traits communs, mais dont l'origine est des plus variées.

C'est ainsi que les cliniciens ont été amenés à distinguer tout d'abord une forme primitive ou essentielle, et des formes secondaires diverses. La forme primitive représenterait une maladie toute spéciale, — dont l'origine reste encore à déterminer, mais qu'on soupçonne de se rattacher à l'action d'un microbe ; — elle serait d'ailleurs favorisée dans son évolution par certaines conditions débilantes, telles que l'hygiène et l'alimentation défectueuses, les dépressions psychiques, la grossesse, la lactation. Quant aux formes secondaires, elles relèvent de causes fort nombreuses, parmi lesquelles on peut citer les maladies infectieuses, les hémorragies à répétition, les néoplasmes malins, les vers intestinaux, etc., etc.

Nous n'avons pas à discuter ici la valeur relative de ces divers éléments étiologiques. Le but que nous nous proposons, en effet, est simplement d'établir l'importance du rôle des parasites dans la production de l'anémie progressivement mortelle, et surtout la diversité des êtres qui sont appelés à remplir ce rôle, en prenant pour base les recherches qui ont été poursuivies depuis longtemps sur ce sujet dans la pathologie des animaux, aussi bien que l'ensemble de nos observations personnelles. Nous n'avons donc d'autre prétention que d'esquisser un chapitre de pathologie comparée, dont le cadre ne tardera pas sans doute à s'élargir.

I

L'action nuisible des parasites sur la santé de leur hôte est susceptible de se manifester suivant des modes assez variés, dont quelques-uns seulement méritent d'être retenus en ce qui concerne la production des troubles que nous devons envisager.

En premier lieu, ils peuvent se nourrir aux dépens des matériaux solides ou liquides de l'organisme, ou même aux dépens des substances éla-

borées en vue d'une absorption ultérieure ; il s'agit alors d'une véritable action *spoliatrice*, directe ou indirecte, dont les effets doivent retentir à bref délai sur l'économie, et se traduire essentiellement par un appauvrissement progressif du sang.

D'autre part, leur présence dans certains organes peut être le point de départ d'une *gêne mécanique* apportée à l'accomplissement des fonctions, soit par le fait d'une obstruction partielle ou complète des canaux dans lesquels ils sont logés, soit par suite de la compression des tissus voisins.

Enfin, des *traumatismes* plus ou moins complexes peuvent être le résultat de cette compression même, aussi bien que des déplacements effectués par les parasites ou par leurs embryons.

Et si l'on tient compte des troubles nutritifs ainsi que des désordres nerveux qui sont la conséquence nécessaire de telles modifications, on aura une idée assez complète des manifestations pathologiques d'origine parasitaire appelées à se traduire par le développement de l'anémie pernicieuse.

Il est clair, cependant, qu'on doit attacher une importance particulière au premier de ces chefs d'accusation. C'est surtout par la soustraction directe des matériaux appartenant en propre à l'organisme que les parasites provoqueront une diminution de la masse totale du sang, ainsi que les altérations qualitatives de ce milieu, et tous les troubles qui en sont la conséquence. Le même résultat sera produit sans doute, mais moins rapidement, par les commensaux trop exigeants qui emprunteront à leur hôte une grande part des produits élaborés à son intention. Moins importants en principe, les troubles résultant de la compression des organes doivent toutefois être pris aussi en considération, comme on pourra s'en convaincre en étudiant le rôle des Coccidies et des Echinocoques. Quant aux phénomènes provoqués par les mouvements et les migrations des parasites ou de leurs embryons, on ne peut leur reconnaître qu'une influence d'ordre secondaire, en raison de leur durée toujours assez limitée. Et pourtant les traumatismes des parasites établis à demeure dans un organe sont-ils susceptibles d'amener, outre une perte réelle de sang, des troubles inflammatoires capables de porter une atteinte sérieuse à l'intégrité des fonctions. Enfin, nous pouvons encore signaler l'inoculation de produits venimeux, attribuée par quelques auteurs à certains parasites, dont la principale action consisterait alors en un véritable empoisonnement de l'organisme.

Mais, encore que ces considérations générales suffisent à expliquer le développement de l'anémie pernicieuse par le fait du parasitisme, on ne peut être autorisé à conclure de la présence des parasites à l'évolution nécessaire de la maladie. En matière de parasitisme, il importe de ne pas négliger, comme trop de médecins ont aujourd'hui de la tendance à le faire, l'influence du terrain. S'il en était besoin, on pourrait rappeler, à cet égard, les instructives expériences de Delafond sur la gale isoroptique du mouton.

Qu'il nous suffise donc de constater, une fois pour toutes, que si l'anémie pernicieuse peut résulter des attaques d'un nombre relativement restreint de parasites, alors que ceux-ci rencontrent un terrain tout préparé, il arrive, par contre, que la présence d'un grand nombre de ces mêmes parasites n'occasionne aucun trouble sérieux dans la santé des individus envahis, lorsque ces individus offrent à leurs attaques des conditions spéciales de résistance. C'est l'éternelle question de la lutte pour l'existence, et l'anémie, comme tant d'autres affections parasitaires, n'est susceptible d'évoluer que dans le cas où la résistance de l'hôte est trop faible, ou qu'elle est vaincue par l'excessive multiplication des parasites.

Si d'ailleurs on cherche à déterminer les conditions propres à mettre ainsi l'hôte en état d'infériorité vis-à-vis de son ennemi, on arrive à reconnaître qu'elles sont analogues à celles dont on signale l'intervention dans le développement de l'anémie essentielle. Il s'agit, en effet, des influences débilitantes de toute nature : travail excessif, alimentation insuffisante, fréquentation des localités humides, etc. Cette dernière condition est du reste en relation avec le mode de développement de la généralité des parasites que nous aurons à incriminer.

S'agit-il maintenant d'aborder l'étude de ces parasites ? nous constaterons qu'ils siègent à peu près exclusivement dans les viscères intra-abdominaux, et en particulier dans le foie et dans l'intestin. C'est du moins ce qui a été noté chez les animaux, et ce que nos propres observations nous ont permis de vérifier.

II

On a cependant fait intervenir des parasites qui vivraient dans le sang même, auquel ils emprunteraient directement les éléments de leur nutrition. Mais nous ne croyons pas devoir nous étendre sur ce sujet, à l'endroit duquel il reste encore quelque obscurité, d'autant qu'une telle étude dépasse un peu les limites de notre domaine, et que les belles recherches de Laveran, Marchiafava et Celli, sur les organismes observés dans les cas de malaria, n'ont

pas encore trouvé leur pendant dans la pathologie des animaux.

Nous noterons seulement en passant que Zschökke et Fröhner ont signalé, il y a quelques années, la présence d'organismes spirales dans le sang de chevaux affectés d'anémie pernicieuse. De même, les vétérinaires de l'armée anglaise ont observé dans l'Inde une affection connue sous le nom de « surra, » sévissant sur les chevaux, les mulets et les chameaux, et présentant tous les caractères d'une anémie progressivement mortelle ; or, le Dr Griffith Evans a découvert dans le sang des animaux malades, comme de ceux infectés expérimentalement, un organisme flagellé auquel Crookshank a donné le nom de *Trichomonas Evansi* (*Hæmatomonas Evansi*, Osler.)

Mais, sans nier l'exactitude de ces observations, nous avons peu de tendance à accuser les hématozoaires de jouer un rôle important dans la production de l'anémie, en constatant l'influence négative, à cet égard, des vers qui s'observent fréquemment dans le sang des animaux. Témoins les larves du Sclérostome armé du cheval, les embryons de la *Filaria recondita* du chien, etc.

III

Le rôle des parasites du foie et de l'intestin est établi d'une façon beaucoup plus précise. Nous ne ferons cependant qu'une étude sommaire des premiers, dont l'histoire est depuis longtemps connue, et nous nous attacherons plus spécialement à ceux qui ont l'intestin pour habitat.

Parmi les nombreux parasites du foie, nous n'avons d'ailleurs à faire intervenir que les Distomes, les Échinocoques et les Coccidies.

A. Le type le plus anciennement connu d'une anémie progressivement mortelle déterminée par des parasites se rapporte sans doute à l'affection vulgairement désignée sous le nom de « pourriture » et que les auteurs ont décrite sous celui de *cachezie aqueuse*. A la vérité, ces expressions s'appliquent à la plupart des formes d'anémie constatées chez les herbivores, et en particulier à toutes celles d'origine parasitaire. Mais, parmi ces dernières, celle qui tient évidemment le premier rang est provoquée par la présence, dans les canaux biliaires de certains vers plats, de l'ordre des Trématodes, appelés Douves ou Distomes : d'où le nom de *distomatose* sous lequel on la désigne actuellement.

L'agent principal de cette affection est le Distome hépatique ou grande Douve du foie (*Distoma hepaticum*), auquel vient fréquemment s'adjoindre, mais à titre secondaire, le Distome lancéolé ou petite Douve (*Distoma lanceolatum*). Nous croyons inutile de rappeler ici le mode d'évolution de ces vers

qu'on trouvera exposé dans les récents traités classiques de zoologie médicale. Bornons-nous à dire que cette évolution ne peut s'accomplir que dans l'eau, et que la forme larvaire ultime (cercaire) de la grande Douve, en particulier, s'enkyste sur les plantes aquatiques, à la faveur desquelles, sans doute, elle est introduite dans l'organisme des herbivores, notamment des moutons.

Il est à peine besoin de faire remarquer que l'infestation de ces animaux a lieu surtout pendant la belle saison : l'automne paraît être de beaucoup l'époque la plus favorable, et souvent alors un grand nombre d'animaux sont atteints à la fois. Ajoutons que, comme dans la plupart des affections parasitaires, ce sont les individus jeunes qui sont le plus fréquemment envahis.

Lorsque les larves de Distomes ont pénétré dans les canaux biliaires, elles se développent rapidement : en six semaines environ, elles se sont transformées en Distomes adultes.

Pour peu que leur nombre soit élevé, la maladie ne tarde pas à évoluer. On remarque d'abord que les animaux sont moins vifs et moins gais. Les muqueuses et la peau sont plus pâles qu'à l'état normal. Cependant, l'appétit est conservé, et les animaux ont même une tendance marquée à s'engraisser ; mais bientôt l'appétit diminue ; une soif fréquente se manifeste ; la rumination est troublée. La peau se montre empâtée, œdémateuse. La conjonctive pâlit davantage, s'infiltre et se présente, à l'exploration de l'œil, sous la forme d'un bourrelet blanc jaunâtre caractéristique.

Peu à peu l'amaigrissement s'accuse ; les animaux deviennent faibles, réagissent à peine quand on les excite. Les œdèmes se localisent et s'accroissent dans les parties déclives, aux membres et sous la mâchoire inférieure ; il survient également de l'hydropisie abdominale. Enfin, l'affaiblissement devient tel que les animaux finissent par succomber, après une période de trois à six mois en moyenne. Il est rare d'observer une réelle guérison, à la suite d'une expulsion spontanée des Douves.

À l'autopsie, on constate une diminution de la masse totale du sang, de la proportion des globules rouges et de celle de l'albumine ; un amaigrissement considérable ; des épanchements dans les séreuses, une infiltration du tissu conjonctif sous-cutané et une décoloration générale des tissus, sans parler des lésions localisées au foie et dues à l'action directe des parasites.

Les Douves se nourrissent-elles de bile, comme quelques auteurs ont encore de la tendance à l'admettre ? Nous croyons avoir établi récemment qu'elles vivent surtout de sang puisé dans les vaisseaux du foie. Mais il n'en est pas moins

vrai que les troubles qu'elles déterminent tiennent en partie aux altérations développées par leur présence dans cet organe.

La distomatose n'atteint pas seulement le mouton ; elle sévit aussi sur les autres ruminants domestiques ; Bassi l'a même observée chez des cervidés, Cadéac chez l'âne, Thomas chez le lièvre et le lapin de garenne, et nous-même chez le lapin domestique. Ce sont néanmoins les moutons qui payent le plus fort tribut à cette maladie, et l'historique a enregistré les dates d'épizooties redoutables de cette nature, survenues toujours à la suite de pluies abondantes et prolongées. Quant à l'homme, bien qu'il puisse être envahi par les Douves, il ne se montre généralement pas infesté à un degré suffisant pour présenter les troubles caractéristiques de la maladie. C'est sans doute en mangeant des salades, et en particulier du cresson, qu'il subit cette contamination.

B. La Coccidie oviforme (*Coccidium oviforme*) est un minuscule parasite du groupe des Sporozoaires, qui se développe dans les cellules épithéliales des canaux biliaires du lapin, puis tombe avec elles dans la lumière de ces canaux, où il s'enkyste sous la forme d'un petit corps semblable à un œuf d'helminthe. L'accumulation des Coccidies donne lieu à la formation de poches irrégulières qui apparaissent à la surface du foie comme des nodosités blanchâtres, et amènent souvent une augmentation considérable du volume de l'organe.

Les lapins affectés de cette maladie — la coccidiose hépatique — maigrissent et succombent souvent au bout de deux ou trois mois, dans un état cachectique comparable à celui qu'ils présentent dans les cas de distomatose, et qu'on désigne vulgairement sous le nom de « gros ventre », nom qui s'applique du reste à toutes les formes de l'anémie pernicieuse des léporidés. Cette maladie sévit surtout sur les lapins domestiques, mais il n'est pas rare de l'observer, dans les années pluvieuses, chez les lapins de garenne, comme Moniez l'a le premier signalé. On sait aussi qu'elle peut atteindre l'homme.

C. Les Échinocoques (*Echinococcus polymorphus*) représentent la phase cystique d'un très petit Ténia (*Tenia Echinococcus*) qui, à l'état adulte, vit principalement dans l'intestin du chien.

Ils se rencontrent le plus souvent chez les herbivores, et en particulier chez les ruminants. On peut les observer dans la plupart des organes ; mais, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, c'est seulement lorsqu'ils siègent dans le foie que leur présence paraît s'accompagner d'anémie. Leur action, du reste, est souvent connexe avec celle des Douves, et les troubles qu'elle provoque sont à peu près du même ordre, notamment chez le mouton.

IV

Nous arrivons enfin aux parasites de l'intestin, dont l'influence, au point de vue qui nous occupe, n'a guère fait l'objet d'études suivies que dans ces dernières années.

Ils se rapportent plus spécialement aux deux ordres des Cestodes et des Nématodes.

A. L'intestin du mouton donne asile à une dizaine d'espèces de Ténias, dont il serait fastidieux de rapporter ici la liste. Les Ténias se montrent particulièrement abondants au cours des années humides, et certains d'entre eux acquièrent parfois des dimensions extraordinaires. Ils sont alors susceptibles de causer, surtout chez les individus jeunes, qu'ils attaquent de préférence, une affection particulière, que les Allemands appellent *Bandwurmseuche*, et qui n'est évidemment, comme en témoigne l'étude des symptômes et des lésions, qu'une forme d'anémie pernicieuse.

De même, on a signalé depuis longtemps, chez les lièvres et les lapins, des épizooties de « gros ventre » occasionnées par des Ténias, dont ces animaux hébergent au moins six espèces différentes.

Nous nous bornerons à rapprocher de ces faits les nombreux cas d'anémie pernicieuse signalés chez l'homme depuis quelques années comme résultant de la présence dans l'intestin du Bothriocéphale large (*Bothriocephalus latus*), ver qui se développe, comme on sait, à la suite de l'ingestion de diverses espèces de poissons.

B. En ce qui a trait au groupe des Nématodes, nous pouvons faire remarquer tout d'abord que le rôle le plus important, dans la production de l'anémie pernicieuse, est dévolu aux Strongylidés.

α. Le parasite le plus complètement étudié à ce point de vue est sans contredit l'Ankylostome de l'homme (*Uncinaria duodenalis*). Il ne sera pas inutile, par conséquent, de rappeler en quelques mots l'histoire de cet helminthe. Découvert en 1838, par Dubini, dans l'intestin d'une jeune paysanne morte à l'hôpital de Milan, il avait été assez généralement considéré comme un parasite inoffensif, lorsque Perroncito démontra qu'il était la cause directe d'une maladie sévissant avec intensité parmi les ouvriers occupés au percement du Saint-Gothard. Peu de temps après, on reconnut qu'il était également le point de départ de l'anémie des mineurs si fréquente à Saint-Étienne, à Anzin et à Commeny. En Belgique, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, pareille constatation a été faite, non seulement chez les mineurs, mais chez les briquetiers, les tuiliers, etc. On peut ajouter, enfin, que le ver a été rencontré dans les diverses parties du monde, et que partout il détermine une grave maladie, dont le nom varie suivant les localités,

mais qui n'est en réalité qu'une forme d'anémie pernicieuse.

L'Ankylostome vit dans l'intestin grêle, et en particulier dans le duodénum; à la faveur de sa puissante armature buccale (fig. 1), il se fixe à la muqueuse, la perce et dilacère les vaisseaux capillaires: le sang qui s'échappe de cette blessure est en partie sucé par le ver, et en partie répandu dans l'intestin. Il est facile de comprendre que ces saignées répétées amènent rapidement un grave état cachectique, tout au moins lorsque les parasites sont nombreux et qu'ils agissent sur un organisme débilisé. F. Lussana a même prétendu récemment que ces vers inoculent des produits toxiques, propres à dissoudre l'hémoglobine, opinion analogue à celle émise antérieurement par Schapiro au sujet du Bothriocéphale.

Le développement de l'Ankylostome est direct: les œufs rejetés avec les excréments évoluent au sein de ces matières ou dans la terre humide; il en sort un embryon qui subit plusieurs mues. La larve définitive peut séjourner assez longtemps dans l'eau ou dans la vase, jusqu'à ce qu'elle soit introduite dans l'organisme avec la boue qui souille les mains, les aliments ou les objets qu'on porte à la bouche.

Il faut ajouter que les Ankylostomes paraissent être parfois aidés, dans leur action pathogène, par d'autres petits vers connus sous le nom d'Anguillules (*Rhabdonema stercorale*).

β. Une affection tout à fait comparable à l'ankylostomatose de l'homme a été signalée chez le chat, dès 1876, par Grassi et C. Parona. Les animaux atteints se montrent d'abord moins vifs qu'à l'état normal; puis ils perdent l'appétit, maigrissent et ne tardent pas à présenter tous les caractères d'une anémie qui s'accuse peu à peu jusqu'à la mort. A l'autopsie, on trouve souvent, dans l'intestin, jusqu'à deux cents vers et plus. Ces vers ont été décrits sous le nom de *Dochmius Balsani*; nous avons montré qu'ils sont identiques à l'Ankylostome commun du chien (*Uncinaria trionocephala*).

γ. On connaissait aussi depuis longtemps, chez le chien, une maladie dite *anémie des meutes*, dont l'origine était demeurée fort obscure, lorsque nous avons signalé, M. Trasbot et moi, la présence d'An-



Fig. 1. — Extrémité céphalique de l'Ankylostome de l'homme, grossie 120 fois.

kylostomes dans l'intestin des animaux atteints (1880). Il nous paraît inutile d'insister sur les caractères de cette maladie ; nous n'aurions guère qu'à répéter ce que nous avons dit à propos de l'ankylostomatose de l'homme et du chat. Un

seul point est à noter : c'est la fréquence des épistaxis, qui ont fait parfois appliquer à cette affection le nom vulgaire de « saignement de nez des chiens de meute ». Comme l'indiquent ces diverses expressions, cette ankylostomatose ne s'observe guère que sur les chiens entretenus en meute, mais elle fait de grands ravages parmi ces animaux. Les vers qui la déterminent appartiennent à deux espèces distinctes, l'Ankylostome ou Uncinaire trigonocéphale (*Uncinaria trigonocephala*) et l'A. sténocéphale (*U. stenocephala*). On a prétendu qu'ils sont aidés par d'autres vers habitant le cæcum (*Trichocephalus depressusculus*), mais nous avons pu montrer que cette donnée n'était pas assez sérieusement établie.

3. La production de l'anémie peut être aussi le fait d'helminthes voisins des Ankylostomes, quoique un peu moins puissamment armés qu'eux : nous voulons parler des Sclérostomes.

Disons seulement que Carità rapporte au *Sclerostoma hypostomum* une anémie mortelle qu'il a observée chez un mouton, et que nous avons constaté nous-

même la présence d'une multitude de *Sclerostoma tetracanthum* dans le cæcum de chevaux morts aussi d'anémie.

4. Tous les Strongylidés qui viennent de nous occuper, Ankylostomes et Sclérostomes, ont en somme une organisation spéciale de la bouche qui leur permet d'attaquer facilement la muqueuse du tube digestif ; mais il existe aussi d'autres vers de la même famille qui, sans posséder d'armature buccale chitineuse, ont néanmoins une pareille aptitude à perforer les muqueuses et à sucer le sang de leur hôte : ce sont des Strongles vrais.

L'un d'entre eux, le Strongle contourné (*Strongylus contortus*, fig. 2), vit dans la cailliette, c'est-à-dire dans le véritable estomac du mouton, de la chèvre et parfois même du bœuf. L'affection qu'il détermine, et qui est appelée pour ce motif *strongylose de la cailliette*, a été primitivement observée dans l'Europe centrale, mais nous avons eu aussi l'occasion de l'étudier en

France. Elle sévit souvent à l'état épizootique, dans les localités à eaux stagnantes ou pendant les années humides, attaque de préférence les jeunes animaux, et se traduit, comme les précédentes, par une anémie progressive, avec le cortège symptomatique habituel. A l'autopsie, on trouve, outre les altérations ordinaires de la cachexie aqueuse, des centaines et même des milliers de Strongles, gorgés de sang pour la plupart. Le mode de développement de ces vers est d'ailleurs le même que celui des Ankylostomes.

Le Strongle contourné est généralement aidé, dans son action spoliatrice, par un autre Strongle, de dimensions beaucoup moindres, le Strongle filicoll (*Strongylus filicollis*, fig. 3), qui peut habiter comme lui la cailliette, mais qu'on trouve le plus souvent, et en nombre extraordinaire, dans l'intestin grêle. Il peut même arriver, comme nous l'avons vu récemment sur la chèvre, et comme Chédhomme l'avait sans doute vu sur le mouton, que la présence de ce seul Strongle filicoll s'accompagne d'anémie.

5. Pour terminer, nous signalerons une *strongylose de l'estomac et de l'intestin* que nous venons d'étudier sur des lièvres et des lapins de garenne, et qui présente, avec celle du mouton, un parallélisme remarquable. Elle est, en effet, déterminée aussi par deux Strongles, l'un d'assez grande taille, le Strongle rayé (*Strongylus strigosus*, fig. 4), vivant dans l'estomac, et l'autre beaucoup plus petit, le Strongle rétrortiforme (*Strongylus retortiformis*, fig. 5), siégeant surtout dans le duodénum. Ce sont également des sucres de sang, et l'affection qu'ils causent est encore une de celles qu'on désigne sous le nom vulgaire de « gros ventre ». Pour donner une idée des ravages qu'ils peuvent occasionner, il nous suffira de dire que dans un parc où nous avons étudié la maladie, il est mort, dans l'espace de six mois — de juillet à décembre 1888 — plus de cinq cents lapins sur une population approximative de mille à douze cents sujets.

V

Du rapide exposé qui précède, il ressort que l'anémie pernicieuse d'origine parasi-




Fig. 2.
Extrémité
céphalique
du Strongle
contourné,
grossie
40 fois.



Fig. 3.
Extrémité
céphalique
du Strongle
filicoll,
grossie
300 fois.



Fig. 4.
Extrémité
céphalique
du Strongle
rayé,
grossie
40 fois.
b — bouche.
œ — œsophage.
I — Intestin.



Fig. 5. —
Extrémité
céphalique
allée d'un
Strongle ré-
trortiforme,
grossie
300 fois.

taire, loin de constituer une affection propre à l'homme, s'observe fréquemment chez les animaux, et non pas seulement chez ceux qui sont entretenus en domesticité, mais encore chez diverses espèces sauvages. Elle est le fait de parasites fort variés, siégeant pour la plupart dans l'intestin ou dans le foie, et dont le mode d'action, quoique imparfaitement connu, paraît se rattacher en grande partie à une soustraction directe de matériaux nutritifs. Il reste sur ce point d'intéressantes recherches à poursuivre.

Quant aux manifestations de la maladie, il est facile de reconnaître qu'elles répondent à une évolution générale sensiblement constante, mais présentent certaines variations secondaires, en

rapport avec la nature des parasites, avec l'organe envahi, avec l'espèce et l'état particulier de l'individu attaqué.

Mais, ce qu'il importe de noter, c'est qu'une fois le parasite expulsé, la maladie doit tendre à la guérison, à moins que les lésions locales ne soient irréparables, ou que la déchéance organique n'ait atteint un degré extrême. Inutile d'ajouter que cette expulsion, parfois spontanée, peut être provoquée par un traitement spécial, dont les indications doivent varier suivant les circonstances.

A. Railliet.

Professeur
à l'Ecole Nationale Vétérinaire
d'Alfort.

LA SYNTHÈSE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE SANS CHLOROPHYLLE NI LUMIÈRE

Des expériences célèbres, dues à Priestley, Ingen-Housz, Sennebiez, Th. de Saussure, Garreau et Boussingault, ont conduit à admettre que la chlorophylle, ou plus exactement le protoplasma vert est « le seul agent des combinaisons synthétiques du carbone, la seule voie pour l'introduction de cette substance dans l'organisme, végétal ou animal (1). »

Plus tard, quand M. Pasteur eût réussi à cultiver des levûres dans des solutions de sels minéraux et de produits organiques *artificiels* (2), fut établi ce fait capital que certaines cellules incolores sont susceptibles de former, aux dépens de ces composés et à l'abri des rayons solaires : albuminoïdes, cellulose, matières protéiques, amides, alcools, acides, éthers, etc... Claude Bernard s'est efforcé de prouver que c'est là un phénomène général, que toutes les cellules se comportent, sous ce rapport, de la même façon : la graisse d'un chien ne provient pas *directement* de celle qu'il a mangée (Bernard et Berthelot); en réalité il *fabrique* tous ses principes immédiats.

Cependant il convient de remarquer combien ces synthèses diffèrent de celles qu'accomplissent à la lumière les cellules à chlorophylle. L'énergie nécessaire aux premières leur est fournie par la

combustion de l'aliment ou la décomposition de la matière fermentescible. Aussi réclament-elles, comme point de départ, des composés endothermiques assez élevés. Au contraire le protoplasma vert, empruntant à la radiation solaire la chaleur dont il a besoin pour assimiler le carbone de l'acide carbonique, peut, en l'absence de toute molécule plus complexe, créer de la matière organique. En 1878 l'illustre physiologiste que nous venons de citer, écrivait à ce sujet : « Si une plante n'a point de parties vertes, elle ne pourra vivre qu'à la condition de trouver tout préparés dans le milieu extérieur les principes qu'antérieurement aura élaborés la chlorophylle de quelque autre plante. Ainsi en sera-t-il des parasites végétaux, des champignons, des mucédinées, des êtres monocellulaires qui doivent trouver sur l'être qui les porte ou dans le milieu qui les baigne ces mêmes principes indispensables, source de leur activité protoplasmique (1). »

Boussingault a résumé ces idées en disant : « Si la radiation solaire cessait, non seulement les végétaux à chlorophylle, mais encore les plantes qui en sont dépourvues, disparaîtraient de la surface du globe. » Il aurait pu ajouter : et les animaux, à la vie desquels, directement ou indirectement, le règne végétal est indispensable.

On considère donc aujourd'hui comme chose démontrée que, sous l'influence de la lumière, le protoplasma pourvu de chlorophylle opère, à partir

(1) Claude BERNARD, *Leçons sur les phénomènes de la vie*, t. I, p. 212.

(2) En réalité M. Pasteur employait de l'alcool, de l'acide acétique, de l'acide lactique, provenant des êtres vivants. Si nous qualifions ces substances d'*artificielles*, c'est que la chimie moderne sait en opérer la synthèse.

(1) *Loc. cit.* p. 220.

des éléments, la synthèse de la matière organique, et que telle est l'unique origine du carbone combiné chez tous les êtres vivants.

I

Un travail récent de M. Sergius Winogradsky vient d'infirmer cette doctrine. L'auteur a poursuivi, à l'Institut hygiénique de l'Université et au laboratoire de chimie agricole du Polytechnicum de Zurich, une série d'expériences (1), d'où il résulte que, dans la plus complète obscurité, l'agent microbien de la nitrification, qui est une bactérie incolore, fabrique de la matière organique dans des liquides d'où l'on a pris soin d'en éliminer les moindres traces.

L'importance de ce fait nous oblige d'en indiquer les preuves avec quelque détail :

Dans une série de recherches, devenues classiques, MM. Schloesing et Muntz ont déterminé les conditions chimiques de la formation naturelle du salpêtre. Les sols où ce corps prend naissance contiennent, à côté d'un sel potassique, du carbonate ou du sulfate d'ammoniaque. L'oxydation de l'ammoniaque donne de l'acide nitrique qui s'unit à la potasse : ainsi se constitue le nitrate de potasse ou salpêtre. Quant à l'oxydation de l'ammoniaque, les auteurs l'ont attribuée à un ferment animé : seul en effet le développement d'un être vivant, susceptible de multiplication indéfinie, pouvait expliquer la nitrification par ensemencement, la suspension du phénomène sous l'influence des anesthésiques, l'arrêt définitif de la réaction dans des circonstances incompatibles avec l'existence de la vie.

Cette conclusion s'imposait ; néanmoins jusqu'à ces dernières semaines personne n'avait réussi à découvrir l'agent présumé de la métamorphose. M. Winogradsky vient d'y arriver.

La méthode, qu'il a imaginée dans ce but, est des plus ingénieuses :

Le sol où se forme le salpêtre renferme une grande variété de micro-organismes. Pour en isoler le ferment nitrificateur, les procédés de *fractionnement* en usage dans les laboratoires semblaient tout indiqués. Ces procédés consistent à diluer dans un liquide stérilisé une parcelle de la matière en fermentation, puis à distribuer de fines gouttelettes du liquide dans divers milieux nutritifs, également stérilisés. On sépare ainsi les uns des autres les microbes qui étaient, pour ainsi dire, contigus dans la parcelle primitive. Semés isolément, chacun dans un matras, ils donnent alors, s'ils se développent, des *cultures pures*, au moyen

desquelles on détermine ensuite leurs propriétés caractéristiques.

Quand on se sert de solutions de gélatine pour opérer ce fractionnement, on pratique l'ensemencement dans la solution liquéfiée à une douce chaleur (A, fig. 1), et on la répand, sans tarder, sur une lame de verre (B, fig. 1) ; elle s'y solidifie tout de suite par refroidissement. La plupart des microbes semés sont de cette façon emprisonnés en diverses régions de la plaque ; chacun d'eux, proliférant, y donne naissance à une *colonie* d'êtres semblables que, pendant un certain temps, l'état solide du milieu nutritif preserve de toute conta-




Fig. 1. — A, Tube à essai contenant une solution neutre de gélatine additionnée ou non de peptone et de sels minéraux. Le tube est bouché par un tampon de ouate et stérilisé par la chaleur avant d'être ensemencé ; — B, plaque de verre stérilisée sur laquelle on a répandu la gélatine du tube A aussitôt après l'ensemencement de ce tube. La plaque, conservée à l'abri des germes de l'air, se couvre, au bout de quelques jours, de colonies 1, 2, 3...8, apparaissant aux points où les microbes semés ont été fixés par la solidification de la gélatine.

mination. Les colonies (1, 2, 3, 4...8 en B, fig. 1) arrivent à constituer de petites taches visibles à l'œil nu ou à la loupe : on peut les y recueillir à l'état d'absolue pureté.

II

C'est là le procédé le plus souvent employé dans les laboratoires pour séparer les bactéries. Malheureusement, lorsqu'on l'applique à la recherche du ferment nitrificateur, on n'isole que des microbes incapables d'oxyder les sels ammoniacaux. M. Winogradsky conclut de cet échec que le milieu de culture employé ne convient pas à l'agent microbien de la nitrification. Aussi résolut-il d'abandonner une méthode qui, dans l'espèce, manifestait une évidente impuissance, et s'appliqua à en inventer une autre. Ses efforts se concentrèrent alors sur le problème suivant : déterminer très-exactement la composition des liquides où la nitrification s'opère avec tendance à éliminer les

(1) *Annales de l'Institut Pasteur*, avril 1890.

microbes non adaptés au phénomène. Il fut ainsi amené à employer l'eau du lac de Zurich additionnée de sulfate d'ammoniaque, de phosphate de potasse, de carbonate basique de magnésie et d'une petite quantité de terreau. Dans ces conditions la nitrification s'accomplit rapidement.

M. Winogradsky remarqua que la couche de carbonate de magnésie déposée au fond de ses matras se couvrait d'un voile grisâtre de consistance gélatineuse, constitué par la zoogée d'une bactérie ovale, imprégnée de cristaux d'un carbonate alcalin. « L'impression que faisaient ces formations était qu'elles ne sont pas un mélange accidentel du microbe avec le sel, mais qu'elles sont dues à l'action de l'être, qui se fixe sur les particules du précipité et les englobe dans la matière gélatineuse qu'il sécrète. Il n'y avait nulle trace de ces bactéries à la surface du liquide, ni sur les parois des vases; toutes se concentraient dans la couche de la base carbonatée, qui disparaissait à vue d'œil, dissoute par leur action (1) ». Ces faits semblaient indiquer que la bactérie de la zoogée était le ferment cherché. Cependant chaque fois qu'on la semait en milieu solide, on n'obtenait que des colonies d'organismes incapables de produire la fermentation. M. Winogradsky eut alors l'idée de fractionner la zoogée dans un milieu liquide identique à celui où il avait obtenu la nitrification, mais *tout à fait exempt de matière organique*. Dans un tel milieu les microbes étrangers ne se développent pas, tandis que la bactérie zoogéique se multiplie. Par une série d'ensemencements successifs, on peut réduire le nombre des impuretés. Vient-on alors à *fractionner* dans la gélatine une gouttelette du liquide riche en bactérie zoogéique et pauvre en microbes étrangers, ceux-ci forment çà et là quelques rares colonies; entre elles se voit l'emplacement des gouttes où la bactérie zoogéique a été déposée seule: on constate que rien n'y pousse. Il suffit donc d'y puiser pour en rapporter à l'état pur le ferment présumé.

En le semant dans des liquides préalablement stérilisés et préparés comme il a été dit plus haut, sans trace de matière organique, on y détermine une abondante production de salpêtre. D'autre part, si l'on verse quelques gouttes de ces liquides dans la gélatine, aucune colonie n'apparaît en ce dernier milieu. La bactérie zoogéique a donc bien été isolée; partant c'est à elle qu'il convient d'attribuer le phénomène de la nitrification.

III

Comme on le voit, ce travail est, quant à la méthode, marqué au coin de l'originalité: il étend

nos moyens d'action sur les microbes et servira de modèle dans les recherches où l'on se proposera de les isoler. Déjà la fécondité du procédé est brillamment attestée par le résultat que M. Winogradsky en a obtenu: en isolant le nouveau microbe, en prouvant qu'il produit la nitrification, l'auteur a fait mieux que de découvrir la cause de ce phénomène; il est arrivé à ce résultat inattendu, — contraire à tout l'enseignement biologique actuel, — qu'une cellule, privée de chlorophylle et soustraite à la lumière, peut, en de certaines conditions, vivre dans un milieu exclusivement minéral et y opérer la synthèse de la matière organique.

On pourrait objecter à cette conclusion qu'il est très difficile de préparer un milieu de culture rigoureusement exempt de matières organiques, et que d'autre part de très petites quantités de ces substances suffisent à la nutrition des bactéries. Mais M. Winogradsky s'est mis en garde contre cette cause d'erreur. Il eut soin de doser le carbone organique dans ses cultures et put ainsi constater qu'il ne cesse de s'y accumuler depuis le commencement jusqu'à la fin de la nitrification (1). C'est donc bien dans des solutions exclusivement minérales qu'il a obtenu le développement de son ferment et, d'une façon corrélatrice, l'oxydation de l'ammoniaque.

Cette dernière réaction, qui est exothermique, semble fournir à la cellule vivante l'énergie requise pour ses synthèses. Il paraît en effet impossible d'admettre dans la bactérie de M. Winogradsky l'existence d'une chlorophylle incolore, athermane à l'égard de certaines radiations obscures et par suite susceptible d'accumuler, en les absorbant, la force vive que réclame la formation des hydrates de carbone et des albuminoïdes. Si cette hypothèse était bien fondée, l'acide carbonique serait décomposé et l'on constaterait, comme dans le phénomène chlorophyllien ordinaire, un dégagement notable d'oxygène. Or, bien que l'auteur ait porté son attention sur ce point, il ne réussit à découvrir dans la nitrification la plus active aucune production de ce gaz. C'est ce qui l'a conduit à chercher dans les réactions du milieu minéral l'énergie nécessaire à la création de la matière organique. La portée de cette interprétation n'échappera à personne: c'est en biologie le commencement d'une révolution dont on prévoit déjà les conséquences sans pouvoir encore en déterminer les limites.

Louis Olivier.

(1) *Loc. cit.*

(1) *Comptes rendus Acad. Sc.*, 12 mai 1890.

REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE

Le nombre des travaux de physique qui sont publiés annuellement tant en France qu'à l'étranger est considérable, et leur seule indication bibliographique complète suffirait pour remplir une brochure compacte, sinon un volume. Nous ne pouvons donc avoir la prétention de les signaler tous, même en un résumé très sommaire : ce résumé serait d'ailleurs sans grand intérêt. Beaucoup de ces travaux ne comportent que l'étude d'un point limité qui ne prend son importance réelle que si on le rapproche des autres recherches faites dans le même ordre d'idées.

Aussi, nous proposant de faire une Revue de physique pour l'année qui vient de s'écouler, nous nous bornerons à l'indication d'un petit nombre de sujets : nous signalerons les découvertes de phénomènes nouveaux, les recherches qui permettent de considérer comme terminée l'étude d'une question, au moins provisoirement, les expériences qui ont conduit à des applications pratiques, les méthodes d'observation originales et qui semblent susceptibles de recevoir des applications variées. Le caractère général de cette revue, qui ne peut avoir la prétention de remplacer les mémoires ou articles détaillés, nous forcera d'ailleurs à négliger les travaux qui ne se rapportent qu'à des détails dont la longueur de l'exposition ne serait pas en rapport avec l'intérêt; nous devons également nous abstenir des sujets qui exigeraient de trop longs développements mathématiques. C'est dire que nous nous résignons d'avance à ne pas être complet, surtout si l'on songe que les questions les plus intéressantes auront été souvent l'objet d'articles spéciaux dans cette *Revue* et que nous devons nous borner à une brève indication dans ce cas. Nous croyons que, malgré ces restrictions, une revue annuelle de physique peut être intéressante et nous ne devons nous en prendre qu'à nous si nos lecteurs ne trouvent pas telle celle que nous nous proposons de leur présenter.

I

Il est, en physique, des questions d'ordre matériel, pourrait-on dire, des questions qui correspondent à des phénomènes mécaniques visibles, comme par exemple celles qui correspondent aux effets produits par des corps en mouvement, notamment par des gaz. Outre que les phénomènes qui se produisent alors peuvent donner lieu à des applications ou qu'ils permettent de fournir une explication

d'effets déjà connus, il est probable que, par l'ensemble des propriétés qui sont successivement mises en évidence ainsi, on arrivera à se former une idée de plus en plus nette de la constitution des corps.

Dans cet ordre d'idées, nous signalerons une étude intéressante de M. J. B. Baille sur l'écoulement des gaz à travers un long tuyau. La méthode ne présente rien de particulier; elle a permis à M. Baille d'étudier notamment les variations de la pression avec les diverses conditions de l'expérience, de déterminer la vitesse moyenne, de mesurer l'abaissement de température qui, pour une même masse de gaz et les mêmes pressions initiale et finale, a été trouvée la même, quelle que fût la durée de l'écoulement. La forme de la veine à la sortie a été déterminée en faisant passer le gaz au-dessus d'une feuille de papier saupoudrée de poudres colorées. Nous ne pouvons que renvoyer à ce travail dont il n'est pas possible d'indiquer les résultats en détail.

Les expériences de M. Weyher sur les mouvements produits dans l'air par l'action d'un corps qui y est animé d'un rapide mouvement de rotation ont montré des effets très curieux, imprévus et qui semblent expliquer l'origine de certains phénomènes dont notre atmosphère est le théâtre. Ces effets sont produits par la rotation de corps faisant de 1000 à 1500 tours par minutes : tantôt on emploie un tourniquet constitué par un cylindre à une base présentant intérieurement des palettes dirigées suivant les rayons, tantôt on fait usage d'une sphère constituée par des méridiens en carton fixés sur l'axe de rotation.

La rotation de ces appareils produit dans l'air des variations de pression et des mouvements qui se traduisent par des effets variés. C'est ainsi que le tourniquet étant placé à 1 m. 50 environ d'une cuvette contenant de l'eau assez chaude pour émettre quelques vapeurs, on voit, lors de la rotation, la surface du liquide présenter une élévation centrale autour de laquelle se produisent des rides spirales mettant en évidence l'existence d'un tourbillon aérien; un peu plus tard les vapeurs s'élèvent en tournant et forment bientôt un fuseau qui s'étend du liquide au tourniquet et qui présente au centre une partie pleine d'air; on vérifie directement à l'aide d'un manomètre que la pression intérieure est moindre que la pression atmosphérique, et, en mettant sur le liquide un petit ballon qui est

bientôt saisi par le tourbillon et élevé jusqu'à la partie supérieure, on s'assure que le tourbillon est ascendant.

L'effet est exactement le même si l'on emploie de l'eau froide et qu'on fasse arriver de la vapeur dans le voisinage du tourniquet.

L'observation des effets que nous venons d'indiquer et d'autres sur lesquels nous ne pouvons nous arrêter montre que ce phénomène présente une très grande analogie avec les trombes dont l'origine serait ainsi déterminée, si cette analogie était absolument acceptée.

On peut également reproduire dans l'air tous les effets d'un cyclone qui se déplace, en faisant mouvoir horizontalement un large tourniquet animé d'un rapide mouvement de rotation à une petite distance d'une table : direction des vents, calme central, variations de la pression atmosphérique, on observe tous les effets signalés par les marins.

Avant d'aborder les effets produits par la sphère tournante, signalons l'attraction exercée par le tourniquet sur un plan situé parallèlement à quelque distance, attraction qui est due à la diminution de pression produite par la rotation. M. Weyher a déterminé les lois de variation de cette attraction.

En faisant tourner la sphère dont nous avons parlé, celle-ci agit comme un ventilateur, aspirant l'air par les régions polaires et le rejetant par l'équateur. Cependant cette sphère agit attractivement par sa partie équatoriale; comme le tourniquet, elle peut donner naissance à une trombe aboutissant à cette région : elle attire un ballon placé dans le voisinage en face de l'équateur et, si ce ballon est libre, il est entraîné et décrit une orbite fermée autour de la sphère et dans le plan de l'équateur.

Il semble y avoir contradiction entre cette attraction et le mouvement de l'air qui s'échappe à l'équateur; mais il faut admettre qu'il se produit dans cette région des tourbillons qui expliquent les effets observés.

Ces expériences, dont quelques-unes produisent des effets imprévus, semblent pouvoir nous renseigner sur la nature des trombes au sujet desquelles les météorologistes n'ont pas encore pu tomber d'accord; elles justifient pleinement la constitution attribuée aux cyclones. Elles ne rendent pas bien compte cependant de l'origine de ces phénomènes, car nous ne voyons pas nettement pour ceux-ci ce qui remplace le tourniquet : elles ne nous en paraissent pas moins cependant très intéressantes et de nature à mériter l'attention des physiciens.

M. Weyher va plus loin et cherche à expliquer à l'aide de tourbillons existant dans l'éther les mou-

vements des planètes, les phénomènes électriques, etc. Nous ne le suivrons pas dans les ingénieuses comparaisons qu'il fait et qui nous semblent prématurées. Il n'en est pas moins curieux de voir reparaître, reposant sur une base expérimentale, l'ancienne hypothèse des tourbillons.

II

Les questions d'acoustique peuvent se rattacher aisément à celles qui se rapportent aux actions mécaniques : ne sait-on pas, maintenant, que les ondes sonores peuvent être étudiées plus complètement et plus exactement à l'aide d'appareils inscripteurs qu'à l'aide de l'oreille même?

Ces questions, qui sont quelquefois un peu négligées, ont donné lieu dans ces derniers temps à quelques travaux qui méritent d'être signalés.

Nous n'insisterons pas sur le phonographe qui a été une des curiosités de l'Exposition : les nouveaux modèles présentés par M. C. S. Tainter sous le nom de *graphophone* et par M. Edison, sous le nom primitif de *phonographe* ne diffèrent en rien comme principe du modèle présenté en 1878 : ils comportent, l'un et l'autre, des perfectionnements très réels : les sons conservent mieux leurs caractères; le *phonogramme* peut être conservé et servir à des auditions multiples. Mais au point de vue physique, rien de particulier n'est à signaler dans ces nouveaux modèles (1). Nous ne savons d'autre part si le *graphophone* et le *phonographe* sont appelés à prendre dans la vie usuelle le rôle important qu'on leur assignait il y a quelques mois, et si les *phonogrammes* sont appelés à remplacer les lettres; nous doutons en tout cas que cette substitution doive avoir lieu prochainement. Signalons toutefois une application importante qui vient d'être faite, paraît-il : on a recueilli en Amérique à l'aide du phonographe des conversations, des légendes, des poèmes d'une tribu d'Indiens dont il ne reste que quelques survivants et qui est certainement appelée à disparaître à bref délai. Il sera possible ainsi de conserver d'une manière exacte la prononciation d'un langage que d'ici quelques années personne ne parlera plus.

M. Neyreneuf, continuant les recherches qu'il a entreprises sur l'harmonica chimique, a fait connaître une série d'expériences sur les conditions de production des sons et sur les particularités que présentent les flammes dans cet appareil. Il a reconnu que les effets diffèrent suivant que la

(1) Si ce n'est le *Gramophone* de M. Berliner, dont nous n'avons pas à parler, puisqu'il a été décrit dans le dernier numéro de cette *Revue*, p. 286.

flamme est petite ou qu'elle occupe une longueur notable du tuyau dans lequel elle brûle. Dans le premier cas, pour qu'il y ait production d'un son, il faut que la longueur du tube qui amène le gaz soit un multiple de la longueur d'onde du son fondamental du tuyau-enveloppe : le tube d'amenée se comporte comme le porte-vent d'un tuyau à anche. Si ce tube d'amenée est court et communique avec une partie dilatée, on peut, en faisant varier les dimensions de celle-ci, obtenir soit le son fondamental, soit les harmoniques du tuyau-enveloppe. Lorsque la flamme est grande, tantôt les vibrations du tube d'amenée agissent seules et tantôt elles coexistent avec celles du tuyau enveloppe : dans ce dernier cas, la flamme présente des apparences remarquables.

Les conditions nécessaires à la mesure directe de la vitesse de propagation du son dans des tuyaux se trouvent assez rarement réalisées; aussi, lorsque l'occasion se présente, est-il intéressant d'en profiter. Une double conduite de 0^m,700 de diamètre et de plus de 6 kilomètres de longueur ayant été établie pour amener à Grenoble des eaux de source, MM. J. Violle et Th. Vauthier se proposèrent de l'utiliser avant qu'elle ne fût mise en service, dans le but de reprendre et de compléter les recherches de Regnault. Nous n'avons pas à nous arrêter sur la méthode employée : elle fut la même que celle de ce physicien dont les appareils originaux furent même mis gracieusement à la disposition des expérimentateurs.

Des expériences de MM. Violle et Vauthier se dégagent d'abord un important résultat qui précise ce qu'il faut entendre par l'expression : *vitesse de propagation* d'une onde sonore, résultat qui a été mis en évidence nettement par l'enregistrement direct, qui permit de noter, en différents points de son parcours, la forme même de cette onde. On pouvait donc noter l'instant du passage du *front* de l'onde et l'instant du *sommet*; la fin de l'onde ne put être appréciée avec exactitude.

Il résulte des expériences de Grenoble que, au début, les diverses parties de l'onde se propagent avec des vitesses différentes, le front marchant plus vite que le sommet qui, dès le début, prend un mouvement uniforme. Mais assez rapidement les vitesses s'égalisent, l'onde prend une forme invariable et la vitesse commune est celle que possédait d'abord le sommet.

La mesure de la vitesse de propagation doit donc être déterminée par celle de son sommet, à moins que l'on n'opère à une distance assez grande de l'origine du mouvement pour que l'onde ait pris sa forme définitive.

Le nombre donné par MM. Violle et Vauthier pour

la vitesse de propagation du son dans l'air libre et sec à 0° est de 331^m,40 par seconde, avec une erreur probable inférieure à 0^m,40. Dans les tuyaux l'influence des parois amène un retard qui est en raison inverse du diamètre et qui dépasse 0^m,46 pour le son du pistolet dans un tuyau de 1 mètre.

Quelques autres conséquences intéressantes résultent encore des recherches dont nous parlons. Parmi celles-ci nous signalerons la constance de la vitesse normale (vitesse du sommet) malgré les variations d'intensité et de hauteur des sons produits; dans le cas où le bruit est produit par la décharge d'un pistolet, l'excès de vitesse du front sur la vitesse normale croît avec l'intensité.

III

Il est toujours intéressant de voir une question traitée et discutée assez complètement pour qu'on ait la conviction qu'il n'y aura plus à y revenir, alors même qu'il ne s'agit pas d'un sujet d'une importance capitale; l'intérêt est augmenté si cette étude conduit à un résultat dont la pratique peut profiter. Telle est l'impression que nous ont fait éprouver les recherches de M. A. Cornu sur ce qu'on appelle le *halo photographique* et ce qu'il propose de désigner seulement sous le nom de *halo de lames épaisses*, car la photographie ne fait qu'enregistrer un phénomène qui n'a point son origine dans l'action chimique de la lumière.

On sait que lorsque l'on veut prendre l'image photographique d'un point lumineux très brillant, on obtient autour de cette image un anneau lumineux plus ou moins large et plus ou moins brillant : c'est cet anneau qui constitue le halo. Sa formation explique le *flou* qui se produit lorsque l'on prend l'image d'une surface très éclairée se détachant sur un fond plus sombre. M. Cornu, après une étude minutieuse des conditions de formation de ce halo dans des circonstances variées, est parvenu à mettre hors de doute son origine.

Lorsqu'une image réelle d'un point lumineux se fait sur une couche translucide déposée sur une plaque de verre (collodion, ou couche mince de peinture) cette image diffuse dans toutes les directions à l'intérieur de la lame; la lumière vient alors rencontrer la seconde face sur toutes les incidences et pour certains points il y a réflexion totale tandis que pour d'autres une partie seulement est réfléchie. La lumière réfléchie revient sur la première face qu'elle éclaire et l'éclairement est le plus vif pour les rayons qui ont subi la réflexion totale : c'est eux qui produisent le halo. Des expériences variées par lesquelles M. Cornu a analysé toutes les conséquences de cette explication rendent celle-ci absolument certaine.

De cette explication découle le moyen d'éviter le halo : il suffit d'empêcher qu'il puisse y avoir réflexion totale sur la seconde face. Pour atteindre ce but, M. Cornu recouvre cette face d'un vernis formé en introduisant du noir de fumée dans un mélange d'essence de girofle et d'essence de térébenthine ayant même indice de réfraction que le verre. Il ne peut y avoir alors réflexion totale à la surface de contact du verre et du liquide, et il ne peut y en avoir non plus à la deuxième surface de la couche de vernis, car la lumière est absorbée par le noir de fumée. Les résultats obtenus par ce procédé sont très satisfaisants : on avait bien auparavant signalé des tours de main qui réussissaient souvent; mais ils ne reposaient sur aucune donnée théorique; aussi faisaient-ils défaut quelquefois. La question est actuellement complètement résolue et il sera possible d'obtenir dans tous les cas des images nettes.

La nécessité d'obtenir des images nettes en photographie s'impose d'ailleurs de plus en plus, au fur et à mesure que ces images sont employées à des mesures, à des déterminations précises. Cet emploi devient de plus en plus fréquent et nous croyons devoir citer deux séries de recherches dans lesquelles la photographie a été employée et qui avaient pour but de recueillir des renseignements sur certaines propriétés des liquides.

M. Gossart s'est proposé de démontrer par l'expérience que le phénomène de caléfaction constitue un cas particulier des phénomènes capillaires et qu'il peut servir à mesurer la tension superficielle des liquides et à étudier les variations de cette tension dans des circonstances diverses. Dans ce but, il a fait l'étude de gouttes épaisses de différents liquides qu'il déposait sur une lame de platine maintenue à une température convenable. En admettant que la tension superficielle est la même sur tout le périmètre de la goutte et que l'angle de raccordement avec la plaque est nul, M. Gossart avait déterminé l'équation théorique d'une section méridienne d'une goutte, ce qui lui avait permis de conclure entre autres éléments la forme de cette section, les épaisseurs et les diamètres de gouttes circulaires ou allongées. La goutte était disposée dans un faisceau lumineux qui pénétrait ensuite dans une chambre noire par une ouverture munie d'un obturateur qui la découvrait pendant $\frac{1}{30}$ de seconde. L'image obtenue était sensiblement égale en grandeur à la goutte, comme il était facile de s'en assurer grâce à un micromètre que l'on plaçait dans le plan de la section méridienne de la goutte et dont on obtenait également l'image sur la plaque sensible.

L'étude des images ainsi obtenues montra que

la section méridienne des gouttes a bien la forme indiquée par la théorie et les mesures des valeurs comparées de la largeur et de l'épaisseur montra également une concordance entre la théorie et les résultats de l'expérience. On est donc conduit à admettre comme démontrés les points qui ont servi à établir la théorie.

Nous n'insistons pas sur d'autres résultats obtenus par M. Gossart, parce que la photographie ne fut pas employée pour les expériences correspondantes et que d'ailleurs la *Revue* en a déjà rendu compte (1).

M. Vauthier s'est proposé d'étudier la vitesse d'écoulement d'un liquide à travers un orifice en mince paroi : cette vitesse est donnée par la formule de Toricelli dans le cas où l'on peut négliger la viscosité du liquide, mais on ne savait pas quelle était l'influence de la viscosité.

Pour déterminer la vitesse d'écoulement d'un liquide tombant verticalement, M. Vauthier mesura la vitesse des bulles d'air qui sont entraînées dans la veine : à cet effet il prenait une image photographique de la veine sur une plaque animée d'un mouvement de translation horizontale. On obtenait sur cette plaque, pour chacune des bulles, une trajectoire qui donnait la direction de la vitesse relative, ce qui permettait de calculer le rapport des deux vitesses composantes et, par suite, de déterminer la vitesse verticale, si l'on connaissait la vitesse horizontale. Dans une série d'expériences, plusieurs plaques étaient fixées sur un volant à axe horizontal placé dans la chambre noire et mù par un moteur électromagnétique. C'est sur ces plaques qu'on projette à l'aide d'un objectif l'image de la veine qui est fortement éclairée, en même temps que l'image d'un orifice circulaire de petit diamètre percé dans un écran porté par un diapason entrete nu électriquement. On conçoit que l'enregistrement des vibrations, en permettant la mesure du temps, donne le moyen de faire des mesures absolues.

La détermination de la vitesse verticale est ici un peu moins simple que nous ne l'avions d'abord indiqué, parce que la plaque se meut circulairement et non horizontalement; mais il est aisé de tenir compte de cette condition.

M. Vauthier opéra d'abord sur l'eau, afin d'avoir un moyen de contrôle de la méthode : il trouva que les vitesses obtenues par l'expérience concordent avec les valeurs fournies par la formule de Toricelli, à $\frac{4}{300}$ près.

En opérant ensuite sur des sirops de glucose de viscosité plus ou moins grande, M. Vauthier recon-

(1) Voyez le n° 2 de cette *Revue*, p. 54.

nut que les résultats sont complètement différents et put calculer, pour chaque cas, la perte de charge. Il trouva que cette quantité croît un peu plus vite que la viscosité.

Ces résultats et d'autres sur lesquels nous n'insistons pas sont intéressants; et, si la méthode, fort ingénieuse, méritait d'être signalée, les données numériques auxquelles elle pourra conduire en l'étendant contribueront à nous fournir des renseignements importants sur les propriétés encore mal connues des liquides. Dans cet ordre d'idées nous aurions à signaler les recherches de M. Schwedoff sur la cohésion des liquides, si elles n'avaient déjà été indiquées dans ce Recueil (1).

IV

L'électricité continue d'être l'objet de recherches nombreuses et d'applications variées : celles-ci ne paraissent cependant pas se développer aussi rapidement qu'on aurait pu l'espérer. Nous ne pouvons cependant passer sous silence, à ce point de vue, le développement important de l'éclairage électrique à l'Exposition, qui a représenté la plus vaste installation qui ait existé jusqu'à présent; nous nous bornerons à citer quelques chiffres pour donner une idée de son importance : la force motrice était produite dans plusieurs stations et correspondait à une puissance totale de 4.000 chevaux-vapeur; le courant était distribué par plus de 200 kilomètres de conducteurs dans 1.500 régulateurs à arc et 10.000 lampes à incandescence; l'éclairement fourni dans ces conditions était égal à celui de 200.000 becs carcel, soit environ le triple de l'éclairement normal des voies publiques de la Ville de Paris. On sait combien était merveilleux l'effet produit.

D'un autre côté l'éclairage électrique a été installé sur les boulevards, la rue Royale; une usine a été disposée par la Ville de Paris dans les caves des Halles pour éclairer ces bâtiments et quelques rues avoisinantes et pour fournir de l'électricité aux particuliers dans cette région. Ajoutons, pour être complet à ce point de vue, que diverses stations sont en construction ou en installation, que l'on procède à la pose de la canalisation, et que l'on peut espérer que, d'ici quelque temps, il sera possible, au moins dans certains quartiers, de pouvoir utiliser sous des formes diverses l'énergie produite dans ces stations.

Ces applications de l'électricité à la distribution de l'énergie deviennent de plus en plus fréquentes; aussi a-t-on cherché à réaliser les conditions les

plus favorables possible, soit au point de vue de la meilleure utilisation des conducteurs, soit au point de vue des appareils où l'énergie est employée. Comme ces conditions ne sont pas les mêmes, on a été conduit à se servir des *transformateurs* qui, avec une certaine perte naturellement, permettent de substituer à un courant donné un autre courant ayant une intensité et une tension différentes.

Un transformateur est, en résumé, une bobine d'induction dont les deux fils ont des longueurs et des sections inégales : un courant alternatif passe dans l'une des bobines et un courant également alternatif est produit dans l'autre. Le rapport des intensités dépend des dimensions des deux fils et des armatures de fer que l'on a disposées; et peut varier dans des limites très étendues : en général, le courant inducteur est à haute tension et le courant induit est à une tension notablement moindre. On arrive ainsi à diminuer le poids et le prix des conducteurs principaux pour lesquels les tensions considérables sont sans inconvénient, puisque ces conducteurs sont hors de la portée du public, tandis que les fils qui aboutissent aux appareils directement utilisés ne sont parcourus que par un courant de faible tension, ce qui évite les accidents.

L'emploi des transformateurs a été indiqué par Jablochhoff en 1877 et est devenu pratique à la suite des recherches de Gaulard et Gibbs, de Ziperowsky, Déry et Blatty, de Ferraris, etc. L'Exposition présentait plusieurs modèles de ces appareils qui sont employés assez fréquemment à l'Étranger, mais qui, jusqu'à présent, n'ont pas été utilisés en France d'une manière un peu générale. Il y a là une particularité dont nous ne voyons pas la raison.

C'est à l'aide de transformateurs que, dans la galerie des machines, M. Elihu Thomson obtenait ces courants d'une intensité considérable, 20.000 ampères, à l'aide desquels on produisait directement la soudure du fer. Il y a là encore une application de l'électricité qui nous paraît appelée à entrer avantagement dans la pratique.

Nous devons citer également, comme ayant été particulièrement remarquées, les expériences de répulsion électro-dynamique, qui figuraient dans la même exposition de M. Elihu Thomson. On sait que si l'on fait passer des courants alternatifs dans un fort électro-aimant, des courants induits prennent naissance dans un disque de cuivre placé à une petite distance au-dessus de cet électro-aimant. Le disque parcouru par ces courants induits subit des actions attractives et répulsives de la part des courants inducteurs; mais on pourrait penser que, par raison de symétrie, ces actions sont égales et

(1) *Rev. gén. des Sciences*, t. I, p. 76.

que, se succédant très rapidement, elles se détruisent respectivement. Ce n'est pas ce qui arrive cependant, à cause de la self-induction du disque, et l'on observe une répulsion manifeste que l'on peut mettre en évidence par des expériences variées, dans le détail desquelles nous ne croyons pas devoir entrer. Ces faits sont très curieux et méritent d'être signalés : outre qu'ils sont une ingénieuse vérification de la théorie, ils conduiront peut-être à des applications : c'est à eux que se rattache une expérience faite par M. Zenger et qui viendrait à l'appui d'une intéressante hypothèse. Si, au-dessus d'un électro-aimant double, dans lequel on fait passer des courants alternatifs et à égale distance des deux pôles, on place une sphère en cuivre rouge suspendue par un fil préalablement tordu, la sphère qui prend un mouvement de rotation par suite de cette torsion, tant que le courant ne passe pas, s'arrête presque complètement lorsqu'on met l'électro en action. Mais si la sphère est placée à des distances inégales des deux pôles, on la voit prendre un mouvement de translation courbe, mouvement spiraloïde, à peu près circulaire si la sphère est peu excentrée, spiraloïde elliptique si la sphère est notablement plus rapprochée d'un pôle que de l'autre. M. Zenger, modifiant un peu une expérience de Pultj, a pu obtenir des tracés de la trajectoire décrite par la sphère : il voit dans cette expérience une confirmation des idées qu'il défend depuis plusieurs années, et dans lesquelles il explique le mouvement orbitaire des planètes par une action d'induction exercée par le soleil qui agirait comme une machine dynamo-électrique. Cette question est d'ailleurs à l'ordre du jour sous des formes diverses et c'est ainsi que, à l'Académie des sciences, M. Tisserand, puis M. Maurice Lévy ont cherché si, pour mieux satisfaire à l'explication de certaines données des orbites des planètes, on ne pourrait pas remplacer la loi d'attraction de Newton par des lois dérivées de l'électro-dynamique.

V

Parmi les questions qui ont été étudiées expérimentalement en physique et dont l'importance paraît très grande, parce qu'il semble qu'elles sont de nature à nous renseigner sur la nature de l'électricité, il en est deux sur lesquelles nous croyons devoir nous arrêter spécialement et au sujet desquelles nous allons entrer dans quelques détails.

Nous parlerons d'abord des effets actino-électriques qui ont été étudiés depuis trois ans environ et sur lesquels des recherches diverses ont été faites cette année. On sait que M. Hertz reconnut

l'influence de la lumière sur les phénomènes électriques dans les conditions suivantes : il faisait éclater des étincelles entre deux tiges reliées à une bobine d'induction et faisait varier la distance de ces tiges jusqu'à ce que l'étincelle cessât ; mais, sans rien changer à cette distance, l'étincelle se produisait de nouveau si l'on éclairait les pointes à l'aide d'étincelles produites dans le voisinage. Des expériences variées montrèrent nettement que ces dernières étincelles n'agissaient pas par une action électrique, mais seulement par la lumière qu'elles émettaient et l'on reconnut que c'était seulement aux radiations très réfringibles, violettes et ultra-violettes que cet effet devait être attribué.

Les expériences de Hertz furent répétées et étendues : on put reconnaître ainsi que des effets du même genre se manifestent également dans le cas d'électricité à potentiel peu élevé. La disposition la plus fréquemment employée est la suivante : on place parallèlement et à une distance variable, mais faible, une lame métallique et une feuille de toile métallique, la première reliée au pôle négatif d'une pile, la seconde à son pôle positif ; dans le circuit est intercalé un galvanomètre, un électromètre ou un téléphone. La source de lumière qui a été le plus fréquemment employée est l'arc électrique produit entre des charbons présentant une âme en aluminium, ce qui augmente l'intensité des radiations très réfringibles. Si l'on dirige un faisceau lumineux sur la toile métallique, ce faisceau traverse celle-ci en partie et va s'arrêter sur l'autre plaque : on reconnaît alors que l'aiguille du galvanomètre, qui était au zéro, est déviée, indiquant l'existence d'un courant, le circuit étant ainsi fermé par la couche d'air éclairée, tandis que cette même couche d'air constitue une solution de continuité dans le circuit, tant qu'elle n'est pas éclairée.

Parmi les physiciens qui se sont récemment occupés de cette question, nous signalerons MM. Bichat et Blondlot, Borgman, Nodon, Stoletow : leurs recherches ont porté à peu près sur les mêmes points et ils sont arrivés, en général, à des conclusions analogues, en faisant varier les conditions de l'expérience. MM. Bichat et Blondlot ont mis en évidence de diverses façons l'effet de l'insufflation de l'air : un courant d'air étant projeté sur la toile métallique en même temps que le faisceau lumineux, on observe des effets plus intenses que par l'effet de la lumière seule ; ils se sont assurés, bien entendu, que l'action du courant d'air seul était nulle ; le plateau prend, dans ce cas, une charge positive et le potentiel qu'il acquiert peut atteindre deux volts.

MM. Bichat et Blondlot ont observé aussi, en

éclairant à l'aide de radiations ultra-violettes un conducteur isolé et relié à un électromètre, que ce conducteur prend une charge positive; la couche d'air traversée joue alors le même rôle que la toile métallique de l'expérience générale, et doit donc devenir négative. L'expérience a réussi également en remplaçant le conducteur par une plante et le potentiel a atteint vingt volts dans certains cas. Nous passons volontairement sous silence quelques détails et quelques irrégularités qui se sont manifestés dans ces expériences.

C'est très certainement à une cause analogue qu'il faut rattacher les expériences de M. A. Nodon qui, soumettant un conducteur isolé à l'action des rayons solaires, reconnut que ce conducteur s'électrisait positivement; pour éviter toute action provenant du frottement de l'air ambiant ou de l'influence électrique des corps voisins, ce conducteur était placé au centre d'une caisse métallique reliée au sol et présentant dans le couvercle une ouverture par laquelle pénétraient les rayons solaires.

Ne peut-on pas penser, avec M. Nodon, qu'une action de ce genre intervient dans l'électrisation des nuages?

M. Borgman s'est proposé plus spécialement de rechercher si l'action était instantanée ou si elle exigeait un certain temps pour se produire : à cet effet, le galvanomètre était remplacé dans le circuit par un téléphone, et un disque percé d'ouvertures tournait entre la source lumineuse et la toile métallique avec une vitesse que l'on pouvait faire varier. Quelle que soit cette vitesse, le téléphone doit donner naissance à un son ou à un bruit si l'action commence et cesse instantanément; pour une certaine vitesse, le son doit être éteint, au contraire, si l'action n'est pas instantanée. C'est ce dernier résultat qu'observa M. Borgman : la durée de l'éclairement intervient donc dans le phénomène.

Par des expériences du même genre, M. Stoleto est arrivé à une conclusion analogue : il a même pu évaluer le retard du courant sur l'action lumineuse et a trouvé qu'il est d'un millième de seconde. Ce physicien a fait d'autres recherches et a pu énoncer des lois relatives à ce phénomène : c'est ainsi qu'il a établi que le courant actino-électrique est proportionnel à l'intensité des radiations actives, qu'il varie avec l'épaisseur de la couche d'air qui sépare les lames et avec la force électromotrice de la pile de charge, et qu'il est proportionnel au rapport de cette force à l'épaisseur.

Nous venons de dire que c'est à M. Hertz que l'on doit les premières expériences sur les effets actino-électriques; c'est lui également qui a réalisé

des phénomènes mettant en évidence la propagation d'ondes électriques, question qui est d'une importance capitale, on peut le dire sans exagération.

Des considérations théoriques dues à Maxwell, complétées par des données expérimentales, permettaient de prévoir qu'un ébranlement électrique doit se propager avec une vitesse égale à la vitesse de propagation de la lumière, soit environ 300.000 kilomètres par seconde, ce qui permet de déterminer la longueur d'onde correspondant à des ébranlements périodiques. On trouve aisément que pour que ces longueurs d'onde soient susceptibles d'être mises en évidence, c'est-à-dire pour qu'elles ne dépassent pas quelques mètres, il faut que la période de l'ébranlement soit de l'ordre des *billionièmes* de seconde; on ne pouvait espérer réaliser un agencement mécanique capable de produire ce résultat. C'est par un procédé indirect que M. Hertz a pu atteindre ce résultat : l'*excitateur* qu'il emploie est formé de deux fils placés sur le prolongement l'un de l'autre et terminés par deux petites sphères séparées par un faible intervalle; chacun de ces fils porte une sphère d'assez grand diamètre dont on peut faire varier la position (ces sphères ont été remplacées ultérieurement par des feuilles métalliques d'un emploi plus commode); enfin ces fils sont reliés aux extrémités du fil induit d'une bobine d'induction. Dans ces conditions, lorsque la bobine fonctionne, il se produit entre les fils une série de décharges dont la durée dépend de la capacité des sphères et de la self-induction des fils. durée que l'on peut faire varier entre certaines limites et qui, avec des dimensions qui n'ont rien d'exagéré, est de l'ordre de grandeur que nous indiquons précédemment.

Grâce à ce dispositif, on devait donc produire des ébranlements d'une longueur d'ondulation appréciable expérimentalement, la théorie l'indiquait au moins. Mais il fallait les mettre en évidence : M. Hertz y arriva en employant un fil métallique courbé circulairement et dont les deux extrémités sont situées en face l'une de l'autre à une très petite distance; si ce cercle est placé dans le voisinage de l'excitateur et s'il a des dimensions convenables, des étincelles jaillissent dans la partie comprise entre les extrémités des fils. Pour que les effets soient nettement perceptibles, il faut qu'il y ait une certaine relation entre les dimensions de l'excitateur et la période des oscillations électriques qui peuvent se produire dans le fil circulaire; par analogie avec ce qui se passe pour les phénomènes acoustiques, ce fil a reçu le nom de *résonateur*.

Les oscillations qui se produisent dans le champ électrique de l'excitateur sont de deux sortes : les

unes, électrostatiques, sont dues aux variations de charge des sphères de l'excitateur; les autres, électrodynamiques, correspondent aux courants qui prennent naissance dans les fils de celui-ci. Sans vouloir insister, disons que suivant la position donnée au résonnateur, cet organe peut déceler les effets dus aux unes ou aux autres.

Grâce à cette disposition, M. Hertz put prouver que l'action de l'excitateur se fait sentir à grande distance et qu'elle n'est pas interceptée par l'interposition des corps isolants, mais qu'elle est arrêtée par l'interposition de corps conducteurs. Il était probable que ceux-ci produiraient l'effet de corps réfléchissants; on pouvait chercher à reproduire pour ces ébranlements oscillatoires une expérience analogue à celle de Seebeck pour le son, en cherchant des nœuds et des ventres fixes provenant de la superposition d'une onde directe et d'une onde réfléchie. L'expérience réussit, et M. Hertz put déterminer ainsi que la longueur de l'onde électrique est de 3 mètres environ.

Disons immédiatement que les expériences de M. Hertz ont été répétées, en France notamment par MM. Joubert et de Nerville, et que d'une manière générale on a obtenu facilement les résultats qu'il avait indiqués.

Au lieu d'étudier les ondes électriques se propageant dans l'air, on a pu observer des ondes se propageant dans un fil; pour arriver à ce résultat, une plaque parallèle à l'excitateur était reliée à un fil perpendiculaire à celui-ci dans lequel se produisaient, par induction, des variations électriques périodiques. En déplaçant le résonnateur le long de ce fil on pouvait explorer son état électrique, en tenant compte, bien entendu, de l'action transmise par l'air. La théorie permettait de prévoir ce qui se passerait soit dans le cas où l'extrémité du fil opposée à l'excitateur était libre, soit dans le cas où elle était reliée à la terre: les résultats de l'expérience furent, d'une manière générale, conformes aux indications de la théorie.

M. Hertz poussa ses recherches plus loin et parvint à produire des *rayons* électriques se comportant comme les rayons optiques; il put étudier leur réflexion et leur réfraction dans des conditions variées, et reconnut que la propagation de ces ébranlements électriques obéit aux mêmes lois

que celle des ébranlements qui donnent naissance aux phénomènes lumineux.

MM. Sarasin et de la Rive, en répétant les expériences de M. Hertz, sont arrivés à des résultats qui complètent ceux de ce savant: en employant un fil métallique soumis à l'action d'un excitateur, comme nous l'avons dit, et en se servant de résonnateurs différents, ils ont reconnu que chaque résonnateur décèle l'existence de ventres et de nœuds dont la position dépend des dimensions du résonnateur; — pour chaque résonnateur d'ailleurs les résultats seraient bien ceux qui avaient été indiqués. Les effets ne sont d'ailleurs observables qu'entre certaines limites de dimensions. Il faut donc conclure de ces expériences qu'un excitateur ne donne pas naissance à un ébranlement simple, mais simultanément à une série d'ébranlements de durées différentes comprises entre certaines limites.

Dans un article publié précédemment (1), M. Brillouin a signalé l'analogie que l'on peut établir entre les recherches de M. Hertz et les expériences d'acoustique. Reprenant cette comparaison, nous dirons que, d'après les faits signalés par MM. Sarasin et de la Rive, tout se passerait comme si l'on avait un corps sonore produisant simultanément des vibrations de durée variable entre des limites déterminées. Chaque série serait capable de mettre en action un résonnateur, et l'emploi successif de résonnateurs différents permettrait de mettre en évidence des nœuds et des ventres occupant des positions caractéristiques, non du corps sonore, mais du résonnateur considéré.

Quoi qu'il en soit, ces importantes expériences ont mis en évidence l'existence d'ébranlements périodiques d'une longueur de quelques décimètres; il y a loin de ces dimensions à celles des plus grandes ondulations qui correspondent aux phénomènes lumineux. Il semble bien cependant qu'on se trouve en présence de phénomènes analogues: il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance capitale de cette constatation.

G. M. Gariel.

de l'Académie de Médecine.

(1) Sur les expériences de M. Hertz, *Revue générale des Sciences*, 13 mars 1890.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Picard (E), *Membre de l'Institut, Professeur à la Sorbonne*. — *Mémoire sur la théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes, couronné par l'Institut, grand prix des sciences mathématiques, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1889.*

Dans cet important mémoire, M. Picard se propose d'abord d'étendre aux surfaces algébriques la notion d'intégrales abéliennes attachées à une courbe algébrique plane. Il considère les intégrales de différentielles totales $\int P dx + Q dy$, où P et Q sont des fonctions

rationnelles de x, y, z liées par l'équation $f(x, y, z) = 0$ de la surface algébrique (la condition d'intégrabilité étant, bien entendu, supposée remplie). Il en donne une classification en trois espèces, comme pour les intégrales abéliennes ordinaires, et est conduit à une théorie des cycles des surfaces algébriques qui rappelle, par son origine, celle des courbes, mais en diffère profondément par certains points essentiels.

M. Picard applique ensuite la théorie générale qu'il vient d'édifier à l'étude de la transformation birationnelle des surfaces en elles-mêmes. Généralisant un théorème de M. Schwarz sur les courbes, il démontre que si une surface peut être transformée en elle-même par une substitution birationnelle renfermant deux paramètres arbitraires, elle est du genre (*Flächengeschlecht* de M. Noether) 0 ou 1; et il est amené à la distinction d'une classe de surfaces de l'un ou l'autre de ces deux genres, pour lesquelles il existe deux intégrales de différentielles totales $P dx + Q dy$ et $P_1 dx + Q_1 dy$, telles que les équations :

$$P dx + Q dy = du \quad P_1 dx + Q_1 dy = dv$$

donneront pour x, y, z des fonctions uniformes de u et de v : On doit considérer ces surfaces comme les véritables analogues des courbes planes de genre 0 et 1.

Enfin l'éminent géomètre applique les résultats trouvés à la recherche des conditions d'uniformité de l'intégrale générale d'équations différentielles de la forme $f(y, y', y'') = 0$, où f est un polynôme, et à l'extension à l'équation $f(x, y, y', y'') = 0$, dans le cas où les points critiques de l'intégrale générale sont fixes, des propositions obtenues par M. Poincaré relativement à l'intégration des équations du premier ordre qui sont dans ce cas.

Maurice LELIEUVRE.

Resal (H.), *Membre de l'Institut, Inspecteur général des Mines*. — *Traité de Mécanique générale, comprenant les leçons professées à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole nationale supérieure des Mines, 7^e vol. et dernier, Gauthier-Villars et fils, 1889.*

Le septième volume du *Traité de mécanique* de M. Resal n'avait pas été prévu dès l'abord, mais, par suite d'une modification dans le programme des cours de l'Ecole Polytechnique et de l'introduction, dans l'enseignement de cette Ecole, d'une fraction importante de la mécanique analytique, il est devenu nécessaire, une fois l'ouvrage terminé, de le compléter à ce point de vue. L'auteur a été ainsi amené à donner les équations de Lagrange, celles de Hamilton, le principe de la moindre action; il a étudié la stabilité de l'équilibre d'après Dirichlet et a établi pour les systèmes à liaisons le principe si important, si fondamental de la superposition des petits mouvements.

Le reste du volume est consacré à combler les lacunes

qui pouvaient présenter les volumes précédents, à développer certains points pris un peu dans tous les sujets, à traiter, dans un appendice, diverses questions intéressantes; ce n'est plus un ouvrage didactique; c'est, à la fois, un complément et un recueil d'exercices.

L. O.

Laurent (H.), *Examinateur d'admission à l'Ecole Polytechnique*. — *Traité de mécanique rationnelle, 3^e édition, 2 vol. in-8 Gauthier-Villars et fils, 1889.*

Le *Traité de Mécanique rationnelle* de M. H. Laurent, dont les deux premières éditions sont épuisées et dont la troisième vient de paraître, est destiné spécialement aux candidats à la licence et à l'agrégation; il est bien connu de tous ceux qui ont eu à étudier la Mécanique.

C'est un livre bien ordonné et très clair sous sa forme quelquefois un peu concise. L'auteur a le vif souci de la rigueur, et, au lieu de passer rapidement sur les difficultés, il les signale et les approfondit. Toute la partie relative à la mécanique analytique est faite de main de maître.

Nous n'avons quelques réserves à faire, pour les vingt-deux chapitres qui composent l'ouvrage, que sur un seul, le dernier. Peut-être y aurait-il intérêt à modifier sur certains points ces applications de la mécanique rationnelle aux machines? Les paragraphes relatifs aux régulateurs et aux volants, par exemple, peuvent donner prise à la critique. Mais ces légères objections n'atteignent pas la valeur du livre qui reste une œuvre d'enseignement bien comprise, consciencieuse, capable de rendre de grands services à tous ceux qui ne peuvent aller aux sources et qui tiennent cependant à avoir exactement la pensée des Maîtres.

L. O.

Houzeau (J.-C.), *ancien Directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles, et Lancaster (A.)*, *Bibliothécaire de cet établissement*. — *Bibliographie générale de l'astronomie, Bruxelles, Hayez, in-8°, 1890.*

Les matériaux réunis pour chaque science sont aujourd'hui tellement nombreux qu'il est impossible de retrouver au moment voulu tout ce qui a été écrit sur une question, si l'on n'est aidé par une bibliographie bien faite. Pour l'Astronomie, le besoin d'un tel ouvrage a été senti depuis longtemps, car il faut remonter à 1753 pour rencontrer la première bibliographie astronomique, celle de Weidler. En 1803 parut celle de Lalande, qui a rendu de grands services; mais fut-elle mise au courant, elle serait insuffisante, car elle se borne aux ouvrages publiés séparément et à quelques tirés à part des principaux mémoires. Ce plan est aujourd'hui trop restreint, parce qu'une partie très importante des productions astronomiques est constituée par les Notices et les Mémoires insérés dans les collections académiques et les journaux scientifiques. Leur recherche était bien facilitée par le *Repertorium Commentariorum* de Reuss, le *Catalogue de la Bibliothèque de Poulkova* de M. O. Struve, le *Biographisches Handwerkbuch* de Poggenдорff et le *Catalogue of scientific papers* publié par la Société royale de Londres; néanmoins une nouvelle bibliographie astronomique proprement dite était nécessaire. Mais son exécution exigeait les qualités les plus diverses : une profonde connaissance de l'Astronomie et des principales langues, tant mortes que vivantes, le goût des recherches bibliographiques, une méthode sûre dans le classement d'une multitude d'articles, une patience et un courage à toute épreuve. Ces qualités étaient réu-

nies à un très haut degré dans la collaboration de MM. Houzeau et Lancaster, comme le prouve leur immense ouvrage, qui doit se composer de trois volumes consacrés respectivement :

Le volume I, aux *Ouvrages séparés*;

Le volume II, aux *Mémoires* insérés dans les collections et journaux;

Le volume III, aux *Observations* astronomiques.

La publication a commencé par le tome II, dont le besoin se faisait le plus vivement sentir : il a paru en 1882 et renferme 1200 pages.

En tête du volume I, qui est en cours de publication, se trouvent un beau portrait de Houzeau et son éloge, dans lequel M. Lancaster retrace en détail la vie agitée de son éminent collaborateur, mort à la peine en 1888.

Une introduction historique de 325 pages est ensuite consacrée à l'exposition des idées astronomiques, depuis l'époque fabuleuse jusqu'aux temps modernes; elle résume les nombreuses découvertes faites depuis un demi-siècle, sur l'Astronomie des Egyptiens, des Assyriens, des Indiens et des Chinois, et elle forme un indispensable complément à toutes les histoires de l'Astronomie. On y voit, par exemple, dans quel ordre ont été reconnues les grosses planètes, Vénus ayant été partout la première. On est frappé de l'analogie des légendes relatives aux éclipses, de la similitude des moyens employés chez tous les peuples pour venir au secours de l'astre offusqué; partout on croit voir dans la lune des objets familiers. Le reste du volume est formé par les onze sections dans lesquelles ont été distribués tous les ouvrages astronomiques; pour chacun d'eux on indique les diverses éditions et les traductions, de manière à constituer une courte monographie de chaque publication.

La première section renferme les ouvrages anciens, jusqu'à 1632, y compris les manuscrits et les documents relatifs à l'Astronomie de l'ancienne Égypte, de l'Assyrie, etc. La seconde est consacrée aux ouvrages d'Astronomie, en général peu connus, parce qu'ils sont aussi peu recherchés aujourd'hui qu'ils étaient répandus autrefois. Enfin les autres sections publiées jusqu'ici sont les suivantes :

Section III, Biographies et commerce épistolaire,

IV, Ouvrages didactiques et généraux,

V, Astronomie sphérique,

VI, Astronomie théorique.

On peut juger, par ce court exposé, quel énorme labeur a dû exiger une pareille entreprise, qui rend aux astronomes d'inappréciables services. Dans les observatoires aucun ouvrage ne sera plus fréquemment consulté; et la *Bibliographie générale de l'Astronomie* portera les noms de MM. Houzeau et Lancaster à la connaissance des générations astronomiques les plus éloignées.

G. BIGOURDAN.

2° Sciences physiques.

Meslin (G.). — Sur la polarisation elliptique des rayons réfléchis et transmis par les lames métalliques minces. Thèse pour le doctorat en sciences physiques présentée à la Faculté des Sciences de Paris, 1890.

Lorsqu'un faisceau lumineux tombe sur une surface polie, il se divise généralement en deux : le faisceau réfléchi et le faisceau réfracté. Pour connaître les modifications subies par la lumière incidente, il suffit de savoir ce qui se produit lorsque l'on a affaire à deux rayons polarisés, l'un A dans le plan d'incidence, l'autre B dans un plan perpendiculaire. Cette étude n'a pas encore été faite complètement dans le cas où le corps est un métal : on a plus particulièrement examiné le cas des plaques métalliques assez épaisses pour être complètement opaques, et par conséquent où seul subsiste le faisceau réfléchi; depuis longtemps cependant l'on sait qu'une lame métallique mince se laisse traverser par la lumière et une expérience de Faraday prouve que les deux rayons A et B transmis contractent un retard δ .

M. Meslin a repris l'étude de cette question et procédé à des expériences très soignées. Il a surtout étudié les lames d'or; tantôt les feuilles d'or minces employées étaient soutenues par le bord supérieur et pendaient librement à la façon d'un rideau; tantôt elles étaient déposées sur des plaques de verre. Les mesures optiques étaient faites avec l'appareil de Jamin, les mesures d'épaisseur étaient d'ordinaire ramenées à des pesées. On arrive ainsi à des résultats très concordants et l'on peut établir une relation expérimentale entre le retard δ , la longueur d'onde, l'angle d'incidence i et l'épaisseur e :

$$\left(\delta - \frac{\lambda}{4} \sin^2 i \frac{e}{e + 60} \right).$$

La seconde partie du mémoire est consacrée à l'exposition d'une théorie simple permettant d'expliquer les faits observés. Les phénomènes de la capillarité démontrent que les couches superficielles d'un corps ne sont pas dans le même état que les couches profondes; il est naturel de supposer que cette différence subsiste au point de vue optique. M. Potier a déjà considéré cette couche de passage qui se comporte comme un milieu cristallisé où l'élasticité varierait en outre avec la profondeur. Les deux vibrations correspondant aux deux rayons polarisés à angle droit se comportent, en traversant cette couche, d'une façon différente puisqu'elles correspondent à des directions suivant lesquelles l'élasticité n'est pas la même. Partant de là, et s'appuyant sur des hypothèses très plausibles, l'auteur parvient à retrouver la formule expérimentale pour le faisceau transmis; de plus, en considérant que les rayons réfléchis peuvent pénétrer dans les couches superficielles avant de revenir dans le milieu d'où ils proviennent, il ramène l'étude de la réflexion à celle de la transmission; le calcul le conduit à des résultats entièrement d'accord avec ce que l'on savait déjà pour les rayons réfléchis par les lames épaisses, et ceux qu'il a lui-même obtenus pour les lames minces.

Dans son célèbre *Traité d'Optique*, Verdet, résumant les travaux connus à son époque sur les phénomènes produits par la transmission métallique, disait : « Il est permis de croire que cette étude éclaircirait beaucoup la théorie de la réflexion à la surface des métaux. » Cette prévision était fort exacte : le très intéressant travail de M. Meslin le démontre de la façon la plus heureuse.

LUCIEN POINCARÉ.

Herschel (A. S.). — Le Spectre du sous-chlorure de cuivre. *The Nature*, 3 avril 1890.

A propos du spectre de la flamme bleue causée dans un peu de charbon quand on y jette du sel marin et que M. Salet a montré être colorée par du cuivre, M. Herschel décrit dans *Nature* une flamme bleue obtenue en brûlant une pâte formée de glycérine et de sous-chlorure de cuivre. Son spectre comprendrait presque uniquement trois paires rapprochées de lignes vertes, bleues et violettes présentes aussi dans le spectre du chlorure de cuivre de Lecoq (*Spectres lumineux*). Les larges bandes qui accompagnent ces raies seraient absentes.

Il est assez difficile de comprendre l'auteur en l'absence de données numériques et quand on observe que le spectre de Lecoq, qui contient beaucoup de lignes vertes, ne renferme d'autre part que des bandes dans le bleu et le violet.

E. DEMARÇAY.

Lothar Meyer. — Les théories modernes de la Chimie et leur application à la Mécanique chimique. *Traduit de l'allemand par MM. Bloch et Meinier*. 2 vol. in-8° de 432-312 pages. Paris, Georges Carré, éditeur, 1887-89.

En quelques pages d'introduction l'auteur rappelle tout d'abord les grandes théories chimiques de ce siècle : la théorie de l'affinité de Berthollet et celle de Berzélius, la loi des proportions définies de Proust, la

loi des proportions multiples de Dalton, la théorie des substitutions de Dumas, celle des types de Gerhardt; celle de l'enchaînement des atomes imaginée par Couper et développée plus tard par Kékulé, les travaux de MM. Berthelot et Péan de Saint-Gilles, et enfin la théorie cinétique de l'affinité de MM. Guldberg et Waage qui est un premier pas dans le rapprochement des phénomènes chimiques, physiques et mécaniques c'est-à-dire vers le but que s'était fixé Berthollet dès le commencement de ce siècle. Les idées de ce savant si vivement combattues de son temps reviennent maintenant à l'ordre du jour.

L'ouvrage est divisé en trois livres: le premier a pour titre, *les Atomes*; le second, *la Statique des atomes*; le troisième, *la Dynamique des atomes*.

Dans le premier livre, l'auteur rappelle que l'hypothèse des atomes forme la base nécessaire de toutes les théories de la chimie aussi bien que de la plupart des théories physiques, que ce n'est qu'en admettant l'existence de particules discontinues qu'on peut déduire des conclusions des phénomènes observés. Arrivant ensuite à la détermination des poids atomiques, il expose la théorie d'Avogadro et d'Amperé et nous démontre que cette hypothèse, combattue à l'origine, mais dont on n'a jamais démontré la fausseté, présente le même degré de probabilité que la théorie cinétique des gaz. Il examine soigneusement les cas où l'application de cette théorie conduirait à des valeurs inexactes pour les poids moléculaires.

Puis viennent la loi de Dulong et Petit, celles de Neumann, de Regnault et de Wæstyn, qui en sont le complément, et enfin la loi de l'isomorphisme de Mitscherlich.

Ce livre se termine par une série de considérations intéressantes sur la nature des atomes, où l'auteur expose les relations qui existent entre les constantes physiques des corps et leur poids moléculaire et fait voir que la plupart des propriétés physiques sont des fonctions périodiques des poids atomiques.

Dans le second livre, M. Lothar Meyer expose la théorie des types de Gerhardt et celle des types mixtes de Kékulé. Il montre ensuite comment la connaissance du poids moléculaire, du nombre et de la nature des atomes qui entrent dans la molécule, de la valence chimique de ces atomes permet d'établir les formules possibles de constitution d'un composé donné; puis il passe à l'enchaînement des atomes et à ses relations avec certaines propriétés physiques.

Enfin dans le troisième livre, l'auteur étudie la permutation chimique et ses causes: agitation mécanique, chaleur, lumière et électricité. Le chapitre relatif à la chaleur, naturellement le plus développé, comprend la dissociation, la thermochimie, la mesure de l'affinité et les expériences d'Ostwald pour la détermination de l'avidité.

Voilà, brièvement résumées, les principales questions traitées dans l'ouvrage de M. Lothar Meyer. Nous avons seulement regretté de voir passer complètement sous silence, dans un livre aussi complet, la théorie du carbone asymétrique découverte presque simultanément par MM. Lebel et Van't Hoff et qui établit une relation si remarquable entre le pouvoir rotatoire moléculaire et la structure chimique; l'exposé de cette théorie eût trouvé naturellement sa place dans le chapitre de l'enchaînement des atomes.

Tel qu'il est cependant, cet ouvrage est très intéressant et méritait d'être traduit en français. Le lecteur y trouvera exposés les premiers travaux qui forment comme le fondement de cette nouvelle branche de la Chimie qu'on appelle aujourd'hui la *Chimie physique*.

H. GAUTIER.

3° Sciences naturelles.

Girard (Jules). — Recherches sur les tremblements de terre, E. Leroux, Paris, 1890.

Le livre de M. J. Girard est un exposé succinct, mais

très clair de tout ce qui concerne la séismologie. L'auteur y passe rapidement en revue les phénomènes séismiques, les appareils destinés à enregistrer quelques-uns d'entre eux, la composition des mouvements séismiques, leur propagation dans le sol et dans la mer; enfin il expose les hypothèses faites sur les causes des tremblements de terre et les relations qui ont paru à certains observateurs exister entre ces phénomènes et les phénomènes astronomiques et météorologiques. M. J. Girard, en vulgarisant les méthodes employées actuellement en séismologie, donne aux personnes étrangères à toute étude spéciale le moyen de faire, à l'occasion et dans un sens scientifique, des observations qui, si elles étaient nombreuses, pourraient rendre de réels services à la Science.

J. BERGERON.

Bohm (J.). — Sur la cause de l'ascension de la sève. *Berichte der deutschen bot. Gesellsch.*, Berlin, 1889.

La cause de l'ascension de la sève dans les végétaux est une des questions les plus controversées qui aient été étudiées dans ces derniers temps. M. Bohm, procédant à l'examen de cette question par la méthode d'élimination, discute successivement les forces qui provoquent l'ascension de la sève: 1° la pression osmotique; 2° les différences de pression de l'air inclus dans les éléments morts du bois; 3° la capillarité. L'auteur écarte la première cause en objectant la lenteur des phénomènes d'osmose et en constatant qu'une plante dont les racines ont été tuées par l'eau bouillante ne se dessèche pas, comme il devrait arriver si l'absorption de l'eau était due à l'osmose.

Dans une première théorie, M. Bohm avait indiqué comme cause de l'ascension de la sève les différences de pression de l'air contenu dans les éléments morts du bois; il renonce à faire de cette pression le moteur principal de la colonne liquide, mais il la considère cependant comme une cause secondaire agissant de la façon suivante: soit une cellule contenant de l'eau et une bulle d'air; si celle-ci chasse de l'eau dans une cellule supérieure, elle se détend et l'eau d'une cellule placée plus bas la comprime de nouveau, y ajoutant encore l'air qu'elle tient en dissolution; ces différences de pression occasionnent donc des déplacements d'eau, mais ils sont beaucoup trop lents pour être le moteur unique de l'ascension de la sève.

Le savant botaniste soutient que la capillarité est la cause la plus importante de l'ascension de la sève. Parmi ses expériences à ce sujet, une des plus frappantes consiste à prendre des plantes dont les racines ont été tuées par l'eau bouillante afin d'empêcher le phénomène d'osmose; les tiges de ces plantes sont masquées dans un flacon contenant un peu d'eau et où l'on a fait le vide pour éviter qu'on pût invoquer les différences de pression comme cause de l'ascension de la sève. La quantité d'eau transpirée par ces plantes est du même ordre que pour les plantes intactes. L'ascension de la sève dans ce cas ne pouvait avoir eu lieu que sous l'influence de la capillarité.

M. Vesque a fait remarquer à ce sujet (*Annales agronomiques*, t. XVI, p. 75), que les résultats de M. Bohm et ceux qu'il a lui-même obtenus d'expériences analogues montrent simplement que la capillarité suffit pour entretenir la transpiration normale d'une plante de quelques décimètres de hauteur, mais il se demande si avec les éléments fournis par le mémoire de M. Bohm et ceux connus jusqu'à présent, on peut conclure que la capillarité jointe aux effets de différences de pression de l'air inclus suffit à faire monter l'eau à plus de cent mètres, hauteur qu'atteignent certains grands arbres. Il semble que nous n'avons pas encore les données suffisantes pour résoudre ce problème et que de nouvelles expériences sont nécessaires.

A. HÉBERT.

Vogt (G.) et Yung (E.). — Traité pratique d'anatomie comparée. — Reinwald éditeur, 1^{er} volume, Paris, 1890.

Tous les ouvrages classiques de zoologie et d'anatomie comparée publiés jusqu'ici sont, en réalité, peu accessibles aux débutants. Préoccupé d'embrasser, dans un même chapitre, tous les faits acquis sur l'organisation de toute une classe d'animaux, embarrassé par les modifications variées d'un même appareil, dont il faut pourtant tenir compte, l'auteur ne peut, pour ainsi dire, exposer un seul fait sans restrictions. Il en résulte une absence, au moins apparente, de précision qui déconcerte, et là où le lecteur déjà familier avec les choses de la zoologie sait trouver sous une forme condensée une foule de renseignements précieux, le jeune homme au début de ses études n'a sous les yeux qu'un tableau flou, sans contours, d'où rien de net ne se dégage à son esprit. Et cet inconvénient est surtout sensible pour certains groupes par enchaînement, tels que les Hydroméduses ou les Mollusques, par exemple, où les termes extrêmes de la série ne montrent parfois plus un seul caractère commun.

Combien n'est-il pas préférable d'étudier isolément dans chaque grand groupe naturel un seul animal, puis, son organisation explorée à fond, d'édifier ensuite sur cette base solide toute la morphologie du groupe par la comparaison des formes les plus importantes! C'est la méthode suivie depuis longtemps dans certains cours de zoologie, c'est celle qu'ont adoptée MM. Vogt et Yung. Le premier volume, le seul encore paru de leur traité, renferme ainsi 31 monographies comprenant les cinq embranchements des Protozoaires, Cœlentérés, Vers, Echinodermes et Mollusques, représentés au moins par un type pour chaque classe, parfois deux (Hydroméduses), trois (Annélides), ou même quatre (Plathelminthes).

A l'étude de chaque type est annexé un résumé succinct des principales différences anatomiques qui en séparent les autres représentants du même groupe. Cela suffit-il pour justifier le titre : *Traité d'anatomie comparée*, choisi par les auteurs? S'ils ont entendu dire par là qu'ils se sont bornés aux seules données anatomiques, écartant résolument la classification et l'embryogénie, cette caractéristique toute négative ne répond guère à l'idée que nous avons de l'anatomie comparée depuis Cuvier, et le lecteur serait désemparé qu'il viendrait chercher dans leur ouvrage la comparaison morphologique d'un même appareil dans toute la série, ou l'état actuel de la science sur la parenté des diverses formes animales. Le *Traité* des deux savants suisses est du domaine de la zoologie anatomique, mais purement descriptive, et, à ce point de vue, il faut les féliciter d'avoir choisi leurs types parmi les animaux les plus faciles à se procurer, bien que les formes terrestres et d'eau douce, auxquelles ils ont toujours donné la préférence, soient souvent modifiées secondairement par l'adaptation à un milieu qui n'est pas leur milieu originel.

MM. Vogt et Yung n'ont pas voulu faire simplement œuvre de compilation. Chacune de leurs monographies est un travail original; elles sont discutées et critiquées comme telles; ils ont vu eux-mêmes ce qu'ils décrivent. C'est une réelle audace que d'entreprendre à deux une révision complète du règne animal. Le nombre et la variété de leurs travaux antérieurs leur en donnaient le droit, mais il est à regretter que la rédaction, parfois visiblement hâtive, de la partie générale annexée à chaque chapitre, ait laissé passer quelques fâcheuses erreurs que je n'ai, du reste, pas la place et encore moins le désir de relever ici. Il est trop facile de s'ériger en censeur; il l'est moins de faire, après tant d'autres, un traité d'anatomie d'allure originale et d'utilité pratique qui doit rendre à l'étudiant, auquel il s'adresse d'ailleurs particulièrement, de précieux services en le guidant à travers les difficultés du début.

G. PRAUVE.

Dastre, (A.) Professeur à la Sorbonne. — Les anesthésiques; physiologie et applications chirurgicales. Un vol. in-18°, G. Masson, Paris, 1890.

Le livre que M. Dastre vient de publier sur les anesthésiques est un bon résumé des travaux des physiologistes sur la matière. C'est surtout un ouvrage de vulgarisation. Les savants eussent aimé y trouver une bibliographie plus soignée du sujet. Mais peut-être l'auteur a-t-il craint l'excès de l'érudition dans un ouvrage destiné à de nombreux lecteurs.

M. Dastre commence par distinguer de l'anesthésie, telle qu'on sait la pratiquer aujourd'hui, l'insensibilisation hystérique et l'emploi, connu depuis longtemps, des narcotiques. Il cite à ce propos la Genèse : « Le Seigneur endormit Adam et tandis qu'il dormait, il lui arracha une de ses côtes. » Tel est le ton aimable de ce livre, qui, pour agréable qu'il paraisse, n'en renferme pas moins une étude sérieuse.

La physiologie générale de l'anesthésie en constitue l'introduction. L'auteur nous fait assister à l'assouplissement progressif du système nerveux, depuis le moment où les premières bulles de vapeur anesthésiante ont pénétré dans le sang, jusqu'à celui où, les derniers centres nerveux venant à être envahis, le sujet succombe. Il importe de bien préciser la série des phases qu'il traverse. Rarement, en effet, la marche de l'anesthésie se poursuit d'une façon régulière. Si le médecin pouvait, en dosant l'anesthésique suivant le besoin, modifier lentement et graduellement l'activité des centres nerveux, comme le mécanicien manie les différentes pièces d'une machine, l'anesthésie n'aurait pas d'histoire et le livre que nous analysons serait inutile. Malheureusement, dès le début de la chloroformisation et de l'éthérisation, le danger existe, pouvant éclater brusquement, déjouant la surveillance la plus attentive. Aussi est-ce l'étude serrée, précise des différents mécanismes de mort qui constitue la partie essentielle de l'ouvrage de M. Dastre. Savoir comment et pourquoi on meurt sous le chloroforme, n'est-ce pas en effet le seul moyen d'arriver à prévenir les accidents ou du moins à en diminuer la fréquence? Les syncopes cardiaques primitives ou secondaires sont les causes déterminantes. L'auteur insiste particulièrement sur ce point que c'est l'arrêt du cœur et non de la respiration qui entraîne la mort. Le danger n'en est que plus grand : car, tandis que la respiration artificielle permet de suppléer à l'organisme défaillant, nous sommes désarmés devant l'arrêt cardiaque.

Mais, si le médecin demeure impuissant quand la syncope a eu lieu, il doit savoir qu'il dépend souvent de lui de la prévenir; elle est en effet le fait non d'une paralysie, mais, tout au contraire, d'un phénomène d'excitation. L'auteur expose alors le procédé que, dans ce but, pratique depuis longtemps avec un éclatant succès le professeur Morat, de Lyon. Il consiste à associer l'atropine et la morphine à l'anesthésique.

M. Dastre s'efforce de démontrer la supériorité de cette méthode. Il la compare aux procédés par le chloroforme, l'éther, le protoxyde d'azote, employés seuls ou en mélanges titrés avec l'air. Il s'élève à ce sujet contre le système des mélanges préconisé par Paul Bert et le D^r R. Dubois, lui reprochant de ne constituer qu'un procédé de laboratoire, impraticable en chirurgie. C'est là une critique exagérée. Quand on emploie le chloroforme seul sans savoir en quelle quantité et sous quelle tension le patient l'absorbe, on opère, pour ainsi dire, à tâtons. Le perfectionnement, conçu par Paul Bert pour obvier à ce grave inconvénient, a donné, dans les mains des physiologistes, d'excellents résultats. Pour se faire accepter des chirurgiens, il réclamait la construction d'un appareil qui en rendit l'emploi à la fois sûr et commode. Celui que M. Raphaël Dubois a inventé dans ce but et que l'Académie des Sciences a récompensé d'un de ses prix, mérite certainement d'attirer l'attention des praticiens.

Reconnaissons cependant que, quel que soit le mé-

lange employé pour la produire, l'anesthésie comporte toujours un certain péril : le danger principal réside dans l'excitation bulbaire qui, par l'intermédiaire des pneumogastriques, peut déterminer l'arrêt du cœur. Sectionner les pneumogastriques serait un procédé un peu trop radical; mais, suivant la remarque de M. Dastre, on peut suppléer à cette opération brutale par une dissection physiologique plus délicate et dont les effets offrent l'avantage d'être passagers. Nous possédons en effet un agent qui paralyse l'action accélératrice du pneumogastrique : c'est l'atropine combinée à la morphine. Une injection préalable de ces deux alcaloïdes dans la proportion d'un centigramme de morphine et d'un demi-milligramme d'atropine, permet de réduire énormément la dose nécessaire de chloroforme ou d'éther et surtout prévient la syncope cardiaque.

Il ne s'agit pas ici de simples déductions théoriques : les expériences de laboratoire sur les chiens, si sensibles cependant au chloroforme, sont absolument démonstratives. Il en est de même des nombreux cas d'anesthésie ainsi obtenue chez l'homme par les chirurgiens de Lyon. Si beaucoup de médecins négligent cette méthode, c'est plus par ignorance que par antipathie raisonnée. Espérons que l'éloquent plaidoyer de M. Dastre entraînera les hésitants, pour le plus grand bien des opérés.

L'ouvrage se termine par un chapitre sur les anesthésiques locaux et plus spécialement sur le plus important de tous : la Cocaine. Cette substance présente aussi quelques dangers, mais les cas mortels sont fort rares et ne se sont produits qu'après injection de doses considérables.

L. O.

Gréchant (H.). — Les poisons de l'air : l'acide carbonique et l'oxyde de carbone; asphyxie et empoisonnement, par les puits, le gaz de l'éclairage, le tabac à fumer, les poêles, les voitures chauffées, etc. 1 vol. in-18 de 320 p. avec 21 fig. J.-B. Baillière et fils, Paris, 1890.

4^e Sciences médicales.

Saenger. — La blennorrhagie chez la femme. *Annales de Gynécologie*, février, mars et avril 1890, t. XXXIII, p. 130, 199, et 276.

Sans aller aussi loin que Møggerath qui pense que 80 % des habitants des grandes villes ont eu la blennorrhagie et que, 9 fois sur 10, les anciens blennorrhagiques donnent la maladie à leurs femmes, Saenger croit à la fréquence extrême de cette affection un peu trop négligée malgré sa réelle gravité.

Certes les formes les plus graves de l'infection gonorrhéique des annexes utérines peuvent guérir. Mais elles entraînent toujours des altérations qui sont définitives, lors même qu'il ne resterait plus un seul gonocoque. Trop souvent en outre elles sont la cause d'une mort prématurée ou, tout au moins, déterminent des modifications profondes dans la santé, le genre de vie et le pouvoir de reproduction.

Aussi Saenger ne craint-il pas de s'appesantir sur les signes chimiques, les localisations, l'évolution, le diagnostic, le pronostic et le traitement de cette affection.

Son travail est certainement le plus complet qui soit encore publié sur cette question si intéressante à tous les points de vue; aussi croyons-nous qu'il sera consulté avec intérêt par tous ceux qui s'occupent de gynécologie.

D^r HARTMANN.

Bazy (D^r). — Du traitement chirurgical des tumeurs de la vessie. *Médecine moderne*, 9 janvier 1890.

Dans cette étude le D^r Bazy rappelle tout d'abord les divers perfectionnements qu'il a successivement ap-

portés à l'extirpation des tumeurs de la vessie, opération pratiquée par lui pour la première fois en France en 1882 (speculum écarteur, éclairage direct). Il compare au raclage et à la cautérisation, comme procédés de destruction, l'ablation large au bistouri, qu'il préfère comme la seule capable de dépasser sûrement les limites du mal. Deux observations sont produites par l'auteur qui établissent que non seulement la résection peut être étendue à la zone des urèteres, mais encore qu'elle est efficace.

D^r A. CASTEX.

Villain (L.), Chef du service d'inspection de la boucherie de Paris et **Bascon (V.),** Contrôleur du service, etc. — *Manuel de l'inspecteur des viandes*. Georges Carré, Paris, 1890.

Cette deuxième édition du *Manuel de l'inspecteur des viandes* mériterait à plus juste titre l'appellation de *Traité*. Ce livre sort en effet des dimensions du manuel et contient une foule de renseignements fort utiles que l'on ne rencontre pas dans les publications dont il porte le titre modeste. L'élite des vétérinaires inspecteurs du service de la boucherie de Paris a collaboré à cette seconde édition qui constitue certainement aujourd'hui le traité le plus complet et le mieux exposé relativement aux altérations que peuvent subir les éléments d'origine animale.

En effet, à côté des renseignements précieux que la pratique de l'inspecteur a permis de faire figurer, en bonne place, dans chacun des chapitres, les auteurs ont toujours cherché à établir l'utile, je dirai même volontiers l'indispensable appui de l'expérience basée sur les données de la science actuelle. C'est même plus que cela qui est offert au lecteur dans certains chapitres; ceux par exemple dans lesquels est faite d'une façon très détaillée l'histoire des microbes pathogènes qui ruinent les écuries et les basses-cours : l'étude de ces redoutables infiniment petits est présentée d'une façon vraiment remarquable et qui ne laisse rien à désirer.

Voici les questions étudiées successivement dans cet ouvrage. Les animaux de boucherie sur pied, les abattoirs, la coupe des animaux de boucherie, les caractères différentiels des viandes de boucherie, les viandes proprement dites, les issues ou abats, mettent le lecteur au courant des caractères présentés par les viandes de bonne qualité, ainsi que des usages adoptés dans différents pays pour la boucherie. Les caractères physiques des viandes altérées sont ensuite étudiés scrupuleusement dans un livre portant pour titre : Introduction à l'étude des viandes impropres à la consommation. Puis vient l'examen des cas spéciaux motivant la saisie des viandes : c'est la partie la plus importante du livre, due tout entière à la plume de M. Villain, suivi de la justification des saisies de viandes d'après les données actuelles de la science.

La charcuterie, la viande de cheval, les volailles, le gibier, les poissons, les crustacés, les mollusques, sont ensuite passés en revue. La micrographie, avec l'exposé des méthodes à employer occupe ensuite une place suffisante pour faire comprendre son importance et apprécier son utilité.

Enfin, sous le titre *législation*, le dernier livre réunit et compare tous les documents existants et n'est pas, malgré leur apparente aridité, le moins intéressant.

C'est avec un grand intérêt que j'ai étudié l'ouvrage de MM. Villain et Bascon; et je n'ai encore rencontré nulle part un exposé détaillé aussi complet et aussi intéressant que celui présenté dans certaines parties de ce volume, que voudront certainement posséder tous ceux qui s'intéressent aux choses de l'hygiène. D'ailleurs, le succès de la première édition qui était, depuis un certain temps, complètement épuisée, est un sûr garant de celui qui attend celle-ci.

D^r Gabriel POUCHET.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 3 mai 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Painlevé : Sur les intégrales algébriques des équations différentielles du premier ordre. — M. E. Beltrami : Quelques remarques au sujet des fonctions sphériques. — M. Poincaré présente un rapport sur un mémoire inédit de M. Cellérier intitulé : « Sur les variations des excentricités et des inclinaisons » ; ce mémoire déjà fort ancien est encore intéressant, tant pour les résultats nouveaux qu'il contient que pour la forme dans laquelle sont exposées les découvertes retrouvées depuis sa rédaction. — M. Tacchini adresse le relevé des phénomènes solaires observés en 1889 avec leur distribution en latitude ; les phénomènes ont été bien plus fréquents dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Lucien Poincaré, étudiant la polarisation des électrodes dans un sel métallique fondu, a vu que la polarisation maximum, qui décroît quand la température augmente, tend vers zéro pour la température de décomposition du sel. Il a observé le fait pour divers sels et pour des électrodes d'argent, d'or ou de fer. — M. W. de Fonvielle présente un mémoire sur les champs de rotation magnétique, qui a pour but d'expliquer par les lois connues de l'induction et de l'attraction magnétique les effets que M. Elihu Thomson a présentés à l'Exposition Universelle et que M. de Fonvielle lui-même avait communiqués à l'Académie. — M. Moissan indique différentes méthodes pour la préparation du tétrafluorure de carbone et quelques-unes des propriétés de ce corps. — M. Boyer formule les conditions dans lesquelles il faut opérer la réduction de l'acide azotique en ammoniacque par le zinc et l'acide chlorhydrique, si l'on veut que cette réduction soit totale et que l'ammoniacque formée puisse servir au dosage de l'acide azotique. — M. E. Doumer explique que si M. Walter n'a pas trouvé exacte la loi sur les pouvoirs réfringents moléculaires des sels en dissolution, cela tient à ce que le pouvoir réfringent des sels n'est pas constant, quelle que soit la dilution. Il faut les considérer dans un état de dilution tel que la densité du sel dans la dilution, prise par rapport à l'hydrogène, soit égale au poids moléculaire du sel. — Après avoir étudié l'action de l'eau oxygénée sur les oxydes de manganèse, M. A. Gorgeu, étudie cette action sur l'acide permanganique et les permanganates. Comme dans le premier cas, cette action est très complexe et varie suivant les conditions dans lesquelles on opère. — M. P. Cazeneuve continuant l'histoire des phénols sulfoconjugués dérivés du camphre, a approfondi l'étude de l' α -méthylcamphophénolsulfone et d'une matière colorante jaune tétranitrite dérivée. — M. A. Hébert a découvert dans la paille en même temps que M. Tollens l'existence de la gomme de bois, qui donne par saccharification de la *xylose* ; il indique le procédé d'analyse de la paille en tenant compte de ce produit.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Er. Mallard montre que, si l'on n'a pu s'accorder sur les propriétés de la *tridymite*, cela tient à ce que certains des échantillons observés étaient pseudomorphosés en quartz ; il décrit les véritables propriétés cristallographiques de ce minéral, ainsi que celles de la *christobalite*. — M. A. Lacroix décrit les géolites dont il a signalé l'abondance dans les fissures des gneiss de diverses localités. — MM. Berthelot et André ont déterminé avec précision les chaleurs de combustion des principales

substances azotées fournies par les êtres vivants, l'albumine de l'œuf, la fibrine du sang, l'hémoglobine, la caséine, l'osséine, la chondrine, la vitelline, le gluten, la fibrine végétale, etc. ; ils présentent ensuite quelques considérations générales sur les combustions chez les êtres vivants. — M. S. Arloing a étudié la disparition de la virulence dans les vieilles cultures de *Bacillus anthracis* ; il constate que si l'on opère des ensemcements dans des bouillons neufs avec des cultures dont l'inoculation est parfaitement inoffensive, on assiste à une résurrection immédiate de la virulence ; il en conclut que l'effet du vieillissement est la raréfaction des bacilles et non une diminution de leur virulence réelle. — M. Babès a reproduit chez le lapin et chez le bœuf, par l'injection du sang d'animaux malades, l'hémoglobinurie des bestiaux de Roumanie dont il a décrit le parasite spécifique. — M. A. Muntz, voulant déterminer la valeur comme engrais azoté des légumineuses enfouies vertes, a étudié la rapidité de la nitrification de leur azote ; on sait en effet que c'est à l'état de nitrates que les plantes utilisent l'azote. Il a constaté que cette nitrification est toujours rapide ; elle le devient surtout, comparée aux autres engrais, dans les terres fortes qui sont habituellement un obstacle à cette transformation.

Séance du 12 mai 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — C. Guichard : sur les surfaces qui possèdent un réseau de géodésiques conjuguées. — M. O. Callandreau a calculé complètement l'écart entre la surface de la terre supposée fluide et celle d'un ellipsoïde de révolution ayant mêmes axes ; cet écart est négatif, maximum pour la latitude de 45° et égal en ce point à 9 mètres. — M. Mouchez présente des photographies lunaires de MM. Henry ; les clichés ont été obtenus directement par agrandissement de l'image fournie par la lunette, procédé qui a donné une netteté supérieure à celle de toutes les épreuves antérieures. — M. Faye présente le volume III des *Annales de l'Observatoire de Nice*. — M. P. Decœur présente un mémoire sur un appareil hydraulique avec nouveau modèle de turbine pour l'utilisation continue de la force des marées.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — MM. J. Macé de Lépinay et Ch. Fabry, sur quelques cas particuliers de visibilité des franges d'interférence. — M. C. Decharme, répétant les expériences de M. Paul Janet sur l'aimantation transversale des barreaux d'acier électrisés longitudinalement, mais avec des courants plus faibles (8 à 10 ampères), a observé que les lignes de force transversales varient d'une façon ondulatoire. — M. A. Witz, a commencé l'étude quantitative des phénomènes lumineux et électriques produits par les champs magnétiques dans les tubes à gaz raréfiés. En particulier il a constaté que l'augmentation de la résistance électrique de ces tubes, signalée dans ces conditions, croît avec l'intensité du champ. — M. G. Geisenheimer, indique le mode de préparation, la composition et quelques propriétés des chlorures doubles d'iridium et de phosphore. — M. G. Denigès, signale, comme réactif sensible de l'eau oxygénée, le molybdate d'ammoniaque en solution dans de l'eau additionnée d'acide sulfurique ; ce réactif présente une coloration jaune intense par l'action de quelques gouttes d'eau oxygénée.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Michel Lévy, a découvert l'existence du périod. microlithique dans les andésites et les labradorites de la chaîne des Pays. — M. A. Lacroix, a étudié les phénomènes de contact de la *syénite éololithique* de Pouzac (Hautes-Pyrénées) et la

transformation en dipyre du feldspath de la roche ophitique du même gisement. — **M. Ch. L. Frossard** donne un classement de la série des roches qui ont subi l'action métamorphique de la syénite de Pouzac. — **M. G. de Saporta** a relevé les dates d'apparition des feuilles, espèce par espèce, des arbres d'une localité de Provence: il a noté des retards considérables d'une espèce à l'autre sans pouvoir en déterminer la cause. — **M. S. Winogradsky**, sur le microbe producteur de la nitrification. (Voir p. 299 du présent numéro.) — Pour étudier expérimentalement des dislocations et déformations analogues à celles qu'a pu subir le globe terrestre, **M. Daubrée** emploie le dispositif suivant: Un ballon de caoutchouc est rendu inégalement extensible par l'addition aux deux pôles, de calottes concentriques de caoutchouc surajouté, ce ballon est gonflé par de l'eau, trempé dans un bassin de cire ou de paraffine de consistance variable; puis, après refroidissement de la couche, on laisse l'eau s'écouler goutte à goutte. Ainsi sont reproduites les conditions auxquelles est soumise l'enveloppe solide d'un sphéroïde qui se rétracte.

M. Raoult est nommé correspondant pour la section de physique.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 13 mai 1890

M. Crivelli (de Melbourne) lit une note avec photographies à l'appui, sur un développement anticipé des organes génitaux chez une petite fille de 18 mois, déjà réglée trois fois. — **M. Dumontpallier** fait une communication sur le traitement local de l'endométrite chronique par les crayons de chlorure de zinc (1 de chlorure pour 2 de farine de seigle) laissés à demeure, traitement donnant les meilleurs résultats curatifs sans provoquer d'accidents ni complications ultérieures. — **M. Ledentu** lit un rapport sur le travail de **M. Boeckel** (de Strasbourg) relatif à l'entérostomie temporaire pour faciliter la réduction des anses intestinales herniées pendant la laparotomie pour occlusion intestinale et rappelle que trois procédés peuvent être employés: ponction simple des anses intestinales, deux à trois ponctions avec gros trocart puis sutures, incision. — **M. Terrier** est élu membre dans la section de pathologie chirurgicale.

Séance du 20 mai 1890.

M. le Président annonce la mort de **M. Siredey**. — **M. Dujardin-Beaumetz**, résume l'action thérapeutique de la noix de kola qui contient caféine, théobromine et tannin et est diurétique, anti diarrhéique, tonique par sa caféine et sa théobromine plus que par le rouge comme le veut **M. Heckel**. **M. G. Sée** ajoute que d'après les expériences les plus récentes c'est la caféine qui a la principale action dans la noix de kola. — **M. Cornil** lit un rapport sur un travail de **M. Babès** relatif à la pénétration du bacille morveux à travers la peau saine, d'autant plus facile que le virus est très actif et récemment préparé: expériences sur les cobayes vérifiées par **M. Nocard**. Le bacille pénétrerait dans les follicules pileux où il se multiplierait, les perforerait pour envahir les lymphatiques et se généraliser. — **M. Hervieux** fait une communication sur le vaccin de la chèvre qui est, de même que la génisse, apte à recevoir l'inoculation vaccinale et à devenir vaccinifère. Le cow-pox n'est pas spécial à l'espèce bovine. **Gibert** (du Havre) l'a observé sur l'âne. On a vu la transmission au cheval, au mouton. L'évolution est toujours la même. — **M. Galezowski** expose un nouveau procédé opératoire pour le rétrécissement lacrymal, respectant la force contractile du point lacrymal, permettant une dilatation progressive facile et rapide. — **MM. Lacassagne et Gros** (d'Alger) sont élus membres correspondants nationaux.

D^r Ed. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 10 mai 1890.

M. Gley présente la thèse de **M. Parisot** intitulée: Étude physiologique de l'action de la caféine sur les fonctions motrices. Ce travail ramène l'effet des substances dites d'épargne à une action tonique nerveuse qui entraîne une activité plus grande des combustions. A propos de ce travail, on avait contesté que l'action de la caféine rende compte des propriétés de la noix de kola; **M. Lapicque** rapporte des expériences comparatives dans lesquelles il a obtenu les mêmes effets avec les deux substances. — **M. Féré** qui avait vu que les urines excrétées par les épileptiques immédiatement avant leurs accès ont un pouvoir toxique et surtout convulsivant fort au-dessus de la normale, a constaté qu'après l'accès cette toxicité s'abaisse au-dessous du taux normal. — A propos de l'aperception de la sensation de poids, **M. Féré** rappelle que 1^{re} l'intensité de la sensation de poids varie en sens inverse de la force musculaire, 2^o les mouvements d'un groupe musculaire provoquent une tendance au mouvement, c'est-à-dire un accroissement de force dans les autres groupes. On a là toute l'explication des variations produites dans la sensation de poids par les mouvements associés des deux bras. — **M. Charrin** a vu que les lapins vaccinés pour le bacille pyocyanique et ceux qui ne le sont pas sont également sensibles à l'action toxique des produits solubles sécrétés par le microbe. — **M. Phisalix** a étudié le mécanisme de transformation de la circulation veineuse chez un embryon humain long de 4 mm, 5. — **M. Charpentier** signale le fait suivant: si l'on regarde sous un éclairage intense un disque noir en rotation avec un secteur blanc, on voit une ligne noire à l'intérieur de ce secteur blanc. **M. Charpentier** pense qu'il y a là un phénomène d'interférence rétinienne. — **M. J. A. Fort**, en électrisant par un courant faradique l'œsophage d'un homme atteint de rétrécissement, a vu se produire sous l'influence du courant une accélération du cœur qu'il attribue à l'excitation des pneumogastriques.

Séance du 17 mai 1890.

M. Mathias-Duval a observé chez l'embryon du poulet, relativement à la transformation de la circulation veineuse, les mêmes phénomènes que **M. Phisalix** a décrits chez l'embryon humain. — **MM. Cambe-male et François** ont étudié une épidémie de crachats verts; il s'agit du développement dans ces sécrétions d'un micro-organisme sans importance pathologique. — **M. Brown-Séquard** a constaté que l'irritation cérébrale produit des hémorragies dans le poumon par la voie du sympathique thoracique et non par celle du pneumogastrique. — **M. Mathias Duval** a observé sur lui-même le fait suivant: il a bonne mémoire pour les noms des personnes qu'il ne connaît pas, mais quand il les connaît, leur représentation visuelle inhibe l'image tonale et l'empêche de se rappeler leur nom. — **M. Louis Dor** a inoculé à des lapins le liquide céphalo-rachidien d'un tétanique; ces lapins sont morts sans phénomènes bien accusés, mais la substance de leur bulbe, chauffée à 60° et inoculée à d'autres lapins, a produit chez ceux-ci le tétanos typique. — **MM. Courmont et Jaboulay** ont produit des ostomyélites expérimentales par injection de streptocoques; ces ostomyélites diffèrent de celles que produisent dans les mêmes conditions les staphylocoques.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 16 mai 1890.

M. Bouty fait une communication sur les condensateurs en mica. On admet généralement que la lame diélectrique séparant les deux armatures d'un condensateur, se laisse pénétrer à la longue par l'électricité;

si les deux armatures sont en communication permanente avec les deux pôles d'une pile, on devrait, au bout d'un certain temps, constater la production d'un courant permanent faible, mais bien déterminé dans le circuit ainsi constitué. M. Bouty a mesuré l'intensité de ce courant; sa valeur est extraordinairement faible et mal déterminée; il montre qu'on ne saurait attribuer ce fait, ni à des phénomènes de polarisation des électrodes, ni à un dépôt de matière isolante; on doit admettre que le mica oppose un obstacle à peu près absolu au passage continu de l'électricité. Le résidu électrique que l'on observe dans les condensateurs doit, sans doute, être attribué à une sorte de déformation électrique du corps isolant, analogue aux déformations élastiques, la constante diélectrique étant fonction du temps. — M. Witz étudie les phénomènes si curieux qui se produisent dans les tubes de Geissler excités dans un champ magnétique très puissant. Autour de la cathode se forme un disque bleuâtre dont les bords tracent dans l'espace la direction des lignes de forces du champ en ce point; l'aspect général est entièrement modifié, l'analyse spectrale décelé la production de nouvelles radiations. La force électromotrice aux extrémités du tube augmente quand le champ devient plus grand, mais elle ne reste pas proportionnelle à l'intensité du courant, de sorte qu'il n'y a pas à proprement parler de résistance. Il est à remarquer que, même concentrée en un seul point du tube, l'action du champ, est encore comparable à celle qui se fait sentir quand elle s'étend sur le tube tout entier. — M. Chaperon présente des boîtes de résistance où les bobines n'ont ni self-induction, ni capacité. Avec ces résistances on peut dans la méthode des courants alternatifs, amener un téléphone jeté sur un pont au silence absolu, et par suite utiliser cette méthode dans la mesure des résistances polarisables. Lucien POINCARÉ.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 8 mai 1890.

SCIENCES PHYSIQUES. — MM. C. A. Alder Wright et C. Thompson communiquent les résultats de leurs nouvelles recherches sur certains alliages ternaires : 1) Ce sont des alliages constitués de telle sorte que tandis que deux des métaux qui les composent, A et B, ne peuvent s'unir l'un à l'autre en toutes proportions, le troisième, C, peut s'unir en toutes proportions, soit à A, soit à B. Lorsqu'on fait fondre, à une température qui reste à peu près égale pendant la durée de l'expérience, un mélange des trois métaux, A, B et C, il se partage, au bout d'un certain temps, en deux alliages ternaires de densité inégale, si la proportion du métal C de l'alliage total reste au-dessous d'une limite donnée, mais si la proportion de C est plus forte, il ne se produit qu'un seul alliage homogène. 2) Dans les circonstances ordinaires, les différents alliages ainsi formés sont, d'une part, une solution saturée de A dans un mélange de B et de C (alliage léger) et une solution saturée de B dans un mélange de A et de C (alliage lourd), les solubilités étant telles que la quantité de A (ou de B) dissoute, est d'autant plus grande que le mélange contient une plus forte proportion de C. 3) La quantité de B, dissoute par un poids donné de A (ou de A dissoute par un poids donné de B), en présence d'un poids donné de C varie considérablement avec la nature de C; l'effet ordinaire de l'accroissement de la température est d'accroître la solubilité de A dans BC et de B dans AC, dans certains cas, il l'accroît considérablement. 4) Le troisième métal C se partage entre les deux alliages d'une manière qui ne varie pas seulement avec la nature de A, B et C, et avec la température, mais aussi avec les proportions relatives de A et de B dans la masse entière et la proportion de C dans cette même masse. — M. E. F. Permain communique quelques expériences sur la densité des vapeurs. L'objet principal de ses recherches est de déterminer si le brome a quelque tendance à

se dissocier aux basses pressions, c'est-à-dire au-dessous de 15^{mm} de mercure, et aux températures modérées. La méthode employée pour déterminer les densités de vapeur diffère de celle de Dumas en trois points essentiels : 1) Le globe n'est pas plongé dans un bain, mais a une enveloppe de vapeur. 2) Le poids de la vapeur contenue dans ce globe n'est pas obtenu par pesée directe, mais en y faisant pénétrer un liquide absorbant dont on mesure le volume. 3) On a fait une série de déterminations de densités de vapeur à différentes pressions avec la même quantité de vapeur, en abaissant la pression, en absorbant la vapeur chassée et en déterminant sa quantité. Les résultats obtenus sont négatifs, mais ils montrent que la dissociation se serait produite si on avait élevé suffisamment la température. Un trait frappant, c'est l'accroissement invariable de la densité aux basses pressions. On a fait aussi des expériences pour déterminer la densité de vapeur de l'iode, par la méthode ci-dessus et par la mesure de la vitesse du son, d'après la méthode de Kundt. On a fait passer l'étincelle électrique à travers la vapeur d'iode pour voir si la dissociation se produirait et on est arrivé à cette conclusion que, bien que l'étincelle ne produise aucune dissociation permanente, il est très probable qu'au moment où l'étincelle passe, il se produit au voisinage des conducteurs une dissociation passagère. On a déterminé aussi les densités de vapeur de l'anhydride sulfurique. — M. William Henry Preece présente une note sur les effets thermiques des courants électriques. Il a déterminé antérieurement le nombre d'ampères que doit avoir un courant pour fondre divers conducteurs cylindriques d'un centimètre de diamètre. (*Roy. Soc. Proc.*, nov. et mars 1888.) Il montre aujourd'hui que lorsqu'on connaît l'intensité d'un courant qui produit une température déterminée dans un conducteur cylindrique donné, on peut facilement calculer quelle doit être l'intensité d'un courant destiné à produire une autre température. — M. C. G. Symens présente une note sur les oscillations barométriques pendant les orages et sur le Brontomètre, instrument destiné à faciliter leur étude. Il a réuni toutes les observations qui signalent une élévation barométrique pendant certains orages. Pour déterminer la cause de ces variations, il est nécessaire de déterminer avec précision la succession des divers phénomènes et les moments de leur plus grande intensité. Dans ce but, l'auteur a inventé avec MM. Richard frères, de Paris, un appareil qu'ils ont construit. Le papier sans fin passe sous la plume inscriptrice avec une vitesse de 6 pieds à l'heure, de telle sorte que le moment d'un phénomène peut être déterminé à la demi-seconde. La vitesse du vent est constamment enregistrée par un anémométrique de Richard et la pression atmosphérique par le statoscope un peu modifié et rendu si sensible qu'il donne 30 pouces pour chaque pouce du baromètre à mercure (c'est trois fois l'échelle du baromètre à glycérine). Grâce à d'autres appareils sont également enregistrés : le commencement, les variations d'intensité et la fin de la pluie; le moment de chaque éclair; le commencement et la durée de chaque coup de tonnerre; le commencement, les variations d'intensité et la fin de la grêle. Richard A. GRÉGOIR.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 2 mai 1890.



M. C. A. Garus-Wilson étudie la distribution des réactions produites dans un solide élastique déformé. Il remarque que, dans le cas d'un barreau soumis à un effort de tension, il se produit des forces de cisaillement qui tendent tous les éléments du barreau; la force résultante atteint sa valeur maximum dans un plan incliné à 45° de l'axe. Si ces efforts de cisaillement s'exercent sur les côtés d'un élément en forme de parallélogramme, et s'ils sont égaux, l'élément se trouvera par suite soumis à une résultante verticale; si au contraire les deux efforts n'ont pas même valeur, l'élément se

trouvera entraîné dans le sens du plus grand. Comme dans toutes les sections également inclinées sur l'axe, les éléments sont soumis à la même force de cisaillement, l'effort le long d'une section quelconque est inversement proportionnel à la longueur même de cette section. Il résulte de là que, si la barre considérée n'a pas partout la même épaisseur, les sections inclinées passant par un point n'ayant pas toujours des longueurs égales et l'effort de cisaillement qui s'exerce du côté de la plus petite étant alors plus grand, le solide se déformera : une ligne droite tirée horizontalement sur le barreau ne restera plus une droite, elle s'infléchira vers son milieu, dans un sens que font prévoir les considérations précédentes. L'auteur a expérimenté sur des barreaux de cuivre très soigneusement préparés et soumis à des efforts permanents, il a trouvé des résultats entièrement d'accord avec sa théorie. — Le professeur **Perry** ne trouve pas très correct de supposer a priori que l'effort de cisaillement a une valeur uniforme sur les sections planes inclinées à 45° de l'axe. — **M. Herschel** pense que cette supposition ne saurait être considérée que comme une simple hypothèse, mais l'accord entre les déductions théoriques et l'observation des faits la légitime *a posteriori*. — **M. Boys** fait une communication sur la photographie des objets animés de mouvements rapides. Il montre un ensemble d'appareils permettant de photographier par exemple des gouttes d'eau dans toutes les périodes de leur formation. Une lanterne permet d'éclairer très fortement les gouttes devant lesquelles tourne un disque percé d'un trou : en avant se trouve la chambre photographique. Si on découpe ensuite les photographies obtenues et qu'on les place dans une sorte de thaumatrope, on pourra reproduire toutes les particularités et tous les aspects du phénomène étudié. — **M. Boys** fait ensuite une communication sur les étincelles électriques oscillantes. Un disque porte six lentilles partagées en deux groupes de trois ; dans chaque groupe les lentilles sont à des distances différentes de l'axe, de telle façon que les images de l'étincelle sur l'écran ne coïncident pas. Le disque peut être animé d'un mouvement de rotation très rapide : les étincelles successives apparaissent alors comme des taches brillantes. On peut donc avec cet appareil observer une décharge simple ; les photographies d'une décharge oscillante prouvent que la durée de l'illumination est une fraction considérable d'une période complète. — **Lord Rayleigh** fait remarquer l'intérêt de ces communications : il avait déjà photographié des gouttes d'eau, mais il n'avait pas cru possible d'avoir assez de lumière pour obtenir une image d'une simple étincelle. **M. Perry** demande s'il est possible de comparer les formes des gouttes d'eau avec celles des surfaces liquides de révolution que Sir W. Thomson a montrées autrefois à la Société Royale. **M. Boys** pense que le mouvement des gouttes est trop rapide, et que l'inertie doit jouer un très grand rôle dans leur formation.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 1^{er} mai 1890

MM. Wyndham Dunstan et Dymond : Recherche des conditions dans lesquelles l'eau oxygénée est produite par l'éther. — Les auteurs trouvent que l'éther pur ne forme pas d'eau oxygénée sous l'influence de la lumière. L'eau oxygénée se forme quand l'ozone réagit sur l'éther en présence de l'eau. A la température du rouge sombre, l'oxygène paraît agir sur l'éther comme l'ozone à basse température. — **MM. Japp et Wadsworth** : *Para-desylphenol*. Par l'action de l'acide sulfurique concentré et froid sur un mélange de benzoïne et de phénol, il se forme de l'acide para-desylphenol-monosulfonique



Les auteurs étudient quelques propriétés de ce corps. — **M. Lewkowitsch** reprend un travail de **Benedikt** sur l'examen des graisses. **Benedikt** a trouvé que, lorsqu'on chauffe les acides gras avec de l'anhydride acétique, les acides qui contiennent le groupement hydroxyle se combinent seuls au radical acétyle, ceux qui ne contiennent pas le groupe hydroxyle restent inaltérés. Les résultats de **M. Lewkowitsch** semblent contredire ceux de **Benedikt**.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 17 avril 1890.

SCIENCES NATURELLES. — **M. le prof. J. Rosenthal d'Erlangen**, dans la suite de ses recherches calorimétriques chez les mammifères, mesure la quantité de chaleur perdue par l'animal fut mesurée à une température constante située au-dessous de 15° et au-dessus de 5°, tandis que l'animal lui-même fut soumis avant l'expérience à la même température, ou à une température plus basse, ou à une température plus élevée. L'animal tenu avant l'expérience dans une atmosphère à basse température communique au calorimètre moins de chaleur dans la première ou dans les deux premières heures. L'animal soumis avant à une température plus élevée communique d'abord plus de chaleur au calorimètre. La production de chaleur n'est plus influencée après cette période initiale. L'auteur explique cette différence par des changements survenus dans la chaleur propre de l'animal, comme tendent à le prouver des expériences faites avec des animaux rasés. La différence entre la production de chaleur et la perte de chaleur se marque encore plus chez les animaux chloralisés. La température d'un lapin auquel on injecte du chloral baisse jusqu'à 2° dans la première heure, et durant ce même temps la perte de chaleur augmente de 30 à 40 0/0, quoique la production de chaleur, au lieu d'être augmentée, soit diminuée ; l'élimination de CO₂ est également diminuée durant le sommeil chloralique. Une augmentation de la production de chaleur avec diminution de la perte de chaleur aurait lieu dans les états tétaniques d'origine réflexe, et spécialement dans ceux déterminés par la strychnine, le bacille du tétanos, et l'excitation immédiate de la moelle épinière.

J. F. HEYMANS.

Séance du 24 avril 1890.

1^o SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Auwers** communique une lettre de **M. Vogel**, directeur de l'observatoire astrophysique de Postdam, d'après laquelle les observations spectrographiques de l'étoile Virginis ont démontré un mouvement périodique, dont la vitesse est à peu près de douze milles.

D^r HANS JAHN.

2^o SCIENCES NATURELLES. — **M. le professeur S. Schwendener** : Sur la gaine du mestome des feuilles des graminées. La plupart des Graminées possèdent une assise limite ou endoderme qui entoure le faisceau du mestome des feuilles. Elle n'existe pas chez une partie des goniciées, chez les Andropogonées et les Maydées. Le système mécanique de cette dernière catégorie de plantes se rapproche d'ailleurs à différents points de vue de celui des Liliacées. Le système mécanique des Bambusées se rapproche de celui des Graminées, il possède un endoderme. Les stomates des Graminées et de la plupart des Cyperacées possèdent une forme typique spéciale. L'auteur tire de ces données une nouvelle confirmation pour le principe qu'il a énoncé et d'après lequel chaque système de tissu et chaque appareil possède son histoire propre dont les différentes périodes dans la série des générations ne coïncident pas d'ordinaire avec celles d'autres processus de développement. On ne peut donc pas s'attendre à trouver que les caractères anatomiques des plantes classées d'après leurs organes de reproduction se groupent comme ceux tirés de la fleur et du fruit ; les caractères anatomiques n'en conservent pas

moins leur imprégnation pour la classification naturelle des plantes. L'auteur considère comme insoutenable la théorie d'après laquelle la structure des organes de la végétation ne serait que l'expression de l'adaptation aux conditions de vie. Il est possible en effet de distinguer chez les Graminées, ainsi que chez les autres plantes, des caractères taxinomiques et des caractères épharmériques (Vesque).

J. F. HEYMANS.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 16 mai 1890.

M. Kopsel présente à la Société le galvanomètre à torsion de Siemens et Halske. Cet instrument se compose de deux bobines parallèles entre lesquelles est suspendu un petit aimant en forme de cloche. Ce dernier est muni d'un ressort à torsion et d'un petit indicateur en aluminium, se mouvant au-dessus d'un disque circulaire en verre qui porte une graduation arbitraire. Dès qu'un courant parcourt les bobines, l'aimant est dévié. On reconduit l'indicateur au zéro de la graduation par une torsion qui est exactement proportionnelle à l'intensité du courant. La graduation arbitraire de l'instrument est faite de telle sorte que chaque degré correspond à une tension de 1/1000 volt, s'il n'y a pas de résistance intercalée. Pour la mesure de tensions plus fortes on se sert de quatre résistances de respectivement 9, 99, 999, 9999 ohms. La résistance du galvanomètre même est exactement égale à 1 ohm, de sorte que, si l'on ajoute la première résistance on a 10 Ohms; un degré de la graduation correspond donc à 10/1000 volt et ainsi de suite. Pour le contrôle indispensable on se sert d'un rhéostat, d'un voltmètre, d'un élément de Clark et de 17 résistances dont chacune est de 143,3 ohms. On ajoute un circuit secondaire qui contient l'élément de Clark, une résistance de 100,000 Ohms et un galvanomètre circulaire. Supposons le courant réglé à l'aide du rhéostat, en sorte que le galvanomètre à torsion montre 10°, alors l'intensité est de 0,01 Ampère et la tension au point de contact de notre première résistance doit être de $143,3 \times 0,01 = 1,433$ volt, c'est-à-dire exactement égale à un Clark. Le galvanomètre auxiliaire doit donc rester immobile si le galvanomètre à torsion est juste. Sinon, il faut compenser jusqu'à l'immobilité totale du galvanomètre auxiliaire : le galvanomètre à torsion subit alors une certaine déviation qui donne la correction cherchée. Alors on donne à l'instrument une déviation de 20° et la compensation doit avoir lieu par l'intercalation de deux de nos résistances. Quant à l'élément de Clark, on le soumet tous les deux ou trois mois à un examen à l'aide du voltmètre.

Dr HANS JAHN.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Séance du 3 mai 1890.

M. L. Henry communique un extrait d'une lettre qu'il vient de recevoir de M. Mentchutkin, professeur à l'Université de Saint-Petersbourg, relativement à l'action qu'un dissolvant indifférent exerce sur la vitesse de combinaison de deux corps qu'il tient en dissolution : « Mes expériences, dit l'auteur, m'ont conduit à étudier les conditions de l'acte de la combinaison chimique. J'étudie la combinaison de la triéthylamine $\text{Az}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ avec l'iodeure d'éthyle $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$ en présence de dissolvants réputés indifférents, par exemple les hydrocarbures, les éthers simples, les acétone. L'expérience montre que ces dissolvants exercent sur la vitesse de combinaison une influence considérable. Si l'on représente par 1 la constante de vitesse de la réaction précédente dans l'hexane C_6H_{14} , la constante de vitesse pour la même combinaison dans l'acétone méthyléthylique $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{C}_2\text{H}_5$, sera, toutes choses égales d'ailleurs, 847,7. La différence est énorme ; mais, dans ce cas, elle n'atteint pas encore le maximum. Ayant observé une relation entre la composition et la structure des dissolvants, et la variation de la vitesse de

formation de l'iodeure de tétraéthylammonium, je crois pouvoir prédire que les acétone de la série naphthique, prises comme dissolvants, seront encore plus favorables pour la combinaison de $\text{Az}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ avec $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$. Vous voyez donc que les dissolvants, réputés indifférents, ne sont pas inertes ; ils modifient profondément l'acte de la combinaison chimique. Cet énoncé est gros de conséquences pour la théorie chimique des dissolutions. »

F. F. Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES
DE SAINT-PETERSBOURG

Séances des 22 avril et 6 mai 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Tchebycheff, membre de l'Académie, présente une note d'un savant français, M. Edouard Lucas, intitulée : « Sur la loi de réciprocity des résidus quadratiques. » Elle contient une nouvelle démonstration d'une importante propriété des nombres qui a été formulée par Euler sous le nom de loi de réciprocity de deux nombres simples. Depuis Gauss et Legendre, plusieurs mathématiciens, entre autres Bonniakovski et Zolotarev, ont travaillé à la démonstration exacte de cette loi.

2^{de} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Wild, directeur du bureau météorologique et membre de l'Académie, présente la description d'un nouvel Anémographe et Anémoscope. Cet instrument, construit à Paris, fonctionne depuis deux ans à l'Observatoire météorologique et donne les meilleurs résultats en notant la direction et l'intensité des plus faibles mouvements de l'atmosphère. — M. Gadolin, membre de l'Académie, présente une note de M. Chwolson sur les changements de la conductibilité de la chaleur dans les métaux, suivant les températures. L'auteur donne une formule pour le rapport entre la conductibilité à la surface et dans l'intérieur des tiges en métal et indique les coefficients des changements suivant les températures pour chacune de ces conductibilités. Ses expériences n'ont été faites pour le moment que sur les tiges en laiton ou cuivre jaune, chauffées dans les vapeurs d'eau et d'aniline.

O. BACKLUND,
Membre de l'Académie.

SOCIÉTÉS SAVANTES D'ODESSA

SCIENCES NATURELLES. — A la Société des Naturalistes de la Nouvelle Russie (3 mai 1890), M. Morine a présenté ses recherches sur l'embryogénie du *Chiton* de Sebastopol. Il confirme en général les résultats principaux des observations de M. Kowalevsky (*Annales du Musée d'Histoire naturelle de Marseille*, tome I^{er}, 1883). L'auteur a examiné les premiers stades du développement : la formation des œufs dans l'ovaire, l'excrétion des globules polaires de Robin. L'enveloppe chorionnaire du *Chiton* observé est tout à fait transparente et ne possède pas la structure si compliquée décrite par le professeur Kowalevsky chez les Chitons qu'il a examinés. Le mésoderme dérive de l'ectoderme comme M. Kowalevsky l'a décrit, c'est-à-dire qu'il apparaît vers le poulvoir même du blastopore et qu'il est constitué par quelques cellules symétriquement placées de chaque côté de l'ectoderme ; mais outre cela, au bord du blastopore se séparent deux grandes cellules rondes mésodermiques, mésoblastes. Plus tard dans le mésoderme se développe la cavité du corps en forme de deux sacs (*coelom*). La glande pédieuse se développe sous forme d'un enfouissement ectodermique. Le ganglion céphalique et les troncs nerveux (deux pédieux et deux latéraux) dérivent des épaississements ectodermiques qui se séparent plus tard complètement de l'ectoderme et s'enfoncent dans le mésoderme. Le rectum se développe beaucoup plus tard que le prétend M. Kowalevsky : l'enfoncement ectodermique, qu'il croyait devenir le rectum n'est qu'un pli séparant le pied du tronc. Le tube digestif commence à se courber deux ou trois jours

après l'éclosion de l'œuf et la courbure commence vers la moitié postérieure du corps ; puis se propage vers la moitié antérieure. De la face dorsale dans le sac endodermique s'enfoncent deux plis qui le divisent en trois régions : l'intestin moyen proprement dit et deux lobes hépatiques latéraux. Onze jours après l'éclosion, l'auteur n'a encore observé aucune apparition ni du cœur, ni des branchies, ni des reins. D^r Pierre HAUSER.

ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 24 avril 1890.

1^o SCIENCES PHYSIQUES. — Le président **Stephan** dépose un mémoire : Sur les oscillations électriques dans les conducteurs rectilignes. Ce mémoire renferme les résultats développés des communications précédentes dont il a été rendu compte ; il contient en outre des recherches relatives aux conducteurs non parfaits et spécialement aux conducteurs électrolytiques. — **M. Ernest Lecher** adresse des « Etudes sur les résonances électriques ». Il décrit d'abord une nouvelle méthode pour observer les oscillations électriques dans des fils. Vis-à-vis chacun des deux plateaux de l'appareil de Hertz se trouve disposé un plateau aussi grand et bien isolé, auquel est attaché un fil de plusieurs mètres de long. A l'extrémité du fil se trouve un tube dans lequel on fait le vide et qui s'illumine par suite des oscillations électriques dans le fil. Si l'on joint les deux fils parallèles par un fil transversal, on voit aussitôt l'illumination se produire. En déplaçant le pont le long des fils parallèles d'un côté et d'autre, on trouve des endroits parfaitement déterminés, où subitement l'illumination du tube devient plus intense, ce sont les ventres des oscillations. L'auteur discute en détail les conditions et les résultats de ses expériences. Il trouve généralement les mêmes résultats que Hertz, cependant il est en désaccord avec lui sur un point important. Pour la vitesse de l'électricité dans les fils, à laquelle Hertz attribue une valeur de 200.000 km. par seconde, il a trouvé une valeur identique à celle de la vitesse de la lumière à 2 0/0 près ; ce résultat est d'ailleurs conforme à la théorie de Maxwell. — **M. Pohl** étudie les acides carbopyridiques ; il décrit l'anhydride, les combinaisons avec l'ammoniaque et l'amine monosubstituée de l'acide orthocarbopyridique.

2^o SCIENCES NATURELLES. — **M. Suess** résume un travail présenté par le lieutenant **Höhnel**, le professeur **Toula**, et lui-même « Sur la description de l'Afrique orientale ». Ce travail comprend trois articles. La première partie est due au lieutenant V. Höhnel qui a fait partie d'une expédition africaine ; il donne une description orographique et hydrographique très complète de toute la région voisine du Victoria-Nyansa ; cette description est accompagnée plusieurs cartes. La seconde partie est due à M. Toula, qui décrit les échantillons géologiques recueillis par M. Höhnel. La troisième partie a été rédigée par M. Suess, il y résume l'état actuel de nos connaissances sur l'Afrique orientale. — **M. Adam Kiewicz** étudie les artères de la moelle allongée. Il

examine en détail les rapports du système vasculaire avec la moelle dorsale chez l'homme et classe les vaisseaux d'après des règles fixes et certaines.

Séance du 8 mai 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. A. Sucharda** : Sur une classe de surfaces. — **M. W. Binder** : Sur les courbes planes du quatrième ordre et de genre un. — **M. F. Mertens** : Les invariants des formes quadratiques.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — **M. J. M. Eder** étudie les spectres d'émission produits par la combustion peu vive des carbures d'hydrogène, et par la flamme du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène. Il donne la valeur des longueurs d'onde qu'il a mesurées pour les radiations visibles et les radiations ultra-violettes. — **M. A. Schraub** adresse un mémoire sur la variation des indices de réfraction du soufre prismatique avec la température. Il a effleuré très soigneusement des mesures d'indice qu'il a rapportées aux températures de 8° et de 30° pour 3 raies bien déterminées ; il résulte de ces recherches qu'il ne semble pas y avoir de relation bien nette entre le coefficient de variation d'un indice avec la température et le coefficient de dilatation correspondant. — **MM. J. Elster et H. Geitel** adressent des remarques sur les phénomènes électriques de l'atmosphère ; les auteurs discutent les résultats d'observations faites pendant les années 1888 et 1889. — **C. Reichl** : Nouvelles réactions de l'albumine. — **M. C. Dolter** : communication des recherches sur la solubilité des minéraux. L'auteur a étudié un grand nombre de minéraux qui passent pour complètement insolubles ; après les avoir réduits en poussière, et les avoir nettoyés avec soin, il les a mis dans des tubes scellés où l'on pouvait les maintenir pendant plusieurs jours à une température de 80°. Il a opéré sur des sulfures tels que la pyrite, l'antimonite du Bismuth, etc., des oxydes analogues au Kutil, des silicates comme l'anorthite, la chabasite, etc. Tous ces minéraux sont plus ou moins solubles. Il montre l'influence qu'a sur leur solidité la présence des matières salines que l'eau peut contenir ; et fait remarquer l'importance que peuvent avoir ces phénomènes dans les minéralisations naturelles ; il termine en relatant quelques expériences sur la solubilité de l'or vers 200°.

3^o SCIENCES NATURELLES. — **M. G. Haberlandt** : Sur les matériaux de réserve du *Fraxinus excelsior*. De ce travail résultent trois faits principaux : 1^o Les tegments du bourgeon du frêne se composent d'un parenchyme épais qui fonctionne comme tissu de réserve. Les couches successives d'épaississement de la paroi qui sont en cellulose disparaissent dans le développement du bourgeon ; le fait est analogue à celui qu'on a décrit pour l'endosperme à parois épaisses. 2^o Un tissu de réserve ayant même constitution se place à l'insertion de chaque bourgeon sous la forme d'une petite plaque plus ou moins épaisse. 3^o Au-dessous de chaque bourgeon se trouve un réservoir local d'amidon qui se vide également au printemps. — **M. G. N. Zlatorski** étudie la région comprise entre les fleuves Topolnica et Struma ; il décrit la constitution géologique du sol, et présente des cartes détaillées de la contrée.

Emil WEYR, Membre de l'Académie.

NOUVELLES

DÉCOUVERTE DE DEUX PLANÈTES

Le 23 mars dernier M. Palisa, de l'Observatoire de Vienne en Autriche, a rencontré à côté l'une de l'autre deux petites planètes : l'une d'elles est nouvelle et portera le n^o (291) ; quant à l'autre, c'est probablement une

ancienne planète, (155) *Scylla* découverte en 1875 ;

Le lendemain 26 mars, ces deux mêmes planètes ont été trouvées, indépendamment, à Nice, par M. Charlois. Et le 29 mai ce dernier astronome a découvert en outre un autre astéroïde du même groupe.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

L'UNIFICATION DES LONGITUDES ET L'HEURE UNIVERSELLE

Une conférence internationale s'est réunie à Washington en 1884 pour discuter l'adoption d'un premier méridien commun à toutes les nations et d'une heure universelle. Elle a conclu en recommandant le méridien de Greenwich comme premier méridien commun, et l'heure moyenne de Greenwich comme heure universelle. Mais les délégués avaient déclaré à l'avance qu'ils n'avaient pas qualité pour engager leurs États respectifs : effectivement, depuis cette réunion, les vœux émis n'ont fait aucun pas vers leur réalisation. Les astronomes et les géographes ont conservé leurs anciens méridiens et l'heure universelle reste confinée dans les limites du Royaume-Uni.

Dans ces derniers temps, l'initiative de l'Académie de Bologne, proposant par l'organe de M. Tondini de Quarenghi le méridien de Jérusalem, le dépôt par notre gouvernement d'un projet d'unification de l'heure en France, ont ramené l'attention du public sur cette matière, sans toutefois le passionner beaucoup : le moment semble donc venu de se demander quelle est la véritable portée de cette innovation, et d'examiner la valeur scientifique et pratique des solutions proposées.

I

La conférence de Washington n'est pas la première qui se soit préoccupée d'établir un méridien universel. Dès 1633 une commission internationale, réunie par le cardinal de Richelieu, avait désigné le méridien de l'île de Fer comme origine commune des longitudes. Cette décision était très

judicieuse. Ce méridien, très rapproché de celui à partir duquel Ptolémée comptait déjà ses longitudes, séparait d'une façon heureuse l'ancien et le nouveau monde ; il était réellement international et suffisamment neutre, et son choix n'était dicté que par des considérations scientifiques. S'il eût été possible dès cette époque de déterminer exactement la différence de longitude entre l'île de Fer et les observatoires du continent, la question était résolue définitivement ; mais malheureusement l'état de la science d'alors ne le permit pas. L'Angleterre n'accepta jamais cette origine ; les astronomes français l'abandonnèrent bientôt ; les géographes, à l'exemple de Delisle, lui substituèrent un méridien conventionnel, placé à 20° à l'ouest de celui de Paris et que beaucoup de géographes étrangers, les Allemands compris, ont conservé jusqu'à ces dernières années, tandis que la grande majorité des astronomes adoptaient le méridien de Paris. Quant à l'heure universelle, personne n'y songeait.

Le mouvement nouveau est parti de l'Amérique du Nord. La vaste étendue en longitude des États-Unis et des possessions anglaises limitrophes occasionne de grandes différences entre les heures locales : une véritable anarchie régnait dans les horaires des nombreux chemins de fer qui sillonnent ces immenses territoires et il devenait urgent d'y remédier. En 1879 sur l'initiative de M. Sandford Fleming, l'Institut Canadien saisit les pouvoirs publics de la métropole d'un projet portant détermination d'un premier méridien (ou mieux méridien

dien zéro) commun à toutes les nations et l'emploi général d'un système unique de mesure du temps. Assez froidement accueillie par l'illustre astronome royal, Sir G. B. Airy (1), par le directeur de l'Observatoire d'Edimbourg, M. Piazzi Smith; considérée comme peu sérieuse par le premier astronome du nouveau monde, M. S. Newcomb, la motion trouva plus d'écho en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Russie. Le gouvernement des Etats-Unis s'en saisit et décida de provoquer une conférence internationale. Avant que cette conférence tint ses assises, l'association géodésique internationale, réunie à Rome en 1883, s'occupa de la question à la demande du Sénat de Hambourg. Elle se prononça pour l'adoption d'une heure universelle qui devait être l'heure astronomique de Greenwich, partant de midi. Faisant un pas de plus, elle recommandait d'une façon générale le méridien de Greenwich comme méridien universel des géographes. Les longitudes devaient être comptées de 0° à 360° en allant vers l'Est, et le jour universel de 0^h à 24^h en commençant à midi.

Cette façon sommaire de signifier congé à tous les méridiens en usage et en particulier à celui de Paris, que son passé scientifique aurait dû protéger un peu mieux, ne fut pas sans éveiller dans notre monde scientifique quelques légitimes susceptibilités. Le gouvernement français, invité à envoyer des délégués au congrès de Washington, voulut d'abord prendre l'avis des intéressés : une commission dans laquelle tous les services publics étaient représentés, et qui sur vingt-deux membres en comptait treize appartenant à l'Institut, se réunit sous la présidence de M. Faye au mois d'août 1884 pour préparer les résolutions que le délégué français aurait à soutenir devant la conférence (2). Après de longues et sérieuses discussions, cette commission acquit la conviction que la mesure proposée n'avait en réalité qu'une portée des plus restreintes, que son utilité et son opportunité étaient également contestables, et que notre pays tout particulièrement trouverait plus d'inconvénients que d'avantages à y adhérer. Néanmoins, dans un esprit de conciliation qui n'a pas été suffisamment apprécié, elle jugea que nous ne devions pas refuser de nous associer à un essai de « réforme sagement conduite », mais à la condition expresse que le méridien choisi aurait un caractère réel de neutralité. Ces résolutions, éloquentement développées à Washington par notre délégué, M. Janssen, n'y furent pas acceptées par une majorité dont

l'opinion était faite d'avance. La conférence adopta la solution préconisée à Rome, en la modifiant seulement sur deux points : numération des longitudes vers l'Est (+) et vers l'Ouest (—), de 0° à 180°, et adoption du minuit au lieu du midi de Greenwich pour l'origine du jour universel.

Les résolutions concernant l'heure universelle sont, nous l'avons dit, restées lettre morte après cette conférence. En Amérique même, au lieu d'une heure unique pour les chemins de fer, on a eu recours au système des fuseaux, c'est-à-dire de subdivisions ayant chacune environ 15° de largeur en longitude; dans chacune d'elles on compte une même heure normale, qui varie d'une unité d'un fuseau à ceux qui lui sont contigus, le chiffre des minutes restant le même.

D'autre part, à Rome même il avait été entendu que le premier méridien universel ne se substituerait pas aux méridiens des divers observatoires pour l'usage des astronomes. Les géodésiens et les topographes de leur côté avaient fait accepter les réserves les plus expresses en ce qui les concernait : la conférence géodésique n'avait donc stipulé que pour les marins, pour les services publics tels que télégraphes, chemins de fer, etc., enfin pour les météorologistes et les physiciens.

Cet historique sommaire donne lieu à d'intéressantes réflexions. On voit d'abord que l'unité que l'on poursuit aujourd'hui a déjà existé; ce sont les besoins des observatoires, les progrès de la science, qui ont conduit graduellement à la multiplication des méridiens fondamentaux : la théorie avait cherché l'unité; la pratique engendrait la diversité. L'heure universelle rêvée pour les chemins de fer a été remplacée avant tout essai par vingt-quatre heures régionales; on a compris que la vie de l'homme se règle nécessairement sur la distinction fondamentale du jour et de la nuit, et qu'il y aurait absurdité trop flagrante à vouloir faire accorder toutes les horloges du monde sur le même méridien.

La deuxième remarque, c'est que ce ne sont pas les intéressés qui réclament cette réforme. Ce sont des astronomes et des géodésiens qui décident des besoins de la marine et du commerce, et en définitive, à propos de l'heure des chemins de fer on a abordé une question dont chemins de fer et télégraphes n'ont nul souci, celle des longitudes terrestres. Ne peut-on déjà préjuger du peu d'importance et d'opportunité de ce mouvement?

II

Mais envisageons la question d'une façon plus objective au double point de vue scientifique et pratique. Ce sont, disions-nous, les exigences de l'Astronomie qui ont conduit à multiplier les méridiens. Dans un observatoire tout se règle naturel-

(1) En ce qui concerne un premier méridien commun, dit l'éminent savant, aucun homme pratique n'en a jamais senti le besoin.

(2) L'auteur de ces lignes eut l'honneur d'être secrétaire et rapporteur de la commission.

lement sur le temps local; la publication des résultats rapportés à une autre origine exigerait une correction dont la valeur dépendrait de la longitude. Or, aujourd'hui encore la précision des observations est bien supérieure à celle des longitudes. Depuis le début du siècle la différence Paris-Greenwich a oscillé entre $2^{\circ} 20' 24''$ et $2^{\circ} 20' 9''$; cette incertitude de 1^{e} de temps est encore moindre que celle qui affecte les distances de Greenwich à Washington ou à Madras.

Les voyageurs qui déterminent des longitudes par le transport du temps ne sient pas exclusivement à l'heure qu'ils emportent du premier port de départ : ils la rectifient à chaque relâche, choisissant un méridien antérieurement repéré qui fait partie du réseau des positions à fixer, et auquel ils rapportent les points voisins. Les positions relatives sont indépendantes de l'erreur dont ce méridien peut être affecté. Si l'on détermine des positions dites absolues, par l'observation de la Lune ou des satellites de Jupiter, il faut les corriger des erreurs des tables : la correction des éphémérides, résultant des observations faites dans les divers observatoires, dépend de la longitude de ceux-ci. Ainsi une longitude rectifiée par comparaison avec les observations de Poulkova est par le fait rapportée à Poulkova, et si l'on veut la rattacher à Greenwich, elle subira ultérieurement les fluctuations de la longitude de Poulkova.

Pour les géodésiens et les topographes, la question se pose à peine, puisqu'ils ne calculent que des différences. Le système même de projection de notre carte d'état major repose sur l'hypothèse que le premier méridien, le seul représenté par une droite, est central : avec une autre origine que Paris, les méridiens changeraient de forme.

On a fait valoir les intérêts de la navigation. On a parlé des périls auxquels peut donner lieu la position signalée par un navire à un autre, objection qui témoigne d'une ignorance complète des conditions de la navigation. Nos officiers ont dans leurs portefeuilles des cartes anglaises et des cartes françaises : la diversité des méridiens n'a jamais donné lieu à des méprises. Sur les cartes hydrographiques, le premier méridien est purement théorique : les vrais méridiens sont ceux des relâches où l'on règle les montres.

Restent les géographes de profession qui ne sont jamais embarrassés de compiler des documents d'origines diverses, puisque tout se réduit à l'addition ou à la soustraction d'un nombre connu. Dans les discussions de positions le premier méridien n'intervient presque jamais : on n'opère que sur des différences. Quant au public qui fait usage des cartes, il ne s'occupe que rarement de la gradu-

tion, n'ayant besoin que des positions relatives des points d'une même feuille.

III

Les promoteurs de l'heure universelle ne pouvaient avoir la prétention de supprimer l'heure locale. Avec l'heure universelle de Greenwich un Japonais bien matinal se lèverait à huit heures du soir, et un Californien dînerait à deux heures du matin : jolie matière à réflexions sur les variations des mœurs avec la longitude. La conférence de Rome a donc reconnu « pour certains besoins scientifiques et pour le service intérieur des grandes administrations des voies de communications, telles que celles des chemins de fer, des lignes de bateaux à vapeur, télégraphes et postes, l'utilité d'adopter une heure universelle à côté des heures locales nationales qui continuent d'être employées dans la vie civile ».

Nous noterons d'abord que les négociants et les voyageurs sont complètement étrangers à l'agitation qu'on a faite autour de cette question : elle leur est indifférente. Dans le service télégraphique, chaque pays adopte l'heure de la capitale, heure qui est transmise d'office : on obtiendrait peut-être difficilement, surtout des administrations de câbles sous-marins, la transmission gratuite de deux heures différentes. Les destinataires des dépêches lointaines qui sont ordinairement des dépêches d'affaires, connaissent la durée moyenne des transmissions et n'auraient aucune peine à la calculer si cela les intéressait. Les commerçants aiment mieux connaître l'heure locale, qui donne aux dépêches leur signification, qu'une heure abstraite : il faut savoir si la dépêche est partie le matin ou le soir, avant ou après la bourse, renseignements qui ressortent immédiatement des indications actuelles, tandis qu'avec l'heure universelle seule, il faudrait chaque fois faire un calcul, avec chance de se tromper.

Pour les chemins de fer, l'heure universelle ne pourrait être admise que dans les pays où elle différerait très peu de l'heure locale : autrement elle offrirait des inconvénients graves pour le public et pour les agents affectés au service des voies. L'heure universelle, ne pouvant entrer dans l'usage ordinaire, doit être exclue des chemins de fer dont les conditions d'exploitation doivent surtout répondre aux exigences de la vie courante. Les graphiques de marche se font évidemment avec une heure unique, mais en France cette heure est celle dont on se sert dans la pratique : avec l'heure universelle, il faudrait la traduire pour l'usage du public, transformation plus fréquente et plus onéreuse que celle qu'exige actuellement

le calcul de la concordance des trains aux frontières, et qui n'a jamais donné lieu à aucune difficulté.

Enfin, pour la navigation transatlantique, on calcule d'avance la durée des traversées sur une échelle horaire arbitraire, mais il faut immédiatement transformer les résultats en heures locales. La longueur d'une escale dépend de l'heure locale d'arrivée : un navire entrant au port à neuf heures du soir n'a aucun avantage sur celui qui arriverait le lendemain au jour. Les rapports de traversée n'ont de sens qu'à la condition de citer l'heure du bord : dans une question d'abordage, par exemple, il s'agit de savoir si les feux de position étaient allumés à l'heure réglementaire qui dépend du coucher et du lever du soleil.

L'heure universelle peut trouver son emploi dans les recherches de physique du Globe. On a réglé sur le méridien de Göttingue les observations magnétiques organisées par Gauss et Weber, sur celui de Greenwich certaines observations météorologiques simultanées. Les météorologistes français n'ont pas hésité à adopter ce dernier pour les cartes de vents, les premières cartes publiées comprenant une division en rectangles qui en dépend. L'étude des séismes exige aussi qu'on rapporte toutes les observations à un méridien unique, mais ce méridien est parfaitement arbitraire. Comme d'ailleurs la plupart des faits de météorologie et de physique terrestre sont en relation intime avec l'heure locale, celle-ci doit toujours être considérée en premier lieu : les savants qui établissent ces sortes de comparaisons ne sauraient s'effrayer du petit calcul nécessaire pour passer d'une heure à une autre.

IV

C'est pour ces besoins très limités que la France avait consenti à discuter la question d'un premier méridien neutre qui devait être choisi d'après des considérations purement scientifiques. Ce méridien ne doit couper aucun continent important, pour ne pas introduire de discontinuité dans les longitudes d'un même pays, et afin de reporter en mer le *saut de date*, c'est-à-dire le point où les bâtiments faisant le tour du globe changent leur date. On avait proposé de repérer ce méridien une fois pour toutes par ses distances aux observatoires existants, suffisamment connues aujourd'hui pour l'objet qu'on se propose, puisqu'il est entendu que les astronomes, qui seuls ont besoin d'une précision supérieure, seraient hors de cause.

On a objecté qu'on n'aurait ainsi « qu'un zéro de » longitude défini par une fiction légale, ce qui « ne constituerait pas le moins du monde un zéro

« réel. » Nous convenons que ce zéro ne serait pas matériel : nous serions même heureux de trouver un méridien qui ne coupât aucune terre, ne fût-ce que pour éviter la tentation d'y construire un observatoire. L'éminent astronome qui a fait cette objection, oubliait-il que l'origine des longitudes célestes n'est pas plus matérielle, qu'elle est même mobile dans le ciel, et que l'astronome ne la retrouve qu'au moyen des étoiles fondamentales ? On n'a pourtant jamais proposé de prendre Sirius comme origine des ascensions droites, sous prétexte que c'est l'étoile la plus brillante du ciel. De même le niveau moyen de la mer auquel on rapporte tous les nivellements n'est qu'une surface idéale, dépendant de l'observation d'un grand nombre de hautes et basses mers : on ne peut le retrouver à chaque instant qu'en le cotant par rapport à une échelle solide et stable. Mais pour se mettre à l'abri des variations que peut subir le niveau de ce repère, soit par accident, soit par l'effet des mouvements du terrain, la prudence commande de déterminer, non pas un seul, mais plusieurs repères reliés entre eux et qui se contrôleront. La forme de la terre se modifie graduellement : la constance absolue des longitudes et des latitudes n'est pas démontrée, elle n'est même pas présumable ; le cercle méridien de Greenwich peut périr dans un cataclysme, aussi bien qu'une île peut disparaître sous les flots : ici encore la multiplication des repères est une mesure de prudence. Dans l'état présent de la science un pareil méridien pourrait être défini à 1" de temps près ; c'est plus qu'il n'en faut pour tracer la graduation d'une mappemonde et calculer l'heure d'un tremblement de terre ou la durée de transmission d'un télégramme.

Quoi qu'il en soit, cette idée, que nous persistons à croire la seule vraiment scientifique, a été repoussée à Washington par une grande majorité, et nous nous en consolons d'autant plus facilement, que nous croyons avoir montré combien la portée de cette unification est restreinte. Il est bien vrai que le développement des moyens de communication a provoqué une tendance générale vers l'abaissement des barrières et vers l'unification de toutes choses ; jamais pourtant les individualités nationales ne se sont affirmées d'une façon aussi nette et aussi tranchée. Plus on parle de fraternité universelle, plus on augmente le nombre des régiments et la portée des canons ; plus on voyage, plus il faut connaître de langues ; le volapük n'a pas plus fait fortune que la langue universelle de Leibnitz. Et cela est très légitime ; toute nouveauté n'est pas nécessairement un progrès, loin de là, et il serait souverainement injuste de qualifier de rétrogrades les tendances nettement

nationales. La diversité est dans la nature, dans les races, dans les climats, dans l'histoire : le sort du méridien de Richelieu est celui qui attend les unifications factices, inutiles ou prématurées. On a comparé l'unification des longitudes et des heures à celle des poids et mesures : c'est comparer une fourmi à un éléphant. Les mesures de longueur, de surface, de volume, les poids et les monnaies sont des quantités d'un usage universel et constant : le calcul nécessaire pour passer d'un système à un autre se compose de multiplications et de divisions longues et fastidieuses ; pour un négociant en relations avec l'Étranger, il se répète à tout instant, et les erreurs se paient cher. La complication croît dans une bien plus large proportion quand le système de numération n'est plus décimal. Des unités de longueur et de poids dépendent enfin toutes les autres unités, celles de la mécanique et de la physique : quoi d'étonnant alors si le système décimal s'est imposé au monde ? Les peuples qui le repoussent s'astreignent à un surcroît de travail sans utilité, et comme l'a fait remarquer un savant illustre, Sir W. Thomson : « L'Angleterre fait un sacrifice en n'adoptant pas le système métrique. »

En faisons-nous un en refusant d'adopter le méridien de Greenwich ? La longitude n'est pas une monnaie courante. Les astronomes, navigateurs, géographes qui en font usage sont gens spéciaux, travaillant d'ordinaire sur un méridien arbitraire pris pour origine générale ; pour les travaux de coordination, plus rares, tout se réduit à une addition ou à une soustraction si rapides qu'on n'y fait pas attention. C'est sur l'heure locale que se règlent les occupations de chacun ; l'homme du peuple n'a besoin de connaître que celle-là, et celui dont l'horizon est plus étendu n'éprouve aucun embarras à y associer la notion d'une autre heure.

V

L'étude que nous venons de présenter est forcément incomplète : le sujet est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit généralement. Nous n'avons même pas effleuré la question connexe du calendrier et de la chronologie.

Avant de discuter le point de départ des temps et des longitudes, il conviendrait de s'entendre sur les unités de mesure. La science gagnerait beaucoup plus à l'emploi généralisé de la division décimale du cercle (et du jour), qu'à l'adoption d'un méridien commun. Essayons aussi d'établir d'abord l'accord entre les savants et le public. Ce dernier ne comprend pas qu'on mette l'origine du jour à son milieu : il lui semble que c'est comme si l'on

mesurait la taille d'un homme à partir de la ceinture : que pourraient perdre les astronomes à suivre le conseil de M. Janssen en faisant commencer le jour à minuit ? Ils seraient alors d'autant mieux fondés à demander au public de compter comme eux de 0^h à 24^h pour rétablir la continuité et faire disparaître la désignation de matin et soir. On pourrait ensuite s'entendre définitivement pour savoir s'il ne serait pas préférable de compter les longitudes de 0° à 360° en allant de l'Est à l'Ouest.

Ces questions une fois résolues avec maturité, il faut discuter le méridien zéro lui-même au point de vue scientifique, voir s'il est nécessaire qu'il passe par un observatoire, comparer le méridien du détroit de Behring et celui de Ptolémée : on arriverait peut-être à reprendre le méridien de Delisle qui a l'avantage d'avoir servi longtemps. Les seuls arguments mis en avant en faveur de celui de Greenwich sont d'ordre économique : c'est, dit-on, le méridien qui a la plus nombreuse clientèle, laquelle n'aura rien à changer à ses habitudes et ne sera pas exposée à voir déprécier sa littérature géographique et son stock de cartes. Cet argument nous fait penser à certain renard qui avait perdu sa queue. Quand il s'agit pour une nation de bouleverser chez elle des habitudes vieilles de deux siècles, de modifier à grands frais ses méthodes de calcul et son matériel scientifique, elle a bien le droit de ne pas se payer de mots, de faire entrer en ligne de compte son intérêt personnel, de chercher quelle nécessité la pousse à une réforme aussi radicale et quels avantages elle pourra en retirer. Selon nous, l'unification de l'heure nationale dont on s'occupe en ce moment donnera satisfaction à tous les besoins légitimes : l'innovation plus étendue que nous venons de discuter n'a que peu d'utilité et beaucoup d'inconvénients : telle qu'elle est présentée, elle aurait plutôt pour effet de retarder un progrès réel. Comme l'a fort bien dit M. de Lesseps : « Je serais bien surpris qu'il sortit de cette réunion une solution définitive : le système décimal réclamera quelque jour ses droits et il faudra tout reprendre. » Nous ne saurions donc mieux conclure qu'en nous appropriant les paroles d'un brillant écrivain et d'un original penseur (1) : « Sachons être à notre jour « des arriérés ; les rôles changent si vite en ce « monde ! Ce sont presque toujours les prétendus « arriérés qui fondent ce que les empressés compro- « mettent. »

E. Caspari,

Ingénieur hydrographe de la Marine.

(1) M. Ernest Renan.

LES MYCORHIZES

Chez un grand nombre d'arbres forestiers, on trouve des racines associées à des filaments délicats, qui sont un appareil végétatif ou *mycelium* de Champignon (fig. 1). L'union est si intime et si ré-




Fig. 1. — Mycorhize de Hêtre, d'où se détachent des filaments de Champignon, qui vont ramper sur une écaille de bourgeon à demi macérée (d'après P. E. Müller.)

gulière, que la racine constitue avec le mycélium *un tout morphologique*, défini avec la netteté d'un organe normal. Comme le montrera la suite de cet article, une telle promiscuité entraîne une solidarité profonde dans les fonctions de cette sorte d'organisme composé. Cette formation, *qui n'est ni racine, ni Champignon, mais qui tient à la fois de la racine et du Champignon*, a reçu de Frank (1) le nom de *mycorhize*.

1

La question des mycorhizes se rattache à la doctrine si controversée de la *symbiose*, suivant laquelle deux êtres vivants, spécifiquement distincts, confondent leurs corps en un organisme mixte et

harmonisent leurs fonctions pour le plus grand profit de la communauté. C'est dire que l'accord est loin d'être unanime entre les auteurs sur la nature des mycorhizes. Bien plus, chacun des botanistes qui a fondé sa conviction sur l'étude approfondie d'un cas particulier, conteste les exemples tenus par ses émules comme les plus probants. Pour Kamienski (1), la nutrition du *Monotropa Hypopitys* serait favorisée par le Champignon qui vit sur les racines, tandis que les arbres cités par Frank seraient victimes d'un vulgaire parasitisme. Frank lui-même exclut du nombre des mycorhizes les tubercules des Légumineuses. Et pourtant la nature symbiotique de ces excroissances repose sur des arguments qui satisfont beaucoup de morphologistes et de physiologistes. Naguère encore Frank niait jusqu'à l'existence d'un organisme inférieur dans ces formations. Brunchorst avait précédé Frank dans cette voie ; mais, contrairement au professeur de Berlin, il croit à une relation causale entre les renflements radicaux des Aunes et un petit Champignon, qu'il nomme *Frankia*, sans d'ailleurs se prononcer sur la nature parasitaire ou symbiotique de l'hôte.

Laissons de côté les cas difficiles ou contestables. Aucun botaniste n'élèvera de doutes sérieux sur l'attribution des filaments des mycorhizes des Cupulifères à un Champignon. Je ne croirais même pas que l'on pût pousser l'amour du paradoxe au point de soutenir une pareille thèse, si je n'avais eu connaissance d'un travail de P. Kummer (2) « sur le problème du mycorhiza ». Entre autres arguments, l'auteur avance qu'il n'est pas prouvé que les Truffes et leur mycélium ne sont pas une excroissance des racines de Cupulifères... Passons outre.

Les relations de la racine et du Champignon oscillent entre deux cas extrêmes. Dans l'un : la Cryptogame forme un simple revêtement superficiel, une gaine mycélienne à la racine (fig. 2) ; dans l'autre : la masse principale du




Fig. 2. — Mycorhize extrophique de Charme, en coupe transversale.

(1) Kamienski, *Mémoires de la Société des Sc. nat. de Cherbourg*. 1882 et *Arbeiten der Saint-Petersb. Naturforscher-Gesellschaft*. 1886.

(2) P. Kummer, *Das Räthsel der Mycorhiza* (Förstl. Blätter 1885.)

(1) B. Frank, Ueber die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung gewisser Bäume durch unterirdischer Pilze (*Berichte der deutschen botan. Gesellschaft*. 1885).

Champignon est représentée par des pelotons filamenteux enfermés dans les cellules. Le premier type constitue les mycorrhizes *exotrophiques*; le deuxième forme les mycorrhizes *endotrophiques*.

II

Chacun de ces types ou quelque forme intermédiaire se reproduit avec une grande uniformité chez tous les représentants d'une même famille. Ainsi, d'après Frank, la constance des mycorrhizes exotrophiques, chez tous les représentants de la famille des Cupulifères, en fait un caractère susceptible d'être utilisé en taxonomie, car elle distinguerait les espèces de ce groupe d'un grand nombre d'arbres, notamment des Bétulacées, du Platane, du Noyer, du Robinier, du Tilleul, des Erables, du Frêne, etc. Toutefois on évitera de conclure prématurément d'après des résultats négatifs. Ainsi Woronin (1) a trouvé des mycorrhizes sur le Bouleau. La plupart des Orchidées ont des mycorrhizes endotrophiques. Chez les Ericacées, famille à laquelle appartiennent quantité de plantes vulgaires comme les Bruyères, les mycorrhizes sont d'une grande finesse, et tout l'appareil tégumentaire se réduit d'ordinaire à une seule



Fig. 3. — Coupe longitudinale de la pointe d'un mycorrhize endotrophique d'Andromède. Le contenu ombré des grandes cellules superficielles représente les filaments pelotonnés du Champignon, qui s'échappent au dehors, à gauche de la figure (d'après Frank.)

assise, occupée par le Champignon (fig. 3). Un grand nombre de végétaux herbacés sont indiqués par Schlicht (2) comme se rattachant à ce dernier type. Leurs mycorrhizes ont souvent un diamètre inférieur à $0^{\text{mm}},04$. Les racines des Juncus et des Souchets sont sujettes aux invasions des *Entorrhiza*, Cryptogames voisines des Ustilaginées; de cette association résultent toujours des galles renflées et

rameuses, qui, morphologiquement, se rattachent à la série des mycorrhizes, et, physiologiquement, selon Lagerheim (3), sont inoffensives.

Outre les différences spécifiques entre les Phanérogames au point de vue de la présence des mycorrhizes, il y a des différences individuelles, liées à l'habitat de la plante. Tout d'abord, la pénétration des Champignons est assez tardive et l'on

en chercherait vainement la trace sur les plantules de germination des Hêtres ou sur bien des Chênes de deux ou trois ans. Frank a pu pousser assez loin la culture de plusieurs Cupulifères dans l'eau sans y voir apparaître des mycorrhizes. Cette suppression du Champignon dans un milieu liquide n'est pas sans analogie avec l'affranchissement de l'Algue d'un *Collema* (Lichen) sur un substratum trop humide. Les mêmes plantes paraissent être plus sujettes à former des mycorrhizes dans un terrain sablonneux que dans un sol bien fumé. Schlicht a donné des indications qui parlent dans ce sens. Hartig (1) a cherché vainement des mycorrhizes sur de nombreux exemplaires de Chênes, de Hêtres, de Charmes, de Noisetiers d'une dizaine d'années, cultivés dans une station de recherches. La terre de Bruyères est favorable aux mycorrhizes. Magnus (2) a signalé ces organes mixtes chez la Myrtille, et Frank (3) en a constaté la généralité chez les Ericacées les plus diverses. Dans certains bois de Pins du grès vosgien, dont le sol maigre portait surtout des Bruyères et des débris accumulés de Mousses, ces mycorrhizes m'ont paru aussi habituels, qu'ils sont inconstants sur les Conifères dans d'autres stations.

Chez les plantes saprophytes, c'est-à-dire puisant leurs aliments dans les débris morts des corps organisés, l'existence des mycorrhizes est un phénomène général et indépendant des affinités des plantes. Johow (4) a fait récemment une révision générale des Phanérogames décrites jusqu'à ce jour comme dépourvues de chlorophylle, et néanmoins exemples de parasitisme. Incapables d'emprunter leur nourriture au milieu inorganique, ces espèces sont vouées à une nutrition exclusivement saprophytique. C'est pourquoi Johow les nomme *holosaprophytes*, pour les distinguer des hémisaprophytes, plantes vertes qui tirent de l'humus une partie seulement de leur aliment. Sur les nombreuses holosaprophytes examinées par Johow et appartenant à cinq familles (Orchidées, Burmaniacées, Triuracées parmi les Monocotylédones, Ericacées et Gentianées parmi les Dicotylédones), une seule Orchidée, le *Wulfschlegelia*, était exempte, de Champignon. Toutes les autres avaient des mycorrhizes endotrophiques, à l'exception du *Monotropa*, où le mycélium extérieur, indiqué déjà par Graves il y a plus de quarante ans, a fait l'objet de travaux minutieux de Drude et de Kamienski.

Voilà pour la systématique des mycorrhizes en ce qui concerne la plante supérieure. Nos connais-

(1) Hartig. *Botanisches Centralblatt*, 1886; et : *Centralblatt für Bakteriologie*. 1888.

(2) Magnus. *Botan. Ver. Brandenburg*. 1885.

(3) Frank. *Tageblatt der 60^e Naturf.-Vers. Wiesbaden* 1887.

(4) Johow. *Pringsheim's Jahrbücher*, 1886 et 1889.

(1) Woronin. *Berichte der deutsch. bot. Ges.* 1885.

(2) Schlicht. *Berichte der deutsch. bot. Ges.* 1838 et Thèse d'Erlangen. 1889.

(3) Lagerheim. *Hedwigia*. 1888.

sances sont moins complètes au sujet du facteur cryptogamique de l'association. En première ligne viennent les Tubéracées. Les relations des Truffes de Cerf (*Elaphomyces*) avec les Conifères ont été les premières élucidées, grâce aux travaux de Boudier (1), de Reess et de Fisch (2). Non seulement les fruits d'*Elaphomyces* (fig. 4) se forment aux dépens




Fig. 4. — Fructification (périthèce) d'un *Elaphomyces granulatus* vivant en mycorrhize avec les racines d'un Pin. Le sac constitué par des mycorrhizes enchevêtrées a été partiellement écarté pour laisser voir le périthèce.

des filaments échappés des mycorrhizes de Pins, d'Épicéas, etc.; mais ces mycorrhizes, abondamment



Fig. 5. — Coupe pratiquée dans une Truffe. Ecorce en haut; tissu renfermant les thèques en bas (d'après Tulasne).

ramifiés en fausses dichotomies, se multiplient et s'enchevêtrent, au point de constituer au tubercule un revêtement auquel prennent part à la fois l'arbre et son associé.

Cette découverte ne pouvait manquer de provoquer des recherches sur une question éminemment pratique : je veux parler du mode de végétation des vraies Truffes et de leurs rapports avec les arbres (Châtaigniers, Chênes) dont elles recherchent le voisinage. En Prusse, Frank (3) fut même chargé officiellement de poursuivre la solution de ce problème Gibelli (4) en Italie, Ferry de la Bel-

lone (5) en France, P. E. Müller (6) en Allemagne apportèrent leur contingent d'observations. Enfin

Mattiolo (1) constata plus directement la continuité entre les mycorrhizes des Cupulifères et les jeunes fruits de plusieurs truffes : *Tuber excavatum* Vitt., *lapideum* Matt. et *Borchii* Vitt.

La Truffe du commerce est, comme on sait, le fruit (*périthèce*) relativement énorme d'un champignon filamenteux, si délicat que son appareil végétatif passe aisément inaperçu. Si l'on vient à faire une coupe dans le périthèce (fig. 5), on y distingue un tissu interne, marbré, dont les filaments sont entremêlés de nombreux sacs (*thèques* ou *asques*) (fig. 6), renfermant les corps reproducteurs (*spores*), et une couche interne, protectrice, qui est l'écorce de la Truffe. Mattiolo vit l'écorce des espèces précitées se prolonger (fig. 7) en cordons



Fig. 6. — Une thèque isolée renfermant les spores (Tulasne).



Fig. 7. — Rhizomorphes se détachant de l'écorce d'une Truffe (d'après Mattiolo).

radiciformes, appelés rhizomorphes, d'une forme très spéciale, qui se mélangeaient à d'autres rhizomorphes identiques aux premiers et dont le point de départ était dans le revêtement mycélien de radicelles. L'association des Truffes comestibles avec les arbres est d'une observation bien plus délicate que celle des *Elaphomyces* avec les Conifères : voilà pourquoi la question du parasitisme des Truffes a suscité tant de théories et d'assertions contradictoires.

Sur les mycorrhizes du Coudrier, Lecomte (2) a rencontré des fruits (*périthèces*) de Champignons Pyrénomycètes à spores partagées en quatre cellules. A la même famille d'Ascomycètes se rattachent les hôtes des racines de plusieurs Orchidées. Wahrlich (3) a trouvé en effet deux *Nectria* dans la couche externe mortifiée des racines de *Vanda suavis* et *tricolor*. Les spores de ces Champignons donnèrent en germant un mycélium qui se chargea ensuite de filaments extraits des mycorrhizes de diverses Orchidées indigènes, Reissek avait déjà obtenu les

(1) Mattiolo. *Archives italiennes de Biologie*. 1888.

(2) Lecomte. *Bulletin de la Soc. botan. de France*. 1887.

(3) Wahrlich. *Beitrag zur Kenntniss der Orchideenwurzelpilze* (*Botanische Zeitung* 1886). On trouve dans ce Mémoire la bibliographie des mycorrhizes d'Orchidées.

(1) Boudier. Du parasitisme probable de quelques espèces du genre *Elaphomyces* (*Bulletin de la Soc. botan. de France*. 1876).

(2) Reess. *Sitzungsber. der physik.-med. Gesellsch. zu Erlangen*. 1880. — *Berichte der deutsch. botan. Gesellsch.* 1885. — Reess et Fisch. *Biblioth. botan.* Cassel. 1887.

(3) Frank. *Levnis Synopsis der Pflanzenkunde*.

(4) Gibelli. La malattia del Castagno (*Boll. Comizio agrario di Modena*. 1879). *Memorie dell' Accad. di Bologna* 1883.

(5) De Ferry de la Bellone. *La Truffe*. 1888.

(6) P. E. Müller. *Botan. Centralblatt*. 1886.

mêmes spores fusiformes, et Wahrlich les a retrouvées, ainsi que des mégaspoires bicellulaires, sur des filaments de *Platanthera bifolia* et de plusieurs *Vanda* (Orchidées) cultivées isolément dans un liquide nutritif (fig. 8). Toutefois jusqu'ici aucun de ces



Fig. 8. — Mégaspore (a) d'un Champignon d'Orchidée, ayant donné, en germant, un mycélium (m) chargé de fusispores (f) (d'après Wahrlich.)

organes de multiplication n'avait été observé dans les parties vivantes des mycorhizes d'Orchidées. Mollberg avait seulement indiqué des renflements terminaux ou intercalaires des filaments, qui pouvaient être attribués à des rudiments de spores. J'ai obtenu en grand nombre les mégaspoires du type décrit par Wahrlich, au sein de cellules en pleine végétation chez l'*Orchis mascula* (fig. 12 et 13 page 331), ce qui confirme d'une façon décisive la dépendance de ces spores à l'égard du Champignon du mycorhize; ce qui montre aussi que Wahrlich avait raison de rapporter les périthèces (fruits) de *Nectria* à ce même Champignon, puisqu'ascospores et mégaspoires ont reproduit dans les cultures la même forme spéciale de spores fusiformes. Il est donc probable que diverses Orchidées sont associées à un certain nombre de *Nectria* ou d'espèces affines.

Les Champignons que nous avons énumérés jusqu'ici appartiennent à l'ordre des *Ascomycètes* et nous pouvons appeler *Ascorhizes* les mycorhizes qu'ils forment, de même qu'on nomme *Ascolichens* les lichens formés d'un *Ascomycète* (Champignon) uni à une Algue. Il existe en outre des *Basidiomycètes*, c'est-à-dire des mycorhizes dont le Champignon appartient à l'ordre des *Basidiomycètes*. Les *Basidiomycètes* se diviseraient de même, d'une façon analogue aux *Basidiolichens*, en *Gastérorhizes* et *Hyménorhizes*. C'est du moins ce qui semble résulter d'une communication préliminaire, présentée par Noack (1), le 14 juin dernier, à la Société botanique d'Allemagne. Les *Basidiomycètes* des mycorhizes sont, d'après Noack : pour les *Gastéromycètes*, les *Geaster fimbriatus* et *foenicatus* sur les Conifères, pour les *Hyménomycètes*, diverses *Agaricinées* sur le

Chêne, le Hêtre, le Sapin. Ajoutons, pour terminer la liste des Champignons de mycorhizes dont la détermination offre le plus de probabilité, que Woronin crut voir une relation entre des mycorhizes de Conifères et de plusieurs *Amentacées* et des fruits de *Boletus edulis* et *scaber* (type et variété *aurantiacus*), mais sans pousser plus loin ses investigations.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il paraît établi que les Champignons des mycorhizes appartiennent à des espèces variées. Il n'y a donc pas lieu d'objecter à la théorie des mycorhizes la nécessité d'admettre l'existence de Champignons d'une ubiquité invraisemblable. Bien que certaines espèces de Champignons soient plus spécialement adaptées à certaines espèces de Phanérogames, un même Champignon peut aussi, dans certains cas, s'associer à diverses plantes supérieures, et réciproquement.

III

La racine associée au Champignon prend son origine dans la profondeur des tissus et, dans les traits essentiels, offre la structure et le développement des racines indépendantes. Chez plusieurs Orchidées, rien, dans l'aspect extérieur de l'organe hétérogène, ne fait soupçonner la présence de l'élément fongique. Les mycorhizes exotrophiques (fig. 9), par leurs ramifications courtes et abondantes simulant une dichotomie répétée, forment des masses coralloïdes, surtout dans les points où les mycorhizes arrivent au contact d'un noyau circonscrit d'humus, correspondant aux débris d'une feuille, d'un fragment de branche, d'un fruit en décomposition. Frank (1) a aussi observé chez le Hêtre une augmentation de surface due à un autre procédé et réalisée par le Champignon seul. Les mycorhizes très allongés émettaient, perpendiculairement à leur direction, des faisceaux de filaments (fig. 10) détachés du revêtement mycélien, et qui allaient se fixer aux particules de terre. D'après des exemplaires de *Pinus Pinaster* envoyés du Cap par Marloth, le même auteur a décrit des mycorhizes de diamètre ordinaire, mais de longueur notable, servant de support à d'autres mycorhizes filiformes, épais d'un dixième de millimètre, malgré la présence de la racine et de la gaine fongique. Ces appendices,




Fig. 9. — Aspect général des mycorhizes exotrophiques, (d'après Frank.)

(1) Frank. Ueber neue Mycorhizen-Formen (*Berichte der deutsch. bot. Gesellsch.* 1887.

(1) Noack. *Bot. Zeitung*. 1889.

décroissant régulièrement de taille vers le sommet, étaient serrés au point de donner à l'ensemble l'aspect d'une queue de renard (fig. 11).

Les poils radicaux manquent aux racines formant avec



Fig. 10. — Rhizomorphes de Hêtre (d'après Frank).

la *Champignon* des mycorhizes exotrophiques ; il est donc bien remarquable de voir les cordons mycéliens des Hêtres, les mycorhizes latéraux du Pin en prendre la place et les caractères morphologiques. Dans le type coralliforme, la gaine continue se substitue de même à l'assise pilifère. Recouvrant les radicelles dès leur naissance, et croissant avec elles, le manteau mycélien est rudimentaire autour de la coiffe, atteint son plein développement au niveau où les racines normales sont absorbantes. Là, des branches mycéliennes isolées se détachent du revêtement fongique comme les soies d'une brosse à bouteille. Dans les parties anciennes, la gaine est exfoliée par la marche naturelle de la dénudation des racines (fig. 14, page 332).



Fig. 11. — Mycorhizes de Pin, disposés comme des poils radicaux (d'après Frank).

La morphologie des mycorhizes endotrophiques n'indique pas moins clairement le parallélisme entre leur développement, leur localisation et les conditions de l'absorption. L'extension de leur surface est réalisée, soit par l'émission d'innombrables mycorhizes filiformes (*Ericacées*), soit par une copieuse ramification qui donne au système l'aspect d'un nid d'oiseau (plusieurs *Orchidées*, *Triuracées*, *Burmanniacées*).

Chez les *Orchidées* où certaines racines sont essentiellement adaptées au rôle de réservoir, les mycorhizes sont localisés sur d'autres racines. Frank n'a jamais observé le *Champignon* dans les tubercules de ces plantes. Les conditions dans lesquelles j'en ai décelé la présence sont plutôt de nature à confirmer la règle qu'à l'ébranler. J'ai vu quelques filaments pelotonnés dans les cellules superficielles des tubercules d'*Orchis mascula* examinés au moment de la récolte ; mais ce mycélium végétait peu et formait sur place les mégasporées connues. D'autres tubercules, nés en chambre humide,

s'étaient couverts de poils radicaux, dont un petit nombre contenait des filaments et des mégasporées ; tandis que, sur les racines absorbantes des mêmes pieds, beaucoup de poils étaient bourrés de *Champignons* (fig. 12). Une observation inédite de Schimper, mentionnée par Johow, indique non moins clairement le lien entre la formation du mycorhize et le pouvoir absorbant : Dans des racines rampantes d'*Orchidées*, le *Champignon* s'observait seulement du côté des racines adhérent au support.

L'absence de poils radicaux se retrouve chez un grand nombre de racines constituant des mycorhizes endotrophiques. Tel est le cas des *Ericacées* et des nombreuses herbes qui leur ressemblent. Le *Champignon* y est bien situé pour jouer un rôle absorbant : il remplit de son mycélium les cellules superficielles ; de plus, vers la pointe, les filaments se répandent dans le sol et s'accumulent parfois en un tissu lâche, revêtant extérieurement l'extrémité de la racine (fig. 3).

Quand les poils radicaux sont développés, par exemple sur les mycorhizes endotrophiques de l'*Orchis mascula*, le *Champignon* contracte des relations particulièrement intimes avec ces éléments absorbants. Vers la pointe du mycorhize, les filaments sont lâchement disséminés dans les couches superficielles et remplissent un grand nombre de poils. De là ils s'échappent et envoient des ramifications dans le sol. Cette dispersion a d'abord été signalée par Pfeffer. Dans les cultures où les mycorhizes sont maintenues à l'air humide, l'issue des filaments est plus rare, et le *Champignon*, se repliant et se ramifiant à l'intérieur du poil, termine ses branches par des mégasporées à deux cellules (fig. 12, page 331). Dans un semblable milieu la coiffe peut persister longtemps et s'opposer à l'éruption des poils radicaux. Alors c'est dans des cellules renflées de l'assise pilifère ou même dans la coiffe que la formation des spores s'opère en abondance (fig. 13, page 331). Ainsi, la région de la racine qui, par sa structure, est adaptée aux relations trophiques de l'*Orchis* avec le milieu extérieur est également celle où le *Champignon* plonge dans le sol ses organes absorbants. Si les conditions ne sont pas favorables à la nutrition aux dépens du milieu, le *Champignon*, au lieu d'envoyer des filaments dans l'espace qui l'entoure, se met en mesure d'émigrer en formant des spores dans les cellules destinées à être exfoliées au cours de l'évolution normale de son hôte. Dans les portions plus âgées du mycorhize, le *Champignon*, comme la racine, perd les caractères morphologiques liés à l'absorption. Il s'accumule dans les assises moyennes de l'écorce, vers le niveau où les cellules atteignent le plus grand diamètre ; il y forme des pelotons denses de tubes

rigides remplissant chaque cellule et passant d'une cellule à l'autre au travers des cloisons. Chez d'autres plantes (*Voyria*, *Pogoniopsis*), toutes les assises de l'écorce sont également occupées par les



Fig. 12. — Poil radical d'*Orchis mascula* avec mycélium et mégasporos (*s*) à l'intérieur de la cellule qui constitue le poil.




Fig. 13. — Mycorhize endotrophique d'*Orchis mascula*. — Mégasporos (*s*) dans une cellule renflée (*a*) de l'assise pilifère, soulevant la coiffe (*b*). — *n*, noyau cellulaire.

Champignons. Ailleurs ceux-ci n'habitent que les couches superficielles.

Beaucoup d'Orchidées sont totalement dépourvues de poils radicaux. Cette absence est aussi un caractère presque constant des holosaprophytes. De toutes les humicoles sans chlorophylle examinées par Johow, une Triuracée du genre *Sciaphila* a seule offert des poils radicaux bien développés et mélangés d'ailleurs de filaments mycéliens qui, provenant des profondeurs de l'écorce, s'échappaient entre les poils pour se répandre dans le sol. Chez les Burmanniacées, Johow a trouvé assez souvent de simples éminences papilliformes de l'épiderme. Enfin une Orchidée (*Pogoniopsis*) offrait des rudiments de poils radicaux en forme de dé à coudre, d'une grandeur uniforme et bourrés de mycélium. Cet allongement des cellules extérieures était moins propre à en faire des éléments absorbants qu'à permettre au Champignon de puiser plus facilement les aliments contenus dans le sol.

En somme, le trouble le plus considérable introduit dans la racine par suite de l'association mycorhizienne, consiste dans la réduction des caractères qui en font un organe absorbant, et dans l'attribution au Champignon des caractères appropriés à cette fonction. La racine devient un simple support et cesse d'accomplir le rôle qui explique la différenciation de la racine à l'égard des autres membres. Une tige s'acquitterait aussi bien des fonctions d'une telle racine. Aussi, par une conséquence toute naturelle, malgré

l'apparence paradoxale de son énoncé, l'association mycorhizienne a-t-elle entraîné souvent une grande réduction, parfois la suppression totale des racines chez les holosaprophytes. Dans les *Corallorhiza*, *Epipogon*, les tiges souterraines (*rhizomes*), contournées à la façon des *Neottia*, donnent l'hospitalité à des Champignons et ont reçu par extension le nom de mycorrhizes caulinaires; nous dirons plutôt *mycorrhizomes*. Ces plantes, ayant perdu la faculté de produire des membres différenciés morphologiquement comme racines, peuvent pourtant, par métamorphose régressive et par adaptation nouvelle aux conditions primitives, former des poils absorbants. Des éléments semblables aux poils radicaux se développent sur les mycorrhizomes d'*Epipogon aphyllum* et de *Corallorhiza innata*, selon Irmisch et Reinke. Des poils de même aspect, souvent fixés aux parcelles d'humus à la façon des poils radicaux, sont localisés, au dire de Johow, sur les feuilles écailleuses des rhizomes du *Dictyostegia orobanchoides*, les racines de cette Burmanniacée étant transformées en mycorrhizes glabres.

L'influence exercée par l'action directe du Champignon sur les cellules de la racine hospitalière est à peu près nulle. On a dit que, chez les Orchidées, la présence du Champignon déterminait une hypertrophie des éléments habités. Je ne crois pas cette assertion fondée, mais je m'en explique l'origine. Dans l'*Orchis mascula*, les cellules grandissent régulièrement, depuis l'assise pilifère jusqu'au delà du milieu de l'écorce, puis décroissent rapidement jusqu'à la dernière couche corticale; les noyaux suivent la même progression et leur diamètre varie de 15 à 45 μ (1). Comme le mycélium tend à se localiser dans les assises les plus élargies, on a pu croire que la taille colossale du noyau était due à sa présence; mais j'ai reconnu les mêmes particularités dans les cellules larges qui avaient échappé à l'invasion du Champignon; et, dans les régions jeunes où le Champignon est répandu irrégulièrement dans les assises superficielles, les cellules qu'il occupe ne présentent pas plus de vigueur que les cellules avoisinantes. Ce phénomène dénote une grande accoutumance dans les relations des deux conjoints; les parasites ordinaires jettent du trouble dans l'organisme occupé, soit par une action destructive, soit par une excitation intempestive qui rompt aussi sûrement l'harmonie des parties. Dans les poils radicaux bourrés de mycélium et de mégasporos, le noyau cellulaire n'a subi aucune déformation. Ces poils se fanent moins vite que les autres.

Le Champignon ne modifie pas davantage les

(1) Dans la notation, adoptée par les micrographes, le μ représente le millième de millimètre.

cellules des mycorhizes exotrophiques. La gaine mycélienne est extérieure à la racine dans les parties les plus jeunes, les plus délicates, dans les points, en un mot, où un parasite exercerait facilement et dans des proportions redoutables son action délétère. Un peu plus loin, les cellules superficielles, mortifiées, ne pouvant être éliminées suivant la règle habituelle, sont englobées par les filaments mycéliens. Ceux-ci se glissent aussi dans

les méats les plus superficiels, de manière à prendre la place des cellules arrivées au terme de leur activité (fig. 14). Chez le Charme et d'autres Cupulifères, les filaments ne pénètrent pas dans l'intérieur des cellules, tant que celles-ci ne sont pas profondément altérées et déformées. Chez les Conifères, il en est parfois autrement. L'abondant parenchyme du cylindre central supplée l'écorce dans ses fonctions, et les tissus extérieurs à la dernière couche corticale se mortifient rapi-



Fig. 14. — Mycorhize exotrophique de Pin sylvestre. La coupe, pratiquée dans un système coralloïde, a divisé trois radicelles nées l'une de l'autre. La plus âgée (I) est coupée transversalement; la gaine mycélienne est exfoliée; les cellules mortifiées (a) sont à nu; la deuxième (II) est coupée obliquement; la gaine mycélienne (m) est pleinement développée; la troisième (III) est sectionnée à peu près en long; elle est très jeune et la gaine mycélienne, bien qu'étendue jusqu'à la pointe, est encore rudimentaire.

dement. Sur les Epicéas envahis par l'*Elaphomyces*, sur les Pins, etc., toute l'écorce est bientôt parcourue par les filaments détachés de la gaine mycélienne, se faisant jour à travers les cloisons desséchées pour dévorer les restes des cellules mortes. Quelques filaments persistent dans les portions d'où l'exfoliation normale a rejeté les cellules superficielles avec la gaine mycélienne. Le Champignon n'est pas l'auteur de cette destruction de l'écorce qu'il met à profit; car, s'il était vraiment parasite, rien ne l'empêcherait de pénétrer au-dessous de l'écorce dans le cylindre central; car l'assise interne de l'écorce et l'assise externe du cylindre central qu'il respecte n'offrent aucun obstacle mécanique à la pénétration de filaments qui, pour arriver dans leur voisinage, ont traversé les parois épaisses et subérisées de l'écorce. Leur pro-

gression n'est donc arrêtée que par des influences biologiques: en un mot, ce Champignon est ici saprophyte et non parasite.

IV

La première idée qui devait venir à l'esprit des botanistes sur la signification biologique des mycorhizes, c'est que le Champignon était un parasite vivant aux dépens de la plante supérieure. Les conditions dans lesquelles Gibelli découvrit les gaines mycéliennes des racines de Cupulifères étaient bien propres à appuyer une hypothèse si naturelle. En 1883, le savant italien recherchait la cause d'une maladie du Châtaignier. Les racines pourries présentant un Champignon inconnu jusqu'alors, Gibelli n'hésita pas à accuser ce Champignon de la pourriture des racines et du dépérissement des arbres. La description de Gibelli ne laisse aucun doute sur l'identité du Champignon du Châtaignier avec celui des mycorhizes de Frank. Gibelli eut quelque surprise en retrouvant le même Champignon sur les racines d'autres Cupulifères, dans les localités les plus diverses de la péninsule. Il lui parut naturel d'admettre que la maladie si préjudiciable au Châtaignier gagnait du terrain et menaçait de ses ravages plusieurs essences forestières. Ses prévisions ne furent pas réalisées. Les caractères morphologiques des mycorhizes nous ont montré que la pourriture des racines ne peut guère être le fait des gaines mycéliennes.

La théorie du parasitisme est reproduite par Hartig sous une forme fort atténuée. Pour Hartig, ces parasites ne causent pas à l'arbre un dommage bien appréciable; la racine ne leur permet pas toujours de pénétrer assez profondément pour compromettre son existence; elle les exfolie à temps avec les assises extérieures, seules envahies. Dans d'autres cas, la victoire resterait au Champignon qui, pénétrant jusqu'aux plus profondes assises de l'écorce, ferait périr la pointe de la racine. Cet énoncé comprend deux parties: 1^{re} la constatation des filaments du Champignon dans les tissus morts de la racine; 2^e la supposition que la mort des tissus est le fait des filaments. La première partie est exacte; la seconde est inconciliable avec des observations authentiques. Tant que la racine est jeune et dans sa période normale d'activité, la pointe reste vivante, lors même que le Champignon traverse de part en part l'écorce entière: nous l'avons reconnu chez les Conifères; malgré cet envahissement, elle émet d'abondantes radicelles. Mais, comme le fait remarquer Frank, les mycorhizes ne sont pas plus éternels que les radicelles indépendantes; et, quand leur évolution est accomplie, la portion provenant de l'arbre,

avant d'être tombée dans le domaine commun des Cryptogames humicoles, devient la proie des Champignons qui la serraient de près. L'observation d'Hartig montre simplement que le Champignon du mycorhize est un saprophyte privilégié. Au reste, Hartig fait une nouvelle concession, quand il compare l'innocuité du parasite des Cupulifères à celle de tant de parasites inoffensifs des feuilles. Il a évidemment en vue des parasites gallicoles. Or, il n'est pas de formations plus propres que les galles à nous montrer par quelle gradation continue le parasitisme passe à des associations bien équilibrées, dans lesquelles la vie en commun ne cause de préjudice à aucun des conjoints. On a distingué sous le nom de *domaties* une variété de galles dans lesquelles l'hospitalité fournie par la plante élevée est payée de services par l'être gallicole.

Est-ce à ce point que serait parvenue l'association des Champignons et des racines ? Les mycorhizes seraient-ils le résultat d'une symbiose ? Frank soutient l'affirmative et considère les mycorhizes comme des organes destinés à permettre aux plantes supérieures d'emprunter aux Champignons la faculté de se nourrir aux dépens de l'humus. Les mycorhizes, dans la nomenclature de Lundstroem, seraient donc des *mycodomaties*.

Cette théorie de la nutrition en commun n'a guère soulevé d'objection en ce qui concerne les mycorhizes endotrophiques ou les mycorhizes exotrophiques d'herbes comme les *Monotropes*. Curieuse particularité : Kamienski niait la symbiose chez les Cupulifères, pour mieux la faire ressortir chez la *Monotropé*. Il a cru en effet que les filaments issus de la gaine mycélienne de cette plante allaient puiser dans les racines des arbres un surcroît d'aliments pour leur associée. Établir la continuité des filaments délicats qui relient à travers le sol les racines de deux plantes différentes n'est point chose facile ; mais admettons que Kamienski ait trouvé le moyen de réaliser cette observation : les conclusions qu'il en tire ne s'appliqueront qu'à un nombre restreint de cas. La direction des filaments a pu être établie sûrement d'après la disposition des boucles mycéliennes, fréquentes chez les Basidiomycètes et les Ascomycètes. Frank et Mattiolo ont démontré (et je l'ai moi-même vérifié), que souvent des filaments rayonnent à partir des mycorhizes des arbres vers le sol, au lieu de s'acheminer vers les racines pour en sucer le contenu.

Le développement des mycorhizes que nous avons examinés est lié à la présence de l'humus. Ces formations font défaut chez les racines de Cupulifères qui ont traversé le manteau d'humus pour se répandre dans la profondeur du sol ; mais

les racines indépendantes qu'on observe en ces points émettent peu de radicelles, tandis qu'elles produisent d'exubérants systèmes de mycorhizes, dès qu'elles arrivent au contact des couches ou des nids d'humus (fig. 15). Si les racines ordinaires substituent aux mycorhizes en l'absence des aliments des saprophytes : réciproquement la présence des mycorhizes est générale chez les plantes qui n'ont pas d'autre mode de nutrition. A l'exception offerte par le *Wulfschlagelia*, il



Fig. 15. — Localisation des mycorhizes de Hêtre au contact d'un débris de feuille en décomposition (d'après P. E. Müller).

faut ajouter l'absence de mycorhizes chez le *Melampyrum pratense*, bien que cette plante, d'après les belles recherches de L. Koch (1), se nourrisse directement de débris de végétaux supérieurs. Par une concordance remarquable, l'appareil absorbant du Mélampyre rappelle à plus d'un titre la structure de la partie radicale des mycorhizes, par ses touffes de radicelles filamenteuses et par la dissémination ou l'absence totale des poils radicaux, sur les houppes absorbantes comme sur leurs supports. De plus, le substratum contenant les racines et les suçoirs du Mélampyre renfermait constamment des Champignons et des mycorhizes d'arbres. Koch ayant négligé de cultiver le *Melampyrum* dans un sol stérilisé, on peut se demander si l'action de ces Cryptogames extérieures n'est pas essentielle pour rendre l'humus capable de nourrir le Mélampyre ? Ajoutons que Koch a observé dans les renflements suceurs de cette plante des corpuscules analogues aux bactéroïdes des Légumineuses ; il les considère comme des différenciations du protoplasma. On sait que plusieurs auteurs interprètent de même les bâtonnets intracellulaires des Légumineuses, tandis que pour d'autres, ce seraient des organismes étrangers ; pour d'autres enfin, des microbes englobés dans des portions spécialisées du protoplasma.

V

La structure et la répartition des mycorhizes prouvent que le Champignon est apte à absorber les aliments du sol, et que la racine est, dans bien des cas, dépourvue par elle-même d'une faculté analogue. Les matériaux de la croissance de la

(1) L. Koch. *Berichte der deutsch. bot. Gesellsch.* 1887.

plante sont transmis, selon Frank, du milieu à la plante par l'entremise du Champignon. Dans les recherches de Frank, les nitrates faisaient totalement défaut aux mycorhizes et aux autres organes des arbres forestiers à mycorhizes et des *Monotropa*, aussi bien qu'aux cordons mycéliens détachés des mycorhizes, tandis que les arbres à racines indépendantes et les herbes croissant au milieu d'eux en renfermaient au moins dans la partie absorbante des racines. Cette dernière remarque infirme l'opinion d'Ebermayer (1), qui crut expliquer le défaut de nitrates dans les arbres à mycorhizes par l'absence de ces composés dans les sols forestiers. Une telle différence dans la nature des combinaisons azotées absorbées s'explique par la différence des êtres chargés de l'absorption dans les espèces à mycorhizes et dans les espèces à racines indépendantes. En général les Champignons trouvent un aliment convenable dans l'azote organique; et, bien que l'ammoniaque puisse être directement utilisée par les plantes vertes (les expériences de Pitsch, Lockeren, Müntz, etc. en font foi), cette capacité est plus accusée et plus constante chez les êtres inférieurs. C'est justement à ces sources plutôt qu'aux nitrates que les mycorhizes emprunteraient leur azote.

Frank (2) n'a jamais obtenu que des exemplaires chétifs de Cupulifères dans des sols stérilisés où les mycorhizes faisaient défaut. Il s'est assuré que la stérilisation n'avait pas fait perdre au support ses qualités nutritives, attendu que des plantes normalement privées de mycorhizes y prospéraient. Mais ces expériences, à supposer qu'elles soient à l'abri de toute objection et qu'aucun facteur accessoire n'ait échappé à l'auteur, ne sont pas plus démonstratives que l'examen direct des mycorhizes.

Si le Champignon se développait aux dépens de l'arbre, il ne dédaignerait pas les racines qui, développées en dehors de la couche d'humus, seraient plus propres que les autres à rassembler les aliments à son profit.

Pour les herbes franchement saprophytes, le Champignon est une partie intégrante, souvent la partie essentielle de l'appareil absorbant. La localisation du mycélium dans des cellules bien déterminées anatomiquement marque sa place dans la structure normale de ces végétaux; sa présence dans les assises qui sont naturellement le siège de l'élaboration la plus active des aliments indique la part qui lui revient dans les phénomènes intimes de la nutrition de l'organisme mixte. Il y a évidem-

ment action commune, association trophique, symbiose dans le sens le plus étroit du mot. Drude (1) a depuis longtemps constaté ces rapports; et les observations récentes n'ont fait que confirmer ses vues.

En ce qui concerne les arbres forestiers, la symbiose est peut-être moins nécessaire, ces plantes trouvant dans leurs organes propres les conditions suffisantes de leur alimentation; mais ici encore, l'association assure en outre à la plante supérieure la faculté de se nourrir en saprophyte. L'engrais naturel des forêts consiste dans les déchets périodiques du corps des arbres; ces déchets sont les racines usées et les feuilles tombées. La perte de cette masse considérable de substance n'est que momentanée. Par l'adaptation réciproque des essences forestières et des Champignons, chaque arbre réalise l'important problème de réparer ses pertes de la façon la plus prompte et la plus complète. Des Cryptogames quelconques, Bactéries ou autres, peuvent transformer les feuilles et les détritrus divers qui forment l'humus; mais, par l'association mycorhizienne, la préférence est accordée, dans les conditions normales, aux Champignons des racines. Ceux-ci paient leur place privilégiée en faisant participer l'arbre à leur nutrition. Les forestiers savent bien que les arbres souffrent autant de l'enlèvement des feuilles dont ils se sont dépouillés, que les plantes des champs profitent peu de l'apport de ces débris. Cela tient précisément à ce que cette fumure faite pour les arbres, est directement utilisée par les mycorhizes adaptés à ce milieu spécial, tandis qu'elle est moins complètement à la portée d'herbes quelconques, en dépit de l'action réelle des microorganismes extérieurs. Les mycorhizes constituent donc l'organe habituel de l'absorption de l'humus par les plantes supérieures.

D'après Frank, la nutrition normale des Cupulifères aux dépens du sol se ferait tout entière par l'intermédiaire des mycorhizes, car il a trouvé en toutes saisons des Hêtres, des Chênes d'âges divers sur lesquels il n'arrivait pas à déceler une seule racine indépendante. Ebermayer, de son côté, a vu dans certaines forêts des Alpes de Bavière, la couche d'humus atteindre jusqu'à un mètre d'épaisseur et contenir toutes les racines des arbres.

Hartig ne croit pas à une si grande fréquence des mycorhizes et, opposant statistique à statistique, il relate de nombreuses observations dans lesquelles une partie seulement des racines était munie de Champignons et d'autres où les mycorhizes faisaient entièrement défaut. Mais comme

(1) Ebermayer. *Berichte der deutsch. bot. Gesellsch.* 1888.

(2) Franc. *Tageblatt des 60ⁿ Naturf.-Vers. zu Wiesbaden.* 1887, *Berichte der deutsch. bot. Gesellsch.* 1888.

(1) Drude. *Die Biologie von Monotropa und Neottia.* Göttingen. 1873.

Hartig ne dit pas que l'humus était suffisamment copieux pour nourrir entièrement les arbres et qu'au contraire ses recherches portent en partie sur de jeunes plantations effectuées dans des champs d'expériences, ses conclusions n'infirment en rien la règle générale. Les faits cités par Groszlik (1) ne disent rien de plus. Hartig va plus loin. Les gaines mycéliennes, très abondantes de juin à septembre, disparaîtraient en automne, et les radicelles nées vers le mois de mai rempliraient leurs fonctions absorbantes pendant quelques semaines. Dans les cas les plus défavorables, l'invasion de la maladie mycorrhizienne supprimerait toutes les racines fonctionnantes jusqu'à l'année suivante. Sans contester l'exactitude des observations d'Hartig, on ne saurait les généraliser. Il est certain que des mycorrhizes s'observent en toutes saisons et que les radicelles nées des mycorrhizes sont dès leur naissance revêtues de mycélium et restent indéfiniment telles dans les sols riches en humus et pauvres en nitrates. Hartig s'est exagéré la portée des faits qui semblaient confirmer le parasitisme des Champignons des Cupulifères. Nous nous sommes suffisamment expliqué sur les relations des deux organismes, pour montrer que le Champignon n'a pas d'action destructive sur les tissus des racines. A peine pourrait-il accélérer la mort des cellules qu'il enserre, quand celles-ci sont arrivées à un degré d'inertie tel qu'elles seraient normalement exfoliées par les racines ordinaires. On verra si l'on veut, dans ce fait brut, un phénomène de parasitisme; mais si l'on apprécie l'avantage indirect qui en résulte au point de vue de la nutrition saprophytique de l'arbre, on n'y verra plus qu'une phase d'une action symbiotique. De même, en envisageant isolément la destruction du nectar et d'une partie du pollen par les insectes, on a pu dire que les insectes se comportaient en ennemis rançonnant les fleurs; mais la plus-value des grains de pollen arrivés à destination par l'entremise des insectes compense et au delà cette dépense matérielle.

Au fond, tous les cas de symbiose se laisseraient ramener à une accoutumance au parasitisme, à un nouvel équilibre résultant de l'action et de la réaction de deux êtres antagonistes, et aboutissant à un fonctionnement synergique. Il n'est donc pas surprenant que, suivant les points de vue, l'action parasitaire frappe exclusivement certains observateurs, tandis que d'autres n'envisagent que les conséquences avantageuses de l'association. Ces

considérations indiquent comment des observations exactes peuvent, en pareille matière, conduire à des conclusions aussi opposées que celles de Frank et d'Hartig.

Pour conclure: le symbiose existe à divers degrés entre les plantes supérieures et les Champignons unis aux racines. Elle est nécessaire chez la plupart des holosaprophytes et normale chez beaucoup de plantes qui, comme les Orchidées, n'ont pas d'autre organe absorbant que des mycorrhizes, pourvus ou privés de poils radicaux; elle est facultative chez beaucoup de Conifères et en rapport avec les conditions extérieures qui rendent ces plantes plus ou moins humicoles; elle tend à se généraliser chez les Cupulifères pour adapter ces plantes à la nécessité de récupérer les pertes considérables résultant de la chute des feuilles. Les Champignons des mycorrhizes sont franchement saprophytes, et ne se nourrissent pas des tissus vivants, bien qu'ils semblent recevoir de ces derniers, outre un habitat très favorable à leurs besoins, une partie des aliments élaborés par la communauté.

Toutefois on ne saurait établir une distinction bien tranchée entre de tels hôtes et les saprophytes meurtriers comme les *Sclerotinia* décrits par de Bary, comme le *Coryneum* du Cerisier, qui tuent les cellules pour s'en faire un aliment conforme à leur nature. On pourra donc trouver des Champignons analogues à ceux des mycorrhizes et dont l'action sera comparable à celle des vrais parasites. Peut-être même, sous des influences spéciales, l'harmonie habituelle entre un Champignon et une racine se trouvera-t-elle rompue. Les excroissances signalées par von Tubeuf (1) sur des racines de *Pinus Cembra* pourraient se rattacher à l'une de ces conditions. Nous en dirons autant du dépérissement constaté par Henschel (2) chez les jeunes plans de Pins dont les racines sont envahies par les Champignons; mais alors ces corps mixtes ne répondraient plus à la définition des mycorrhizes, que nous formulerons ainsi: « Morphologiquement: un complexe de Champignon et de racine, ou mycodomatie; physiologiquement: un organe adapté à la nutrition commune d'un Champignon et d'une plante supérieure aux dépens d'aliments spéciaux, et en particulier de l'humus. »

Paul Vuillemin,

Chef des travaux d'histoire naturelle
à la Faculté de Médecine de Nancy.

(1) Groszlik. *Botanisches Centralblatt*. 1886.

(1) Von Tubeuf. *Beiträge zur Kenntniss des Baumkrankheiten*. Berlin. 1888.

(2) Henschel. *Österr. Vierteljahresschrift für Forstwesen*. 1887.

NOUVELLES RECHERCHES SUR LE FLUOR

Dans des recherches précédentes nous avons démontré qu'il est possible d'isoler le fluor, en électrolysant le fluorure de potassium en solution dans l'acide fluorhydrique anhydre, préparé par le procédé de M. Fremy. Dans un appareil spécial en platine, on recueille, au pôle négatif, de l'hydrogène, et au pôle positif, un gaz doué d'une activité chimique très grande, et facilement reconnaissable en ce qu'il enflamme le silicium cristallisé à la température ordinaire. Par des expériences sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici, nous avons démontré que le corps gazeux, mis en liberté dans ces conditions, est bien le radical des fluorures.

Nous avons pensé qu'il était indispensable de compléter ces premières recherches, en préparant ce corps gazeux en plus grande quantité, et en déterminant les plus importantes de ses constantes physiques. L'appareil dont nous nous sommes servi dans ce but est identique, comme forme, à celui employé dans nos premières recherches; seulement, il est beaucoup plus grand, et peut contenir 100^{cc} environ d'acide fluorhydrique (fig. 1).




Fig. 1.

Il était indispensable, dans ces nouvelles expériences, d'obtenir du fluor absolument privé d'acide fluorhydrique; aussi avons-nous disposé à la suite de l'appareil à électrolyse un petit serpentín en platine entouré de chlorure de méthyle à — 50°. Comme l'acide fluorhydrique bout à 19°,5, la presque totalité de ce composé sera retenue à l'état liquide au fond du serpentín. Le gaz fluor n'entraînera que la faible quantité d'acide, correspondant à la tension de vapeur de l'acide fluorhydrique à — 50°, c'est-à-dire à une température inférieure de 70° à son point d'ébullition. Enfin, pour retenir ces dernières traces d'acide fluorhydrique, on plaçait à la suite

du petit serpentín, deux tubes de platine remplis de fragments de fluorure de sodium. Ce composé s'empare de l'acide fluorhydrique, à la température ordinaire, avec une grande énergie, en formant un fluorhydrate de fluorure.

Le fluor, obtenu au moyen de ce nouvel appareil, possède toutes les réactions que nous avons indiquées précédemment. Il ne produit pas de fumées dans l'air sec, et il peut être conduit, au moyen de petits tubes flexibles en platine, dans les appareils destinés à le recevoir. Nous nous sommes assuré, tout d'abord, que le platine, à la température ordinaire, n'est pas attaqué par le fluor. Nous avons reconnu que, jusqu'à 100°, sous forme de fil ou de lame, ce métal résiste parfaitement à l'action du fluor pur. Au contraire, entre 500° et 600°, l'attaque se produit avec facilité, et il se forme un bifluorure de platine. Ce sel possède la propriété importante de se dédoubler parfaitement à l'action du fluor pur par une simple élévation de température. Il est certain que le jour où l'on saura préparer, par une voix détournée, ce fluorure de platine ou le fluorure d'or qui lui est analogue, on possèdera une préparation chimique du fluor.

Le fluor pur n'attaquant pas le platine, à la température ordinaire, il devenait possible de déterminer quelques-unes de ses constantes physiques.

Densité. — Pour obtenir la densité de ce nouveau corps simple gazeux, nous nous sommes servi de petits flacons analogues à ceux employés par M. Berthelot pour la détermination des chaleurs spécifiques des liquides, et dont la forme rappelle celle de l'appareil à densité de M. Chancel (fig. 2). Nous n'insisterons pas sur les détails de cette expérience. Trois déterminations nous ont fourni les chiffres 1,262, 1,263, 1,270. Nous adopterons donc d'après ces recherches le chiffre moyen de 1,263.




Fig. 2.

La densité théorique du fluor obtenu en multipliant la densité de l'hydrogène 0,06927 par l'équivalent de fluor 19, est de 1,316; elle est donc plus élevée de 0,03 que la densité expérimentale. Nous ferons remarquer, à propos de cette différence, que, dans nos recherches antérieures sur le trifluorure de phosphore, nous avons trouvé déjà une densité plus

faible, ce qui pourrait peut-être laisser supposer que la détermination de l'équivalent du fluor a fourni un chiffre un peu élevé. Nous nous occupons en ce moment de vérifier ce dernier point.

Nos expériences ont été faites avec une balance qui accusait aisément 0^{re},0005 avec 70 grammes dans chaque plateau. De plus, le flacon de platine présente cet avantage de mettre rapidement le gaz qu'il contient en équilibre de température avec l'air contenu dans la cage de la balance. Des expériences comparatives, faites dans nos appareils avec différents gaz, nous ont fourni des résultats très exacts que nous attribuons justement à ces conditions expérimentales.

Couleur du Fluor. — Cette expérience a été faite dans un tube de platine d'un mètre de longueur, fermé par des plaquettes de fluorine tout à fait transparentes. Deux ajutages de platine soudés près des deux extrémités permettent l'entrée et la sortie du gaz. L'appareil est d'abord séché avec soin, puis légèrement incliné et rempli par déplacement de gaz fluor jusqu'à ce que le silicium froid prenne feu à l'extrémité de l'autre ajutage. Les deux petits tubes d'arrivée et de sortie sont alors fermés par des cylindres de platine ajustés à frottement doux. Pour se rendre compte de la couleur du gaz, il suffit de regarder une surface blanche, en jugeant par comparaison, au moyen d'un tube de verre rempli d'air, de même longueur et de même diamètre, recouvert de papier noir et fermé par deux lames de verre à faces parallèles.

Sur une épaisseur de 1 mètre et même de 0^m30, le fluor possède une couleur jaune verdâtre très nette, beaucoup plus faible que celle du chlore vu sous la même épaisseur. La teinte d'ailleurs diffère de celle du chlore en ce qu'elle approche davantage du jaune. Examiné au spectroscope, sur une épaisseur de 1 mètre le fluor ne nous a pas présenté de bandes d'absorption.

Spectre du Fluor. — Dans un important travail sur les spectres des métalloïdes, M. Salet avait indiqué l'existence de cinq raies rouges attribuables au fluor. Il avait déterminé leur position en comparant les spectres du fluorure et du chlorure de silicium. Nous avons dans cette étude du spectre du fluor fait jaillir l'étincelle d'induction au milieu du fluor gazeux, et en employant des électrodes d'or et de platine. Notre spectroscope était à trois prismes afin d'obtenir un spectre très étendu, et l'étincelle était fournie par une bobine très forte, munie de deux condensateurs. En comparant les résultats obtenus avec le fluor, avec l'acide fluorhydrique, avec le fluorure de silicium, avec le trifluorure de phosphore et enfin avec le tétrafluorure de carbone, nous sommes arrivés à des résultats d'une grande netteté. J'ajouterai que

le spectre fourni, en particulier, par le tétrafluorure de carbone est très beau et très étendu.

Le fluor est caractérisé par un ensemble de raies rouges, au nombre, au moins, de treize, placées entre les longueurs d'onde 749 et 623. Outre ces raies, on obtient plusieurs bandes dans le jaune et surtout dans le violet; ces bandes sont assez larges et peu nettes; elle se rencontrent dans plusieurs des composés gazeux dont nous venons de parler et surtout dans le spectre de l'acide fluorhydrique. La position des raies rouges nous semble d'autant plus intéressante qu'on les rencontre dans une partie du spectre où, jusqu'ici, aucun corps simple connu n'avait donné de raies.

En résumé, par suite de l'ensemble de ces propriétés, le fluor se place nettement en tête de la famille naturelle : Fluor, Chlore, Brome, Iode. Sa densité est normale. Il est coloré. Il donne avec l'hydrogène un acide analogue à HCl. Il fournit avec les métaux des combinaisons le plus souvent comparables aux composés chlorés. Avec les métalloïdes il donne aussi des produits similaires, mais qui tous tendent à occuper l'état gazeux. Exemple : le fluorure de silicium, les fluorures de phosphore et les fluorures de carbone.

En même temps que ces analogies, il existe aussi des différences que nous rappellerons. Le fluorure de calcium semble se rapprocher plutôt de l'oxyde de calcium que du chlorure. Le fluorure d'argent est très soluble dans l'eau, tandis que le chlorure d'argent est insoluble. Enfin, les chaleurs de neutralisation de l'acide fluorhydrique par les oxydes métalliques, déterminées par M. Guntz, sont plus voisines des sulfates que des composés chlorés. De telle sorte que, tout en se rapprochant bien du chlore, le fluor semble conserver aussi quelques analogies avec l'oxygène. L'action du fluor sur le charbon vient encore confirmer cette manière de voir. En effet, le charbon de bois, un peu dense, brûle dans le fluor, comme il le fait dans l'oxygène, en produisant un corps gazeux qui est un fluorure de carbone.

Si l'on compare maintenant les séries similaires de composés organiques fluorés et chlorés, tels, par exemple, que les premiers éthers de la série grasse, on voit tout de suite que les propriétés de ces corps sont assez voisines, mais que les points d'ébullition des composés fluorés sont toujours beaucoup moins élevés. Nous ajouterons que l'action du fluor libre sur les composés organiques, et surtout sur les composés organiques hydrogénés, ne peut pas être comparée à l'action du chlore. En effet, les réactions qui se font avec le fluor sont tellement brutales qu'il ne se produit pas de composés intermédiaires, et que l'on arrive le plus souvent aux produits ultimes, tels que l'acide

fluorhydrique et les fluorures de carbone. Nous citerons, comme exemples, l'action du fluor sur l'éthylène, le formène et le chloroforme.

On voit donc que si le fluor doit être placé d'une façon indiscutable en tête de la famille du chlore, néanmoins par quelques-unes de ses propriétés, il se rapproche un peu de l'oxygène. Mais ce qui nous paraît le plus important à signaler, c'est l'activité chimique de ce nouveau corps simple. Il n'y a pas d'élément connu qui nous présente des réactions aussi énergiques. En effet, le fluor se combine directement à l'hydrogène et au carbone sans l'intervention d'une énergie étrangère; et sa chaleur de combinaison avec l'hydrogène, déterminée par M. Berthelot et l'auteur de cet article,

est supérieure à celles de tous les autres hydracides. S'il était besoin d'un nouvel exemple pour démontrer cette énergie, il suffirait de rappeler que le fluor décompose l'eau à la température ordinaire en fournissant de l'ozone assez concentré pour apparaître avec la belle couleur bleue indiquée par MM. Hautefeuille et Chappuis. Son action si énergique sur le silicium et sur tous les métalloïdes avait d'ailleurs été mise en évidence dans des recherches précédentes. De tous les corps simples connus, le fluor est donc celui qui présente indiscutablement la plus grande énergie chimique.

Henri Moissan,
de l'Académie de Médecine.

LES OBSERVATIONS RÉCENTES DE M. KLEIN SUR L'ÉTIOLOGIE DE LA DIPHTÉRIE

Pendant ces trois dernières années, l'éminent bactériologiste anglais Klein a eu l'occasion de constater une relation curieuse existant entre la diphtérie humaine et une maladie des chats, encore mal connue (1). A diverses reprises, on avait observé les coïncidences suivantes : Des chats étaient atteints d'une affection pulmonaire, et les enfants qui jouaient avec eux contractaient la diphtérie. Ou bien encore les chats d'une maison où se trouvaient des enfants malades de diphtérie, tombaient malades. Les signes que ces animaux présentaient étaient surtout des symptômes pulmonaires. Ils guérissaient parfois, mais souvent aussi mouraient avec un amaigrissement considérable. Il y eut, en particulier au printemps de 1889, à Londres, une épidémie assez étendue de cette maladie sévissant sur les chats. L'épidémie prit naissance dans une maison où, peu de temps après, apparurent des cas de diphtérie. Les animaux étaient atteints d'une affection des voies respiratoires, avec amaigrissement considérable et paralysie de l'arrière-train. Les autopsies montrèrent de la broncho-pneumonie et de gros reins blancs, avec dégénérescence grasseuse de la substance corticale. M. Klein fit alors des expériences d'inoculation. En introduisant sous la peau d'un chat des fausses-membranes diphtériques de l'homme ou des cultures pures du bacille de la diphtérie, il produisit les effets suivants : Tumeur au point d'inoculation, congestion pulmonaire et bronchopneumonie; dégénérescence grasseuse de

la substance corticale des reins. Le bacille de Klebs-Löffler, agent spécifique de la diphtérie, peut être isolé de la tumeur située au point d'inoculation; mais on ne le retrouve ni dans le sang ni dans les viscères. Il semble à M. Klein que la maladie expérimentale ainsi produite a la plus grande analogie avec la maladie spontanée décrite plus haut. L'introduction, sur la muqueuse de la trachée *saine et non excoriée*, de cultures pures de bacilles de la diphtérie, donna des résultats analogues à ceux obtenus par l'inoculation sous la peau. Les animaux moururent, au bout de deux à sept jours, de pneumonie aiguë avec dégénérescence grasseuse des reins. Les bronches, les infundibula et les alvéoles étaient remplies d'un exsudat pseudo-membraneux, et dans l'exsudat muco-purulent des bronches, on trouva le bacille de la diphtérie.

Le chat domestique serait donc susceptible de contracter la diphtérie et de la communiquer à l'homme. Une constatation analogue a été faite par M. Klein sur les vaches. Depuis dix ou douze ans, des médecins et des vétérinaires anglais avaient cru pouvoir rapporter au lait de vache certains cas de contagion de diphtérie. Les vaches laitières incriminées avaient, sur les tétines, des croûtes et des fausses-membranes. Pour voir s'il n'y avait pas là de simples coïncidences, M. Klein inocula deux vaches laitières avec une culture pure de diphtérie (une seringue de Pravaz dans le tissu cellulaire sous-cutané). Il y eut au point d'inoculation un peu d'œdème, puis de la fièvre et de la toux. Les deux animaux, dès le 5^e jour, avaient sur

(1) Voyez ci-dessous : *Société royale de Londres*, séance du 22 mai 1890, page 347 du présent numéro.

les tétines des papules rouges, qui se transformèrent en vésicules, puis en pustules, qui séchèrent, en formant une croûte brune, vers le 7^e jour. Les dimensions de ces pustules étaient variables. Pendant l'éruption le lait recueilli avec pureté renfermait le bacille de la diphtérie. L'un des animaux mourut le 15^e jour, l'autre fut tué le 25^e. Tous deux présentaient des lésions de broncho-pneumonie, des hémorragies dans le péricarde et des foyers nécrotiques dans le foie. Au point d'inoculation dans la tumeur, on retrouva le bacille de la diphtérie.

On inocula à deux veaux, sous la peau, des parcelles des pustules, et on reproduisit l'éruption. Ces animaux eurent de plus de la bronchopneumonie et de la dégénérescence graisseuse de la substance corticale des reins. L'inoculation sous-cutanée du bacille de la diphtérie chez la vache paraît donc produire les effets suivants: Tumeur au point d'inoculation, éruption vésiculeuse sur les tétines, pneumonie grave et foyers de nécrose dans le foie. *On retrouva le bacille dans le lait; deux chats nourris avec le lait de ces vaches*

diphtériques moururent de diphtérie et communiquèrent cette maladie à quatorze autres chats.

Il s'agissait bien là, dans tous ces cas, du bacille de Klebs-Löffler. M. Klein s'en assura par les moyens usuels: cultures et repiquages dans les différents milieux. Les coupes de la tumeur située au point d'inoculation montrèrent, il est vrai, des filaments granuleux, avec spores terminales, différant notablement de l'aspect ordinaire du bacille de la diphtérie. Mais la culture de ces formes de microorganismes reproduisit le bacille-type de Klebs-Löffler.

Si toutes ces expériences de M. Klein sont vérifiées, elles montreront ce fait intéressant que les chats et les vaches sont susceptibles de contracter la diphtérie de l'homme. Cette maladie s'observerait chez ces deux espèces, d'une façon spontanée, ainsi que les faits de contagion semblent l'avoir établi. Elle pourrait également être reproduite expérimentalement.

D^r R. Würtz.

Chef du laboratoire de Pathologie expérimentale à la Faculté de Médecine de Paris.

UNE PILE PHOTO-ÉLECTRIQUE

La production de l'électricité par l'action de la lumière sur certaines substances sensibles peut donner lieu à la construction de piles d'un genre tout particulier. Celle que nous allons décrire est constituée par un tube en verre mince rempli d'alcool (fig. 1); deux plateaux métalliques p et q plongeant dans le liquide; ils sont attachés à deux fils de platine soudés en A et B aux extrémités du tube et communiquent avec les deux paires de secteurs d'un électromètre à quadrants C D E. Le plateau p est revêtu d'une couche de composition convenable; le plateau q est laissé à nu. Si l'on fait tomber sur




Fig. 1.

la lumière du jour, on voit aussitôt l'aiguille de l'électromètre indiquer une déviation correspondant à 1/2 volt environ; petit à petit la sensibilité du plateau p diminue, puis elle disparaît complètement. De légères secousses imprimées à l'appareil ramènent le système à son état de sensibilité primitive. Un procédé plus curieux peut produire le même résultat: qu'on attache en A un fil isolé W et que dans le voisinage on fasse éclater entre deux boules g et h

l'étincelle d'une machine de Voss ou l'étincelle excitatrice des expériences de M. Hertz, on verra aussitôt la sensibilité reparaitre. J'ai trouvé que les vibrations de M. Hertz exerçaient encore leur action sur la pile à une distance de plus de 23 mètres et il semble que l'on pourrait encore doubler cette distance sans atteindre la limite.

Tels sont brièvement résumés les phénomènes que j'ai récemment observés et sur lesquels je compte publier prochainement un mémoire détaillé (1).

George M.-Minchin,

Professeur
au Royal Indian Engineering College

(1) Ces phénomènes sont encore un peu vagues; aussi convient-il d'attendre le mémoire annoncé par l'auteur pour tirer des conclusions et discuter les interprétations possibles. On peut cependant dès à présent faire quelques remarques. La production d'une différence de potentiel entre deux lames métalliques p et q , inégalement éclairées, n'est pas, croyons-nous, un phénomène nouveau. M. Ed. Becquerel (*) le premier a constaté ce fait qui fut plus tard étudié par Grove (**). Les expériences de M. Minchin sont néanmoins fort intéressantes; elles rappellent l'attention sur des faits curieux, et paraissent de nature à faire percevoir un lien entre les effets actinométriques de M. Becquerel et les découvertes récentes de MM. Hertz, Righi, Bichat et Blondlot, etc., qu'analysait dernièrement dans ce recueil M. Gariel (***). L'identité des effets produits par de légères secousses répétées ou par la lumière violette d'une étincelle semble confirmer les observations de MM. Lenard et Wolf (****) sur la pulvérisation des corps par la lumière ultra-violette.
(Note de la Rédaction).

(*) Comptes-Rendus, t. IX, p. 145 (1839); t. XXXV, p. 136 (1841).

(**) Philosophical Magazine (1838).

(***) Voir la Revue, p. 304.

(****) Wiedemann, Annal., t. XXXVII, p. 441 (1889).

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

James Atkinson Longridge, *Mem. Inst. Civil. eng.*; Hon. mem. of north of england institute of mining and mechanical engineers. — **Internal Ballistics**. Un volume de 240 pages avec figures dans le texte. E. et F. N. Spon, 125, Strand, London; New-York, 13, Cortlandt Street, 1889.

Le traité de balistique intérieure, qui vient de publier M. Longridge, est dédié à M. Sarrau; il n'en pouvait être autrement; l'étude physico-mathématique des explosifs est une science éminemment française, due presque entièrement à M. Sarrau, dont les formules font loi pour toutes les artilleries du monde.

Après avoir, dans un premier chapitre, étudié rapidement les explosifs en général, l'auteur aborde le problème de la combustion de la poudre et examine successivement la nature des produits, l'inflammation et l'ignition du grain, l'influence qu'a la forme de ce grain, la température de la combustion, l'action refroidissante des parois, la pression des gaz, etc.

Le troisième chapitre, qui occupe à lui seul plus du tiers de l'ouvrage, est uniquement consacré aux formules de M. Sarrau pour la détermination de la vitesse du projectile au sortir de la pièce et du maximum de pression.

Enfin, dans les deux derniers chapitres, l'auteur s'occupe spécialement de la construction des canons et les étudie en s'appuyant sur les résultats fournis par la balistique intérieure et par la thermodynamique.

Le livre de M. Longridge est intéressant, non seulement parce qu'il contient des résultats inédits, mais parce qu'il est le premier ouvrage didactique publié sur ce sujet; les travaux de M. Sarrau ont paru dans des journaux périodiques et n'ont pas, jusqu'ici, été constitués en corps de doctrine; M. Longridge a fait œuvre utile en les réunissant et en les prenant pour base de son remarquable traité.

L. O.

Mathieu (Emile), *Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy*. — **Théorie de l'Elasticité des corps solides**, 1^{re} partie. Un vol. in-4° de 219 pages. Gauthier-Villars et fils, éditeurs, 55, quai des Augustins, 1890.

Depuis près de vingt ans M. Emile Mathieu, dont tous les géomètres connaissent les beaux travaux, a entrepris, chez MM. Gauthier-Villars, la publication d'une œuvre considérable; il s'agit d'un grand traité qui doit comprendre successivement les diverses parties de la physique mathématique; peu de savants étaient aussi capables que l'éminent auteur de la *Dynamique analytique*, de mener à bien ce difficile travail.

Après avoir publié, depuis 1873, cinq volumes sur la physique mathématique en général, sur la Capillarité, sur la théorie du Potentiel, sur l'Electrostatique et le Magnétisme, sur l'Electrodynamique, M. Mathieu aborde aujourd'hui l'Elasticité des corps solides; deux volumes seront nécessaires pour terminer ce vaste sujet.

Après avoir dans le premier chapitre défini les forces élastiques, puis étudié leur distribution autour d'un point, l'auteur donne leurs expressions en fonction des déformations, exprime leur travail élémentaire et obtient les équations différentielles de l'élasticité. Il examine alors les simplifications qu'elles présentent lorsque le corps est isotrope et les applique à divers cas classiques d'équilibre d'élasticité; puis il traite le grand problème de la torsion et de la flexion des prismes ou cylindres, qui, abordé d'abord par Poisson et

par Cauchy, a été ensuite l'objet des belles recherches de Clebsch et a été enfin amené au dernier point de rigueur par de Saint-Venant.

Dans le chapitre suivant, M. Emile Mathieu établit les équations de l'élasticité en coordonnées curvilignes. Ces équations ont été données par Lamé en 1841, mais par des calculs un peu compliqués; M. Mathieu les simplifie notablement; il montre, de plus, que les équations qui expriment l'équilibre des forces élastiques à l'intérieur d'un corps homogène, isotrope ou non, équations qui ont été établies par Lamé dans un système de coordonnées provenant d'un triple système de surfaces orthogonales, sont également applicables à des coordonnées relatives à un système de surfaces joint à ses trajectoires orthogonales.

L'auteur étudie ensuite les déformations qui ne sont pas très petites des tiges minces; c'est là un problème difficile, pour lequel les travaux de très grands géomètres peuvent donner prise à la critique; Kirchhoff, en particulier, a fait une théorie sur ce sujet; Clebsch l'a reprise ensuite; tous deux appliquent à chaque tranche de la tige les formules de la flexion et de la torsion des prismes, données par de Saint-Venant; M. Mathieu fait remarquer le manque de rigueur de ce procédé; il apporte dans l'exposition de cet important chapitre de profondes modifications, et s'il ne peut pas arriver jusqu'au bout de la recherche en n'acceptant que des considérations absolument rigoureuses, il diminue du moins notablement la part des raisonnements approximatifs.

Le volume se termine par l'étude de l'équilibre et du mouvement vibratoire des plaques et membranes planes. Cette théorie a été donnée, pour la première fois, en ce qui concerne les plaques, par Poisson; Cauchy a repris la question et est arrivé aux mêmes résultats que Poisson, quand le bord de la plaque considérée n'est soumise à aucun couple; Kirchhoff enfin, en partant de l'expression du travail des forces élastiques provenant de la déformation, est parvenu à simplifier d'une façon notable cette théorie. M. Mathieu adopte le procédé de Kirchhoff, puis il montre, par une discussion fort intéressante, comment l'on doit modifier l'analyse de Poisson et celle de Cauchy qui avaient trouvé trois conditions aux limites, pour les réduire aux deux obtenues par Kirchhoff; il arrive enfin aux membranes minces auxquelles il applique deux méthodes, l'une due à Poisson, l'autre qui met bien en évidence la différence fondamentale des plaques et des membranes et dans laquelle on considère les forces élastiques comme constantes dans toute l'épaisseur.

Ce volume de M. Emile Mathieu est digne de ceux qui l'ont précédé; nous ne pouvons en faire un meilleur éloge.

L. O.

Masoni (U.), *prof. nella R. Scuola di Applicazione per gli Ingegneri in Napoli*. — **Corso di Idraulica teorica e pratica**. — Un volume grand in-8°, avec figures intercalées dans le texte. Prix : 10 francs. — Napoli, libreria scientifica e industriale di B. Pellerano, via Genaro Serra, 20, e largo Nilo, 6, 1889.

Le traité d'Hydraulique qui vient de publier le professeur Masoni est un ouvrage des plus complets, des plus développés. Il débute par des notions générales sur l'équilibre interne des corps et sur la nature des fluides, puis il expose l'Hydrostatique absolument comme nous le faisons en France.

Les trois équations générales de l'hydrodynamique sont données ensuite, puis l'équation de continuité;

quant à la cinquième équation, nécessaire pour la détermination des cinq inconnues du problème, elle résulte de ce qu'il s'agit d'un liquide pesant. A partir de ce moment l'hydraulique commence et est traitée pour chaque problème particulier avec de grands détails.

L'écoulement de l'eau par les orifices, par les déversoirs; les questions relatives aux tuyaux de conduite, aux distributions d'eau; tous les problèmes se rapportant aux canaux découverts, à la translation des ondes, etc., sont examinés successivement. Le savant professeur de l'Ecole des Ingénieurs de Naples connaît à fond et expose avec une grande clarté les travaux expérimentaux et théoriques qui ont constitué l'Hydraulique, depuis les premières expériences de de Chézy, Dubuat, Girard et les premières recherches de Navier, jusqu'aux résultats de Darcy, de Lesbros, de Weisbach, de Dupuit, de M. Bazin, jusqu'aux beaux mémoires de de Saint-Venant et de M. Boussinesq. J. POULET.

2° Sciences physiques.

Rosa (Edward B.), étudiant à l'Université de John Hopkins (Baltimore). — **Détermination de v , rapport des unités électromagnétiques aux unités électrostatiques.** *Philosophical Magazine*, 1889.

M. Rosa vient de donner une nouvelle détermination du rapport des unités v ; ses expériences paraissent fixer la valeur de v à 3×10^{10} avec une erreur relative inférieure à $\frac{1}{1000}$.

La méthode qu'il a suivie a été indiquée par Maxwell. Elle consiste à prendre un condensateur de forme géométrique simple dont on puisse déterminer a priori la capacité électrostatique, et à en mesurer la capacité électromagnétique en valeur absolue, au moyen d'une disposition spéciale du pont de Wheatstone.

Interrompons une des branches BD du pont entre les deux points R et S (fig. 1), et faisons vibrer entre ces deux points une lame métallique en communication avec l'armature interne du condensateur; l'armature externe est reliée au point D. Si n est le nombre de vibrations de la lame par seconde, le condensateur sera chargé et déchargé n fois par seconde. Soit E la différence de potentiel entre les points B et D, et C la capacité électromagnétique du condensateur. Une vibration double, de la lame, qui produit une charge et une décharge, amène en définitive le passage d'une quantité d'électricité EC de B en D; et si ces alternatives de charge et de décharge sont suffisamment rapides, tout se passera comme si la branche BD, supposée continue, était traversée par un courant d'intensité $I = nEC$.




Fig. 1.

Supposons qu'on règle les résistances de manière à réaliser l'équilibre du pont. Le théorème de M. Thévenin nous donne alors (1): $I = \frac{E}{\frac{cd}{d} + R_1}$, R_1 étant la ré-

sistance de l'ensemble du réseau entre les points B et D;

où $nC = \frac{1}{\frac{cd}{d} + R_1}$, $R_1 < a + b + g$ est dans les expé-

riences de M. Rosa de l'ordre du cent-millième de $\frac{cd}{a}$; donc :

$$C = \frac{a}{ncd}.$$

Si C' est la capacité électrostatique, mesurée géométriquement, on aura :

$$v^2 = \frac{C'}{C} = \frac{C'ncd}{a}.$$

La méthode exige donc la mesure d'une capacité électrostatique, la connaissance d'une résistance en valeur absolue, la comparaison de deux autres résistances, et enfin la mesure de la période d'un mouvement vibratoire. Elle suppose qu'on ait déterminé la valeur de l'ohm. M. Rosa prend pour la valeur absolue de l'unité de l'Association britannique: 0,98664, ce qui revient à prendre l'ohm égal à une colonne de mercure de 106,325 (et 1 mm. de section).

Le grand avantage de cette méthode est qu'elle est une méthode de zéro: elle n'exige point la connaissance de la constante du galvanomètre; elle n'exige ni la connaissance de la force électromotrice ni de la résistance de la pile; et la constance de ces éléments n'est pas essentielle. Enfin v est donné par son carré et une erreur relative commise dans la mesure d'une des capacités n'entraîne qu'une erreur relative moitié moindre dans la valeur de v .

Cette méthode appliquée en 1883 par M. J. J. Thomson, l'avait conduit au nombre $2,963 \times 10^{10}$.

Ce savant employait une lame vibrante de fer doux qui était tour à tour attirée par un électro-aimant et ramenée en arrière par un ressort antagoniste. Le principal perfectionnement de M. Rosa est d'avoir substitué à ce système peu régulier, surtout dans le cas de vibrations très rapides, un interrupteur à mercure dont la pièce essentielle est un diapason entretenu électriquement. Les branches de ce diapason sont horizontales et vibrent dans un plan vertical. A chacune d'elles est fixée une pointe de platine qui, dans l'état de repos, vient affleurer la surface d'une goutte de mercure placée dans une coupelle isolante. Si l'on fait vibrer le diapason, à chaque instant une des pointes et une seule est en communication électrique avec la goutte de mercure correspondante. Des pointes de platine partent deux fils qui se rejoignent, pour former un fil unique, qui va toucher l'armature interne du condensateur. Dans les gouttes de mercure plongent aussi deux fils reliés aux sommets B et D du pont: le point D est d'ailleurs en communication avec l'armature externe du condensateur. On mesure avec une grande précision le nombre de vibrations du diapason par seconde, au moyen de la méthode stroboscopique. Le système des fils de charge avait une capacité propre, et il fallait la déduire de la capacité du système total, pour avoir celle du condensateur. On la mesurait en supprimant le contact du fil et de l'armature intérieure. La résistance c était constituée par un trait de graphite tracé sur une lame de verre. C'est la résistance a qui était variable et qu'on ajustait de manière à produire l'équilibre.

Le condensateur était sphérique. On en calculait la capacité électrostatique par la formule $c' = \frac{r'r'}{r' - r}$; r et

r' étaient déterminés par des pesées; on évaluait le poids d'eau contenu dans la sphère extérieure creuse; et ensuite la perte de poids dans l'eau de la sphère intérieure. Les capacités ont été, suivant les cas: 50,069 et 29,556, c. g. s. On s'est servi de deux diapasons de hauteurs différentes. L'un d'eux donnait 130 vibrations doubles par seconde. Les moyennes de plusieurs séries d'expériences, dans lesquelles on a changé le conden-

(1) Voir Mascart et Joubert: Électricité et magnétisme, t. II, p. 380 et aussi p. 529.

sateur ou le diapason, ont donné des nombres variant entre 2,9977 et 3,0045.

Suivant qu'on prend ou qu'on laisse de côté un groupe d'expériences qui paraît présenter une cause d'erreur systématique, on a comme moyenne générale des résultats :

$$\text{ou} \quad \begin{array}{l} 3,0004 \times 10^{10} \\ 2,9993 \times 10^{10}. \end{array}$$

Ces expériences ne permettent donc pas d'affirmer qu'il existe une différence bien constatée, dans un sens ou dans l'autre, entre la quantité v et le nombre 3×10^{10} .

Bernard BRUNHES.

Mascart. — Sur la mesure du champ magnétique terrestre. *Annales de chimie et de physique* : mars 1890.

Avec quelle précision la méthode de Gauss donne-t-elle la composante horizontale du champ terrestre? C'est à cette question que répond M. Mascart à la suite d'une discussion minutieuse de la méthode.

La détermination du produit MH par la mesure de la durée des oscillations comporte une cause d'erreurs due à l'aimantation induite par la terre. Le barreau étant toujours dirigé dans le plan du méridien magnétique, ou du moins s'écartant très peu de cette position, s'aimante dans le sens de sa longueur : à son moment magnétique rigide M s'ajoute un moment temporaire dû à l'influence terrestre et proportionnel à H ; c'est une fraction de M égale à $M \varphi H$; et ce qu'on mesure c'est $M(1 + \varphi H)$. Diverses méthodes ont été proposées pour éliminer ou pour déterminer le coefficient φ (1); mais aucune d'elles ne permet de répondre du chiffre des millièmes.

Dans la mesure de $\frac{M}{H}$, la correction relative à l'aimantation induite est absolument négligeable dans les conditions ordinaires.

Si les aimants étaient infiniment courts, on aurait simplement, en se plaçant, par exemple, dans la première position de Gauss :

$$\tan \delta = \frac{M}{H} \cdot \frac{2}{R^3}.$$

Les aimants étant de longueur finie, il faut introduire des termes correctifs; on doit multiplier $\frac{2M}{H R^3}$ par $\left(1 + \frac{p}{R^2} + \frac{p_1}{R^4} + \dots\right)$, série ordonnée suivant les puissances croissantes de $\frac{1}{R^2}$. On peut s'arrêter aux 3 premiers termes, mais leur détermination est très délicate. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de choisir le rapport des longueurs des barreaux de manière à annuler p_1 . Il suffit pour cela que le barreau déviant soit sensiblement le double de l'autre, et l'on déterminera p par deux expériences faites à deux distances différentes.

Mais pour arriver à connaître le rapport $\frac{M}{H}$ au $\frac{1}{5.0}$ près, il faudrait évaluer la différence des déviations dans les deux cas à moins de 7°, ce qui est un degré de précision bien difficile à atteindre.

La conclusion est que l'emploi des aimants ne permet pas de connaître sûrement la valeur de H avec quatre chiffres exacts.

Bernard BRUNHES.

M. Gérard (Eric). — Leçons sur l'électricité, professées à l'Institut électro-technique de Montefiore, annexé à l'Université de Liège. Tome 1^{er} Paris 1890. Gauthier-Villars.

Cet ouvrage n'est pas, à proprement parler, un traité d'électricité, car les lois fondamentales de cette science

y sont exposées sans démonstration; mais tel n'était pas le but de l'auteur. M. Eric Gérard s'est proposé dans ses leçons d'enseigner tout ce qu'il était nécessaire de savoir à un ingénieur électricien pour les applications si nombreuses et si importantes de la science électrique; en cela il nous semble avoir parfaitement réussi. L'exposition est simple; les calculs peu compliqués sont faciles à suivre; de nombreuses figures théoriques très claires facilitent l'intelligence du texte.

Mais ce qui fait surtout la valeur de cet ouvrage, ce qui le rendra précieux pour les ingénieurs, ce sont les indications sur la manière de faire le projet d'un électromoteur à courant continu, d'un alternateur, d'un transformateur d'énergie etc..., ainsi que les exemples et les nombreuses données numériques nécessaires, relevées sur les meilleures machines.

Malgré le but essentiellement pratique de ces leçons, M. Eric Gérard y donne un aperçu des théories les plus en faveur sur les actions magnétiques et électriques. Ces spéculations d'ordre purement scientifique sont loin de déparier cet excellent ouvrage, auquel nous souhaitons tout le succès qu'il mérite.

Henri PELLAT.

Barillot (Ernest). — Manuel de l'analyse des vins. Gauthier-Villars et fils, 1889, Paris.

L'auteur, dans sa préface, explique d'une façon très claire le but qu'il a poursuivi en publiant ce petit livre : faciliter la pratique de l'analyse des vins, repêcher la faculté de reconnaître la fraude et par suite en restreindre le développement. Dans la première partie de son travail l'auteur a choisi parmi toutes les méthodes qui ont été présentées pour l'analyse des vins celles qui lui ont paru offrir le plus de certitude et il les a présentées sous une forme nette et concise.

Dans la seconde partie, il indique quel parti on peut tirer des résultats analytiques pour conclure aux sophistication dont les vins peuvent avoir été l'objet. Un chapitre spécial donne la marche systématique à suivre pour la recherche des matières colorantes étrangères; cette partie de l'ouvrage est très clairement exposée, elle permet d'arriver sûrement et rapidement au résultat cherché.

Le livre se termine par un appendice dans lequel se trouve exposé l'ensemble des connaissances acquises sur la constitution des matières colorantes artificielles tirées de la houille; ce chapitre s'adresse aux personnes déjà familiarisées avec les études de chimie organique; il résume sous une forme succincte les diverses publications faites dans les ouvrages spéciaux, notamment par MM. Otto Witt, Nölting, G. de Becht, Königsberg, etc.

Enfin M. Barillot expose, en terminant, une méthode qui lui est personnelle pour l'évaluation et la recherche de l'alcool en nature ajouté dans les vins. Cette méthode très élégante est d'une exécution facile. Il est impossible de se prononcer encore avec certitude sur sa valeur; il convient pour cela d'attendre qu'une expérimentation plus complète, faite sur des vins de toute origine, vienne corroborer les résultats intéressants obtenus par l'auteur.

Nous adresserons une légère observation relative au procédé de dosage de l'extrait dans les vins; l'auteur donne sur ce sujet des indications trop peu précises; il eût été préférable d'indiquer la méthode prescrite par le Comité consultatif des Arts et Manufactures dans laquelle sont précisées toutes les conditions que doivent observer les divers opérateurs pour obtenir des résultats comparables. Cette lacune est regrettable, car la connaissance de la quantité d'extrait sec d'un vin est un des éléments les plus utiles, soit pour apprécier sa valeur, soit pour déterminer les falsifications qu'il a subies. Or la quantité d'extrait peut varier dans d'assez larges limites suivant que l'on opère dans des conditions différentes. Pour arriver à des résultats comparables, il est indispensable d'agir suivant une

(1) Mascart et Joubert. *Elect. et magn.*, 2^e vol. p. 684.

méthode absolument déterminée. Cette lacune, facile à combler, n'enlève aucun mérite au travail de M. Barillot, qui sera consulté avec intérêt par toutes les personnes appelées à s'occuper de l'analyse des vins.

Ch. BARDY.

Prost (Aimé), *ingénieur des mines*. — **La préparation et les propriétés du ciment de laitier**. — *Annales des mines*, 1889.

De nombreuses tentatives ont été faites pour utiliser les laitiers des hauts-fourneaux. Celle qui semble devoir le mieux réussir est la fabrication du ciment. On a remarqué qu'il suffisait d'ajouter aux laitiers de la chaux et quelquefois un peu d'alumine pour avoir une composition voisine de celle du ciment de Portland. On a essayé tout d'abord de chauffer un mélange de laitier et de chaux et d'utiliser le produit comme ciment. Les résultats n'ont pas été satisfaisants, et la solution a été obtenue dans une voie différente. On a remarqué que les laitiers, lorsqu'ils étaient *granulés* par refroidissement brusque dans un courant d'eau froide, acquéraient des propriétés pouzzolaniques très marquées, et pouvaient par leur mélange avec la chaux former un bon ciment hydraulique. Ce procédé est actuellement employé dans quelques usines françaises et allemandes. M. Aimé Prost décrit les différents appareils employés dans cette fabrication. Il résume ensuite une longue série d'expériences qu'il a entreprises sur les propriétés du ciment de laitier, et compare ses résultats à ceux obtenus d'un autre côté par M. Tetmajer. — Les principales conclusions de M. Prost sont les suivantes :

1^{re} La partie importante de la fabrication du ciment de laitier est la granulation. Un laitier non granulé possède une hydraulicité négligeable. Après une granulation convenable il acquiert au contraire des propriétés pouzzolaniques remarquables.

2^e Les laitiers qui conviennent le mieux pour la fabrication du ciment sont les laitiers basiques. En général un laitier est d'autant plus avantageux qu'il est plus riche en chaux et en alumine.

3^e Le ciment de laitier, sujet au fendillement, ne convient pas très bien pour les travaux aériens; mais employé comme ciment hydraulique, surtout en grandes masses, il peut lutter avec le ciment de Portland dont le prix de revient est près de deux fois plus élevé.

Georges CHARPY.

3^e Sciences naturelles.

Riva Palazzi (G.). — **La Geologia e gli studi geografici**, in-8, 24 pages, Rome, Tipogr. della R. Accademia dei Lincei. (Extrait du Boll. Soc. geol. Italiana, vol. IV.)

Verri (A.). — **Geologia e Topografia**, in-8, 18 pages. (Id. vol. VIII, 1889.)

A l'occasion de la récente publication de M. Verri, dont nous allons rendre compte, il nous paraît utile d'appeler d'abord l'attention sur le mémoire que fit paraître il y a déjà quelques années sur le même sujet un officier de l'armée italienne, M. le colonel Riva Palazzi. Ce substantiel travail témoigne en effet de l'importance croissante que les méthodes synthétiques et systématiques, fondées sur la géologie, prennent chaque jour aux yeux des géographes. L'auteur insiste sur la nécessité où l'on se trouve d'abandonner les classifications artificielles du passé, et notamment de remplacer la trop célèbre « théorie des bassins » par des procédés d'analyse plus rationnels; à la suite de M. Suess, il montre comment on peut envisager les grands linéaments du relief de notre continent. Passant ensuite à l'examen des traits d'ordre topographique, et empruntant ses exemples au sol de l'Italie et à ses frontières, il fait voir comment les particularités de configuration

des différentes régions choisies sont étroitement conditionnées par deux facteurs essentiels: la disposition des couches, résultant elle-même des déformations subies par l'écorce terrestre, et l'inégale résistance à l'érosion des roches affleurant à la surface. C'est là aujourd'hui, pour les personnes qui se sont occupées des formes du terrain, une vérité banale; mais il n'était pas inutile d'attirer une fois de plus l'attention des géographes sur cette relation capitale, dont la science et l'enseignement sont encore loin d'avoir tiré tout le parti qu'elle comporte. Ajoutons que le savant officier fait clairement ressortir l'intérêt pratique de ce genre d'études, au point de vue de ses applications à l'art militaire, l'agriculture et l'économie territoriale.

Nous retrouvons ces excellentes tendances dans un mémoire que vient de publier un autre officier de l'armée italienne, M. le commandant Verri. Ce second travail est consacré à l'analyse et à la critique d'un ouvrage d'ensemble sur les *formes du terrain*, ayant pour auteur principal M. le colonel G. de la Noë, et publié à Paris en 1888. Les réserves ou les divergences de vues exprimées par M. Verri ne portent que sur différents points de détail: une partie de ces objections disparaîtrait même, croyons-nous, devant un examen plus approfondi du texte original; mais pour les principes généraux, qui sont ceux de toute l'école contemporaine, représentée à l'étranger par les Geikie, les Powell, les Gilbert, les Davis, les Richtofen, les Heim, les Philippon et bien d'autres, M. Verri déclare s'y rallier d'une manière complète et leur apporte le précieux témoignage de ses études personnelles sur le sol de la Péninsule. A cet égard, son mémoire renferme deux documents pleins d'intérêt: le premier est une esquisse du tracé des cours d'eau des Apennins (p. 4 à 7, en note), tracé établi en entière conformité avec les lignes de plus grande pente et les rigoles naturelles de la surface plissée; le second a trait au mode de formation des vallées transversales de la même région (p. 13): la plupart de ces cluses sont dues au remblaiement général survenu à l'époque pliocène: les cours d'eau actuels, établis à la surface des alluvions correspondantes, ont peu à peu mis à jour, en s'encaissant, les rides plus anciennes, primitivement ensevelies sous ce manteau discordant. Ce cas bien connu de *perce par surimposition* (*superimposed valleys*, Powell) n'avait pas encore été signalé sur une aussi grande échelle.

Emmi, DE MARGERIE.

Jourdan (E.) *Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Marseille, Professeur à l'Ecole de Médecine*. — **Les sens chez les animaux inférieurs**. Un vol. in-16 Paris, J.-B. Baillière et fils.

L'étude des fonctions des organes des sens est une des questions les plus difficiles de la physiologie. Les sensations fournies par ces organes spéciaux sont, en effet, perçues dans les centres nerveux, où elles subissent les élaborations qui leur donnent leurs caractères propres. L'homme peut expérimenter sur lui-même et analyser ses sensations. Quant il s'agit des animaux, surtout des êtres inférieurs, nous ne pouvons connaître ces sensations que lorsqu'elles sont assez intenses pour provoquer une réaction extérieure; mais en tout cas leur nature exacte nous échappe. Il n'est donc pas étonnant que les notions que nous possédons sur les sens des animaux inférieurs, des invertébrés, se bornent à des données encore bien incertaines. Ces données ne sont trop souvent basées que sur la comparaison de la structure de certains organes avec celle des organes des sens de l'homme et des vertébrés supérieurs; de l'analogie de structure nous concluons à l'analogie de fonction, et celle-ci ne peut être qu'exceptionnellement déterminée par la méthode expérimentale. Un certain nombre de recherches importantes, tant au point de vue anatomique qu'au point de vue physiologique, ont cependant été faites depuis quelques années sur les appareils sensitifs des inver-

tébrés; résumer aussi fidèlement que possible les travaux publiés dans les nombreux recueils scientifiques, et présenter avec clarté un exposé de nos connaissances actuelles sur les organes des sens chez les animaux inférieurs, tel est le but que s'est proposé M. Jourdan. Par ses recherches personnelles sur l'histologie des Zoanthaires, des Echinodermes et des Annelides, le jeune et savant professeur de Marseille était mieux que personne préparé à ce genre de travail; aussi son ouvrage n'est-il pas une simple compilation bien faite : à côté de faits nouveaux, on y trouve une critique judicieuse des observations des autres auteurs. Le cachet d'originalité du livre de M. Jourdan fait que ce petit volume sera lu avec profit non seulement par toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire naturelle, mais encore par les biologistes de profession, qui y trouveront de nombreux et intéressants documents.

Après avoir exposé sommairement la constitution générale des êtres organisés, établi ce qu'il faut entendre par appareil, par organe, par fonction, et défini les différents organes des sens d'après les sensations que nous percevons nous-mêmes, M. Jourdan montre que ces sens n'ont pas la même importance relative chez tous les animaux et que la nature du milieu ambiant exerce une influence évidente sur la prépondérance qu'un organe des sens peut prendre sur un autre. On est en droit de supposer que l'organe du goût en particulier doit prendre chez les animaux aquatiques une importance beaucoup plus grande que celle qu'il a chez nous; il ne présiderait plus seulement au choix des aliments, mais serait d'une application plus générale, pouvant rendre sensibles à l'animal des modifications de milieu qui échappent à nos organes des sens. L'expérience prouve aussi qu'il doit exister chez certains animaux des sens spéciaux, dont les analogues manquent chez nous, et en rapport avec les conditions d'existence de ces êtres.

M. Jourdan passe ensuite successivement en revue la constitution des organes du toucher, du goût, de l'odorat, de l'ouïe et de la vue chez les Protozoaires, les Coelentérés, les Echinodermes, les Vers, les Mollusques et les Arthropodes. Pour chacun de ces sens il indique les modifications anatomiques et physiologiques des organes homologues, suivant le genre de vie des divers animaux; il insiste sur les observations et les expériences qui permettent de classer physiologiquement ces organes et il se montre très réservé lorsqu'il s'agit d'assigner un rôle déterminé à ceux de ces organes dont le mécanisme n'a pu être encore étudié expérimentalement.

Félix HENNEGUY.

4° Sciences médicales.

Nélaton (Ch.). — Contribution à l'étude du pied-bot invétéré. *Arch. génér. de méd.*, avril 1890, p. 383.

M. Nélaton conclut, de constatations faites au cours d'opérations et d'examen d'une série de pièces anatomiques, qu'il existe deux ordres de déformations dans le pied-bot invétéré.

Les unes, *consécutives à l'équinisme*, portent essentiellement sur l'astragale qui, comprimée en arrière, entre le tibia et le calcaneum, s'atrophie dans sa partie postérieure, réduite à une lame ossieuse de 2 à 3 millim., tandis que sa partie antérieure se développe d'une manière exagérée; de là, une elongation, un élargissement, une incurvation du col en dedans, une augmentation du diamètre transversal de la tête, la formation sur la facette articulaire externe d'une sorte de plateau large et épais, véritable cale en avant de la malléole péronière.

Les autres, *consécutives au varus*, consistent en une hypertrophie de la tête et du col de l'astragale en dedans desquels le scaphoïde est luxé, une subluxation ou

une luxation du cuboïde sur la face interne du calcaneum, une hypertrophie de la grande apophyse du calcaneum.

Lorsque ces déformations existent, il faut, pour réduire, faire sauter la cale de la facette externe et extirper la tête de l'astragale, puis réséquer un centimètre et demi de la grande apophyse du calcaneum.

Dr HARTMANN.

Berger (P.). — Considération sur l'origine, le mode de développement et le traitement de certaines encéphalocèles. *Rev. de chir. Paris*, avril, 1890, t. X, p. 269.

Deux examens histologiques d'encéphalocèles opérées l'une par M. Périet, l'autre par M. Berger ont montré à M. Suchard une structure complexe, des caractères mixtes de la structure du cerveau et de celle du cerveau. Il s'agissait de produits néoplasiques véritables auxquels on pourrait donner le nom d'*encéphalomes*. De cette structure complexe on peut conclure qu'il s'agit d'un vice dans la formation de la vésicule encéphalique primitive, d'une tumeur développée dans les premiers temps de la vie embryonnaire et s'opposant ultérieurement au rapprochement des lames, qui constituent le crâne membraneux. Il y a ectopie et non hernie. Les signes, donnés par les auteurs pour différencier l'encéphalocèle, sont purement théoriques.

On doit extirper les tumeurs volumineuses, tendues, dont les enveloppes amincies menacent de se rompre ainsi que celles qui sont le siège d'une augmentation de volume manifeste, pourvu qu'il n'existe aucune contre-indication tirée de l'état général ou de complications, telles qu'hydrocéphalie spina bifida étendue, éventration ombilicale, etc.

Dr HARTMANN.

Boschetti (F.). — Sulle principali cause di fusione della tubercolosa. *Giornale di Veterinaria Militare* nos 10, 11, 12 (1889).

L'auteur admet que la diffusion de la tuberculose se produit presque essentiellement 1° par l'alimentation de produits tuberculeux, chair, lait, beurre, et 2° par les crachats des malades. Aussi est-il persuadé que des mesures prophylactiques sévères pourraient enrayer le mal.

Il demande donc pour son pays la constitution d'une commission permanente contre la tuberculose et surtout la création d'un service vétérinaire complet, chargé de surveiller les animaux amenés dans les abattoirs et dont les agents auraient l'indépendance nécessaire vis-à-vis des autorités locales. Mais cette surveillance ne peut s'exercer que s'il existe des abattoirs; or, quoiqu'il paraisse en coûter à M. Boschetti, il avoue que les juries municipales se montrent très réfractaires à toutes ces dépenses d'hygiène. Quant à la diffusion du bacille par les crachats, elle serait diminuée sinon supprimée par des règlements administratifs défendant de cracher dans les lieux publics, les églises, les écoles, les casernes, etc. Les rues mêmes devraient être arrosées avec des liquides antiseptiques. En outre on interdirait l'entrée de l'école et de la caserne à tout sujet suspect de tuberculose. Toutes ces mesures proposées s'appuient évidemment sur ce que nous savons aujourd'hui du mode de propagation de la tuberculose; malheureusement elles sont loin d'être d'une efficacité absolue; les discussions récentes de l'Académie de Médecine ont montré les difficultés qui surgissent lorsqu'il s'agit de les appliquer.

L. O.

Roux (Dr). — Formulaire aide-mémoire de la Faculté de Médecine et des Médecins des Hôpitaux de Paris. 1 vol. in-18 de 320 pages. Georges Steinheil, Editeur, Paris, 1890.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 19-mai 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Stieltjes : Sur la valeur asymptotique des polynômes de Legendre. — M. Hatt indique un procédé de détermination des points, à partir de mesures angulaires, où le dessin graphique vient au secours du calcul. — On se sert généralement pour l'interpolation dans les recherches météorologiques de la formule de Bessel, qui nécessite de longs calculs trigonométriques M. Marc Dechevrens a trouvé qu'on peut éviter ces calculs par l'emploi de facteurs convenablement choisis, pour lesquels il a construit des tables. — MM. G. Rayet et Courty : Observations de la comète Brooks (21 mars 1890) faites au grand équatorial de l'Observatoire de Bordeaux. Les auteurs ont obtenu des photographies de la comète.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — Les sels de sesquioxyde de chrome peuvent affecter à l'état dissous deux états isomériques distincts, connus sous le nom de sels violets et sels verts, ces deux catégories de sels correspondant à deux états isomériques du sesquioxyde de chrome. M. A. Recoura a vu que le bromure correspondant au sesquioxyde des sels violets présente lui-même deux états isomériques distincts, caractérisés par leur couleur et par leur chaleur de combinaison avec la soude ; le sel vert, stable à l'état sec, passe spontanément avec dégagement de chaleur à l'état de sel violet dans les solutions étendues. — M. G. Rousseau signale l'existence d'un hydrate d'oxychlorure ferrique cristallisé, et sa transformation en une variété dimorphe de la *gérthite*. — En traitant à chaud le chromate de plomb par des proportions variables d'azotates de potassium, de sodium et de lithium, MM. A. Lachaud et C. Lepierre ont obtenu une série de chromates doubles qu'ils décrivent. — En faisant agir l'acide chlorhydrique sous pression, MM. P. Hautefeuille et A. Perrey ont pu à une température inférieure à celle du rouge, obtenir la cristallisation de l'alumine, ainsi que celle de la zirconite et de l'acide titanique.

3^o SCIENCES NATURELLES. — Poursuivant ses recherches sur l'importance de l'espèce de levure au point de vue du bouquet des vins, M. A. Rommier a fait fermenter de l'eau sucrée, additionnée des sels minéraux nécessaires, par des levures provenant de quatre vins différents : les alcools provenant de ces fermentations, distillés et ramenés à un même titre alcoolique, ont présenté des saveurs et des parfums distincts. — M. Alcide Treille a observé la fièvre intermittente pendant vingt ans en Algérie ; il a remarqué, quel que soit le type affecté d'abord par la fièvre, que la rechute d'un accès coupé par la quinine se produit toujours le septième jour. Il en résulte que pour obtenir une guérison assurée, il faut administrer la quinine tous les six jours à partir du premier accès coupé. — M. Daubrée a continué ses recherches sur les déformations des sphéroïdes, en vue d'expliquer les phénomènes géologiques. Il a étudié cette fois l'influence des pressions normales à la surface, soit en faisant le vide à l'intérieur d'un ballon de caoutchouc revêtu d'une couche plus ou moins plastique, soit en soumettant des sphères métalliques creuses à des pressions de plusieurs atmosphères dans un cylindre d'acier rempli d'eau ; il décrit les diverses déformations qu'il a vu ainsi se produire.

Séance du 27 mai 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. H. Parenty présente une méthode pour la résolution automatique et l'intégration des équations en mécanique. — M. Appell

expose quelques considérations mathématiques sur la propagation de la chaleur. — M. Folie : sur la nutation de l'axe du monde.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. A. Cornu lit une notice sur les travaux de M. Louis Soret (V. plus loin, page 352). — M. F. Beaulard étudie la double réfraction elliptique du quartz pour les incidences de plus de 20° sur l'axe optique du quartz taillé normalement à cette direction. Il a commencé une série d'expériences sur le quartz comprimé. — M. Janssen a fait un voyage dans le sud de l'Algérie pour étudier dans ces régions très sèches l'action de l'atmosphère terrestre sur les rayons solaires. Il en a rapporté d'importants documents photospectroscopiques. Il a photographié aussi des phénomènes de mirage pour les analyser d'une façon précise. — M. H. Faye s'appuyant sur les nombreuses observations recueillies depuis peu de temps dans les stations météorologiques de montagne, montre que la condition première des cyclones et des anticyclones ne peut pas être la température des couches d'air dans ces météores. — M. C. Decharme : Si dans la méthode d'aimantation dite de la touche séparée au lieu de faire agir les pôles de noms contraires des aimants excitateurs, on met en regard les pôles de même nom (pôle nord, par exemple) et qu'on fasse d'ailleurs comme à l'ordinaire glisser les aimants du milieu vers les extrémités de la pièce à aimanter, on obtient un pôle sud à chaque extrémité et un pôle nord au milieu. L'auteur indique en outre plusieurs variations de cette expérience. — M. Daniel Berthelot a étudié les conductibilités électriques des combinaisons de l'ammoniaque et de l'aniline avec l'acide benzoïque et les trois acides oxybenzoïques. Les combinaisons de ces acides avec la soude présentent une conductibilité inférieure à la conductibilité moyenne des composants. Ici au contraire, elle est supérieure, sauf pour l'acide salicylique, ce qui paraît tenir à la grande conductibilité relative de cet acide, car les trois oxybenzoates fournissent des valeurs très voisines. — MM. Ph. Barbier et L. Roux continuent leurs recherches sur la dispersion dans les composés organiques. Dans les alcools de la série grasse, le pouvoir dispersif croît avec le poids moléculaire ; la variation peut être représentée par une équation hyperbolique. — M. Ed. Grimaux identifie l'*homofluorescéine* de M. Schwartz (C²³H¹⁸O⁸) et l'*orcine-urine* de M. Nencki (C²²H¹⁶O⁷) ; c'est cette dernière formule qui doit être considérée comme exacte.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Paul Pelseener décrit les organes génitaux de deux nouveaux Pélécytopes (Gastéropodes) hermaphrodites. — M. H. Fol expose les conditions de vision où se trouve placée le zoologiste qui explore en scaphandre le fond de la mer. — Pendant l'exposition de 1889, M. E. Perrier a pu faire vivre des huîtres plusieurs semaines dans une eau de mer artificielle. — M. Em. Olivier signale des espèces de Lamproyrides qui sont communes à Bornéo et à l'Asie Orientale ; ce fait vient à l'appui de l'opinion de M. E. Blanchard qui conclut de l'examen de la faune et de la flore à la séparation récente de ces deux contrées. — M. Aimé Girard dans des expériences comparatives a vu que le traitement par les sels de cuivre est avantageux contre la maladie des pommes de terre. — M. G. Vasseur a découvert une flore tritonienne aux environs des Martigues (Bouches-du-Rhône). — M. Marion donne une description sommaire de cette flore. — M. Stan. Meunier a examiné au point de vue chimique deux échantillons d'eaux thermales envoyées de Malaisie ; l'une est riche en matières organiques, l'autre contiendrait de l'azote libre. Les concrétions de cette dernière source

contiennent de l'étain. — **M. Bourgeat** a reconnu que les concrétions ferrugineuses de divers terrains jurassiques (minerais oolithiques) ont pour point de départ une trame organique provenant de Bryozoaires ou de Polypiers. **L. LAPIQUE.**

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 3 juin 1890

M. Grancher fait une communication sur la prophylaxie des maladies contagieuses dans les familles, et à l'hôpital. Deux moyens : isolement, antiseptie. L'isolement, tel qu'il est pratiqué, par exemple, aux Enfants-Malades, ne suffit pas pour protéger contre la contagion intérieure de la rougeole, de la diphtérie. Il faudrait de véritables lazarets dans Paris et des hôpitaux d'évacuation, spéciaux, suburbains. En attendant, l'antiseptie peut rendre de grands services : en l'appliquant rigoureusement, en pratiquant, par elle, une sorte d'isolement des malades soupçonnés de maladies contagieuses, il a vu tomber, dans son service, les contagions intérieures de rougeole de 37 cas en 1883 à 25 en 1889. D'après ses observations, il semble que la rougeole se transmet surtout par les solides (mains de l'infirmière, couvertures, etc.) plus que par l'air. La diphtérie n'a donné qu'un cas de contagion intérieure en 1889, alors que précédemment il y avait 10 et 15 morts par an. Les mesures prises ont consisté à éviter les contacts suspects, à désinfecter les objets ayant subi le contact. — **M. Daremberg** fait une communication sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par l'air et le repos. La pureté est la seule qualité de l'air auquel le malade sera exposé, étant couché. Quand il est convalescent, il doit faire la cure d'endurcissement par la gymnastique respiratoire et les voies de la peau, en évitant toute fatigue physique ou intellectuelle. Le traitement rationnel, progressif, n'est guère applicable que dans des sanatoria. Sur les bords de la Méditerranée, vents, soleil, changements brusques de température sont les écueils au traitement, aussi emploie-t-il pour la cure à l'air, des kiosques abrités et munis de rideaux. Le traitement à l'air, qui n'exclut pas d'autre médication, a déjà donné d'excellents résultats chez les phthisiques pris au début. — **M. Dujardin-Beaumetz** expose à ce propos l'inefficacité et les dangers du traitement de la phthisie par l'air chaud, suivant la méthode de Weigert. L'air, chauffé à 180°, n'a plus que 50° au fond de la bouche, il n'a donc plus d'action anti-bacillaire. Par contre, ses inhalations bâteaient la terminaison fatale, (expériences et observations cliniques de Mosso et Rondelli, Trudeau, Korkounoff.). — **M. Verneuil** oppose de bons résultats produits dans les tuberculoses locales, et d'après **M. Clado**, dans la phthisie laryngée. — **M. Routier** présente un malade âgé de 36 ans chez lequel il fit la trépanation pour une fracture du crâne ayant produit une déchirure de l'artère méningée moyenne, hémorragie, compression cérébrale par le caillot ayant amené coma, paralysie du membre inférieur droit, contracture du membre supérieur droit, obtusion de la sensibilité. Disparition de ces accidents après l'opération, mais aphasie due à la compression faite par le pansement. Enlèvement du pansement, retour de la parole, guérison.

M. Cadet de Gassicourt est élu membre titulaire. **D^r E. DE LAVARENNE.**

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 24 mai 1890.

M. Féré a observé de nombreux cas où des épilepsies, reconnaissant pour causes des lésions ou des tumeurs cérébrales, ont été favorablement influencées ou même guéries par le bromure de potassium. — **M. Féré** étudie les contractions musculaires chez les hystériques au moyen de l'ergographie de Mosso, a trouvé que la courbe fournie présente d'emblée la forme d'un esca-

lier : cette forme chez les gens dont le système nerveux est sain, est caractéristique de la fatigue. — **M. Retterer** communique le résultat de ses recherches embryologiques sur la formation et la naissance de l'éminence cloacale. — **M. Laguesse** a trouvé dans l'épithélium de la muqueuse intestinale d'un poisson un réseau vasculaire bien caractérisé. — Les recherches faites jusqu'ici sur la pénétration de la lumière dans l'eau donnent seulement la limite de cette pénétration. **M. Regnard** a pu établir la courbe de l'absorption lumineuse, en notant les déviations galvanométriques fournies par une pile au sélénium immergée à des profondeurs variables. Le premier mètre absorbe la moitié de la lumière extérieure. — Les expériences de **MM. Charrin** et **Gamaleia** prouvent qu'il n'y a aucun rapport entre l'immunité d'un animal vacciné contre un virus actif et la résistance de cet animal à l'action toxique des produits solubles sécrétés par ce virus. — **MM. Achard** et **Lannelongue** rapportent deux cas d'ostéomyélite à streptocoques observés chez les nouveau-nés dont les mères avaient eu des accidents puerpéraux. — **M. Charpentier** repousse l'interprétation donnée par **M. Féré** des variations de la sensation des poids sous l'influence de mouvements associés. — **M. F. S. de Mendoza** : Contribution à l'étude des fausses perceptions sensorielles secondaires physiologiques et particulièrement des pseudo-sensations de couleurs associées aux perceptions objectives des sons.

Séance du 31 mai 1890

M. Ch. Livon a repris la question de l'action sur la glotte de récurrents soumis à des excitations électriques variables : les excitations à interruptions peu fréquentes produisent seules la dilatation, mais avec une série de contractions rythmiques : les excitations à interruptions rapides produisent l'occlusion. — On sait que certaines substances chimiques, injectées aux animaux, favorisent le développement des divers microbes pathogènes. **M. Roger** en a lui-même signalé plusieurs. Aujourd'hui, il indique que diverses zymases (papaine), ou substances voisines des zymases (extrait glycérique des cultures du *B. prodigiosus*), peuvent rendre leur activité à des cultures virulentes épuisées et semblant mortes. — **M. A. Charpentier** : un champ blanc, regardé au travers d'un disque rotatif fenêtré, produisant des interruptions de 30 millièmes de seconde, paraît coloré en violet ; il y aurait là vision entoptique du pourpre rétinien. — **M. G. Pouchet** a vu le parasite énorme qu'il a décrit chez certains Copépodes, sortir de son hôte sous forme d'un Flagellé analogue aux Périodinien. — **M. Pilliet** a trouvé chez l'homme, dans des muscles atteints de dégénérescence, des corps neuro-musculaires à enveloppes concentriques comme dans les corpuscules de Paccini. — **MM. P. Langlois** et **Ch. Richet** présentent un chien qui, après avoir subi une ablation étendue de la zone motrice de l'écorce cérébrale droite, a été atteint de troubles trophiques bilatéraux. — **MM. J. Héricourt** et **Ch. Richet** présentent six lapins inoculés pareillement de la tuberculose ; deux avaient reçu préalablement des infusions intra-péritonéales de sang de chien ; ils sont incomparablement mieux portants que les autres. — **M. Paul Zachariades**, en traitant par la potasse des coupes d'os décalcifiées, a reconnu que les tractus, pris par Ebner pour des fibrilles conjonctives, sont en réalité les prolongements ramifiés des cellules osseuses. — **M. L. Malassez** présente un appareil de contention pour les chiens, qui repose sur le même principe que celui qu'il a présenté pour les lapins et les cobayes ; la fixation est assurée par un crochet latéral embrassant la nuque. — **M. E. Doumer** démontre que le double pouvoir osmotique n'est pas spécial aux membranes animales ; il appartient à toutes les membranes dont les deux surfaces ne sont pas pareilles.

Séance du 7 juin 1890.

M. Ch. Richet a cherché à appliquer à l'athérapié que les propriétés vaccinales du sang de chien vis-à-vis

bacille de la tuberculose; il a donné ce sang, sous forme de confluents gélatinés, à deux malades dont l'un a été sensiblement amélioré. Les expériences continuent. — **M. Ch. Richet** signale que le sang de chien présente pour les lapins des toxicités très variables selon les conditions du sujet qui a fourni le sang. Dans un cas, le sang d'un chien qui avait jeûné dix jours s'est montré extraordinairement toxique. — **M. Dyerim** rapporte l'observation de deux cas des maladies de Friedreich, chez deux enfants frère et sœur; contrairement à la règle, les deux malades présentent, en même temps qu'une atrophie musculaire très marquée, des troubles profonds de la sensibilité. Ces troubles sont vraisemblablement sous la dépendance de névrites périphériques. — **M. Charrin**, après avoir inoculé des doses égales de bacilles pyocyaniques à des lapins vaccinés et non vaccinés, a déterminé, 40 minutes après l'injection, la proportion des bacilles dans la sérosité qui envahit les tissus autour du point piqué. La phagocytose ne peut vraisemblablement jouer un rôle important en un temps aussi court; pourtant les bacilles sont infiniment moins nombreux chez les animaux vaccinés que chez les autres. — **M. Laulanié** a constaté que chez les animaux asphyxiés très lentement, l'acide carbonique empêche les convulsions; si on l'absorbe par la potasse à mesure de sa formation, les convulsions apparaissent, produites par l'anoxémie. — **M. Netter** rapporte deux cas de fracture des côtes ayant suppuré, bien qu'il n'y eut pas de plaie interne ni externe, mais seulement des inflammations dans le voisinage. — **MM. Mairet et Boss**, étudiant l'action physiologique de la chloralamide, ont constaté que ce médicament possède sur la circulation l'action déprimante du chloral. — **M. Pisan** expose ses recherches sur le développement du système nerveux des Ascidies. — **M. Thélohan** décrit deux espèces nouvelles de Coccidies, parasites l'une du foie de l'épinoche, l'autre du testicule de la sardine.

M. Laveran est élu membre de la Société.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 6 juin 1890

M. A. Chassy fait une communication sur un nouveau transport électrique des sels dissous. On sait que la concentration d'un électrolyte dissous autour des électrodes varie peu à peu pendant l'électrolyse, c'est le phénomène connu sous le nom de transport des ions. Si, à la place d'un sel unique on électrolyse un mélange de deux sels, tels que l'un d'eux ne soit pas décomposé, **M. Chassy** a découvert que la teneur du liquide en sel non électrolyté varie aux environs des deux électrodes; cette variation peut être considérée comme le résultat d'un transport du sel lui-même à travers le liquide. Ce transport se fait toujours dans le sens du courant et obéit à des lois particulièrement simples. Reprenant ensuite l'étude du transport des ions dans le cas d'un mélange de sels, l'auteur montre qu'il peut être considéré comme la combinaison d'un transport de chacun des ions séparés joint à un transport du sel lui-même. — **M. Ch. Ed. Guillaume** présente un appareil destiné au laboratoire de **M. Bouty** et servant à la détermination du coefficient de pression intérieure β , d'un thermomètre, c'est-à-dire de la quantité qui, multipliée par la pression, exprime la variation du volume du thermomètre; la pression sera évaluée en millimètres de mercure, et l'unité de variation sera le degré; connaissant β , on peut calculer le coefficient β , de pression intérieure exprimant la variation totale produite sur le réservoir et le mercure qu'il contient. L'appareil se compose d'un tube en verre destiné à recevoir le thermomètre et que l'on remplit de glycérine, il est en communication avec un manomètre à une branche, relié à un grand réservoir où l'on peut faire le vide. On observe ainsi le thermomètre sous des pressions variant de 0 à 1 atmosphère. **M. Guillaume**

montre comment il convient dans ces expériences d'établir une marche de températures afin de rendre les observations suffisamment indépendantes et surtout afin d'éliminer l'influence relativement considérable de la pression capillaire du ménisque dans la tige thermométrique. — **M. Chaperon** présente des radiophones où la substance sensible est une plaque de sulfure d'argent. Ce corps moins résistant que le selenium possède un pouvoir absorbant beaucoup plus considérable, comparable à celui du noir de fumée, il peut servir à constituer d'excellents récepteurs radiophoniques, dont on ferait un usage avantageux pour l'étude des radiations.

Lucien POINCARÉ.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séances du 8 et du 13 mai 1890.

M. le Président annonce que le prix Nicolas Leblanc sera décerné à la fin de l'année 1890 à l'un des mémoires présentés à la Société chimique. Il indique les conditions de ce concours. — **M. Bechamp** communique à la Société une note sur la fermentation de l'acide mucique comparée à celle du sucre de lait. — **M. Hauser** signale le déplacement de l'acide sulfurique de divers sulfates par l'acide p. nitrotoluène-sulfonique. **MM. Friedel, A. et Ch. Combes** ont obtenu dans l'électrolyse de l'acide tartrique du glyoxal et de l'acide glyoxalcarbonique. — **M. Léger** présente un régulateur simultané de gaz et d'eau pour les bains-marie et appareils analogues. — **M. Friedel** a appliqué l'hypothèse Lebel et van t'Hoff à la formule de l'acide camphorique, et explique ainsi l'existence des diverses variétés de cet acide. — **M. Guye** montre que les variations de signe du pouvoir rotatoire d'un grand nombre d'éthers valériques et amyliques est en rapport avec la loi qu'il a récemment formulée. **M. Gorgeu** a analysé les différents bioxydes de manganèse qu'il a préparés et signale quelques différences de composition et de propriétés. **M. Grimaux** montre l'identité de l'homoluquescéine et de l'orcine-aurine. — **MM. Ch. et G. Friedel** ont reproduit l'anorthite par l'action de l'eau de chaux sur le mica. **M. Hanriot**.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 22 mai 1890.

1^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. George J. Burch** indique une méthode pour déterminer la valeur des variations rapides des différences de potentiel par l'électromètre capillaire.

2^o SCIENCES NATURELLES. — Le professeur **Burdon Sanderson** s'est servi de la photographie pour enregistrer à l'aide de l'électromètre capillaire les phénomènes électriques qui accompagnent l'excitation de la feuille de *Dionaea*; d'autres physiologistes se sont servis de cette méthode pour déterminer les moments où finissent et commencent les changements électriques qui se produisent dans les tissus vivants. L'auteur, entreprenant ces expériences, a découvert une méthode qui permet de déterminer, à l'aide d'une courbe photographique, les différences de potentiel qui correspondent à l'une quelconque des parties de la courbe. — **M. G. Klein** communique le résultat de ses recherches sur l'étiologie de la diphtérie (V. ci-dessus, page 238). — **M. Sydney Martin** communique le résultat de ses recherches sur les substances chimiques produites par le développement du *Bacillus Anthracis* et leur action physiologique. Les bacilles ont été cultivés dans une solution d'albumine pure (faite avec les matières protéiques du sérum) et de sels minéraux, de même composition que ceux du sérum. La culture a été continuée pendant 10 à 15 jours et on a débarrassé le liquide des micro-organismes en le filtrant au filtre Chamberland. Le liquide filtré contient les substances qui ont été produites par le développement des bactéries; c'est-à-dire 1^o de la protoalbumose et de la deutéro-albumose avec des traces de peptone (ces corps présentent les mêmes réactions chimiques que les corps analogues qui se forment dans

la digestion peptique); 2° un alcaloïde; 3° de petites quantités de leucine et de tyrosine. La proto-albumose et la deutéro-albumose charbonneuses sont caractérisées par une forte alcalinité, alcalinité que ne fait disparaître ni l'alcool absolu, ni la benzine, le chloroforme, l'éther, ni la dialyse prolongée. L'alcaloïde est soluble dans l'alcool absolu, l'alcool amylique et l'eau; il est insoluble dans la benzine, le chloroforme et l'éther. Il est fortement alcalin; c'est une base puissante. M. S. Martin a étudié l'action physiologique de ces diverses substances. Le mélange de proto et de deutéro-albumose charbonneuses est toxique pour une souris de 22 grammes à la dose de 0^{gr},3 (administrés en injections sous-cutanées). L'alcaloïde produit des accidents et détermine des lésions analogues, mais il agit beaucoup plus vite et avec beaucoup plus d'intensité; la dose toxique pour une souris de 22 grammes est de 0,1 à 0,3, la mort survient en 2 à 3 heures. — M. Arthur Willey communique ses recherches sur le développement du vestibule branchial chez l'*Amphioxus*. Le mode de développement du vestibule branchial de l'*Amphioxus* qui a été accepté jusqu'ici a été décrit par Kowalewsky (*Archiv. für Mikrosk. Anat.* vol. 13, 1877), et plus complètement par Ralph (*Morph. Jahrbuch*, vol. 2, 1876). M. Willey a passé plusieurs mois en Sicile à recueillir des embryons et des larves d'*Amphioxus*, et à faire des observations sur leur développement. L'examen des échantillons qu'il a recueillis montre que la théorie de Kowalewsky est fondée sur des observations erronées. Voici comment les choses se passent en réalité: il se forme une étroite rainure, qui se ferme, puis s'enfonce dans le corps de l'*Amphioxus*. Ce mode de développement diffère à beaucoup d'égards de celui qui a été décrit par Kowalewsky bien que le résultat final soit le même. — M. E. H. Hankin présente une note sur une globuline bactéricide. Les expériences semblent conduire aux conclusions suivantes: 1° la globuline cellulaire β , d'Halliburton, possède un pouvoir bactéricide; 2° ce pouvoir semble se distinguer du ferment fibrinogène; 3° ce pouvoir bactéricide est de même nature que celui du sérum du sang; 4° ce pouvoir du sérum est probablement dû à la même substance ou à une substance voisine; 5° comme il est possible d'extraire des cellules qui sont ou qui peuvent devenir phagocytes une substance bactéricide, nous pouvons supposer que les phagocytes ne détruisent pas seulement les bactéries en les dévorant, mais aussi en se brisant et en mettant en liberté leur contenu. Richard A. Gregory.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 16 mai 1890.

Lord Rayleigh présente et décrit un appareil composé d'engrenages de Huyghens destiné à faire comprendre les phénomènes d'induction électrique. L'engrenage consiste en deux poulies folles montées sur le même axe; elles portent une chaîne sans fin, sur le milieu de laquelle reposent des poulies pesantes dont les plans sont parallèles à l'axe de rotation des poulies supérieures. Si l'une de ces dernières poulies est animée d'un mouvement de rotation, l'autre se met à tourner dans un sens opposé, et ce mouvement dure jusqu'au moment où la première a atteint un régime constant; tant que l'on maintient cette vitesse constante, la seconde poulie demeure immobile, un des poids étant soulevé et l'autre abaissé; mais si l'on diminue la vitesse, on voit alors la seconde poulie se mettre à tourner dans le même sens que la première. Ces phénomènes sont, on peut le remarquer, entièrement analogues aux phénomènes d'induction électrique produits par un courant qui commence ou qui finit dans un circuit voisin. Lord Rayleigh insiste sur cette analogie qui n'est pas seulement apparente; si l'on traite mathématiquement le problème de mécanique correspondant à cet engrenage, les variations d'énergie cinétique sont représentées par les mêmes équations que celles don-

nées par Maxwell pour l'induction électrique. — Le D^r S. F. Thompson fait une communication sur les recherches de Kœnig relatives aux fondements physiques de la musique; cette communication est accompagnée de plusieurs expériences faites par M. Kœnig. Pour bien comprendre les remarquables recherches de Kœnig, et apprécier l'extrême habileté avec laquelle il a réalisé des appareils de démonstration et de recherches, il faut diviser le sujet en deux: M. Thompson s'occupera d'abord de la question des battements, ensuite de la question du timbre. Sur la question des battements de longues controverses ont eu lieu entre les personnes les plus compétentes, pour savoir s'ils forment ou non des sons indépendants quand ils sont suffisamment rapides. M. Kœnig est parvenu à trancher le différend dans le sens de l'affirmative en construisant des diapasons donnant des sons presque rigoureusement purs. On peut, si on le désire, changer à volonté la tonalité des diapasons pendant qu'ils vibrent; on se sert à cet effet de diapasons creux que l'on peut remplir plus ou moins de mercure. On arrive aux conclusions suivantes: Deux sons simples n et n' battent lorsque n' n'est pas divisible par n . Le nombre des battements est égale aux deux restes de la division de n' par n , c'est-à-dire aux deux nombres m et $m' = n - m$ qu'on trouve en faisant $n' = hn + m = (h + 1)n - m'$. Tout se passe comme si les battements m et m' étaient dus aux deux harmoniques h et $h + 1$ du son grave n entre lesquels tombe le son aigu n' . Quand le

reste m est beaucoup plus petit que $\frac{n}{2}$ on n'entend que les battements inférieurs m . Quand il est plus grand, on n'entend que les battements supérieurs m' . Les battements m comme les battements m' s'échangent en sons continus dès que leur nombre dépasse une certaine limite. Quand les deux sons de battements m et m' approchent de l'unisson ou de l'intervalle de l'octave, ils battent comme feraient deux sons primaires de même hauteur; ce sont les battements secondaires. La perceptibilité des battements ne dépend que de leur fréquence et de l'intensité des sons primaires, elle est indépendante de l'intervalle musical. Les recherches de M. Kœnig sur le timbre ont plus particulièrement porté sur la question de l'influence de la différence de phases sur le timbre des sons musicaux. Helmholtz a nié cette influence. M. Kœnig établit au contraire qu'elle peut être assez considérable. Il a, à cet effet, construit un appareil déjà bien connu qu'il nomme sirène à ondes, formé par des porte-vent devant lesquels tourne un cylindre en laiton découpé suivant des séries de sinusoides représentant des sons harmoniques et avec des différences de phases connues; il parvient ainsi à mettre en évidence qu'il existe une différence sensible entre les timbres produits par la même courbe dont le sommet s'éloigne du milieu de la courbe soit d'un côté soit de l'autre. Il montre en outre que cette différence est très sensible en employant une disposition qui permet de passer subitement du timbre donné par la courbe inclinée d'un côté au timbre de la même courbe inclinée du côté opposé, sans rien changer d'autre aux conditions de l'expérience. — Lord Rayleigh, M. Branquet et M. Blaikley font à la suite de cette communication diverses observations de détail.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 13 mai 1890.

MM. E. Thorpe et Barlux North: Acide-diéthylphosphoreux. Ce corps est obtenu en ajoutant goutte à goutte de l'alcool à de l'acide phosphoreux refroidi par un mélange de glace et de sel. — MM. Henry Armstrong et P. Wynne. 1° *Naphthalines trichlorées* dans le même noyau. 2° Les dix *dichloronaphthalènes isomères* et les *acides sulfonés dérivés*. Les auteurs décrivent longuement les propriétés et la préparation de ces différents composés et donnent leur constitution et les constantes physiques qui permettent leur identification.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 30 mai 1890.

M. **Leman** présente un appareil servant à la détermination exacte du nombre de vibrations d'un diapason normal de 435 vibrations. Un pendule qui fait exactement une oscillation par seconde ferme une fois par seconde un courant et met en oscillation un petit pendule de quatre oscillations par seconde. Celui-ci de son côté règle les contacts de trois diapasons électro-magnétiques de 12 vibrations, de 72 vibrations ($= 6 \times 12$), et de 432 ($= 6 \times 72$) vibrations, intercalés l'un après l'autre dans le même courant. La tranquillité et la pureté du ton des diapasons garantissent la parfaite harmonie des oscillations, et par suite le nombre voulu de vibrations pourvu que la longueur du premier pendule soit bien réglée. Le diapason qu'il s'agit d'examiner doit faire avec le dernier diapason trois battements par seconde qui sont faciles à observer. Pour examiner un diapason de 500 vibrations par seconde on peut intercaler comme dernier diapason dans le courant un instrument de 504 ($= 7 \times 72$) vibrations, qui donnera avec le diapason à examiner 4 battements par seconde.

— M. **Reichel** fait quelques expériences avec un appareil de cours qu'il a construit pour démontrer le parallélogramme de forces. L'appareil, dont il est difficile de donner une idée nette sans dessin, consiste en trois pendules formés par trois boules métalliques suspendues par des fils métalliques et retenues dans les positions de repos par de petits électro-aimants. Le premier et le second de ces pendules oscillent le long des côtés d'un parallélogramme dessiné sur la table, le troisième le long de la diagonale du même parallélogramme. Au centre on suspend un cercle mobile en bois. Si le courant est interrompu, les trois pendules se meuvent simultanément vers ce cercle qui doit rester en repos. — M. **Pringsheim** fait voir quelques plaques photographiques montrant très nettement le phénomène de la solarisation; les images sont devenues positives après une exposition de 30 à 50 minutes.

Dr HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIOLOGIE DE BERLIN

Séance du 9 mai 1890.

M. **H. Lohers** a étudié chez le lapin l'action du bromure d'éthyle sur la respiration et sur la circulation. La respiration devient d'abord rapide et superficielle, puis rapide et profonde, enfin profonde et de plus en plus lente; elle reste beaucoup plus longtemps suffisante que dans la narcotisation par le protoxyde d'azote; mais le bromure d'éthyle exerce plutôt que le protoxyde d'azote une action déprimante sur le cœur. Une diminution de la pression sanguine, accompagnée d'une arythmie du cœur qui va jusqu'à *audelirium cordis*, survient déjà lorsque la respiration fonctionne encore régulièrement. L'auteur conclut que dans la pratique médicale le bromure d'éthyle trouve seulement une application avantageuse pour des opérations de courte durée, comme l'extraction des dents; mais alors même il faut cesser son emploi si pour des motifs quelconques il ne détermine pas immédiatement la narcose. — M. **A. Löwy**: Sur l'excitabilité du centre respiratoire. L'étude de la variabilité de l'excitabilité du centre respiratoire durant les différents états de l'organisme humain n'a pas encore été abordée sérieusement; l'auteur utilisa à cet effet la méthode nouvelle de Cohnstein et Zuntz. Les personnes en observation expirent à travers un gazomètre, on annule leur volume respiratoire et mesure la teneur en acide carbonique. On laisse ensuite inspirer de l'air auquel on ajoute une quantité de plus en plus grande d'acide carbonique, et on observe l'augmentation correspondante de la respiration. Les mêmes expériences sont répétées durant le sommeil normal et durant le sommeil déterminé par le chloral, l'hydrate d'amylène, la chloralamide. Les ré-

sultats furent que les modifications respiratoires déterminées par l'acide carbonique étaient proportionnellement à peu près identiques dans ces différents états; l'excitabilité du centre respiratoire n'est donc pas changée. La morphine au contraire rehausse considérablement l'excitabilité du centre respiratoire. — Le Dr **A. Blaschko** communique ensuite le résultat des recherches instituées dans son laboratoire par M. **J. Löwy** sur l'architecture de l'épiderme; ces recherches sont la confirmation des travaux publiés déjà par Blaschko. Celui-ci a établi que le réseau de Malpighi constitue un réseau extrêmement régulier, M. Löwy a examiné à ce point de vue toute la surface entourée et y a retrouvé partout le même arrangement régulier, il a découvert en outre des dispositions spéciales caractéristiques pour les différentes régions du corps et pour les différentes époques de la vie, ce que l'auteur démontre à l'aide de préparations microscopiques et de photographies. D'après lui les reliefs de la face inférieure de l'épiderme ne correspondent pas aux reliefs de la face supérieure mais ils seraient dans un certain parallélisme avec l'orientation des cheveux (Vogt et Escherich) et du tissu conjonctif du derme (Langer); de sorte que la structure de l'épiderme se trouverait ainsi dans une certaine relation avec la distribution des nerfs et des vaisseaux. — M. **Gad**: On sait qu'entre les cellules épithéliales de la *Shia vascularis* du *dudus cochlearis* se trouvent des capillaires sanguins, l'auteur a observé un fait analogue dans le plancher du quatrième ventricule de la grenouille: des capillaires sanguins qui paraissent complètement dépourvus de tissu conjonctif circulent ici en grand nombre entre les cellules épithéliales de l'ependyme. Jusqu'à présent on n'est pas d'accord sur la signification génétique, morphologique et fonctionnelle à accorder aux épithéliums munis de vaisseaux.

Séance du 23 mai 1890.

M. **F. Falk** expose le cas d'un individu mort subitement et chez lequel l'autopsie ne révéla d'autre lésion qu'une hémorragie pancréatique. Cette hémorragie fut toutefois trop peu considérable pour qu'elle ait amené la mort par anémie; de sorte que l'auteur, à défaut d'autre explication, croit à une action réflexe, rappelant l'expérience de Goltz, qui déterminait l'arrêt du cœur. — J. **F. Heymans**: Sur l'innervation de l'uretère. D'après les recherches d'Engelmann, il est dit généralement que la couche musculaire de l'uretère ne possède pas de fibres nerveuses. L'auteur a repris chez la souris blanche, à l'aide des méthodes à l'or de Ranvier, l'étude de l'innervation de l'uretère et a trouvé également que les cellules ganglionnaires n'existent qu'au voisinage de la vessie, que de petits troncs nerveux accompagnent l'uretère dans toute sa longueur et que des branches nerveuses entourent partout la couche musculaire, se ramifient et se terminent dans cette dernière. On ne peut affirmer, mais non plus nier que chaque fibre musculaire reçoive une fibrille terminale. Quelle qu'intéressante que soient les expériences d'Engelmann, elles ne prouvent toutefois pas que ces fibres nerveuses ne sont pas des fibres nerveuses motrices et quelle que soit l'origine et le mode de propagation de la contraction péristaltique de l'uretère, il paraît à l'auteur qu'on doit admettre que la couche musculaire sur toute sa longueur est innervée directement. — M. **Bruhns** expose ses recherches sur l'adénine et l'hypoxanthine. La combinaison de l'adénine avec l'acide picrique $C^5 H^3 N^3 = C^5 H^2 (NO)^2 OH + H^{20}$ permet de la séparer quantitativement de l'hypoxanthine. L'hypoxanthine donne avec le nitrate d'argent une combinaison de la formule $(C^5 H^2 Az^2 N^3 O)^2 + H^{20}$, qui permet également de la doser. L'adénine et l'hypoxanthine se combinent entre elles et donnent un composé en cristaux microscopiques de la formule $C^5 H^4 N^3 O$, $C^5 H^3 M^3 + 3H^{20}$, qui serait identique avec la sarcosine de Strecker. — MM. **Zuntz** et **S. Rosenberg** présentent des chiens chez lesquels, d'après une variation de la mé-


ithode Valba, ils ont ré-équ un bout d'intestin long d'environ 50 centimètres et dont une extrémité est soudée dans la paroi abdominale de la région lombaire un peu en arrière du rein, et l'autre au milieu de la ligne blanche. Dans leurs recherches actuelles, les auteurs étudient l'absorption des graisses dans ce bout d'intestin. J. F. HEYMANS.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCÉI

Séance du 18 mai 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Bianchi : Sur une nouvelle classe de surfaces qui appartiennent à des systèmes triples orthogonaux. — M. Pannelli : Sur la plus simple transformation birationnelle de l'espace ordinaire en espace linéaire à quatre dimensions.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Tacchini présente une note sur la manière de changer en instruments enregistreurs les trommètres ordinaires destinés à l'étude des mouvements sismiques. L'appareil a été imaginé par M. Aganennone et construit par M. Brassari, mécanicien du Bureau central de Météorologie. Cet appareil permet de substituer à l'observation directe, mais discontinue, un enregistrement continu pendant le jour et la nuit. Une première multiplication des mouvements du trommètre est obtenue à l'aide d'un appareil pendulaire très délicat; et une seconde multiplication est produite par la réflexion d'un rayon lumineux, qui laisse une trace sur du papier sensible, dont est recouvert un tambour en mouvement. De cette manière toutes les oscillations restent enregistrées, même les plus petites qui dans les trommètres ordinaires sont révélées par le microscope. M. Tacchini présente à l'Académie une épreuve photographique obtenue avec l'appareil enregistreur et il fait observer que les oscillations correspondent aux moments où il soufflait un vent très fort, qui certainement faisait osciller la tour de l'Observatoire du collège Romain. L'appareil décrit par M. Tacchini, sera distribué aux Observatoires géodynamiques de premier ordre, pour exécuter des expériences. — M. Ascoli donne la description d'un thermoscope électrique qu'il a fait construire pour l'Ecole des ingénieurs de Rome : l'appareil est formé par une combinaison de Wheatstone, dont trois côtés sont en pakfong, et un côté est en cuivre (A B). L'équilibre du galvanomètre, établi pour une température déterminée, reste rompu par les variations de cette dernière, parce que le rapport des résistances des deux côtés en pakfong (A C, A' C') reste constant, pendant que celui des deux autres côtés (A B, A' B') varie à cause de la différence entre le coefficient du cuivre (0,0037) et celui du pakfong (0,0004). On peut lire la déviation du galvanomètre, qui est sensiblement proportionnelle à la variation de la température, ou rétablir l'équilibre en déplaçant un contact mobile (C). Dans l'appareil, dont M. Ascoli s'est servi, la résistance de chaque fil était de 1 ohm environ; le courant était donné par un élément Meidinger, et le galvanomètre (Thomson) était sensible à des variations



de 0,0001. Cette sensibilité peut être redoublée, en faisant de cuivre, le fil A C opposé à A B. L'appareil de M. Ascoli est différent du *bolomètre* de Langley, dans lequel on réchauffe un seul des fils, pendant que les autres doivent être maintenus à une température constante. — M. Battelli a fait en 1889 des observations sur le magnétisme terrestre en Suisse. Les résultats de ces observations, dont l'auteur présente un résumé, seront publiés en *extenso* dans les *Annales* du Bureau central de météorologie, qui a presque achevé une grande carte magnétique de l'Italie. — M. Vanni décrit un nouveau procédé qui permet de déterminer le foyer des grandes lentilles, et rapporte les formules nécessaires à cette détermination. —

MM. Ciamician et Silber donnent des nouveaux détails sur les expériences qui leur ont permis d'établir l'analogie de l'apiol avec le saphrol et l'eugenol. Ils ont fait d'autres recherches sur l'eugenol et ils se proposent d'en exécuter encore sur l'apiol, se réservant d'en discuter les résultats, pour en déduire la constitution de l'apiol et de ses dérivés. — M. Magnanini a continué ses recherches sur la conductibilité électrique d'une solution d'acide borique, en mettant en présence de cette solution, au lieu de la mannite, un isomère de cette substance, la dulcité. — MM. Zatti et Ferratini entretiennent l'Académie de leurs recherches relatives à l'action de l'iode de méthyle sur l'hydro- α -méthylindol et aux divers composés qu'ils ont pu obtenir. Ernesto Mancini.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 16 mai 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. L. Gegenbauer : Sur un théorème d'arithmétique de M. Ch. Hermite. — M. Otto Stolz : Les maxima et minima des fonctions de plusieurs variables; dans ce mémoire l'auteur généralise la méthode proposée par Schaeffer pour les fonctions de deux variables.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Ernest Lecher : Sur la mesure des constantes diélectriques au moyen des oscillations électriques de M. Hertz. La méthode qui est développée dans cette note a été proposée par M. Lecher dès le 24 avril. Comme on pouvait le prévoir *a priori*, les résultats sont assez complexes, ils ne concordent pas avec les résultats des mesures analogues de G. G. Thomson. Pour les très courtes durées de charge, les valeurs de la constante diélectrique ne sont pas les mêmes que celles que l'on trouve directement par la mesure des capacités. Pour des durées de charge de 5×10^{-4} , 5×10^{-4} et 5×10^{-8} secondes, la constante diélectrique de la gomme prend les valeurs 2,64, 2,81 et 3,04; celle du verre 4,67, 5,34 et 7,31. — M. Alois Smolka étudie la constitution de quelques dérivés des cyanamides. L'auteur les distingue en deux groupes, les véritables composés cyanés qui contiennent le radical cyané auquel s'ajoute de l'hydrogène, de l'eau, de l'acide sulfurique, de l'ammoniaque, et les produits d'addition des composés cyanés qui prennent naissance à partir de ces composés par des réactions d'addition. Dans le premier groupe, il range la cyanamide, la dicyandiamide, l'acide amidodicyanique, et la thiocarbonyncyanamide; dans le second il étudie l'urée, la carbanidine, l'acide thionurique, la digandiamidine, la biguanide, l'ammeline, l'ammelide, et la melamine; il attribue à ces composés des formules de constitution, qu'il justifie par la façon dont on peut arriver à en faire la synthèse. — M. Léopold Schneider étudie les liaisons de l'eau dans les composés chimiques, en particulier le rôle de l'eau d'hydratation et de l'eau de cristallisation.

3^o SCIENCES NATURELLES. — MM. J. Singer et E. Munzer : Recherches sur l'anatomie du système nerveux central, en particulier de la moelle épinière. — M. Graber adresse un mémoire sur les embryons des insectes. Son mémoire est divisé en 8 parties où il étudie la formation, le développement, la structure interne et externe, les divers organes des embryons. — Le professeur Franz Toula fait une communication sur divers mammifères fossiles que lui a envoyés son ancien élève Hali Edhem Bey de Constantinople; ces fossiles ont été trouvés en mars 1873 pendant la construction du chemin de fer de Scutari à Ismid, dans des fouilles de la profondeur a varié entre 8 mètres et 30 mètres; on a trouvé les échantillons mastodon pandionis, Elephas (Stegodon) Cliftii, Rhinoceros (Aceratherium) Hippotherium, Equus namadicus. — Le professeur F. Toula parle ensuite d'une excursion scientifique qu'il vient d'entreprendre avec ses élèves dans la région du Danube inférieur entre Neu Orsova et Golubar : Emil WEYR.

Membre de l'Académie.

CHRONIQUE

LES VOYAGES D'ÉTUDIANTS À PROPOS DU SIXIÈME CENTENAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Pendant quinze jours, le Midi a été en fête.

Du 22 au 27 mai l'Université de Montpellier a célébré l'anniversaire du sixième centenaire de sa fondation. Elle avait adressé des invitations à un grand nombre d'Universités françaises et étrangères. À l'attrait des fêtes annoncées, au charme du climat, se joignait pour les étudiants le désir d'affirmer la solidarité qu'ils unit; aussi beaucoup avaient-ils répondu à son appel. Tant de camarades ne pouvaient pas, étant pour la plupart venus de très loin, passer si près d'Aix et de Marseille sans que les étudiants de ces deux villes, dont l'une a de grands souvenirs et l'autre de grandes espérances universitaires, ne fissent effort pour les retenir également quelques jours. À défaut de centenaire à célébrer, on n'avait, il est vrai, qu'une franche et cordiale hospitalité à nous offrir, mais, ajoutait-on, pour nous convaincre, la route est courte de Montpellier en Provence et le pays qu'elle traverse, très pittoresque. Nous nous sommes donc rendus de Montpellier à Aix, puis d'Aix à Marseille et les fêtes ont succédé aux fêtes. Que des étudiants aient été ainsi recus par d'autres étudiants dans leurs maisons d'étudiants, n'est pas en France un événement banal. Si l'on rapproche ces fêtes de celles qui eurent lieu en 1888 à Bologne, en 1889 à Paris, de celles que la ville de Leyde va donner ce mois-ci, on estimera peut-être qu'il y a là quelque chose de nouveau, quelque chose qui mérite de retenir un instant l'attention, car savoir ce que pensent et font des jeunes gens, qui sont pour la plupart de futurs savants, c'est dans une certaine mesure avoir des symptômes sur l'avenir de ce pays et de la science.

Il était venu des délégués des quatre points cardinaux. Les uns avaient traversé toute l'Europe, d'autres tout l'Atlantique. Les villes universitaires de France étaient presque toutes représentées et quelques-unes par un nombre considérable d'étudiants. Lyon en avait envoyé trente et Paris quinze. La longueur et la variété du cortège, qui défila dans les rues de Montpellier le jour de l'arrivée du Président de la République, put convaincre nos hôtes de l'empressement avec lequel on s'était rendu à leur appel.

S'il avait fallu, comme au temps jadis, au temps où le pape Nicolas IV donna la bulle de fondation à l'Université, répartir entre quatre nations distinctes les étrangers venus à Montpellier, on eût été fort embarrassé. Car des contrées alors païennes ou inconnues et où certes on n'avait jamais ouï parler du *trivium* et du *quadrivium* avaient envoyé ces jours-ci des étudiants dans tout ordre de science. On n'a pas poussé jusque-là le culte de la vérité historique, et c'est par ordre alphabétique que les délégués des divers pays ont défilé. Les étudiants d'Amérique suivis de ceux d'Angleterre ouvraient la marche, tous semblablement vêtus de leurs robes noires flottantes et coiffés de leurs bonnets carrés. Puis alternaient très heureusement et comme pour le plus grand plaisir des yeux les écharpes brillantes des Européens orientaux : Bulgares, Grecs, Roumains, les bonnets multicolores des Italiens, et les insignes plus discrets des peuples du Nord : Suédois et Finlandais. Les Suisses, vêtus de leur uniforme traditionnel, culotte blanche et veste à brandebourgs, coiffés de leur casquette minuscule venaient les derniers, mais non les moins applaudis parmi les Étrangers.

Les Français s'avancèrent ensuite, portant comme signe distinctif, les uns le bérêt, qu'on a essayé de mettre à la mode il y a deux ans, les autres des écharpes, où le violet universitaire se mariait en général avec les couleurs municipales de la cité, que représentait la délégation. De même que tous les Français avaient cédé par courtoisie le pas aux étrangers, les étudiants de province s'étaient avec beaucoup d'affabilité effacés devant les Parisiens, auxquels l'anti-

quité et l'importance de leur Université valait l'honneur de marcher en tête des délégations françaises. Bien haut au-dessus des bérêts, des casquettes, des chapeaux de toute forme flottaient les bannières aux couleurs variées, pareilles, selon la hardie métaphore d'un étudiant italien, à un arc en ciel, gage de concorde entre les peuples. Enfin suivait à une assez grande distance, le corps des dignitaires de l'Université, membres de l'Institut, et professeurs de tous pays, dont les uniformes et les robes éclatantes terminaient heureusement ce cortège. C'est dans le même ordre, privés toutefois de la partie la plus savante de nous-mêmes, — car la plupart des professeurs étaient partis, — que nous avons défilé à Aix entre les vieux hôtels aristocratiques, en fête pour nous recevoir, et à Marseille sur la remuante et vivante Cannebière éclairée par des milliers de lanternes vénitienes.

Rabelais, s'il fût pour quelques jours redevenu étudiant de Montpellier, aurait sans doute estimé qu'on comprenait la science tout à fait selon ses vœux. Car dans toutes ces réunions de savants ou de futurs savants, — philosophes ou naturalistes, historiens ou chimistes, philologues ou mathématiciens — ce qu'on a fait le moins, c'est précisément de la science. Non pas que ses rares apparitions n'aient été très bien à leur place. Le discours, par exemple, dans lequel M. Maurice Croiset a retracé le développement de l'Université de Montpellier est une page d'histoire de premier ordre. Mais tout appareil scientifique avait été banni. Personne n'avait de mémoire substantiel et profond dans sa valise. Chacun pouvait dire comme ce sage de l'antiquité qu'il portait sur lui tout son bien. Et si des personnes bien intentionnées ont essayé de tenir un congrès de philologie romane, sa gravité a paru détonner au milieu de la gaieté générale.

Les étudiants qui nous recevaient avaient véritablement déployé pour distraire leurs hôtes une ingéniosité qui leur fait honneur. Le cadre, il est vrai, s'y prêtait. Un touriste ne saurait s'ennuyer à Montpellier, à Aix et à Marseille, à plus forte raison un touriste qui ne voyage pas isolé sans autre compagnon qu'un guide, mais entouré d'un peuple d'amis. Il n'en fallait pas moins varier le programme des fêtes et c'est à quoi les organisateurs ont admirablement réussi. Il y a eu des cérémonies solennelles comme la commémoration du sixième centenaire de l'Université, des représentations de gala à Montpellier et à Marseille, des réceptions de professeurs par les étudiants, mais surtout des réunions d'étudiants entre eux, les uns au siège même de l'association, d'autres sous le prétexte d'excursions en mer, la visite à Aigues-Mortes et celle au château d'If par exemple. Enfin on nous a offert tant de banquets que nous avons renoncé à collectionner les menus.

Toutes ces réunions ont été animées d'un même esprit. Nous supposons bien que l'accueil ne serait pas froid; on ne saurait être morose dans un pays où le soleil fait des avances aussi engageantes. Mais l'entrain et l'enthousiasme ont dépassé toute attente. Les toasts ont sans fin succédé aux discours, et sans fin les discours aux toasts. Les moins loquaces devenaient éloquents, les plus calmes d'ordinaire éprouvaient le désir de crier, de chanter, de s'agiter. Les étrangers, qui ignoraient le français, ne pouvaient s'abstenir de parler, et il nous a été donné d'assister à ce spectacle à la fois comique et touchant d'un Oriental qui, non content de se servir d'un interprète demanda la permission d'exprimer dans sa langue maternelle ses sentiments de reconnaissance, bien qu'il fût certain de n'être compris d'aucun des assistants.

Ces fêtes sont la meilleure réponse à faire à ceux qui voient d'un œil hostile ou indifférent ces réceptions

des étudiants entre eux. Quelques personnes scrupuleuses ont craint que dans cette vie commune les esprits originaux ne soient rabaisés à un niveau commun de médiocrité. D'autres, plus sceptiques, n'ont pas cherché si loin. Pour elles, les belles paroles prononcées sur les rives de la Méditerranée n'ont été que de belles paroles. Vienne un coup de mistral et tout se dissipera.

Assurément, et il faut commencer par l'avouer, il y a bien eu parfois quelques incorrections de conduite. Dans la plupart des banquets, la gaieté n'a pas été maintenue dans de justes limites, mais on serait mal venu d'exiger la gravité dans de pareilles réunions. Elles paraîtraient ternes, si elles n'étaient précisément un peu trop gaies. Il n'en est pas moins regrettable qu'on n'ait pas su, selon le mot d'un maître, imposer parfois le silence, et le faire. Au banquet de Palavas les manifestations enthousiastes ont été exagérées. D'ailleurs les indisciplinés ont subi immédiatement le châtiement de leur faute puisqu'ils se sont eux-mêmes privés du régal d'entendre les admirables discours de MM. Liard et Lavisse.

Ces réserves faites, le bon assurément l'emporte sur le mauvais. C'est d'abord un plaisir particulier, assez malaisé à définir, très réel et très fort cependant, que de se sentir soudain en communauté d'idées et de sentiments avec un inconnu. Ce plaisir, rare dans le courant ordinaire de la vie, nous l'avons éprouvé à chaque instant pendant les fêtes. Car ce ne sont pas les réceptions officielles et prévues par le programme, qui ont été le plus agréables, ce sont celles que la sympathie improvisait. On s'abordait, on se tutoyait et on devenait amis avant de se connaître.

Si les chaires sont pendant quelques jours restées muettes et les amphithéâtres déserts, on n'en a pas moins fait de la science, et beaucoup de science, à bâtons rompus, les coudes sur la table, autour des choppes de bière. Combien de fois m'a-t-on posé, ai-je posé et ai-je entendu autour de moi poser cette question : A quelle faculté appartenez-vous ? Si le hasard voulait qu'on fût adonné aux mêmes études, les discussions et les jugements ne tariraient plus sur les cours et sur les méthodes, sur les élèves et sur les maîtres. Si l'on n'appartenait pas à la même école, on n'en trouvait pas moins souvent beaucoup à recueillir dans la conversation d'un interlocuteur inconnu.

Nous savons bien qu'il ne faut pas prendre à la lettre tous les discours prononcés. Beaucoup l'ont été après boire, et quelques-uns sous le soleil qui dardait. Pour entendre le concert véritable, il faudrait transposer de plusieurs tons tous ces morceaux. Il est impossible cependant que de ces serments de fraternité entre étudiants de nationalités diverses, il ne reste aucune trace. Nous avons entrevu pendant quinze jours un bel idéal de paix et de science, de paix fondée sur la science. C'est un rêve, soit. Mais le rêve n'est que la réalité déformée. Lorsque, retournés chez eux, les étudiants délégués entendront discuter pour la millième fois l'éternelle question de la paix universelle, et qu'ils verront, comme toujours, les sceptiques secouer la tête et parler d'impossible, eux, peut-être, ne secoueront pas la tête et ne parleront pas d'impossible, car ils se souviendront avoir vécu cette existence prétendue chimérique, pendant les fêtes universitaires du Midi de la France.

HENRI DEDÉRIAN.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

LOUIS SORET

Jacques-Louis Soret, né à Genève en 1827, y est mort le 13 mai dernier. Il fit ses premières études à l'Académie de Genève, les continua à Paris dans le laboratoire de Regnault qui lui inspira le goût des expériences de haute précision, puis revint dans sa ville natale où il travailla sous la direction d'Auguste de la Rive. En 1873 il entra, en qualité de professeur suppléant, à la Faculté des Sciences de l'Université ; bientôt (1876) il y fut nommé professeur titulaire, puis doyen. Récemment l'Académie des sciences de Paris lui conféra le titre de *Correspondant*.

Ses premières recherches contribuèrent puissamment à déterminer la densité et le degré de polymérisation de l'ozone, question du plus haut intérêt pour la philosophie chimique. Puis il se consacra plus spécialement à la physique. Le premier, en 1867, il institua, au sommet du Mont-Blanc et en deux stations moins élevées, des expériences pour mesurer l'intensité des radiations solaires. Il en conclut que la température du soleil est beaucoup moins élevée qu'on le croyait alors. Sa méthode « correctement appliquée », dit M. A. Cornu (1), se trouve d'accord avec celle de Pouillet pour attribuer au soleil une température de même ordre que celle de nos foyers terrestres.

« Dans le domaine de l'Optique », ajoute l'éminent physicien que nous venons de citer, « L. Soret a imaginé des appareils qui restent classiques : le double prisme montrant la dispersion anormale, le réseau circulaire donnant des images focales par diffraction ; l'oculaire fluorescent perfectionné, qui permet d'observer jusqu'à leur extrême limite les radiations invisibles ultra-violettes presque aussi aisément que les

rayons visibles : c'est à l'aide de ce dernier appareil que L. Soret et ses habiles collaborateurs ont déterminé le pouvoir rotatoire du quartz dans toute l'étendue des radiations visibles et ultra-violettes, défini le pouvoir absorbant d'un grand nombre de substances et montré que la transparence ultra-violette est, pour certains corps, un des caractères les plus délicats de leur pureté chimique.

« Ce mode d'analyse par absorption des radiations a permis à L. Soret, en 1878, de signaler, dans ce qu'on appelait alors l'*erbine*, l'une des terres extraites de la gadolinite, un élément chimique nouveau,.... l'*holmium*, dont M. Clève parvint de son côté, en 1880, à opérer la concentration... »

« En d'autres régions de l'Optique, la science lui est redevable de consciencieuses recherches parmi lesquelles on doit citer l'étude si difficile de la diffusion de la lumière, de l'illumination des corps transparents et surtout de la polarisation atmosphérique poursuivie aux altitudes les plus diverses. Enfin, l'observation des beaux phénomènes que présentent les lacs et les glaciers des Alpes, ainsi que les mouvements sismiques du sol ont été l'occasion d'observations importantes ou de suggestions ingénieuses. »

Outre le savant, il y avait aussi en Louis Soret un lettré et un artiste. Vers la fin de sa vie il écrivit sur les beaux-arts, notamment la musique, un livre dont la préface seule a paru. Elle a été publiée dans les *Archives des Sciences physiques et naturelles de la Bibliothèque universelle de Genève*. Ce recueil qui, selon la remarque du *Journal de Genève*, renferme en quelque sorte le dépôt de la science suisse, lui doit une bonne part de son succès. C'est dans cette Revue que les physiciens trouveront presque tous les travaux de Louis Soret.

L. O.

(1) *C. R. Acad. des Sc.*, 27 mai 1890.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LA RECONSTITUTION DES UNIVERSITÉS FRANÇAISES

ET LES RÉFORMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, EN PARTICULIER DANS LES FACULTÉS DE MÉDECINE

A Monsieur le Directeur de la *Revue générale des Sciences*

CHER MONSIEUR,

La résurrection de nos anciennes Universités serait un événement scientifique si considérable, si libéral au point de vue d'une décentralisation équitable faite au profit de nos provinces, si propre à exciter dans tout le pays une véritable renaissance de l'esprit public, que j'ai pensé que votre journal accepterait l'article que je vous envoie à ce sujet. Je sais que vous vous réservez de n'y traiter que des faits scientifiques, et que les questions d'enseignement sont hors de votre cadre ordinaire. Mais l'on ne parle pas tous les jours de réorganiser les Universités françaises, et ce grand événement ne saurait laisser indifférent aucun de vos lecteurs (1).

Malheureusement j'ai peur que nous ayons perdu depuis trop longtemps en France la tradition de ces grandes écoles d'esprit public et d'indépendance personnelle; je crains que nous nous arrétions au mirage des mots, et qu'avec une très réelle bonne volonté, nos gouvernants ne nous promettent plus d'apparences que de réalités. C'est ce malentendu presque inconscient que je cherche à dissiper dans cet article.

En vous remerciant, je vous prie, cher Monsieur, de recevoir l'expression de mes meilleurs sentiments.

Paris, 20 juin 1890.

ARMAND GAUTIER.

I

Il est une expression populaire qui nous vient du siècle dernier : elle sert à caractériser un travail improdudif, mieux encore, fait à l'inverse du but à atteindre. Nous disons : *travailler pour le roi de Prusse*. Expression aujourd'hui devenue plus réaliste que jamais, cruelle dans sa clarté prophétique!

Dans nos essais de reconstitution, de l'*Enseigne-*

(1) Absolument incompétent en matière d'Enseignement, mais ne voulant pas néanmoins nous désintéresser des dispositions administratives d'où dépend l'avenir même de la Science, nous nous faisons un devoir d'accueillir l'important article de notre éminent collaborateur, M. Armand Gautier. Nous avons la conviction d'être agréable à nos lecteurs, en leur faisant connaître sur ces délicates questions de l'organisation de la Science la pensée des Maîtres.

Désireux d'ajouter et non de substituer les études de ce genre à nos articles scientifiques, nous faisons, pour la circonstance, une addition de 16 colonnes à notre numéro d'aujourd'hui.

LOUIS OLIVIER

ment supérieur en France, prenons garde que, trop méfiants de l'esprit de liberté, obsédés peut-être d'un vain fantôme de fédéralisme, préoccupés de ne pas imiter nos rivaux, prenons garde de travailler pour eux et de tenter une aventure nouvelle alors que notre pays ne saurait perdre ni un sou, ni une heure. Car, tandis que nos voisins s'efforcent de donner à leurs vieilles Universités le plus d'autonomie, d'unité, de puissance, de liberté; que chacun de leurs membres n'y dépend que de ses pairs, de ses élèves et de lui-même; nous parlons déjà de créer un système bâtarde, mi-partie Faculté et Université, où chaque groupe enseignant, régi ou dirigé par un recteur ou un directeur nommé par l'Etat, continuerait à rester sous l'étroite surveillance et la dépendance d'une forte Administration centrale, le consultant quand

il lui convient, et décidant en dernier ressort de ses intérêts majeurs (1).

En ce qui touche à l'Enseignement lui-même, alors que nos voisins tendent à le spécialiser de plus en plus, à l'adapter exactement et dès le début à leurs besoins scientifiques, agronomiques, médicaux, industriels, etc., augmentant chaque jour le nombre de leurs professeurs, pour que chacun s'adresse à peu d'élèves et leur enseigne exactement ce en quoi il possède une réelle compétence personnelle, nous faisons, nous, un effort inverse pour réduire le Haut Enseignement, diminuer les laboratoires dans nos Ecoles spéciales, confondre les collections, en attendant que l'on confonde les programmes et les chaires.

Lorsqu'on nous promet la reconstitution de nos anciennes Universités et qu'on nous fait entendre en même temps qu'on prétend conserver la direction administrative de leur enseignement, créer ou transformer leurs chaires, garder la haute main sur leur personnel — lorsqu'en quête d'élèves destinés à peupler ces Universités, on parle d'une part d'abaisser les programmes des Facultés des lettres et des sciences jusqu'à la préparation aux baccalauréats, de l'autre de porter la main sur l'enseignement professionnel de nos écoles techniques — tandis que les esprits les plus perspicaces et les plus classiques demandent la disparition de cette institution du baccalauréat qui fausse tout l'enseignement secondaire, etc., l'on nous parle d'un nouveau dédoublement de ces épreuves, de telle sorte qu'il y aurait demain quatre examens de baccalauréat successifs (deux de lettres et deux de sciences) exigibles pour entrer dans nos établissements d'instruction supérieure! Encore une fois, si l'on exécutait ces projets, ne craindrait-on point de travailler pour nos voisins!

Pendant qu'en Allemagne et en Italie l'Etat tend à diminuer le nombre des universités pour concentrer et multiplier le moyen d'action de celles qui sont de véritables foyers de lumière et de travail, et, peu soucieux des influences locales (Heidelberg lui-même va, dit-on, disparaître) — alors que l'on sacrifie tout au bien public, au perfectionnement et aux convenances du Haut Enseignement, chez nous l'on se hâte de promettre, à côté de ces Universités vraiment désirables, la conservation de Facultés sans élèves, sans traditions, sans avenir, et l'on demande déjà à nos Assemblées la création d'autant d'Universités nouvelles qu'il y a d'Académies (2)!

Le vent des économies souffle à rafales du côté de

l'instruction publique. Nous travaillons encore ici contre nous-mêmes. Dans ces palais qu'ont de tous côtés construits nos voisins à la Science et qui sont comme sortis tout armés du cerveau même des sénats universitaires, les laboratoires se multiplient et s'outillent; les professeurs, tous les jours plus nombreux, se spécialisent; largement rétribués par leurs élèves, laissés par l'Etat entièrement maîtres chez eux, ils sont comblés de considération et d'honneur, et sont les plus libres des citoyens. Chez nous, là où s'élèvent nos constructions universitaires nouvelles, les architectes décident en maîtres; leurs moellons et leurs pierres de taille dévorent nos budgets d'installation; les laboratoires à peine ouverts, on parle de les supprimer ou de réduire leurs maigres budgets. On met en discussion la raison d'être de ces services; on demande de diminuer le nombre des professeurs; on s'attaque à leur sécurité, et par là on tarit leur recrutement. Tout en proclamant bien haut le culte de la Science, l'on porte en tout un esprit étroit de réglementation et de suspicion qui inquiète et diminue ceux-là mêmes qui sont chargés d'élever le niveau de la nation, d'augmenter son lustre et son influence, de l'armer dans les questions vitales qui font sa force et sa prospérité.

Il est vrai que le projet nouveau de reconstitution de nos anciennes Universités est plein de promesses, et je me hâte de le dire, car je le crois, plein de bonnes intentions. L'homme très distingué et très sympathique qui poursuit ces idées va de l'avant avec conviction, et son libéralisme n'est pas douteux. « En tout pays civilisé, a-t-il écrit, l'idéal de l'enseignement supérieur, c'est de grouper la jeunesse en de larges foyers d'étude, de science et d'esprit national et de l'y élever librement dans le culte de la vérité et de la patrie... Service essentiellement intellectuel et moral, *l'Enseignement doit être, non pas un mécanisme administratif, mais un organisme vivant et doué de personnalité.* » Mais enfin, nous pensons que ces projets si beaux en principe, s'ils étaient réalisés tels que les font déjà juger un commencement d'exécution, et les paroles mêmes de ceux qui les poursuivent, reviendraient à limiter encore les moyens d'action, l'avenir et le nombre des hommes d'élite qui travaillent et professent dans nos écoles; nous estimons qu'ils produiraient un abaissement du niveau général de l'enseignement, et par conséquent de l'esprit public en France, et cette conviction nous a conduit à dire à ce sujet toute notre pensée.

Mais avant d'exposer le plan de reconstitution qu'on nous propose, quelques mots sont nécessaires pour faire connaître ce qu'étaient ces Universités anciennes qu'on pense ressusciter, ce que sont aussi ces Universités étrangères qu'on vou-

(1) « Je pensais et je pense encore », a dit M. Jules Simon au Sénat (séance du 18 juin 1890, *Journal officiel*, p. 633) « que les différents ministères, les différentes administrations exercent sur l'instruction publique une tyrannie véritable. »

(2) Voyez le discours de M. Combes au Sénat. *Journal officiel* du 18 juin 1890, p. 632.

draît essayer timidement d'imiter, tout en craignant de leur laisser comme autrefois les prérogatives et l'âme libre qui en faisaient de véritables et puissantes personnalités, et en annonçant officiellement et solennellement que *l'indépendance qu'il s'agit de leur donner, c'est simplement l'indépendance scientifique* (1). Dans le monde administratif, qui depuis le commencement de ce siècle propose et décide au nom de l'Université de France, on ne paraît pas s'apercevoir assez qu'une réunion de chaires publiques et de bureaux dans un même lieu ne suffit pas plus à constituer une Université qu'un mannequin dont on tirerait les ficelles ne constitue une individualité, s'il manque de ce principe vital qui lui permet de coordonner lui-même librement ses efforts et ses actes en vue de sa conservation et des intérêts qu'on lui demande de défendre.

II

Les Universités d'autrefois étaient une des puissances de l'Etat, une petite cité dans la ville, une *communauté* ayant ses fonctions, ses devoirs et ses droits : elles tenaient du cloître et de la citadelle. Elles recevaient les étudiants au sortir du collège où ils avaient appris les *éléments*, et leur donnaient une culture nouvelle visant un but pratique et professionnel. Elles enseignaient, le plus souvent dans la même enceinte, les diverses branches du savoir humain à leur époque : théologie, grammaire, langues, philosophie, droit, médecine, arts libéraux. Mais cette réunion de chaires n'aurait pas fait une Université, pas plus qu'elle ne suffit à cette heure à constituer l'*Université de Paris* dans le vieux palais de la Sorbonne, si ces corps enseignants n'avaient eu leurs règlements intérieurs, leurs usages, leurs fêtes communes, leurs prérogatives, leur autonomie, leurs libertés, leur gouvernement propre, en un mot leur âme et leur vie. L'Etat les consultait à son heure, respectait leurs privilèges, se glorifiait de leur lustre et de leur influence, tirait parti de leur savoir. Elles vivaient de leurs deniers, de leurs riches dotations, de leurs étudiants. Elles avaient une personnalité légale et pouvaient tester et hériter. Je n'ai jamais ouï dire que tant de liberté et de puissance les eussent entraînées dans la voie du *séparatisme*, dont, à propos de leur reconstitution, on a essayé déjà de galvaniser le spectre : c'est la tactique des Jacobins !

La tourmente révolutionnaire fit chez nous disparaître ces cités saintes qui, à quelques exceptions près, avaient été les refuges du savoir et de la liberté de conscience. Napoléon I^{er} n'eut garde de les rétablir. Il créa l'*Université impériale*, jouant sur les mots et cherchant moins encore à populariser

l'enseignement supérieur, qu'à créer une machine de gouvernement et de direction de l'esprit public. Cette idée mère que le temps et les circonstances ont atténuée beaucoup, je le reconnais, se fait encore sentir dans notre Université actuelle, dans l'Université de la République, car si nous avons renoncé au but de son fondateur, nous n'en avons pas moins gardé ses moyens d'action administrative, nivela-teurs, sinon oppressifs, des personnalités et des corps enseignants.

Heureusement que le type de nos anciennes Universités s'est conservé à l'Etranger : en Angleterre, en Espagne, en Italie, surtout en Allemagne.

Dans ce dernier pays où, grâce à ces libertés mêmes que l'on craint chez nous de concéder, l'Instruction publique a fait un jour surgir la *Nation allemande*, chacune des *Universités* est une institution d'Etat, à laquelle est confiée l'Instruction supérieure de la jeunesse, et le développement de sa moralité et de son patriotisme. Elle est généralement subdivisée en Facultés de théologie, de droit, de médecine, de philosophie et sciences ; ces deux dernières souvent confondues en une.

Chacune de ses Facultés est réglée par des statuts propres et placée sous la direction et le contrôle du *Conseil* de ses professeurs ordinaires et d'un doyen qu'ils nomment chaque année pour les présider, représenter et administrer. Le doyen a la garde des sceaux, convoque le Conseil, et ne peut rien arrêter sans lui. Chaque décision est communiquée, s'il le faut, à l'Autorité centrale, après avoir été contre-signée de tous les professeurs.

L'ensemble des Facultés forme l'Université. Elle a un *Recteur* à sa tête nommé par tous les professeurs et pris parmi eux. Un *sénat*, composé des doyens des Facultés, du recteur sortant et actuel et de quatre professeurs élus par l'assemblée, régit les affaires de l'Université, et négocie avec l'Etat par l'intermédiaire d'un *Curateur* ou d'un secrétaire général que nomme seul le pouvoir central (1). Chaque université est maîtresse chez elle ; son sénat décide en dernier ressort de tout ce qui a trait à la nomination de ses professeurs, de son recteur, de ses doyens, de tout ce qui concerne son enseignement, de la création, s'il y a lieu grâce aux donations dont elle dispose, ou de la transformation, des chaires, du maniement de ses fonds, etc. Ce Sénat souverain est dans ces grands corps comme l'âme

(1) La liberté de conscience et l'indépendance scientifique, dans le sens exact du mot, sont des conquêtes définitives qu'on ne saurait plus donner et qu'il serait difficile de reprendre.

(1) On ne saurait trop approuver la sagesse de cette mesure. Doyens et recteurs restent en Allemagne entièrement indépendants du pouvoir administratif, qui ne les nomme pas et qu'ils ne représentent à aucun degré. Seul le *Curateur* est fonctionnaire de l'Etat ; il est nommé par le ministre et est chargé de défendre les prérogatives du pouvoir central, et de veiller à l'observation des lois et règlements. Ces deux fonctions sont confondues chez nous dans nos doyens, présentés par leurs collègues, mais nommés par le ministre. On ne saurait que regretter cette confusion de rôles.

libre et pensante, qui manque chez nous, et qui fait la force et la personnalité des universités allemandes. Le droit d'enseigner dans l'Université largement accordé à tout docteur, mais à ses risques et périls; un corps nombreux de professeurs ordinaires et extraordinaires et de suppléants officiels ou *privat-docent* (1); une entière liberté dans l'administration des affaires et des biens propres de l'Université (2); le respect absolu par le pouvoir politique des décisions du Sénat; l'indépendance complète des professeurs et de tous vis-à-vis de l'État, qui sanctionne simplement les décisions universitaires; des fonds largement alloués à tout laboratoire de recherches; les étudiants libres de choisir leurs professeurs et les payant proportionnellement aux services que ceux-ci leur rendent... Est-ce bien là l'image et le modèle de nos futures universités? Est-ce bien cette organisation libérale et puissante que la République veut octroyer à notre Haut Enseignement français pour soutenir utilement la concurrence avec nos intelligents voisins?

III

Nous ne saurions l'espérer devant les tendances qui déjà se font jour; surtout devant cette franche déclaration qui vient d'être faite dans une circonstance solennelle par l'homme qui est le plus autorisé à parler de ces projets au nom de l'État : « *Il faut* » a-t-il dit, « *que dans les Universités de demain comme dans les Facultés d'aujourd'hui, l'État continue à nommer les maîtres, à approuver les dépenses et à garder dans les études cette haute direction qui est un de ses devoirs.* » N'avais-je pas raison de dire plus haut que la pensée de direction et de domination du créateur de notre Université de France hante encore presque inconsciemment les meilleurs esprits?

En mettant de côté les ombres et les mots pour bien voir le fond des choses, tel qu'il se montre déjà et résulte de la création des divers établissements nouveaux qui doivent devenir comme les membres, les parties fondamentales de nos prochaines Universités régionales, le projet de reconstitution du Haut Enseignement français consiste surtout à transporter, partout où ce sera possible, les chaires de même nom dans un même local, un même

Institut; à y réunir les collections, les instruments, les services, en un mot, tout ce qui peut paraître faire double emploi et à donner la direction de cet Institut à celui qui paraîtra le plus apte à le diriger. Autour de cette *persona grata*, de ce professeur émérite, seul de son grade, viendraient graviter sous forme de chargés de cour, suppléants, agrégés, répétiteurs, etc., tous ceux qui seraient jugés propres à compléter cette branche de l'enseignement public. La réunion en un même lieu des Instituts ainsi constitués par les diverses Facultés formerait une Université.

L'on voit tout de suite comment de ce système naissent les économies et quelles sont les bases fermes de ce projet. Si nous prenons une ville telle que Montpellier ou Nancy, ayant Faculté des Sciences, Faculté de Médecine, École de Pharmacie, etc., nous trouvons dans chacune d'elles, un ou plusieurs professeurs titulaires de chimie, de physique, d'histoire naturelle, etc. Quel besoin, dit-on, de trois ou quatre cours magistraux exposant une même science? Avec un Institut de chimie ou de physique, un professeur titulaire unique suffirait; vous y adjoindriez, s'il le fallait, sous forme de cours complémentaires, l'étude des applications diverses de ces sciences aux besoins de la médecine, de la pharmacie, de l'agriculture, etc., et l'État bénéficierait, sans dommage pour l'enseignement public, de la différence des traitements. En attendant, d'ailleurs, l'on ne sacrifierait pas, par un effet rétroactif contraire à nos lois, les positions acquises. Ici, où là, les professeurs titulaires actuels d'une science de même nom, réunis en un même Institut, conserveraient leurs titres et leurs chaires magistrales; celles-ci ne seraient transformées ou supprimées que petit à petit, au fur et à mesure des démissions, décès, retraites ou permutations. Ce n'est qu'alors seulement que, s'il était jugé nécessaire, l'on remplacerait les professeurs actuels par des adjoints ou des maîtres de conférences, et que l'on arriverait à réaliser sur l'ensemble des traitements des économies sensibles, auxquelles viendraient s'ajouter celles faites sur la disparition des services communs, la réunion des collections, des laboratoires, des travaux pratiques, la diminution des employés subalternes, etc.

Telle est l'une des bases principales de ces projets. L'on pense en haut lieu qu'il faut faire des économies sur l'instruction publique; l'on croit que l'on aura toujours assez de professeurs, et l'on veut essayer pour eux du système du *numérariat*. Je crois aussi que l'on trouvera toujours assez de gens prêts à accepter, pour vivre, une position même diminuée. Il s'agit seulement de savoir si des places subalternes ten-

(1) Par exemple Bonn qui a à peu près 200 étudiants en médecine a 32 professeurs ordinaires ou extraordinaires et *privat docent*.

(2) Les universités allemandes ayant depuis des siècles une vraie personnalité civile, étant des corps ou communautés stables, à la fortune desquelles l'État ne peut toucher, ont pu hériter, comme autrefois nos communautés religieuses, de biens propres dont elles gardent la gestion et qui contribuent à l'indépendance de leur enseignement, à la création, par exemple, de chaires spéciales lorsqu'elles le jugent nécessaires. D'où ce double résultat : 1° d'être véritablement maîtresses de leur enseignement; 2° de présenter assez de stabilité et de garanties pour hériter, recevoir des dons, etc. L'ingérence de l'État dans nos Facultés sera toujours un obstacle aux dotations ou héritages, ce qui est fort regrettable.

teraient des hommes de mérite autant que des positions élevées et libres; si ceux auxquels vous offrirez une chaire de suppléant, avec un bien faible espoir d'arriver au titulariat, ne tourneront pas plutôt vers la clientèle et l'industrie, en un mot si, dans le système que vous voulez tenter, le choix des professeurs se ferait largement et sur une élite comme aujourd'hui. L'on espère aussi que même avec ce système, le pays tiendra dans le monde une place scientifique suffisante, honorable, et que de ces laboratoires dont on aura restreint le nombre et les budgets (car l'on vise à l'économie), qu'on aura confiés à des chargés de cours, à des professeurs maigrement rétribués et considérés, il sortira des travaux qui seront l'honneur du pays, et des hommes nouveaux dévoués à l'enseignement, aptes à remplacer leurs maîtres. Nous le désirons vivement; nous ne l'espérons pas.

Mais sacrifions tout à l'économie : ne la cherchons même, ni dans une meilleure administration, ni dans la suppression d'emplois subalternes notablement inutiles, ni dans la diminution des bureaux qui nous dévorent, ni dans une réduction des dépenses d'autres ministères. Il est entendu, accepté, que l'instruction publique doit économiser encore sur ses maigres budgets et sacrifier sur l'autel de la patrie une partie des sommes actuellement destinées à relever le niveau des études, l'âme de la nation, et l'instruction de ceux qui deviendront un jour les producteurs de la richesse publique, ou l'honneur de notre pays. Ce principe accepté, demandons-nous comment doivent être faites ces économies pour être le moins préjudiciables à l'intérêt général.

Ces économies que l'on rêve de faire sur l'instruction publique (tout en déclarant du haut de la Tribune que celle-ci est la sauvegarde de l'État et la génératrice féconde des plus utiles citoyens) on ne saurait les faire aux dépens de l'instruction primaire qui est trop populaire, et dont l'utilisation, même électorale, crève les yeux. De l'instruction secondaire l'on a tiré ce que l'on a pu : on a augmenté le prix des lycées, et décidé d'accorder à nos collégiens vacances sur vacances, à propos de tout, à propos de rien, pendant qu'on chargeait de plus en plus les programmes des baccalauréats. Chaque jour de congé est une économie pour l'État, et ne chagrine point trop les familles.

Il ne restait donc plus qu'à s'adresser à l'Enseignement supérieur.

Dans le haut enseignement que donne l'Université, l'on pouvait essayer de toucher aux Écoles de droit, aux Facultés des sciences ou aux Facultés de médecine. Je ne parlerai pas des Écoles de droit que je ne connais pas assez. Elles semblent se bien défendre. Lorsqu'on a voulu diminuer nos agrégés

de médecine en leur demandant un enseignement complémentaire gratuit, tout en se réservant de les renvoyer à la vie privée après neuf ans de service, les Écoles de droit ont su maintenir à leurs agrégés, nommés à vie, rarement chargés de cours, une position, et un traitement supérieurs.

Les chaires des Facultés des sciences sont généralement réservées aux plus distingués des professeurs de l'enseignement secondaire. Comment demander à leurs camarades du ministère de porter la main sur l'arche sainte!

Restaient nos Facultés de médecine; c'est sur elles qu'on a compté pour économiser, trouver les élèves qui faisaient défaut ailleurs, réduire les professeurs, et en attendant qu'on organise les Instituts, passer aux Facultés des sciences les enseignements qui, dit-on, feraient double emploi.

Combien cependant serait-il plus logique (car il y a du côté des Facultés des sciences, des Facultés des lettres et des Écoles de médecine secondaires des économies réelles, nécessaires, à faire) de supprimer celles de ces Facultés et Écoles qui se meurent faute d'élèves (1) et de créer de vrais centres universitaires, dans les six à sept villes françaises où se sont conservées les traditions du travail scientifique et littéraire, du droit et de la médecine.

Il existe, en effet, aujourd'hui en France (*Paris non compris*) quinze facultés des sciences qui comptent en tout sept cent quatre-vingt-dix-huit élèves (2).

(1) Je parle surtout dans ce travail des Facultés des sciences, bien plus que des Facultés de lettres que je connais moins. Quant aux Écoles secondaires de médecine, il est vrai que leurs professeurs sont payés par les municipalités, mais l'État ne leur donne pas moins des allocations pour édifications, collections, etc.

(2) Tous les chiffres que je cite dans cet article sont extraits des *Enquêtes et documents relatifs à l'Enseignement supérieur* publiés par le Ministère en 1890. Voici pour la dernière année scolaire 1888-89 le détail des diverses Facultés de sciences :

Faculté des Sciences	Nombre d'élèves
Marseille.....	55 dont 45 libres; les autres boursiers, professeurs de lycée, auxiliaires, maîtres répétiteurs, préparateurs.
Besançon.....	44 dont 14 libres.
Bordeaux.....	85
Caen.....	33
Clermont... Moins de	20
Dijon.....	34 dont 11 libres; les autres comme à Marseille et Besançon.
Grenoble.....	37 et 26 correspondants.
Lille.....	87 et 25 correspondants.
Lyon.....	114 y compris les laboratoires annexes de chimie industrielle et agricole.
Montpellier.....	60 au lieu de 80 en 1887-88.
Nancy.....	72 au lieu de 101 en 1887-88.
Poitiers.....	21
Rennes.....	31 et 51 correspondants.
Toulouse.....	75
Alger.....	29
Total des élèves de ces 15 facultés de sciences de province....	798
En moyenne environ	50 élèves par Faculté.

Si l'on distrair les cinq Facultés de sciences réellement importantes de Lyon, Lille, Bordeaux, Nancy, Toulouse et Montpellier qui ont à elles seules cinq cents élèves inscrits, il reste pour les neuf autres Facultés trois cents élèves en tout, soit pour chacune d'elles une moyenne de trente-trois seulement, y compris les boursiers, préparateurs, professeurs-auxiliaires, maîtres répétiteurs, etc. C'est-à-dire que pour plusieurs d'entre elles, *tout le monde est payé par l'Etat, maîtres et élèves*, et qu'il y a telles de ces Facultés où l'on compte plus de professeurs, chargés de cours, adjoints, administrateurs et employés qu'il n'y a d'étudiants réels (1).

Ce malaise va sans cesse en augmentant. Le nombre des élèves des Facultés des sciences, qui était de huit cent cinquante-sept en 1887-88 n'est plus que de sept cent quatre-vingt-dix-huit en 1888-89. Et comment pourrait-il en être autrement ! On n'a plus le temps de s'attarder aujourd'hui aux œuvres de luxe. Depuis 1870 le pays s'est appauvri, il est chargé d'impôts, la vie est dure, il faut la gagner. Au sortir du lycée on entre dans les Ecoles spéciales de médecine, de pharmacie centrale, agricoles, militaires, polytechnique, etc. Les Facultés des sciences ou des lettres ne conduisant qu'à la science pure, à la licence, à l'agrégation, n'appellent guère que ceux qui se destinent au professorat. Encore, ces rares candidats ont-ils l'Ecole Normale supérieure, l'Ecole des chartes, etc., qui les absorbent.

Il semblait donc qu'on dût penser à remédier à cet état de choses dont nul n'est responsable, — car il tient au vice même du principe dont est sorti le système de notre enseignement public, — en supprimant les Facultés décadentes au profit des cinq à six centres intellectuels qui tiennent vraiment leur rang et ont une tradition et des élèves. Mais il faut compter d'une part avec nos Représentants qui, tout en réclamant hautement des économies, entendent tous faire une exception chacun pour son département et sa ville ; de l'autre, avec l'organisation actuelle de l'Université. Elle possède régulièrement une école de professeurs, une *Ecole normale supérieure* d'où sortent chaque année des agrégés qu'il faut caser, et comment le faire, si l'on supprime quelques-unes de ces Facultés et les chaires afférentes, c'est-à-dire le but même que visent les plus méritants de ceux que l'Ecole a versés dans l'enseignement secondaire ?

L'on a donc pris le problème à résoudre par

l'autre bout, et l'on a essayé de trouver à ces Facultés des sciences agonisantes, qui vivent de boursiers, de maîtres répétiteurs et de *correspondants* (1), les élèves réels qu'elles n'avaient pas. C'est alors qu'on jeta les yeux sur les Facultés de médecine où six mille jeunes gens suivent nos cours (2). On espère qu'environ le cinquième, ou douze cents étudiants de première année, peuvent en être distraits et conservés dans les Facultés des sciences. Ceux-ci répartis également dans nos quinze Facultés de province formeraient une moyenne respectable de quatre-vingts étudiants.

(1) C'est une assez jolie invention. Elle coûte bon au budget, mais elle fait si jolie figure ! Nos maîtres adjoints, ou répétiteurs, de lycées et collèges de petites villes de province sont invités à se rendre tous les quinze jours au chef-lieu universitaire. Le voyage est payé par l'Etat. Chacun court donc deux fois par mois vers sa Faculté. C'est ce qu'on y a nommée *le petit train de plaisir bi-hebdomadaire*. Nos élèves voyageurs signent la feuille de présence, reçoivent un *devoir à faire* pour la prochaine quinzaine, puis chacun prend sa leçon pratique ou va là où l'amour du travail l'entraîne. Je ne sais si personne ne se préoccupe à la maison de cette petite fête Universitaire, mais ne faut-il pas que la science pénètre jusqu'au plus arriérés villages de nos provinces ? Dans cette vieille Bretagne retardataire, inféodée aux anciennes coutumes et aux idées d'une autre époque, voici un jeune maître répétiteur qui arrive le matin d'Auray à la faculté des sciences de Rennes. Il vient apprendre à faire le gaz de marais. On lui donne sa leçon, il déjeune et dîne au laboratoire, pour ne pas perdre un temps précieux, et repart le soir porter la bonne nouvelle jusqu'au fin fond de sa province. — Ce n'est point là un fait humoristique que je raconte, c'est un fait bien réel qui est arrivé. Encore ce brave maître répétiteur d'Auray était-il un de ces élèves correspondants dont le petit voyage répété n'inquiétait pas la famille.... Et pendant qu'on gaspille ainsi les fonds destinés à l'instruction publique, nos laboratoires de recherches manquent du nécessaire pour compléter les travaux et publications qui sont l'honneur de notre pays.

(2) Ce nombre était de 6388 en 1887-88. Il a été de 5978 en 1888-89 pour nos 6 Facultés et 17 écoles de médecine françaises.

Nombre d'étudiants en médecine (Officiers de santé et Docteurs)

	Doctorat	Officier de santé	Total
FACULTÉS			
Paris.....	3535	359	3894
Montpellier.....	314	9	323
Nancy.....	120	4	124
Lyon.....	363	22	385
Lille.....	402	43	445
Bordeaux.....	352	23	375
	Total.....		5246

	Doctorat	Officier de santé	Total
ÉCOLES...			
Alger.....	37	46	83
Amiens.....	6	51	57
Angers.....	25	42	67
Besançon.....	46	44	90
Caen.....	49	12	61
Clermont.....	12	43	55
Dijon.....	11	42	53
Grenoble.....	6	42	48
Limoges.....	26	5	31
Marseille.....	52	34	86
Nantes.....	74	10	84
Poitiers.....	43	7	50
Reims.....	45	7	52
Rennes.....	42	20	62
Rouen.....	18	4	22
Toulouse.....	78	27	105
Tours.....	21	5	26
	Total.....		732

Nombres pour 1888-89, tirés du *Rapport sur la situation de l'Enseignement supérieur en France*. Académie de Paris, 1890.

(1) Encore les maîtres-répétiteurs, professeurs de lycées, auxiliaires, préparateurs, etc., forment-ils un lot, un *article de fond*, qui apparaît chaque année, toujours le même ou presque le même, et qui vient remonter la moyenne générale d'une quantité constante qui, déduction faite, réduit très sensiblement le nombre déjà minime des élèves réels.

soit, avec ce qu'elles ont déjà, cent trente élèves environ pour chacune d'elles. Ce serait une véritable résurrection.

Mais, pour convaincre nos Facultés de médecine de la nécessité de cette castration volontaire, il fallait invoquer des raisons convaincantes; il fallait plus : trouver des arguments susceptibles de flatter les penchants naturels de ces Facultés, et de ménager en apparence leurs intérêts professionnels.

Je reconnais qu'on a su trouver des arguments captieux; les voici :

L'on a dit : la médecine fait tous les jours des progrès sensibles. De nouvelles branches viennent se greffer sur le vieux tronc et portent des fruits dont nous devons faire bénéficier nos élèves. D'où, cette nécessité de consacrer un temps plus long à nos études médicales.

L'on ne saurait augmenter d'un an le temps de la scolarité : les nécessités du service militaire, le désir des familles, les besoins même du pays qui manquerait de médecins, s'y opposent. Mais l'on peut trouver un an de plus en sacrifiant la première année actuelle. Celle-ci n'est qu'une répétition, une amplification tout au plus, du baccalauréat ès sciences; chacun sait ça, ou du moins le répète. Faisons donc dans nos Facultés des sciences, dans nos futurs Instituts plutôt, une année de sciences proprement dites : sciences générales d'abord, communes à tous les élèves, puis sciences appliquées, différentes suivant que l'étudiant se destina à l'agriculture, à l'industrie, à la pharmacie, à la médecine, etc. Comme sanction de ces études, exigeons un double baccalauréat ès sciences répondant à ce double enseignement; nous aurons ainsi doté d'élèves nos Facultés des sciences décadentes et nos Instituts projetés. Nos Ecoles spéciales d'agriculture, industrielles, de médecine, etc. n'auront pas à revenir sur cet enseignement scientifique une fois donné. Ce sera encore gagner du temps. Les étudiants en médecine par exemple, vers leur dix-huitième année, débiteraient pleins de zèle par l'anatomie et la physiologie et sans connaître ni un os, ni un organe, seraient admis à couper et trancher dans le mort et dans le vif.

Sacrifions donc cette première année d'études scientifiques qui n'a de médicale que le nom, faisons quatre ans de médecine réelle, et renvoyons l'étude des sciences préparatoires à ceux-là qui font métier de les enseigner exclusivement.

A prendre cette solution, ajoute-t-on, il ne manque pas de raisons convaincantes à invoquer :

1° Les sciences proprement dites doivent rester le lot de Facultés des sciences. A chacun son rôle : *la science aux savants, la médecine aux médecins* (1).

2° Gagner ainsi un an, c'est faire des médecins, des praticiens plus instruits, sans sacrifier des connaissances qu'on peut acquérir ailleurs, et qu'un bon baccalauréat suppléerait haut la main.

3° Dès lors, les budgets des sciences et travaux pratiques actuels de nos Facultés pourraient passer, au moins partiellement, aux services de médecine pure qui bénéficieraient ainsi d'un double profit et de temps et d'argent.

Ces propositions, je le reconnais, sont engageantes, capiteuses même : mais examinons-les successivement et nous reconnaitrons bien vite qu'elles ne sont qu'apparences, qu'on ne nous paye que de fausse monnaie; que la mesure qu'on nous propose tend au rapetissement de nos Facultés, de leur enseignement, de leur influence, de leur budget.

A. — *Les Sciences, nous dit-on, doivent être enseignées dans les Facultés des sciences ou les Instituts de sciences.*

Il n'y a de doute pour personne que les sciences doivent être apprises quelque part par nos étudiants et qu'on ne saurait faire un médecin passable sans connaître l'eau que l'on boit, l'air que l'on respire; le soufre, l'arsenic, l'iode dont on se sert tous les jours en thérapeutique; le fer, le plomb, le mercure même; l'alcool, le sucre, le chloroforme, le vin, le pain, la chair musculaire, autrement que ne les connaît le droguiste, l'épicier, le boulanger, etc. Dans d'autres branches des sciences : l'opium, la rhubarbe, les quinquinas, les champignons toxiques ou comestibles, les vers intestinaux et autres parasites; ou bien encore l'électricité animale, le mécanisme de l'audition, l'optique de la vision et les vices géométriquement réformables de l'œil, une pile, un microscope, un thermomètre même sont des objets avec lesquels il n'y a pas de mal que le médecin se familiarise. Il s'agit seulement de savoir où il convient le mieux d'acquérir ces connaissances préliminaires qui sont comme l'introduction indispensable de l'étude de la physiologie, de la thérapeutique, de l'hygiène, de la pathologie modernes.

Nous pensons, nous, que puisqu'il faut acquérir ces connaissances nécessaires, il vaut mieux que ce soit dans nos Facultés de médecine, là où tout respire la tradition médicale, où, de tous côtés, nous arrive la sensation des besoins techniques de notre art, du progrès journalier qui l'emporte, des phases rapides par lesquelles il passe en se transformant.

Nous pensons que, les sciences, confiées à d'autres professeurs, fussent-ils éminents, s'ils ne sont pas médecins, seront traitées hors de nos écoles d'une façon étrangère aux besoins et aux conceptions de la médecine; de la médecine théorique et savante, aussi bien que de la médecine pratique.

Nous le pensons, parce qu'il n'est pas possible,

(1) Ce mot a été prononcé à la tribune de l'Académie de Médecine en 1888.

en nous reportant aux projets du Ministère sur la réforme du baccalauréat qu'on nous propose (1), qu'un cours de Faculté de sciences qui ne serait pas spécialisé dès le début convienne à nos élèves; nous affirmons que quelques mois consacrés à l'étude des sciences appliquées à la médecine, ne pourront suffire à préparer les jeunes gens à suivre nos cours, alors que dans nos Ecoles spéciales une année suffit à peine. Nous croyons qu'il en est de même de la préparation à la pharmacie, à l'agriculture, à l'industrie. Dans tous les cas, pour la médecine, nous avons la preuve directe de la faiblesse de ce système.

Nous savons qu'à l'Etranger, en Allemagne surtout, les professeurs spéciaux se plaignent de l'enseignement trop général, trop peu spécialisé donné dans les Instituts de physique et de chimie.

A l'Institut de chimie de Strasbourg, le professeur Fittig vient de passer un semestre entier à exposer la constitution hexagonale de la benzène et de ses homologues. Avec leurs études antérieures faites au gymnase classique, c'est toute la préparation que les futurs élèves de Hoppe-Seyler auront reçue pour arriver à suivre les cours de chimie biologique et de physiologie. A Bonn le professeur Kékulé se borne une année à étudier les hydrocarbures, une autre les acides organiques, une autre les alcools, etc. Ne voilà-t-il pas une forte préparation à la médecine! Dans la même Université, le professeur d'électricité médicale, Fuchs, se plaint que les étudiants qui suivent son cours d'électrothérapie appliquée n'y soient nullement préparés; il demande instamment la création à l'Institut des sciences d'un *Cours de physique médicale*, les jeunes gens qui lui arrivent ne connaissant absolument que des formules abstraites.

Dans cette même Université (que je prends comme exemple, vu sa notoriété) à la demande de son directeur, le professeur Schulz, l'Institut de clinique, rétribue de ses fonds un cours de *chimie appliquée au diagnostic*, afin de compléter dans la mesure la plus indispensable le cours insuffisant professé à l'Institut de chimie. Le professeur d'ophtalmologie a été obligé d'ajouter à ses leçons un cours d'optique géométrique pour rendre acces-

sible à ses élèves la pratique des instruments d'optique usités dans ses démonstrations à l'hôpital (ophtalmoscope, optomètre, ... etc.) — Les mêmes plaintes et les mêmes faits se reproduisent dans les autres universités allemandes.

Si nous adoptons le système allemand des Instituts, ou ce qui revient presque au même, de la restauration des Facultés des sciences qu'on nous propose, il faudrait aussi suppléer à leur enseignement en créant des cours complémentaires, (ceux-là que nous avons, ou pourrions avoir dans nos Facultés de médecine); sinon, les mêmes insuffisances, les mêmes inconvénients apparaîtraient (1). Ils auraient plus de gravité encore, si l'Etat décidait seul de la création des chaires, alors que les Universités étrangères peuvent au besoin les créer sur leurs propres fonds, grâce aux donations que n'a pas permis ou favorisé la constitution de nos Facultés.

Cette insuffisance des instituts scientifiques ou des Facultés de sciences dans notre pays, se montre déjà chez nous dans les cas où les circonstances particulières ont permis de les mettre à l'épreuve. Grâce à nos tournées de premier examen de doctorat dans les Ecoles de médecine de plein exercice ou secondaires de province, nous revenons chaque année à Nantes, Rennes et Caen. Les épreuves sont tout à fait satisfaisantes dans deux de ces Ecoles; elles sont mauvaises dans la troisième, au moins pour la physique, parce que là seulement cette science est enseignée aux étudiants en médecine par un membre de la Faculté des sciences qui ne veut, ou ne peut, tenir aucun compte des besoins de la médecine dans son enseignement. Lors des fêtes du sixième centenaire à Montpellier, les professeurs de la Faculté des sciences me disaient : *Nous ne voulons pas tomber au rang de simples préparateurs aux Facultés de médecine*. C'est aussi, je le sais, le sentiment de la Faculté des Sciences de Paris qui croit, avec raison, devoir donner dans ses cours l'enseignement de la licence, et qui n'accepterait pas de faire des cours préparatoires au baccalauréat.

C'est là cependant où conduirait le système pro-

(1) La lettre du ministre, communiquée aux Facultés de médecine, relative aux projets de réforme du baccalauréat des sciences, propose qu'après le baccalauréat ès lettres, le futur candidat aux écoles spéciales entre dans les facultés de sciences, où il préparera durant un an (un an au moins) un baccalauréat-ès-sciences composé de deux parties et de deux examens : le premier examen serait consacré aux sciences pures et générales; ces études seraient communes à tous les candidats. Le deuxième examen serait spécialisé et différent suivant qu'on préparerait la médecine, l'agriculture, l'industrie, etc. C'est dans ce 2^e semestre qu'on donnerait, par exemple, l'enseignement de la chimie médicale tout entière. On ne réserverait que la chimie biologique.

(1) Ce serait pire. On vient de voir qu'en Allemagne l'on peut au besoin créer un cours de chimie médicale à l'Institut de chimie, et que d'autre part les fonds paraissent suffisants pour créer et entretenir des cours supplémentaires tels qu'un cours de physique appliquée au diagnostic à l'Institut de clinique. La division très grande du travail et la non homogénéité des Instituts et Universités permettent ainsi de suppléer aux défaillances momentanées, et de corriger les imperfections. A Bonn par exemple, il y a 32 professeurs titulaires, sans compter les assistants et professeurs libres, pour une population d'étudiants qui s'élève à peine à 400. L'on comprend donc que, dans ces conditions, l'étudiant trouve toujours le cours, le professeur, le laboratoire qui convient à ses besoins, et que si l'instruction qu'il recherche n'est pas suffisamment spécialisée dès le début, elle arrive à se compléter plus tard dans l'un ou l'autre de ces nombreux cours.

jeté; car de deux choses l'une : ou il n'y aurait pas de baccalauréat et par conséquent pas d'élèves dans les Instituts et Facultés de province, à l'exception de quatre ou cinq; ou bien il y aurait le baccalauréat scindé qu'on nous propose, le baccalauréat *mi-professionnel*, et dans ce cas il faudrait bien que ces Instituts ou Facultés y préparassent leurs étudiants.

Si donc nous voulons que l'enseignement des sciences nécessaires à nos Ecoles spéciales, à la médecine en particulier, se spécialise, qu'il soit médical, approprié aux futurs besoins de la physiologie, de l'hygiène, de la clinique, il faut que cet enseignement se fasse dès le début par des médecins, docteur ès-sciences si vous le voulez, mais par des médecins et dans nos Facultés de médecine.

B. — Le second argument qu'on invoque est celui-ci : En supprimant dans nos facultés de médecine ces cours de première année et renvoyant nos jeunes étudiants aux Facultés de sciences ou aux Instituts à venir, on gagnerait un an, qu'on pourrait consacrer à l'étude des branches nouvelles de l'art médical.

Si cet argument était réel (en admettant qu'on pût aborder l'hygiène, la thérapeutique, la physiologie sans études spéciales scientifiques préparatoires) il serait d'un grand poids. Mais comptons : quatre ans de médecine proprement dite, de médecine pure que tout le monde demande, et un an pour étudier celles de ces sciences préparatoires jugées nécessaires, (année qu'on passera soit au lycée, soit dans les Facultés des sciences, soit dans nos Ecoles), *cela fait bien cinq années à partir du baccalauréat ès lettres.*

Or que vous fassiez cette première année d'études scientifiques préparatoires ici ou là, ce sera toujours douze mois consacrés à l'étude des sciences que vous jugez nécessaires, et cinq années à partir du baccalauréat ès lettres pour atteindre le doctorat. Il s'agit donc simplement de savoir où il convient le mieux de commencer ces études scientifiques faites en vue de carrières déterminées. Je persiste à penser que la spécialisation doit se faire dès le début pour les écoles d'agriculture, d'ingénieurs, industrielles, pour les écoles de pharmacie, mais surtout pour les Facultés de médecine; puisqu'il faut qu'elles soient spécialisées, je conclus que les sciences préparatoires à la médecine doivent être enseignées par des médecins. Le temps nécessaire pour arriver au doctorat en médecine n'en serait pas augmenté d'un jour, si le baccalauréat ès sciences actuel étant supprimé, comme le propose la Faculté de Médecine de Paris, et s'il était remplacé non par une demi-année, mais par une année entière d'études franchement spécialisées.

C. — Le troisième argument, celui-ci en apparence palpable et sonnant, on ne le présente à nos Ecoles que de la bouche à l'oreille. On laisse deviner (car on ne s'engage pas dans des promesses fermes) que par la suppression de l'enseignement des sciences dans nos Facultés de médecine, tout ou partie de leur budget pourrait passer à d'autres services qui en vérité, en ont besoin.

Mais, c'est pure illusion. D'une part, les cours spéciaux, ceux de chimie biologique, physique et histoire naturelle médicales de nos facultés de médecine ne pourraient disparaître, pas plus que ne pourraient disparaître les cours de chimie ou d'histoire naturelles agricoles dans les Ecoles spéciales d'agriculture; les cours d'histoire naturelle pharmaceutique dans les Ecoles de pharmacie; ceux de chimie industrielle à l'Ecole Centrale; les cours de physique ou de mécanique appliquée à l'art des constructions dans les écoles d'architecture, etc.; d'autre part, sous une forme ou sous une autre, les étudiants auront besoin de travaux pratiques appliqués, et les chaires auront leurs laboratoires de recherches. A moins que vous ne vouliez tout supprimer : les travaux pratiques que ne sauraient suppléer les cours publics ou les livres, les recherches originales qui font la gloire de vos Ecoles, les laboratoires où se forment vos agrégés, où se jurent longtemps à l'avance vos futurs professeurs et où se prépare l'avenir. D'ailleurs, si une partie de ces services était supprimée, ce serait, dans l'esprit du ministère, pour les transférer aux Instituts projetés, et pensez bien qu'avec ces services l'on transporterait les crédits afférents. Car il ne faut point oublier que l'idée-mère de tous ces projets, c'est l'économie.

D. — J'ai dit déjà combien est faux cet argument que la première année est chez nous une répétition, un complément des études du baccalauréat-ès-sciences. Je le prouverai tout à l'heure avec usure. Mais, je pense (et j'ai déjà exprimé, il y a des années, cette opinion) que l'élève médecin devrait dès son début suivre régulièrement des cours d'ostéologie et peut-être d'histologie élémentaire.

Ainsi se passent les choses durant les deux premières années en Allemagne (1). On y réalise doré-

(1) L'étudiant en médecine allemand passe d'abord deux ans dans les Instituts de sciences. Voici comment y est reparti l'enseignement : Première et deuxième année (*hiver*) : chimie, physique, anatomie. — Première et deuxième année (*été*) : histologie, physiologie, botanique. La botanique n'est exigible que des étudiants en médecine; ceux qui étudient la chirurgie remplacent la botanique par un cours d'anatomie comparée. Après ces deux ans, l'étudiant subit un examen de sciences (physique, chimie, anatomie, physiologie) et entre en troisième année à l'Institut de clinique; la quatrième et cinquième années, il suit les polycliniques. Le matin à l'hôpital, le soir aux laboratoires, mais ici facultativement. Ces laboratoires sont ceux d'histologie, anatomie pathologique, pathologie expérimentale, chimie biologique, diagnostic, etc.

et déjà ce que M. de Lacaze-Duthiers demande pour nos Facultés des Sciences : l'enseignement par les professeurs des sciences de l'anatomie et de la physiologie, qui, en effet, ne sont logiquement que des branches des sciences naturelles. Mais n'exagérons rien : apprenons à nos étudiants dès la première année les sciences que nous utiliserons plus tard en physiologie, hygiène et thérapeutique ; ajoutons un peu d'anatomie et d'histologie, et n'essayons pas de faire plus. La physiologie et la clinique sont des livres pour eux fermés tant qu'ils ne connaîtront ni l'anatomie, ni les méthodes exactes d'observation. S'ils ont pris dans nos cours et nos travaux pratiques le goût des choses claires, des raisonnements serrés, de l'observation et de l'expérimentation sérieuses ; s'ils y ont acquis des notions suffisantes de chimie, de botanique et de zoologie *vraiment médicales*, s'ils se sont habitués aux principaux instruments d'observation et aux mesures précises ; s'ils ont pu étudier dès le début les éléments de l'anatomie et de la micrographie, croyez-moi, ils auront fait une bonne première année d'études spéciales, solides, médicales ; une année qu'ils ne feront nulle autre part ; ils auront acquis des idées justes, des méthodes précieuses de raisonnement et d'observation dont bénéficiera largement tout le reste de leur vie médicale.

La Faculté de médecine de Paris, interrogée par le ministre sur le projet de réforme du baccalauréat ès sciences (V. p. 359 et 360) au point de vue de son application aux études médicales, a répondu par l'expression des vœux suivants :

1° N'exiger des futurs étudiants en médecine que la première partie du baccalauréat-ès-lettres actuel ; en un mot ce baccalauréat, moins la philosophie.

2° Employer l'année aujourd'hui consacrée à la philosophie à acquérir les connaissances scientifiques préliminaires, techniques, indispensables aux futurs médecins.

3° La Faculté de médecine réserve seulement la question de savoir où ces études scientifiques préliminaires devront être faites, jusqu'à ce qu'elle connaisse les programmes, plans et moyens pratiques que proposera le ministère pour en assurer la réalisation.

Je n'ai pas à défendre la première de ces conclusions : elle est plus que justifiée. Ce qu'on appelle aujourd'hui *philosophie* dans nos lycées (j'entends celle qui résulte de la préparation de nos élèves au baccalauréat ès lettres) — est un vrai jeu de ma mère Poie. On y fausse le jugement des jeunes gens. Ce n'est plus de la logique, c'est de la casuistique. On dépense à ces exercices une chose sacrée, sans prix, une année toute entière de la vie de nos enfants. Ah ! si nous pouvions disposer d'un an ! Que nous nous hâterions bien plutôt, à cet âge du

développement et de l'exubérance physique, d'envoyer nos jeunes gens bêcher, forger, raboter, chasser, courir, faire des voyages pédestres, vivre en pleins champs, apprendre un métier manuel ! Mais si les dures nécessités de la vie moderne nous en empêchent, du moins, plus de *barbara* ni de *baralypton* ! Certes, nous avons tous fait de la philosophie avec nos grands penseurs, nos grands écrivains, les ouvrages des grands physiiciens et mathématiciens qui ont créé la logique, la métaphysique ou la mécanique presque sans y prétendre, mais tout cela après le collège, à notre heure, et non à force de prétentieuses et indigestes leçons. Plus tard encore, devant les faits naturels, nous nous sommes peu à peu convaincus que ce n'est pas seulement la vue interne, l'observation abstraite du moi, mais bien l'expérimentation et l'observation des réalités concrètes et mesurables, qui font arriver l'homme aux vérités nouvelles, augmentent vraiment sa puissance et grandissent ses conceptions.

L'année de philosophie actuelle est donc condamnée (1). Elle doit être employée aux études scientifiques qui ouvrent l'intelligence, et donnent à nos jeunes gens l'esprit des méthodes et les connaissances réelles indispensables surtout au médecin.

Interrogée par le Ministre sur les projets d'organisation à venir de l'enseignement des sciences, la Faculté de médecine de Paris a donc répondu avec raison, en demandant que l'on remplaceât l'année de philosophie par une année de sciences préparatoires. Mais elle nous paraît avoir agi avec trop peu de décision, avec une modération suivant nous excessive, peut-être imprudente, en réservant la question de savoir où seraient faites ces études de sciences appliquées.

J'ai montré plus haut qu'elles doivent être spécialisées dès le début, et qu'une année entière suffit à peine pour donner à l'étudiant les connaissances scientifiques indispensables qui lui permettront d'aborder plus tard la physiologie, la clinique, la thérapeutique, l'hygiène. Si, vous adressant à ces futurs médecins, vous vous attardez sur la composition et les propriétés de l'air, à peine aurez-vous le temps de leur parler de ses impuretés, de ses miasmes, de ses moisissures, de ses microbes. Après avoir rapidement montré ce qu'est l'eau au point de vue chimique, hâtez-vous de leur faire connaître les caractères des bonnes ou mauvaises eaux potables, les règles pour les choisir, les filtrer, cultiver leurs organismes. N'allez pas oublier surtout les eaux minérales. La toxicologie

(1) Je ne dis pas l'étude ou l'histoire des méthodes de l'esprit humain, étude qui devrait être faite dans toutes les Facultés des lettres et des sciences.

du phosphore, de l'arsenic, de l'antimoine; le danger et la recherche, dans les atmosphères confinées, de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone, etc., etc. voilà ce qu'il faut que sache dès la première année votre étudiant en médecine sous peine de ne le savoir jamais. C'est une toute autre technique qu'il faudra au futur agriculteur, ingénieur, pharmacien, industriel, et voilà justement ce qu'on n'apprendra pas en quelques mois; ce qu'on n'apprendra pas surtout à nos futurs médecins dans les facultés des sciences. Car on nous propose, remarquez-le bien, de partager le temps entre l'étude des sciences générales, et celle des sciences appliquées; de faire un baccalauréat ès sciences, en deux parties. L'une à l'usage de tout le monde, l'autre particulière à chaque carrière. Mais est-il possible après s'être attardé à l'étude des sciences pures dans un cours, ne fût-il que d'un semestre, d'exposer dans le semestre suivant ce qui, dans les sciences chimiques, physiques et naturelles, importe à la médecine, à l'industrie, à l'agriculture même? Encore cette année (car il faut songer à ne pas dépasser la limite de cinq ans pour arriver au doctorat en médecine) cette première année serait-elle coupée par deux examens! Ainsi en quelques mois l'on apprendrait à nos jeunes étudiants, outre les applications médicales innombrables des métaux et des métaux, la chimie organique entière, car il faut que le médecin l'ait entrevue au moins une fois dans sa vie. Jugez de l'entreprise par quelques en têtes de ce programme: L'extraction des principes immédiats des végétaux et des animaux; les alcools et leurs applications: l'alcool-métrie, les alcools toxiques, les liqueurs fermentées, etc., le chloroforme, l'iodoforme, les anesthésiques et antiseptiques modernes, le chloral, le sulfonal, l'antipyrine, l'iodol, le salol, les phénols, la créosote; les essences qu'on utilise, les corps gras, les savons; les sucres, dextrines, amidons, le glycogène; les hydrocarbures et acides aromatiques de nos boissons, de nos médicaments: acides benzoïque, salicylique, caféique, tannique, etc., les couleurs d'aniline, au moins celles qui sont appliquées à frauder les aliments et les boissons; les alcaloïdes du tabac, de la ciguë, de la coca, des strychnées; de l'opium, du quinquina, des solanées; les ptomaines; le camphre; la cantharidine; les térébenthines, les glucosides vénéneux ou utilisables en thérapeutique; les bases animales: corps xanthiques, leucine, lécitines, leucomaines, etc., l'urée et les uréides, les albuminoïdes, chapitre immense essentiellement médical, etc., etc... et tout ceci, il faudra l'apprendre dans un temps très court, sous forme de seconde partie de baccalauréat ès sciences! car quoique préparatoire, il n'est pas un de ces chapitres qui ne soit indispensable, je ne dis

pas seulement pour commencer la physiologie, et pour suivre plus tard utilement un cours de thérapeutique ou de médecine légale, mais même pour entreprendre la chimie biologique, pour expliquer la digestion, le sang, la composition et les transformations des humeurs et des tissus, la nature d'un calcul, d'une excrétion, les fonctions du foie, la constitution des globules blancs ou rouges, la production de chaleur et d'énergie, l'assimilation, en un mot *la vie*. Pour commencer l'étude de cette chimie nouvelle, vraiment médicale et moderne, des phénomènes de la vie du tissu et de la cellule, il faut que vous nous donniez des élèves qui aient satisfait au programme précédent, et vous n'y satisferez que si, dès le début, vous exposez ces matières au point de vue médical. Or cela ne se fera pas en quelques mois et par l'organe des Facultés des Sciences.

Sans doute les programmes que nous proposerons le ministère seront satisfaisants: c'est nous que l'on consultera pour les libeller. Mais faire un programme n'est pas l'exécuter, et nous avons dans nos Facultés le temps bien juste nécessaire pour le remplir en un an, en sacrifiant toutes les généralisations inutiles... Et ce que je dis de la chimie médicale s'appliquerait également aux autres branches des sciences physiques et naturelles.

J'ajoute encore une fois que de ces programmes techniques ne peuvent être enseignés que par des spécialistes: agronomes, ingénieurs, mécaniciens, pharmaciens, médecins et par conséquent dans les Facultés ou Ecoles spéciales.

Grâce à cette suppression de l'année de philosophie et du baccalauréat ès sciences, on aurait donc cet avantage que les jeunes gens, au sortir du collège, se spécialiseraient aussitôt dans la partie des sciences afférentes à leur carrière. Dès lors, pour nos Facultés de médecine par exemple, sans demander à nos jeunes gens à partir du baccalauréat ès lettres un temps plus long qu'aujourd'hui, nous aurions l'avantage de gagner un an et, avant leur service militaire, de faire des docteurs de nos jeunes étudiants. Nous aurions encore l'avantage de ne pas lancer tous ces jeunes gens, grâce à des études générales préliminaires communes, dans une voie qui s'encombrait bientôt et ferait des déclassés.

IV

Nous ne nous sommes pas fait d'illusion en écrivant ces lignes; nous avons dit ce que la raison et l'amour du bien public nous imposaient de dire; le temps fera le reste. Car il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir raison: dans notre pays, chacun se sent tous les jours de plus en plus en tutelle, et avant de se décider, se demande ce qu'il lui en coûterait de déplaire à ses Maîtres. J'entends par là bien

moins ceux qui font ou défont les lois, que ceux-là surtout qui nous mènent grâce à cette puissante machine de gouvernement et de domination, chez nous réorganisée par l'esprit du plus personnel des chefs d'État : la machine administrative. Au milieu des révolutions de notre pays, seule elle est restée debout parce que tous les régimes ont senti quel instrument commode de pouvoir elle centralisait entre leurs mains. Nous assistons à l'entier épanouissement de ce système, et grâce à lui, dans ce généreux pays, avide cependant de libéralisme et d'indépendance, les mœurs sont devenues telles que presque chaque famille a l'honnête ambition de colloquer un au moins de ses enfants dans nos Ministères, comme elle avait autrefois celle de les envoyer à la Cour.

Mais revenons ici aux choses qui regardent plus particulièrement l'Enseignement public : Tout ce que nous venons de demander dans ces quelques pages s'accomplit-il dans nos Écoles spéciales et dans nos Facultés, que cet état de choses serait loin encore de celui qui seul nous paraîtrait garantir l'avenir de notre Enseignement supérieur et propre à lui conserver son lustre et son autorité (1). Gardez, si vous voulez, vos Facultés et vos Ecoles, en en diminuant seulement le nombre, ou bien constituez des Universités régionales, très désirables, si elles sont peu nombreuses, mais avant tout ayez des professeurs multipliés, maîtres de leur enseignement, de leur personnel, de leurs élèves, indépendants chez eux. Que leur nomination et leur avancement soient entre les mains de ces Universités elles-mêmes, l'État ne se réservant de refuser sa sanction que si ces nominations étaient contraires à ses décrets et à ses lois. Et comme il ne faut point imposer au pays de nouvelles charges, tout en sauvegardant l'intérêt général et la haute portée de l'Instruction publique, il convient que ces professeurs, que je crois indispensable de nommer en plus grand nombre, ne reçoivent de l'État qu'un mince traitement, bénéficiant surtout des inscriptions de ces élèves qu'ils sauront attirer autour de leurs chaires et qui resteront libres de choisir les maîtres, titulaires ou adjoints, qu'ils sentiront leur donner le meilleur enseignement.

Simplifiez vos examens, réduisez-les au lieu de les multiplier; qu'ils soient à la fois théoriques et

appliqués, mais qu'ils soient sérieux. Qu'on les prépare comme on le voudra et qu'on les passe quand on le pourra. A l'exception des exercices pratiques très réduits correspondant aux examens à venir, ne rendez vos pavillons et laboratoires abordables qu'à ceux-là seulement qui, leurs premiers grades conquis, voudraient arriver aux positions scientifiques supérieures. Je donnerais volontiers le droit d'exercer la médecine, avec le titre de *médecin*, à tous nos étudiants après qu'ils ont satisfait à leurs examens de doctorat; mais j'exigerais au moins une année supplémentaire d'études de laboratoire, une thèse scientifique, acceptée, après discussion, par une commission de la Faculté, de ceux qui, se destinant au professorat, à la science, aux concours, voudraient arriver jusqu'au grade de docteur en sciences ou de docteur en médecine. Ainsi qu'on le faisait autrefois, je réserverais ce beau titre de *docteur* à ceux-là seulement qui, ces hautes épreuves subies, se sentiraient marcher et avancer dans la voie des maîtres (1).

Soyez-en sûrs, avec ce système vous n'écraseriez pas vos élèves de connaissances ou trop théoriques ou trop complètes ou trop élevées, qui ne sont et ne peuvent être le lot que d'une élite; vous ne confondriez pas dans vos leçons les deux enseignements pratiques et scientifiques. Vous n'inquiéteriez pas les faibles et ne les dégoûteriez pas par de multiples examens; vous ne leur sacrifieriez pas les forts. Vous posséderiez de nombreux maîtres, car ils ne coteraient que bien peu à l'État et ils auraient bientôt fait de se spécialiser, chacun faisant école de ce qu'il connaîtrait le mieux et le communiquant à un petit nombre d'adeptes. Avec ces maîtres multipliés, attirant chacun des élèves, vous auriez bientôt de nombreuses publications qui illustreraient vos laboratoires et vos Ecoles. En laissant à vos professeurs la responsabilité et le profit de leur enseignement, soyez sûrs qu'ils sauraient l'adapter bien vite aux besoins scientifiques ou pratiques, suivant le cas, de chaque catégorie d'élèves; on aurait bientôt fait de se débarrasser des inutilités et des non valeurs, comme on l'a fait en Allemagne. Pourquoi le cacher? Nous lui empruntons en partie ces idées; qu'essaye-t-on de faire mieux que ne l'a pu faire la longue expérience de nos intelligents rivaux? Pas plus qu'eux ne pâlissons à la pensée d'une organisation libérale de l'Enseignement public! Vous craigniez quelques abus? Ils seraient noyés dans le bien général. Croyez-le, comme chez nos voisins, ceux-là surtout attireraient le plus d'écoliers qui joindraient au vrai sens pratique des choses la conception la plus élevée de la science et la plus haute illustration personnelle.

(1) C'est par l'Enseignement secondaire surtout que doit commencer la réforme de l'Enseignement supérieur. C'est dans ces dix années de collège, que l'on devrait surtout apprendre à nos jeunes gens les sciences réelles qu'on propose de leur donner à la sortie du lycée. Faites-en des humanistes, mais amenez-les pour les nécessités de la vie moderne. A propos de cet Enseignement secondaire, il conviendrait d'étudier le système des gymnases et des *Real Schulen* allemands. (Voir mon discours à l'Académie de médecine, *Bulletin*, 26 juillet 1887. Voir aussi le *Premier Bulletin de l'Association nationale pour la Réforme de l'Enseignement secondaire*, Paris, mai 1890.)

(1) C'est ce qui se fait déjà chez nous pour le Droit.

C'est ainsi, c'est en suivant ces principes que vous donneriez à l'enseignement supérieur français une liberté, une dignité d'allures, une vitalité, une puissance de production, une influence qu'aucun de vos projets éphémères et pusillanimes ne lui donneront jamais.

Sous un régime dont le nom même indique la participation de chaque citoyen aux affaires de l'Etat, et le maximum de libéralisme possible, il nous faut dans l'Enseignement plus que des mots et des espérances vaines. A ceux qui respectent les lois, qui veulent ardemment le bien de la nation et y contribuent par leurs actes, leurs services, leur illustration; à ces grandes écoles qui donnent l'enseignement supérieur et qui sont l'honneur de leur pays; à ces Universités que vous rêvez (puissent-elles être aussi grandes et aussi maîtresses d'elles-mêmes qu'autrefois!) il faut laisser une personnalité qui ne dépende absolument que de la loi, il leur faut une âme fière et libre. Il faut que la chaleur de la liberté féconde ces Ecoles d'enseignement supérieur aussi bien que nos autres institutions civiles. Et pour généraliser et rendre toute ma pensée, que pourrais-je faire de mieux que de reproduire ici les véhémentes et justes paroles que M. Paul Deschanel prononçait dernièrement au Corps législatif (1)?

« Efforçons-nous de délivrer, d'affranchir l'État
« de tous les fardeaux inutiles, de toutes les res-
« sibilités compromettantes sous lesquelles il chan-
« celle, il succombe... Cet excès de centralisation,
« cet amas de bureaux qui date de l'an VIII qu'en
« faites-vous? (*Vifs applaudissements.*)... Ce qui est
« nécessaire, c'est de remanier nos institutions à
« la base; c'est de donner au peuple les mœurs et
« les institutions de la liberté, j'entends, la par-
« ticipation de plus en plus grande des citoyens aux
« affaires publiques, leur action peu à peu substituée à
« celle des fonctionnaires, la disparition graduelle de la
« bureaucratie qui est issue du césarisme, enfin la mise
« en harmonie de nos institutions sociales avec notre
« organisme politique. »

A mon tour, je vous dirai : si vous voulez voir prospérer l'Enseignement public qui ne donne pas la fortune, au moins laissez aux maîtres qui s'y dévouent la considération et le bien-être moral du libre exercice de leur conscience et de leurs facultés. Ne leur faites pas répéter ce mot de Guizot encore trop vrai même à cette heure : Dans notre pays l'Enseignement supérieur a toujours été asservi, tantôt à l'Eglise, tantôt à l'Etat.

Armand Gautier,

Membre de l'Académie des Sciences.

L'ÉQUATION FONDAMENTALE DES FLUIDES

On a beaucoup cherché une relation générale entre le volume, la pression et la température, donnant sous n'importe quel état, liquide ou gazeux, l'une de ces quantités en fonction des deux autres.

Dans des limites restreintes, et lorsque les gaz sont assez éloignés de leur point de liquéfaction, on connaît depuis longtemps une forme très approchée de cette fonction : l'expression algébrique des deux lois classiques de Mariotte et de Gay-Lussac, soit :

$$(1) \quad pv = RT$$

v représente le volume occupé par un gaz sous une pression p , à une température t ; T est la même température comptée depuis le zéro absolu; donc $T = 273^\circ + t$. La quantité R est une constante dont il est aisé de fixer la valeur en considérant un gaz sous l'unité de volume et sous l'unité de pression à la température du zéro de la glace fondante. Alors

$$p = 1, \quad v = 1, \quad T = 273^\circ + 0^\circ,$$

d'où l'on déduit $R = \frac{1}{273}$ (2).

Il est dès lors facile de voir que l'équation (1) est bien l'expression des faits. Si la température ne change pas, le second membre, et par suite le produit du volume par la pression, pv , restera constant : c'est ce que demande la loi de Mariotte.

Si, au contraire, la pression restant la même, la température varie, l'équation (1) deviendra, en tenant compte de la valeur $R = \frac{1}{273}$:

$$pv = \frac{1}{273} T, \quad \text{ou} \quad v = \frac{1}{273p} T;$$

donc, pour toute élévation de température de 1° , sous pression constante, le volume augmentera d'une quantité constante égale à $\frac{1}{273}$ de sa valeur : c'est ce qu'exige la loi de Gay-Lussac.

Si l'on songe aux applications nombreuses de ces deux lois, qui, pour ne citer qu'un exemple, ont permis aux chimistes de fixer au moyen des densités de vapeur la grandeur moléculaire de plusieurs milliers de corps, on entrevoit aisément tout l'intérêt qu'il y aurait de connaître la forme générale de la fonction entre les quantités p , v et t ,

le volume au poids moléculaire et en calculant la pression en grammes par centimètre carré de surface. Voyez à ce sujet l'article de M. Etard dans la *Revue* du 15 avril 1890 page 195.

12**

(1) Mai 1890.

(2) Dans un autre système d'unités on donne quelquefois à R la valeur 84500; c'est qu'alors on l'exprime en rapportant

applicable tant aux gaz qu'aux vapeurs et aux liquides.

Depuis quinze ans environ, plusieurs physiiciens et savants éminents, notamment M. van der Waals (1) en Hollande, M. Sarrau (2) en France et Clausius (3) en Allemagne ont publié sur cette intéressante question une série de travaux qui lui ont fait faire un grand pas.

Bien que nous ne connaissions pas encore l'équation générale des gaz et des liquides sous sa forme définitive et rigoureusement exacte, nous sommes aujourd'hui en état de la représenter avec une très grande approximation par une formule ne contenant qu'un petit nombre de constantes. Ce sont ces résultats et les conséquences qu'on en déduit que nous nous proposons d'analyser ici, en prenant d'abord pour guide le mémoire de M. van der Waals.

I. — L'ÉQUATION FONDAMENTALE

Les physiiciens d'aujourd'hui, reprenant l'hypothèse de Daniel Bernouilli, admettent qu'une masse gazeuse est formée d'un nombre considérable de molécules animées de mouvements rapides de translation.

Ces molécules rencontrent les parois des vases qui renferment les gaz, de sorte que la pression est la résultante des chocs des molécules contre ces parois. Le calcul démontre que les lois de Mariotte et de Gay-Lussac, représentées par l'équation (1) donnée plus haut, sont des conséquences toutes naturelles de l'hypothèse de Bernouilli.

Mais, pour arriver à ce résultat, on néglige deux facteurs importants. D'une part, on ne tient aucun compte de l'attraction des molécules gazeuses les unes pour les autres, attraction d'autant plus appréciable que la matière gazeuse est plus comprimée et que ses particules sont par conséquent plus rapprochées.

On assimile d'autre part ces dernières à de simples points matériels sans dimensions, de sorte que, si l'on considère une masse gazeuse renfermée dans un vase cubique par exemple, on admet,

— dans l'hypothèse de Bernouilli, — que le chemin parcouru par une molécule se transportant normalement d'une paroi du récipient à la paroi opposée est strictement égal à la distance séparant ces deux parois. Si l'on veut tenir compte du volume de la molécule, il n'en est plus ainsi, et le chemin parcouru par le centre de gravité de la molécule est alors égal à la distance séparant les deux parois, diminuée de deux fois la distance comprise entre le centre de gravité de la molécule et la paroi au moment du choc.

M. van der Waals a cherché ce que devenait l'équation (1) indiquée plus haut, lorsqu'on veut tenir compte de ces deux corrections, et, il a trouvé qu'il fallait ajouter à la pression un terme égal à $\frac{a}{v^2}$ désigné sous le nom de *pression interne*, et retrancher du volume une quantité constante b que l'on a appelée le *covolume*.

La pression interne n'est au fond qu'une pression égale à la résultante des attractions réciproques des molécules; la constante a a donc reçu le nom d'*attraction spécifique moléculaire*; quant au covolume, il est, d'après M. van der Waals, un multiple — le quadruple — du volume total et invariable occupé par les molécules gazeuses. Dans ces conditions l'équation des gaz devient, en donnant aux lettres p , v , T , les mêmes significations que précédemment :

$$(2) \quad \left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

R est une constante numérique dépendant des conditions initiales des expériences et du choix des unités. Les constantes a et b sont numériquement très petites et inférieures à l'unité (1).

(1) L'exposé des raisonnements qui ont conduit M. van der Waals à ce résultat important occupe plus de 60 pages dans son remarquable mémoire. Bien qu'il soit impossible de les analyser ici par suite des nombreux développements mathématiques que comporte cette question, il y a cependant quelque intérêt à indiquer sommairement la marche suivie par le savant Hollandais :

Les considérations par lesquelles Laplace (théorie de la capillarité) a réduit l'effet de l'attraction moléculaire à une pression normale exercée sur la surface d'un liquide s'appliquent également aux corps gazeux. À la pression extérieure, il faut donc ajouter celle due aux attractions réciproques des molécules. Dans ces conditions M. van der

Waals établit entre la force vive du système $\sum \frac{1}{2} m V^2$, le volume v , la pression extérieure N et la pression interne (ou moléculaire) N' , une première relation de la forme :

$$\frac{3}{2} (N + N') v = \sum \frac{1}{2} m V^2$$

Mais cette équation n'est vraie que dans l'hypothèse de molécules sans dimensions, c'est-à-dire assimilées à de simples points matériels. M. van der Waals se demande alors quelle correction il faut y apporter lorsqu'on substitue à ces molécules hypothétiques des molécules réelles de dimensions finies.

C'est alors qu'il fait remarquer que ces dimensions molé-

(1) Van der Waals : *Die Continuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes*, Leipzig, 1881 (traduction d'une thèse en hollandais publiée en 1873). — Voir une analyse de ce travail : *Arch. de Genève* (3) 22.540.

(2) Sarrau, *Journ. de Phys.* (1) 2.318 (1873). — *C.R.* 94.639, 718, 845 (1882). — *C.R.* 101.951 (1885) — *C.R.* 110. 28 avril 1890.

(3) Clausius, *Wied. Ann.* 9.127 (1879). — *Wied. Ann.* 14.279 et 692 (1881). Consulter parmi les travaux plus anciens ou moins complets : Rankine, *Phil. Trans.* 1854 p.336. Hirn, *Théorie mécanique de la chaleur*, 2^e édition, I, 195, 3^e édition, II, 211. — Recknagel, *Pogg. Ann. Ergbd.* 5. 563 et 114.469 (1872). — Budde, *Journ. f. prakt. Chemie*, 9.30 (1874). Pour compléter ces renseignements bibliographiques, voir les travaux suivants en cours de publication : Tait, *Proceed. R. Soc. Edinburgh* 1889-1890. — Nattanson, *C. R.* (1889-1890). — Guye, *C. R.* 1890). — *Arch. de Genève* (1890).

Nous essaierons de montrer que cette équation rend compte de toutes les propriétés des gaz et des vapeurs ; qu'elle fait prévoir et réunit dans un même corps de doctrines un grand nombre de faits d'expérience qui avaient paru jusqu'alors absolument hétérogènes. Enfin, sans être rigoureusement applicable aux liquides, elle permet d'en découvrir plusieurs propriétés importantes. C'est donc bien l'équation fondamentale des fluides.

II. — PROPRIÉTÉS DES GAZ

Nous rappelons au début de cet exposé que les gaz considérés à des températures assez éloignées de leur point de liquéfaction suivent avec une exactitude très satisfaisante les deux lois de Mariotte et de Gay-Lussac. L'équation fondamentale des fluides va nous montrer qu'il doit en être ainsi.

En effet, aux températures élevées, le volume occupé par un gaz est considérable. Les constantes a et b étant, d'autre part, beaucoup plus petites que l'unité, la fraction $\frac{a}{v^2}$ sera négligeable relativement à p , ainsi que le terme b relativement à v . Les termes $\frac{a}{v^2}$ et b disparaissant de l'équation (2), celle-ci se confondra avec l'équation (1) qui représente les lois de Mariotte et de Gay-Lussac. Ces deux lois deviennent donc des conséquences né-

cessaires de l'hypothèse de Bernouilli convenablement interprétée.

Revenons maintenant au cas où le gaz se rapproche du point de liquéfaction. L'expérience démontre que, si l'on comprime un gaz à température constante, le produit du volume par la pression, pv , ne reste pas constant, ainsi que cela devrait être si la loi de Mariotte était rigoureusement exacte. A mesure que la pression s'élève, le produit pv diminue jusqu'à une certaine valeur minimum à partir de laquelle il repasse par des valeurs croissantes. Graphiquement, le produit pv ne peut donc être représenté par une droite parallèle à l'axe des pressions ; il doit être au contraire figuré par une courbe affectant à peu près la forme suivante (fig. 1, Amagat) :




Fig. 1.

Or, de l'équation (2) on peut tirer la valeur de pv

$$(3) \quad pv = RT - \frac{a}{v} + \left(\frac{ab}{v^2} + bp \right);$$

et il est facile de voir que cette valeur de pv est l'expression même des faits.

A température constante, le premier terme du second membre ne changera pas. En outre, on sait qu'à de faibles valeurs de p (c'est à-dire à de faibles pressions) correspondent des valeurs relativement grandes de v (c'est à-dire de grands volumes).

De là résulte que le terme négatif $\frac{a}{v}$ l'emportera

d'abord sur le terme positif $\left(\frac{ab}{v^2} + bp \right)$ et que, conformément à l'expérience, les valeurs de pv devront d'abord décroître. Mais, à mesure que la pression p s'élève, on sait aussi que v diminue, de sorte qu'à partir d'une certaine valeur de p , le terme positif $\left(\frac{ab}{v^2} + bp \right)$ l'emportera à son tour sur le terme négatif $\frac{a}{v}$ et que les valeurs de pv , après avoir passé par un minimum, prendront à leur tour des

culaires ont pour effet de diminuer le chemin moyen parcouru par les molécules dans le temps qui s'écoule entre deux chocs consécutifs et d'accroître par conséquent le nombre de chocs survenant dans un temps donné. Cet effet équivaut à une diminution de volume dont on peut tenir compte en ajoutant à v un terme soustractif $-b$.

En étudiant les conditions variées dans lesquelles les chocs moléculaires peuvent se produire, M. van der Waals établit que ce terme $-b$ est égal à quatre fois le volume réellement occupé par les molécules et qu'il faut alors remplacer N et N' par N' et N'_1 , ces quantités étant reliées entre elles par la formule :

$$\frac{N' + N'_1}{N + N'_1} = \frac{v}{v - b}.$$

De là résulte que l'équation donnée plus haut doit être remplacée par la suivante :

$$\frac{3}{2} (N' + N'_1) (v - b) = \sum \frac{1}{2} m V^2.$$

M. van der Waals montre ensuite comment on peut regarder l'attraction moléculaire comme proportionnelle au carré de la densité, ce qui lui permet d'exprimer N' par un terme de la forme $\frac{a}{v^2}$. Observant enfin que N' n'est autre que la pression extérieure p , et qu'en outre, d'après les idées reçues, la force vive $\sum \frac{1}{2} m V^2$ est proportionnelle à la température absolue, il arrive à remplacer l'équation précédente par :

$$\left(p + \frac{a}{v^2} \right) (v - b) = RT$$

où R étant une constante.

valeurs croissantes (1). On voit donc que l'équation (4) fait prévoir des variations de la quantité pv tout à fait d'accord avec celles qu'indique l'expérience; ces écarts de la loi de Mariotte, bien loin de constituer une anomalie inexplicable, apparaissent dès lors comme une conséquence nécessaire de l'équation fondamentale des fluides.

L'étude des formes que prend cette équation lorsqu'on examine la dilatation des gaz à pression constante et à volume constant, nous conduirait d'une façon analogue à des résultats bien vérifiés par les faits. Nous les laissons de côté pour passer à une question présentant plus d'intérêt.

III. — LES TROIS ÉTATS

Reprenons l'équation fondamentale, et ordonnons-la par rapport à v :

$$(4) \quad v^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right)v^2 + \frac{a}{p}v - \frac{ab}{p} = 0.$$

Cette équation est du 3^e degré en v . Or, comme toute équation du 3^e degré possède ou trois racines réelles ou une seule racine réelle (les deux autres devenant alors imaginaires), nous concluons qu'un même corps est susceptible de se présenter dans de certaines conditions de température et de pression avec trois volumes caractéristiques ou avec un seul.

C'est ce que l'expérience vient confirmer : Si nous considérons, en effet, les corps au-dessus de leur température critique, — soit la température au-dessus de laquelle il est impossible de liquéfier une vapeur par la compression, — nous ne leur connaissons qu'un seul volume caractéristique : leur volume de vapeur. Si nous soumettons ensuite ces mêmes corps à des températures assez basses pour que, passant à l'état liquide, leur tension de vapeur devienne nulle ou négligeable, nous n'observons également qu'un seul volume caractéristique : leur volume de liquide.

Enfin, entre ces limites extrêmes de température, un corps quelconque est susceptible d'exister sous trois états présentant chacun un volume caractéristique : l'état liquide, l'état de vapeur et un troisième état, intermédiaire entre les deux premiers, très instable dont l'existence, prévue par M. Lecoq de Boisbaudran et par M. J. Thomson, se trouve ainsi confirmée par la théorie. Cet état instable, avec lequel nous sommes loin d'être bien familiarisés, joue probablement un rôle important dans les phénomènes météorologiques. Quelques savants ont en effet admis que la vapeur d'eau des hautes

régions de l'atmosphère se trouve parfois sous ce troisième état instable. On expliquerait ainsi certaines pluies subites et torrentielles dont il est difficile de rendre compte par la simple condensation de la vapeur d'eau à la suite d'un abaissement de température.

Au point de vue expérimental, ce troisième état, intermédiaire entre l'état liquide et l'état de vapeur, est étroitement relié aux phénomènes de retard d'ébullition et de retard de liquéfaction, de sorte qu'on peut le définir comme l'état limite vers lequel tendent les liquides surchauffés d'une part et les vapeurs surcomprimées d'autre part.

On voit donc que l'équation fondamentale dont nous sommes partis fait prévoir, comme une conséquence nécessaire, l'existence d'un fluide sous trois états : l'état liquide, l'état de vapeur et l'état instable de M. Lecoq de Boisbaudran et de M. Thomson, ainsi que la possibilité des phénomènes de retard d'ébullition et de retard de liquéfaction. Cette même équation va nous conduire encore à une notion bien plus importante.

IV. — LE POINT CRITIQUE

Les coefficients des termes en v^2 et v de l'équation (4) dépendent à la fois des constantes a , b , R , et de deux éléments variables, la pression p et la température T , qui se trouvent eux-mêmes fixés par les conditions des expériences. On peut dès lors concevoir que les coefficients de v^2 , v et le terme connu $\frac{ab}{p}$ prennent des valeurs telles que les trois racines de l'équation (4) deviennent égales, en d'autres termes que les volumes d'un corps à l'état liquide, à l'état gazeux et à l'état instable deviennent eux-mêmes identiques. Cette condition est précisément réalisée au *point critique*. L'expérience démontre, en effet, que le volume de la vapeur tend à s'identifier avec celui du liquide à mesure que l'on se rapproche de part et d'autre du point critique : à plus forte raison doit-il en être de même pour le volume caractéristique de l'état instable, ce volume étant toujours compris entre le volume de la vapeur et celui du liquide.

On peut aller encore plus loin : Il existe des relations algébriques nécessaires entre les racines d'une équation du 3^e degré et les coefficients de celle-ci, lorsque ses trois racines deviennent égales. Au moyen de ces relations, et en désignant par π , θ et φ les valeurs que prennent p , T , et v au point critique, on a pu établir des équations de condition entre les constantes a et b et les constantes critiques π , θ et φ . Ces équations sont :

$$(5) \quad b = \frac{\varphi}{3} \quad (6) \quad a = 3\pi\varphi^2$$

1) La condition du minimum, donnée par l'analyse, est $\frac{a}{v} = \frac{2ab}{v^2} + bp$.

$$(7) \quad \frac{3}{8 \times 273} \Theta = \frac{\pi \varphi}{(1 + 3\pi \varphi^2) \left(1 - \frac{\varphi}{3}\right)}$$

Pourvu que l'on ait déterminé la pression critique et la température critique d'un corps, on peut donc calculer la valeur des constantes a et b , et, introduisant ensuite ces valeurs de a et de b dans les équations précédentes, les employer pour diverses vérifications. Nous en reproduisons deux exemples qui donneront une idée de la précision à laquelle on peut arriver.

M. van der Waals a trouvé que la température critique de l'éthylène est de $+9^{\circ},3$ et sa pression critique de 58^{atm} . En d'autres termes, dans l'équation (7), $\Theta = 273 + 9,3$, et $\pi = 58$; cette équation donnera la valeur de φ ; celle-ci au moyen de l'équation (5) la valeur de b , et de l'équation (6) enfin on tirera la valeur de a . Tous calculs faits, on a trouvé $a = 0,0101$ et $b = 0,0029$.

Si l'on introduit ces valeurs de a et de b dans l'équation (3), on pourra calculer des valeurs du produit p_v à une température donnée, et si les théories qui viennent d'être exposées sont fondées, ces valeurs devront s'identifier avec celles qu'indique l'expérience. Cette vérification a été faite par M. Baynes (1) au travail duquel nous empruntons les chiffres suivants; ils sont relatifs à la température de 20° :

Pression en atmosphères	Produit p_v calculé	Produit p_v observé
45,80	782	781
84,16	392	399
133,26	520	520
282,21	940	941
398,71	1254	1248

L'accord est très satisfaisant. Il en est de même de l'exemple suivant extrait d'un travail de M. Korteweg (2). Le coefficient moyen de dilatation de l'acide carbonique a été calculé à l'aide des valeurs de a et de b , telles qu'elles sont données par la détermination des constantes critiques de ce gaz. L'accord entre les résultats du calcul et de l'expérience est encore plus remarquable:

Coefficient moyen de dilatation de CO_2

De 0° à t°	Formule de M. van der Waals	Trouvé par M. Amagat
$t^{\circ} = 50$	0,003714	0,003714
110	0,003711	0,003711
150	0,003708	0,003706
200	0,003705	0,003704
250	0,003703	0,003703

V. — LES ÉTATS CORRESPONDANTS.

Nous avons fait remarquer au début de cette étude que l'équation des fluides, sans être rigou-

reusement applicable à toute l'étendue de l'état liquide, permettait cependant de déduire plusieurs propriétés remarquables des liquides. Nous ne suivrons pas M. van der Waals dans les développements analytiques qui l'ont conduit à sa théorie fort ingénieuse des *états correspondants*. Il nous suffira d'en indiquer les résultats qui sont assez frappants pour attirer l'attention.

Physiciens et chimistes se sont en effet demandé depuis longtemps dans quelles conditions les propriétés des liquides sont comparables. On avait fait à ce sujet plusieurs hypothèses; quelques auteurs avaient supposé ces conditions remplies à la température d'ébullition sous la pression atmosphérique; d'autres, moins nombreux, à des températures et sous des pressions identiques. Toutes ces manières d'envisager la question, absolument arbitraires, se sont trouvées en contradiction avec les faits.

Or, voici que l'équation fondamentale des fluides permet d'établir, de la façon la plus inattendue, que les propriétés des liquides sont comparables lorsqu'on les considère sous des pressions représentant des fractions égales de leurs pressions critiques et à des températures représentant aussi des fractions égales de leurs températures critiques. L'expérience confirme ces prévisions, pour autant du moins qu'on possède les éléments suffisants de vérification.

En d'autres termes, si nous envisageons plusieurs liquides dont les températures critiques soient $\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3, \dots$ et les pressions critiques $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \dots$; ces liquides seront dans des conditions comparables toutes les fois qu'ils se trouveront à des températures $T_1, T_2, T_3, \dots$ et sous des pressions $p_1, p_2, p_3, \dots$ telles que les relations suivantes soient satisfaites:

$$(8) \quad \frac{T_1}{\Theta_1} = \frac{T_2}{\Theta_2} = \frac{T_3}{\Theta_3} = \dots$$

$$(9) \quad \frac{p_1}{\pi_1} = \frac{p_2}{\pi_2} = \frac{p_3}{\pi_3} = \dots$$

Lorsque les températures satisfont la relation (9) on dit que ces températures sont *correspondantes*; on désigne de même les pressions satisfaisant la relation (10). Enfin, si ces deux conditions sont remplies, les liquides se trouvent à des *états correspondants*.

VI. — CONCLUSIONS.

Il nous reste à dire quelques mots de deux équations plus compliquées par lesquelles on peut remplacer la formule de M. Van der Waals:

$$(10) \quad \left(p + \frac{a}{T(v + \beta)^2}\right)(v - b) = RT$$

$$(11) \quad \left(p + \frac{k e^{-T}}{v + \beta^2}\right)(v - b) = RT.$$

(1) Baynes, Beiblätter 4,704 (1880).

(2) Korteweg, Pogg. Ann. NF. 12,446 (1881).

La dernière a été proposée par M. Sarrau, la première par Clausius. Elles ne diffèrent de l'équation de M. van der Waals que par le mode d'évaluation de la pression interne. Cette quantité serait non seulement une fonction du volume, — ainsi que M. van der Waals l'admet — mais encore une fonction de la température.

Nous avons mentionné dernièrement (1) la brillante vérification que M. Sarrau a donnée de la formule qu'il propose. Aucune des deux autres équations n'a été vérifiée dans des limites aussi étendues.

Rappelons cependant que ces trois relations, bien que de formes un peu différentes, donnent, pour les applications numériques, des résultats, sinon identiques, du moins très voisins, et qu'au point de vue des déductions théoriques que nous venons d'exposer, les trois formules, celle de M. van der Waals, celle de Clausius et celle de M. Sarrau conduisent d'une manière générale aux mêmes résultats. Toutes trois font prévoir qu'un

fluide est susceptible d'exister sous trois états, l'état liquide, l'état gazeux et l'état instable intermédiaire. Toutes trois nous montrent que les lois de Mariotte et de Gay-Lussac ne peuvent être vraies que dans certaines conditions et que, lorsque ces lois sont en défaut, les écarts, bien loin de constituer des anomalies embarrassantes, sont au contraire des conséquences nécessaires de l'hypothèse fondamentale sur la constitution des gaz. Toutes trois enfin conduisent à une notion précise du point critique et permettent de fixer les conditions dans lesquelles les propriétés des liquides deviennent comparables. C'est là un point capital. Le jour où un ensemble d'expériences décisives permettra de se prononcer définitivement pour l'une ou l'autre de ces équations, nous sommes assurés d'avance que les résultats importants qu'on a su en dégager n'en resteront pas moins acquis à la science.

Philippe A. Guye.

Docteur ès sciences.

REVUE ANNUELLE DE ZOOLOGIE

A propos d'une Revue de zoologie pour 1889, j'ai eu la curiosité de tenter, à ce point de vue spécial, une comparaison entre les années 1789 et 1889. J'ai dû bientôt abandonner ce projet en raison du petit nombre des mémoires publiés il y a un siècle. C'est seulement par l'analyse d'une période de plusieurs années consécutives qu'on peut juger des progrès de la Science, quand on se reporte à une date aussi éloignée de nous, et c'est ainsi en effet qu'on pratiquait alors à la Société philomatique, où nous voyons en 1792, le secrétaire Riche présenter un rapport embrassant l'ensemble des travaux publiés de 1788 à 1792 et plus tard le rapport de Sylvestre s'étendre sur la période de 1792 à l'an VI. Il suffit d'ailleurs de parcourir les recueils scientifiques d'alors pour être complètement édifié sur ce point. En 1790, par exemple, les *Mémoires de l'Académie* ne contiennent que trois travaux ayant trait à l'histoire naturelle, l'un sur les muscles situés à la partie antérieure du col, par Sabatier, le second sur les muscles droits du ventre, par le même, le troisième enfin sur la transpiration des animaux par Seguin et Lavoisier. Les *Philosophical Transactions* de Londres ne donnent à la même date qu'un mémoire sur l'ambre gris; on ne trouve rien dans les *Transactions of the Royal Society*

d'Édimbourg, un seul mémoire anatomique dans les *Nova Acta de l'Académie de Saint-Petersbourg*, et ainsi de suite. Les temps sont bien changés, et s'il me fallait aujourd'hui faire la simple énumération de tous les travaux, mémoires ou notes parus dans le courant de l'année 1889, la place qui m'est réservée pour cet article ne suffirait pas. Aussi bien n'ai-je pas la prétention de dresser dans les pages qui suivent un état complet des travaux que nous devons aux zoologistes. Je m'en tiendrai aux questions qui m'ont paru plus particulièrement préoccuper les esprits en ce moment et encore serai-je, en ces matières, intentionnellement incomplet, ne voulant pas m'attarder à divers points qui feront l'objet d'articles spéciaux que doit publier ultérieurement la Revue, ou qui ont déjà fait dans ce Recueil le sujet d'études détaillées.

I

Il est des sciences comme la chimie, la physique, l'astronomie, etc. dont le domaine est si bien défini qu'il ne viendra à l'idée de personne de dissertar sur ses limites; or ce n'est pas le cas de la zoologie. Pendant de longues années cette science, sous l'impulsion de Linné, fut réduite à la seule étude des caractères extérieurs et à la classification, et même après que Cuvier eût montré que l'anatomie, aussi bien celle des animaux vivants que celle des formes disparues (paléontologie) ne

(1) Voir *Revue Générale des Sciences* du 15 mai 1890, p. 288.

pouvait être séparée de la zoologie, nombre de zoologistes se refusèrent à entrer dans cette voie. Les progrès les plus récents des sciences ont montré dans toute son évidence la justesse des vues de Cuvier et aujourd'hui c'est d'un accord à peu près unanime qu'on fait rentrer dans la zoologie non seulement l'anatomie, mais encore l'embryologie, la physiologie, l'anthropologie, en un mot toutes les branches de la biologie animale. Mais comme cette conception nouvelle de la zoologie ressort des progrès mêmes de nos connaissances, elle s'affirme davantage à mesure que ces progrès grandissent, et la question est toujours actuelle. Cela est si vrai qu'au Congrès de Zoologie tenu à Paris pendant l'Exposition nous voyons le Professeur Perrier lire un rapport sur « les services que l'embryogénie peut rendre à la classification » ; dans la même réunion, M. Filhol présente une étude sur « les liens qui rattachent la zoologie à la paléontologie » et M. Topinard traite « de l'anthropologie dans ses rapports avec la zoologie ». Même préoccupation en Angleterre où le Professeur Flower, président de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, insiste dans son discours d'ouverture traitant « des Musées d'histoire naturelle » sur les rapports intimes qui existent entre l'anthropologie et la zoologie, entre l'anatomie comparée et la paléontologie. Il déplore l'organisation défectueuse d'un grand nombre de Musées où, en dépit des progrès de la Science, la paléontologie et la biologie se trouvent séparées « au point d'empêcher de suivre le développement naturel des rapports existant entre les différentes branches de la Science. » Enfin, le Professeur de Lacaze-Duthiers, Président de l'Association française pour l'avancement des sciences en 1889, a choisi pour sujet de son discours d'ouverture « la méthode en zoologie ». La zoologie, affirme-t-il, doit être *expérimentale*. L'éminent professeur de la Sorbonne tient beaucoup à ce caractère expérimental et il a longuement défendu son idée dans un article publié en 1872 en tête du premier volume de ses « Archives de zoologie expérimentale ». Ce n'est pas ici le lieu d'examiner jusqu'à quel point il est nécessaire de substituer le terme « *expérimental* » à celui « *d'observation* », le fait important à retenir c'est que, pour M. de Lacaze-Duthiers, la Zoologie ne peut progresser sans le secours des diverses branches de la biologie.

Il résulte de tout cela que dans une revue de zoologie nous avons à envisager à la fois les travaux qui portent sur ces différentes branches. Pour mettre un peu d'ordre dans l'exposé, il nous paraît utile d'examiner séparément ceux de ces travaux qui font à l'hypothèse la plus large part et

ceux, plus positifs, qui font passer l'étude attentive des faits avant les théories.

II

Le grand problème de l'Évolution est toujours au premier rang des préoccupations des zoologistes. La théorie de Darwin basée sur la « sélection naturelle », ou « survivance du plus apte », après une fortune inouïe, semble perdre quelque peu de terrain. Les enthousiastes avaient hardiment exploité l'idée nouvellement exprimée ; la sélection levait tous les voiles ; elle est invitée aujourd'hui à plus de modestie. De deux côtés en effet, d'Amérique et d'Allemagne, nous arrivent des interprétations différentes des lois de l'Évolution. En Amérique une École dite néo-Lamarkienne tend à donner plus d'importance qu'on ne l'a fait encore aux deux grands principes de Lamarck : 1° modifications d'organes sous l'influence du milieu, de l'usage ou du défaut d'usage ; 2° hérédité qui fixe les caractères acquis. En Allemagne une nouvelle théorie de l'hérédité nous est offerte par le professeur Weissmann.

Pour ce qui regarde l'École néo-Lamarkienne, nous relevons un mémoire de B. H. Osborn sur les preuves qu'apporte la paléontologie à la transmission des caractères acquis. Sans rejeter le principe de la sélection naturelle, l'auteur pense que ce principe ne peut tout expliquer et qu'il ne saurait s'appliquer en particulier à certaines variations, très fréquentes, qui relèvent de l'adaptation mais qui ne sont pas utiles au début et ne le deviennent qu'en s'accumulant. Comme exemple de variations de cet ordre emprunté à la paléontologie, Osborn signale le développement du squelette et spécialement celui des dents qu'on peut suivre pas à pas dans leur évolution phylogénique depuis la forme conique simple, propre aux premiers mammifères, jusqu'aux molaires composées, d'origine plus récente. Ici la question d'usage et de non-usage a une place prééminente aussi bien que l'hérédité des caractères acquis. Mais pour répondre à certaines critiques qui lui ont été faites, l'auteur fait observer que ce n'est pas, comme le pensait Lamarck, la transmission des modifications adaptatives elles-mêmes qu'il faut entendre, mais la transmission de la disposition à ces modifications ; dans le cas particulier des dents, ce n'est pas la croissance elle-même, mais les réactions qui produisent cette croissance dans le tissu vivant que l'on suppose être transmises. L'hypothèse, on le voit, est subtile. Il est peut-être opportun d'opposer à l'École néo-Lamarkienne les paroles suivantes que Flower prononçait dans son discours à l'Association pour l'avancement des sciences de Londres : « Le fait de dire que telle partie de l'organisme d'un animal ou

d'une plante, ou telle habitude ou instinct dont il est doué, sont sans utilité ou même sont nuisibles, me paraît une présomption que nous ne sommes pas autorisés à avoir dans l'état actuel de la Science. » Combien cette observation a plus de force encore quand elle s'applique à des êtres disparus dont il ne nous reste que des débris !

Depuis plusieurs années le professeur Weissmann a publié sur l'hérédité divers mémoires qui viennent d'être réunis en un ouvrage édité à Londres. La nouvelle théorie est absolument en désaccord avec les idées de Darwin et de Lamarck sur l'hérédité. Weissmann en effet repousse catégoriquement la possibilité de la « transmission des caractères acquis » qui était précisément l'une des bases des précédentes théories ; il n'accepte que la transmissibilité des caractères congénitaux c'est-à-dire de ceux que possède l'individu en naissant. On conçoit toute l'importance d'une vue semblable qui ne tend à rien moins qu'à annihiler ou à reléguer à l'arrière plan la sélection naturelle. Celle-ci en effet est réduite à ne plus avoir d'action que sur des modifications de rencontre, de hasard, dues au mélange de deux efforts héréditaires, ou sur les êtres affaiblis par les accidents ou la maladie, qu'elle fera disparaître au profit des plus forts.

Pour expliquer le lien qui unit tous les animaux et rend compte des faits d'hérédité, d'atavisme, etc., Weissmann part des êtres unicellulaires ou monoplastidés auxquels il accorde une immortalité potentielle. Suivant Weissmann, les Protozoaires sont d'organisation si simple qu'ils se trouvent par là même à l'abri de l'usure physiologique, et comme d'autre part ils se multiplient par division, les deux moitiés résultant de cette division jouissent de la même puissance physiologique. Mais chez les animaux pluricellulaires, ce n'est plus la division simple qui préside à la multiplication de l'espèce : de là vient qu'ils ne jouissent pas de l'immortalité comme les Protozoaires ; toutefois potentiellement l'immortalité subsiste pour les cellules-germes qui existent dans chaque individu pluricellulaire et qui constituent la matière héréditaire. Ces cellules-germes, en s'associant, produisent les nouveaux organismes, et de leur union procèdent les variations congénitales sur lesquelles agit la sélection naturelle.

La théorie de Weissmann a subi déjà de multiples assauts. Cette année encore M. Maupas, dans un très intéressant mémoire sur la multiplication des Infusoires ciliés, lui porte un coup d'autant plus sensible que l'auteur est mieux placé par ses études approfondies pour avoir une idée juste de la biologie des Protozoaires. M. Maupas fait tout d'abord remarquer que bien avant Weiss-

mann, Ehrenberg avait eu l'idée de l'immortalité des Infusoires : « La propagation des Infusoires, dit Ehrenberg, par divisions fissipares, supprimant toute probabilité de destruction possible de l'individu, leur confère une permanence potentielle et une dissémination dans les mers et l'espace, qui, envisagées poétiquement, ressemblent à l'immortalité douée d'une éternelle jeunesse. » C'est en effet au rang des idées poétiques et des rêveries qu'il faut placer, si nous en croyons les arguments de M. Maupas, l'immortalité des Protozoaires. Cet observateur conclut de ses nombreuses cultures que les Infusoires « n'échappent pas à la loi générale de la sénescence ; il s'usent et vieillissent par le jeu et l'exercice même de leurs fonctions ». Quant à l'équivalence physiologique parfaite entre les deux moitiés du Protozoaire résultant d'une unique répartition elle semble en effet admissible, mais M. Maupas nie qu'elle se perpétue et se maintienne sans modifications de génération en génération. Ainsi tombe tout cet échafaudage ; « la théorie de l'immortalité des monoplastidés n'est qu'une hypothèse *a priori* sans base solide ni scientifique. »

L'étude des organismes inférieurs paraît d'ailleurs appelée à causer bien des embarras aux théoriciens qui cherchent à tout expliquer d'après les données que leur fournit l'étude de phénomènes plus ou moins complexes observés chez les êtres élevés en organisation. Nous en avons une nouvelle preuve dans une courte, mais très substantielle note de M. Khawkine, sur le principe de l'hérédité et les lois de la mécanique appliquées à la morphologie des êtres unicellulaires. M. Khawkine démontre par l'application des lois ordinaires de la mécanique que chez un Infusoire (*Paramœcium aurelia*), « le travail des cils est un facteur qui peut changer les contours extérieurs de la cellule ». Il examine ensuite quelle est la puissance développée par les cils et il arrive à cette conclusion « que la force avec laquelle le cil produit une pression latérale sur le corps est plus grande que la ténacité de ce dernier, et par suite est suffisante pour produire des enfoncements sur le corps ». Ainsi s'explique tout naturellement la présence du péristome chez la Paramécie. L'auteur oppose cette explication si simple à celle qui a été récemment donnée de la formation du péristome d'un autre Infusoire (*Bursaria truncatella*). La transmission héréditaire avait été invoquée, comme on pouvait s'y attendre, sans que l'on se préoccupât de ce fait que chez *Bursaria* aussi bien que chez la Paramécie le péristome n'apparaît que secondairement. M. Khawkine conclut en disant qu'il est temps enfin de rechercher dans les lois élémentaires de la nature l'explication des faits

que nous offre la biologie des organismes inférieurs. Nous ajoutons qu'on pourrait se préoccuper également de faire la même application à maints phénomènes observés chez les animaux plus compliqués.

L'aperçu que nous venons de donner montre combien est mouvant le sol sur lequel se tiennent les théoriciens. Le moment nous paraît venu pour reprendre équilibre, de rappeler la phrase suivante du discours de M. de Lacaze-Duthiers cité plus haut : « Ce ne sera que par l'expérience que les grandes questions de philosophie seront résolues, que les discussions soulevées par les convictions froissées, les assertions hasardées, les déductions dites philosophiques, les synthèses aventureuses, manquant trop souvent de bases solides, seront justement appréciées ou définitivement établies. » Ceux des zoologistes, dit encore M. de Lacaze-Duthiers, « qui demandent tout d'abord des données positives avant les données hypothétiques sont accusés sans ménagement de ne voir que les faits ». S'ils gardent quelque triste impression de ce procédé, ils peuvent se consoler en constatant l'impuissance des théoriciens à outrance.

III

La descendance des Vertébrés est un des cas particuliers du problème général de l'Évolution qui attire tout spécialement l'attention. Les zoologistes constatant, ici comme ailleurs, l'insuffisance de la paléontologie qui semble un livre dont les plus intéressants feuillets ont été arrachés, se sont rejetés sur l'embryogénie : cette science est à l'heure actuelle la source de toutes les hypothèses proposées pour résoudre la question. Partant de cette idée que dans les phases du développement individuel (ontogénie) on peut retrouver celles du développement ancestral (phylogénie), on coupe en séries des embryons de tout âge et l'on s'ingénie à comparer l'état de chacune des périodes observées au cours du développement avec l'état adulte d'espèces moins élevées en organisation. Mille pièges sont d'ailleurs cachés sous cette apparente simplicité, car, en dehors de la contraction ou de la dilatation que peut présenter le cycle du développement d'une espèce, bien des circonstances interviennent qui ne sont pas faites pour faciliter la tâche des embryogénistes. Quoi qu'il en soit, de très réels progrès ont été faits dans cette voie au cours de ces dernières années et nous devons rendre compte des efforts nouvellement tentés.

Pour le moment les recherches et les discussions ont trait principalement au mode de segmentation, à la *métamérie* de la tête des Vertébrés. Il s'agit de démontrer que la tête est formée d'un certain nombre de segments ou *métamères* comparables

aux segments du tronc. Prouver la structure métamérique du corps des Vertébrés, c'est, semble-t-il, autoriser l'hypothèse de l'existence d'un ancêtre métamérique, plus ou moins apparenté par suite à l'un des groupes d'Invertébrés à métamères bien définis, tel que celui des Annelés; c'est tout au moins, montrer que les Vertébrés présentent certains caractères qui permettent de les grouper parallèlement à diverses classes d'Invertébrés.

Depuis que Gegenbaur a montré tout l'intérêt qui s'attache pour la solution de la question à l'étude comparée des nerfs crâniens et des nerfs spinaux, on a complètement abandonné la célèbre théorie de Goethe et Oken basée sur l'étude du squelette et tendant à démontrer que la tête est formée d'un certain nombre de vertèbres modifiées.

On paraît aujourd'hui s'être mis d'accord sur un point qu'il s'agissait de déterminer tout d'abord, je veux dire l'origine première des nerfs spinaux. Des deux racines dont ceux-ci se composent, la supérieure (sensitive) se développe aux dépens d'un cordon cellulaire continu (*crête neurale*), tandis que l'inférieure (motrice) naît de la moelle même, dans sa région ventrale. Beard a récemment confirmé ces faits primitivement avancés par Balfour.

Ceci posé, il semble que rien n'est plus simple que de constater quels sont parmi les nerfs crâniens ceux qui naissent de la crête neurale prolongée. Ils devront être considérés comme les équivalents crâniens des racines supérieures spinales et par suite comme correspondant à autant de segments céphaliques. Les autres nerfs crâniens seront équivalents aux racines inférieures spinales, à moins qu'ils ne présentent tels caractères qui empêchent à première vue de les homologuer. Cependant les choses sont loin d'être aussi simples; d'une part en effet il y a entre les nerfs spinaux et les nerfs crâniens des différences considérables dans leur arrangement et leur disposition, différences encore accrues par ce fait que les racines supérieures crâniennes, contrairement aux correspondantes spinales qui conservent leur situation primitive, se déplacent et gagnent peu à peu par suite du développement de l'encéphale un plan plus inférieur. D'autre part, le caractère mixte des nerfs crâniens ajoute aux difficultés de la comparaison. De là de tels obstacles que Balfour niait la possibilité de comparer les nerfs crâniens aux nerfs spinaux, ne retrouvant pas de racines ventrales chez les premiers. Récemment M. Phisalix, étudiant un embryon humain de 32 jours, a affirmé que les nerfs crâniens sont construits sur le même plan que les nerfs spinaux et qu'en particulier il est possible de retrouver les racines ventrales du trijumeau. L'étude des ganglions oph-

thalmiques chez les Sélaciens l'a conduit d'autre part à des conclusions semblables. Il admet par exemple chez ces derniers que le ganglion ophthalmique, avec son rameau d'origine, doivent être considérés comme la racine dorsale d'une paire crânienne dont le moteur oculaire commun serait la racine ventrale.

On a également cherché à établir l'homologie entre les nerfs crâniens et les nerfs spinaux par l'étude de leur distribution périphérique. Milnes Marshall, continuant les recherches de Balfour, posa en principe qu'un nerf crânien, pour avoir la valeur d'un organe métamérique, c'est-à-dire d'un nerf spinal, doit fournir à une fente branchiale ou à son équivalent. Mais toute la difficulté est de reconnaître ce qui est une fente branchiale ou son équivalent; c'est dire que l'hypothèse a beau jeu et que les observateurs n'arrivent guère à se mettre d'accord.

Van Wijhe, insistant sur l'étude des segments primitifs du mésoderme (somites, myomères), décrit dans la tête neuf somites qu'il considère comme homologues des somites vertébraux du tronc. Mais il constate en même temps que la partie dorsale seule ou crânienne de la tête offre la segmentation en somites distincts et il ne trouve pas ceux-ci en rapport exact avec les segments ventraux ou arcs viscéraux (limitant les fentes branchiales) qui seraient seulement au nombre de six. Van Wijhe établit d'autre part que les nerfs se distribuent dans les segments de la tête de la même manière que dans ceux du tronc, les nerfs crâniens ventraux aux muscles dérivant des somites céphaliques et les fibres motrices des nerfs crâniens dorsaux aux muscles viscéraux dérivant des lames latérales. Partant de là l'auteur dresse un tableau des métamères du crâne et de la distribution des muscles et des nerfs dans ces métamères que Wiedersheim adopte à quelques variantes près.

Dohrn cependant s'est élevé contre les vues de Van Wijhe et dans un récent mémoire Th. Shore, discutant en détails la valeur des caractères attribués par cet observateur à ses somites, déclare qu'ils ne sont pas clairement établis et qu'on n'y peut trouver une base certaine de comparaison entre les nerfs crâniens et les spinaux.

Entre temps Beard, après maints tâtonnements, est arrivé à formuler cette idée que tous les nerfs crâniens métamériques se distinguent à ce qu'ils possèdent, comme les nerfs spinaux, un ganglion sur leur racine dorsale. Ce ganglion, dans la région crânienne, naît d'un épaissement de l'épiblaste placé immédiatement au-dessus d'une fente branchiale qui donne en même temps naissance à une branche dorsale ou « suprabranchiale » et à un organe sensoriel. Beard accorde une grande

importance dans la détermination de la valeur métamérique des nerfs crâniens à ces organes sensoriels, « branchial sense organs » (organes des sens de la ligne latérale) et à leurs rapports avec les ganglions. Shore dans un récent mémoire sur l'anatomie du nerf vague des Sélaciens, avec remarques sur la valeur segmentaire des nerfs crâniens, ne paraît toutefois pas très enthousiaste; il reproche à Beard de prendre tantôt les fentes branchiales dans une partie de la tête comme preuve de la valeur segmentaire des organes des sens et des nerfs, tantôt dans une autre partie de la tête les organes des sens comme preuve de l'existence de fentes branchiales plus ou moins avortées. Cependant les principes de Beard sont acceptés par d'autres embryologistes et M. Houssay étudiant dans un travail récent la métamérie du crâne, prend pour caractères des métamères : « 1° la présence d'une branchie : 2° une certaine complication de leur système nerveux périphérique indiquée par Beard. » Partant de là il trouve dans la tête jusqu'à dix branchies, parmi lesquelles une nasale, une cristallo-hypophysaire, une hyomandibulaire et une auriculaire qui n'avaient pas encore été franchement reconnues.

Toutes ces divergences montrent assez combien la question est difficile et obscure. Cependant un nouvel élément d'appréciation qui semble avoir une certaine importance a été indiqué par Gaskell et accepté par Beard. Suivant Gaskell, un nerf métamérique spinal complet comprend, outre les deux racines, dorsale et ventrale, dont il a été seulement tenu compte jusqu'à présent, une troisième racine dite racine *latérale*, dont les fibres ne deviennent distinctes chez les animaux étudiés par lui que dans la région cervicale antérieure où elles sont représentées par les racines spinales de l'accessoire de Willis. Cette troisième racine est motrice et innerve des muscles dérivés des lames latérales. Elle comprend deux ordres de fibres, les unes se rendant à un ganglion (ganglion du système sympathique), les autres n'étant en relation avec aucun ganglion. Cette troisième racine et le ganglion deviennent pour Gaskell le point de départ d'un nouvel essai de rapprochement entre les nerfs crâniens et les nerfs spinaux. En appliquant les données ci-dessus, il est amené à conclure que les troisième et quatrième paires crâniennes, la partie motrice de la cinquième, la sixième et la septième sont des nerfs métamériques complets, chacun ayant la valeur d'un nerf segmentaire spinal, tandis que le groupe comprenant la partie sensitive de la cinquième paire, les neuvième, dixième, onzième, et douzième paires est composé d'un ou de plusieurs nerfs métamériques spinaux parfaits, dont les éléments ont été disso-

ciés. Les recherches de Gaskell ont porté sur l'homme, le chien et le mouton. Th. Shore a tenté d'appliquer les mêmes principes à des types plus primitifs et a choisi les Sélaciens. Pour le moment il ne nous fait part que de ses recherches sur le nerf vague de la raie. D'après ses observations, le nerf vague ne contient pas tous les éléments d'un nerf métamérique parfait; il lui manque en particulier les fibres motrices somatiques (racines ventrales); l'auteur était arrivé précédemment à la même conclusion dans ses études morphologiques sur le nerf vague des Élasmodontes, de la grenouille et des amniotes. Pour Shore, le nerf vague n'est pas un nerf métamérique, c'est un composé de rameaux viscéraux des nerfs spinaux antérieurs et des représentants des ganglions cérébroïdes et des cordons latéraux du système nerveux des Invertébrés.

Puisque nous parlons du nerf vague, c'est le cas de nous rendre compte des renseignements que donnent les recherches embryogéniques sur la nature du nerf de la ligne latérale (rameau latéral) qui est une branche du vague. D'après Shore, le « rameau latéral » aurait une origine très ancienne et devrait être considéré comme l'équivalent des cordons latéraux des Némertiens, du système nerveux principal des Annélides et des Arthropodes et peut-être aussi de l'anneau nerveux des Cœlentérés. Beard dans une récente note confesse que les essais d'homologie du système nerveux des Vertébrés, soit chez l'embryon, soit chez l'adulte, avec celui des Invertébrés, n'ont encore eu que peu de succès. En ce qui concerne la ligne latérale et le rameau latéral, il admet qu'ils naissent de la partie postérieure du renflement épiblastique du vague et que le rameau latéral doit être considéré comme un prolongement de quelques suprabranchiaux soudés. M. Houssay est d'un autre avis. Les renflements épiblastiques qui fournissent aux ganglions crâniens ne sont pas segmentés au début, comme le suppose Beard; ils forment de chaque côté un cordon continu et la ligne latérale n'est que le prolongement en arrière de ce cordon. Dès lors, le nerf latéral « ne représente pas des suprabranchiaux soudés, mais bien une somme de parties homodynames aux ganglions crâniens. »

D'après ce qui précède, on voit qu'on est encore loin de s'entendre au point de vue de la métamérie de la tête aussi bien pour les grandes lignes que pour les points de détail. Est-il permis, d'après le peu que nous savons sur la métamérie des Vertébrés, de les comparer sous ce rapport aux Invertébrés? Nous ne devons pas oublier à ce propos de rappeler avec Wiedersheim qu'en tous cas nos connaissances ne nous permettent pas de supposer avec certitude une forme ancestrale segmentée, car chez

les Vertébrés « l'ébauche du système nerveux central est absolument homogène, sans aucune trace de segmentation ». Celle-ci est secondaire et non primitive. Reste à savoir si la métamérisation chez les Invertébrés doit être considérée comme un phénomène primitif ou comme un phénomène de complication. Suivant M. Perrier la métamérisation totale serait le phénomène primitif et parmi les Annélés par, exemple, les formes les plus complètement métamérisées seraient les plus primitives; cela semble indiquer que la segmentation dans les deux groupes n'a pas la même valeur et qu'elle ne peut servir de terme de comparaison.

On sait que par la considération des organes néphridiaux Semper et Dohrn ont été amenés à faire dériver les Vertébrés des Annélés; à ces raisons et à d'autres encore que nous ne pouvons exposer ici, faut-il joindre la preuve nouvelle que Beard croit avoir trouvée de la convenance de ce rapprochement. Il pense pouvoir démontrer l'origine bilatérale du système nerveux central chez les Vertébrés. Beard montre en effet que chez l'embryon des Vertébrés comme chez les Annélides les deux bandes neuro-épithéliales sont séparées l'une de l'autre par une gouttière ciliée, qui, en s'accroissant, forme la plus grande partie sinon la totalité de l'épithélium cilié du canal central permanent. — On ne devra pas oublier que la bilatéralité du système nerveux des Annélés paraît n'être que secondaire, car Kleinenberg a démontré que le système nerveux des larves d'Annélides a une symétrie radiaire et il est même parti de là pour rapprocher ces larves des méduses.

Si les Annélés doivent prendre parmi les Invertébrés, par rapport aux Vertébrés, la place importante qu'on semble leur assigner en ce moment, nous devons accueillir avec satisfaction tous les renseignements qui nous parviennent sur ce groupe d'animaux. Signalons, entre autres, un mémoire sur le développement des Annélides dû à M. Roule. Les recherches de l'auteur ont porté principalement sur un petit Oligochète limicole, l'*Enchytreoides Marioni*. De ses études l'auteur conclut que la fameuse division des Métazoaires en Entérocoéliens et Pseudocoéliens établie par les frères Hertwig ne saurait être acceptée. Suivant cette théorie qui a suscité déjà un grand nombre de travaux favorables ou défavorables, le coelome (cavité générale du corps) dérive de l'archentéron (cavité intestinale primitive) ou en est complètement indépendant. Dans le premier cas (entérocoéliens) le mésoderme prend naissance aux dépens d'un feuillet du blastoderme dont les éléments sont disposés en couches épithéliales; dans le second cas (pseudocoéliens) les feuillets du blastoderme produisent des cellules qui émigrent et, pénétrant dans

l'espace laissé entre eux, s'y disposent sans régularité pour donner naissance aux tissus conjonctifs et musculaires du mésoderme. Cette théorie élève une barrière entre les Mollusques et les Annelés, les premiers étant des pseudocéliens et les seconds des entérocéliens. M. Roule n'accepte pas cette division; d'après lui le colome des Mollusques est homologue de celui des Annelides, et on peut retrouver dans les deux groupes le même mode d'évolution du mésoderme; en effet si chez les Archiannelides les fibres musculaires se développent suivant le procédé épithélial propre aux Entérocéliens, chez Enchytréoides elles prennent naissance par le mode mésenchymateux propre aux Pseudocéliens. En conséquence l'auteur, se basant sur les rapports morphologiques des larves d'annelides et de mollusques déjà signalés par Hatschek, conclut au rapprochement des deux groupes en un seul embranchement : celui des Trochozoaires.

Le squelette des extrémités est toujours de la part des anatomistes l'objet de théories tendant à l'établissement d'un type duquel dériveraient les modifications si multiples qu'offrent ces parties. Deux points sont à considérer dans cette question, suivant qu'on s'occupe du nombre des doigts ou du nombre des phalanges.

Pour ce qui est du nombre des doigts, il a considérablement augmenté dans ces dernières années. L'extrémité pentadactyle a cessé d'être le type reconnu, pour faire place à l'extrémité heptadactyle. Malheureusement on n'a pas encore défini ce qu'il faut entendre par un doigt et l'on ne paraît guère tenir compte en ces matières de l'embryogénie; car ce n'est pas faire de l'embryogénie, à mon sens, que de relever dans le carpe ou le tarse des embryons un nombre plus ou moins grand de cartilages, d'en décrire les formes et d'en mesurer les dimensions.

Pour cette fois encore, ce sont des preuves purement morphologiques qui nous sont apportées. Bardeleben a décrit il y a quelques années au côté interne du carpe et du tarse d'un grand nombre de mammifères, des rudiments d'un sixième doigt (præpollex et præhallux). Puis, il lui a plu de regarder le pisiforme et la tubérosité du calcaneum comme des rudiments d'un septième doigt externe (postminimus). Ainsi a été constituée l'extrémité heptadactyle. Bardeleben donne de nouvelles preuves morphologiques de sa manière de voir, tirées de l'examen de diverses pièces anatomiques dans les musées de Londres et de l'Amérique du Nord. Il cite le *Pedetes cavensis* chez lequel il a observé un præpollex formé de deux os et portant un ongle vrai. Il a vu aussi un spécimen de *Bathyergus maritimus* dont le præpollex et le postmini-

mus sont tous deux très développés. Ce dernier consiste en deux os dont le proximal (le vrai pisiforme) a 3 millimètres de long et le distal 7^{mm},5. Il regarde ce dernier comme le métacarpien de son postminimus. Enfin il reprend l'étude de l'extrémité antérieure de *Theriodesmus phylarchus*, spécimen fossile étudié par Seeley et dont la place parmi les Vertébrés est fort incertaine. Seeley avait décrit trois centraux. Pour Bardeleben l'un d'eux, celui qui siège sur le bord du scaphoïde et du trapèze, est l'os proximal du præpollex; un petit os omis par Seeley siégeant sur le bord du trapèze serait l'os distal du même præpollex. On peut voir par là le rôle que peut jouer l'interprétation dans ces questions. Si l'on objecte que dans un grand nombre de cas il ne s'agit peut-être que d'anomalies, Bardeleben répond que les observations sont assez nombreuses maintenant pour autoriser à regarder les cas de polydactylie, même chez l'homme, comme des exemples d'atavisme et non comme des anomalies.

L'heptadactylie a été retrouvée chez les Amphibiens, les Reptiles et les Mammifères, mais chez les Oiseaux on n'a pu encore observer que six doigts. Pour eux, jusqu'à plus ample informé, l'hexadactylie est la règle. On sait que Parker aurait en effet constaté chez les embryons d'Oiseaux outre les trois doigts normaux, l'ébauche de trois autres doigts qui disparaissent plus tard. F. Cowper nous fait connaître un cas d'hexadactylie chez un *Gallus domesticus* variété Dorking, adulte. Le sixième doigt se trouve placé entre le métatarsien rudimentaire portant deux doigts qu'on observe chez beaucoup d'oiseaux pentadactyles et la tubérosité de l'éperon. Etant donné le courant actuel des idées, on ne doit pas s'étonner de voir Cowper considérer ce fait non comme une anomalie, mais comme un cas d'atavisme.

Un très intéressant mémoire de Leboucq sur la morphologie de la main chez les Pinnipèdes reporte l'attention sur la question controversée de l'hyperphalangie des Cétacés. Un naturaliste américain, Ryder, avait cru pouvoir considérer l'allongement des doigts des pinnipèdes comme le premier degré de la transformation qui aboutit à l'hyperphalangie des Cétacés. Il avait été suivi dans cette voie par des anatomistes comme Weber qui cherchent à prouver une filiation entre les Cétacés et les Carnassiers amphibies. Leboucq établit que la main de ces derniers transformée en nageoire est en réalité un résultat d'adaptation à la vie aquatique, car chez le fœtus la forme des extrémités se rapproche plus de celle des Carnassiers terrestres que chez l'adulte; tandis que chez les Cétacés la nageoire est atavique, car dans le fœtus elle s'écarte encore plus du type mammifère terrestre que dans

l'adulte où l'hyperphalangie très développée rend déjà impossible toute comparaison avec les mammifères terrestres. D'ailleurs chez les Pinnipèdes bien que l'extrémité s'allonge et prenne la forme d'une nageoire, on ne constate aucune augmentation dans le nombre des phalanges ; c'est, comme le démontre Leboucq, la partie des doigts correspondant à la région de la pulpe qui s'allonge considérablement au-dessous et en avant de l'ongle en une tige cartilagineuse ou fibreuse soutenant la nageoire et ce processus ne peut en aucune manière être comparé à celui qui donne naissance à la nageoire des Cétacés chez laquelle le squelette lui-même est profondément modifié par l'addition de nouvelles phalanges produisant l'allongement de l'extrémité. Un mémoire de Howes sur la morphologie et la genèse des phalanges surnuméraires et particulièrement de celles des Anoures vient à l'appui de la thèse soutenue par Leboucq. Les phalanges surnuméraires sont d'origine intercalaire et par suite elles ne peuvent être considérées comme secondaires et nées de la segmentation de la baguette cartilagineuse terminale qui, chez l'Otarie, par exemple, prolonge les doigts et soutient l'extrémité de la nageoire.

IV

L'ouverture des nouvelles galeries de zoologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris est un fait important pour la science française et nous ne saurions le passer sous silence. Les riches collections zoologiques entassées jusqu'ici dans des salles obscures ou dans des magasins ont aujourd'hui un emplacement digne d'elles. Il nous est impossible d'entrer dans le détail des nouveaux aménagements ; nous ne ferons qu'émettre le vœu de voir bientôt s'achever l'œuvre commencée, par la construction de galeries destinées aux diverses branches de la zoologie qui n'ont pas trouvé place dans les nouveaux bâtiments.

De toutes parts d'ailleurs de grands efforts sont faits pour enrichir les musées et pour étendre nos connaissances sur maintes formes animales encore mal connues ou complètement ignorées. Le Professeur Vaillant vient de publier les Poissons recueillis au cours des expéditions du *Travailleur* et du *Talisman* ; Günther ceux recueillis par le *Challenger*. Pelsener d'autre part a publié les Mollusques des grandes profondeurs, Carpenter les Comatules et Sladen W. Percy les Astéroïdes recueillis dans la même exploration. Quelques-uns des résultats obtenus par le Prince de Monaco dans ses voyages à bord de son yacht l'*Hirondelle* ont été également publiés et parmi eux nous relevons particulièrement un beau mémoire dû au Professeur G. Pouchet et relatif aux expériences de flot-

tage entreprises dans le but d'étudier les courants de l'Atlantique nord, problème qui intéresse vivement à la fois la météorologie et la zoologie des côtes françaises. Des trois campagnes de 1885, 1886 et 1887, au cours desquelles de nombreux flotteurs ont été lancés dans des directions déterminées en prenant pour point de départ le groupe des Açores, il résulte qu'il existe dans l'Atlantique nord vers le 43° long. O. de Paris et le 42° lat. N., une zone indifférente, « sorte de château d'eau », s'emplantant par le N. et par l'O. se vidant par le N.-E. et le S.-E. De là il semble qu'une nappe d'eau s'écoule en éventail du Spitzberg aux Canaries. Il est établi d'une manière péremptoire que nos côtes françaises ne reçoivent au moins en été, aucun courant de surface venant du S.-O. mais au contraire un courant descendant de l'O.-N.-O. et qu'il faut en tous cas rejeter comme une erreur cette idée longtemps acceptée que nos côtes sont échauffées par une branche quelconque du Gulf-Stream.

Ce n'est donc pas au Gulf-Stream qu'il faut s'en prendre si certains poissons migrateurs comme les sardines manifestent depuis quelques années une tendance à s'écarter de nos côtes. Cette question du régime de la sardine a pris depuis peu en France une importance considérable. Le Professeur G. Pouchet, directeur du laboratoire de Concarneau, était on ne peut mieux placé pour l'étudier et y apporter quelques éclaircissements et nous lui devons une série de recherches des plus instructives.

Depuis 1880, l'industrie de la sardine passe par une phase critique. On a compté six années maigres séparées par une année moyenne, 1883. Le fait s'est déjà présenté d'ailleurs et s'observe pour d'autres poissons à mœurs analogues, comme le hareng qu'on cesse de pêcher sur les côtes de Norvège parfois pendant des périodes de trente à quarante ans, au bout desquelles le poisson repart et la pêche reprend. Il ne semble donc pas qu'on puisse incriminer pour la sardine comme on l'a fait, même dans des documents officiels, des causes telles que le Gulf-Stream, l'influence des bateaux à vapeur (!) ou l'emploi d'instruments de pêche plus ou moins destructeurs. Il y a d'autres causes, d'une importance bien autre, mais que dans l'état actuel de la science il est fort difficile de démêler, car nos connaissances sur la vie du monde de la mer sont à peu près nulles encore. Le Professeur G. Pouchet, convaincu qu'on n'arriverait à aucun résultat si l'on ne parvenait à connaître les conditions de la vie de la sardine, s'est mis à l'œuvre, et les résultats qu'il a obtenus jusqu'ici, sans lever encore tous les voiles, offrent un intérêt capital et démontrent amplement que toutes les mesures prises pour empêcher la soi-disant destruction de la

sardine par les procédés de pêche n'arriveront qu'à laisser à leur élément quelques milliers de sardines de plus qui ne sauraient compter dans l'innombrable quantité qui existe. Ce sont des mesures vexatoires et rien de plus, propres seulement à détruire à bref délai la moyenne industrie au profit des grandes usines où se fabriquent les conserves de ce poisson.

La sardine se présente sur nos côtes sous deux aspects différents. L'une, dite *de dérive*, mesure 23 à 24 centimètres; l'autre, dite *de rogue*, a une taille variable de 6 centimètres (très rare) à 14 ou 15 centimètres. Le professeur G. Pouchet a démontré qu'elles ne sont qu'une seule et même espèce, la sardine de dérive seule étant adulte et pouvant présenter des œufs prêts à être pondus. Or la sardine de dérive ne se montre sur les lieux de pêche que vers le milieu de mai et la période très courte pendant laquelle elle apparaît coïncide précisément avec l'apparition en abondance de bancs de sardines jeunes (de rogue). On peut il est vrai rencontrer dans la saison d'hiver des sardines (Douarnenez, janvier 1890) sur les côtes françaises, mais leurs organes génitaux sont toujours rudimentaires; il n'y a donc aucune preuve que cette sardine ponde au rivage, ou simplement sur les fonds accessibles aux instruments des pêcheurs. Toutes les présomptions sont pour le contraire. Les bancs de sardine jeune, aussi bien que ceux de sardine adulte se renouvellent sans cesse sur la côte, comme si leur déplacement s'opérait dans un plan normal à la ligne du rivage. En fait, l'apparition périodique annuelle de la sardine jeune dans les eaux océaniques françaises est un phénomène solaire, sans qu'il soit possible actuellement de déterminer le facteur immédiat.

On est réduit aux conjectures relativement aux causes de déplacement de la sardine, ainsi qu'à la raison des tailles diverses que présentent les différents bancs se succédant en un même lieu. On s'accorde généralement à admettre, ainsi que le démontrent les observations du Professeur Marion de Marseille, que la sardine grandit d'un centimètre par mois en moyenne. Les jeunes sardines qui arrivent en bancs serrés sur nos côtes auraient donc de 14 à 16 mois (elles se montrent bien plus jeunes sur les côtes de la Méditerranée). Mais comment établir le chemin parcouru par elles? On ne peut expliquer non plus d'avantage en raison de quelle loi la sardine de rogue se montre plus tôt au S. vers les sables d'Olonne qu'au N. et disparaît plus tôt également au S. qu'au N. Les conditions thermiques générales qu'on pourrait invoquer ne donnent en fait aucun éclaircissement. D'autre part, les dimensions

variées qu'offrent les différents bancs se succédant en un même lieu, parfois à 24 ou 30 heures d'intervalle, indiquent des âges différents et par suite une ponte répartie sur l'année entière, indépendante par conséquent du cycle solaire qui cependant règle d'une manière si manifeste les déplacements de l'animal dans les eaux françaises. Cette conséquence semble en entraîner une autre, à savoir que la sardine pond dans des eaux d'une température constante, c'est-à-dire dans des eaux profondes, loin des côtes.

On voit d'après ce qui précède combien le problème est complexe. Les observations du Professeur G. Pouchet ont révélé sur le régime de la sardine des faits fondamentaux. Il reste de nombreux points de cette histoire à élucider, mais en tout cas, il résulte clairement de ces premières recherches que le mode employé pour la pêche n'a rien à voir avec l'abondance plus ou moins grande des bancs de sardine.

Une autre question de zoologie appliquée préoccupe également notre pays; c'est celle des invasions de criquets qui en ce moment encore désolent certaines parties de l'Algérie. Persuadé que là encore la solution du problème se trouve dans une étude plus approfondie de la biologie de ces insectes dévastateurs, le Gouvernement a délégué M. Künckel d'Herculais pour étudier sur place les mœurs de ces animaux. M. Künckel commença par établir exactement à quelles espèces on avait à faire: il régnait sur ce point une grande confusion. Les espèces des invasions actuelles sont le *Stawronotus maroccanus* et le *Caloptenus italicus*. Elles font leur apparition en juin et juillet, puis pondent leurs coques ovigères d'où les jeunes sortent au printemps suivant. Contrairement à l'opinion générale, ce n'est pas dans les régions du Sud du Sahara, voire du Soudan, que viennent les migrations, mais des montagnes et des hauts plateaux de l'Algérie. M. Künckel insiste sur la nécessité de pousser activement le relevé de cartes orographiques indiquant les foyers de multiplication, au moyen desquelles on pourra dresser des cartes de prévision et préparer ainsi à coup sûr l'application des procédés de destruction. Nous apprenons par les journaux que l'invasion cette année semble prendre un caractère de gravité exceptionnel dans certaines régions, en particulier dans la province d'Oran, espérons que les études entreprises nous garantiront pour l'avenir de telles destructions et que la science y gagnera de mieux connaître la vie de ces insectes.

H. Beauregard,

Aide naturaliste au Muséum,
Professeur agrégé à l'École Supérieure de pharmacie.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Salmon (G.), *Professeur au Trinity-College à Dublin.* — *Leçons d'algèbre supérieure. Ouvrage traduit de l'anglais par O. CHEMIN, Ingénieur en chef des ponts et chaussées, Professeur à l'Ecole Nationale des ponts et chaussées.* Deuxième édition française, publiée d'après la quatrième édition anglaise. Un fort volume de in-8°, 577 pages. Gauthier-Villars et fils, 1890.

Le *Traité d'Algèbre supérieure* de M. Salmon est bien connu et il n'y a plus à en faire l'éloge; c'est un ouvrage qui est devenu classique en France.

La nouvelle édition française que publient MM. Gauthier-Villars est plus complète que la précédente; elle est conforme au texte même de M. Salmon que l'on avait cru, dans un but de simplification, devoir modifier sur certains points dans la première édition; elle se termine comme elle par les deux leçons de M. Bâzin sur les formes quadratiques ou cubiques, ternaires et quaternaires, suivies des deux notes célèbres de M. Hermite sur les invariants des formes du cinquième degré et sur l'invariant gauche des formes du sixième, découvert par le P. Joubert.

L. O.

Gomes Teixeira (F.), *Director da Academia Polytechnica de Porto.* — *Curso de Analyse infinitesimal. Calculo integral (primeira parte).* Porto, typographia occidental, 66, rua da Fabrica, 1889.

L'ouvrage de M. Gomes Teixeira constituera un cours complet de calcul infinitésimal; le premier volume seul a paru jusqu'ici; il contient la théorie des intégrales indéfinies, celle des intégrales définies, l'intégration des équations différentielles partielles du premier ordre et des ordres supérieurs; il se termine par l'étude des équations aux dérivées partielles.

Ces divers sujets sont exposés avec une grande clarté et une compétence remarquable; l'auteur, dont le nom est bien connu des mathématiciens, est au courant de tous les travaux récents et il a, en même temps, une grande habitude du professorat. Cette double qualité se reconnaît à chaque page de son livre. Des applications géométriques bien choisies complètent les diverses théories.

L. O.

Barré de Saint-Venant, *Membre de l'Institut.* — *Courbes représentatives des lois du choc longitudinal et du choc transversal d'une barre prismatique, publiées par M. FLAMANT, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.* Journal de l'Ecole polytechnique, 59^e cahier. Gauthier-Villars et fils, 1889.

M. Flamant vient de publier, dans le Journal de l'Ecole polytechnique, des courbes données, il y a environ 25 ans, par feu de Saint-Venant pour représenter graphiquement les lois du choc longitudinal ou du choc transversal d'une barre prismatique heurtée à son extrémité ou à son milieu par un corps d'une masse comparable à la sienne. Les ordonnées de ces courbes sont exprimées par des séries convergentes dont l'auteur n'a pris que les premiers termes; il a craint que les termes négligés ne fussent, dans leur ensemble, assez importants pour modifier les formes qu'il avait déduites des premiers et ce scrupule l'a empêché de publier son travail. Depuis lors, les équations du problème relatif au choc longitudinal ont pu être intégrées en termes finis par M. Boussinesq, et les lois de ce choc, repré-

sentées par des courbes exactes qui ont été publiées dans les *Comptes rendus* les 16, 23, 30 juillet et 6 août 1883. La comparaison de ces courbes exactes avec celles que de Saint-Venant avait déduites des séries, faite par M. Flamant, montre que les différences sont, en somme, plus apparentes que réelles et que l'allure générale des courbes n'en est pas modifiée. On peut en conclure, par analogie, qu'il en est sans doute de même pour celles qui sont déduites des premiers termes des séries représentant les lois, encore inconnues, du choc transversal. Elles donnent en tous cas, sur ces lois, une première indication permettant de déduire quelques conséquences pratiques qui, si elles ne sont pas absolument exactes, sont néanmoins très-précieuses, puisqu'elles constituent tout ce que l'on sait aujourd'hui sur ce sujet si important au point de vue de la stabilité des constructions.

L. O.

Petitcol, *Capitaine d'artillerie de marine.* — *De l'influence d'un vent parallèle au plan de tir sur les portées des projectiles.* — *Mémorial de l'Artillerie de la Marine*, 26^e année, 2^e série, tome XVIII, 2^e livraison de 1890, Imprimerie Nationale.

L'influence du vent sur les projectiles a été bien souvent étudiée; de très nombreuses expériences ont été faites et des formules diverses ont été données. M. Petitcol lui-même avait déjà traité la question dans le tome XIV du *Mémorial*; il la reprend aujourd'hui pour y apporter une précision plus grande.

Il propose d'admettre comme mesure de l'effet du vent l'expression

$$WT \left(1 - \frac{V}{V_0}\right)$$

où W est la vitesse du vent dans le sens du tir, T la durée du trajet, V la vitesse initiale du projectile, V_0 sa vitesse en arrivant au but.

Lorsque l'angle de tir est petit, $\frac{V}{V_0}$ est voisin de l'unité et l'influence du vent est très faible; mais si l'angle de tir augmente, $\frac{V}{V_0}$ diminue, l'effet du vent croît constamment et tend vers la limite WT qu'il n'atteint jamais.

L. O.

Thurston (R. H.), *Director of Sibley College, Cornell University.* — *Reflections on the Motive Power of Heat and on Machines fitted to develop that Power.* — *From the original french of N. L. S. Carnot.* New-York: John Wiley and Sons 53, East Tenth Street, 1890.

M. Thurston, le célèbre ingénieur américain, a eu l'idée « pour resserrer les liens qui font des ingénieurs une seule famille », de traduire en anglais le chef-d'œuvre de Sadi Carnot et de le faire connaître ainsi à tous ceux qui ne parlent pas le français. Il a réuni dans un volume les réflexions sur la puissance motrice du feu, une notice originale sur l'œuvre de Sadi Carnot, le portrait biographique dû à M. H. Carnot et publié dans la dernière édition de l'ouvrage, faite par MM. Gauthier-Villars, le célèbre mémoire de sir William Thomson intitulé « Contribution à la théorie de Carnot », enfin un grand nombre de notes rédigées par Sadi Carnot lui-même.

Le volume ainsi formé aura, nous en sommes convaincu, un grand succès en Angleterre et en Amé-

rique; d'une part, en effet, peu de personnes, dans ces deux pays, ont pu lire le prodigieux petit livre de 1824 où presque toute la thermodynamique était présentée, et, d'autre part, la notice écrite par M. Thurston est du plus haut intérêt.

L. O.

2° Sciences physiques.

Janet (Paul). — Etude théorique et expérimentale sur l'aimantation transversale des conducteurs magnétiques. Thèse de physique présentée à la Faculté des sciences de Paris, Gauthier-Villars, 1890.

Un corps magnétique quelconque peut être aimanté par influence, de deux façons différentes : ou bien il est placé dans le voisinage d'un système d'aimants fixes ou de courants électriques extérieurs, c'est le cas le mieux connu, le seul même que l'on examine d'ordinaire; ou bien il est parcouru par un courant, circulant ainsi dans la masse même soumise à l'aimantation. Au point de vue mathématique les deux cas se distinguent nettement : dans le premier, les forces magnétisantes dépendent d'un potentiel, dans le second, au contraire, elles n'en dépendent pas.

Ce second cas, le plus difficile, a été peu étudié jusqu'à présent; Kirschhoff a seulement donné les équations générales correspondantes sans aucun développement; la théorie restait presque complètement à édifier. M. Paul Janet a traité le problème analytiquement et vérifié par l'expérience les conséquences déduites de ses calculs.

Nous ne pouvons indiquer ici que très sommairement la marche élégante de l'analyse. L'auteur s'appuyant sur la théorie de Maxwell, établit d'abord que le flux d'induction magnétique se conserve dans tout l'espace, y compris les conducteurs, magnétiques ou non, parcourus par des courants quelconques; ce théorème constitue l'un des résultats les plus généraux de l'électromagnétisme. Il étudie ensuite comment on pourrait mettre en équation le problème général de l'aimantation, considérée dans le cas d'un coefficient d'aimantation variable avec la force magnétisante; en supposant ce coefficient constant, de notables simplifications se produisent : on arrive aisément aux équations générales; on leur peut appliquer la méthode de Carl Neumann. Le cas qui se présente le plus naturellement dans la pratique, est celui d'un cylindre quelconque parcouru dans le sens de sa longueur par un courant uniforme; la recherche des lignes d'aimantation se ramène alors à une quadrature. Si la section du cylindre est simple, les intégrations pourront facilement être poussées jusqu'au bout; dans le cas d'une ellipse par exemple, les lignes d'aimantation sont elles-mêmes des ellipses toujours moins aplaties que la section droite du cylindre; cette conséquence n'aurait pu évidemment être établie *a priori*; il résulte de là qu'il existe une distribution superficielle du magnétisme, et que l'ellipse est partagée en quatre quadrants alternativement positifs et négatifs.

Dans la seconde partie du mémoire, M. Janet décrit les expériences qu'il a instituées. L'une d'elles est bien simple, mais fort instructive. Si l'on prend un cylindre circulaire, les lignes d'aimantation produites par le courant seront des cercles concentriques; la densité sera nulle en tous les points de la surface; l'aimantation n'aura aucune action extérieure; elle existe pourtant et peut produire certains effets; Villari a démontré dès 1869 qu'un fil de fer tendu rectilignement a un coefficient de self-induction très notable; la création de l'aimantation transversale exige une certaine quantité d'énergie, et c'est à cette énergie supplémentaire qu'est dû l'accroissement du coefficient de self-induction; mais personne n'avait jusqu'à présent démontré par une expérience directe l'existence du magnétisme intérieur dans le cylindre; M. Janet prend un cylindre d'acier séparé en deux parties par un plan diamétral,

et dont les parties planes sont rodées avec soin; si l'on fait passer dans le cylindre un courant assez intense, il acquiert une aimantation transversale permanente, qu'il est facile de mettre en évidence en séparant après la rupture du courant les deux parties du cylindre; il se forme alors sur chaque plan diamétral deux lignes polaires parallèles à l'axe du cylindre, que l'on peut révéler comme d'ordinaire à l'aide d'un spectre magnétique. Dans le cas du cylindre elliptique, l'autour vérifie par le même procédé les conséquences de la théorie, mais ici l'aimantation présente une densité superficielle différente de zéro et se manifeste à l'extérieur sans aucun artifice.

Ces vérifications sont purement qualitatives, car elles se font sur le magnétisme rémanent restant dans la masse d'acier après la rupture du courant et non sur le magnétisme induit lui-même. M. Janet a été plus loin : il a obtenu des vérifications numériques de la théorie; à cet effet, il étudie la distribution de l'aimantation transversale dans un tube cylindrique à sections circulaires, mais sans supposer le coefficient d'aimantation constant, et il montre comment l'on peut faire servir cette aimantation à mesurer ce coefficient par une méthode d'induction mutuelle. Ces mesures, effectuées avec grand soin, ont été reprises sur les mêmes échantillons par les méthodes classiques et les résultats ont été très concordants.

On voit, en résumé, que M. Paul Janet est parvenu à résoudre un problème difficile; ses expériences sont fort ingénieuses et très probantes, et, ce qui ne gâte rien, son mémoire est écrit dans un style particulièrement clair et élégant.

Lucien POINCARÉ.

Nichols (Edward L.) and Franklin (William S.). — Expérience sur la question de la direction et de la vitesse du courant électrique. *American Journal of Science*, t. 37, 1889.

Un courant est-il dû à un mouvement de l'électricité le long d'un conducteur, mouvement se produisant dans une direction et avec une vitesse déterminées? Fœppl a essayé de résoudre la question et a donné une réponse négative; mais sa méthode manquait de sensibilité. MM. Nichols et Franklin l'ont reprise en la perfectionnant.

On observe la déviation d'un système d'aiguilles astatiques sous l'influence d'un courant qui passe dans un fil roulé sur un multiplicateur. Faisons tourner ce multiplicateur; si l'on admet que le courant électrique a le long du fil une vitesse déterminée, la vitesse relative de l'électricité par rapport au système astatique variera, par suite la déviation. L'appareil est sensible à un courant C_1 . Quand le fil est traversé par C_2 , et qu'il est animé d'un mouvement de vitesse V , l'intensité varie dans le rapport $\frac{V}{u}$, u étant la vitesse de l'électricité dans

le fil; elle varie donc de $\frac{C_2 V}{u}$. Si l'on n'observe rien, c'est que $\frac{C_2 V}{u} < C_1$ ou $u > \frac{C_2 V}{C_1}$. On emploie une bobine

plate de caoutchouc durci, présentant une gorge dans laquelle on enroule un grand nombre de tours de fils; sur les deux faces sont deux plaques de cuivre percées suivant l'axe, servant de pôles, et contre lesquelles on applique des frotteurs. On peut donner à la bobine autour de son axe une vitesse de 400 tours par seconde. Si on lance dans le fil le courant alternatif d'une dynamo à 40.000 reverses par minute, l'aiguille reste au zéro quand le conducteur est au repos; elle y reste encore quand il est en mouvement. Des dimensions de l'appareil et de sa sensibilité, les auteurs concluent que la vitesse du courant électrique dans ce fil, — si cette vitesse existe, — dépasse 9×10^{10} centimètres par seconde.

Bernard BRUNES.

Colson (A.), Répétiteur à l'Ecole Polytechnique. — Sur quelques applications de la thermochimie à l'étude de la constitution des alcalis organiques. *Annales de Chimie et de Physique*, mars, 1890.

L'auteur a déterminé les chaleurs de dissolution et de neutralisation de la pipéridine, de la pyridine, de la nicotine et de la quinoléine. Si l'on compare les nombres obtenus à ceux donnés précédemment pour beaucoup d'autres bases par MM. Berthelot, Longuinie, Thomson, H. Gautier et Vignon, il en résulte que :

1° Dans un même groupe, la chaleur moléculaire de neutralisation baisse progressivement de l'amine primaire à l'amine tertiaire, la somme de la chaleur de dissolution de la base et de la chaleur de neutralisation ou *chaleur totale* restant sensiblement constante.


2° La chaleur moléculaire de neutralisation pour un même acide augmente dans les amines primaires de la série grasse avec le poids de la molécule.

Puis, appelant *bases fortes* celles qui neutralisent exactement les acides et dont un très faible excès ramène au bleu la teinture de tournesol, *bases faibles*, celles qui ne remplissent pas ces conditions, il fait remarquer que :

3° Les bases non saturées de la série grasse sont des bases fortes, mais que leur chaleur totale et leur chaleur de dissolution sont notablement affaiblies.


4° Si le groupe amidogène est soudé directement à un noyau aromatique, l'expérience montre que la base devient faible, fût-elle à chaîne fermée comme la pyridine.

La nicotine, qui est bibasique, est base forte par une de ses basicités, et base faible par l'autre. Par sa basicité forte, les données thermiques la rapprochent d'une amine tertiaire de la série grasse. Ces mêmes données thermiques montrent que la formule de constitution proposée par Andréoni :



si elle n'était déjà rejetée, parce qu'elle ne rend pas compte du pouvoir réducteur de la nicotine, devrait l'être encore parce que la nicotine possède une forte chaleur de dissolution et que la présence de deux groupements non saturés correspond à une faible chaleur de dissolution, d'après une remarque précédente.

D'autre part, les formules à double liaison naphthalique proposées ultérieurement représentent vraisemblablement des corps peu solubles (la quinoléine en est un exemple). Or la nicotine est très soluble. M. Colson termine son mémoire en proposant pour la nicotine la formule suivante :



qui rend compte des transformations chimiques et aussi des propriétés de cet alcaloïde, puisqu'elle montre que la pipéridine est devenue base tertiaire, ce qui explique la forte basicité et la faible chaleur de neutralisation de la nicotine; quant à la faiblesse de la seconde basicité, la présence du groupe pyrrolique l'explique largement.

H. GAUTIER.

3° Sciences naturelles.

Leidy (Prof. J.). — Notice of some fossil human bones.

— **Id.** Description of mammalian remains from a rock crevice in Florida. — **Id.** Description of vertebrate remains from Peace Creek, Florida. — **Id.** Notice of some mammalian remains from the salt mine of Petite Anse, Louisiana (*Transactions of the Wagner Free Institute of science of Philadelphia*, vol. 2, december 1889, in-8°, avec plusieurs planches).

De nombreux ossements fossiles des animaux quaternaires en même temps que des ossements humains ont été découverts récemment par les savants américains W. Crooks, J. Willcox, Heilprin et autres, dans la Louisiane et la presqu'île de Floride. Ces trouvailles viennent d'être décrites par un géologue bien connu, M. le professeur Leidy. Ses trois articles, dont nous venons de transcrire les titres, forment la plus grande partie du deuxième volume des Mémoires de l'Institut libre Wagnérien de Philadelphie.

Les ossements trouvés dans une crevasse de rocher au voisinage d'Ocala (comté Marion, Floride) appartiennent au lama, au tigre (*Machairodus floridanus*), aux différents éléphants (*Elephas primigenius*, *E. americanus* ou *E. Columbi*, etc.) et au cheval (*Equus feratrum* Leidy) qui paraît être très voisin du cheval domestique actuel de l'ancien continent. Le crâne de tigre, auquel il manque malheureusement toute la partie alvéolaire du maxillaire, est représenté sur une des planches qui accompagnent le volume des « *Transactions* ».

D'autres ossements proviennent de la Crique de la Paix (*Peace Creek*) près d'Arcadia (Floride). Ils ont été trouvés au milieu des couches de phosphorites exploitées dans un but industriel. Ce sont des dents de tapir, semblables de tout point à celles du tapir actuel de l'Amérique du Sud; des dents de cheval et d'un autre animal que l'on peut considérer comme une variété d'*Hippotherium* décrit dans les « *Proceedings* » de l'Académie des Sciences de Philadelphie, 1882, p. 290; des os et des dents de bison, de *Cervus virginianus* et d'éléphant; enfin des plaques nombreuses et de formes très variées d'un Glyptodon semblable au *Chlamydotherrum Humboldtii* décrit par le Dr Lund. Parmi ces plaques il y en a qui frappent par leur forme conique ou en crochet; il y en a qui présentent deux grandes éminences coniques. En outre des mammifères on a trouvé aussi dans ce gisement des carapaces de tortues, dont une qui devait avoir plus de 1 m. 50 de longueur, des plaques dermiques de crocodile et quelques ossements de poissons.

Enfin des ossements humains ont été découverts par MM. Willcox et A. Heilprin sur la côte est de la baie de Sarasota (dans la presqu'île de Floride). Les os ont été trouvés dans des couches de grès ferrugineux recouvertes par une bande de terre végétale d'un mètre environ d'épaisseur. Parmi ces ossements on remarque surtout un fragment de crâne comprenant la base de la boîte crânienne et une partie de la face, le tout transformé en limonite par l'action des roches environnantes; à côté du crâne il y avait plusieurs os longs dont la position fait supposer que le squelette avait une attitude accroupie; mais on n'a recueilli qu'un calcaneum. Les quelques spécimens de roches au milieu desquelles le crâne a été trouvé renferment des coquilles sub-fossiles des espèces existant actuellement: *Natica pusilla* Say, *Helix wulferi* Schuttl, *Helix ceratulus* Mühl., *Succinea avara* Say, etc. La roche et les fossiles sont presque les mêmes que ceux qui provenaient d'une petite île du lac Monroe, près d'Entreprise (Florida) où des restes humains ont été trouvés par Portales il y a quelque trente ans. Le crâne ne présente aucune particularité saillante et se rapproche du crâne moyen français; sa longueur (de la gabelle à la protubérance occipitale externe) est de 170^{mm}; la longueur biarculaire est de 131^{mm}. Le dessin, assez médiocrement exécuté, disons-le en passant, confirme

la description et représente le crâne brisé en plusieurs morceaux qui semblent être retenus par la gangue de limonite. Si le fait que ce crâne provient réellement des couches quaternaires non remaniées vient à être confirmé par des coupes exactes du gisement, il sera d'un grand intérêt, car jusqu'à présent aucun des crânes humains fossiles trouvés dans le Nouveau Continent n'a été à l'abri de critiques justifiées quant à sa contemporanéité avec les mammifères quaternaires.

J. DENIKER.

Bertrand (C. Eug.), *Professeur de botanique à la Faculté des Sciences de Lille.* — *Les Poroxylons, végétaux fossiles de l'époque houillère*, *Mém. Soc. belge de Microsc.* t. XIII.

L'auteur a étudié avec beaucoup de soin la structure de plusieurs sortes de *Poroxylon*. On sait que ces végétaux singuliers, découverts par M. Bernard-Renault, méritent toute l'attention des paléontologistes en raison des relations qu'ils permettent d'établir entre plusieurs types importants de végétaux du terrain houiller. Ce sont surtout leurs tiges et leurs feuilles qui offrent de l'intérêt. Les tiges étaient hélicoïdales, à entrenœuds allongés. Une seule feuille partait du nœud et abritait à son aisselle un rameau axillaire.

M. Bertrand a pu déterminer l'organisation interne des tiges et des feuilles; par la méthode des coupes successives il y a suivi le parcours des faisceaux libéro-ligneux. Cette étude l'a conduit, ainsi que M. Bernard-Renault, à voir dans les *Poroxylon* des Gymnospermes ayant encore un reste d'organisation lycopodiacée; il les considère comme intermédiaires entre les Phanérogames et les Cryptogames vasculaires, plus particulièrement les Lycopodiacees. Ils sont inférieurs aux *Cycas* et *Cordaites*, mais supérieurs aux *Lygirodendron* et *Sigillaria*.

M. Bertrand conclut aussi que le faisceau foliaire des Cycadées n'est qu'un reste d'organisation ancienne. Ses observations sur les faisceaux ayant porté sur un grand nombre de plantes fossiles, il croit pouvoir en tirer cette loi que dans les faisceaux unipolaires normaux le bois primaire centrifuge représente uniquement la portion interne différenciée du bois cambial des faisceaux diploxylés. Maurice Hovelacque.

Lignier (O.). — *Recherches sur l'anatomie des organes végétatifs des Lécythidacées*, *Bulletin scientifique de la France et de la Belgique*, 1890.

La famille des Lécythidacées renferme uniquement des plantes exotiques, dont un certain nombre d'espèces ont beaucoup embarrassé les botanistes. D'après M. Lignier, en tenant compte des caractères anatomiques, on peut la diviser en trois tribus : les Lécythidées, les Barringtoniées et les Napoléoniées. L'auteur prend comme type de son étude diverses espèces du genre *Gustavia*, auxquelles il compare les autres espèces de la famille, en se plaçant surtout au point de vue de la connaissance complète du *système libéro-ligneux foliaire*, dont il mentionne dans les moindres détails le parcours, la nature et l'importance des éléments. Il emploie à cet effet une notation qui, dit-il, a le grand avantage d'indiquer toujours par elle-même, et sans qu'il soit besoin de recourir à la figure, la position de chaque faisceau dans le système libéro-ligneux foliaire. La lecture du texte et des dessins reste cependant très laborieuse. L'auteur montre d'ailleurs comme conclusion que, malgré la complication des faisceaux, il est toujours possible de déterminer rapidement et en se servant de caractères anatomiques, la tribu ou la sous-tribu à laquelle appartient une Lécythidacée donnée, à l'aide d'une section transversale soit d'un entre-nœud, soit plutôt du pétiole. Les Barringtoniées sont particulièrement remarquables par l'orientation inverse de tous les faisceaux corticaux de la tige, et de ceux de l'arc postérieur du pétiole. Quant à la véritable position des Lécythidacées dans la classifi-

cation, elle paraît devoir être près des Myrtacées et particulièrement des Myrtées.

C. SAUVAGEAU.

Trouessart (E. L.). — *La Géographie zoologique*. In-16 de 328 p. et 2 cartes. J.-B. Baillière et fils, Paris, 1890.

Un ouvrage français sur la géographie zoologique manquait encore à notre littérature scientifique. M. Trouessart, bien préparé par ses études antérieures à entreprendre la tâche difficile de combler cette lacune, nous donne aujourd'hui sur cette matière un petit livre concis et substantiel, qui lui fait le plus grand honneur.

Il adopte les six grandes régions géographiques établies par Scater, puis admises par Wallace; il distingue en outre deux régions nouvelles, l'une arctique ou du pôle nord, l'autre antarctique ou du pôle sud. Il expose les caractères propres à chaque région et signale avec une grande précision les espèces typiques de chaque contrée; il étudie les divers groupes d'animaux suivant leur habitat et leurs moyens de dispersion. L'un des chapitres les plus originaux et les plus intéressants de ce livre est assurément celui dans lequel l'auteur démontre que les grandes lois de la géographie zoologique sont également vraies pour les faunes anciennes.

L'ouvrage de M. Trouessart est bien écrit, d'une lecture agréable et d'une grande clarté; le fond et la forme sont également louables. Nous regrettons d'autant plus vivement que l'illustration ne soit pas à la hauteur du texte, que les cartes ne soient pas plus nombreuses et que les deux seules cartes qui l'accompagnent soient d'une aussi déplorable exécution.

D^r Raphaël BLANCHARD.

Beauvis (H.). *Professeur de physiologie à la Faculté de médecine de Nancy, Directeur du laboratoire de psychologie physiologique à la Sorbonne.* — *L'évolution du système nerveux*. — Un vol. in-16, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1890.

Le livre de M. Beauvis est un véritable petit traité d'anatomie comparée du système nerveux; l'auteur y embrasse d'un coup d'œil d'ensemble les formes multiples de ce système, et montre comment ces formes dérivent les unes des autres. Se fondant sur la loi de Darwin et de Fritz Müller, à savoir que l'évolution individuelle est calquée en quelque sorte sur l'évolution des espèces, il étudie le développement du système nerveux chez l'embryon et sa complexité croissante dans la série animale.

M. Beauvis examine d'abord les animaux dépourvus de système nerveux, les Protozoaires, doués cependant de mouvement et de sensibilité et chez lesquels l'activité nerveuse est pour ainsi dire à l'état diffus; puis il établit quatre types de système nerveux : 1^o le type disséminé des Coelentérés inférieurs, constitué par un plexus nerveux qui réunit les cellules sensitives de l'ectoderme aux éléments moteurs; 2^o le type radié qui commence à se centraliser chez les Méduses et s'accroît chez les Echinodermes, et dans lequel tous les centres paraissent avoir la même valeur; 3^o le type bilatéral ventral des Vers et des Arthropodes, caractérisé par une double chaîne de ganglions, chaque paire ganglionnaire commandant à un segment du corps. Un centre nerveux prédominant, le cerveau, fait ici son apparition; il est dorsal, placé au-dessus du tube digestif; de plus, à mesure qu'on s'élève des espèces inférieures aux supérieures, on observe une tendance des ganglions de la chaîne ventrale à se fusionner. Les Mollusques se rattachent à ce type, comme le prouvent les formes de transition des *Chiton* des *Neomenia*. Enfin 4^o le dernier type est le type médian dorsal des Vertébrés qui commence chez les Tuniciers et l'*Amphioxus* et aboutit au système nerveux si complexe de l'Homme.

Un grand nombre de bonnes figures empruntées aux meilleurs auteurs permettent de suivre avec la plus grande facilité les descriptions anatomiques de

M. Beannis. Un vocabulaire des termes techniques placé à la fin de l'ouvrage en permet la lecture aux personnes les moins initiées au langage scientifique.

FÉLIX HENNEGY.

Locard (A). — *Les Huitres et les Mollusques comestibles*. J.-B. Baillière et fils. Paris, 1890.

Dans ce livre l'auteur a réuni l'histoire naturelle, la culture industrielle, et l'hygiène alimentaire des nombreuses espèces de Mollusques comestibles qui vivent sur les côtes de France.

Répondant aux préoccupations des économistes relatives à l'alimentation de l'homme, il a montré les ressources dont on dispose par la culture sagement conduite de ces animaux. Il rend hommage à Coste qui a tant fait pour l'industrie des pêches marines et à qui l'on doit de si heureuses modifications dans la culture des huitres. L'élevage des huitres occupe en France 300,000 individus, la superficie des parcs, sur les domaines de l'Etat, est de 13,000 hectares exploités par 37,000 individus.

C. NAUD.

4^e Sciences médicales.

Klein (D^r E), Membre de la Société Royale, Professeur d'anatomie et de physiologie générales à l'Ecole de médecine de l'Hôpital Saint-Barthélemy; Professeur de bactériologie au Collège médical de Londres. — *The Bacteria in Asiatic cholera*. Un vol., 179 p., Macmillan and Co, London, 1890.

Cet ouvrage est la réimpression d'articles publiés dans le *Practitioner* en 1886-87. L'auteur se pose la question de savoir si le bacille-virgule, découvert par Koch dans le choléra, est bien l'agent pathogène de cette maladie. Il croit pouvoir affirmer le contraire et ranger ce micro-organisme parmi les nombreux saprophytes qui pullulent dans l'intestin. Il n'existe, selon lui, aucun rapport entre le nombre des bacilles-virgules trouvés dans le contenu intestinal des cholériques et la gravité de l'affection; ils peuvent même être très rares dans les cas les plus favorables; si on les trouve dans les coupes microscopiques de l'intestin, cela résulte d'un phénomène de putréfaction, de la multiplication de ces bactéries après la mort.

M. Klein établit qu'il y a un grand nombre d'autres bacilles présentant une grande analogie de forme et de culture avec le spirille du choléra; ainsi dans la salive des individus sains (Miller, Lewis), dans le vieux fromage (Dencke), dans le contenu intestinal du co-baye, du singe, etc.,...

Ces objections ne sont pas démonstratives. Outre que l'observation de Koch a été confirmée par beaucoup de bactériologistes, il est acquis que la virulence des microbes n'est pas toujours fonction de leur nombre (exemple: le tétanos); d'autre part, de ce qu'il existe plusieurs organismes banals présentant plus ou moins de ressemblance avec le bacille virgule, on ne peut en aucune manière conclure à une identité de nature et de fonction entre eux.

L'argument le plus sérieux qui ait été invoqué contre la découverte de Koch repose sur les résultats de l'inoculation expérimentale des cultures du Komma-bacille; celle-ci ne réussit qu'à la condition ou bien de lier le canal cholédoque et d'injecter la culture dans le duodénum, pour éviter l'action de la bile et du suc gastrique; ou bien de neutraliser avec la soude le contenu acide de l'estomac avant de faire ingérer la culture (Nicati et Rietsch, Koch). La mort des animaux avec des phénomènes cholériques et la présence de très nombreux bacilles-virgules dans l'intestin ne s'obtiennent, dès lors, qu'au prix d'une opération un peu compliquée, sinon dangereuse, qui agit avec elle son contingent étiologique dans les troubles morbides provoqués; M. Klein fait ressortir ce fait. Mais l'objection fondée sur les résultats incertains des inoculations du choléra aux animaux perd beaucoup de valeur, si l'on songe qu'on ne connaît, dans l'Inde ou ailleurs, au-

cun animal qui prenne spontanément cette maladie.

Enfin Finkler et Prior ont trouvé dans le choléra *nostras* un bacille courbe qui diffère à peine de celui du choléra asiatique. Inoculé dans les mêmes conditions que le spirille de Koch, il détermine aussi la mort des animaux avec des phénomènes cholériques. Partant de ce fait qu'on attribue à deux organismes qu'on peut regarder comme identiques la cause de deux maladies différentes: choléra *nostras* et choléra indien, M. Klein conclut que ces microbes ne sont spécifiques ni de l'une ni de l'autre. Mais ces deux maladies sont-elles réellement différentes? Leur symptomatologie est la même et leur seul caractère distinctif, si c'en est un, est leur nature endémique ou épidémique. Cela suffit-il à écarter l'unité de cause? Il n'est peut-être pas téméraire de penser, avec quelques-uns, que l'organisme de Finkler et Prior n'est probablement que le parent très rapproché, sinon le descendant domestiqué, atténué du bacille-virgule de Koch. Cette opinion encore hypothétique ne heurte ni les lois de la bactériologie ni celles de l'épidémiologie.

On trouvera, dans l'ouvrage de M. Klein, une étude très complète de la morphologie du komma-bacille et de ses caractères dans les divers milieux de culture.

D^r H. VINCENT.

Metchnikoff (M. El.), Chef de service à l'Institut Pasteur. — *Etudes sur l'immunité: Le charbon des rats blancs*. — *Annales de l'Institut Pasteur*, avril 1890.

M. Metchnikoff attache, on le sait, une très grande importance au phénomène de la phagocytose, qu'il a découvert, dans l'établissement de l'immunité, et il s'efforce de multiplier les preuves pour asseoir sa doctrine sur des bases de plus en plus solides. Comme on avait cherché à établir que l'immunité des rats blancs pour le charbon est un argument sérieux contre la théorie des phagocytes, il s'est livré à une expérimentation suivie sur ces animaux et de ses expériences sont sorties quelques conclusions intéressantes.

M. Metchnikoff a d'abord cherché à élucider un point encore obscur: dans quelle mesure les rats blancs sont-ils réfractaires à la maladie charbonneuse? Et sur ce point il présente quelques résultats inattendus. Tout d'abord les rats blancs n'ont pas une immunité aussi solide qu'on l'avait affirmé et un certain nombre de sujets succombent à l'inoculation, et cela d'autant plus facilement qu'ils sont plus jeunes. (C'est là d'ailleurs un phénomène général en pathologie microbienne.) D'autre part, lorsqu'un rat blanc a résisté à une première inoculation, son immunité naturelle n'en est pas renforcée: cette première inoculation ne le vaccine pas; au contraire il semble qu'il soit plus apte à prendre la maladie qu'avant la vaccination, et M. Metchnikoff cite nombre d'exemples de ce fait tout à fait nouveau et extrêmement important.

Ceci une fois dit, et étant démontré que l'immunité des rats blancs n'est que relative, quels est l'origine de l'immunité? M. Metchnikoff rejette la théorie de Behring qui veut voir la cause de cette immunité dans un excès d'alcalinité du sang. D'après l'auteur, cette doctrine est erronée et c'est la phagocytose qui constitue le principal mode de destruction des bactéries charbonneuses dans l'organisme des rats blancs. M. Metchnikoff en fournit une preuve dans ce fait qu'en inoculant la bactérie sous forme de spores, ou la voit toujours germer et produire des bâtonnets, qui plus tard seront absorbés par les phagocytes. Toutes les formes de la phagocytose ont été encore observées ici, avec cette particularité que les acteurs sont ici surtout les macrophages, représentés par des cellules de la pulpe splénique, les cellules étoilées de Kupffer et les leucocytes uninucléés du foie; les microphages sont au contraire l'exception. On lira avec intérêt les détails dans lesquels est entré M. Metchnikoff pour la démonstration de sa doctrine, car son mémoire renferme une ample moisson de faits neufs et bien observés.

D^r H. DUBIEF.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 2 juin 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — MM. Lœwy et Puiseux indiquent la façon d'appliquer à la mesure précise des distances angulaires des astres l'appareil optique dont ils ont récemment donné la théorie complète, à savoir un double miroir plan formé par deux faces d'un prisme. On installe ce prisme devant l'objectif d'un équatorial. — M. E. Cosserat : Observations de la comète Brooks (19 janv. 1890) faites à l'Observatoire de Toulouse.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Ernest Cesaro étudie analytiquement la courbe représentative des phénomènes de diffraction donnée par M. Cornu. — M. Ch. Antoine a proposé, pour exprimer la relation entre la pression, le volume et la température absolue d'un gaz une formule plus simple que celles de MM. Van der Waals et Sarrau (voyez à ce sujet dans le présent numéro de la Revue l'article de M. Ph. A. Guye, page 365); il examine si cette formule donne des valeurs suffisamment approchées des nombres trouvés expérimentalement pour l'azote par Regnault et M. Amagat. — M. Gouy indique les applications que peut recevoir l'électromètre à quadrants employé comme appareil balistique. — M. E. Renou envoie le résumé des observations météorologiques faites à l'Observatoire du Parc Saint-Maur pour le mois du mai 1890. — M. Ph. A. Guye a montré qu'on peut fixer la grandeur du poids moléculaire d'un corps au point critique par une relation simple entre le pouvoir réfringent spécifique et le coefficient critique (rapport de la température critique absolue à la pression critique). Aujourd'hui, il indique la façon de calculer a priori le coefficient critique d'un composé ou d'un mélange à partir des coefficients atomiques critiques; les résultats varient considérablement suivant qu'il y a ou non combinaison, il y a une méthode pour déterminer si un corps est décomposé ou non au point critique. — M. Berthelot a déterminé le détail du mécanisme suivant lequel s'effectue la réduction des sulfates alcalins par l'hydrogène et par le charbon. Dans les deux cas, la réaction véritable, qui explique les phénomènes, leur développement initial et leurs phases successives diffère de celle qu'on avait supposée en ne tenant compte que des produits ultimes; pour l'hydrogène, il se forme d'abord un sulfhydrate de sulfure et un hydrate alcalin; pour le charbon, il est nécessaire de passer par l'intermédiaire de l'oxyde de carbone. Ces réactions sont d'ailleurs exothermiques. — M. A. Joly étudie les chlorosels de l'iridium; ses dosages assignent au poids atomique de ce métal une valeur très voisine de celle donnée par M. Seubert, soit 192,75 pour $H = 1$. — M. A. Gorgeu étudie les bioxydes de manganèse obtenus par la voie humide. — M. Ch. Astre, par l'emploi de l'acide acétique, a obtenu quelques nouveaux iodures double de bismuth et de potassium. — M. E. Augé rectifie quelques affirmations contenues dans les traités classiques au sujet de l'alun de soude : il pense que les auteurs ont opéré sur de l'alun de soude mélangé de sulfate de soude.

3^o SCIENCES NATURELLES. — Des recherches récentes viennent de confirmer la théorie de M. Dareste sur le mode de formation des monstres omphalocéphales : deux blastèmes formatifs du cœur se rejoignant à la région dorsale et non plus à la face ventrale. — M. Louis Roule expose le processus du développement des feuillets blastodermiques chez les Géphyriens tubicoles. — M. Edmond Perrier a cherché une classification naturelle pour le groupe des Gastéropodes prosobran-

ches; les noms des principales divisions sont tirés des caractères et des rapports du cœur et des reins. — M. A. Pomel établit les caractères et la classification des Hippopotames fossiles de l'Algérie. — M. Ant. Magnin indique que l'altération produite par l'*Ustilago Vaillantii* sur les inflorescences du *Muscari comosum* consiste à transformer les fleurs stériles de la houppe en fleurs mâles, et non à supprimer cette houppe; il signale quelques phénomènes accompagnant la castration parasitaire des Euphorbes. — Les expériences de M. Bouchard établissent : 1^o Que les produits solubles d'un microbe pathogène injectés dans le sang d'un animal, lui communiquent vis-à-vis de ce microbe un pouvoir bactéricide qui subsiste après élimination de ces produits; 2^o Certains de ces produits s'opposent à la diapédèse. — M. Charrin et Gamaleia ont constaté que les produits solubles du bacille pyocyanique, par une action physiologique indéterminée, s'opposent à l'inflammation produite habituellement par les frictions à l'huile de croton. — M. G. Jacquemin rappelle ses travaux sur l'influence de l'espèce de levure sur le bouquet des boissons fermentées. — M. A. Lacroix : Sur la Syénite éololithique de Montréal (Canada) et sur les modifications de contact endomorphes et exomorphes de cette roche.

Séance du 9 juin 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. H. Resal : Sur le mouvement d'un prisme reposant sur deux appuis, soumis à l'action d'une force normale variable, suivant une loi particulière, appliquée en un point déterminé de la fibre moyenne. — M. J. Boussinesq : Théorie du mouvement permanent, graduellement varié, qui se produit près de l'entrée évacuée d'un tube fin, où les filets d'un liquide qui s'y écoulent n'ont pas encore atteint leurs inégalités normales de vitesse. — M. A. de Saint-Germain : Sur un cas particulier du mouvement d'un point dans un milieu résistant. — MM. Rambaud et Renaux : Observations de la comète Brooks (mars 19) faites à l'équatorial coudé de l'Observatoire d'Alger. — M. Ch. Trepied : Observation photographique de la comète Brooks faite à l'Observatoire d'Alger.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — MM. Hurion et Mermeret ont mesuré le retard que subissent les vibrations lumineuses en traversant une lame d'or; ce retard est très variable suivant la portion du spectre considérée et diminue rapidement avec la longueur d'onde. — M. Alfred Angot a calculé d'après quinze années d'observations horaires faites au parc Saint-Maur, l'amplitude moyenne de la variation diurne de la température. Après avoir éliminé l'influence de la nébulosité, il a établi une formule qui, en fonction de la longitude du soleil, de sa distance à la terre et de constantes propres à la station, exprime les faits avec une très grande approximation. — M. H. Faye donne le schéma d'une tempête, en plan et en coupe verticale, pour servir de base aux observations météorologiques des stations de montagne. — A. Minet : Un mélange de fluorure double d'aluminium et de sodium et de chlorure de sodium est très propre à la préparation de l'aluminium par électrolyse du sel fondu; on évite que le bain attaque la cuve, en rattachant celle-ci en dérivation au pôle négatif par l'intermédiaire d'une résistance assez considérable. — M. Recoura a montré que les solutions étendues de sesqui-bromure de chrome vert virent au violet; il a isolé le sel qui résulte de cette transformation, le sesqui bromure de chrome bleu. — M. J. Riban indique, pour séparer et doser le zinc en présence du manganèse, une méthode qui repose sur la précipi-

lation de ce métal par les hyposulfites alcalins. — M. G. Vogt communique ses recherches sur les procédés d'analyse des argiles et kaolins. — MM. Charles et Georges Friedel ont obtenu la *néphéline*, la *sodalite*, l'*amphigène*, l'*orthose*, l'*anorthite*, en attaquant en tube scellé du mica par diverses solutions alcalines et salines. (Voir la *Revue* du 15 mai, page 288.) — M. C. Chabrie montre que le tétrallure de carbone peut être préparé dans un appareil de verre. Il a obtenu un nouveau gaz, le *fluorure de méthylène*, par l'action du fluorure d'argent sur le chlorure de méthylène. — M. G. Flourens, étudiant comparativement par la liqueur cuivrique et le polarimètre les produits de la saccharification des matières amylacées par les acides, s'est assuré qu'il ne se forme qu'une seule dextrose comme intermédiaire et que la maltose n'apparaît jamais.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. Muntz démontre dans le sol l'existence d'un organisme producteur d'ammoniaque aux dépens des matières organiques azotées; cet agent prépare probablement les voies au ferment nitrique. — M. H. Fol a reconnu que les fibrilles qui se mêlent aux grosses fibres cornées chez certaines éponges (*Hirenia*) sont des fibres de tissu conjonctif et non des parasites. Le tissu conjonctif est très abondant chez les *Sarcopus*, genre créé pour une espèce nouvelle découverte par M. Fol à Nice. — M. L. Bouvier, par l'examen d'un grand nombre de Crustacés décapodes, a vu que le cercle circulatoire de la carapace existe bien nettement et qu'il a un rôle respiratoire. — M. P. Thélohan signale deux Coccidies parasites des poissons, l'une dans le foie de l'épinoche, l'autre dans le testicule de la Sardine. — M. Heudes, étudiant les systèmes dentaires des mammifères, a pu établir une relation très constante entre la forme des dents et la division du pied chez les ongulés, à la condition de considérer comme *primordiale* la molaire de lait. — M. E. Bataillon a observé dans les cellules de la queue du têtard un filament chromatique, en rapport avec le nucléole, qui présente des phénomènes cinétiques, tandis que le noyau est à l'état de repos. — M. E. Olivier a observé qu'une *Tenthrévidée*, l'*Emplytus tener*, pond ses œufs sur les sarments fraîchement taillés, dont sa larve détruit la moelle. — Le prince de Monaco, au moyen de ses appareils spéciaux, a recueilli un assez grand nombre d'animaux marins à une profondeur de 1.600 mètres, au large de Monaco. — M. Marcel Brandza a étudié l'évolution des téguments de l'ovule chez les Angiospermes et leurs rapports avec les téguments de la graine. — M. Bleicher a examiné les phosphates du massif du Dekma (département de Constantine). Ces phosphates, très abondants dans plusieurs couches écènes, sont d'origine animale. — M. G. Vasseur décrit les dépôts marins pliocènes qu'il a découverts en Vendée.

Séance du 16 juin 1890

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. J. Boussinesq : Théorie du mouvement permanent qui se produit près de l'entrée évasée d'un tube fin; application à la deuxième série d'expériences de Poiseuille. — M. J. Boussinesq : Calcul des températures successives d'un milieu homogène et athermane indéfini que sillonne une source de chaleur. — M. Maurice Lévy indique les méthodes dont s'est servie la Commission instituée en 1878 pour le nivellement général de la France; il exprime le regret qu'elle ait changé le zéro de Bourdaloue et se prépare à changer son propre zéro à mesure que le niveau moyen de la mer sera déterminé avec plus de précision; il eût préféré qu'on conservât le zéro de Bourdaloue en le rattachant à des repères matériels et au niveau moyen de mieux en mieux défini.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. Gouy montre *a priori* à partir du principe d'Huygens, et par des expériences, que le passage d'un rayon lumineux par un foyer réel donne aux ondes une avance d'une demi-période. — M. Ch. Antoine établit et étudie d'après les expériences de Regnault et celles de M. Amagat, l'équation

caractéristique de l'hydrogène. — M. E. H. Amagat a déterminé la variation de l'élasticité du verre et du cristal avec la température. En observant la déformation intérieure d'un piézomètre comprimé par l'extérieur, il a vu qu'entre 0° et 200°, cette variation est trop faible pour influer sur les recherches relatives aux volumes des gaz. — M. Marc Dechevrens rappelle ses travaux sur la variation de la température avec l'altitude dans les cyclones et anticyclones. — M. Besson : Sur les combinaisons et réactions du gaz ammoniac et du gaz hydrogène phosphoré sur les composés halogènes de l'arsenic. — M. G. Rousseau définit les cas dans lesquels il est possible de préparer des oxychlorures métalliques cristallisés par l'action d'un carbonate alcalino-terreux sur le chlorure du métal; il étudie les oxychlorures du cuivre. — M. Emile Tassel a obtenu par l'action de l'acide hypozotique sur le pentafluorure de phosphore un produit d'addition, Az O³ Ph F⁵. — M. Berthelot a déterminé les chaleurs de transformation des inosités isomères; les résultats sont semblables à ceux obtenus pour les acides tartriques. — M. C. Matignon a mesuré la chaleur de formation de l'acide urique et des urates alcalins. — MM. Béhal et Choay signalent un isomère de la chloralimide; ils ont obtenu la transformation isomérique de la chloralimide en son isomère et inversement. — M. A. Aignan indique le moyen de reconnaître, par le polarimètre, si une huile de lin est mélangée d'huile de résine.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. Cuénot a étudié la glande signalée par M. R. Perrier dans l'oreille de la *Paludina vivipara*; c'est une glande lymphatique; la glande qui avoisine le rein chez les Prosobranches s'écarte au contraire du type des glandes lymphatiques. — M. William Russell démontre que les bourgeons multiples, qu'on observe dans un assez grand nombre de végétaux divers, doivent être considérés comme des ramifications normales de générations superposées. — M. E. Bartet a recherché, pour divers espèces forestières, quelles sont les époques d'abâtage les plus favorables au rejet des souches, dans l'exploitation en taillis. — Les expériences de MM. J. Héricourt et Ch. Richet montrent que la transfusion péritonéale du sang de chien chez le lapin retarde l'évolution de la tuberculose. — M. Andréa Ferrarini a déterminé *in vitro* l'influence que les divers antiseptiques peuvent avoir pour empêcher la digestion stomacale. — M. H. Fol adresse une note sur la ressemblance entre époux. — M. Bischoffsheim est élu membre libre.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 10 juin 1890.

M. Budin lit un rapport constatant que dès 1852 M. Delot avait vu et signalé l'endocardite d'origine puerpérale. — M. Thévard présente un cas de laparotomie pratiquée 15 heures après le diagnostic d'une rupture de l'utérus chez une femme rachitique à bassin rétréci, en travail depuis 12 heures : utérus rompu au niveau des culs-de-sac vaginaux, complètement séparé du vagin, refoulé à la face inférieure du foie; sutures, guérison en 31 jours. — M. Michaud présente un cas de cholécystectomie pour fistule biliaire datant de 3 ans chez un homme de 26 ans; guérison en 30 jours. Il conseille de faire l'incision sur le bord externe du muscle droit, d'exciter séparément le trajet fistuleux, de faire une ligature peu serrée du pédicule, de le rentrer dans la cavité péritonéale; ainsi faite, ce n'est pas une opération grave : mortalité 5, 6 0/0. — M. Heckel adresse une lettre au nom de M. Duhamel président du club alpin (section de l'Isère) qui considère, d'après l'expérience de nombreux alpinistes, que la caféine n'a pas la même action que la Kola; modératrice de la circulation et des sécrétions, excitante de la contraction musculaire, il propose à M. Germain Sée des expériences comparatives. — M. Laborde continue son étude des

accidents dus au chloroforme. Au début de la chloroformisation il y a action de contact, irritative des fibres nerveuses, de la pituitaire déterminant un réflexe d'arrêt du cœur par le centre cardiaque bulbaire, et des muqueuses laryngée et bronchique déterminant un réflexe d'arrêt respiratoire par le centre bulbaire. Après absorption la mort survient par toxicité. — D'après les expériences de Charles Richet et Langlois il y a accumulation dans le sang de produits toxiques habituellement rejetés par l'expiration et le moindre obstacle (chute de la langue) détermine l'asphyxie. Enfin la mort peut survenir par action réflexe d'arrêt du cœur au moment de l'incision cutanée, la sensibilité n'étant pas encore abolie.

M. M. Lannelongue (de Bordeaux) et Pamard sont élus membres correspondants nationaux.

Séance du 17 juin 1890.

M. Féréol lit un rapport sur la communication de M. Glénard relative à l'exploration du foie et à son rôle dans le diabète : le procédé d'exploration « du pouce » très précis, peut donner d'excellentes indications ; dans le cas de diabète 60 fois 0/0 le lobe droit du foie est altéré, il existe une connexion intime entre l'alcoolisme, la lithiase biliaire et le diabète ; il y a un diabète vrai, hépatique, d'origine exclusivement alcoolique. — M. Laborde examine les moyens propres à remédier aux accidents dus au chloroforme. L'accident initial peut être évité : 1° en atténuant les effets irritatifs des vapeurs de chloroforme par la diminution de la sensibilité périphérique, morphine, narceine, cocaïne ; 2° en diminuant le pouvoir inhibiteur des pneumogastriques sur le cœur ; curare, qui ne peut être employé chez l'homme, atropine, mise en usage à dose modérée par les chirurgiens lyonnais. Les effets toxiques peuvent être évités grâce au dosage par les appareils de Paul Bert, Raphaël Dubois, le simple cornet des chirurgiens de marine. La respiration et le pouls doivent être surveillés au besoin à l'aide d'appareils comme le pneumocardiographe.

MM. Hergott (Nancy) et Bourguet (Aix) sont élus membres associés nationaux.

D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 14 juin 1890.

MM. Brown-Séquard et Darsonval ont recherché combien de temps une grenouille peut vivre dans différents gaz et dans le vide ; cet animal meurt, dans l'acide carbonique pur, après quelques minutes ; dans l'hydrogène exempt d'arsenic, au bout de 8 ou 10 heures ; dans l'azote, après, 24, 36 heures, et même davantage. Dans le vide presque absolu, maintenu par une trompe à eau, il vit pendant plusieurs jours. — M. Brown-Séquard rapporte des faits observés par des médecins de tous les pays, qui auraient vu le liquide testiculaire, en injections sous-cutanées ou mieux rectales, combattre avantageusement l'adynamie dans les maladies les plus diverses. — M. Tuffier a constaté que l'urine aseptique est parfaitement tolérée dans les cavités naturelles ou dans l'épaisseur des tissus ; mais les chiens auxquels on coupe un urètre, l'urine s'écoulant dans la cavité abdominale, périssent au bout de quelques jours. — M. Fabre-Domergue a observé chez un poisson une tumeur sous-cutanée composée exclusivement de bactéries. — M. Laguesse a saigné à blanc des embryons de truite, par la section de la queue ; le sang se renouvelle très rapidement par des leucocytes fournis par la rate et par le rein. — M. Schmitt a constaté l'action déprimante de la chloralamide sur la circulation. — M. Phisalix a étudié les rapports de l'épithélium dans le jabot du pigeon, avec le réseau vasculaire sous-jacent ; celui-ci pénètre dans les couches profondes de cet épithélium, qui, au moment de la lacta-

tion, desquame ses couches superficielles, et, s'invaginant entre les mailles vasculaires, forme de véritables glandes.

Séance du 21 juin 1890

M. Quinquaud a reconnu que le sang d'un animal asphyxié a gardé intacte sa capacité respiratoire. Si l'asphyxie est rapide, le sang et les tissus contiennent la même proportion d'acide carbonique ; si elle est lente, les tissus en contiennent deux fois plus que le sang. L'oxygène de l'air confiné dans les poumons est absorbé complètement. — M. Gley, étudiant l'action physiologique du mono et du bichloralantipyrine, a constaté que ces composés sont toxiques par le chloral qu'ils renferment ; l'association a pour effet d'augmenter la toxicité de chloral. — MM. Macret et Bosc concluent de leurs expériences que la chloralamide n'agit que par le chloral qu'elle contient. — M. Laveran discute la question du polymorphisme ou de la pluralité des hématozoaires de l'impaludisme : l'ensemble des faits tend à prouver que le parasite est unique, mais polymorphe. — M. Achalme rapporte un cas de suppuration du tibia à la suite d'une fièvre typhoïde ; les recherches microbiologiques firent constater dans le pus l'existence du seul bacille typhique. — M. Dupuy a eu occasion d'observer, à la suite d'application d'arnica sur une plaie, une intoxication caractérisée par un gonflement de la face pareil à de l'érysipèle. — M. Cassedebat indique combien délicates sont les différences qui séparent les faux bacilles typhiques des eaux du bacille pathogène ; il est très difficile d'affirmer la présence de celui-ci dans une eau. — M. Fabre-Domergue a étudié le système circulatoire des infusoires ciliés.

L. LAPICQUE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 20 juin 1890.

M. Bouasse fait au nom de M. Mascart une communication sur un dynamomètre de transmission à lecture directe et enregistrement photographique. Le principe en est simple : comme dans tous les appareils de ce genre, on réunit le moteur aux organes destinés à recevoir le travail par une liaison déformable, dont les déplacements relatifs déterminent l'effort à chaque instant et permettent d'évaluer le travail produit. Supposons d'abord que l'arbre de commande soit coupé et que les bouts soient terminés par deux poulies de même diamètre reliées par un système de ressorts. La poulie de commande porte un repère qui se meut en face d'une division tracée sur la surface extérieure de la poulie entraînée ; le déplacement du repère permettra par une graduation expérimentale de connaître le couple moteur. Pour lire les indications du repère pendant que l'arbre est animé d'un mouvement de rotation on emploie, un système optique mobile qui donne une image fixe pendant une fraction notable de la période de révolution. Si l'on ne peut couper l'arbre, il suffit de rendre la poulie entraînée folle sur l'arbre et de la monter sur un manchon qui porte également la poulie sur laquelle s'enroulent les courroies de transmission. L'appareil comporte un enregistrement photographique : il suffit de remplacer le repère par un index qui chevauche sur les divisions et de produire une image réelle sur une fente derrière laquelle se meut une feuille de papier sensible. — M. Hillairet entretient la Société d'un coup de foudre remarquable qu'il a eu l'occasion d'observer dans le Dauphiné ; un orage violent ayant éclaté dans le voisinage d'une ligne installée pour une transmission de force, la foudre a frappé exclusivement les poteaux plantés sur une nappée d'eau souterraine. Tous ont été atteints du côté d'où venait la pluie, et au-dessous des divers fils conducteurs qu'ils portaient.

Lucien POINCARÉ.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 3 juin 1890

SCIENCES PHYSIQUES. — Le général Walker rend compte des expériences qu'il a faites avec le pendule pour déterminer l'intensité relative de la pesanteur aux observatoires de Kew et de Greenwich. En rapportant les chiffres au niveau de la mer, on constate que la pesanteur est plus intense à Kew d'un 0,64 d'oscillation. — M. F. Thomas Andrews communique le résultat de ses observations sur la glace pure. Il a pris une tige d'acier poli de 0^m40 de long et de 0^m07 de diamètre, et il l'a placée dans une position verticale sur un gros bloc de glace; un poids de 18 kilos était placé à l'extrémité supérieure de la tige. L'objet de ces expériences était de déterminer la plasticité de la glace aux différentes températures; on y parvenait en mesurant la longueur de la tige qui pénétrait dans la glace en un temps donné. On a constaté dans une série d'expériences faites à des températures croissant graduellement de 20° à 30° F., que la plasticité de la glace s'accroissait très rapidement et dans de très larges proportions après que la glace avait atteint la température de 32°, et pendant le temps qu'elle était maintenue à cette température. Des expériences analogues ont été faites sur la glace naturelle de lac et d'étang; si on compare les résultats obtenus avec ceux des expériences sur les blocs de glace pure spécialement préparés, on constate que les différences de pénétration de la tige sont beaucoup plus grandes. — M. Th. Andrews communique également une note sur l'état passif du fer et de l'acier. La conclusion générale à laquelle l'amènent de minutieuses observations, c'est que l'état passif du fer et de l'acier ne doit pas être regardé comme fixe ou statique, les observations électro-chimiques tendant à montrer que la passivité est une propriété plus ou moins influencée par des conditions variées, telles par exemple que les variations de la structure moléculaire et de la composition chimique du fer et de l'acier, la concentration de l'acide nitrique, les modifications des conditions physiques concomitantes, magnétisme, température, etc. — Lord Rayleigh fait une communication sur la viscosité superficielle de l'eau. Un simple anneau de fil de cuivre mince était soutenu par un fil fin de soie de telle sorte qu'il pût tourner librement autour de son centre. Pour donner une position fixe à l'anneau et pour faciliter les déplacements forcés, on attache à l'anneau avec de la cire une aiguille à coudre aimantée. Lorsqu'on veut faire une expérience on place l'anneau sur la surface de l'eau, contenue dans un vase. Quand tout est en repos, on couvre la surface de l'eau de soufre réduit en poussière fine, et on met en rotation par l'action d'un aimant extérieur au système, tout le système suspendu. On constate, que bien loin que la surface de l'eau entourée par l'anneau soit entraînée par lui sans rotation, il ne se produit pas le plus léger mouvement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'anneau. Il est donc clair que la surface de l'eau, dans les conditions ordinaires, ne peut résister d'une manière appréciable à l'action d'un objet qui la rase, qui glisse sur elle. L'expérience a été légèrement modifiée par l'addition à l'anneau d'un diamètre de même matière. Dans ce cas, le soufre fait voir que la surface totale de l'eau comprise dans les deux demi-cercles partage maintenant le mouvement. On peut dire d'une manière générale que la surface tourne avec l'anneau. Des expériences de cette espèce montrent que ce à quoi résiste une surface aqueuse, ce n'est pas à un objet qui la rase, mais bien aux expansions et aux contractions locales de la surface, même lorsque la surface totale demeure invariable. Quand on ajoute à l'eau une très petite quantité de savon, la surface devient presque rigide. Toute la surface entourée par l'anneau est alors entraînée dans son mou-

vement comme si elle lui était attachée. La gélatine produit un effet semblable. Au moyen d'un appareil spécial, l'auteur a pu montrer que la viscosité superficielle est due en réalité à des souillures. Il a fallu, dans une expérience, 12 battements du métronome, battant le tiers de seconde, à une aiguille de boussole pour parcourir un arc de 60° sur une surface d'eau distillée. La surface a alors été nettoyée par un courant: il n'a plus fallu que 10 battements; après une nouvelle opération, il n'en a plus fallu que 8. En chauffant l'eau et en provoquant ainsi des courants de connexion, le temps a été abaissé à 6 3/4 et après une autre opération à 6. En arrêtant le courant d'air, on en est revenu au chiffre 12. On a recouvert alors l'aiguille d'une couche d'eau d'environ 6^{mm}. Dans ces conditions, le temps a été de 6 3/4. On voit donc que tandis que, sur la surface non nettoyée, ce temps était à peu près double de ce qu'il était dans l'intérieur, il était sur la surface nettoyée inférieur à ce qu'il était dans l'intérieur. Pour l'alcool méthylique, le temps était toujours de 5 à la surface, il s'élevait à 7 1/4 dans l'intérieur. L'auteur pense que la diminution progressive de la tension des surfaces aqueuses bien protégées, que Quincke a observée, s'explique facilement par la formation graduelle d'une couche grasseuse, formée de matières qui viennent de l'intérieur et qui n'existent qu'en très petite quantité. Les membranes de graisse peuvent être extrêmement minces; pour que la viscosité soit sensible, il suffit qu'elles aient 1/40 d'épaisseur, soit environ 1/2 de la longueur d'onde de la lumière jaune. — Le professeur Schuster rapporte les expériences qu'il a faites avec la boîte de couleurs de Lord Rayleigh. Il indique les particularités de la vision, qu'il a découvertes en examinant 70 personnes atteintes d'achromatopsie. Richard A. GREGORY.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 6 juin 1890

M. H. Tomlinson lit un mémoire sur les effets des variations de température sur les points critiques de Villari dans le fer. Ce mémoire est la suite de celui qu'il a déjà communiqué à la Société le 21 mars; la méthode est la même que celle qu'il a décrite à ce moment, mais ici les expériences ont été faites à des températures variant jusqu'à 285°; pour déterminer ces températures, l'auteur s'est servi de la mesure de la résistance d'un fil de platine, dont il avait préalablement étudié les variations avec la température. Le tableau suivant donne quelques-uns des résultats obtenus avec un fil de fer fortement trempé, de 1 millimètre de diamètre, qui a été souvent chauffé jusqu'à 300° et refroidi à la température du laboratoire jusqu'à ce que la perméabilité temporaire avec des charges variées atteigne des valeurs constantes aux deux températures :

Forces magnétiques en unités C. G. S.	Charge en kilogrammes pour lesquelles la perméabilité est la même que pour le fil non chargé aux températures.				
	120°	160°	167°	244°	285°
2.84	4.7	5.0	5.3 et 12	5.7 et 10	4.7 et 9.9
3.70	2.5	3.2	3.6	4.2 et 11.5	3.1 et 12.3
4.8	1.8	2.5	2.7	—	—
7.69	0	0	0	0	0
10.40	0	0	0	0	0
15.32	0	0	0	0	0

Les valeurs ainsi obtenues ont été portées par l'auteur sur une courbe. On voit que dans tous les cas les valeurs du point de Villari sont accrues par une augmentation de température; il résulte aussi de là que l'augmentation de température diminue la variation totale de perméabilité produite par un accroissement de charge. — M. le professeur Rücker communique un mémoire de MM. W. G. Robson et G. W. J. Smith sur les variations diurnes du magnétisme à Kew. Il

fait d'abord remarquer le grand intérêt qu'il y a à avoir des résultats d'observations magnétiques effectuées à des observatoires différents, mais réduites et publiées de la même manière et relatives au même moment. On ne sait pas encore trop quelle méthode générale il conviendrait d'adopter; le plan proposé par l'observatoire de Greenwich est bien laborieux pour être généralement adopté; la méthode proposée en 1883 par le D^r Wild semble préférable: dans cette méthode on obtient la variation diurne moyenne par l'observation de cinq jours dans chaque mois. Voici les résultats obtenus par M. Whipple pendant les années 1870-71-72 pour la comparaison de ces méthodes:



$K_s - K_w = 0^{\circ},7$ (minutes d'arc)...	} où K_s est la variation diurne à Kew obtenue par la méthode de Sabine.
$G - K_s = 1^{\circ},2$	
$G - K_w = 1^{\circ},5$	} K_w le même élément obtenu par la méthode de Wild. et G le même élément obtenu par la méthode de Greenwich.

M. Rücker établit que la méthode de Wild est préférable. Cet avis est d'ailleurs conforme à celui d'un météorologiste autorisé M. Mascart. M. Whipple fait ressortir l'avantage considérable résultant de l'emploi d'instruments enregistreurs: avant l'invention de ces appareils les calculs à effectuer étaient tellement laborieux que des erreurs devaient presque nécessairement se glisser dans les résultats. M. Perry demande si l'on ne pourrait employer quelque machine pour calculer les moyennes des observations inscrites par les appareils. M. Whipple répond que de tels appareils sont en usage au bureau météorologique, mais ils ont l'inconvénient de ne pas éliminer les perturbations accidentelles, dues au passage d'une voiture par exemple dans le voisinage. A ce propos M. Boys fait observer qu'il a construit des instruments intégrateurs à cylindres beaucoup moins chers que ceux de G. Thomson et dont l'inertie est bien moins considérable.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 15 mai 1890.

MM. Armstrong et P. Wynne: Les chlorures de naphthaline et leurs dérivés; manière dont ils sont décomposés par les alcalis. Les auteurs résument cette partie de leur travail dans le tableau suivant. La première colonne indique la constitution du corps en expérience, la deuxième celle du produit obtenu par l'action du chlore; enfin la troisième colonne renferme la formule du composé obtenu par l'action de la potasse sur le chlorure:



MM. Armstrong et P. Wynne: Changements isomériques dans la série de la naphthaline. Influence de la position pour déterminer la nature du changement isomérique dans le cas des acides mono et dichloronaphthaline-sulfoniques. — MM. Meldola et Hughes: Une troisième naphthoquinone. En préparant la monobromindone par l'action de l'acide nitrique fumant sur le dibromo- α -naphthol, on obtient une petite quantité d'un produit insoluble dans l'alcool que ces auteurs considèrent comme une naphthoquinone répondant à la formule



MM. Thomas Carnelley et W. Frew: Les pouvoirs antiseptiques relatifs des composés isomériques. Les recherches sur l'action des dérivés di-substitués de la benzine sur les organismes de l'atmosphère conduisent à conclure que les composés para sont en général plus antiseptiques que les composés ortho et méta correspondants. Ces résultats sont d'accord avec ceux de Wolcott Gibbs et Hare qui ont récemment expérimenté sur des chiens l'action vénéneuse des benzines di-substituées. — M. Perkin: Note sur la préparation de la pyrocatechine. Le phénol peut s'obtenir par l'action de l'acide iodhydrique sur le gaïacol. — M. Lewkowitsch: Deuxième mémoire sur les travaux de Benedikt.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 8 mai 1890.

SCIENCES NATURELLES. — M. W. Waldeyer: Sur l'atrophie du thymus. L'auteur traite de l'atrophie du thymus chez l'homme, spécialement dans un âge avancé. Si l'on en juge d'après les traités classiques et les travaux spéciaux, ce ne serait qu'exceptionnellement que se conserverait jusqu'à la vieillesse un corps ayant la forme du thymus; il serait de même exceptionnel d'y rencontrer dans un âge avancé des restes du tissu thymique normal. Les données de M. Watuly et celles de M. Sappey, dont l'exactitude est relevée spécialement, concordent le plus avec les résultats des recherches nouvelles instituées par M. Waldeyer. Il suit de ces dernières que durant toute la vie jusqu'à l'extrême vieillesse il se conserve toujours dans le médiastin antérieur un corps, ayant la forme du thymus et étant en moyenne un peu plus volumineux que le thymus du du nouveau-né; c'est ce que démontre une série d'autopsies faites chez des personnes de 40 à 70 ans. L'examen microscopique de ce « corps adipeux rétro-sternal ou thymique » y démontre sans exception la présence de restes du parenchyme thymique. Les vaisseaux qui arrivent au corps thymique ont la même origine que ceux du thymus normal. L'auteur se range à l'opinion de MM. Friedleben, His et Watney sur le mode de formation de la graisse dans la grande thymique. Le processus de cette dégénérescence repose sur un développement de graisse dans les stromas conjonctifs; en même temps un nombre assez considérable de cellules parenchymateuses disparaît.

Séance du 22 mai 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Fuchs: Sur les équations différentielles linéaires et intégrables algébriquement. — M. Kronecker: Sur les systèmes

orthogonaux et sur la composition des systèmes de n^2 grandeur avec eux-mêmes. — M. Lipschitz : Sur la théorie de la transformation simultanée de deux formes quadratiques ou bilinéaires. — M. Bruns : Sur le problème des perturbations séculaires.

29 SCIENCES NATURELLES. — M. W. Vagel : sur le développement de l'utérus et du vagin chez l'embryon humain. Comme suite de ses publications antérieures sur le développement du système uro-génital, l'auteur communique aujourd'hui ses recherches sur les canaux de Müller : il résulte de celles-ci que le cordon sexuel et les parties avoisinantes du *plicæ uro-genitalis* présentent déjà dans leurs premiers stades de développement une légère courbure dorso-ventrale à concavité antérieure; la position inclinée antérieure doit être considérée comme la position première. La partie distale du canal de Müller, d'où dérive le vagin, possède un épithélium différent de celui de la partie proximale qui forme l'utérus. L'auteur décrit les différents stades des transformations du canal de Müller, d'où résulte la disposition définitive de l'utérus et du vagin.

D^r J. F. HEYMANS.

Séance du 5 juin 1890.

SCIENCES PHYSIQUES. — M. de Helmholtz présente un travail de MM. Kayser et Runge à Hanovre sur les spectres des métaux alcalins. Les spectres ont une structure tout à fait analogue et se composent de différentes séries de raies qui peuvent être représentées par la formule :

$$\frac{1}{\lambda} = A \frac{B}{n^2} - \frac{C}{n^4}$$

où A, B, C, sont des constantes; λ représente la longueur d'onde; pour n il faut mettre les nombres entiers depuis $n=3$. La valeur $n=3$ donne la vibration fondamentale. Dans chaque spectre il faut distinguer une série principale, qui se compose des raies les plus visibles et le plus facilement réversibles et qui s'étend depuis le rouge jusqu'à l'ultra-violet extrême. Les raies de cette série sont des paires dans les spectres de tous les métaux alcalins excepté celui du lithium. La distance des deux raies, donc la différence du nombre de vibrations est indirectement proportionnelle à la quatrième puissance du n caractéristique pour la raie. Les séries secondaires se trouvent toutes dans la partie visible du spectre : le lithium en a deux, le sodium et le potassium quatre qui sont égales deux à deux; le rubidium et le césium n'en ont que deux. L'égalité des séries deux à deux se manifeste par l'égalité des deux constantes B et C. La différence du nombre de vibrations reste constante pour toutes les paires des séries secondaires contrairement à ce qu'on a trouvé pour les séries principales. Cette différence est égale à celle qu'on trouve pour la première paire des séries principales ($n=3$); elle est approximativement proportionnelle au carré du poids atomique. Plus le poids atomique du métal est grand, plus les séries principales et secondaires se rapprochent de la partie rouge du spectre. Contrairement aux indications de M. Lockyer, les auteurs ont trouvé que seulement les raies du sodium, savoir les raies de sa série principale, se retrouvent dans le spectre du soleil. — M. Kronecker : Sur les systèmes orthogonaux (suite). D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 13 juin 1890.

M. Vogel présente à la Société un exemplaire des photographies de M. Verres qui reproduisent les couleurs naturelles. Quant à la technique de cette photographie il faut mentionner que la méthode d'exposer des images transparentes posées sur du papier à chlorure d'argent bruni était déjà employée par Niepce en France et Jenker en Allemagne. Les parties rouges de l'image sont très bien reproduites, le jaune et le vert deviennent rougeâtres, le bleu ne vient que très faible-

ment et le brun devient rouge. En somme ces photographies sont très inférieures aux photographies en couleurs naturelles que Becquerel et Niepce ont déjà exécutées pour le spectre solaire et elle ne sont pas beaucoup mieux fixées que les photographies des savants français. — M. Kundt y joint la remarque qu'il a vu au laboratoire de feu M. Magnus un exemplaire des photographies du spectre exécutées par L. M. Becquerel et que celles-ci surpassaient de beaucoup les photographies modernes. Il a fait lui-même quelques essais d'après la méthode de Becquerel et il a observé qu'on réussit presque toujours à reproduire la partie rouge et jaune du spectre, mais qu'à partir de là les couleurs deviennent indistinctes. — M. Kundt présente un appareil construit par MM. Hartmann et Braun d'après les indications de M. Lenard pour démontrer la variation de la résistance électrique du bismuth dès qu'on le place dans un champ magnétique. L'appareil consiste en un fil de bismuth roulé en spirale et placé entre deux feuilles de mica. Si l'on compense la résistance de cette spirale à l'aide d'un pont de Wheatstone, il suffit de la placer entre les pôles d'un électro-aimant en sorte que les lignes de force soient perpendiculaires à la spirale, pour obtenir une déviation notable du galvanomètre. Les courants induits ne sont qu'extrêmement faibles de sorte que la déviation permanente qu'on observe doit être attribuée à un changement de la résistance de la spirale. Sa déviation est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique, de sorte que, d'après M. Kundt, on pourrait se servir avec avantage de la spirale de Lenard pour déterminer l'intensité du champ. D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIOLOGIE DE BERLIN

Séance du 6 juin 1890

M. O. Hagemann étudie les échanges des substances azotées durant la grossesse et la lactation chez deux chiennes. Il commença par leur donner une ration constante de substances azotées, hydro-carbonées et grasses. Après plusieurs semaines, lorsque les animaux étaient entrés dans un équilibre constant d'échanges nutritifs, la fécondation eut lieu. Il dosa l'azote des urines, avant la fécondation, continua durant la grossesse, la lactation et jusqu'après la lactation. La quantité d'azote éliminée, comparée à la quantité d'azote absorbée (celle des aliments moins celle des fèces), lui était inférieure avant la fécondation; après celles-ci, elle lui devient notablement supérieure; diminuant peu à peu, elle lui est égale vers le milieu de la grossesse; elle devient de plus en plus petite jusqu'au moment de l'accouchement, où durant quelques jours elle est supérieure à la quantité d'azote absorbé. Mais elle redevient inférieure à cette dernière durant toute la période de lactation; après que la lactation a cessé, l'élimination de l'azote augmente légèrement. — M. Zuntz : L'anse intestinale, isolée (voyez séance du 23 mai, n° du 13 juin 1890, page 349) absorba bien la solution physiologique de chlorure de sodium, les solutions sucrées de 1 et de 3 %. Une solution de carbonate de sodium de 0,4 % était excitatrice pour la paroi intestinale; elle sortit en totalité par le bout postérieur, le liquide intestinal recueilli contenait seulement 0,2 % de carbonate; le liquide intestinal contenait donc moins d'alcali que l'a indiqué Heidenhain. Des émulsions de lipanine ou d'huile de foie de morue, du chyle recueilli chez une personne avec fistule lymphatique, ne furent nullement absorbés par l'anse intestinale; l'addition de bile n'eut aucune action. Une solution de savon est absorbée partiellement, mais probablement en moindre quantité que cela n'a lieu normalement. L'auteur, tout en pensant que la graisse pour être absorbée subit d'abord l'émulsion, peut-être la saponification, est forcé ainsi d'admettre que ce processus est soumis encore à des influences inconnues, qui sont peut-être d'origine pancréatique.

D^r J. F. HEYMANS.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 6 juin 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A. Winckler : sur le multiplicateur des équations différentielles du premier ordre. — M. Z. Mandl : projection du dodécèdre pentagonal. — M. L. Horkay : recherches sur la gravitation, la véritable position de la terre et son mouvement de rotation. — Le D^r Paul Czernak : contribution à l'étude des lignes de niveau L'auteur propose une représentation de lignes équipotentielles électriques, considérées comme l'intersection de deux surfaces. — Le D^r Alois Walter : calculs relatifs à la chute des corps suivant les lois de la gravitation ; le mémoire contient l'intégration par des développements en série des équations différentielles du mouvement en tenant compte de la rotation de la terre autour de son axe et de la résistance de l'air.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. M. Zulkowski adresse un mémoire sur l'orcéine.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Adamkiewicz : Sur la virulence des tumeurs malignes (cancers). Les tumeurs malignes offrent des caractères singuliers au point de vue pathologique : d'un côté elles se rapprochent des tumeurs infectieuses (de la tuberculose ou de la syphilis par exemple) ; tandis que sous d'autres rapports elles en diffèrent profondément. Les points de ressemblance entre les cancers et les tumeurs infectieuses tiennent surtout à la façon dont ces accidents se répandent dans l'organisme qu'ils attaquent pour le ruiner petit à petit ; mais jusqu'à présent on pouvait établir entre eux une différence essentielle ; on sait au moins d'une façon générale qu'il existe un virus produit dans les tumeurs infectieuses dont on a étudié la propagation sur le malade et la transmission d'un individu à un autre ; la plus grande obscurité règne au contraire sur le mode de transmission du cancer dans l'organisme et sur son mode de contagion. Cohnheim a même cru pouvoir affirmer, à cause de l'impossibilité d'inoculer le cancer, qu'il n'existe pas de virus capable de le transmettre. Sans entrer dans aucune hypothèse et édifier aucune théorie, l'auteur établit par des faits qu'il se croit autorisé à considérer comme démontrée l'existence d'un virus réel dans la structure des véritables cancers ; dans ses recherches il a été aidé par son collègue le professeur Obalinski ; il compte d'ailleurs revenir bientôt sur cette importante question. — Le D^r Geza Bukowski écrit à l'Académie pour lui donner des nouvelles de son voyage en Asie mineure ; parti de Diner, dernière station du chemin de la province Aidin, il a jusqu'à présent exploré la région du Sud et de l'Est ; il va continuer son voyage vers le Nord et l'Ouest ; il a déjà recueilli de précieux renseignements orographiques et géologiques. — M. G. Haberbandt établit que les organes correspondants de copulation du *Spilogira quinquia* sont presque constamment en opposition ; une excitation dont l'origine est fort probablement chimique les fait correspondre d'une façon toute momentanée. — Le professeur J. Wiesner adresse des études sur la formation élémentaire des cellules des plantes, qui font suite à ses recherches publiées en 1886 sur l'organisation des cellules végétales.

Séance du 12 juin 1890.

1^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. J. Stephan fait une communication sur la théorie des décharges oscillantes d'une bouteille de Leyde. Cette théorie a été développée par S. W. Thomson et par Kirchhoff, elle fournit pour l'intensité du courant de décharge une équation qui s'identifie avec celle du mouvement du pendule dans un milieu résistant. Dans le développement du calcul on suppose que la décharge se produit avec un courant de densité uniforme dans toute la section du fil ; cette supposition doit, pour des courants aussi rapides, être assez éloignée de la vérité. On sait qu'en pareil cas le mouvement électrique reste dans un conducteur métallique presque exclusivement sur une

couche très voisine de la surface. L'auteur en adoptant cette hypothèse pour le cas présent reprend la théorie de la décharge. Le résultat essentiel est qu'une décharge oscillante est toujours le résultat de deux mouvements dont l'un toutefois s'éteint plus rapidement que l'autre. Le dernier est celui qui prend le caractère d'un mouvement pendulaire, quand l'influence de la résistance sur la durée des oscillations est petite, la nouvelle théorie conduit à des résultats tout à fait analogues à ceux donnés par l'ancienne théorie. Mais il faut remplacer le coefficient de self-induction du fil par l'induction de chacun des filets longitudinaux sur la surface. Il en résulte que le magnétisme du conducteur n'a pas grande influence sur la durée des oscillations, et qu'on obtient les mêmes résultats avec son conducteur de fer ou de cuivre ; tandis que l'ancienne théorie conduisait pour le fer à une durée un peu supérieure. Si l'on intercale une étincelle dans le conducteur, il peut en résulter que le mouvement s'écarte davantage du mouvement pendulaire que dans l'ancienne théorie. Il y a lieu de tenir compte de cette influence dans les calculs relatifs aux ondulations ainsi produites, et l'on trouverait peut-être là l'interprétation des expériences de MM. Sarasin et de la Rive. L'auteur termine son mémoire par des considérations sur l'énergie dispersée dans la décharge oscillante du conducteur.

2^o SCIENCES NATURELLES. — Le D^r Geza Bukowski envoie la seconde partie du compte-rendu de son voyage en Asie Mineure.

Emil Weyr,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance du 1^{er} juin 1890

1^o SCIENCES PHYSIQUES. — MM. Gerosa et Finzi ont étudié le coefficient magnétique des liquides. Ils remarquent que les valeurs trouvées par plusieurs expérimentateurs pour ce coefficient ne s'accordent ni pour la grandeur ni pour les changements du coefficient, sous les variations de la force magnétisante. Pour Poisson, il est constant ; pour d'autres, il croît ou décroît pour tous les liquides ou pour quelques liquides seulement. Silow, qui a expérimenté avec des champs magnétiques faibles, admet, pour la solution de perchlorure de fer, déterminée par deux méthodes différentes (densité = 1,48 ; 1,52) un coefficient maximum ($k = 10^{-6}, 179 ; = 10^{-6}, 142$) entre les valeurs $0,3 - 0,4$ unité C. G. S. de la force magnétisante. Les recherches exécutées par MM. Gerosa et Finzi sur le coefficient k de deux solutions de perchlorure de fer (1^{re} densité = 1,518 ; 2^{me} densité = 1,175 à 12°) ont conduit aux résultats suivants, pour deux valeurs de la force magnétisante F , comprises entre 0,1 et 1,1 unités C. G. S. :

1^{re} solution $k = 0,0006062 + 0,000053 \cdot F$

2^{me} solution $k = 0,0001841 + 0,000053 \cdot F$

C'est-à-dire que le coefficient magnétique des deux solutions varie proportionnellement à la force magnétisante et dans la même raison. Dans leurs expériences, MM. Gerosa et Finzi suspendent dans un tube vertical en laiton une aiguille magnétique, que l'on règle à l'aide d'un aimant extérieur jusqu'à ce que la sensibilité soit suffisante. En faisant passer un courant dans le tube, on donne naissance à un champ magnétique, dont l'intensité dépend du courant. Le tube est entouré d'un vase cylindrique en verre, divisé en deux parties par une cloison normale au méridien magnétique. En remplissant une partie du vase avec un liquide, celui-ci agit sur l'aiguille comme la moitié d'un anneau aimanté, et la dérivation de l'aiguille permet de calculer le coefficient k . Avec cette méthode, différente de celle de Silow, on arrive : 1^o à faire varier la sensibilité entre des limites très étendues ; 2^o à soustraire l'aiguille aimantée à l'action de la force qui magnétise le liquide, et aux perturbations du liquide même. A ce

propos, on a reconnu que le mouvement des particules de la masse liquide augmente la valeur du coefficient magnétique. — **M. Ascoli**, poursuivant ses études sur la relation qui existe entre l'élasticité et la résistance électrique des métaux comme le platine, l'argent et le fer, a repris ses expériences sur l'argent. Dans ces expériences, il compare entre elles les variations qu'éprouvent les deux propriétés physiques sous les variations de température, comprises entre 15° et 350° , auxquelles étaient soumis des fils métalliques. Les nombreuses expériences de **M. Ascoli**, la discussion de leurs résultats et leur comparaison avec ce que l'on connaît déjà sur la résistance et l'élasticité des métaux, conduit aux conclusions suivantes : 1^o La résistance électrique de l'argent cru va toujours diminuant, atteint un minimum pour le recuit à 235° environ, et après elle augmente de nouveau jusqu'à dépasser la valeur initiale; le platine présente le même phénomène; 2^o Le coefficient de torsion de l'argent placé dans la même condition, augmente jusqu'au recuit à 270° environ, et après il diminue jusqu'au-dessous de la valeur initiale; 3^o A chaque état élastique correspond une valeur fixe de résistance, pour des modifications provoquées d'une manière quelconque; et à chaque état normal élastique correspond un état électrique normal; 4^o La résistance électrique diminue lorsqu'on augmente l'électricité de première espèce, et augmente avec l'accroissement du frottement intérieur; 5^o Les métaux expérimentés se comportent tous de la même manière, en égard à la relation entre la résistance et l'électricité. — **M. Pisati** a reconnu que, dans ses expériences sur la propagation du flux magnétique dans les métaux, il se produit un phénomène secondaire, qui cause des perturbations sensibles à la loi fondamentale du flux. **M. Pisati** décrit dans une note ce phénomène qui explique les différences entre les valeurs fournies par l'observation et par le calcul, et qui peut donner une idée de la manière dont les lignes de force du courant exciteur pénétrèrent dans le conducteur magnétique.

2^o SCIENCES NATURELLES. — **M. Moriggia** présente à l'Académie les résultats qu'il a obtenus dans ses expériences sur les tétards. Ces animaux, soumis à l'ombre, au froid et au jeûne, ne peuvent commencer à accomplir leur métamorphose, et leur corps présente des dimensions quinze fois plus petites que celles des tétards développés dans des conditions normales. **M. Moriggia** ajoute des observations sur la résistance des tétards et des grenouilles à la chaleur, à l'eau acidulée, à l'asphyxie produite par différents moyens. — **M. Fusari** a réussi, à l'aide de la réaction noire de Golgi, à mettre en évidence les terminaisons des fibres sympathiques dans les capsules surrénales. Des recherches embryologiques, exécutées sur les poulets et sur quelques mammifères, dont **M. Fusari** donne la description, il résulte, contrairement à ce qui avait été énoncé par Gottschau, Janosik, Mihalkovics et Valenti, 1^o que deux espèces d'éléments entrent dans la formation de l'ébauche des capsules surrénales, l'une, qui dérive de l'épithélium péritonéal, l'autre, qui dérive des ganglions du sympathique; 2^o que, entre les ganglions du plexus solaire restent encore enfermés des éléments de dérivation ou de l'épithélium péritonéal; 3^o que dans les mammifères, la structure lobulaire des capsules surrénales disparaît rapidement, mais que, malgré cela, les éléments s'arrangent de manière que ceux qui dérivent de l'épithélium forment la substance corticale et ceux qui dérivent de la partie nerveuse forment la substance médullaire. **M. Fusari** n'a pu, jusqu'alors, établir que cette dernière substance soit formée exclusivement par des éléments du second ordre.

Séance du 13 juin 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Bianchi** : Sur les surfaces dont les lignes asymptotiques dans un système sont des courbes à torsion constante. — **M. de**

Paolis : Quelques propriétés de la surface de Kummer. — **M. Ciani** : Sur les surfaces cubiques dont la Hessienne se brise. — **M. Enriquez** : Sur quelques propriétés des faisceaux d'homographies, dans les espaces linéaires à n dimensions.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Tacchini** présente une photographie de l'éclipse solaire du 22 décembre 1889, envoyée à l'Académie par **M. Holden**, directeur de l'Observatoire Lick, en Californie. **M. Tacchini** établit une comparaison entre la couronne solaire, bien marquée dans cette photographie, et la distribution des phénomènes solaires à la surface du Soleil, qu'il a obtenue de ses observations exécutées à l'Observatoire du collège Romain; il croit pouvoir conclure que la forme de la couronne solaire a une relation manifeste avec les protubérances du Soleil, et même il considère la couronne, en grande partie, comme un produit de ces phénomènes. — **M. Tacchini** donne encore communication de ses observations sur l'influence du mouvement des passants, des véhicules, etc., et du vent sur les appareils sismiques. On a fait, à ce sujet, des expériences sur la vieille tour du Collège Romain à 40 m. au-dessus du niveau de la ville, et le résultat a été que les oscillations produites par un régiment de soldats qui passait à 150 mètres de la tour, furent enregistrées par les appareils, ce qui démontre leur sensibilité et leur aptitude à ce genre d'enregistrements. **M. Tacchini** insiste sur la nécessité, qui devient toujours plus pressante, de placer les Observatoires géodynamiques dans des lieux autant que possible éloignés de toute action perturbatrice, et d'attendre, pour l'adoption définitive des sismographes, les résultats obtenus avec des modèles soumis à une longue observation dans des stations convenablement placées, comme celle de Casamicciola. — **M. Agamennone** a fait des recherches sur les derniers tremblements de terre que l'on a ressentis à Rome le 8 décembre 1889, le 23 février et le 5 mai 1890. Dans sa note, **M. Agamennone** reproduit les enregistrements obtenus avec les appareils Brassart au Collège Romain; il en déduit l'amplitude d'oscillation de la tour, et il présente quelques considérations sur l'usage des appareils sismiques. — **M. Vanni** donne une nouvelle méthode pour mesurer la distance du foyer dans les lentilles ou dans les systèmes convergents; cette méthode, observe **M. Vanni**, est inférieure à celle proposée par **M. Cornu**, mais elle peut être utile lorsqu'on n'a pas à sa disposition une lunette à longue portée, nécessaire à régler le viseur indispensable avec la méthode de **M. Cornu**. — **M. Keller** a rédigé un guide topographique et itinéraire des localités de la campagne du Latium où l'on trouve les principales roches magnétiques, dont quelques-unes, comme la lave d'origine basaltique, présentent une action remarquable et des anomalies dans la distribution du magnétisme difficiles à expliquer, mais analogues à celles des aimants artificiels. — **MM. Ciamician** et **Zanetti** exposent leurs recherches sur la stabilité du groupement périodique dans les divers dérivés du pyrrol. — **M. Piccini** annonce avoir obtenu, en faisant agir l'ammoniaque sur une solution de fluoritanate ammoniacal normal, un sel qui contient fluor, oxygène, titane et ammonium. Ce composé, bien qu'il s'oxygène dans des circonstances faciles à reproduire et qu'il appartienne à la série la plus stable TiX_3 , n'a pas encore été décrit; il forme sur du papier Berzelius une tache blanche et soyeuse composée de petits cristaux en groupes, et sa formule serait $TiO_2F_{12}(NH_4)^9$. — **M. Fabris**, rappelant qu'aujourd'hui on ne connaît qu'une seule modification du fluorure chromique (CrF_3), la verte, donne la description des réactions qui lui ont permis d'obtenir le fluorure chromique violet en combinaison avec l'eau, substance très peu soluble mais d'une transformation facile, dont on peut exprimer la composition avec la formule $CrF_3 + 9H_2O$. — **M. Marino-Zucco**, qui avait déjà extrait avec l'éther des fleurs de chrysanthème (*Chrysanthemum cinerariæ folium*) une paraffine et un homologue supérieur de la cholestérine

ordinaire, a obtenu, poursuivant la distillation des fleurs dans l'alcool à chaud, un nouvel alcaloïde, la *chrysantémine*, dont il donne la description.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. *Pirotta* entretient l'Académie de ses recherches sur la structure anatomique du *Keteleeria Fortunei* (Murr.) Carr. Cette plante est une Conifère Abietinée monotypique très intéressante de la Chine, dont M. Pirotta a déjà fait connaître les fleurs mâles il y a trois ans. Il s'occupe dans ce moment de l'étude monographique de cette plante, et les résultats obtenus peuvent se résumer ainsi : 1° La racine est caractérisée surtout par la présence d'un canal sécrèteur primaire axile, de canaux résinifères secondaires irrégulièrement disposés dans le bois secondaire, par l'existence de cellules à gomme dans l'écorce secondaire; 2° La tige est caractérisée par la présence de canaux sécrèteurs et de cellules à gomme dans l'écorce primaire et par leur absence dans le bois

et dans l'écorce secondaires; 3° Dans les feuilles la structure bi-latérale à mésophylle hétérogène est caractéristique; on y trouve deux canaux sécrèteurs latéraux et marginaux et des cellules à gomme dans le parenchyme. — M. *Acqua* a étudié l'accroissement en surface et l'origine de la membrane des tubes polliniques. Il a été conduit à conclure : 1° Que la membrane cellulaire est un produit de transformation directe de l'assise la plus extérieure du corps protoplasmique; 2° Que l'accroissement en surface a lieu dans plusieurs cas par distension et déchirement des assises actuelles et par une formation correspondant à une nouvelle assise, ce que l'on peut voir aussi quelquefois directement au microscope. M. *Acqua* a aussi confirmé en partie les observations de M. *Palla*, c'est-à-dire que des portions de protoplasma sans nucleus peuvent sécréter une nouvelle membrane et l'accroître.

Ernesto Mancini.

NOUVELLES

L'ÉCLIPSE SOLAIRE DU 17 JUIN 1890

L'observation de l'éclipse solaire du 17 de ce mois vient d'apporter une importante contribution à la Science.

M. Janssen, Directeur de l'Observatoire d'Astronomie physique, avait organisé dans ce but à Meudon et à Candie, lieu du maximum de l'éclipse, un service dont voici les principaux résultats :

1° A Meudon on a pu, malgré le mauvais temps, photographier la photosphère solaire jusqu'au bord même de la lune. Les épreuves obtenues montrent que les granulations photosphériques ne subissent aucune déformation appréciable au voisinage immédiat de notre satellite; d'où l'on doit conclure, sinon à l'absence absolue, du moins à l'extrême raréfaction de l'atmosphère autour de la lune.

2° A Canée (Candie), où M. de la Baume avait été envoyé par l'Observatoire de Meudon, ce savant a pleinement réussi à photographier l'anneau et son spectre. Conformément aux instructions de M. Janssen, les images des astres en conjonction ont été prises sur plaques argentées, de sorte qu'il sera possible d'effectuer sur ces clichés la mesure exacte des diamètres, mesure dont la détermination rigoureuse offre un intérêt de premier ordre.

Il importait aussi de photographier le spectre de l'anneau au moment du minimum de la couronne. « On sait », dit à ce propos M. Janssen (1), « que le spectre solaire, même pour les régions circumzénithales, contient les raies de l'oxygène. C'est la présence de l'oxygène de notre atmosphère qui produit ce phénomène; et il est si accusé qu'il serait difficile de décider si une portion du phénomène ne pourrait être attribuée à l'action de l'atmosphère solaire. Il existe, il est vrai, tout un ensemble de moyens qui pourraient conduire à la solution de cette importante question. Mais parmi ces moyens figure l'observation des bandes obscures de l'oxygène. En effet, ces bandes ne se montrent dans le spectre solaire que quand l'astre est à moins de 10° de l'horizon. Il en résulte que, quand le Soleil est élevé, si le spectre du bord de l'astre, c'est-à-dire des points où l'action de son atmosphère doit être la plus forte, montre les bandes en question, on sera en droit d'attribuer leur présence à

celle de l'oxygène de l'atmosphère de notre astre central. » Grâce à la forme annulaire de l'éclipse observée à Candie, les épreuves de M. de la Baume ont, pour ainsi dire, isolé le spectre du bord du disque solaire. L'examen de ces épreuves promet donc de trancher d'une façon décisive l'une des questions les plus controversées de l'Astronomie.

Comme on le voit, ce sont là des résultats considérables. En les annonçant lundi dernier à l'Académie des Sciences, M. Janssen a fait remarquer que les heures d'entrée oculairement observées en divers pays offrent entre elles un écart d'une quinzaine de secondes, qu'explique la difficulté d'une telle détermination. L'emploi du *revolver photographique*, créé en 1874 à l'occasion du passage de Vénus, conduirait au contraire à une solution très précise; cet appareil est en effet devenu tout à fait pratique depuis l'invention des plaques au gélatino-bromure d'argent.

A l'Observatoire de Paris on devait observer l'éclipse non seulement à l'aide des équatoriaux installés à demeure, mais en outre avec des lunettes et des télescopes placés pour la circonstance sur des pieds mobiles; cela formait un total de 7 à 8 instruments, avec lesquels on se proposait de déterminer les heures des contacts et de faire des mesures micrométriques de la distance des cornes brillantes découpées sur le soleil par le disque obscur de la lune.

A moins d'employer des instruments spéciaux, tels que l'héliomètre, ces mesures ne peuvent se faire que lorsque les cornes sont assez rapprochées pour se trouver simultanément dans le champ de la lunette, c'est assez dire pendant quelques minutes après le commencement et quelques minutes avant la fin.

Au commencement de l'éclipse des nuages cachaient le soleil; il ne s'est montré que lorsque les cornes étaient déjà fort éloignées l'une de l'autre. Il y a eu ensuite quelques éclaircies aussi courtes que médiocres, mais qui ont cependant permis de bien voir l'éclipse à l'œil nu; quelques temps avant la fin, le Soleil se montrait encore et il a été possible de mesurer plusieurs fois la direction et la distance des cornes; mais des nuages survenus quelques secondes avant le dernier contact ont empêché de noter cette phase importante.

L. O.

(1) *C. R. Acad. des Sc.* 23 juin 1890.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

DE LA CRANIECTOMIE DANS LA MICROCÉPHALIE ⁽¹⁾

Je ne veux invoquer, au début de ce travail, ni des raisons de théorie pure, ni les enseignements de la physiologie ou de la clinique, pour justifier une opération dont l'entreprise a été suivie des plus heureux effets. Il me paraît préférable de faire connaître tout d'abord l'état du jeune sujet chez qui la tentative opératoire a eu lieu le 9 mai 1890.

C'est une petite fille âgée de quatre ans et un mois, offrant les déformations crâniennes et les signes de la microcéphalie sous sa forme grave. Elle est née à terme, sans aucun accident, d'un père âgé de 38 ans et d'une mère âgée de 35 ans, tous deux exempts de défectuosités physiques et jouissant d'une bonne santé.

On ne trouve aucune influence héréditaire pour expliquer l'état de cette fillette qui a cinq frères ou sœurs tous bien portants. La mère raconte que sa petite fille a toujours été beaucoup plus en retard que les autres. Jusqu'à trois ans elle n'a pris que des aliments liquides; elle n'a jamais marché et elle ne se tient même pas debout. Depuis quelques semaines seulement on lui fait balbutier quelques syllabes toujours les mêmes. La salive s'écoule hors de la bouche comme chez le nouveau-né.

Les apparences de cette fillette sont celles d'un enfant de deux ans, imparfaitement développé; elle est toute petite, chélive, et quoique ses yeux soient brillants et très mobiles, elle ne paraît pas s'intéresser à ce qui se passe autour d'elle et on ne parvient pas à captiver son attention. — On la

voit dans son lit pousser continuellement des cris inarticulés et balbutier les mêmes monosyllabes en s'agitant sans cesse et sans but.

Le corps tout entier est grêle dans toutes les dimensions; la taille est de 77 centimètres; la circonférence du thorax mesure 45 centimètres au niveau des mamelons; la charpente osseuse des membres est petite; les extrémités sont longues et effilées.

Lorsqu'on met l'enfant debout, elle tombe immédiatement et de tout son poids lorsqu'on cesse de la soutenir; si l'on veut la faire marcher en la soutenant par les bras, on n'y parvient aucunement, mais les membres inférieurs s'agitent en exécutant des mouvements désordonnés et très précipités, toujours dans le même sens. Il n'y a, en effet, aucun déplacement antéro-postérieur du tronc et il faut la porter pour la faire aller en avant; mais l'enfant soutenue lève et abaisse alternativement ses membres inférieurs avec une extrême rapidité et en piétinant sur place; cesse-t-on de la soutenir, elle s'affaisse immédiatement.

On ne constate chez ce bébé ni contractures, ni paralysies; la sensibilité générale paraît normale; les réflexes ne sont pas augmentés; il n'y a pas de trépidations épileptoïdes.

La tête de cette enfant, d'un très petit volume, présente en outre une déformation remarquable. Le crâne est étroit, très aplati transversalement, saillant sur le vertex; c'est le type du genre scaphoïdien.

La face présente un prognathisme assez accusé; elle est amincie en travers; le nez est développé et

(1) Je me sers du mot *craniectomie* qui n'a pas, je crois, encore été employé, le trouvant plus conforme à l'opération dont il s'agit que le mot *trépanation*.

aquilin, le front fuyant et très étroit. De tous les diamètres crâniens, un seul se rapproche de l'état normal : c'est l'antéro-postérieur ou occipito-frontal qui mesure 155 millimètres. Les autres, très amoindris, atteignent, le bi-pariétal, 119 mm; le bi-auriculaire, 105 mm; le bi-frontal, 86 mm.

Telle est la jeune personne confiée accidentellement à mes soins; vrai type de microcéphalie avec idiotie; il est difficile de trouver un terrain en apparence moins favorable à une intervention quelconque, et je n'y eusse pas songé si je n'avais pas eu l'occasion de faire récemment l'autopsie d'un cas semblable, provenant du service de mon collègue, M. le D^r Legroux. Mais avant d'en parler, qu'il me soit permis de rappeler les courants d'opinion qui existent sur cette question obscure de la microcéphalie.

Attribuant au crâne une importance prépondérante, Virchow crut devoir rapporter à une ossification prématurée des sutures la cause de l'arrêt du développement de cet organe. Le crâne fermé, sa capacité était désormais limitée et l'évolution cérébrale, se trouvant entravée, était elle aussi frappée pour toujours d'un arrêt de développement. Doctrine séduisante, paraissant expliquer à merveille certaines formes particulières du crâne, mais qui devait plier devant les faits et ne rester qu'à titre d'exception. C. Vogt (1), Broca (2), Montané présentèrent bientôt des exemples peu nombreux, il est vrai, mais probants, établissant que les sutures sont constamment fibro-cartilagineuses chez les jeunes microcéphales, et que ce n'est qu'entre vingt et quarante ans qu'on observe une ossification prématurée, portant exclusivement sur les sutures sagittales et squameuses : dans la moitié des cas (Montané), quatre fois sur sept (C. Vogt).

Mais ces auteurs ont remarqué avec beaucoup d'autres observateurs, et le fait demande à être relevé, que les sutures sont serrées anormalement chez eux, en même temps que les fontanelles sont elles-mêmes très rétrécies à la naissance.

Du moment que l'ossification prématurée des sutures n'était plus la règle, on devait penser, et P. Broca fut un défenseur convaincu de cette opinion, que la microcéphalie provenait d'un arrêt portant originellement sur le cerveau et non point sur le crâne. C'est le cerveau qui serait, en somme, l'organe essentiel du développement crânien, qui le commande alors que celui-ci ne fait que le suivre en s'adaptant à sa forme.

La nouvelle doctrine n'est pas une hypothèse; Baillarger (1), Vogt (2), Broca (3), Ducatte (4), Bourneville (5) ont décrit avec soin le cerveau des microcéphales qu'ils ont observés; ils ont enregistré l'apparence normale du cerveau dont la forme, les dimensions sont seulement rudimentaires et plus exigües; les circonvolutions sont aplaties, plus unies; quelques-unes sont atrophiées et anormales; les espaces qui les séparent sont agrandis.

Mais en même temps qu'on produisait des faits pouvant faire croire que la microcéphalie était un retour atavique vers les primates, des données d'un autre ordre montraient la question sous un autre point de vue. On avait depuis longtemps constaté une hydropisie ventriculaire ou méningée dans certains cerveaux de microcéphales; des études encore incomplètes, mais en cours d'élaboration actuellement, ont fait voir qu'il y a des altérations cérébrales proprement dites, des scléroses limitées ou diffuses, en voie d'évolution et coïncidant d'habitude avec des altérations notables des parois osseuses du crâne, telles que l'hyperostose, une irrégularité d'épaisseur, un amincissement de cette paroi, des sutures plus serrées, des fontanelles anormalement rétrécies.

La microcéphalie ne représente plus en réalité un type clinique exclusif: elle correspond à des variétés propres par la nature des altérations primitives qui l'engendrent. Mais la question présentée sous cette forme est encore à l'étude et en attendant que des notions plus précises l'aient éclairée, on doit se borner à admettre que le cerveau est, en général, plus ou moins atteint et que le crâne offre des altérations d'une époque contemporaine ou postérieure. En tout cas, il n'est nullement établi que les altérations du crâne soient consécutives ou secondaires.

Chez le sujet microcéphale du service de M. Legroux, dont il a été parlé précédemment, le cerveau possédait des lésions évidentes et le crâne présentait, en dehors d'une déformation excessive le rapprochant des crânes simiens, des sutures extrêmement serrées et un épaississement irrégulier et montueux des plus frappants; on y voyait de véritables plaques d'hyperostoses (6).

(1) Baillarger, *Ossification précoce chez les microcéphales*, *Bul. Acad. Méd. Paris*, 1855-1856, t. XXI, p. 954.

(2) C. Vogt, *loc. cit.*

(3) P. Broca, *loc. cit.*

(4) Ducatte, *La microcéphalie au point de vue de l'atavisme*, *Thèse*, Paris, 1886.

(5) Bourneville et Huillamié, note sur deux cas de microcéphalie, *Bul. Soc. An.* 1881, 4^e série, t. XVI, p. 756.

(6) A la suite de ma communication à l'Académie des Sciences sur ce sujet (36 juin 1890), j'ai appris que M. Guéniot (Acad. de méd. 5 novembre 1889, note additionnelle) avait très judicieusement émis l'idée d'une intervention dans les cas analogues.

(1) C. Vogt, *Mémoire sur les Microcéphales ou Hommes-Singes*, Genève, Bâle, 1867.

(2) P. Broca, *Sur un cas excessif de microcéphalie* (Bull. Soc. Anthropologique, Paris, 1876, 2^e série, t. XI, p. 85, et *Sur un microcéphale âgé de 2 ans 1/2*, Paris, 1880, 3^e série, t. III, p. 387.

Dans ces conditions, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être modifier une évolution cérébrale compromise ou retardée et chercher à lui donner un nouvel essort en affaiblissant dans une certaine mesure la résistance du crâne, principalement dans la région où le cerveau possède les centres qui exercent la plus grande influence sur la vie de relation.

Les résultats obtenus sont assez significatifs dès à présent pour qu'il soit utile de les divulguer avec le procédé opératoire suivi.

Le crâne a été ouvert, non pas à la manière des trépanations ordinaires, mais dans un lieu d'élection, le long de la suture sagittale, de façon à prolonger le débridement crânien, le long des sutures voisines et au delà de la suture frontale. Je pratiquai donc, sur mon malade, à un travers de doigt de la ligne médiane, une longue et étroite ouverture crânienne, parallèle à la suture occipitale. En un mot, je fis au côté gauche du crâne qui était d'ailleurs notablement plus déprimé que du côté droit, une brèche, c'est-à-dire une perte de substance de neuf centimètres de longueur et de six millimètres en travers. On pratique aisément la tranchée dans les os, une fois qu'on a enlevé avec le trépan une petite rondelle, en se servant de pinces coupantes solides, fabriquées par M. Collin.

La dure-mère ne fut intéressée en aucun point et, l'hémorrhagie des parties molles ayant été immédiatement arrêtée, il n'y eut pas, à proprement parler, d'écoulement sanguin par les canaux veineux du diploë, ni par les artères méningées.

On procéda ensuite à une réunion exacte de toute la plaie, sans drainage, en évitant de ramener le périoste au devant de la fissure osseuse. On jugea utile également, durant le cours de l'opération, de ne pas placer les téguments immédiatement au-dessus de la rigole osseuse, mais en dehors d'elle.

La cicatrisation fut obtenue en quelques jours, sans trace de pus, et la température ne dépassa jamais l'état normal.

Il convient de dire qu'il s'écoula, pendant l'opération, un liquide séreux, sortant en très fines gouttelettes de la surface de la dure-mère; le même suintement a continué sous le premier pansement, pendant quatre à cinq jours. Ce fait me fit hésiter et faillit me déterminer à inciser la dure-mère.

Un nouveau cas de microcéphalie s'étant présenté à nous, a été l'objet d'une seconde opération de craniectomie le 20 juin; elle a été pratiquée avec le concours de M. Poirier, chef des travaux anatomiques de la Faculté, et le manuel opératoire a été un peu modifié. Le sujet est un type d'idiotie plus accentué que le précédent. Le projet opératoire devait consister à débrider en plus le frontal du côté gauche, en même temps que le pariétal du même côté. Ces deux débridements pratiqués

exactement comme chez Valentine Plossard, il restait entre eux un pont correspondant à la suture fronto-pariétale; mon collègue, M. Poirier, me décida à le faire sauter et la chose eut lieu sans ouvrir la dure mère. La perte de substance de la paroi osseuse du crâne mesurait dans ce cas quatorze centimètres de longueur. Les suites immédiates de l'opération ont été des plus simples, c'est-à-dire, sans réaction fébrile et sans suppuration.

La craniectomie a été faite chez mon premier sujet le 9 mai, et à la date du 15 juin on a constaté des résultats que je me suis refusé à consigner moi-même, laissant ce soin à mon interne, M. Dupré; les élèves du service et des médecins étrangers ont pu et peuvent encore les contrôler.

« L'état de Valentine Plossard, dit M. Dupré, a beaucoup changé et s'est notablement amélioré depuis l'opération qu'elle a subie.

« Elle est beaucoup plus calme. Les cris aigus presque incessants qu'elle poussait ont cessé dès le lendemain de l'opération.

« L'enfant paraît s'intéresser à ce qui se passe autour d'elle, joue, rit et semble très heureuse qu'on s'occupe d'elle. Elle comprend, essaie de parler et prononce quelques mots. Aujourd'hui elle se tient debout toute seule, sans qu'on la soutienne. Elle ne piétine plus sur place; elle marche et fait des pas très réguliers, en titubant un peu quand elle se presse, comme tous les enfants qui commencent à marcher. A ce point de vue surtout, les progrès sont réels et l'amélioration indiscutable.

« Enfin elle ne bave plus; ses sécrétions nasales sont normales.

« En somme, les phénomènes d'excitation cérébrale caractérisés par les cris incessants et par la trépidation des membres inférieurs dans la position verticale, l'enfant étant soutenu, ont complètement disparu. Le développement de l'intelligence paraît se faire progressivement et même en tenant compte de l'éducation qu'elle reçoit dans la salle, il est incontestable qu'elle a fait des progrès rapides et réels.

« L'enfant aujourd'hui mange à table.

« L'état local est parfait; la cicatrice est mobile et non adhérente. On sent un peu en dehors d'elle une dépression linéaire peu profonde et étroite correspondant à la perte de substance de la boîte crânienne. »

Il est à remarquer que, quelle que soit l'influence exercée par l'acte opératoire, une part du résultat doit être attribuée à l'éducation de l'enfant. C'est la seconde partie du traitement et elle en est le complément nécessaire.

D^r Lannelongue,

Professeur à la Faculté de Médecine.

LES TERRES RARES

On sait que les chimistes désignent sous le nom de *terres rares* un groupe de bases isomorphes entrant, toujours ensemble, dans la composition de quelques minéraux peu répandus : *Cérite*, *Gadolinite*, *Samarsskïte*, *Monazite*, *Euxénite*, etc. Ces terres sont plus communes que leur nom ne l'indique. Elles existent à l'état de traces, quelquefois notables, dans tous les calcaires; on en trouve même dans les os des animaux. Parfois, certains de leurs minerais forment de véritables roches, — telle est la *Cérite* —, ou ont été accumulés en quantité énorme en certains points, comme la *Monazite* au Brésil.

Jusque dans ces dernières années, ces terres, (d'où l'on exclut la thorine qui les accompagne à peu près toujours) avaient assez peu attiré l'attention des chimistes. Découverts par Berzelius, Hisinger, Klaproth, Gadolin, le *Cérium* et l'*Yttrium* s'étaient démultipliés entre les mains de Mosander (Ce^2O^3 , Di^2O^3 , La^2O^3 d'une part; Yt^2O^3 , Er^2O^3 , Tr^2O^3 , de l'autre). On savait que leurs ressemblances étaient assez grandes pour avoir engagé entre autres MM. Bahr et Bunsen à nier l'existence de l'*Erbium* de Mosander (le *Terbium* d'aujourd'hui). Cependant, M. Delafontaine, soutenu dans son opinion par M. de Marignac, maintenait son existence. En 1878, ces savants annoncèrent en outre la présence dans ces terres de plusieurs éléments nouveaux. Dès lors, ils se multiplièrent sous les efforts des chimistes, à tel point que s'il fallait compter comme authentiques tous ceux qui ont été déclarés probables, on aurait affaire à un groupe de trente à quarante corps simples. Mais il s'en faut de beaucoup que tous soient d'une égale certitude. Ceux qu'indiquait M. Delafontaine ont dû disparaître comme insuffisamment caractérisés, mais il n'est que juste de reconnaître qu'il a signalé le premier la grande complexité de ce groupe.

I

On ne peut actuellement distinguer d'un corps simple un mélange, si les divers éléments du mélange ne se laissent pas séparer. L'*Yttrium* de Gadolin était un corps simple jusqu'au jour où l'on en a tiré une portion différente du reste. Le calcium, le fer ne sont réputés corps simples que parce que personne n'en a pu tirer deux portions de propriétés tant soit peu distinctes du reste.

Nous examinerons quels moyens on a employés pour distinguer entre elles les différentes portions des terres rares. Ce point, d'ordinaire sans intérêt, en prend ici un fort sérieux en raison de l'extrême ressemblance de ces corps.

1° Parmi les propriétés les plus caractéristiques

d'un corps, il faut compter son spectre d'émission dans l'étincelle électrique : les spectres sont absolument caractéristiques et constants avec une source électrique donnée pour un corps donné. C'est là, par suite, un caractère d'importance majeure : tout élément nouveau devra donc posséder un spectre d'émission spécial. Cette loi ne souffre pas d'exception; elle semble d'ailleurs nécessaire *a priori*. Il est bon toutefois de remarquer que si chaque corps a son spectre, il ne le donne pas avec la même facilité dans tous les cas : on reconnaît encore dans l'étincelle $\frac{4}{100000000}$ d'*Yttrium*; on n'y voit plus $\frac{4}{1000}$ de *Néodyme*.

2° Si d'un mélange on tire des parties à poids moléculaires différents, il y a là plusieurs corps simples, à moins qu'opérant sur un mélange qui en contient deux, on n'ait un poids atomique intermédiaire. Il faut alors recourir à d'autres propriétés pour établir la présence d'un élément distinct. Au point de vue qui nous occupe, on peut classer en trois groupes les éléments en question : l'un comprend le *Scandium* seul avec le poids atomique 44, le second l'*Yttrium* seul avec le poids atomique 89 environ, le troisième enfin comprend une série à poids atomiques renfermés entre 139 et 173. Tout corps à poids atomique compris entre 44 et 173 pourra donc être un mélange et devra présenter une propriété caractéristique pour devoir être considéré comme contenant un élément distinct.

Comme on le voit, la question des poids atomiques rentre ici un peu dans l'ombre. Des considérations accessoires lui rendent une grande importance. Jusqu'ici dans le groupe des éléments de poids atomiques compris entre 140 et 173, à mesure que le poids atomique baisse, la basicité s'accroît; les autres propriétés chimiques varient de même très graduellement avec une grande régularité. Si l'on admet cette règle comme toujours vraie, on possède un contrôle de la pureté d'une terre dans la comparaison des places que lui assignent le poids atomique et la basicité ou les autres propriétés chimiques.

3° Les spectres d'absorption des terres rares (*Didyme*, *Erbine*, etc.) sont caractéristiques au plus haut point, en ce qu'ils se manifestent, pour une solution de composition déterminée, sous forme de bandes relativement étroites (surtout dans les sels solides) souvent d'extrême intensité, plus ou moins nettement terminées suivant diverses conditions de concentration, lumière et composition des solutions et non sous forme de ces absorptions unilatérales diffuses si fréquentes. Il ne faut cependant pas oublier que des changements dans l'intensité

de l'éclairage, sa nature, l'acide du sel, son abondance, la concentration de la solution entraînent des changements notables tant pour une même bande que pour les intensités relatives des diverses bandes du spectre.

En outre, bien que le spectre d'un mélange soit la superposition des spectres des constituants, il peut arriver que dans certains cas il soit en apparence tout à fait différent. Ainsi, il peut arriver, comme l'ont montré M. Lecoq de Boisbaudran et M. Brunner, que le spectre d'un mélange de sels de *Samarium* et de *Didyme* ne semble pas présenter trace des bandes bleues de ces corps. Les bandes du *Samarium* tombent en effet dans l'intervalle de celles du *Didyme*. On conçoit donc qu'une solution un peu étendue de *Didyme* et de *Samarium* puisse pour une composition spéciale présenter simplement dans le bleu un affaiblissement général pouvant échapper à l'œil de l'observateur. Il faudrait recourir à un spectro-photomètre pour s'assurer de la présence d'une bande, ou, ce qui serait plus simple, examiner une série de fractionnements du produit considéré, en ayant soin d'opérer dans les mêmes conditions d'acidité et de concentration. Comme cet évanouissement apparent des raies n'a lieu que pour une composition spéciale, elles reparaitront dans les termes extrêmes des produits du fractionnement.

La conclusion déduite de l'examen d'un spectre d'absorption n'est donc valable que sous la condition qu'on examinera une série de fractionnements.

4° On peut encore, dans quelques cas, utiliser deux méthodes dues, l'une à M. Crookes, de phosphorescence des corps solides dans le vide, l'autre à M. Lecoq de Boisbaudran, de phosphorescence des liquides.

Dans ce dernier procédé on fait jaillir sur la solution très acide du chlorure l'étincelle d'une bobine d'induction à fil induit fin, en ayant soin de rendre le liquide positif, au lieu de négatif comme on fait quand on veut obtenir un spectre d'émission. Le fil de platine qui forme le pôle négatif doit en outre être parfaitement propre. Dans ces conditions, si le liquide phosphoresce, on voit à sa surface une petite plaque brillante, qui, dans le cas de quelques terres rares, se résout au spectroscope en larges raies caractéristiques. Le nombre des corps qui fournissent ces raies est assez faible. Il est à noter que le spectre de phosphorescence d'un mélange est la superposition des spectres de phosphorescence des éléments du mélange. Ce procédé est d'une sensibilité modérée, d'un emploi facile, mais assez restreint. Il exige que la solution ne contienne pas de substance absorbant les radiations extrêmes comme Fe^3 Cl^6 , Pt Cl^4 , Pt Cl^2 , etc.

Bien plus sensible de beaucoup est le procédé de M. Crookes. Mais, il faut le dire, cette extrême sensibilité, qui est parfois un écueil, est achetée au prix de difficultés qui rendent souvent cette méthode inapplicable dans la pratique. MM. Crookes a montré que $\frac{1}{1,000,000}$ de *Samarium* à l'état de sulfate en combinaison intime avec le sulfate de chaux se reconnaissait encore. Ce chiffre est certainement inférieur à la réalité, si l'on réfléchit que le *Samarium* n'est qu'un mélange. On sera donc exposé à en trouver partout. De plus, et c'est là son inconvénient le plus sérieux, ce procédé encore peu connu est obscurci de graves difficultés pratiques. On sait en effet par les recherches de MM. Crookes, Verneuil, Klatt et Lénard, Becquerel et surtout Lecoq de Boisbaudran, qu'un corps qui, dissous en *minime proportion* dans un autre (dit inactif) convenablement choisi, donne une phosphorescence brillante à raies caractéristiques, n'en donne pas d'ordinaire s'il entre en proportion trop forte dans la solution solide et en donne une qui est toute différente, si le corps inactif employé est différent. Cette phosphorescence dépend souvent en outre de petites quantités d'un autre corps inactif agissant parfois de façon fort obscure. Donc si la proportion de substance active n'est pas très forte dans la matière à examiner, que par suite la substance qui l'accompagne forme une portion notable de la matière phosphorescente, elle exercera une influence perturbatrice des plus graves sur le spectre et pourra même le changer complètement.

Il en résulte que, pour recourir avec sécurité à la méthode de M. Crookes, il faut d'abord employer des précautions extrêmes contre toute matière étrangère, connaître à peu près la composition du mélange et les effets des éléments de ce mélange.

Il s'en faut malheureusement de beaucoup que nos connaissances soient aussi avancées. Il en résulte de sérieuses doutes sur les conclusions basées sur l'emploi des phosphorescences dans le vide.

M. Crookes, qui a beaucoup employé cette belle méthode découverte par lui, n'admet pas encore comme principe général la nécessité d'un corps actif, dissous en proportion minime dans un solvant inactif solide, pour provoquer la fluorescence. Ainsi, bien que les recherches de M. de Boisbaudran aient été confirmées par M. Becquerel, qui avait autrefois professé une opinion contraire, M. Crookes conteste encore que la phosphorescence rouge de l'alumine soit due à des traces de chrome. Il conteste de même que la phosphorescence de l'Yttria soit due à des traces de matières étrangères et pense avoir pu le décomposer en un nombre considérable d'éléments distincts. Ce que nous avons dit plus haut des difficultés d'interprétation des expériences dans un cas aussi délicat que celui des

phosphorescences, nous oblige à suspendre notre jugement sur la présence d'éléments multiples dans l'Yttria en tant qu'y existant en traces; quant au principe contesté par M. Crookes, nous l'admettons comme établi par de nombreuses expériences d'observateurs différents. Dans le cas de l'Yttria, du reste, les matières actives ont été séparées de l'Yttria pure, qui, elle, ne phosphoresce en aucune façon.

5° On a encore employé, pour caractériser les terres rares, tous les procédés usuels; nous n'y insisterons pas, ces points ne donnant lieu à aucune difficulté spéciale.

II

M. Crookes a été conduit par ses recherches à imaginer une théorie spéciale des corps simples. Suivant lui, une matière primitive, en se condensant lentement, aurait donné naissance aux différents éléments successivement. Mais à un moment donné, ce refroidissement ayant été trop rapide, il se serait produit une série particulière d'éléments « dont le développement aurait été arrêté. » Sortes de monstres du règne minéral, ces *méta-éléments* seraient caractérisés par ce fait qu'avec des propriétés physiques et chimiques très légèrement différentes, ils auraient des poids atomiques différents et les mêmes spectres d'émission dans l'étincelle électrique.

La différence d'ailleurs entre les méta-éléments et les corps simples ordinaires ne serait que de degré. Ainsi le calcium, avec son poids atomique 40, pourrait être formé d'atomes pesant : 39,8; 39,9; 40; 40,1; 40,2. Si l'on suppose que par des procédés chimiques on puisse séparer les atomes 39,8 des atomes 40, 40,1, 40,2, on aura scindé le calcium en ses méta-éléments de même spectre et de poids atomiques différents.

Même en admettant que cette dernière supposition fût possible malgré son extrême invraisemblance, on peut dire que les faits ne correspondent pas aux théories de M. Crookes.

D'après les recherches de MM. Auer von Welsbach, Thalen, Lecoq, les *méta-éléments* du *Didyme* (*Prasodyme*, *Néodyme*, *Samarium*), de l'Yttria (*Terbium*, *Z β*, *Holmium*, *Erbium*, *Gadolinium*, *Dysprosium*, etc.), n'ont pas même spectre dans l'étincelle. Si M. Crookes a cru leur voir même spectre, cela tient d'une part à l'extrême sensibilité de la réaction spectrale de l'Yttrium dans l'étincelle, d'autre part à la médiocrité de celle des éléments phosphorescents dans la même étincelle.

Pour ne parler en effet que de l'Yttrium, surtout en vue dans les travaux de M. Crookes, M. Lecoq a obtenu ces terres assez pures pour ne plus montrer trace du spectre de l'Yttrium, tandis qu'une faible proportion (1^{00/100}) de ces terres mêlées à l'Yttria pure non phosphorescente à l'état de sul-

fate dans le vide, reproduisait avec éclat les phosphorescences de l'éminent chimiste anglais. Ces terres pures, ou même simplement concentrées, ne phosphorescent pas du tout, comme M. Crookes l'a montré pour le *Samarium*.

De plus, les poids atomiques de ces terres, loin de différer, comme le voudrait la théorie des méta-éléments, de quelques dixièmes, voire même de quelques unités, varient entre des limites énormes, du simple jusque au double, de l'Yttrium (Yt = 89 environ) au *Terbium* (163 environ).

Ainsi : spectres, poids atomiques sont d'accord pour faire de ces éléments des analogues, par toutes leurs propriétés générales, des autres corps simples. Ils ne diffèrent d'eux que par ce point qu'ils offrent plusieurs propriétés semblables et qu'ils sont difficiles à séparer. Il suffirait qu'un mode de séparation fût trouvé pour que cette distinction s'effaçât.

Nous concluons que dans le groupe des terres rares on a affaire non pas tant à des corps exceptionnels qu'à des corps que nos méthodes habituelles sont impuissantes à séparer entre eux.

III

Nous ne connaissons pas de principe qui permette de décider, à l'inspection d'un corps, s'il contient plusieurs éléments. Cependant, dans ces dernières années, M. H. Becquerel pense avoir trouvé une méthode qui s'applique au cas spécial de corps caractérisés par des sels à spectres d'absorption à bandes étroites. Bien que cette méthode ait encore besoin de la sanction de l'expérience, il convient de la faire connaître ici, à cause des conclusions que M. Becquerel en a tirées.

M. Bunsen avait autrefois remarqué que les cristallins des sels de Didyme présentaient des absorptions variables, suivant la direction suivie par les rayons lumineux dans le cristal. M. Becquerel, étudiant cette propriété dans des cristaux de divers sels, fit voir que, dans un cristal donné, l'absorption est tout à fait différente suivant trois axes rectangulaires particuliers, appelés par lui *directions principales d'absorption*. Telle absorption maximum pour une vibration perpendiculaire à tel de ces axes est nulle pour la vibration parallèle à ce même axe. Dans une direction quelconque, les absorptions sont des composantes des absorptions suivant les directions principales.

Or, tandis que, pour un même corps considéré comme homogène, tel qu'un sel d'urane, les diverses bandes d'absorption ont même direction principale, ces directions, dans les cristaux de sels de didyme, varient pour les diverses bandes; celles-ci se groupent en faisceaux ayant des directions principales différentes. M. Becquerel pense que

ces groupes caractérisent autant d'éléments différents. Il y en aurait ainsi une dizaine pour le *Didyme* seul (dont quatre pour le *Praséodyme*).

Le même savant a montré, en outre, que, quand on examine une série de composés du *Didyme*, les bandes d'un même groupe sont déplacées de la même quantité en passant d'un sel à l'autre ($\lambda - \lambda' = \lambda_1 - \lambda'_1 = \lambda_2 - \lambda'_2 = \text{etc.}$), quantité qui, au contraire, varie d'un groupe à l'autre pour les mêmes combinaisons. Il y voit une confirmation de son opinion.

Il est assez difficile de tirer de ces intéressantes observations une conclusion définitive. S'il est bien certain que, pour des éléments différents, les choses doivent se passer comme le veut M. Becquerel, il est moins certain que, dans un même cristal, on n'ait pas à la fois les bandes de divers composés du même corps qui, en passant à une autre combinaison, varieraient à la fois avec la forme du cristal et la nature des éléments accessoires de manière différente. Il nous semble qu'à l'heure actuelle, toute conclusion est prématurée, et que c'est à l'expérience qu'il appartiendra de dire si la loi de M. Becquerel est exacte. Toujours est-il que, s'il se confirme que le *Didyme* renferme presque autant d'éléments que de bandes d'absorption dans ses sels, c'est à M. H. Becquerel que l'on devra attribuer l'honneur de l'avoir dit le premier.

IV

D'ordinaire on divise les terres rares en deux groupes principaux : les terres de la *Cérite* d'une part, celles de la *Gadolinite* de l'autre. Cette distinction est peu justifiée : on trouve en effet dans la *cérite* toutes les terres de la *gadolinite* avec prédominance toutefois des terres à poids moléculaires voisins de 328. Dans la *gadolinite* on rencontre de même les éléments constituants de la *cérite*. Cette fois, c'est l'*Yttria* et les terres à poids moléculaires variables de 380 à 390 qui dominent. Il n'y a là rien que de très relatif. On doit en dire autant de tous les autres minéraux qui renferment ces terres en quelque abondance. Bien qu'incorrecte, cette distinction se trouve un peu justifiée par une réaction qui lui donne une base chimique. Elle consiste dans l'insolubilité ou du moins la très faible solubilité des sulfates doubles potassiques des terres de la *cérite* dans les solutions saturées de sulfate de potassium, alors que les sulfates des terres de la *gadolinite* y sont assez solubles. Il n'y a là rien de précis : sans parler de l'*Yttria* et de la *Scandine*, cette insolubilité maximum pour le *Lanthane* et le *Cérium* décroît par degrés sans présenter de saut marqué ; c'est ainsi que le *Terbium* dont le sulfate double est un peu soluble pourrait trouver sa place à côté du

Didyme aussi bien qu'à côté de l'*Erbium*. A dire vrai, il en est de même des autres propriétés chimiques ; elles varient par degrés insensibles d'une terre à sa voisine. Ainsi la basicité, forte pour le *Lanthane*, en arrive à être minime pour l'*Ytterbium*. L'*Yttrium* et le *Scandium* jouent un rôle un peu à part tant par leur poids atomiques que parce qu'ils ne se rallient pas à l'ordre sériel. Ainsi la basicité presqu'absolue dans la *Scandine* est assez forte dans l'*Yttria* et très forte dans l'oxyde de *Lanthane*. Le sulfate potassique double insoluble dans le cas du *Scandium*, est très soluble dans le cas de l'*Yttrium* et insoluble avec le *Lanthane*. Mais dans la grande série qui va du *Lanthane* à l'*Ytterbium* on ne voit que continuité et régularité dans les variations des propriétés. Aussi a-t-on dû, pour séparer ces terres, employer des procédés fort grossiers : cristallisations répétées, précipitations partielles par l'ammoniaque, l'acide oxalique, etc... Dans tous les cas ces opérations ont dû être répétées bien des centaines, parfois bien des milliers de fois pour donner quelque résultat un peu net.

V

Comme nous l'avons dit plus haut, Mosander avait scindé le *Cérium* en trois éléments : l'un (*Cérium*) donne un peroxyde stable ; des deux autres (*Lanthane* et *Didyme*) l'un fournit des sels incolores, l'autre des sels roses doués d'un spectre d'absorption caractéristique. Ce travail de Mosander a été, à l'origine, accepté comme définitif. Il n'en a pas été de même de son travail pourtant fort exact sur l'*Yttrium*, qu'il montra formé d'*Yttrium* à poids atomique bas (90 environ), de *Terbium* à poids atomique assez élevé, à sels roses, et d'*Erbium* à poids atomique voisin, dont l'oxyde légèrement peroxydé est jaune brun. Berlin, Popp, Bahr et Bunsen ne surent pas séparer ces deux dernières terres. Delafontaine au contraire les maintint comme distinctes. Bahr et Bunsen introduisirent même à ce propos une première confusion dans ce sujet en désignant sous le nom d'*Erbin* la terre à sels roses qui était la *terbine* de Mosander. Cette confusion a prévalu : on désigne sous le nom de *terbine* la terre à peroxyde brun.

Les séparations deviennent ici, à dire vrai, fort pénibles. Ainsi l'obtention d'*Yttria* pure est des plus longues, malgré l'abondance de cette terre. Partant de 2 kilogrammes de terre brute M. Clève n'en obtint que 4 à 5 grammes encore jaunâtre. Dans ces dernières années M. Lecoq de Boisbaudran montra qu'elle n'était pourtant pas pure et qu'il fallait encore des fractionnements prolongés pour l'en tirer enfin blanche comme de la *Magnésie*.

Primitivement on attribuait à ces oxydes la formule MO. M. Mendeleeff, se basant sur diverses

considérations, leur attribua la formule $M^{2}O^{3}$ qui a prévalu et est justifiée par les chaleurs spécifiques de ceux de ces corps que l'on a obtenus à l'état métallique.

Les choses en étaient là en 1878. M. Delafontaine affirmant contre la plupart des chimistes l'existence de l'*Erbium* et du *Terbium*, confondus en général. A cette époque M. de Marignac, tout en maintenant avec son compatriote l'existence de l'*Erbium* et du *Terbium*, annonça l'existence d'un nouvel élément à poids atomique élevé (173) et à oxyde peu basique. L'*Ytterbine* existe toujours dans l'*Erbine* brute, souvent en abondance. Son radical possède un spectre d'émission fort brillant, décrit par Thalen. M. Lecoq de Boisbaudran en a également décrit un de basse température. L'existence de ce métal a été admise sans contestation : son poids atomique, sans parler de la science et de l'habileté de l'auteur de sa découverte, étant un sûr garant de son existence.

A peu près au même moment, le regretté Soret, examinant au point de vue des spectres ultra-violet divers produits de fractionnement de l'*erbine* où M. Delafontaine présumait la présence d'une nouvelle terre, montrait qu'on devait en effet conclure à l'existence d'une terre à bandes d'absorption caractéristiques et la désignait sous le nom de terre X. Elle se distinguait par des bandes d'absorption (situées la première vers λ 640,4, 566,3, entre les raies du spectre solaire M et N, entre N et O, et peu après Q). Soret admettait donc comme fondée la supposition de Delafontaine. Ce dernier, quelques semaines plus tard annonçant qu'il avait découvert une nouvelle terre (la terre X) et lui donnait le nom de *Philippium*. Il la caractérisait : 1° par son équivalent, compris entre 111 et 120. Cet équivalent ne mérite aucune confiance, l'auteur ignorant si sa terre contenait ou non encore de l'*yttria* ou d'autres matières étrangères; 2° par son spectre d'absorption formé surtout d'une très forte bande (λ 450) dans le bleu. Plus tard revenant sur ce sujet, il déclara que le *Philippium* n'avait pas de spectre d'absorption et était différent, par suite, de la terre X. Il ne restait plus rien de caractéristique au *Philippium* et on a dû le rayer de la liste des corps simples.

A peu près à la même époque (1878) M. Lawrence Smith avait annoncé, sur des motifs jugés universellement insuffisants, la présence d'un élément particulier le *Mosandrum* dans les terres de la Samarskite.

Cette même année M. Delafontaine publia la découverte d'un nouvel élément, le *Décipium*, caractérisé par son poids atomique 159 et les bandes d'absorption de ses sels ($\lambda = 416$ et 478). Ces sels étaient incolores. Plus tard M. Delafontaine a trouvé que le *Décipium* était un mélange de *Samarium* et de

l'élément γ_a de M. de Marignac. Il adoptait pour son métal le nom de *Samarium*, tout en revendiquant la priorité de sa découverte. Ce dernier métal avait été découvert, en 1879, par M. Lecoq de Boisbaudran et il semble vraisemblable que le *Décipium* ait été du *Samarium* très impur. Les propriétés de cet élément sont en effet assez distinctes. Ses sels sont jaunes et présentent des bandes d'absorption intenses ($\lambda = 480, 463,5, 417, 400,7$). Son poids atomique est environ de 150 (Clève).

M. de Marignac a désigné sous le nom de γ_β un élément qui est aussi le *Samarium*.

C'est en 1879 encore que M. Nilson découvrit le *Scandium* dans l'*Ytterbine* brute tirée de certains minéraux. Il le caractérisait par la faible basicité de la scandine $Sc^{2}O^{3}$, plus faible encore que celle de l'*ytterbine*, et un poids atomique très bas : M. Clève a montré plus tard, qu'il est environ de 44. M. Thalen établit que le nouveau corps avait un spectre d'émission spécial et fort brillant : le corps a été identifié à l'*Ekabor* de M. Mendeleeff, dont il présente en effet beaucoup de propriétés. Son faible poids atomique lui donne, avec son rang de premier terme de la série des terres rares, un grand intérêt. Malheureusement les minéraux d'où on l'extraît n'en renferment que des traces.

Nous avons dit plus haut que Soret avait démontré l'existence d'une terre particulière à spectre d'absorption désignée sous le nom de X. Dans d'autres mémoires publiés dans les *Archives des sciences physiques et naturelles de Genève*, il montrait qu'une des raies du rouge extrême dans le spectre des sels d'*Erbium* éprouvait des variations assez fortes pour qu'on pût supposer la présence d'un élément spécialement caractérisé par cette raie. En 1880, M. Clève, sans connaître les travaux de Soret, montra qu'on pouvait isoler une *erbine* dépouillée de la raie rouge en question et aussi des raies de la terre X. Il donna à l'élément de la raie rouge le nom de *Thulium*, et celui de *Holmium* à l'élément de la terre X. Soret accepta ces noms, tout en faisant remarquer qu'il y avait quelque imprudence à nommer des corps sans en avoir isolé une seule combinaison.

En 1880 M. de Marignac avait prouvé que, parmi les terres à sulfates potassiques solubles dans le sulfate de potasse, il se trouve un élément à sels incolores sans spectre d'absorption, offrant un poids atomique voisin de 156. Cette terre, désignée d'abord sous le nom de γ_a , en attendant que son existence se confirmât, a été appelée plus tard *Gadoline* (du radical *Gadolinium*). Il ne faut pas confondre ce nom avec le *Gadolinium* de M. Nordenskiöld, nom sous lequel il désignait le mélange des terres rares auxquelles il attribuait un poids moléculaire moyen constant.

M. Lecoq de Boisbaudran a montré que le *Gadolinium* est caractérisé par un spectre d'émission particulier. Son existence est donc certaine. M. Crookes a professé sur ce corps une série d'opinions contradictoires. Il l'a considéré comme un corps simple, puis comme un mélange d'*Yttrium* et de *Samarium*, puis comme formé de divers des méta-éléments de l'*Yttrium* et de *Samarium*. Ces observations reposent uniquement sur l'examen des spectres de phosphorescence. D'après M. Lecoq de Boisbaudran le *Gadolinium* de M. de Marignac contenait en effet de petites quantités de *Samarium* (4,4 0/0), de *Zr* et *Zp* (voir plus loin) (environ 4,7 0/0) mais une simple trace d'*Yttria* (0,1 0/0) et plus de 90 0/0 de la terre étaient dus à l'élément possédant le spectre d'émission précité. De plus un élément à poids atomique égal à 156 ne peut être un mélange de *Samarium* (150) et d'*Yttria* (89); nous devons donc considérer le *Gadolinium* comme véritablement distinct.

En 1885 M. Auer von Welsbach a scindé le *Didyme* en deux corps. L'un a été nommée *Praséodyme* de la couleur verte de ses sels; l'autre, *Néodyme*, a des sels roses. Le poids atomique du premier est de 143,6; celui du second, 140,8. Il y a là une anomalie : en effet dans le fractionnement de ces corps, le *Praséodyme* se sépare en dernier lieu avec le *Lanthane*, le *Néodyme* au contraire s'en écartant davantage. Il paraît singulier que la gradation des propriétés, d'ordinaire si nette, n'existe pas ici. Il est d'ailleurs fort possible que ces éléments puissent être encore dédoublés.

Il est regrettable que l'on n'ait pas conservé au *Néodyme* le nom de *Didyme* donné par Mosander à l'élément qui fournissait des sels roses. On introduit en effet de la confusion en donnant de nouveaux noms à des corps suffisamment déterminés. Si l'on considère que rien n'est moins certain que la simplicité de ces produits de dédoublement, on aurait en suivant l'exemple de M. Auer von Welsbach, à changer encore le nom du *Didyme*. Il semble bien préférable, ainsi qu'on l'avait fait jusqu'ici, de garder le nom donné par le découvreur, à la terre qui possède la propriété caractéristique qui l'a fait trouver. Ainsi la propriété d'avoir des sels roses au *Didyme*, celle d'en avoir de verts au *Praséodyme*, d'avoir un peroxyde brun au *Terbium*, etc.

En même temps qu'il donnait le mode de préparation du *Néodyme* et du *Praséodyme*, M. Auer semblait indiquer la présence d'un autre élément dans le *Didyme* en éliminant du *Praséodyme* et du *Néodyme* une raie ($\lambda = 476$ env.) du *Didyme*. M. Crookes a confirmé cette élimination et déclaré avoir obtenu des variations considérables dans plusieurs des autres raies du *Didyme*, mais sans préciser da-

vantage, et sans avoir, à ce qu'il semble, obtenu des séparations nettes.

En 1885 et 1886, M. Lecoq de Boisbaudran, utilisant la phosphorescence de M. Crookes et son propre procédé (dit de renversement), scinda la terbine brute en une terre peu colorée à fluorescence jaune citron qu'il désigna provisoirement sous le nom de *Zz*, l'autre à peroxyde brun-rouge, à phosphorescence verte, désignée sous le nom de *Zp*. Cette seconde terre semble de tous points identique à la terbine. Le *Terbium* à cet état de pureté a un poids atomique égal au moins à 163. Le *Zz* paraît avoir un poids atomique encore supérieur. Les terres riches en *Zz* sont remarquables par un spectre particulier d'émission dans l'étincelle électrique. M. Lecoq de Boisbaudran nomme *Zy* l'élément auquel il est dû, en faisant observer que, bien qu'il soit naturel d'attribuer ce spectre à *Zz*, cela n'est point prouvé. En tous cas, il caractériserait un métal particulier contenu dans les terres riches en *Zz* et pauvres en *Holmium*.

A peu près à la même époque, M. Lecoq publia des recherches sur le *Holmium*, d'où il résulte que cet élément peut être dédoublé. Le *Holmium* est caractérisé par les deux bandes du rouge et du vert ($\lambda = 640,4$ et $536,3$); l'autre élément, nommé *Dysprosium*, par les bandes $\lambda = 753,475$ et $451,5$; il se sépare dans les fractionnements entre le *Terbium* et le *Holmium*. Le *Dysprosium* présente, outre les deux bandes principales signalées ci-dessus d'autres bandes minimes. M. Crookes, étudiant un peu après certains produits de fractionnement, émit l'avis que cet élément en renferme encore au moins un autre. M. Lecoq a bien voulu m'autoriser à dire ici qu'il partage l'avis de M. Crookes et qu'il attribue le nom de *Dysprosium* à l'élément caractérisé par la bande $\lambda = 475$.

En 1886 l'auteur de cet article a montré que le *Samarium* était un mélange. La bande double ($\lambda = 449$) du violet se trouve en effet éliminée, dans certains, de ses produits de fractionnements. Le nouvel élément paraît plus basique que le *Samarium* vrai, caractérisé par les deux bandes bleues et la bande ultraviolette ($\lambda = 400$ env.). Il serait compris entre le *Samarium* et le *Néodyme*.

Tout récemment en 1887, 88 et 89 MM. G. Krüss et Nilson ont pensé démontrer la complexité des éléments à bandes d'absorption en examinant les terres brutes extraites de divers minéraux. Nous avons dit plus haut qu'à notre avis on ne pouvait tirer de pareilles conclusions que de l'examen d'une série de fractionnements et non de terres brutes qui ne permettent pas de fixer les idées sur la confiance qu'on peut avoir dans l'aspect d'une bande. Les observations de MM. Krüss et Nilson ne nous paraissent donc pas comporter de

conclusions. M. Bailey avait fait avant nous des observations analogues. M. Crookes a déclaré d'ailleurs avoir obtenu des résultats contradictoires de ceux de ces savants. Je puis ici confirmer absolument les résultats de M. Crookes.

MM. Krüss et Nilson concluent en attribuant la présence d'à peu près chaque bande à un élément particulier. C'est accepter l'opinion de M. Becquerel en l'exagérant sur quelques points.

M. Crookes, dans ses derniers travaux, a adopté la croyance à un nombre considérable d'éléments nouveaux, en se basant soit sur des faits de variations dans les bandes d'absorptions soit sur des arguments basés sur les phosphorescences dans le vide. Nous avons déjà indiqué les objections qu'on pouvait faire aux conclusions fondées sur ces dernières expériences. Il suffira de dire ici qu'en comptant comme éléments les méta-éléments de M. Crookes il y en aurait 5 dans l'*Yttria*, 4 dans le *Samarium*, 2 dans l'*Erbium*.

De leur côté MM. Krüss et Nilson en admettent 9 dans le *Didyme*, 2 dans le *Samarium*, 2 dans l'*Erbium*, 4 dans le *Holmium*, 2 dans le *Thalium*, 3 dans le *Dysprosium*.

Nous ne compterons pas jusqu'ici l'existence de tous ces éléments nouveaux comme prouvée. Si l'on se borne à ceux dont l'existence a été affirmée sur des bases solides, on peut présenter le tableau suivant :

Scandium.....	44	Yttrium.....	89
Lanthane.....	139	Cérium.....	141
Néodyme.....	141	Praséodyme.....	143
(2 éléments suivant		élément du Didyme non	
M. Crookes).....		nommé.....	
Samarium (Yβ).....	148		
(2 éléments suivant			
M. Demarçay).....			
Gadolinium (Yα).....	156	Terbium (Zβ).....	163
Zα, Zγ.....		Dysprosium.....	
		2 éléments (Crookes) .	
Holmium.....		Erbium.....	
Thalium.....		Ytterbium.....	

On connaîtrait donc 19 éléments sûrement constatés. Suivant M. Becquerel d'une part, MM. Krüss et Nilson, d'autre part, il faudrait en compter au moins une quinzaine de plus, sans doute davantage si l'on réfléchit que ces savants n'ont utilisé que les bandes d'absorption visibles et ne se sont aucunement occupés des éléments qui, comme le *Gadolinium* et le *Terbium* n'en présentent pas.

C'est l'avenir qui décidera, à la suite de patients travaux, si la théorie « une bande : un élément », est vraie en absorption et en phosphorescence. Pour le moment il n'est que modéré de s'abstenir.

VI

Comme on vient de le voir, on compte au minimum 19 éléments dans le groupe des terres rares, dont 17 à poids atomiques compris entre ceux du baryum et du tantale, doués de propriétés telle-

ment analogues que longtemps on a cru ne voir là que 4 ou 5 éléments. Le fait est d'une grande importance pour la classification naturelle des corps simples et aussi pour celle de M. Mendeleef. Il est en effet très difficile de ranger ces corps d'une façon tant soit peu vraisemblable dans les cadres du célèbre savant russe. On est conduit à des rapprochements qui choquent le moins expérimenté des chimistes. Dans ses tables M. Mendeleef prévoyait dans les limites 138-173 la présence de 20 éléments rangés dans sa famille aux places vides du tableau suivant qui reproduit la fraction de sa classification qui nous intéresse.

Rb	Sr	Yt	Zr	Nb	Mo	X	Ru	Rh	Pd	Ag
(Ag)	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	—	—	—	—
Cs	Ba	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	Ta	W	—	Os	Ir	Pt	Au
(Au)	Hg	Tl	Pb	Bi	—	—	—	—	—	—

Des vingt éléments compris entre le baryum et le tantale, 4 devraient être intermédiaires entre le ruthénium et l'osmium, le rhodium et l'iridium, le palladium et le platine, l'argent et l'or. Rien d'approchant ne peut se trouver parmi les métaux des terres rares. Des 16 restants, deux devraient donner des oxydes alcalins de formule M^2O , analogues l'un à l'oxyde d'argent, l'autre à l'oxyde de césium ; 2 devraient donner des oxydes de formule MO comme la baryte d'une part, l'oxyde de mercure de l'autre ; 3 enfin devraient être triatomiques comme le sont les métaux des terres rares, dont 3 trouvent place ici d'une façon naturelle ; 3 seraient tétratomiques et fourniraient un peroxyde de la forme MO^2 (on peut à la rigueur mettre ici le cérium) ; enfin 6 fourniraient des oxydes acides et seraient intermédiaires à l'antimoine et au tantale, au tellure et au Wolfram, à l'iode et à son homologue inconnu situé entre le Wolfram et l'osmium.

Il n'est pas besoin d'insister davantage pour montrer le désaccord presque complet de la théorie et de l'expérience. Que l'on observe en outre que si, comme il est probable, ce groupe (138-173) s'enrichit encore de quelques membres, il n'y aura pas assez de place pour les loger, même de force.

Quant au *Scandium* et à l'*Yttrium*, ils se rangent sans peine dans cette classification et il n'y a point là d'observations à faire.

Le groupe des terres rares paraît donc devoir être l'instrument d'un progrès important de nos classifications des corps simples. De toutes celles connues jusqu'ici, il ne reste de bon que des fragments, sauf peut-être la série linéaire de Newlands qui ne peut guère être considérée que comme une première approximation. En tous cas, la classification naturelle des éléments est encore à trouver.

E. Demarçay.

LES PHÉNOMÈNES MORPHOLOGIQUES DE LA FÉCONDATION CHEZ LES PLANTES PHANÉROGAMES

A partir de l'époque où l'existence des sexes fut reconnue chez les plantes phanérogames, de longues années s'écoulèrent avant qu'on ne parvint à savoir comment l'élément mâle agit sur l'élément femelle dans la fécondation. En 1822, Amici fit le premier pas vers la détermination de la marche du phénomène. En examinant les poils du stigmate du Pourpier pour étudier les mouvements du protoplasme, il vit un grain de pollen émettre un tube très fin, qui s'étendit sur toute la longueur d'un poil stigmatique et dans lequel il constata un mouvement de granules; mais après quelques heures, ces granules disparurent sans qu'il réussit à savoir ce qu'ils étaient devenus. Ce fait très important aurait pu passer inaperçu, comme les observations de Richard, Batiér et autres botanistes, qui avaient déjà vu et même figuré le tube pollinique sans en soupçonner ni l'origine ni le rôle, s'il n'avait singulièrement frappé Brongniart, qui, dès ce moment, commença une série de recherches à la suite desquelles il établit, en 1826, que tous les grains de pollen émettent sur le stigmate « un appendice tubuleux d'une longueur variable, formé par une membrane extrêmement mince et transparente et contenant un assez grand nombre de granules polliniques ». Toutefois, Brongniart ne put suivre ce tube jusqu'aux ovules, et ce fut encore Amici qui, plus tard, annonça qu'il l'avait vu pénétrer dans le micropyle ovulaire.

Mais quelle était la nature de ces granules polliniques désignés depuis sous le nom de *forilla*?

On la connaissait si peu que, dans une discussion restée célèbre, certains botanistes prétendirent que le grain de pollen contient en germe l'embryon végétal, l'ovule étant simplement destiné à recevoir et à nourrir cet embryon apporté à son intérieur par le tube pollinique. Plus que tout autre, Hofmeister contribua à renverser cette singulière théorie, qui était la négation même de la sexualité. Mais le mécanisme de la fécondation n'en restait pas moins à trouver : c'est seulement dans ces derniers temps qu'on y est parvenu. A M. Strasburger revient l'honneur d'avoir inauguré en botanique, par ses observations sur les cellules et les noyaux, les découvertes qui seules pouvaient conduire à la connaissance des phénomènes morphologiques de la fécondation.

1

Au début des recherches nouvelles effectuées dans cette voie, on pensa que la fécondation, envi-

sagée dans l'ensemble des végétaux, consiste dans la fusion et la combinaison de deux cellules, l'une mâle, l'autre femelle, fusion et combinaison portant séparément sur les protoplasmes et sur les noyaux. Puis, en considérant la réduction progressive que subit le protoplasme de la cellule mâle, à partir des organismes inférieurs, chez lesquels la sexualité est à peine ébauchée, jusqu'à ceux dont les corps reproducteurs sont les plus différenciés, on soupçonna que le protoplasme ne doit remplir qu'un rôle accessoire. Chez les Algues, par exemple, la réduction du protoplasme de la cellule mâle, coïncidant avec la différenciation progressive des corps reproducteurs, se manifeste déjà d'une façon très marquée, quand on compare les uns aux autres les divers groupes de cette classe. Elle atteint son plus haut degré chez les Cryptogames archégoniées, telles que les Characées, les Muscinées, les Fougères, etc., dont l'anthérozoïde, né par métamorphose spéciale du contenu primitif de sa cellule mère, peut être considéré comme uniquement formé, dans sa partie active, par de la substance nucléaire, les cils dont il est pourvu n'étant que des organes locomoteurs. Chez les Phanérogames, le corps reproducteur mâle est représenté par un noyau que le tube pollinique transporte dans la cellule femelle; dès qu'il y est entré, il s'unit au noyau femelle, sans que le protoplasme qui l'accompagnait dans le tube paraisse devoir intervenir dans l'acte de la fécondation.

Mais cette idée, si simple au premier abord, que la fécondation consiste dans la fusion de deux noyaux, renferme pourtant quelque chose d'obscur. On sait, en effet, qu'un noyau possède une structure complexe et contient des éléments différenciés de diverses natures. On distingue, à l'intérieur de son enveloppe membraneuse, un filament contourné et pelotonné, dont les replis sont ordinairement anastomosés en réseau. Ce filament se compose d'une substance fondamentale hyaline et homogène, dans laquelle on aperçoit, disposées en série, des granulations plus réfringentes, de grosseur variable, qui fixent énergiquement certaines matières colorantes. Cette propriété montre que ces granulations sont constituées par une substance albuminoïde spéciale, désignée sous le nom de *chromatine* et formée en majeure partie, sinon en totalité, par de la *nucléine*, matière albuminoïde phosphorée. La substance fondamentale du filament nucléaire ne se colore pas ou se colore très peu par les réactifs de la chromatine. Le noyau pos-

sède en outre un ou plusieurs corps arrondis, de grosseur variable, appelés *nucléoles*. Enfin, les interstices laissés entre ces éléments figurés et la membrane d'enveloppe sont occupés par une substance hyaline très aqueuse, qui est le *suc nucléaire*. Que deviennent ces divers éléments pendant la fécondation, c'est-à-dire quand le noyau mâle s'unit au noyau femelle ?

Pour avoir un aperçu de l'ensemble des phénomènes morphologiques qui accompagnent cet acte important, il faut rechercher d'abord comment les corps reproducteurs naissent et se différencient dans l'organe mâle et dans l'organe femelle, puis quelle est leur constitution à l'état adulte, enfin de quelle façon ils s'unissent pour former le premier noyau embryonnaire.

En exposant les résultats récemment acquis sur ces divers points, nous n'envisagerons que les faits essentiels, considérés seulement chez les Phanérogames angiospermes.

II

Quand le grain de pollen vient de prendre naissance dans l'anthere, il ne renferme qu'un noyau dans un protoplasme dense; mais plus tard il divise son contenu en deux cellules de volume inégal, l'une petite, appelée *cellule génératrice*, l'autre grande, appelée *cellule végétative*; toutes deux sont entourées par la membrane commune, ordinairement double, qui constitue l'*intine* et l'*exine* du grain de pollen. La cellule végétative est séparée tout d'abord de sa congénère par une cloison très délicate, en forme de verre de montre, qui ne tarde pas à disparaître. D'autre part, la cellule génératrice, s'isolant de la paroi du grain de pollen, devient libre à l'intérieur de la cellule végétative et prend ordinairement la forme d'un fuseau plus ou moins courbé en croissant et dont le centre est occupé par le noyau (fig. 1).

Presque aussitôt après leur naissance, ces deux cellules montrent une différence très grande dans la forme, la structure et les réactions de leurs noyaux. Les réactifs de la nucléine colorent en général beaucoup plus fortement le noyau de la cellule génératrice, par suite de la présence, dans ce dernier, d'une charpente chromatique plus riche et plus serrée que dans le noyau de la cellule végétative; en outre, tandis que le premier est ordinairement dépourvu de nucléole ou n'en renferme qu'un petit, le second en possède un assez gros.

La bipartition du noyau primitif du grain de pollen a lieu suivant le mode normal de la division indirecte ou karyokinèse, caractérisée par une succession régulière de phases déterminées. Le filament pelotonné, qui constitue la charpente ou réticulum nucléaire, se contracte et s'épaissit, les mailles du réticulum formé par ses replis disparaissent;

les granulations chromatiques du filament se rapprochent, s'accolent et même se fusionnent. Puis il se segmente en un certain nombre de tronçons ou bâtonnets droits ou courbes, qui paraissent dans certains cas préexister dans le filament. Pendant ce temps, le nucléole ou les nucléoles se dissolvent dans le suc nucléaire; la membrane du noyau elle-même se résorbe, et, à la place noyau primitif, on voit apparaître un *fuseau* formé de fils protoplasmiques achromatiques, à l'équateur duquel les bâtonnets ou segments chromatiques s'orientent de manière à former une *étoile*



NOTA. — Toutes les figures sont empruntées au *Lilium Martagon*.

Fig. 1. — Grain de pollen adulte montrant sa cellule génératrice lenticulaire, *cg*, libre dans le protoplasme de la cellule végétative. — Gross. : 300.

Fig. 2. — Partie terminale du tube pollinique, avec le noyau végétatif, *ve*, en avant, et la cellule génératrice, *cg*, en arrière. — Gross. : 250.

Fig. 3. — La cellule génératrice s'est divisée en deux nouvelles cellules. — Gross. : 250.

Fig. 4. — Etat plus âgé du tube pollinique.

Fig. 5. — Plaque nucléaire du noyau générateur primitif en voie de division. Elle est formée de 12 segments ou bâtonnets chromatiques offrant déjà les indices du dédoublement longitudinal. — Gross. : 1000.

Fig. 6. — Arrivée des bâtonnets ou segments secondaires aux deux pôles du fuseau achromatique. — Gross. : 1000.

ou *plaque nucléaire* (voir fig. 8). Bientôt, il se fait dans chaque bâtonnet ou segment chromatique une scission longitudinale, qui commence à l'extrémité la plus rapprochée du centre de figure de la plaque et marche progressivement vers l'extrémité opposée. Les deux moitiés de chaque bâtonnet glissent en sens inverse sur les fils du fuseau et se transportent à ses deux pôles. A chacun de ceux-ci viennent donc, en définitive, se rassembler autant de moitiés de *bâtonnets*, ou *segments secondaires*, qu'il y avait de *segments primaires*, et par le fait même du dédoublement longitudinal qui s'effectue dans chaque segment primaire, les deux moitiés qui se séparent sont tout à fait semblables entre

elles. Après l'arrivée des segments secondaires aux pôles, les deux nouveaux noyaux en voie de formation renferment la même quantité de substance nucléaire.

Comme on le verra bientôt, la considération du nombre des bâtonnets ou segments chromatiques que renferment les éléments sexuels présente un grand intérêt. Mais comme ce nombre peut varier d'une plante à l'autre, nous prendrons maintenant pour exemple le *Lis Martagon*, qui m'a permis d'étudier en détail les phénomènes qui précèdent et accompagnent la fécondation.

Quand le grain de pollen forme son tube sur le stigmate de la fleur, le noyau végétatif y pénètre ordinairement le premier; la cellule génératrice, avec son protoplasme peu abondant et son noyau très chromatique, dépourvu de nucléole, le suit à peu de distance (fig. 2). Avec un mélange approprié de vert de méthyle et de fuchsine, j'ai pu colorer en rose vif, et d'une façon tout à fait caractéristique, le protoplasme de la cellule génératrice et le distinguer ainsi du protoplasme végétatif qui remplit plus ou moins complètement l'extrémité antérieure du tube pollinique. Cette réaction permet de suivre la destinée du premier de ces protoplasmes aux diverses phases du développement et de savoir s'il intervient ou non dans la fécondation. Pendant l'accroissement du tube pollinique, peu de temps après la germination du grain de pollen, la cellule génératrice divise son noyau et son protoplasme chacun en deux moitiés égales, qu'on aperçoit d'abord rapprochées l'une de l'autre, puis assez écartées et étirées dans le tube dont elles occupent tout le diamètre (fig. 3 et 4). Dans le noyau de cette cellule en voie de bipartition, on trouve *douze segments chromatiques*, faciles à compter avant et surtout pendant le stade de la plaque nucléaire (fig. 5). Chaque segment se dédoublant suivant sa longueur en deux moitiés égales, qui se dirigent en sens opposé vers les pôles du fuseau achromatique, les deux nouveaux noyaux générateurs reçoivent chacun douze segments chromatiques secondaires (fig. 6): ils sont donc équivalents. Le tube pollinique renferme alors deux cellules génératrices nues.

Pendant que les noyaux de ces deux cellules grossissent sensiblement en continuant leur marche dans le tube, le noyau végétatif qui les précède diminue peu à peu de volume et présente bientôt des symptômes de désorganisation; il disparaît presque complètement avant l'arrivée du tube pollinique sur le nucelle ovulaire (fig. 4). Ce fait est important à constater, car, à ce stade du développement, on pourrait croire que les deux noyaux générateurs sont l'un le noyau végétatif, l'autre le noyau générateur qui serait resté indivis. Tardive

chez le *Lis* et chez beaucoup de Monocotylédones, la disparition du noyau végétatif a lieu, au contraire, beaucoup plus tôt chez les Dicotylédones; de sorte que, dans ce dernier cas, on ne trouve de bonne heure à l'intérieur du tube que les deux noyaux générateurs. De ces deux noyaux, le plus rapproché de l'extrémité du tube pénétrera seul, dans la presque totalité des cas, dans la cellule femelle qu'il est chargé de féconder; pour cette raison, il mérite le nom de *noyau mâle*.

II

Voyons maintenant comment l'appareil sexuel femelle naît et se développe dans l'ovule.

Le centre du nucelle ovulaire est occupé par




Fig. 7. — Coupe longitudinale médiane d'un ovule au moment de la division du noyau primaire du sac embryonnaire; *lg*, téguments ovulaires; *se*, sac embryonnaire. — Gross. : 30.

Fig. 8. — Noyau primaire du sac plus grossi, au stade de la plaque nucléaire, formée de 12 segments chromatiques, dont les deux moitiés, dans chaque bâtonnet, commencent à se séparer à l'extrémité tournée vers le centre de figure, pour se diriger en sens inverse vers les deux pôles du fuseau. — Gross. : 750.

Fig. 9. — Les deux premiers noyaux du sac, encore réunis par quelques fils achromatiques sont semblables l'un à l'autre. — Gross. : 250.

Fig. 10. — Le noyau inférieur est devenu plus gros que le noyau supérieur. — Gross. : 250.

Fig. 11. — Noyau supérieur du sac en division, avec plaque formée de 12 segments chromatiques. Le fuseau est vu dans la direction de son grand axe. Le noyau inférieur offre une plaque nucléaire composée de 16 segments; son fuseau est perpendiculaire au premier. — Gross. : 600.

une grande cellule, le *sac embryonnaire*, remarquable dès l'origine par son gros noyau, qui est le *noyau primaire* du sac embryonnaire. Quand il se divise pour donner naissance à l'appareil sexuel, ce noyau offre toujours, dans le *Lis*, douze segments chromatiques; le même nombre, on l'a vu, se rencon-

trait dans chacun des noyaux formés dans le tube pollinique. Après le dédoublement longitudinal de ces segments primaires, disposés en une plaque nucléaire très régulière à l'équateur du fuseau achromatique (fig. 7 et 8), et le transport des segments secondaires aux deux pôles du fuseau, les deux nouveaux noyaux, dans la constitution desquels entre le même nombre de segments chromatiques, se montrent tout d'abord entièrement semblables l'un à l'autre sous le rapport de la structure et des réactions (fig. 9). Mais dès qu'ils s'éloignent du centre du sac embryonnaire en se dirigeant vers ses deux extrémités, le noyau inférieur commence à l'emporter, par son volume et sa masse chromatique, sur le noyau supérieur (fig. 10). Puis tous deux entrent simultanément en division.

On remarque alors ce fait curieux, que le nombre des segments chromatiques n'est plus égal dans chacun d'eux. On en compte douze dans le noyau du haut, tandis que celui du bas en offre souvent seize, comme le montre la figure 11, où la division des deux noyaux est parvenue au stade de la plaque nucléaire et se fait dans deux plans perpendiculaires. Le noyau inférieur peut même offrir un nombre de segments encore plus élevé, sans que le nombre de douze change dans le noyau supérieur ni dans ses dérivés (fig. 13). Il apparaît donc, dès les premières divisions qui s'effectuent dans le sac embryonnaire, une différence caractéristique dans la constitution des noyaux, différence qui coïncide avec le rôle qu'ils auront à remplir.

La distance qui sépare les deux groupes nucléaires, situés l'un au sommet, l'autre à la base du sac, augmente peu à peu, par le fait même de l'accroissement de ce dernier, dont le centre est généralement occupé par une grande vacuole. L'inégalité de volume dans les deux groupes nucléaires est déjà très marquée alors qu'ils ne comprennent encore chacun que deux noyaux (fig. 12). Pendant la dernière bipartition, les noyaux de la base offrent chacun de vingt à vingt-quatre segments, aussi épais et aussi longs que ceux qu'on observe en même temps dans les noyaux du sommet, ce qui prouve que l'augmentation de volume s'est accompagnée d'une augmentation de la masse chromatique. Par contre, chacun des noyaux du sommet n'offre jamais que douze segments.

Parmi les quatre noyaux de la tétrade supérieure, il en est deux qui appartiendront aux *synergides* et qui sont frères; des deux autres situés un peu au-dessous, l'un deviendra le noyau de l'oosphère ou *noyau femelle*, tandis que son congénère, restant libre, concourra à former le *noyau secondaire* du sac embryonnaire. Dès que les synergides et l'oosphère se sont entourées d'une membrane d'enveloppe

très délicate, ce noyau demeure libre, que j'ai désigné jadis, ainsi que son homologue inférieur, sous le nom de *noyau polaire*, à cause de leur situation dans le sac embryonnaire, commence à




Fig. 12. — Inégalité de volume des noyaux dans les deux groupes nucléaires situés aux deux extrémités du sac embryonnaire. — Gross. : 250.

Fig. 13. — Partie supérieure du sac, offrant ses deux noyaux en division dans deux plans perpendiculaires, avec plaques nucléaires formées chacune de 12 segments chromatiques. — Gross. : 250.

Fig. 14. — Sac embryonnaire entier, renfermant au sommet l'appareil sexuel femelle, qui comprend les deux synergides *syn*, et l'oosphère avec son noyau *nf*; à côté de cette dernière se trouve le noyau polaire supérieur *nps*. — A la base du sac, les trois cellules antipodes *ant* sont déjà en voie de désorganisation, tandis que le noyau polaire inférieur, *npi*, a conservé ses caractères primitifs et même augmenté de volume. — Gross. : 250.

Fig. 15. — Le noyau polaire inférieur *npi* s'est rapproché du noyau polaire supérieur *nps*, auquel il doit s'unir pour former le noyau secondaire du sac embryonnaire.

Fig. 16. — Stade plus avancé, montrant la réunion de deux noyaux polaires.

Fig. 17. — Partie supérieure du sac embryonnaire recouverte par l'épiderme de la nucelle. Le tube pollinique *tp* a pénétré entre les cellules épidermiques au sommet; le noyau mâle *nm* a passé dans l'oosphère, où il se trouve encore à quelque distance du noyau femelle *nf*. Le second noyau générateur est resté à l'extrémité du tube. — Gross. : 250.

grossir et à devenir plus chromatique que le noyau de l'oosphère, dont il est pourtant le frère (fig. 14).

Pendant ce temps, une différence très sensible se manifeste également entre le noyau polaire de la tétrade inférieure et les trois noyaux des cel-

tules antipodes. Ces derniers sont même en voie de désorganisation et de résorption avant la différenciation complète de l'appareil sexuel et la fusion des deux noyaux polaires. Les antipodes n'ont d'ailleurs, comme on sait, aucun rôle à jouer dans la fécondation.

Lorsque l'appareil sexuel est parvenu à l'état adulte, le noyau de l'oosphère est un peu plus gros et plus chromatique que les noyaux des synergides; il possède un ou plusieurs nucléoles inégaux.

Le noyau polaire supérieur reste d'abord tout près de l'oosphère; il est séparé par une grosse vacuole du noyau polaire inférieur. Ce dernier fait la plus grande partie, parfois même la totalité du chemin nécessaire pour venir le rejoindre (fig. 13). Arrivés en contact, les deux noyaux polaires, toujours inégaux, restent d'abord accolés en gardant chacun sa membrane propre; ils descendent ensemble vers la partie centrale du sac embryonnaire (fig. 16). En s'aplatissant l'un contre l'autre, sans se confondre et sans qu'il y ait ni soudure, ni fusion de leurs éléments figurés, car la ligne de démarcation formée par leurs membranes persiste jusqu'au moment de la fécondation, ils forment ensemble une masse plus ou moins arrondie ou ovoïde, qui est le *noyau secondaire du sac embryonnaire*, dont la destinée est de donner naissance à l'*albumen*. Remarquons, toutefois, que si l'union des noyaux polaires est peu prononcée dans le *Lis*, il n'en est pas de même dans beaucoup d'autres plantes, chez lesquelles le noyau secondaire du sac embryonnaire forme une masse globuleuse, où les nucléoles se fusionnent, mais où les éléments chromatiques dérivés des deux composants doivent certainement rester distincts.

III

Le tube pollinique, après avoir pris naissance sur le stigmate de la fleur, s'insinue entre les papilles du stigmate, puis s'enfonce entre les cellules épidermiques de cet organe pour s'avancer à travers le tissu conducteur du style jusqu'au micropyle de l'ovule. De là, son extrémité s'avance jusqu'au sommet du sac embryonnaire en écartant les cellules de l'épiderme non résorbé du nucelle; elle vient s'accoler à la membrane du sac qu'elle refoule et avec laquelle elle se soude intimement, vis-à-vis l'appareil sexuel femelle. Ordinairement, la pénétration du tube à lieu à côté ou entre les synergides, parfois aussi dans l'une des synergides, dont le contenu se désorganise aussitôt. Dans un cas comme dans l'autre, sous l'influence de la poussée qui s'exerce à l'intérieur du tube pollinique, dont la membrane est ramollie et gonflée, le noyau mâle passe aussitôt dans le protoplasme de l'oosphère. Le second noyau générateur n'y entre

que par exception. Quant au protoplasme qui dérive de la cellule génératrice primitive et accompagne le noyau mâle dans le tube pollinique, on ne le retrouve pas dans l'oosphère : *le noyau seul paraît donc intervenir dans la fécondation*.

Aussitôt après son entrée dans la cellule femelle, le noyau mâle, qui s'était d'abord étiré pour traverser le micropyle, apparaît comme une petite masse chromatique dense et homogène. Il va si rapidement s'accoler au noyau de l'oosphère qu'il est très rare de le trouver encore à quelque distance de ce dernier (fig. 17). Bientôt il commence




Fig. 18. — Accolement des deux noyaux sexuels dans l'oosphère. On aperçoit déjà dans le noyau mâle *nm* un réseau chromatique distinct, avec un nucléole. — Le noyau secondaire du sac s'est divisé et a donné les deux premiers noyaux de l'albumen. — Gross. : 250.

Fig. 19. — Les deux noyaux sexuels sont entrés dans la prophase de la division; leurs membranes propres sont encore distinctes. — Gross. : 750.

Fig. 20. — Les membranes nucléaires ont disparu. On voit à droite, dans l'oosphère, les segments chromatiques du noyau mâle *nm*; à gauche, ceux du noyau femelle *nf*.

Fig. 21. — Formation du fuseau, à l'équateur duquel les vingt-quatre segments chromatiques mâles et femelles s'orientent pour former la plaque du noyau de l'œuf après la fécondation. — Gross. : 750.

à grossir et à prendre insensiblement les caractères morphologiques d'un noyau à l'état de repos; un ou plusieurs nucléoles apparaissent dans son réseau

chromatique (fig. 18). Plusieurs jours sont nécessaires, dans le cas actuel, pour qu'il revête ces caractères. Toutefois, même après qu'il a augmenté de volume, il reste toujours un peu moins gros que le noyau femelle; mais son réseau chromatique est plus dense et plus serré, ce qui permet de le reconnaître facilement jusqu'au moment de la division. Dans d'autres plantes, telles que la Fritillaire, la Tulipe, etc., le noyau mâle devient finalement semblable sous tous les rapports au noyau femelle et ne peut en être distingué.

Quel que soit le degré d'aplatissement des noyaux sexuels l'un contre l'autre, on aperçoit toujours entre leurs charpentes chromatiques une ligne de démarcation formée par leurs membranes d'enveloppe. Pendant que le noyau mâle revêt les caractères de l'état de repos, aucun changement ne se manifeste dans le noyau femelle, même lorsque la prophase de la division a commencé dans chacun d'eux, et elle a lieu simultanément dans l'un et dans l'autre; les membranes nucléaires sont encore visibles; les éléments chromatiques ne se mélangent pas de l'un à l'autre; les nucléoles se résorbent sans se fusionner (fig. 19). A ce moment, on peut encore reconnaître l'origine double du noyau de l'œuf.

Bientôt les enveloppes nucléaires disparaissent; mais on retrouve à la périphérie des deux groupes chromatiques du noyau mâle et du noyau femelle le contour primitif de ces noyaux (fig. 20). Les segments chromatiques apparaissent libres et distincts dans chacun d'eux, sans qu'on puisse encore les compter.

Après s'être raccourcis et par conséquent épaissis en se contractant, les segments s'orientent pour former une plaque nucléaire unique, en même temps qu'apparaît un fuseau achromatique dirigé parallèlement au grand axe de l'œuf (fig. 21 et 22). Dès lors il est possible, surtout en comprimant avec précaution la plaque nucléaire pour en écarter les éléments, d'apprécier exactement le nombre des segments chromatiques, lequel, dans le *Lis*, est de vingt-quatre. Jusqu'ici, ce fait important n'avait pas encore été constaté directement chez les plantes.

Comme il a été prouvé antérieurement que le noyau mâle et le noyau femelle renfermaient chacun douze segments, il en résulte que la fécondation se produit avec un apport égal de part et d'autre. En outre, quand la plaque nucléaire est formée, on ne remarque ni dans la longueur, ni dans l'épaisseur, ni dans le pouvoir chromatique des segments, aucune différence qui permette de distinguer ceux qui proviennent du noyau mâle de ceux qui dérivent du noyau femelle. Il importe peu, d'ailleurs, que leur disposition varie et qu'ils soient ou non répartis symétriquement et à nombre

égal de chaque côté du plan équatorial, puisque les deux moitiés ou segments secondaires, nés par dédoublement longitudinal d'un segment primaire, se rendent toujours, en sens inverse, chacun à l'un des pôles du fuseau pour y former les deux nouveaux noyaux (fig. 23).



Fig. 22. — Fuseau nucléaire de l'œuf, avec sa plaque composée de vingt-quatre segments chromatiques. — Cross. : 750.

Fig. 23. — Séparation des moitiés de chaque segment chromatique; transport de ces moitiés vers les pôles. — Cross. : 750.

Ainsi se produit la division du noyau de l'œuf. Les deux premiers noyaux embryonnaires posséderont chacun vingt-quatre segments chromatiques. Après l'arrivée de ces derniers aux pôles du fuseau, une cloison cellulosique se forme à l'équateur de la figure,

sur le trajet des fils achromatiques; l'embryon comprend alors deux cellules superposées et inégales, l'inférieure étant la plus petite. Dans les divisions ultérieures, tout au moins quand l'embryon est jeune, on compte aussi vingt-quatre segments dans les noyaux des tissus embryonnaires (fig. 24).




Fig. 24. — Embryon bicellulaire, offrant ses deux premiers noyaux en division, à deux stades différents. — Cross. : 750.

Pendant que ces phénomènes s'accomplissent dans le sac embryonnaire au moment de la fécondation, le noyau secondaire du sac, destiné à former l'albumen, se divise dès que le noyau mâle pénètre dans l'ootophère, par conséquent bien avant le noyau de l'œuf lui-même (fig. 18). Cette division immédiate s'explique facilement par ce fait, que les deux noyaux polaires, dont l'union a produit

le noyau secondaire du sac, sont l'un et l'autre dans un état comparable lors de la pénétration du noyau mâle dans l'oosphère; ils n'ont donc pas besoin, comme ce dernier, de revêtir les caractères morphologiques de l'état de repos, puisqu'ils les possédaient tous deux au moment de leur union. Ils peuvent par conséquent entrer en division dès que se fait sentir l'impulsion spéciale occasionnée par l'arrivée du noyau mâle dans l'appareil sexuel femelle.

Un autre fait à noter pour les noyaux de l'albume consiste dans la variation du nombre de leurs segments chromatiques; ce qui pouvait être prévu, si l'on se rappelle la différence caractéristique qui se manifeste dans le sac embryonnaire, avant la constitution de l'appareil sexuel, entre les noyaux de cet appareil et ceux dont le rôle sera accessoire ou nul dans la fécondation. Les premiers noyaux de l'albume peuvent posséder jusqu'à quarante-huit segments chromatiques; plus tard, le nombre diminue, tout en restant supérieur à celui qu'on rencontre dans les tissus de l'ovule et des autres organes de la plante.

IV

Bien que le nombre des plantes favorables à l'étude détaillée de la structure et du mode d'union des éléments sexuels soit assez restreint, j'ai pu néanmoins constater dans divers cas des faits entièrement comparables à ceux que j'ai observés chez le *Lis Martagon*. Il est donc permis de formuler, sur l'ensemble des phénomènes morphologiques de la fécondation, les conclusions suivantes :

1. Dans une plante donnée, les deux noyaux sexuels mâle et femelle renferment un nombre d'éléments chromatiques égal et fixe. Pour l'organe mâle, cette fixité existe et se maintient à partir des cellules mères du pollen; pour l'organe femelle, elle apparaît dans le noyau primaire du sac embryonnaire. Comme elle n'a été rencontrée dans aucun tissu purement végétatif, on ne peut lui refuser une grande importance. Des résultats analogues ont été fournis par les recherches faites au même point de vue chez les animaux. Cette fixité a pour but de faire la part égale à chacun des noyaux sexuels dans la transmission des propriétés héréditaires. On peut concevoir d'ailleurs que si cette égalité venait à faire défaut et si la mère, par exemple, avait une influence plus grande que le père, on arriverait ainsi jusqu'à la parthénogenèse.

Comment et à quel moment s'établit la fixité en question, par exemple dans le *Lis*, où les noyaux du jeune embryon possèdent chacun vingt-quatre segments chromatiques, tandis que les noyaux sexuels en ont seulement douze? C'est un point qui n'est pas encore complètement élucidé, mais dont la solution ne se fera sans doute pas longtemps

attendre. Mes observations m'autorisent déjà à dire que la réduction du nombre des éléments chromatiques n'a pas lieu d'un seul coup.

2. Le mode de formation des noyaux sexuels est le même que celui des noyaux végétatifs; il a lieu suivant la marche normale de la division indirecte, par dédoublement longitudinal des segments chromatiques.

De ses observations sur l'*Ascaris megalocephala*, M. Ed. Van Beneden a conclu que les noyaux sexuels ne sont que des demi-noyaux, la formation des globules polaires chez les animaux, ayant pour but le rejet de la moitié femelle d'un noyau hermaphrodite, quand il s'agit du pronucléus mâle, et celui de la moitié mâle, quand il s'agit du pronucléus femelle. Mais cette assertion ne repose, comme divers auteurs l'ont montré, que sur des erreurs d'observation. On a constaté, en effet, que les globules polaires et le pronucléus se forment avec dédoublement longitudinal des segments chromatiques des noyaux qui leur donnent naissance; ils ont par conséquent, à l'origine, la même constitution. Les globules polaires éliminés ne représentent donc pas, soit la partie mâle, soit la partie femelle du noyau dont ils dérivent.

Les détails qui ont été donnés précédemment sur la différenciation des noyaux végétatifs et générateurs dans le pollen, différenciation comparable à celle qu'on observe au cours de la formation du pronucléus mâle des animaux, prouvent de même que ces noyaux sont d'abord équivalents. La transmission, à l'enfant, de propriétés d'ancêtres femelles par le père et de propriétés d'ancêtres mâles par la mère, suffirait, d'ailleurs, à défaut d'autres arguments, à montrer que les noyaux sexuels n'expulsent pas, pendant leur différenciation, l'un ses éléments femelles, l'autre ses éléments mâles.

3. L'accrolement des noyaux sexuels dans l'oosphère a été constaté dans tous les cas observés jusqu'à ce jour chez les plantes. Le noyau mâle doit revêtir d'abord les caractères de l'état de repos et devenir entièrement comparable sous ce rapport au noyau femelle, avant les premiers indices de la division dans l'œuf. Il n'y a ni soudure, ni fusion des segments chromatiques du noyau mâle avec ceux du noyau femelle après la résorption des membranes nucléaires; seules les substances nucléaires non figurées et le produit de résorption des nucléoles se fusionnent ou se mélangent quand les membranes ont disparu: c'est à cela que se réduit la copulation ou la conjugaison des noyaux sexuels. Mais si ce phénomène a lieu tardivement chez le *Lis* et quelques autres plantes, alors que la division a déjà commencé à se manifester dans les noyaux, il peut aussi se produire plus ou moins longtemps avant l'entrée en division. Ce dernier

cas est même assez fréquent; on observe aussi, parfois, une fusion des nucléoles, précédant leur résorption. Ces variations, on le conçoit, n'ont pas d'importance.

Dans l'*Ascaris*, souvent les deux pronucléus mâle et femelle entrent en division dans le protoplasme de l'œuf sans s'être préalablement accolés, puis leurs segments chromatiques se réunissent en une plaque nucléaire unique. On en a conclu que la conjugaison des noyaux n'est pas nécessaire dans la fécondation. Mais on peut dire que, dans ce cas, la conjugaison, réduite au mélange des substances nucléaires solubles, n'en a pas moins lieu dans le protoplasme de l'œuf.

Quelle est la cause qui détermine la division dans l'œuf après la fécondation? Il est certain que la pénétration du noyau mâle dans la cellule femelle exerce sur cette dernière une action spéciale, qui se manifeste, chez les animaux, par l'apparition dans le protoplasme de deux « sphères attractives », lesquelles se disposent dans l'œuf de façon à occuper les deux pôles du fuseau nucléaire en voie de formation. Ces sphères attractives n'interviennent pas dans la constitution des noyaux des cellules embryonnaires; elles persistent à côté d'eux, en tant que portions différenciées du protoplasme, à tous les moments de la vie cellulaire; leur division précède toujours celle du noyau. Elles n'existent pas dans l'œuf animal avant la pénétration du noyau mâle. Tout récemment, leur origine restée douteuse a été rapportée par M. Vejdowski, à la suite de ses observations sur le *Rynchelmis*, au spermatozoïde et non au protoplasme de l'œuf. En entrant dans l'œuf, le noyau spermatique serait accompagné d'une substance hyaline protoplasmique, représentant la queue du spermatozoïde: ce protoplasme serait destiné à fournir les sphères attractives et à présider en quelque sorte à la division de l'œuf.

C'est en vain qu'on a cherché jusqu'ici quelque chose de semblable chez les plantes. Les manifestations du protoplasme y sont beaucoup moins caractérisées que chez les animaux; on n'a encore pu reconnaître la présence de sphères attractives dans aucune cellule embryonnaire ou autre. D'ailleurs, comme il paraît établi que le noyau mâle n'est pas accompagné dans l'œuf par son protoplasme propre, il devient difficile de chercher l'explication de la division dans l'apport d'un élément protoplasmique effectué par ce noyau. Il est rationnel de penser que la division du noyau de l'œuf n'a pas d'autre cause que celle qui détermine la division du noyau secondaire du sac embryonnaire, au moment de la formation de l'albumen. Dans ce dernier cas, le phénomène ne peut évidemment pas être attribué à l'action d'une subs-

tance figurée apportée par le tube pollinique. Si l'impulsion nouvelle, produite par l'entrée du noyau mâle dans l'oosphère, peut agir à distance de l'appareil sexuel sur le protoplasme du sac embryonnaire et provoquer la division du noyau secondaire, on conçoit à plus forte raison qu'elle s'exerce de même sur le contenu de l'oosphère fécondée.

A mon avis, cette action est de même ordre que celle qu'exerce la pollinisation sur la formation des embryons adventifs et sur le développement des ovules chez les Orchidées. Chez certaines Phanérogames, dites à tort parthénogénétiques, la germination du pollen et la pénétration du tube pollinique dans le micropyle ovulaire peuvent déterminer, à distance, le développement des cellules épidermiques du nucelle situées au voisinage ou au contact du sac embryonnaire, mais en dehors de lui, et tout à fait indépendantes de l'appareil sexuel femelle. Ces cellules donnent ainsi naissance à des embryons adventifs, multiples, dont l'origine est donc toute différente de celle de l'embryon normal. De même, chez les Orchidées, la germination du pollen sur le stigmate et la pénétration des tubes polliniques dans l'ovaire sont nécessaires, soit pour provoquer la naissance des ovules qui, dans diverses espèces, n'ont pas encore commencé à se former au moment où le stigmate reçoit le pollen, soit pour permettre aux ovules, dans d'autres cas, de continuer leur développement toujours incomplet au moment de la floraison. Si la pollinisation n'a pas lieu et si les tubes polliniques ne s'introduisent pas dans la cavité ovarienne, les ovules ne naissent pas ou n'arrivent pas à leur accroissement complet. J'ai constaté expérimentalement que dans certaines espèces d'Orchidées exotiques le laps de temps qui est nécessaire, à partir de la pollinisation, pour que l'ovule soit apte à être fécondé, atteint parfois cinq ou six mois.

En résumé, le fait important mis en lumière par les observations récentes sur la fécondation consiste dans le rôle capital du noyau, dont les éléments chromatiques nous apparaissent comme le support des caractères et des propriétés héréditaires. Comment ces caractères se conservent-ils et se modifient-ils plus ou moins à travers l'évolution de l'individu, pour être transmis à ses descendants? C'est une question qu'on ne saurait aborder dans ce rapide aperçu. D'ailleurs si l'on est parvenu aujourd'hui à soulever un coin du voile épais qui nous cachait la nature du phénomène de l'hérédité, les théories auxquelles elle peut donner lieu laissent encore un champ très vaste à l'hypothèse.

Léon Guignard,

Professeur
à l'École supérieure de Pharmacie de Paris.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Comberousse (Ch. de), *Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. — Cours d'algèbre supérieure, seconde partie, deuxième édition, refondue et augmentée; un volume in-8°. Gauthier-Villars et fils, Paris 1890.*

Le cours de Mathématiques que publie M. de Comberousse à l'usage des candidats à l'Ecole Centrale, à l'Ecole Polytechnique ou à l'Ecole Normale, comprend six volumes; le premier est relatif à l'Arithmétique et à l'Algèbre élémentaire, le second à la Géométrie et à la Trigonométrie; le troisième, dont la seconde édition a paru en 1887, donne en Algèbre supérieure, les déterminants, les fonctions continues, l'Analyse combinatoire, les séries et les dérivées; le quatrième enfin, dont la deuxième édition vient d'être publiée, contient les imaginaires et la théorie des équations.

L'ouvrage se terminera par deux volumes sur la Géométrie analytique, la Géométrie descriptive et la Géométrie supérieure.

Le volume d'Algèbre supérieure récemment paru présente les qualités qui ont fait le succès des ouvrages de M. de Comberousse; il ne renferme, ni dans les résultats obtenus, ni même dans le mode d'exposition aucun fait nouveau, mais comme livre d'enseignement, il est clair, bien ordonné et capable de rendre aux candidats de réels services.

L. O.

Thurston (R.-H.), *directeur du Sibley College Cornell University, Ithaca (N. Y.), ancien président de la Société des Ingénieurs américains. — Théorie expérimentale et analytique de Hirn et Dwelshauvers sur la machine à vapeur. Discours prononcé au dernier meeting de l'Association américaine des Ingénieurs américains, Opuscule in-8°, 1890.*

Dans un remarquable article qui a paru ici même, il y a peu de temps (1), M. Dwelshauvers-Dery, le savant professeur de mécanique appliquée de l'Université de Liège, a fait connaître la part considérable, on pourrait dire prépondérante, que G. A. Hirn et les ingénieurs formés à son école ont prise dans les progrès réalisés pendant les trente-cinq dernières années, par la science de la machine à vapeur.

Il a montré que, reprenant la question où l'avaient laissée les études théoriques de Carnot, de Clausius et de Rankine sur les moteurs thermiques, l'illustre chef de l'école alsacienne a fait faire à cette science un pas immense, en soumettant à l'expérience l'évolution de l'énergie thermique dans la machine à vapeur et en établissant ce qu'il a appelé la *théorie pratique*, théorie qui constitue la philosophie expérimentale définitive de ce moteur.

Mais ce que la modestie de M. Dwelshauvers ne lui a pas permis de dire, c'est que si cette théorie, d'abord méconnue et plus tard combattue par certains ingénieurs et même par des hommes de la valeur de Zeuner, est aujourd'hui universellement acceptée, si elle a conquis son droit de cité dans l'enseignement de tous les pays, si elle est même sur le point d'entrer dans la pratique des ateliers en fournissant au constructeur une base logique pour ses calculs et ses essais, on le doit en grande partie aux travaux de M. Dwelshauvers lui-même, à l'expression nette, concise, lumineuse qu'il a su lui donner, en la fixant dans quelques équations

d'une admirable simplicité, abordables même à ceux qui n'ont pas fait une étude approfondie des mathématiques.

Ce rôle de M. Dwelshauvers a été mis en lumière d'une façon éclatante dans un mémoire que M. Thurston, le professeur bien connu de Sibley College à Ithaca (N. Y.), a présenté au dernier meeting de l'Association américaine des ingénieurs mécaniciens. L'historien si compétent de la machine à vapeur établit d'abord que Hirn, en créant la théorie expérimentale de la machine à vapeur, a étudié l'évolution de l'énergie thermique pour un cycle entier et a recherché la valeur globale de chacune des trois parties entre lesquelles elle se décompose : le travail extérieur, la chaleur perdue par l'influence des parois et enfin celle qui disparaît par d'autres causes.

M. Thurston ajoute que M. Dwelshauvers a divisé le cycle en quatre phases qu'il étudie chacune à part : l'admission, la détente, l'émission, la compression. C'est un progrès nouveau, un progrès important et qui est, d'une façon incontestable, entièrement l'œuvre de M. Dwelshauvers. Certes, Hirn a conçu le premier et expliqué la théorie expérimentale de la machine à vapeur; mais la théorie algébriquement formulée, telle qu'elle est solidement établie aujourd'hui, est due à M. Dwelshauvers-Dery.

Dans différents mémoires qu'il a publiés depuis 1880 à la *Revue universelle des Mines*, de Liège, dans le *Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse*, dans les *Bulletins de la Société des Ingénieurs civils de Londres* et dans le *journal Engineering*, M. Dwelshauvers a analysé les transformations de la chaleur dans chacune des quatre phases d'un coup double du piston et a traduit ces phénomènes en six équations permettant d'établir nettement les conditions qui distinguent la machine réelle de la machine idéale étudiée par Carnot, Clausius et Rankine. Il a su tirer de ces équations des conclusions importantes au point de vue de l'efficacité de l'enveloppe, du calcul du condenseur, de l'effet des grandes vitesses, de celui de la surchauffe et du réchauffement extérieur du cylindre. Il a complété ses recherches par l'institution d'une méthode graphique permettant d'exprimer d'une manière frappante les résultats économiques obtenus par l'application de ces divers perfectionnements.

C'est donc à bon droit que M. Thurston, associant le nom de M. Dwelshauvers à celui du regretté chef de l'Ecole alsacienne, a intitulé, son mémoire : *Théorie expérimentale et analytique de Hirn et Dwelshauvers sur la machine à vapeur*. C'est en effet sous ce titre qu'a été présenté ce travail d'un haut intérêt pour tous ceux qui s'intéressent aux progrès de la machine à vapeur, ce facteur si important de la civilisation moderne.

H. HUBERT.

2^{re} Sciences physiques.

Chassy (A.). — *Sur un nouveau transport électrique des sels dissous. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris le 27 mai 1890.*

Le mémoire de M. Chassy est court, mais il renferme un résultat important. Quand on électrolyse une dissolution saline, la concentration du liquide varie peu à peu autour des électrodes; ce fait souvent étudié est connu sous le nom de transport des ions. Si, au lieu d'un seul sel, on prend un mélange de plusieurs tels que l'un d'entre eux ne soit pas en proportion suffisante pour subir un commencement de décomposition, on

(1) *Revue générale des Sciences pures et appliquées* n° 5, 15 mars 1890.

constate que la teneur du liquide en sel non décomposé varie autour des deux électrodes. C'est là un phénomène nouveau, découvert par M. Chassy et qui peut être considéré comme un transport du sel lui-même, à travers le liquide, sans séparation de ses parties constitutives.

L'étude de ce transport pour les sels non décomposés, que l'auteur appelle non électrolysés, lui permet d'analyser, comme on ne pouvait le faire antérieurement, le phénomène du transport des ions lui-même; il démontre que ce phénomène doit être considéré comme la superposition du transport qui a lieu dans les sels non électrolysés et d'un autre, que l'on peut avec Hittorf regarder comme le produit d'un transport séparé de chacun des ions, animés de vitesses différentes, ou avec M. Bouty comme le résultat de la séparation des ions en parties équivalentes aux deux électrodes, jointe à un transport du sel lui-même sans séparation de ses parties.

M. Chassy établit des formules simples pour le transport des sels métalliques; il montre qu'un composé quelconque est caractérisé dans ces formules par une constante indépendante des autres composés en présence; cette constante est très sensiblement proportionnelle au poids moléculaire. Il étudie comment varie le transport d'un corps par l'adjonction d'un corps conducteur dans la dissolution du premier; le transport est alors diminué, et tout corps n'ayant aucune influence sur le transport d'un sel n'est lui-même pas transporté.

Quand l'analyse devient impuissante à décider dans un mélange de sel celui ou ceux qui sont électrolysés, l'étude du transport permettra désormais de résoudre la question.

Lucien POINCARÉ.

Poincaré (Lucien). — Recherches sur les électrolytes fondus. *Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Paris le 25 juin 1890.*

L'étude des phénomènes électriques qui se produisent dans les sels métalliques fondus présente un intérêt tout particulier: l'absence de tout dissolvant donne à la constitution des électrolytes fondus un caractère de simplicité extrême, et de leur étude on est en droit d'attendre des résultats importants sur la nature de l'électrolyse et le mécanisme de la production de l'électricité par les actions chimiques. M. Lucien Poincaré qui avait déjà publié en collaboration avec M. Bouty un mémoire « sur la conductibilité électrique des sels fondus (1) » a poursuivi ses recherches sur ces corps. Il s'est occupé dans la première partie de son travail, des phénomènes qui se passent au sein de l'électrolyte, lui-même, c'est-à-dire de la mesure des conductibilités; et, dans une seconde partie, des phénomènes qui se passent au contact des électrodes et de l'électrolyte, c'est-à-dire de la polarisation des électrodes et des piles thermo-électriques ou hydro-électriques que l'on peut constituer avec des sels fondus.

La méthode ingénieuse employée précédemment par MM. Bouty et Poincaré pour mesurer la conductibilité d'un sel fondu ne s'appliquerait pas aux températures élevées. M. Poincaré emploie plusieurs méthodes: nous décrirons seulement l'un des procédés dont il a fait le plus fréquent usage. Il s'agit de prendre au sein même de la masse en fusion une portion déterminée et d'en mesurer la résistance électrique; cette masse, environnée de toute part d'un bain de même nature, pourra être considérée comme à une température uniforme. Dans un creuset en terre, plein de sel fondu, plonge un tube vertical en porcelaine fermé à sa partie inférieure par une plaque métallique percée d'un trou et attachée à un fil qui communique à l'un des pôles de la pile et qui est isolé

par des tubes en terre réfractaire; dans l'intérieur du tube, à quelques centimètres au-dessus du fond se trouve une seconde lame attachée à l'autre pôle de la pile. Une électrode parasite également isolée aboutit vis-à-vis du trou de la lame inférieure; la seconde électrode parasite isolée de la première lame et du fil qui lui est attaché au moyen d'un second tube, aboutit vis-à-vis du trou dont cette lame est percée. On mesure ainsi la résistance d'une colonne cylindrique de liquide. Pour avoir la valeur absolue de cette résistance, on fait une expérience de comparaison, en remplissant l'appareil d'une dissolution connue, par exemple, de la solution normale à 1 équivalent par litre de chlorure de potassium, dont la résistance spécifique a été déterminée par M. Bouty. Les électrodes principales et parasites sont toujours en argent; c'est l'application d'une remarque faite par M. Poincaré, à savoir que les électrodes en argent ne se polarisent pas dans un sel auquel on a ajouté une trace d'un sel d'argent. La méthode permet d'opérer jusqu'aux environs de 1000°.

L'auteur établit ainsi que la conductibilité croît à peu près linéairement avec la température et que le produit du coefficient de variation par la densité est sensiblement le même pour tous les sels. Si on considère la conductibilité moléculaire, on trouve, en comparant un sel de potassium et un sel de sodium, que le rapport de leurs conductibilités moléculaires est indépendant de la nature de l'acide. Entre les chlorure, bromure et iodure d'un même métal existe aussi une relation simple; à égale distance du point de fusion, ces trois sels ont même conductibilité moléculaire. Abordant l'étude des mélanges de sels, M. Poincaré montre que, tant qu'il n'y a pas action chimique, la conductibilité peut se calculer par une formule de moyenne; s'il y a écart entre le calcul et l'observation, c'est qu'il y a réaction, et c'est là un moyen qui peut être très précieux, ainsi que l'auteur le met en évidence par quelques exemples simples, pour l'étude des réactions chimiques qui se produisent entre corps fondus.

L'étude de la polarisation des électrodes métalliques en présence des sels fondus a fourni à M. Poincaré un des résultats les plus originaux de son travail. Si l'on prend un sel décomposable par élévation de température, un chlorate ou un azotate par exemple, on constate que la polarisation des électrodes de métaux non attaqués par ce sel tombe à zéro quand on atteint la température de décomposition. L'interprétation de ce fait ne peut être que très hypothétique: si l'on admet pourtant que le maximum de polarisation est l'équivalent de l'énergie dépensée dans la réaction électrolytique, n'y a-t-il pas lieu de supposer que l'élévation de température décompose spontanément NaAzO_3 en ses deux ions Na et AzO_3 ? Si l'on recueille d'autres produits, c'est qu'ils sont dus aux réactions secondaires du sodium sur l'azotate; la chaleur produirait ainsi une dissociation analogue à celle qui existe dans une dissolution très étendue d'après les idées d'Arrhénius. Quoi qu'on puisse penser de cette explication, il est certain que tout essai de théorie fondé sur l'identification de la dissociation thermique et de la dissociation électrolytique devra tenir grand compte du fait important découvert par M. Poincaré.

Au contact d'une électrode métallique et d'un électrolyte fondu, existe une force thermo-électrique, et dans tous les cas étudiés, la force électro-motrice d'un couple formé du même métal et d'un électrolyte fondu est sensiblement égale à la force électro-motrice d'un couple formé du même métal et d'une solution saturée de l'électrolyte ou du métal et de l'électrolyte solide, la différence de température aux deux soudures étant supposée la même dans les deux cas.

En plongeant dans un sel fondu des métaux différents, on constitue une pile voltaïque. On pouvait se demander si à ces températures élevées, la chaleur intervenait d'une manière spéciale comme source d'énergie, ou si au contraire les couples ainsi formés obéissaient aux lois établies pour les piles hydro-élec-

(1) *Annales de chimie et de physique*, 6^e série t. XVII, 1889.

triques ordinaires. M. Poincaré a établi, par l'étude de quelques couples, que les diverses conséquences de la théorie de Helmholtz, notamment le théorème de M. Lippmann sur l'application de la loi de Wüestyn aux couples indépendants de la température, sont parfaitement vérifiées dans le cas des piles à électrolytes fondus.

En résumé, les électrolytes fondus donnent lieu pour la première fois à des recherches systématiques. M. Lucien Poincaré a nettement tracé les grandes lignes de cette étude. Il a donné des méthodes expérimentales d'une application très générale. L'intérêt que présentent les résultats déjà obtenus fera naître, sans doute, de nouvelles recherches dans cette voie.

Bernard BRUNES.

Hospitalier (E.). — Traité élémentaire de l'énergie électrique, tome I, 608 p., 253 fig.; Paris, Masson, 1890.

Si nous avions à présenter M. Hospitalier à nos lecteurs, nous ne saurions le mieux faire qu'en citant l'épigraphie de son *Traité* : *J'appelle un chat un chat*. C'est, en effet, l'effort constant de M. Hospitalier de nommer chaque chose par son nom, et, pour ainsi dire, d'introduire dans la science électrique une bonne administration. Cette préoccupation perce en chaque point de son ouvrage, où l'auteur a cherché avant tout la rigueur absolue du langage. Une note de la dernière page, par exemple, engage le lecteur à rectifier une in-correcture répétée, dans laquelle le quotient de deux quantités de natures diverses est nommé *rapport*. Ce dernier terme ne doit s'appliquer, selon M. Hospitalier, qu'au quotient de deux quantités de même nature. Le péché était sans doute véniel, mais il faut savoir gré à l'auteur d'appuyer en toute occasion sur la correction du langage et de la notation, à laquelle on n'attribue pas toujours assez d'importance.

Le traité de M. Hospitalier est pseudo-élémentaire, en ce sens qu'il peut être compris sans préparation mathématique spéciale. Si nous devons le critiquer, ce serait précisément parce que, en maints endroits, des formules intercalées dans le texte s'y trouvent comme une sorte de hors-d'œuvre, sans démonstration suffisante, comme simple renseignement; cette manière de faire donne à un traité l'aspect un peu inférieur du formulaire. Hâtons-nous de racheter cette critique en indiquant sommairement les grandes qualités de l'ouvrage de M. Hospitalier. Préparé, par un enseignement pratique de plusieurs années et par la direction d'un journal d'électricité, nul peut-être ne pouvait mieux que lui réunir la connaissance solide des éléments à celle de la technique électrique moderne. Le premier volume, qui forme la partie scientifique de l'ouvrage, est conçu dans un sens absolument pratique, et nous pouvons espérer que le second sera fait avec toute la rigueur à laquelle l'auteur nous a habitués.

Dans l'ordonnance même de l'ouvrage, l'ordre scientifique, celui qui fait découler logiquement les phénomènes les uns des autres, a été plusieurs fois sacrifié à celui qui mène plus directement à la connaissance des méthodes pratiques; la simple énumération de quelques chapitres le montrera suffisamment. L'introduction traite du système C. G. S., et des méthodes de mesure; puis un court chapitre est consacré au magnétisme, afin que l'on puisse comprendre le mode d'action des aimants, l'emploi du galvanomètre, et surtout les unités magnétiques et électro-magnétiques. Les chapitres II et III donnent des notions générales sur l'électrostatique, le courant électrique et le système électro-magnétique C. G. S. Les trois suivants traitent des *résistances*, des *intensités* et des *potentiels*, et ainsi de suite; dans le chapitre XVIII et dernier sont reléguées des questions sans doute très importantes au point de vue théorique, palpitantes même à l'heure

qu'il est, telle que la théorie électromagnétique de la lumière, les phénomènes électrocapillaires, etc., mais dont on n'a pas encore pu tirer grand-chose dans l'industrie. On le voit, l'ouvrage de M. Hospitalier auquel nous aurions voulu pouvoir consacrer une notice plus étendue, est destiné avant tout aux techniciens, qui pourront y puiser des notions très saines et absolument modernes sur la science électrique; il rendra aussi de grands services aux hommes de science pure, par la quantité prodigieuse de renseignements qu'il contient. Il n'est pas un instrument de mesure qui n'y soit décrit, avec une figure à l'appui, pas un phénomène quelque peu important qui n'y soit mentionné. Les formules pratiques s'y trouvent toutes prêtes, avec leurs constantes numériques, de telle sorte qu'en les employant, le lecteur attentif arrivera droit au but, et sans avoir à faire les recherches et les réflexions fastidieuses que nécessite souvent l'application de la formule la plus simple, dans laquelle les unités de mesure ne sont pas suffisamment indiquées.

L'impression qui reste de la lecture de cet ouvrage, c'est qu'il n'est pas une phrase qui n'ait été pour ainsi dire sentie, pas une indication qui n'ait été pratiquée par l'auteur; il peut paraître un peu trop étiqueté pour la lecture courante; mais la recherche des renseignements, facilitée encore par un index détaillé, est d'autant plus commode.

Ch. Ed. GUILLAUME.

Oechsner de Coninck. — Nouvelles recherches sur les bases de la série pyridique et de la série quinoïque. Un vol. in-8° de 128 pages. Paris, G. Masson, éditeur, 1890.

Cette brochure fait suite aux recherches exposées par l'auteur dans sa thèse inaugurale; elle est divisée en trois parties :

Dans la première, il étudie les réactions générales des bases pyridiques et quinoïques. C'est tout d'abord la réaction d'Anderson (action de l'eau bouillante sur les chloroplatinates) : cette réaction permet d'établir une différence entre les bases pyridiques de provenances diverses; le sel modifié s'obtient presque instantanément avec les bases pyridiques dérivées de la brucine et de la cinchonine; dans les mêmes conditions les bases du goudron de houille ne subissent la transformation qu'au bout d'un quart d'heure environ et celles de l'huile de Dippel qu'au bout de plusieurs heures. Les sels des bases quinoïques résistent à l'action même prolongée de l'eau bouillante. L'action des iodures alcooliques sur les bases pyridiques conduit aux mêmes conclusions : la rapidité de la combinaison décroît quand on passe des bases dérivées de la cinchonine à celles du goudron de houille et de l'huile de Dippel. Cette première partie se termine par une étude de la polymérisation des bases pyridiques sous l'influence du sodium.

Dans la deuxième, où il est traité de l'oxydation des bases pyridiques, l'auteur établit la constitution de quelques bases de cette série ainsi que celle de deux acides qui en dérivent, l'acide homonicoïanique et l'acide cinchoméronique : ceux-ci se rattachent à la pyridine de la même manière que les acides toluïque et phthalique à la benzène; puis il passe aux hydrides pyridiques et quinoïques et examine les rapports qu'ils présentent avec les alcaloïdes proprement dits.

La troisième partie est consacrée à l'exposé des caractères fondamentaux des bases pyridiques, quinoïques et de leurs hydrides; elle se termine par une application de ces réactions à la recherche analytique des alcaloïdes volatils de ces diverses séries.

C'est en résumé un travail intéressant qui pourra être utilement consulté par ceux qui s'occupent des séries pyridique, hydropyridique et quinoïque ainsi que des plomaines.

H. GAUTIER.

3^e Sciences naturelles.

Rivière (E.). — Grotte de la Combe ou des Deux-Goules (Alpes-Maritimes). Association française pour l'avancement des sciences, Congrès de Paris, 1889.

La grotte fouillée par M. Rivière se trouve dans le canton de Saint-Valier-de-Thiery, arrondissement de Grasse (Alpes-Maritimes). Elle était restée complètement inconnue jusqu'à présent. On pénétre par une double ouverture, d'abord dans un vestibule où l'on ne trouve rien; mais plus loin sont deux salles dans l'une desquelles M. Rivière a recueilli les squelettes de *Cervus elaphus*, de cheval et de chèvre. Rarement on avait trouvé de squelettes aussi complets de ces animaux. La grotte ne paraît pas avoir jamais été habitée par l'homme.

J. DENIKER.

Hamilton Acton. L'assimilation du carbone par les plantes vertes en partant de certains composés organiques. — *Proceedings of the Royal Society*, Janvier, 1890.

On admet généralement aujourd'hui que les plantes s'assimilent les éléments de l'eau et de l'acide carbonique pour former un glucose; mais la nature des changements intermédiaires est encore incertaine. La théorie qui admet la formation d'aldéhyde formique $\text{H}\cdot\text{COH}$, et la polymérisation de cette aldéhyde, n'a pas reçu de preuve expérimentale. Wæhner a même montré que les plantes ne s'assimilent pas le carbone de l'aldéhyde formique non plus que celui de l'aldéhyde acétique ou du trioxyméthylène.

M. Acton a recherché si les plantes pouvaient s'assimiler le carbone des divers composés, entre autres l'acroléine et des composés analogues; ces corps présentent un intérêt spécial, depuis que Fischer et Tafel ont réalisé la synthèse d'un véritable glucose (l'acrose) en partant de l'acroléine. (1)

Le mode expérimental employé était le suivant. La plante, privée d'amidon par culture dans l'obscurité ou dans une atmosphère dénuée carbonique, était cultivée dans une dissolution contenant tous les éléments nécessaires sauf le carbone. On reconstruit le tout d'une cloche dans laquelle l'air circulait librement; mais il n'y avait pas trace d'acide carbonique. Ce gaz était constamment absorbé par de la potasse. De plus la solution de culture contenait un léger excès d'acétate de baryum pour éliminer au fur et à mesure de sa formation l'acide carbonique provenant de la respiration de la plante. Dans ces conditions on faisait agir la substance organique essayée, à l'état de solution diluée soit sur les racines, soit sur les feuilles, soit sur l'extrémité d'une branche coupée, et l'on recherchait au bout d'un certain temps s'il y avait ou formation d'amidon et par suite assimilation de carbone.

Les expériences ont donné des résultats négatifs avec l'acroléine, l'acroléine-ammoniacale, les composés sulfonés de l'acroléine, l'alcool allylique, etc... On n'a obtenu de formation d'amidon qu'en mettant au contour des feuilles ou des racines des solutions de glucose, de glycérine, de saccharine et d'inuline: L'empois d'amidon a donné une assimilation par les racines et non par les feuilles.

M. Acton conclut de ses expériences que les plantes vertes ne peuvent normalement assimiler le carbone de substances autres que des hydrates de carbone; que, puisque ni les feuilles ni les racines ne peuvent absorber le carbone de l'aldéhyde formique, acrylique, de l'alcool allylique, etc... il est difficile de décider si un produit aldéhydique ou acétonique se forme comme intermédiaire entre l'acide carbonique et l'eau d'une part, le glucose ou l'amidon d'autre part. Mais si un tel produit prend naissance, il doit être polymérisé par la

plante, dans des conditions spéciales, au moment même de sa formation.

Georges CHARPY.

Gabritchevsky (Dr G.) de Moscou. — Sur les propriétés chimiotactiques des Leucocytes, *Annales de l'Institut Pasteur*, 25 juin 1890.

Les cellules libres de l'économie semblent se comporter dans ce que Claude Bernard appelait le *milieu interne* (sang, lymph, etc.) à la manière des animaux tout à fait inférieurs dans les infusions. L'indépendance relative dont elles semblent jouir suggère la pensée qu'elles dérivent de Protistes captés par les organismes plus complexes et progressivement adaptés à la vie symbiotique avec les éléments fixes du corps. Quoi qu'il advienne de cette hypothèse, conforme au système de l'Évolution, il est légitime d'appliquer à l'étude des cellules libres les procédés qui ont déjà réussi à éclairer la physiologie des animaux inférieurs.

Guidé par cette idée, M. Gabritchevsky vient de faire sur les leucocytes de plusieurs Vertébrés (Grenouille, Axolotl, Lapin) des observations d'un haut intérêt. Depuis quelques années on sait que beaucoup de Bactéries (Engelmann, 1881), plusieurs Myxomycètes (Stahl, 1884; de Bary, 1884), les organes reproducteurs mobiles de diverses algues (Pfeffer, 1886; Rosen, 1890), quantité de végétaux unicellulaires manifestent leur sensibilité à l'égard de certains agents chimiques en se dirigeant vers eux (*Chimiotaxie positive*) ou en les fuyant (*Chimiotaxie négative*). Cette action toute spécifique varie de grandeur et de sens, pour une même substance chimique, avec la nature des organismes mis en expérience. Chose curieuse, les organismes sont pour la plupart susceptibles de s'habituer à certains liquides qu'ils évitaient au début (Massart et Bordet).

Semblable phénomène existe-t-il aussi chez les Leucocytes? Ceux-ci, dans le cas des maladies infectieuses suivies de guérison, s'accumulent autour des bactéries, les englobent dans leur masse et finalement les détruisent par une sorte de digestion. Peut-on expliquer cette migration vers les microbes envahisseurs par une réaction chimiotactique? Les recherches de M. Gabritchevsky apprennent quelque lumière à ce problème abordé par plusieurs savants depuis quelques mois.

Sous la peau de grenouilles introduisons, avec M. Peckelharing (1889), des tampons d'ouate imbibés les uns de liquides non ensemencés, les autres de culture de charbon. Quelques heures après, les tampons imprégnés de bactéries renferment beaucoup plus de leucocytes que la ouate imbibée de bouillon stérile. Avec MM. J. Massart et Ch. Bordet (février 1890) remplaçons ces tampons d'ouate par des tubes capillaires ouverts à un bout et contenant: les uns, du bouillon stérile; certains, des cultures bactériennes vivantes faites en semblable bouillon; d'autres enfin, ces mêmes cultures stérilisées. Les leucocytes pénétreront en petit nombre dans les tubes de la première série, en abondance dans ceux de la seconde et de la troisième. D'où il faut conclure que certains microbes dégagent une substance qui attire les leucocytes.

M. Gabritchevsky a varié ces expériences. Il a fait usage de tubes très allongés (15 à 20 millimètres), dont il ne plaçait sous la peau que le bout ouvert. Il les enfonçait dans la queue de têtards et d'Axolotls immobilisés par la curare, ou dans les oreilles d'un Lapin. Au bout de vingt-quatre heures il comptait les leucocytes. Leur nombre dépendait des solutions employées. Ceux des animaux précités fuient en général les poisons protoplasmiques tels que chlorure de sodium, acide lactique, alcool, quinine, se montrent indifférents à l'eau distillée, aux doses faibles de phénol, antipyrine, peptone, au bouillon, mais recherchent avidement les excréments microbiens, si l'on en excepte celles du choléra des poules. Les tubes qui contiennent les substances attractives se remplissent de telles quantités de leucocytes qu'il s'y produit de véritables

(1) Voyez à ce sujet l'article de M. Maquenne sur la *Synthèse des sucres* dans la Revue du 30 mars 1890, page 165.

embolies pyohémiques. La pénétration de ces globules y est pourtant toute spontanée : on ne saurait l'attribuer à un transport passif par des courants dus à la diffusion des matières dissoutes, car il suffit d'augmenter la concentration de ces substances pour enrayner l'immigration.

D'après M. Gabritchewsky, c'est uniquement par leurs excréments que les bactéries semblent révéler leur présence aux leucocytes : ces produits séparés des microbes par filtration, se montrent en effet aussi actifs que le sont les cultures elles-mêmes. On peut objecter à cette conclusion que l'inoculation de certaines poudres excitantes sous la peau y détermine une abondante accumulation de leucocytes. Mais peut-être est-ce à la suite de changements chimiques provoqués par ces matières dans les tissus. Même s'il en était autrement, il demeurerait établi que les poisons solubles des bactéries exercent sur les leucocytes une action souvent attractive. Remarquons toutefois que cette action doit varier suivant les espèces. En général elle est plus énergique chez le Lapin que chez la Grenouille. Il serait fort intéressant d'instituer à ce sujet de nombreuses expériences et de comparer sous ce rapport les animaux à sang chaud aux Vertébrés à sang froid. Indépendamment d'ailleurs des modifications que la température peut apporter aux propriétés des leucocytes, il faut s'attendre à les voir varier aussi d'une espèce à l'autre parmi les animaux de la même classe, puisque plusieurs de ces animaux réagissent très différemment à l'inoculation du même microbe.

Les recherches que nous venons de résumer sont, comme on le voit, très importantes. Elles expliquent un phénomène jusqu'alors resté mystérieux : le premier stade de la phagocytose, marqué par l'accumulation des leucocytes autour des microbes envahisseurs.

L. O.

4° Sciences médicales.

Péan, Chirurgien de l'Hôpital Saint-Louis. — Leçons de clinique chirurgicale. T. VII, Paris, Alcan, 1890.

Ce volume continue la série des leçons faites par M. Péan à l'hôpital Saint-Louis. On y trouve les observations des malades traités dans son service pendant les années 1885 et 1886, un certain nombre de cliniques et un tableau général des gastrotomies faites par ce chirurgien du 1^{er} janvier au 31 décembre 1887. Nous ne dirons rien des observations réunies dans ce volumineux travail, non plus que des considérations qui les accompagnent; les unes et les autres manquent un peu de la précision que l'on recherche en général dans les travaux scientifiques; mais nous attirerons l'attention sur une série de leçons exposant la pratique du morcellement et l'emploi judicieux de la forcepsure au cours des opérations.

Certes beaucoup ont fait du morcellement; M. Péan les blâme d'oublier de le citer; c'est qu'on fait souvent du morcellement, un peu comme M. Jourdain de la prose, sans le savoir. Il n'en persiste pas moins un fait indiscutable, c'est que celui qui a vulgarisé l'emploi méthodique de la forcepsure, qui a multiplié les modèles de pincées à arrêt, qui a montré l'utilité qu'il y avait souvent à attaquer les grandes tumeurs d'emblée par leur partie centrale beaucoup moins vasculaire que la périphérie, est sans conteste M. Péan.

A ce titre le volume, dont nous annonçons aujourd'hui l'apparition, est digne d'intérêt, car il contient, réunis en quelques leçons, les principes généraux du morcellement. De nombreuses figures montrent en outre, les divers modèles de pincées qu'a fait construire M. Péan et leur emploi dans les extirpations diverses d'organes ou de tumeurs.

D^r HARTMANN.

Guyon, Chirurgien de l'Hôpital Necker. — Diagnostic précoce des tumeurs malignes du rein. *Annales des maladies des organes génito-urinaires*, juin 1890, t. VIII, p. 329.

Le nombre des interventions chirurgicales dans les cancers du rein est aujourd'hui assez grand, et la question tranchée dans le sens de l'opération. Malheureusement, si les résultats opératoires immédiats sont excellents, les résultats tardifs sont des plus médiocres; cela tient à ce que le plus souvent l'opération est pratiquée à une époque trop avancée de l'évolution de la maladie. Aussi est-il très important de faire un diagnostic précoce afin de pouvoir, par une intervention rapide, obtenir la guérison radicale.

Un des premiers symptômes est le plus souvent l'hématurie, qui serait encore plus fréquente qu'on ne le croit, si l'on faisait l'examen microscopique des urines, les hématies pouvant y exister, mais en quantité insuffisante pour déterminer une coloration appréciable à la vue. Les douleurs font rarement défaut; elles sont tenaces, durables et siègent à la région lombaire, s'irradiant quelque peu dans l'hypocondre; lors de la descente d'un caillot, on observe chez quelques malades tous les signes de la colique néphrétique. Grâce à ces différents symptômes et, en particulier par l'étude méthodique de l'hématurie, on arrive à faire le diagnostic d'hématurie rénale néoplasique. Malheureusement la difficulté que l'on éprouve à constater directement par le palper la tumeur, fait que l'on reste quelquefois hésitant sur le côté affecté. L'examen endoscopique de la vessie ne donne que des renseignements insuffisants sur les écoulements urétraux et de plus est loin d'être exempt de gravité, car trop souvent c'est le point de départ d'accidents infectieux. Aussi, se guidant sur le siège de la douleur, doit-on, dans la région lombaire, faire une incision exploratrice qui deviendra curatrice, lorsqu'ayant constaté par la vue et le palper l'existence d'un néoplasme, on procédera à son ablation.

D^r HARTMANN.

Kelsch et Vaillard. — Tumeurs lymphadéniques multiples avec leucémie. Constatation d'un microbe dans le sang pendant la vie, et dans les tumeurs enlevées aussitôt après la mort. *Annales de l'Institut Pasteur*, 25 mai 1890.

On cherche beaucoup à l'heure actuelle le microbe des tumeurs malignes; quelques faits ont pu faire espérer la solution du problème. MM. Kelsch et Vaillard rapportent à ce sujet le cas d'un jeune soldat atteint de leucémie avec lymphadénomes multiples, dans le sang duquel ils ont trouvé pendant la vie un microbe qu'ils ont cultivé, et qu'ils ont retrouvé dans les tumeurs après la mort. Pour pouvoir apporter une lumière quelconque à la bactériologie de la leucémie, ainsi que les auteurs en expriment l'espoir, il faudrait que leur observation fût toute autre. D'abord, sauf au moment de l'admission du malade, il n'est pas question de l'état de la température, et cependant une plaie suppure *abondamment*, il y a de la céphalalgie : à quel moment ont débuté les accidents infectieux? L'impression générale qu'on recueille à la lecture de l'observation, quand on n'est pas suggestionné par une idée arrêtée, c'est que l'on a été en présence d'un malade leucémique dont l'une des tumeurs s'est ulcérée; par cette porte d'entrée, une septicémie quelconque a pénétré l'organisme affaibli et débilité, terrain tout préparé pour son évolution. L'expérience chez les animaux démontre d'ailleurs qu'on a affaire à un micro-organisme donnant une maladie infectieuse septicémique sans lésion caractéristique. MM. Kelsch et Vaillard auraient pu réfuter l'hypothèse d'une infection accidentelle, qui était au moins possible, étant donnée l'ulcération d'une des tumeurs. Ils auraient dû démontrer la présence du microbe avant l'ulcération des tumeurs. Il y a encore loin de ce fait à la démonstration de l'origine microbienne de la lymphadénie.

D^r H. DUBIEF.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 23 juin 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. F. Boussinesq** : Théorie du régime permanent graduellement varié qui se produit près de l'entrée évasée d'un tuyau de conduite, où les filets fluides n'ont pas encore acquis leurs inégalités normales de vitesse. — **M. Ch. Lallemant**, Les opérations géodésiques anciennes indiquaient des différences assez notables entre les niveaux moyens de la mer sur les différents points des côtes d'Europe; les opérations les plus récentes réduisent ces écarts à fort peu de chose; le niveau moyen de la mer pourrait donc servir de base uniforme pour le nivellement des différents pays. — **MM. G. Rayet, Picart et Courty** : Observations de la Comète Brooks (19 mars 1890) faites au grand équatorial de l'observatoire de Bordeaux. — **M. Charlois** : Éléments et éphémérides de la nouvelle planète ⁽²⁹³⁾ découverte à l'observatoire de Nice, le 20 mai 1890. — **M. Janssen** annonce que **M. de la Baume**, envoyé à Candie pour observer l'éclipse de soleil du 17 juin, a pu obtenir des photographies de l'anneau et de son spectre. Il rappelle à ce propos l'intérêt de ces observations pour déterminer la présence de l'oxygène dans le soleil et l'existence d'une atmosphère lunaire. — **MM. Perrotin, Gonnessiat, Trepied, Trouvelot**, adressent les observations de l'éclipse du 16-17 juin, qu'ils ont faites respectivement à Nice, Lyon, Alger et Meudon. — Après des comparaisons minutieuses, **M. Huggins** est en mesure d'affirmer que la raie brillante du spectre de la nébuleuse d'Orion se confond pas avec la première annulaire de la bande brillante du spectre du magnésium brûlant dans l'air; il a étudié aussi le spectre photographique de cette nébuleuse. — **M. G. Trouvé** décrit un dynamomètre universel à lecture directe du travail; cet appareil est composé de deux parties distinctes, dont l'une mesure le couple et l'autre la vitesse.

2^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. H. Faye** montre comment les phénomènes observés par les navigateurs dans les cyclones se rapportent au schéma général des tempêtes qu'il a donné dans la séance précédente. — **M. A. Ditté** a étudié l'action réciproque des sels halogènes, alcalins et mercuriels, dont le type est la décomposition du calomel par le sel marin en sel mercuriel soluble et mercure métallique. Il n'examine aujourd'hui à ce point de vue que les sels de potassium. Ces réactions sont endothermiques; elles s'expliquent par un commencement de décomposition que l'eau fait subir aux sels mercuriels. — **M. L. Ouvrard** décrit quelques phosphates de lithine, de glucine, de plomb et d'urane obtenus suivant sa méthode (dissolution d'oxydes métalliques dans les phosphates alcalins en fusion). — **M. G. Geisenheimer** a constaté que le chlorure double d'iridium et de phosphore, décrit par lui, se combine avec le chlorure d'arsenic. — **M. Guntz** a obtenu le sous-fluorure d'argent par l'électrolyse du fluorure d'argent en solution saturée; il l'a ensuite obtenu par l'action à chaud de l'argent métallique sur le fluorure d'argent. — **M. Echsner de Coninck** étudie les propriétés de la ptomaine pyridique en $C^{10}H^{14}$ Az qu'il a signalée en 1888.

3^{re} SCIENCES NATURELLES. — **M. R. Léprieux** et **J. Barral** ont vérifié, directement *in vitro* la destruction du glucose par le sang ou mieux le chyle d'un chien normal; ce pouvoir glycolytique n'existe pas chez les chiens reus-

diabétiques par l'extirpation du pancréas ou par l'absorption de phloridzine. — **M. de Lacaze-Duthiers** entretient l'Académie des travaux et des progrès du laboratoire Arago en 1890. Il signale particulièrement les services que rendront à la Zoologie les grands bacs du laboratoire, où les animaux s'acclimatent parfaitement. La station aurait le plus grand besoin d'une chaloupe à vapeur, les conditions locales rendant insuffisantes les embarcations à voiles. — **M. Prouho** a pu, en observant des *Asterias glacialis* bien acclimatées dans les aquariums de ce laboratoire, déterminer les conditions anatomiques et physiologiques de l'olfaction chez ces animaux. Le sens de l'odorat est localisé dans des tubes ambulacraires spéciaux situés en arrière de la plaque ocellaire; la principale voie nerveuse de transmission des impressions est le nerf ambulacraire. — **MM. A. F. Marion et F. Guitel** signalent la dispersion le long de la côte méditerranéenne au sud de l'embouchure de l'Aude, des Saumons *quinat* ensemencés dans cette rivière. — **M. A. Rommier** obtient pure la levure la plus résistante d'un moût donné, en faisant des ensemencements successifs sur des échantillons stérilisés de ce moût, puis dans de l'eau sucrée minéralisée. — **M. C. Timiriazeff** démontre de la façon suivante que ce sont les rayons du spectre absorbés par la chlorophylle qui réduisent l'acide carbonique: une feuille atteignant à la plante, privée d'amidon par le séjour à l'obscurité, reçoit le spectre solaire; au bout de quelques heures elle est lavée à l'alcool puis traitée par l'iode; l'amidon bleu reproduit exactement les bandes d'absorption de la chlorophylle. — **M. A. Lacaze** a fait l'étude lithologique de la collection de roches de la Guadeloupe recueillies par Ch. Sainte-Claire Deville: ce sont des roches trachytiques, andésites et labradorite. — **M. J. Thoulet** démontre par des expériences de laboratoire que l'oxygène diffuse assez rapidement dans l'eau de haut en bas, même quand les couches supérieures sont plus chaudes; de petits fragments solides tombant dans le liquide entraînent de l'oxygène jusqu'au fond du vase. L'auteur explique par ces faits la présence de l'oxygène et de la vie dans les profondeurs marines sans qu'on ait besoin d'admettre un grand cycle circulaire allant de l'équateur aux pôles et réciproquement.

Séance du 30 juin 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. A. de Caligny** : Sur l'application aux grandes chutes de l'écluse de navigation à colonnes liquides oscillantes, et sur un moyen d'employer le tube oscillant automatique, sans qu'il s'arrête quand la chute motrice est notablement augmentée. — **M. Janssen** donne lecture d'une lettre de **M. de la Baume-Pluvine** qui indique les détails de son observation sur l'éclipse partielle de soleil du 17 juin, à la Candie (Candie). — **M. W. Huggins** a trouvé sur une photographie du spectre de Sirius, dans l'ultraviolet, au delà des raies de l'hydrogène, six raies obscures qui vont de λ 3338 à λ 3199.

2^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. E. Bouty** a étudié le résidu des condensateurs à mica; des résultats qu'il a obtenus, il conclut que ces appareils peuvent donner une grande précision, si on les soumet à une étude méthodique et si on les emploie suivant des règles fixes, ainsi qu'on le fait aujourd'hui pour les thermomètres à mercure, par exemple. — Ajoutant à une solution donnée d'acide malique des quantités croissantes de tungstates alcalins, **M. D. Gernez** observe dans le pouvoir rotatoire du mélange des variations positives

ou négatives suivant les proportions. Comme il l'avait déjà fait pour les molybdates, il tire de ces faits des indications sur les combinaisons des tungstates avec l'acide malique. — En faisant passer du chlorure de titane sur du silicium, du bore, d'autres métaux encore, chauffés au rouge blanc à l'abri de l'air et de l'humidité, M. Lucien Lévy obtient des cristaux caractéristiques, qu'il considère comme formés de titane à peu près pur. — M. A. Lacroix : Caractères cristallographiques et optiques du pyroxène obtenu dans l'eau surchauffée. — En chauffant au rouge blanc un mélange en proportions définies de silice et d'alumine, M. W. Vernadsky a reproduit la sillimanite cristallisée. Les cristaux de sillimanite se retrouvent dans toutes les argiles fortement chauffées; les cristaux de la porcelaine, s'ils ne sont pas de la sillimanite en sont très voisins. — M. Henri Lasne a constaté que la composition de divers phosphates sédimentaires est identique à celle de l'apatite; les différences signalées tenaient à des erreurs dans le dosage du fluor.

3° SCIENCES NATURELLES. — M. A. Muntz a constaté que le ferment nitrique joue un rôle important dans la désagrégation des roches; il est répandu dans toutes les roches, quelquefois à une grande profondeur; dans les roches nues des montagnes, il est à peu près le seul agent biologique de désagrégation. — M. Louis Roule Sur le développement du blastoderme chez les Crustacés isopodes (*Porcellio scaber*). — M. de Lacaze-Duthiers annonce qu'il a commencé des essais d'ostéoculture à Roscoff, et que les premiers résultats sont excellents. — M. G. Sayn décrit la faune d'ammonites pyriteuses barrémiennes du Djebel-Ouach, province de Constantine. — M. Lannelongue fait sur la craniectomie une communication qui fait l'objet de son article page 393 de cette Revue. M. Verneuil appelle l'attention de l'Académie sur l'intérêt pratique de cette opération hardie.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 24 juin 1890.

M. Duploux fait une communication sur l'opération de la hernie ombilicale étranglée qui depuis l'antisepsie n'a donné que 18 % de décès, à propos de deux cas de kélotomie avec recherche de cure radicale, suivie de guérison. — Rapport de M. Guéniot sur l'observation de M. Thévard de la laparotomie pour arrachement total de l'intérus, concluant à une simple déchirure de la partie antérieure de la paroi utérine, la confusion étant du reste fort admissible. — Rapport de M. Cornil sur le travail de MM. Babès et Marinesco portant sur la morphologie et la pathologie des terminaisons nerveuses intra-musculaires, duquel il résulte qu'il existe une grande analogie au point de vue des modifications histologiques des faisceaux musculaires entre les lésions causées par les microbes et celles qui résultent d'autres causes comme dans les myopathies primitives d'origine médullaire ou nerveuse. — M. François Franck communique les résultats de ses expériences sur la chloroformisation à l'état sain et pathologique. Les réflexes cardio-pulmonaires dus à l'irritation des premières voies par les vapeurs de chloroforme, consistant en spasmes du larynx, des petites bronches, des vaisseaux pulmonaires, en atonie et dilatation parfois irréparable du cœur, sont graves en dehors de toute lésion cardiaque ou pulmonaire. Les accidents sont surtout graves quand il y a de la myocardite, insuffisance tricuspidienne, insuffisance aortique; les lésions mitrales sans myocardite ne semblent pas les aggraver. Les spasmes respiratoires peuvent amener la mort quand il y a des lésions pleuro-pulmonaires étendues. Pour parer à ces accidents, il faut atténuer l'excitabi-

lité nerveuse centrale; la morphine est dangereuse; — atténuer l'activité des nerfs d'arrêt du cœur, les doses nécessaires d'atropine seraient toxiques; — atténuer la sensibilité périphérique, la cocaïne est le seul moyen qui puisse rendre des services sans exposer à des accidents. — M. Lagneau communique la première partie d'un travail sur les mesures propres à rendre moins faible l'accroissement de la population en France.

Séance du 1^{er} juillet 1890.

Rapport de M. Rochard sur un travail de M. Bertrand relatif à la valeur diagnostique des frotements hépatiques dans les abcès du foie, et à l'origine microbienne des hépatites suppurées; chez les dysentériques les micro-organismes pénétreraient au niveau des ulcérations intestinales, et seraient transportés consécutivement dans le foie. — M. Panas fait une communication sur l'emploi du thermo-cautère pour remplacer l'électro-cautère; le thermo-cautère pouvant s'appliquer à toutes les opérations où il est nécessaire d'employer un instrument élevé à une haute température. — M. Ledouble lit un travail sur certaines anomalies musculaires, en particulier un muscle pré-sternal qu'il aurait rencontré 95 fois sur 623 sujets, et sur une anomalie de la crosse de l'aorte. — M. François Franck traite des dangers de la chloroformisation pendant la période d'absorption et des moyens de les conjurer.

D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 28 juin 1890.

MM. Quinquand et Fournioux indiquent un procédé de préparation de l'aristol qui donne un produit de composition constante. Leurs recherches physiologiques leur ont montré que ce corps est très peu toxique, qu'il s'élimine lentement par les urines, enfin qu'il rend des services comme antiseptique, principalement dans les ulcères et les tumeurs cancéreuses ulcérées. — M. E. Gley a observé des arrêts du cœur, qui ont duré plusieurs minutes jusqu'à un quart d'heure, et ont été suivis de la reprise des battements rythmiques, dans les circonstances suivantes : 1° chez des grenouilles auxquelles on avait injecté du sulfure d'allyle; 2° chez des chiens nouveau-nés, après faradisation directe du ventricule. — M. Brown-Séquard, rappelant que les lésions de la lèvre sont attribuées à des altérations de la moelle, pense que l'action favorable exercée sur ces lésions par l'injection de suc testiculaire s'explique par la dynamogénie des parties de la moelle restées saines, qui viendraient suppléer celles altérées. Il apprend qu'on a obtenu chez les femmes des effets d'invigoration par l'injection de suc ovarique. — M. F. Houssay a étudié l'ordre d'apparition des fentes branchiales chez l'*Acrolott*. Le phénomène est plus complexe qu'on ne l'admettait; il existe une fente branchiale auditive transitoire, la fente hyoïde n'apparaissant qu'en dernier lieu, après disparition de cette fente auditive. — M. R. Blanchard signale une anomalie nouvelle des organes génitaux chez le *Tania saginata*. — M. Bazy, à propos des communications récentes de M. Tuffier, rappelle que bien avant les recherches de cet auteur, M. Guyon et plusieurs chirurgiens de ses élèves avaient fait voir que le contact de l'urine n'empêche pas la cicatrisation des plaies, même par première intention. M. Bazy tient à faire remarquer que, sur ce point, c'est la clinique qui a résolu le problème sans le secours de l'expérimentation. — MM. Dastre et Laborde, sans vouloir entrer dans la discussion de priorité, font remarquer que seule l'expérimentation peut fixer d'une manière précise le déterminisme d'un fait clinique.

Séance du 3 juillet 1890.

M. Déjerine indique les différences qui séparent la maladie de Morvan de la syringomyélie. — M. Black conclut des recherches physiologiques qu'il a faites sur les composés d'arsenic et de thallium, que la loi des actions toïques ne doit pas être recherchée dans les affinités chimiques des substances considérées, mais bien dans le mode de vibration moléculaire de ces substances tel que le révèle l'analyse spectrale. — M. Laveran a repris l'étude des hématozoaires des oiseaux que divers auteurs ont signalés comme identiques à ceux du paludisme. Après les avoir cherchés en vain sur divers oiseaux, M. Laveran les a trouvés chez le geai. Ses recherches le portent à croire qu'il s'agit là d'une espèce voisine, mais distincte. C'est ce que confirme l'expérience suivante : le sang d'un paludique injecté à un geai exempt de parasites n'a pas fait apparaître ceux-ci chez le sujet. — M. Laguesse a reconnu l'existence du pancréas et de la rate chez le *Protopterus* (Dipnéus) que l'on croyait privé de ces organes. Ceux-ci sont compris l'un et l'autre dans l'épaisseur des tunique intestinales. Il est curieux de retrouver là chez un adulte une phase embryonnaire des Sélaciens. — M. Schmidt a étudié les composés du chloral avec l'antipyrine au point de vue physiologique et thérapeutique. D'une façon générale, leur action se confond avec celle du chloral; le pouvoir toxique du chloral est augmenté par l'addition de l'antipyrine. Le mono-chloral-antipyrine offre quelques avantages thérapeutiques. — M. Blocq, par l'histoire de quelques cas, fait voir que des manifestations morbides à peu près semblables reconnaissent comme cause tantôt des myélites, tantôt des polynévrites. — MM. Charrin et Gamaleïa présentent deux lapins dont l'oreille a été frottée à l'huile de croton; l'un d'eux avait reçu préalablement une injection des produits solubles du bacille pyocyanique; l'inflammation locale est bien moindre chez lui que chez l'autre. La papaine ne possède à aucun degré cette propriété antiplogistique. — M. Onanoff, sur la nature des faisceaux neuro-musculaires. — M. Tuffier achève l'étude de l'action de l'union normale sur les tissus; plus tard il compte faire l'étude de l'action des urines pathologiques, et c'est là qu'il aura à tenir compte des résultats de la chirurgie clinique. Dans les places vésicales non suturées, la pente des substances se recouvre d'une fausse membrane sous laquelle s'effectue la réparation. — M. R. Blanchard décrit des tumeurs volumineuses et irrégulières qu'il a observées sur la queue d'un lézard vert; ces tumeurs étaient produites par des conidies; cultivées sur diverses substances, elles ont germé et ont reproduit un mycélium analogue à celui des *Fusarium*.

L. LAPICQUE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 4 juillet 1890.

M. Gouré de Villemonté fait une communication sur la différence de potentiel au contact d'un métal et d'un liquide ou de deux liquides. Ces différences sont fort petites; il est malaisé de les déterminer avec précision. Pour avoir, par exemple, la différence de potentiel entre un métal Met et un liquide L, l'auteur a surtout employé la méthode suivante : une lame du métal M est reliée à un plateau formé de même métal, d'un condensateur dont la seconde armature est sur sol; la lame plonge dans le liquide L qui s'écoule en se séparant en gouttelettes, par la pointe d'un entonnoir de verre, au travers d'un tube en métal, ce tube peut être porté à un potentiel connu d ; le liquide acquiert ce potentiel par le jeu de l'écoulement. Si l'on constate que le plateau n'est pas chargé d'électricité, on connaît la différence de potentiel cherchée qui est égale et de signe contraire à d . Pour obtenir des résultats

concordants, il est nécessaire d'opérer sur des métaux n'ayant subi aucun travail industriel et préparés par voie galvanoplastique; les liquides doivent être des dissolutions non filtrées, mais décantées; les valeurs ainsi trouvées sont parfaitement définies et constantes dans les conditions indiquées. En faisant la somme des différences de potentiel directement mesurées à tous les contacts d'un élément voltaïque, on trouve bien la force électromotrice de la pile. — M. G. Trouvé présente un dynamomètre universel à lecture directe du travail dont nous rendrons compte prochainement.

LUCIEN POINCARÉ.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 12 juin 1890.

1^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. et Mme Huggins présentent une note sur la re-détermination de la raie principale du spectre de la nébuleuse d'Orion et sur le caractère de cette raie. Une nouvelle série d'observations a montré que la longueur d'onde de la principale raie de la nébuleuse est de 5004.73. On a pu aussi constater : 1^o que la raie principale ne coïncide pas avec la région terminale de la bande de la flamme du magnésium, mais tombe dans cette région; 2^o que dans la nébuleuse d'Orion cette raie n'a pas l'apparence d'une bande, ils présentent également une note sur le spectre photographique de la grande nébuleuse d'Orion. Ils ont obtenu deux photographies qui offrent nettement les raies de l'hydrogène en H et h (ces raies ne se retrouvent pas dans les photographies anciennes du Dr Huggins). Les deux premières raies de l'ultra-violet décrites pour les étoiles blanches en 1879 (*Philosophical Transactions* 1880, p. 669) se retrouvent aussi sur les clichés, la raie α en λ 3887.8, bien marquée, et la raie B en λ 3834.5 plus faible. Outre les raies de l'hydrogène A et B, il y a une raie plus marquée que la raie α elle-même, qui a une longueur d'onde d'environ λ 3868. La raie très nette à laquelle le Dr Huggins avait attribué en 1882 une longueur d'onde de 3790, se retrouve dans les photographies et il semble qu'il faille la placer entre λ 3725 et λ 3726. Une raie très bien marquée et beaucoup d'autres plus faibles se retrouvent du côté le moins réfrangible de a . Il faut rappeler que le Professeur Lockyer a obtenu une photographie de ces raies en février dernier et communiqué ses observations à la Société royale (*Revue générale des sciences*, n^o 5, p. 134). M. et Mme Huggins présentent aussi une note sur un nouveau groupe de raies découvertes dans le spectre photographique de Sirius. Les longueurs d'onde des nouvelles raies ont été déterminées comme suit : 3338, 3311, 3278, 3254, 3226, 3199. — Le professeur J. Norman Lockyer présente une note sur les spectres de la comète α 1890 et de la nébuleuse G. C. 4058. Dans un mémoire communiqué à la Société royale en janvier 1889, il avait montré que le spectre de la nébuleuse d'Andromède a les caractères d'un spectre de comète, *i. e.*, qu'il consiste essentiellement dans les deux bandes principales du carbone, avec une légère modification de la bande citron. Le fait a été signalé pour la première fois par M. Fowler en novembre 1888 et confirmé dans la suite de M. Tayla. Les bandes brillantes sont superposées à un spectre continu peu lumineux et échappent à l'observation, à moins que l'attention ne soit dirigée sur elles. Des observations récentes montrent qu'il existe une ressemblance frappante entre le spectre de la comète de Brooks (α 1890), celui de la nébuleuse d'Andromède et celui d'une nébuleuse voisine G. C. 4058 (R. A. 15 h. 9 24' Decl + 56° 11') comparable à celle de la partie bleue qui se trouve à la base de la flamme d'une lampe à alcool. Une comparaison directe, faite le 2 mai, a montré que les trois bandes du spectre coïncident entièrement avec celles du spectre de la flamme. La

bande qui se trouve au voisinage de λ 517 était beaucoup plus brillante que les deux autres et la bande bleue était plus brillante que la bande citron. Le spectre continu s'étend aux environs de D en λ 474. Les parties les plus brillantes de la nébuleuse du Dragon coïncident (comme le montre la comparaison directe) avec les bandes du carbone qu'on aperçoit dans le spectre de la lampe à alcool. Les trois spectres coïncidant avec un même spectre doivent coïncider entre eux; ces observations démontrent une fois de plus ce que le Professeur Lockyer avait déjà soutenu il y a deux ans, c'est-à-dire, que la constitution physique et la température des nébuleuses et des comètes sont très analogues.

2^e SCIENCES NATURELLES. — Le professeur A. P. W. Thomas présente une note préliminaire sur le développement du Taatara (*Sphenodon punctatum*). Il a fait plusieurs expéditions à Karewa, à environ 40 milles de Tamanga, dans la baie de l'Abondance (Nouvelle-Zélande) pour recueillir des spécimens de Taatara. Il a constaté que, contrairement aux assertions antérieures, il existe une différence extérieure entre les deux sexes; le mâle est beaucoup plus grand, et les arêtes qu'il a sur le cou et sur le dos sont beaucoup plus développées. Chez le mâle adulte, les arêtes avec leurs épines blanches sont très apparentes; chez la femelle, au contraire, les arêtes sont basses et les épines sont réduites à une rangée de pointes blanches le long du dos. Bien que la captivité semble nuire au pouvoir reproducteur de ces animaux, on a pu en avoir quelques œufs au bout de plusieurs mois de captivité. Les œufs sont de forme ovale (les deux bouts sont de diamètre égal), ils ont de 2,5 à 3,25 centimètres de long. La coquille est dure, flexible et très élastique; elle contient une quantité variable de carbonate de chaux. Ils séchent et se vidant avec une grande facilité quand ils sont exposés à l'air, aussi faut-il les maintenir à l'humidité. — Le Dr Félix Simon présente une note sur la position des cordes vocales chez l'homme pendant la respiration tranquille et la trouble réflexe de leurs muscles abducteurs. Voici quelles sont ses conclusions: 1^o La glotte est plus largement ouverte chez l'homme pendant la respiration tranquille (expiration et inspiration) qu'après la mort ou qu'après la section des nerfs laryngés, vagues et récurrents. 2^o Cette plus large ouverture pendant la vie est le résultat de l'activité permanente des abducteurs des cordes vocales (muscles aryénoïdes postérieurs), qui appartiennent par conséquent non point à la classe des muscles respiratoires accessoires, mais à celle des muscles régulateurs de la respiration. 3^o L'activité de ces muscles est due à l'action tonique que leurs centres reçoivent des centres respiratoires voisins dans la moelle allongée. 4^o En dépit de cette innervation de luxe, les muscles abducteurs des cordes vocales sont physiologiquement plus faibles que leurs antagonistes. 5^o Ces antagonistes n'ont rien à faire normalement avec la respiration, ils servent ordinairement à la phonation seule. Leurs fonctions respiratoires se réduisent: a) à contribuer à empêcher la pénétration de corps étrangers dans les voies aériennes; b) à aider les formes exceptionnelles d'expiration, comme le rire et la toux. — Les Drs C. G. Beevor et Victor Hasley communiquent les résultats de leurs recherches sur l'excitation électrique des centres corticaux moteurs et de la capsule interne chez l'orang-outan (*Simia satyrus*). Ils décrivent les particularités de configuration des circonvolutions de l'orang; ils ont cherché le siège de la fonction motrice dans l'écorce du macaque (barnet-monkey). — Les Drs Sidney Martin et Dawson Williams communiquent le résultat d'expériences qui montrent que le pouvoir de la bile de hâter la digestion pancréatique n'est pas limité à la digestion amylolytique, mais qu'il existe également, sinon davantage, pour la digestion protéolytique.

Richard A. GREGORY.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 20 juin 1890.

Le professeur A. W. Worthington fait une communication sur les propriétés des liquides. Il étudie la tension et l'extension d'un liquide enfermé dans un tube. On peut employer trois méthodes, la méthode du tube barométrique, la méthode centrifuge, et la méthode de refroidissement. Il convient de remplir les tubes de liquide bien privé d'air; l'auteur a pris pour cela de minutieuses précautions. Dans la méthode de refroidissement, on remplit complètement un tube de verre très résistant du liquide à étudier à une température particulière; par un léger échauffement le tube se remplit absolument, l'air, qui pouvait rester, étant dissous. On refroidit de nouveau; le liquide reste dans son état d'extension et remplit le tube, jusqu'à ce qu'un violent choc se produise et la bulle d'air reparait. D'ordinaire on calcule la tension en supposant que le coefficient d'extension est le même que le coefficient de compressibilité; l'auteur décrit un appareil permettant de mesurer simultanément la tension et l'extension sans cette hypothèse. La tension est déduite de l'élargissement d'un réservoir ellipsoïdal d'un thermomètre scellé dans le tube, et l'extension est calculée en partant du volume de la bulle après le choc. Pour la mesure de la tension on calibre le thermomètre par des pressions intérieures et on détermine la correction d'extension par le changement de volume de l'appareil. On a pu soumettre l'alcool à une tension de 17 atmosphères, et constater ainsi que le coefficient d'extension est beaucoup plus petit que celui de compressibilité. — M. C. V. Boys lit un mémoire sur la mesure des radiations électro-magnétiques qu'il a faite en collaboration avec MM. Briscoe et Watson. En novembre 1889 M. R. A. Grégory a décrit un nouvel appareil pour mesurer les radiations électriques; dès cette époque l'auteur se demandait si les effets observés pouvaient être dus à quelque autre cause que le dégagement de chaleur, et si c'était un véritable effet calorifique, il pensait qu'il pouvait être mesuré. Pour élucider la question on a employé deux méthodes. La première est fondée sur cette idée que, si deux fils fins sont placés l'un près de l'autre et agissent tous deux comme résonateurs d'un excitateur primaire, l'attraction électro-dynamique causée par les courants électriques, et la répulsion électro-statique outre les charges qu'ils portent peuvent s'ajouter pour produire les mouvements relatifs des deux fils. De considérations théoriques basées sur l'hypothèse que les courants sont harmoniques dans le temps et l'espace, les auteurs déduisent que l'effet électro-dynamique doit être prédominant dans le milieu du fil tandis que la répulsion électro-statique doit l'emporter vers les extrémités. On conçoit dès lors que l'on puisse faire concourir ces attractions et répulsions à produire un mouvement de rotation dans un résonateur convenablement disposé. Malgré l'extrême sensibilité obtenue, les expériences ont conduit à un résultat négatif. La seconde méthode repose sur l'emploi d'un thermomètre à air *dynamique* de Joule. Cet appareil consiste en un tube de verre formé d'une façon analogue au thermomètre de Leslie; si l'un des côtés est chauffé, des courants de convection circulent qui déplacent un index. On peut suspendre un miroir à cet index de façon à augmenter la sensibilité de la méthode ordinaire. Le fil double servant de résonateur est placé dans l'un des côtés; et l'on constate en excitant les oscillations une assez grande déviation. Les expériences prouvent donc bien que les effets observés par M. R. A. Grégory sont dus à l'échauffement. M. Lodge demande à cette occasion à Sir W. Thomson s'il pense que l'on peut dans le cas d'impulsions électriques se propageant dans des fils avec une vitesse comparable à celle de la lumière, considérer que les attractions et les répulsions ordinaires peuvent s'exercer. Sir W. Thomson

pense que la manière dont M. Boys envisage les choses est la plus correcte; cependant, il est bien possible qu'avec de parcelles vitesses les lois ordinaires soient modifiées, car le temps que met l'action électro-dynamique à se propager d'un fil à l'autre est comparable au temps employé par le courant lui-même à parcourir le fil. Il cite comme exemple des actions produites par les décharges rapides deux fils de cuivre qu'il a vus aplatis l'un contre l'autre après qu'ils avaient été frappés par la foudre. — M. Worthington demande s'il est possible de mesurer l'énergie de l'excitateur, et dans le cas où cela serait, si la quantité reçue par le résonateur peut être considérée comme proportionnelle à l'angle solide sous lequel il est vu de la source d'énergie. — M. Lodge répond que l'on peut arriver à une évaluation de l'énergie, mais il faudrait se garder d'appliquer le principe de proportionnalité à l'angle solide, car la présence du résonateur fait converger vers lui la plus grande partie de l'énergie. — MM. Gladstone et Hibbert présentent une batterie secondaire; ils obtiennent d'excellents résultats en ajoutant au sel de plomb qui entre dans l'accumulateur du sulfate de sodium. — M. Perry montre une règle d'un emploi facile pour calculer approximativement la self-induction d'une bobine; dans la formule qu'il donnait :


$$L = \frac{n^2 a^2 < 10^7}{4,841a + 3,1c + 3,5b}$$

où n est le nombre des spires; a , le rayon moyen des spires en centimètre; b , la longueur de l'axe; b doit être moindre que $\frac{a}{2}$.


SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 5 juin 1890.

M. Duncan : Production de cuivre métallique pur à l'état cristallisé. L'auteur recherche dans quelles limites de concentration, les sels de cuivre laissent déposer ce métal à l'état cristallin par l'action du zinc de l'aluminium ou magnésium. — MM. Bistrop Tingle : Action de l'oxalate d'éthyle sur le camphre. En présence du sodium métallique ces deux corps réagissent suivant l'équation.



M. Armstrong : Oxydation de la turpentine à la lumière solaire. — Sur la structure des carbures cycliques. — M. Leonard Doblin : Butyle mercaptan tertiaire. Ce corps est obtenu par l'action du sulfure de zinc sur l'iode du butyle tertiaire. — M. Smith : Desylacétophénone. Une solution diluée de cyanure de potassium dans l'alcool agit dans beaucoup de cas comme agent de condensation. Par exemple, par l'action de la benzoiné et de l'acétophénone dissous dans l'alcool avec un peu de cyanure de potassium, on obtient un produit de condensation la desylacétophénone.



Ce produit est facilement transformé en triphényl-furfurane triphenyl-pyrrol et triphényl-thiophène.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Séance du 7 juin 1890.

L'Académie vote l'impression au Bulletin de la réponse de M. Ronkar à la note dans laquelle le général Liagre attaquait son travail sur l'entraînement mutuel de l'écorce et du noyau terrestres en vertu du frottement intérieur, note dont il a déjà été question dans les numéros antérieurs de la Revue. Dans cette réponse, l'auteur s'est proposé de relever les objections soulevées par M. le général Liagre contre sa première note sur ce sujet. M. Ronkar fait d'abord remarquer que l'hypothèse de l'existence d'une couche fluide intermédiaire entre une écorce et un noyau solides n'est nullement nouvelle et ne repose en rien sur la nutation diurne. C'est une hypothèse géologique des plus motivées. Partant donc de là, l'auteur s'était proposé d'appliquer au globe, supposé constitué de la sorte, son théorème de mécanique sur l'influence du frottement dans les mouvements périodiques d'un système, et de rechercher quel serait l'ordre de grandeur à attribuer au coefficient de frottement intérieur dans la couche intermédiaire, pour qu'il y ait indépendance entre le noyau et l'écorce dans la nutation diurne, et dépendance dans la précession et la nutation annuelle. M. Liagre avait reproché à l'auteur de n'avoir pas fait usage des lois de Morin pour le frottement. Cette objection était due à une méprise, puisqu'on ne peut, dans les circonstances présentes, qu'avoir recours aux lois habituelles qui régissent le frottement intérieur des liquides. Comme son honorable contradicteur avait mis en doute, même dans ce cas, le théorème de mécanique exposé par M. Ronkar, celui-ci a fait remarquer que, jusqu'ici, on n'avait pas montré en quoi l'analyse pour laquelle il a établi ce théorème est en défaut. De plus il a soumis la question actuelle à une vérification expérimentale qui a parfaitement réussi. Quant aux autres objections formulées par M. le général Liagre au sujet des hypothèses faites par M. Ronkar sur l'étendue et la constitution de la couche fluide intermédiaire, l'auteur a montré qu'il n'avait utilisé ces hypothèses qu'à bon escient. — M. le marquis de Caligny (Versailles), associé de l'Académie, traite du système d'écluses dont il est l'inventeur et qui est appliqué en Belgique, sur le canal de Charleroi (Ecluses de navigation à épargne d'eau, spécialement étudiées pour les grandes chutes, et écluses en construction). Il décrit un moyen de faire arriver ou sortir l'eau par les quatre angles du sas et de faire toutes les constructions en maçonnerie. Les tubes verticaux étant fixes, à l'exception de leur partie inférieure réduite à une soupape cylindrique à double siège. L'élargissement de la partie supérieure, des tubes verticaux permet de faciliter la marche automatique. Dans la séance du 2 avril il avait déjà présenté un moyen de faciliter cette marche. Il est revenu sur la partie théorique de ce qu'il avait dit. Dans la séance du 7 décembre il avait communiqué le résultat d'une expérience sur la réalisation du calme à l'écluse de l'Aubois. Il avait donné alors quelques détails sur une des machines hydrauliques de son invention, employées par lui à faire des irrigations à Elottemanville près Valognes (Manche), pour le cas où l'on a à élever l'eau à d'assez grandes hauteurs. Dans la séance du 6 mai 1890, il a décrit des expériences nouvelles sur une autre machine hydraulique de son invention, ayant spécialement pour objet, non seulement d'élever l'eau, aussi au moyen d'une chute d'eau, mais de la conduire à d'assez grandes distances.


F. F. Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 12 juin 1890.

M. de Siemens expose sa théorie sur le système général des vents de la terre. Les résultats principaux de ses calculs et de ses réflexions sont les suivants : Tous les mouvements de l'air sont causés par des per-

turbations de l'équilibre indifférent de l'atmosphère et ont pour but de le rétablir. Ces perturbations sont produites par le surchauffement des couches les plus proches de la surface, par un refroidissement asymétrique des couches supérieures par le rayonnement et par l'accumulation de masses d'air qui trouvent des obstacles dans leur flux. Elles se compensent par des courants ascendants qui subissent une accélération proportionnelle à la diminution de la pression de l'air. Aux courants ascendants correspondent des courants descendants qui subissent une diminution analogue de leur vitesse. Si le territoire du surchauffement des couches inférieures est limité, on observe un courant ascendant local qui s'étend jusqu'aux régions les plus élevées de l'atmosphère et qui offre le phénomène d'un tourbillon composé de couches montant en spirale en dedans et descendant en spirale de même direction en dehors. Le résultat de ces tourbillons est la dissipation de l'excès de chaleur qui trouble l'équilibre adiabatique, sur toutes les couches supérieures qui participaient au mouvement tourbillonnant. Si le territoire des perturbations est très étendu, s'il comprend par exemple toute la zone chaude, les différences de température ne peuvent plus se compenser par des tourbillons locaux, mais il s'en forme qui comprennent toute l'atmosphère. Les lois du mouvement de l'air restent les mêmes. Puisque toute l'atmosphère est soumise à une rotation dont la vitesse absolue est approximativement la même pour toutes les latitudes à cause des courants méridionaux provoqués et soutenus par la chaleur, les courants méridionaux causés par le surchauffement se combinent avec les courants terrestres pour former ce système de courants qui comprend toute la terre et qui a pour but de faire participer les latitudes moyennes et supérieures à l'excès de chaleur et d'humidité des zones chaudes. Ce but est atteint par des diminutions et augmentations alternantes de la pression à la suite des perturbations de l'équilibre des couches supérieures de l'atmosphère. Les maxima et les minima de la pression de l'air sont causés par la température et la vitesse des courants d'air dans les couches supérieures de l'atmosphère. — M. Rammelberg présente un travail sur la composition chimique des tourmalines. Il confirme sa formule générale :



où l'hydrogène figure parmi les métaux monovalents, l'aluminium et le bore parmi les métaux hexavalents, par quelques analyses de tourmalines de Pierrepont, et de Windischköppl.

D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉS SAVANTES D'ODESSA

SCIENCES NATURELLES. — A la séance du 23 mai de la Société Balnéologique d'Odessa M. le D^r Broussilowsky a communiqué les résultats de ses observations sur l'influence des micro-organismes sur la formation des boues limoneuses et marécageuses. La boue employée comme traitement représente une masse noire plastique, huileuse, épaisse : étant soumise à l'action de l'air elle absorbe avidement son oxygène et présente bientôt la couleur grise. Au contraire, si cette boue grise desséchée est arrosée par de l'eau, elle redevient noire, épaisse, manifestant toutes les propriétés des boues fraîches. M. le professeur Werigo a démontré que la transformation de la boue noire en grise est un procédé d'oxydation au dépens de l'oxygène libre de l'air, phénomène rendu visible par la transformation du sulfure de fer en hydrate d'oxyde de fer ; au contraire le changement de la boue grise en noire est dû à la réduction d'hydrate d'oxyde de fer. Les recherches du D^r Broussilowsky ont démontré que ce sont quelques espèces déterminées de bactéries qui opèrent la réduction. En stérilisant la boue grise par l'exposition à 120°C pendant une demi-heure ou à l'action de liquides antiseptiques, on lui fait perdre la faculté de se réduire ; si on l'arrose ensuite d'eau stérilisée, elle reste grise comme auparavant. Mais

il suffit d'y ajouter un morceau de boue fraîche ou un peu d'eau de limon non stérilisée pour qu'elle se réduise et redevienne noire et plastique. Par conséquent le procédé de réduction se produit par la vitalité des bactéries contenues dans l'eau et dans la boue des limons. Examinant bactériologiquement l'une et l'autre, le D^r Broussilowsky a préparé les cultures de 13 espèces de bactéries dont certaines se montraient tout à fait indifférentes ; les autres réduisaient la boue plus ou moins. Ces bactéries spécifiques se montraient actives séparément et particulièrement en symbiose. On pourrait les classer en trois espèces de bâtonnets ayant beaucoup de traits morphologiques et biologiques communs ; toutes en forme de virgule, elles appartiennent au groupe de bactéries anaérobies facultatives qui peuvent vivre et se développer dans un milieu saturé de sels et sont capables d'absorber l'oxygène de ses combinaisons ; par leur vitalité elles déterminent la réduction qui se produit constamment dans la boue et se manifeste par le changement de couleur et de plasticité de la boue. Si l'on enseme dans la boue grise, desséchée et stérilisée, une culture des bactéries ci-dessus faites dans l'agar, la boue offre peu après les propriétés de la boue noire réduite. Cette réduction se produit sous l'influence d'une culture pure des bactéries encore mieux que par la boue fraîche ou par l'eau non stérilisée ; elle se fait à l'air libre (sous une couche d'eau dans des éprouvettes ordinaires fermées par de la ouate), ainsi qu'en l'absence de l'air (dans les tubes fermés de deux côtés, dont on a retiré auparavant l'air) ; dans le premier cas, au bout d'un certain temps, aux dépens de l'oxygène libre de l'air dans la boue réduite recommence de nouveau le processus d'oxydation ; dans le second cas la boue reste toujours réduite de couleur noire foncée. Ainsi nous voyons que le premier stade du processus se fait par l'intermédiaire des micro-organismes au dépens de l'oxygène des combinaisons et le second exothermique au dépens de l'oxygène libre de l'air. Dans la formation de la boue des limons prennent part les facteurs suivants : 1^o le sol qui sert de base ; 2^o l'eau du sol ou du limon ; 3^o des matières organiques et 4^o les bactéries trouvées par M. Broussilowsky. Les trois premiers éléments indiqués par le professeur Werigo constituent les matériaux primitifs dont se forment définitivement les boues des limons sous l'influence de la vitalité des bactéries.

D^r PIETRE HAESNER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 19 juin 1890.

SCIENCES PHYSIQUES. — M. Man Mandl adresse un mémoire sur l'équation générale des lentilles. — MM. O. Gressly et M. Nencki présentent un travail sur la constitution du Carboxyl-ortho-amido-phénol. — M. C. Glücksmann étudie l'oxydation des acétones par le permanganate de potasse en solution alcoolique. L'auteur a démontré antérieurement que la pinacoline donne par oxydation non seulement de l'acide triméthylacétique, mais encore de l'acide triméthylpyruvique ; l'acétophénone se comporte de même et donne, contrairement à l'opinion généralement admise, de l'acide benzoyl-formique ; C⁶H⁵ — CO — CO — OH ; Glücksmann a préparé le sel barytique de cet acide et son dérivé phénylhydrazinique. — MM. Bénédikt et Narc Bamberger ont entrepris des recherches sur une réaction quantitative du ligneux. Si l'on chauffe du bois avec de l'acide iodhydrique dans un appareil pour la détermination des méthoxyles, on obtient pour le chiffre du méthyle une valeur considérable ; comme la cellulose pure donne dans les mêmes conditions une valeur nulle, on ne saurait attribuer cette valeur qu'au ligneux exclusivement. On se trouve ainsi en possession d'un procédé d'évaluation de la quantité de ligneux ; les auteurs montrent l'importance de leur procédé pour l'étude du bois, du papier, etc.

Emil WEYN, Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Séance du 6 juillet 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Brioschi, Sur le développement en série des fonctions hyperelliptiques. — M. Padova, Extension du problème de De Saint-Venant.

2^o SCIENCES NATURELLES. — Ayant eu occasion d'examiner des feuilles de mûrier recouvertes par des taches noires, MM. Cuboni et Garbini ont reconnu au microscope que ces taches étaient produites par une destruction du tissu, due à un nombre énorme de bactéries. Dans l'air humide ces taches ont donné naissance à des colonies de diplocoques, qui se reproduisent dans la gélatine et sur les pommes de terre en formant des taches rougeâtres, et qui sont capables de communiquer l'infection à des feuilles saines de mûrier. Ces micro-organismes sont analogues à ceux que Leydig, Béchamp et Pasteur ont considérés comme la cause de la flacherie du ver à soie. En exécutant des recherches, MM. Cuboni et Garbini ont relevé que, à l'aide d'inoculations ou en donnant aux vers des feuilles de mûrier baignées avec de l'eau qui contenait le diplocoque, on voyait paraître dans le vers la flacherie, et on retrouvait les micro-organismes dans leur tube intestinal. Il est donc très probable que le diplocoque qui produit la maladie du mûrier est aussi celui qui produit la flacherie des vers à soie; MM. Cuboni et Garbini se proposent de répéter en grand nombre leurs recherches, afin d'éclairer une question qui a tant d'importance pour l'agriculture. — M. Tirelli a étudié les tissus osseux pour établir s'ils prolongements des cellules osseuses s'anastomosent entre eux, comme il arrive dans le tissu connectif de la cornée et dans le connectif compact. M. Tirelli s'est

servi de la réaction noire de Golgi, qui a été employée avec grand avantage par plusieurs expérimentateurs pour l'examen des tissus, et il a vu que dans les os du crâne de fœtus de lapin, coupés en minces lamelles et observés au microscope, les cellules présentent, d'une manière évidente, les anastomoses de leurs prolongements. — M. Magini donne la description des recherches qu'il a exécutées pour découvrir quelque nouveau caractère morphologique qui puisse faire différencier les cellules nerveuses des autres éléments cellulaires. Sur des préparations de cellules nerveuses de l'homme, du fœtus de bœuf, du lapin, du chat, de la souris blanche il a reconnu les caractères suivants : 1^o La cellule nerveuse en générale est pourvue d'un nucléole très pauvre en chromatine ou tout à fait dénué de cette substance ; 2^o tandis que la cellule motrice des mammifères (homme compris) est dépourvue, dans son nucléole, de chromatine, l'on trouve cette substance largement distribuée dans le corps cellulaire et dans ses prolongements ; 3^o la cellule nerveuse est toujours pourvue d'un nucléole, qui manque en général dans les autres éléments cellulaires, dont le nucléus pourtant contient en grand nombre les granules chromatiques ; 4^o pour ce qui est présence, forme, distribution de la chromatine dans les prolongements des cellules nerveuses, il n'y a pas moyen de distinguer les prolongements nerveux des prolongements protoplasmiques. — M. Fusari présente à l'Académie un résumé de ses nombreuses recherches sur les premiers moments de développement des Téléostéens, recherches que l'auteur a exécutées sur des œufs vivants, ou sur des préparations et des sections en séries : matériel que M. Fusaria tiré presque en totalité du *Cristiceps argentatus*.

Ernesto MANCINI.

COURRIER DE NAPLES

1. — L'Institut royal d'encouragement de Naples vient de faire paraître le dernier volume de ses Mémoires. Je me propose de vous rendre compte de ceux relatifs à l'électro-technique, dus à M. Grassi.

Il étudie, pour commencer, le rendement lumineux des lampes à incandescence dans les installations à éclairage électrique. Soient deux lampes ayant le même pouvoir éclairant, mais de rendement différent; D et D' leur durée ou vie des lampes, w et w' les énergies dépensées respectivement ; on a :

$$\frac{D}{D'} = \left(\frac{w}{w'} \right)^m$$

dans laquelle généralement $m > 2$.

Mais si l'on considère une seule lampe alimentée au moyen d'une force électro-motrice variable depuis w jusqu'à w', alors les durées D et D' de la lampe dans les deux cas sont données par l'équation

$$\frac{D}{D'} = \left(\frac{w}{w'} \right)^q$$

où q est au minimum $= 2m$ c'est-à-dire > 4 . On arrive parfois à 12 ou 13.

Si l'on nomme : f le pouvoir éclairant d'une lampe évalué en candles; D sa durée en heures; w l'énergie dépensée en watts; t la durée de l'éclairage par an; a le coût de 3600 watts; C le nombre total de candles de l'installation; k, le coefficient d'intérêt et d'amortissement; l le prix d'une lampe; la dépense s rapportée à l'unité d'intensité lumineuse (1 candle) et à une année est

$$s = \frac{lt}{fD} + \frac{awt}{f} + K \left(\frac{S_2}{C} + \frac{S_1}{f} + \frac{S_3 w}{f} \right).$$

La dépense d'installation est divisée en trois parties : la première S₀ indépendante de la puissance de l'installation et du nombre des lampes, la seconde S₁ qui dépend seulement du nombre des lampes et la troisième S₂ proportionnelle à la puissance de l'installation. M. Grassi suppose une installation de 1,000 lampes de 16 candles et cherche les conditions pour que s soit un minimum dans tous les cas qui peuvent se présenter.

M. Grassi cherche ensuite à établir le prix du courant électrique, ce qui est indispensable lorsqu'on veut passer un contrat entre le fournisseur et le consommateur.

Dans un autre mémoire, M. Grassi s'occupe de l'échauffement des conducteurs parcourus par un courant électrique. Il résume d'abord la question pour montrer que l'on n'est pas du tout d'accord sur les valeurs des coefficients d'échauffement.

On sait qu'un conducteur à section circulaire parcouru par un courant constant s'échauffe d'un nombre de degrés, au-dessus de la température de l'ambiant, proportionnel au carré de l'intensité et au coefficient de résistance et en raison inverse du cube du diamètre.

Mais c'est sur le coefficient de proportionnalité, que M. Grassi appelle coefficient d'échauffement, qu'on n'est pas fixé. Différents auteurs donnent pour ce coefficient des valeurs variant du simple au double.

M. Grassi étudie de nouveau la question et il se borne pour le moment à l'exposé de résultats obtenus par des essais préliminaires. La méthode qu'il a suivie est semblable à celle du galvanomètre différentiel pour la mesure des petites résistances. On prend un conducteur long par exemple de deux mètres et on le coupe à moitié. L'une des moitiés est étendue horizontalement et on l'a expérimentée soit à découvert, soit enveloppée, à

l'air ou bien posée sur des morceaux de planches. L'autre moitié du conducteur dont la résistance est la même a été contournée en hélice et immergée dans un calorimètre plein d'eau placé sur un fourneau à gaz. Ayant établi l'équilibre des résistances pour un courant de très faible intensité, l'on renforce le courant dont la mesure est donnée par un ampère-mètre, et l'on place le conducteur en hélice dans le calorimètre. Il est clair alors que le galvanomètre donne une déviation, car la résistance rectiligne, étant à l'air, s'échauffe davantage. On chauffe le calorimètre jusqu'à ce que le galvanomètre revienne au zéro, il est visible dès lors que le thermomètre du calorimètre marque la température que l'on cherche. La méthode est donc directe sans calculs.

M. Grassi a fait six expériences en se plaçant dans des conditions différentes. Il en résulte que les coefficients de conductibilité extérieure du cuivre et des couvertures isolantes sont beaucoup plus grands que ceux admis jusqu'à présent.

M. Grassi se réserve de discuter plus à fond sa

méthode et ses résultats lorsqu'il aura eu le loisir de continuer son étude.

2. — Dans la séance du 5 avril, M. Torelli a lu une note « sur certaines équations aux dérivées partielles ».

Les recherches de M. Torelli se rattachent à un Mémoire « sur la fonction potentielle de la Circonférence », publié dans les comptes rendus du « Circolo matematico » de Palerme et dans lequel M. Beltrani a fait connaître certaines équations aux dérivées partielles, satisfaites par les intégrales elliptiques complètes de 1^{re} et de 2^e espèces. Les équations obtenues par M. Torelli sont vérifiées par des intégrales définies, contenant trois nombres complexes dont on peut disposer à volonté, pourvu que leurs parties réelles soient positives. Il suffit d'établir entre eux deux relations convenables pour retrouver les équations mêmes de M. Beltrani et l'on a ainsi une solution plus générale que les intégrales elliptiques, puisqu'elle renferme une constante arbitraire.

FRANCESCO SINIGAGLIA,

Professeur à l'Institut Royal de Naples

CHRONIQUE


L'OBSERVATION DES ÉLÉMENTS HISTOLOGIQUES A LA TEMPÉRATURE NORMALE DE LA VIE

Le dispositif que représente la figure ci-contre a été récemment imaginé par M. le Professeur Ranvier pour observer les éléments histologiques à leur température physiologique normale. Jusqu'alors on avait, dans ce but, fait usage de *platines chauffantes*. Dans ces appareils, difficiles à manier, circule un courant d'eau chaude. La préparation ne plongeant pas dans cette eau et se trouvant entourée d'air, n'est jamais à la température qu'indique l'instrument, et il est impossible de la déterminer d'une façon suffisamment exacte. C'est pourquoi M. Ranvier a cherché à remplacer cet appareil. Son procédé (1) est à la fois beaucoup plus commode, plus rapide et plus précis. Il consiste à bien luter les préparations et à les immerger, montées sur le microscope, dans un vase de verre où circule un courant d'eau à température constante. On choisit un corps de microscope que l'eau ne puisse altérer. Un thermorégulateur, un siphon, des pinces à pression graduée, maintiennent absolument fixes la température et le débit du liquide. L'expérience se fait généralement entre 36° et 39° C. L'eau, privée d'air par une ébullition antérieure, afin de ne donner naissance à aucune bulle, s'écoule dans un cristalliseur profond. On y plonge un microscope du modèle de celui de la figure ci-jointe. L'eau doit y être en quantité telle qu'elle recouvre la préparation et baigne la partie inférieure de l'objectif sans atteindre le mécanisme de la vis micrométrique.

On emploie un objectif à immersion. Avant d'en plonger l'extrémité inférieure dans l'eau, il est utile de la chauffer légèrement, afin de dessécher la surface du verre que recouvrirait une buée opaque. À côté de l'objectif, contre la préparation, on place horizontalement un thermomètre ; puisqu'il est immergé tout près de la préparation, la température de celle-ci se confond avec celle qu'il indique.

La simplicité de ce procédé d'étude le recommande à l'attention des micrographes. On sait que nos tissus peuvent se comporter très différemment suivant la température à laquelle on les observe. Les Leucocytes, par

exemple, se montrent mobiles ou immobiles selon qu'on les examine à 37° ou sans les chauffer. Chose curieuse, si on les enferme avec un peu d'air dans une cellule de verre à bords bien lutés, on constate leur



immobilité ; mais il suffit, 24 heures après que cette préparation a été faite, de la porter à 39° dans l'appareil de M. Ranvier, pour voir quelques-uns des leucocytes les plus petits se déformer, pousser des pseudopodes et entrer en mouvement. Dans les vaisseaux des animaux ils meurent au contraire très vite, peut-être sous l'action de ptomaines cadavériques. — On voit par cet exemple combien promettent d'être fructueuses les expériences que la nouvelle méthode de M. Ranvier permet d'entreprendre. En physiologie, en microbiologie surtout elle paraît appelée à rendre les plus grands services.

L. O.

(1) C. R. Acad. Sc. 13 mars 1890.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

CHARLES GRAD

Il y a quelques mois la *Revue* enregistrait la nouvelle de la mort du savant alsacien Hirn. Aujourd'hui c'est encore un enfant de Colmar dont l'Alsace et le monde savant déplorent la perte. Charles Grad est mort dans la nuit du 2 au 3 juillet, au Logelbach, des suites d'une maladie de cœur dont il souffrait depuis quelques années. Il était dans sa quarante-huitième année.

Grad, qui représentait la circonscription de Colmar au Parlement allemand depuis 1877, était peut-être plus connu comme homme politique que comme homme de science. Mais son activité intellectuelle incomparable s'est portée sur les domaines les plus variés et dans chacun d'eux il a laissé des travaux de mérite. Il s'est occupé successivement de l'étude des glaciers, de climatologie, d'océanographie, d'hydrologie, de géologie, d'archéologie, d'économie politique.

Dès 1866 il publiait une *Esquisse physique des îles Spitzbergen et du pôle arctique*, puis vint une *Etude sur les glaciers du Groënland*. Ses voyages fréquents l'amènèrent à écrire des notes sur le Sahara algérien, l'Égypte, la Nubie. On lui doit de bonnes observations sur les glaciers des Alpes suisses, mais surtout sur les

anciens glaciers de la chaîne des Vosges. L'étude des formations glaciaires fut pendant de longues années son sujet d'études préféré, ainsi que toutes les questions de physique terrestre qui de près ou de loin s'y rattachent. Son *Essai sur le climat de l'Alsace et des Vosges* constitue maintenant encore le travail le plus complet sur cette matière.

Dans les dernières années de sa vie et surtout depuis qu'il avait embrassé la carrière politique, il s'était principalement occupé de questions économiques et sociales et là moins que jamais il ne perdait de vue dans ses études sa chère Alsace. Son beau volume *l'Alsace, le pays et ses habitants*, publié en 1888 par la maison Hachette, fut accueilli avec faveur par le public des deux côtés des Vosges et fut couronné par l'Académie française.

Depuis 1883 Grad était membre correspondant de l'Académie des Sciences morales et politiques pour la section d'Economie politique.

L'année dernière encore il avait présidé, lors de l'Exposition, le Congrès international de politique économique et sociale.

Émile HAU.

NOUVELLES

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE A BERLIN

La Compagnie berlinoise d'électricité est en train d'achever deux nouvelles usines qui lui permettront d'alimenter le soir 250,000 lampes à incandescence de 16 bougies, et, pendant le jour, quantité de machines-outils, presses, pompes, ventilateurs, etc. Depuis longtemps, la Compagnie a rompu avec le système usité presque partout ailleurs des machines à vapeur à grande vitesse commandant, à l'aide de courroies de transmission, des *dynamos* marchant quatre ou cinq fois plus vite encore, c'est-à-dire faisant de 800 à 1000 révolutions à la minute. Les transmissions sont coûteuses; elles prennent beaucoup de place, exposent le personnel à des dangers sérieux et nuisent à la régularité de la production du courant. Les deux nouvelles usines, ainsi que les agrandissements des usines plus anciennes, ne comprennent donc que d'immenses machines à vapeur verticales dont la vitesse est réduite à 85 tours à la minute et dont l'arbre est accouplé directement à l'armature de *dynamos* multipolaires Siemens. C'est dire que les *dynamos* évoluent à la même vitesse. Cette lenteur relative a permis de donner aux générateurs électriques des dimensions qui ne seront dépassées qu'à l'usine de Bedford près de Londres. A l'usine de la Spandauerstrasse, il y aura quatre moteurs de mille chevaux chacun, et chaque moteur actionnera deux *dynamos* dont l'armature a un diamètre de 3,50 mètres. Chacune de ces *dynamos* alimentant 3,000 lampes, l'usine en question aura une capacité de 4,000 lampes. L'usine du Schillnerlamme est un peu moins avancée. Elle comprendra six moteurs de 1200 chevaux chacun et les *dynamos* à l'avenant.

On voit que l'éclairage électrique marche à pas de géant sur les bords de la Sprée. La proportion est dès aujourd'hui d'une lampe à incandescence pour neuf becs de gaz, mais tout fait prévoir que, dans un avenir très prochain, l'électricité sera pour le moins l'égale de son principal concurrent.

Presque sans exception, les villes allemandes de second et de troisième ordre suivent l'exemple de la

capitale; mais elles prennent en général elles-mêmes l'éclairage électrique en mains, ainsi qu'elles l'ont fait partout pour le gaz et l'eau.

D'autre part la Compagnie générale d'électricité s'apprête à doter enfin les grandes villes d'Allemagne de tramways électriques. M. Werner de Siemens, qui en est l'inventeur, s'étant borné jusqu'ici à construire deux petites lignes, celle de Lichterfelde, inaugurée il y a quelque dix ans, et celle de Francfort à Offenbach qui a cinq ou six années d'existence. La Compagnie d'électricité y appliquera exclusivement le système Sprague, c'est-à-dire les courants continus de faible tension (300 volts) et les conducteurs aériens.

G. VAN MUYDEN.

COMÈTES

La comète périodique de Brorsen, dont on attendait le retour en mars ou avril, a été cherchée en vain par divers astronomes; et il y a lieu de craindre qu'elle passe encore inaperçue cette fois; peut-être même s'est-elle désagrégée comme la comète de Biela. C'est un fait remarquable et qui semble montrer que la vie des comètes périodiques est généralement courte, comme le faisait récemment observer dans ce Recueil notre distingué collaborateur, M. Bigourdan (1).

La comète périodique de d'Arrest n'a pas été revue non plus; mais elle n'a pas encore atteint son plus grand éclat; peut-être le mois juillet ne se passera-t-il pas sans qu'elle ait été retrouvée.

Enfin la comète α 1890, la seule qui ait encore été découverte cette année, et qui d'abord n'était visible que le matin, est aujourd'hui facile à observer, car elle est circumpolaire depuis le 14 mai et par suite reste constamment sur l'horizon de Paris. Son éclat théorique, qui a augmenté considérablement, décroît depuis le commencement de juin. L'éclat réel a présenté quelques variations anormales dans les premiers jours de juin.

(1) Voyez la *Revue* du 15 février, page 63.

Le Gérant: OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

RECHERCHES NOUVELLES SUR LA PHAGOCYTOSE

La science s'est récemment enrichie d'un grand nombre d'observations sur les relations qui existent, au cours des maladies virulentes, entre les microbes pathogènes et les cellules des animaux supérieurs, c'est-à-dire des Vertébrés. En raison de leur grand intérêt pour la biologie générale et du jour nouveau dont elles éclairent la théorie de l'immunité, il importe de les examiner avec soin.

Passons d'abord en revue les principaux faits établis à ce sujet. On a constaté depuis longtemps que les tissus de toutes les classes contiennent plus ou moins souvent différentes espèces de microbes pathogènes appartenant à deux groupes principaux de parasites : les Bactéries et les Sporozoaires. La plupart des variétés du tissu épithélial, les cellules nerveuses, les fibres musculaires, les éléments du tissu conjonctif et les cellules endothéliales, ainsi que les globules rouges et blancs du sang, ne font point exception à cette règle générale.

Si nous examinons ces cas différents de plus près, nous pourrions nous convaincre facilement que, dans la pénétration des microbes à l'intérieur des cellules, les mouvements du protoplasme ou mouvements amiboïdes jouent le rôle le plus considérable. Si c'est le parasite qui est doué de ces mouvements, c'est lui qui s'introduit dans la cellule, tandis que dans les cas où le microbe ne présente aucun état amiboïde et se trouve néanmoins dans l'intérieur d'une cellule, c'est toujours celle-ci qui manifeste des mouvements protoplasmiques, à

l'aide desquels elle englobe le parasite dans son contenu.

On peut donc établir comme règle générale que les microbes qui ont un stade amiboïde, comme les Sporozoaires, s'introduisent activement dans les cellules, tandis que les Bactéries, ne présentant jamais d'état amiboïde, ne parviennent dans l'intérieur des cellules que d'une façon passive, à l'aide des mouvements amiboïdes des cellules de l'animal même. On a souvent prétendu que les Bactéries seraient en état de s'introduire dans l'intérieur des cellules d'une manière active à l'aide de leurs mouvements, quelquefois très vifs, ou bien par suite d'un simple mouvement d'accroissement. L'observation directe démontre l'inexactitude de cette supposition. En réalité les mouvements spontanés des Bactéries ne suffisent jamais pour les faire pénétrer dans l'intérieur d'une cellule. Comme exemple, je puis citer les spirilles de la fièvre récurrente, qui sont animés de mouvements très vifs. Ils se fixent souvent à la surface des leucocytes, et pourtant ne s'introduisent jamais à l'intérieur de ces derniers. La croissance des bactériidies qui s'allongent en filaments souvent très longs ne suffit pas non plus pour leur permettre de pénétrer dans l'intérieur des cellules; les microbes poussent vers l'endroit de la moindre résistance et s'insinuent dans les interstices entre les cellules.

Si, d'un côté, il n'est rien de plus facile que de trouver un microbe sporozoaire dans des cellules complètement dépourvues de mouvements ami-

boïdes, comme dans les cellules épithéliales et musculaires ou dans les globules rouges du sang, il devient tout à fait impossible de constater la présence de Bactéries dans l'intérieur de ces catégories d'éléments cellulaires. Quoiqu'il existe un nombre assez considérable d'affirmations d'après lesquelles différentes Bactéries se trouveraient dans l'intérieur des cellules épithéliales, comme par exemple dans les cellules hépatiques, l'épithélium des canaux du rein ou des alvéoles pulmonaires, néanmoins l'examen direct démontre pleinement l'inexactitude de ces assertions. Le plus souvent on prend des cellules épithélioïdes pour ces cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules d'origine tout à fait étrangère, des éléments provenant du mésoderme de l'embryon et présentant des mouvements amiboïdes plus ou moins prononcés. Ainsi les cellules endothéliales du foie, qui renferment très souvent des Bactéries, ont été souvent prises pour des cellules hépatiques mêmes. D'un autre côté les grands éléments qui se trouvent si souvent dans les alvéoles pulmonaires, présentent une forme aplatie, et des corpuscules étrangers dans leur intérieur, éléments désignés souvent comme cellules à poussière (*Staubzellen* des Allemands), ont été, par la plupart des observateurs, pris pour de véritables cellules épithéliales, mais à tort, parce que ces éléments sont des leucocytes immigrés dans les alvéoles, c'est-à-dire des cellules amiboïdes par excellence.

Récemment M. Babès a décrit dans une affection hémoglobinurique du bœuf un fait qui présenterait une exception à la règle établie, parce que le micrococcus de cette maladie résiderait surtout dans l'intérieur des globules rouges du sang. Vu que M. Babès considère lui-même son travail comme encore incomplètement achevé, que la situation intracellulaire des cocci n'a été constatée que sur des préparations étalées et encore que la nature bactérienne du parasite n'est pas définitivement établie, il serait prématuré d'émettre des conclusions sur ce cas particulier.

Partout où la présence des Bactéries à l'intérieur des cellules a été suffisamment démontrée, ces éléments appartiennent à la catégorie des cellules migratrices, ou bien à celle des éléments fixes, ne changeant pas leur place, mais *pourvus néanmoins de prolongements protoplasmiques*. Dans les deux cas ce sont des *phagocytes*, c'est-à-dire des cellules qui mangent ou englobent des corps étrangers en général et des Bactéries en particulier.

Ce sont d'abord deux espèces de leucocytes qui fonctionnent le plus souvent comme phagocytes : les globules blancs à un seul noyau grand et arrondi et à protoplasma prenant facilement les couleurs d'aniline, et les leucocytes polynucléaires

avec un noyau lobé ou en forme de trèfle, etc., et à protoplasma ne se colorant que fort difficilement avec les couleurs d'aniline ordinairement employées. Il faut bien se garder de confondre les leucocytes avec les phagocytes, car il y a des leucocytes qui ne sont pas phagocytes, comme par exemple les lymphocytes, et d'un autre côté il existe un nombre de phagocytes qui ne sont point leucocytes. Cette catégorie de phagocytes comprend les cellules endothéliales, grandes cellules de la pulpe splénique, et, dans des cas très rares il est vrai, même des cellules nerveuses. D'après les observations très exactes de M. Soudakewitch, les cellules des ganglions sympathiques contiennent, dans quelques cas de lèpre nerveuse, des bacilles spécifiques à leur intérieur. On serait peut-être tenté d'accepter ici une introduction active de la part des bacilles; mais des recherches qui ont démontré la présence de corpuscules étrangers dans les cellules nerveuses et surtout la découverte de M. Ehrlich que les prolongements des cellules nerveuses sont doués de mouvements amiboïdes, nous permettent avec beaucoup plus de droit d'envisager ces cellules comme des phagocytes.

De même que les microbes possédant un stade amiboïde s'introduisent non indifféremment dans n'importe quelle espèce de cellules, mais choisissent les éléments des tissus qui leur conviennent le plus (ainsi les parasites du paludisme n'entrent que dans les globules rouges, les coccidies oviformes que dans les cellules épithéliales des canaux biliaires, etc.), de même les phagocytes ne sont nullement capables d'englober tous les microbes pathogènes sans distinction. Il y a des bactéries qui ne sont englobées que par une catégorie de phagocytes, tandis que d'autres sont mangées uniquement par les phagocytes d'une autre catégorie; d'autres encore par les différentes espèces de ces cellules. Ainsi les spirilles de la fièvre récurrente et les streptococques de l'érysipèle ne sont attaqués que par les leucocytes à noyau lobé ou multiple, avec un protoplasma se colorant difficilement, c'est-à-dire par une catégorie de phagocytes que nous appellerons *microphages* (fig. 1). Les bacilles de la lèpre, au contraire, ne se retrouvent jamais dans l'intérieur de ces cellules, mais bien dans les phagocytes à noyau unique et à protoplasma prenant facilement les couleurs d'aniline, c'est-à-dire dans les phagocytes désignés sous le nom de *macrophages* (fig. 2). Dans cette catégorie se rangent tous les grands leucocytes uninucléaires, les cellules de la pulpe splénique, les cellules étoilées du foie et les véritables cellules endothéliales. Dans une troisième catégorie de cas les Bactéries peuvent être englobées par les microphages aussi bien que par

les macrophages, mais une de ces espèces de phagocytes peut présenter néanmoins une certaine prédilection pour tel ou tel autre microbe. Ainsi les bacilles de la tuberculose sont englobés par les




Fig. 1. — Un microphage d'un rat blanc contenant 12 bacilles charbonneux.



Fig. 2. — Macrophage du foie d'un rat blanc contenant des bactériidies.

deux espèces de phagocytes, mais bien plus souvent par les macrophages qui se présentent quelquefois sous forme de cellules géantes, c'est-à-dire de grandes cellules avec des noyaux multiples.

II

Passons maintenant à la question de savoir comment se comportent les microbes qui se sont introduits eux-mêmes ou qui ont été introduits dans l'intérieur des cellules? On peut répondre en général que dans le premier cas les parasites croissent et souvent aussi se multiplient dans le contenu des cellules envahies, comme cela a lieu pour



Fig. 3. — Cellule épithéliale de l'intestin de la Salamandre avec une coccidie parasitique dans le noyau.

les Sporozoaires intracellulaires, tels que les Coccidies ou Sarcosporidies. La vie de ces microbes est même liée d'une façon nécessaire à leur séjour dans le corps des cellules. Le plus grand nombre se fixe dans le contenu protoplasmique des cellules, tandis que quelques espèces isolées ne trouvent leur milieu favorable que dans l'intérieur du noyau. C'est le cas pour le *Caryophagus Salamandræ*, coccidie parasite du noyau des cellules épithéliales de l'intestin de la Salamandre terrestre (fig. 3).

Un certain nombre de bactéries, quoique introduites dans l'intérieur des cellules d'une manière passive à l'aide des mouvements protoplasmiques de ces dernières, sont également capables de croître et de se multiplier dans le contenu des cellules. Comme exemple, on peut citer les bacilles du rouget des porcs et de la septicémie des

souris, végétant dans l'intérieur des phagocytes d'animaux sensibles, tels que le pigeon, la souris, etc. Un autre exemple bien connu est celui de la tuberculose, dont le bacille est sans aucun doute capable de se maintenir et de végéter, péniblement il est vrai, dans le contenu des différentes cellules phagocytaires. Mais dans le plus grand nombre des cas les microbes, incorporés dans des phagocytes, trouvent dans ces cellules un milieu défavorable pour leur existence. Comme preuve on peut invoquer la règle générale que *plus un animal est réfractaire pour une maladie quelconque, plus ses phagocytes sont capables d'englober le microbe de la même maladie*. Ainsi il est établi que la bactériidie charbonneuse ne se rencontre que fort rarement dans les phagocytes des animaux très sensibles, tels que la souris, le cobaye et le lapin, tandis qu'elle abonde dans les phagocytes des espèces plus ou moins réfractaires, comme la grenouille, le pigeon, la poule, le rat et le chien. De même pour une série d'autres microbes, comme pour celui du choléra des poules, qui n'est point englobé par les phagocytes des poules, pigeons et lapins, mais l'est à un fort degré par les phagocytes d'un animal très peu sensible, le cobaye. Si, au lieu d'étudier le sort d'une espèce de microbe chez plusieurs animaux, nous nous adressons à un animal quelconque et examinons les relations de ses phagocytes avec plusieurs bactéries plus ou moins virulentes, nous verrons la même règle se confirmer. Ainsi, comme nous venons de le mentionner, les phagocytes des lapins, d'un des animaux les plus employés dans les laboratoires, ne sont point aptes à englober en quantité notable ni la bactériidie virulente, ni le coccobacille du choléra des poules, c'est-à-dire deux microbes pour lesquels notre animal est excessivement sensible. Ses leucocytes sont également très peu capables d'englober les microbes de la pneumonie, qui provoque chez le lapin une septicémie aiguë et mortelle. D'un autre côté, le bacille du charbon atténué, facilement supporté par le même animal, celui du pus bleu, qui ne tue les lapins qu'à de fortes doses, sont facilement englobés par les leucocytes.

Il est temps de mentionner que, pour débarrasser l'organisme d'un microbe envahisseur, il ne suffit pas que ce dernier soit englobé dans l'intérieur des phagocytes. Il existe des maladies, où le microbe est bien englobé, mais non détruit par les cellules, et nous avons déjà cité le cas de la tuberculose et du rouget des porcs, comme exemples de microbes capables de persister et se multiplier à l'intérieur des phagocytes. Evidemment l'englobement n'est qu'un des premiers actes de la défense du côté des cellules. Ces dernières doivent détruire ou au

moins entraver le développement du microbe pour bien protéger l'organisme. Or, nous observons que tandis que le bacille du rouget des porcs virulent, quoique englobé par des phagocytes, reste vivant dans ces cellules, le même bacille atténué y péricite au bout d'un temps plus ou moins prolongé.

Il existe donc réellement une certaine relation entre la faculté bactéricide des phagocytes et l'état réfractaire de l'animal.

On a beaucoup discuté la question de savoir si les phagocytes sont capables d'englober les microbes à l'état plus ou moins vivant ou bien s'ils ne sont aptes qu'à dévorer les microbes préalablement affaiblis ou détruits par d'autres facteurs agissant dans l'organisme. Dans ce dernier cas le rôle des phagocytes se réduirait à celui de simples balayeurs des microbes déjà rendus inoffensifs par d'autres moyens. On a donc supposé que les Bactéries infectieuses sont englobées à l'état vivant et virulent uniquement dans les cas où ces parasites se maintenaient vivants dans les phagocytes, comme dans la tuberculose et le rouget des porcs. Un certain nombre de faits, l'observation directe nous montrent que cette supposition n'est pas suffisamment fondée. En tuant les phagocytes par le bouillon, qui sert de nourriture aux bactéries, on peut constater souvent que la bactérie charbonneuse, englobée par les phagocytes d'un animal réfractaire, comme par exemple (fig. 4). L'expérience avec une culture issue d'une



Fig. 4. — Macrophage de pigeon, tué par du bouillon, a, b, c, d quatre bactéries intraphagocytaires en vive croissance.

bactériémie englobée prouve également que le microbe a été dévoré lorsqu'il conservait sa virulence.

D'autres observations démontrent de plus que les leucocytes englobent les bactéries vivantes plus facilement que les mêmes microbes préalablement tués. Ainsi M. Lubarsh, en injectant des bactéries vivantes à un côté et des bactéries tuées à l'autre côté du même individu, a pu constater que les bacilles introduits vivants sont englobés plus vite et en plus grand nombre que les bacilles stérilisés.

S'il n'est plus douteux que les phagocytes sont aptes à dévorer les Bactéries vivantes et virulentes, il n'est d'autre part non moins douteux que les

microbes sont le plus souvent détruits dans l'intérieur de ces cellules. On peut facilement observer tous les stades de dégénérescence, de mort et de dissolution finale des microbes englobés. Ceux-ci perdent d'abord leur propriété de se colorer, deviennent souvent granuleux, prennent des contours crénelés, etc.

III

Ces faits, envisagés dans leur ensemble, indiquent déjà que les éléments de l'organisme, capables de détruire les microbes pathogènes, doivent jouer un rôle considérable dans les phénomènes de résistance et de réaction de l'organisme contre ces agents infectieux. Cette conclusion peut être appuyée encore par le fait général que les phagocytes se trouvent agglomérés justement dans les endroits de l'organisme les plus sujets à l'invasion microbienne. Les amygdales, plaques de Peyer et toute une série d'organes analogues, situés tout le long du canal intestinal — qui est une des principales portes d'entrée pour les microbes — produisent une grande quantité de phagocytes; ceux-ci renferment souvent des bactéries venant du contenu intestinal. Comme l'a démontré M. Stoehr, il se produit à l'état normal une émigration constante de leucocytes à travers ces organes folliculaires, et un grand nombre de ces cellules parvient dans les cavités buccale, stomacale et intestinale. La surface des alvéoles pulmonaires, — autre porte d'entrée pour les microbes, — est tellement tapissée de grands macrophages, provenant des systèmes lymphatique et sanguin, que ces cellules ont été longtemps considérées comme appartenant au tissu pulmonaire lui-même et envisagées comme des cellules épithéliales des alvéoles. Dans chaque partie du corps envahie par les microbes ou par un autre agent morbide quelconque il se produit une inflammation, accompagnée d'immigration des phagocytes à l'endroit menacé. Cet afflux constant des phagocytes dans les endroits les plus exposés confirme donc la supposition de l'importance du rôle joué par eux dans l'organisme.

Quelques exceptions à cette règle générale ont été souvent citées comme objections de principe à la théorie des phagocytes. Dans certaines maladies, comme dans le charbon des animaux les plus sensibles, la réaction inflammatoire est comparativement très faible. Voilà donc un exemple où l'organisme menacé n'est point protégé par les phagocytes qui n'arrivent point là où ils devraient justement s'accumuler en grande quantité. Envisageant ces cas de plus près, on peut les expliquer en admettant une action spécifique des microbes sur la paroi des vaisseaux, action qui empêche

l'émigration et par conséquent la concentration des leucocytes autour du point lésé.

Dans l'acceptation du fait que les phagocytes s'accumulent à l'endroit menacé, qu'ils se comportent d'une manière toute différente vis-à-vis de diverses espèces de microbes et que même les différentes variétés des phagocytes présentent une variabilité extraordinaire à l'égard de ces envahisseurs, on a quelquefois attribué aux cellules comme une faculté exceptionnelle et en quelque sorte surnaturelle de discernement. Cette prétendue explication constituerait plutôt une objection à la théorie, si elle pouvait être bien fondée. Mais il n'en est rien. L'accumulation des phagocytes autour des microbes et en général dans les endroits menacés peut s'expliquer par une propriété physiologique normale qui se rencontre chez les organismes les plus inférieurs. On sait depuis un certain nombre d'années que les êtres protoplasmiques les plus simples, comme les Myxomycètes et autres, possèdent une sorte de sensibilité à l'égard des agents extérieurs, tels que chaleur, humidité, composition chimique etc. Les plasmodes, des Myxomycètes sont attirés par l'humidité, par des solutions de substances nutritives et repoussés par la sécheresse, les substances nuisibles, etc. Or ces propriétés, qu'on a désignées sous les noms de hydrotropisme, phototropisme, chimiotaxie, etc. se rencontrent aussi chez les phagocytes. Ces cellules sont attirées par différents microbes et repoussées par d'autres, comme on peut s'en assurer en introduisant dans l'organisme animal des tubes remplis avec des cultures vivantes ou stérilisées (1). Comme la propriété chimiotactique des Myxomycètes et d'autres êtres inférieurs s'est développée graduellement en raison de son utilité pour la vie de ces organismes, de même la chimiotaxie des phagocytes s'est fixée en raison de l'avantage que cette propriété pouvait présenter à l'animal dans sa lutte pour l'existence. Dans les deux cas c'est la sélection naturelle qui a élaboré une qualité utile sans intervention de facteurs téléologiques quelconques.

On ne connaît jusqu'à présent que la propriété chimiotactique des phagocytes; mais il est très probable que ces cellules possèdent également une sensibilité à l'égard d'autres agents extérieurs, comme le degré de l'humidité, de la température, même de la pression etc. Nous avons droit de le supposer, puisque nous voyons qu'en général les phagocytes sont sous beaucoup de rapports analogues aux êtres inférieurs. Entre autres points de ressemblance il y en a un qui mérite avant tout notre attention. Depuis les recherches de M. *Stahl* sur

les Myxomycètes, on sait que ces organismes protoplasmiques s'habituent aux substances chimiques et aux autres agents qu'ils évitaient au début. Ainsi les plasmodes qui s'éloignent lorsqu'on les approche d'une solution de sucre finissent par s'habituer graduellement à cette liqueur. Le sucre, qui était d'abord nuisible à l'organisme, devient pour lui une substance indifférente ou même utile. Il y a donc une accoutumance du plasmode, une sorte d'immunité acquise. Après tout ce que nous savons des phagocytes et de leur propriété chimiotactique, on peut admettre que ces cellules sont aussi susceptibles de s'habituer graduellement aux influences qui leur étaient nuisibles au début, et à acquérir une accoutumance vis-à-vis de ces influences.

Cette interprétation pourrait s'appliquer à certains cas de guérison, qui serait alors produite par l'accoutumance des phagocytes accomplie pendant le cours de la maladie, de même que les Myxomycètes dans les expériences de M. *Stahl* finissaient par pénétrer dans de l'eau sucrée qu'ils évitaient au début.

La même interprétation pourrait servir aussi pour expliquer l'immunité surtout dans les cas où l'organisme est réfractaire à un microbe quoique son sang et ses autres humeurs fournissent un milieu favorable à la culture de ce microbe. Or, on sait depuis des années que c'est le cas pour beaucoup d'organismes, notamment pour la bactérie qu'on cultive dans le sang, le sérum et l'humeur aqueuse des animaux réfractaires au charbon.

Malgré ce fait suffisamment prouvé on a dernièrement émis la théorie d'après laquelle les humeurs des animaux possèderaient une faculté bactéricide très considérable. Cette propriété expliquerait à elle seule l'immunité, sans un concours quelconque de la part des phagocytes. Les auteurs de cette théorie, comme M. Flügge avec ses élèves et jusqu'à un certain point M. Buchner, ont observé eux-mêmes que la propriété bactéricide des humeurs peut se trouver au plus haut degré chez les animaux les plus sensibles. Ainsi le sang et le sérum des lapins détruisent les bactéries aussi bien que ceux des chiens et infiniment mieux que ceux des bœufs ou du cheval. Ce fait, joint à toute une série de faits analogues, démontre clairement que cette prétendue propriété bactéricide des humeurs ne correspond nullement aux phénomènes de l'immunité. D'un autre côté M. Lubarsch a constaté que le sang extravasculaire des lapins tue un grand nombre de bactéries, tandis qu'une quantité de ces dernières beaucoup moins grande suffit déjà pour donner au même animal le charbon mortel. Il est donc clair que dans ce phénomène de mortalité des microbes dans les humeurs le grand rôle appartient

(1) Voyez à ce sujet les recherches de M. Gabritchevsky sur les propriétés chimiotactiques des Leucocytes dans la *Revue* du 15 juillet 1890, page 414.

à des agents qui sont surtout actifs en dehors de l'organisme. Mais, en opérant soigneusement, on parvient même, comme l'a démontré M. Haykine, à obtenir des cultures de bactéries issues d'un seul bâtonnet ensemencé dans les humeurs d'animaux réfractaires, comme par exemple celles du chien.

Nous arrivons au même résultat en modifiant la méthode expérimentale. Si nous retirons les humeurs de l'organisme, nous voyons toujours qu'elles donnent lieu à des cultures du microbe, alors même que l'animal qui les fournit est réfractaire. Dans les conditions naturelles, déjà l'humeur aqueuse nous présente un milieu presque privé de cellules. Eh bien, on a constaté pour toute une série de maladies, que les microbes contre lesquels les animaux sont naturellement ou artificiellement réfractaires, poussent très bien dans la chambre antérieure de l'œil de ces animaux. Ainsi des grenouilles, moutons, pigeons, rats, lapins réfractaires pour le charbon donnent, dans leur chambre antérieure, des cultures même du premier vaccin de cette Bactérie. Le même phénomène a été constaté pour le vaccin du rouget des porcs cultivé dans la chambre antérieure du chien et de lapins réfractaires.

Des sacs de papier buvard ou de moelle de roseau, de petites outres faites avec des portions d'intestin de grenouilles ou même un tampon d'ouate introduits dans l'organisme permettent d'y cultiver les microbes à l'abri des phagocytes. Dans le liquide lymphatique ainsi isolé, à l'intérieur d'un animal réfractaire, on constate que les spores de la bactérie germent parfaitement. Ces expériences démontrent que la condition essentielle pour obtenir ces cultures consiste à éliminer les phagocytes, preuve nouvelle du rôle important de ces cellules.

Ainsi, de quel point de vue que nous considérons la relation des microbes avec les phagocytes, nous arrivons toujours à la conclusion que ces cellules représentent un moyen formidable de défense de l'organisme contre l'agression des agents qui produisent les infections. Mais il serait contraire à la vérité de supposer que ce moyen est seul à la disposition de l'organisme. Il existe incontestablement plusieurs facteurs tendant vers le même but; ainsi, nous voyons que l'acide du suc gastrique détruit un grand nombre de microbes par une action purement chimique. Il est très probable que le pouvoir protecteur des phagocytes, étant insuffisant dans certains cas, doit être secondé par d'autres agents physiques et chimiques.

Les différences que nous présente l'action phagocytaire vis-à-vis des microbes infectieux sont très nombreuses et jusqu'à un certain point analogues à ce que nous présentent ces microbes eux-mêmes. A côté des Bactéries qui, à elles seules, produisent

infailliblement la maladie, il y en a d'autres qui exigent le concours d'autres influences. Souvent un seul et même microbe se comporte d'une façon différente dans deux espèces différentes d'animaux. Ainsi, comme on sait, le bacille du charbon symptomatique envahit très facilement le cobaye, mais ne se propage dans l'organisme du lapin qu'à l'aide de substances surajoutées, comme, par exemple, l'acide lactique. Dans d'autres cas, un microbe ne provoque que des accidents secondaires, tels qu'on en voit si souvent au cours de la fièvre typhoïde ou dans d'autres infections.

IV

En exposant le rôle prophylactique et thérapeutique des phagocytes, nous n'avons parlé que de la relation de ces cellules avec les Bactéries. Il serait intéressant de voir aussi comment se comportent les phagocytes vis-à-vis des parasites qui ont acquis une facilité spéciale à végéter dans l'intérieur des cellules. J'ai en vue les Sporozoaires. Eh bien, ces organismes qui mènent une vie parasitique dans l'intérieur des globules rouges, des cellules épithéliales de différentes espèces, dans les œufs et les fibres musculaires, ne se rencontrent jamais comme parasites des phagocytes, cellules souvent errantes qui entrent en relations si fréquentes avec toutes sortes de corps étrangers. Jamais on n'a vu une Coccidie ou un Sporozoaire quelconque végéter dans l'intérieur d'un phagocyte fixe ou mobile. Toutes les fois qu'on a rencontré un phagocyte contenant une coccidie, celle-ci était en voie de destruction. Dans le cours de la fièvre malarique, les coccidies découvertes par M. Laveran sont souvent englobées par les phagocytes et surtout par les macrophages de la rate et du foie. Mais ces cellules tuent et digèrent les parasites, desquels il ne reste que le résidu pigmentaire. M. Danilevsky a observé des phénomènes analogues sur les parasites du sang découverts par lui chez différents animaux.

Cette série de faits confirme de nouveau la proposition générale que les phagocytes forment un milieu dans lequel les microbes périssent dans la majorité des cas.

Il serait plus que téméraire de prétendre dès à présent que l'étude des relations entre les microbes pathogènes avec les cellules de l'organisme en général et les phagocytes en particulier, a pu résoudre les grandes questions de la pathologie générale des maladies infectieuses. Mais on peut au moins accepter que cette étude nous facilite la connaissance des phénomènes pathologiques, tels que l'immunité et la guérison, l'inflammation et la production de néoplasies infectieuses. L'histologie pathologique ne peut que gagner en consta-

tant la relation qui existe entre une espèce microbienne déterminée et la réaction de la part de telle ou telle autre variété de phagocytes. La question se simplifie, si nous sommes en état d'envisager le tubercule, la néoformation lépreuse et les granulomes en général, comme des manifestations de réaction macrophagique, la suppuration présentant le cas le plus vulgaire d'une réaction microbienne de l'organisme.

L'étude de la relation des cellules avec les microbes nous conduit donc à constater une sorte de lutte entre les deux éléments, lutte qui se termine en faveur de l'une ou de l'autre partie, suivant les circonstances. Dans cette lutte ce sont les sécrétions qui jouent un rôle des plus importants. Tandis que le microbe se défend par des substances

qu'il produit et qui nuisent à l'animal, les phagocytes sécrètent eux-mêmes des liquides propres à détruire les microbes. En poursuivant cette lutte, on arrive à observer quelquefois des phagocytes tout à fait gonflés de sécrétions, au milieu desquelles se trouve logé le parasite. Il est évident que c'est l'analyse, la détermination chimique de ces produits de sécrétion, qui doit surtout avancer nos connaissances des phénomènes de l'infection. L'étude de la phagocytose nous indique donc la voie vers laquelle doivent être dirigées les recherches qui feront avancer la question. Ces recherches rentrent dans le domaine de la chimie biologique.

Elie Metchnikoff,

Chef de service à l'Institut Pasteur.

LA DÉCOUVERTE DE LA CYCLOÏDE

M. Joseph Bertrand, dans le *Journal des Savants* de mai dernier, apporte sur l'histoire d'un cas particulier des *roulettes*, celui de la *cycloïde*, une lumière inattendue.

Tout le monde connaît cette histoire pour l'avoir lue dans les œuvres de Pascal :

En 1615, le P. Mersenne, observant la révolution d'un point fixe considéré sur la circonférence d'une roue de voiture en marche, découvre la cycloïde, mais n'en peut pénétrer les propriétés. Roberval, en 1634, résout les trois premiers problèmes relatifs à cette courbe. Enfin, en 1658, Pascal déclare qu'il vient d'achever l'étude de la roulette, mais qu'avant de publier ses résultats, il veut laisser à d'autres l'honneur de les découvrir comme lui, et qu'en conséquence il convie les géomètres à envoyer avant le 1^{er} octobre, le résumé de leurs recherches à M. de Carcavi, lequel présidera un jury chargé d'attribuer aux deux meilleures solutions un prix de 40 pistoles et un prix de 20 pistoles. Quelques manuscrits arrivent en effet; mais tous, sauf deux, sont aussitôt retirés par leurs auteurs, qui les estiment fautifs. Restent donc deux mémoires à juger : l'un, qui est du grand géomètre anglais Wallis, se trouve écarté parce qu'il ne résout que quelques-uns des problèmes proposés; l'autre, dont l'auteur est le jésuite Lalouère (qui, ayant présenté des corrections après le 1^{er} octobre, déclare ne pas concourir), est rejeté presque sans examen comme particulièrement erroné. Et Pascal garde sa gloire et son argent.

Mais voici que le jésuite rebuté se rebiffe, prétend sa méthode de solution excellente, réclame la sentence du jury. Pascal court à sa plume et rédige une violente diatribe pour le convaincre d'ignorance.

d'incapacité et même de plagiat, car, assure-t-il, s'il a envoyé des corrections après le 1^{er} octobre, c'est que, sur ces entrefaites, il a eu connaissance de la solution — non publiée il est vrai, mais connue de quelques personnes — que Roberval avait donnée jadis.

De quel côté était le bon droit en cette affaire ? Telle est la question que se pose M. Joseph Bertrand. Et avec deux lettres de Pascal, publiées dès 1659 par le P. Lalouère, il établit d'une façon péremptoire que, de quelque façon qu'on s'y prenne, il est bien difficile d'accorder le beau rôle à l'auteur des *Provinciales*. Dans ces deux lettres en effet, Pascal comble le P. Lalouère de prévenances et d'éloges; par la première il lui mande que sa méthode est toute nouvelle et bien plus générale que celle de Roberval, mais qu'il croit seulement à quelques erreurs dans les calculs; par la seconde il lui avoue qu'après un plus mûr examen il a constaté que ses calculs étaient eux-mêmes exacts.

Que conclure ?

Faut-il admettre avec Condorcet que Pascal, trop ardent janséniste, a mieux aimé brouiller les cartes que de laisser à un jésuite l'honneur de la partie ? M. Bertrand n'ose souscrire à une accusation aussi grave et cherche d'autres raisons. Peut-être, propose-t-il, Pascal a-t-il voulu par ces deux lettres tendre un piège au P. Lalouère, et l'amener à livrer peu à peu les preuves de son plagiat; mais, comme il le reconnaît, « cette explication, il faut l'avouer, fait peu d'honneur à la sincérité de Pascal ». Vaut-il mieux croire, demande-t-il encore, que Pascal, bien qu'il déclarât dans sa diatribe avoir flairé tout de suite le plagiat, n'avait plus mémoire de la solution de Roberval lorsqu'il écrivait ses

deux lettres et ne s'en est souvenu qu'ensuite : cela est fort peu vraisemblable et, en ce cas, Pascal nous aurait trompé dans sa diatribe. Quant à l'authenticité des lettres, elle ne peut être niée puisqu'elles ont été publiées du vivant même de leur auteur, dans un ouvrage dédié à Fermat, son ami.

Or, même quand on a relu, comme je viens de le faire, les pièces du procès, il devient indubitable que la discussion de M. Bertrand est d'une logique absolue et qu'il est impossible de trouver d'autres explications que les siennes. « Il serait cruel, dit Condorcet, d'être obligé de soupçonner Pascal de mauvaise foi. » Sans doute. Mais comment faire autrement, surtout quand les contemporains ont déjà donné l'exemple ?

Car, et je me permets d'appeler sur ce point l'attention de M. Bertrand, les contemporains n'ont pas toujours eu à se féliciter des procédés de Pascal. L'histoire de la roulette nous en offre déjà un exemple. C'est Torricelli qui est ici en cause. Pascal l'accuse d'avoir publié récemment, sous le nom de Galilée, le problème de Roberval, dont il avait trouvé la copie dans les papiers du savant florentin. « M. de Roberval, ajoute-t-il, s'en plaignit à Torricelli, par une lettre qu'il lui écrivit la même année; et le P. Mersenne, en même temps, mais encore plus sévèrement, lui donna tant de preuves et d'implications, et de toutes sortes, qu'il l'obligea d'y donner la main et de céder cette invention à M. de Roberval ». Voilà, cette fois une accusation de plagiat nettement formulée. Or, Pascal calomnie ici Torricelli; M. Bertrand, qui rapporte ce passage, le déclare en termes formels : « Qui ne croirait, dit-il, que Pascal a vu ces lettres? Il n'en est rien. Elles ont été publiées et ne prouvent rien de contraire à la bonne foi de Torricelli. Roberval, écrivant à Torricelli, n'a pas l'impertinence de l'accuser de plagiat, et Torricelli, répondant à des réclamations exprimées en termes courtois, accepte avec politesse les assertions de Roberval sans avoir à défendre sa loyauté. » Pourquoi, alors, cette acrimonie contre Torricelli? Probablement parce que Pascal ne peut lui pardonner d'être obligé de partager avec lui la gloire des expériences relatives à la pesanteur de l'air. Le ressentiment date de loin; quand Pascal, si l'on en croit le texte reproduit par Bayle, publia la relation de ses premières expériences barométriques, il y parla vaguement d'une certaine invention italienne, et ne prononça même pas le nom de Torricelli. « Cette suppression apparente du nom d'une personne que M. Pascal préférerait d'ailleurs à tous les géomètres de l'antiquité, donna lieu à quelques-uns de le soupçonner d'avoir voulu se rendre plagiaire de Torricelli. » (V. Bayle, *Diet. Crit.* au mot *Pascal*.)

Objectera-t-on, comme on l'a déjà fait, que le

nom de Torricelli pouvait ne pas avoir pénétré encore en France. Soit. Mais celui de Descartes y était assurément connu. Or, comme chacun sait, Descartes a toujours dit et répété à qui voulait l'entendre que l'idée de l'expérience du Puy-de-Dôme était sienne : « Ce fut moi qui le priai, deux ans auparavant, de la vouloir faire et qui l'assurai du succès, comme étant entièrement conforme à nos principes, sans quoi il n'eût eu garde d'y penser, étant d'une opinion contraire. » (*Voir les divers témoignages rapportés par Bayle*.) Qui nous trompe? A moins d'accuser aussi Descartes de mauvaise foi, ce qui finirait par faire passer le monde savant du XVII^e siècle pour un bien étrange monde, il faut avouer que Pascal garda encore une attitude singulière devant cette revendication réitérée à laquelle il n'a jamais répondu.

Tout cela su, il devient aisé de reconstituer avec quelque probabilité l'histoire véritable de la cycloïde, et je sou mets en toute humilité mon essai de reconstitution au jugement de M. Bertrand.

Pascal, — comme, hélas! la plupart des hommes de génie, — était un esprit altier, ombrageux, très jaloux de sa suprématie. En 1658 il trouve sa solution des théorèmes de la roulette. Un savant modeste eût publié ses résultats sans fracas et ne se serait pas amusé à donner à ses confrères trois mois pour en faire autant. Lui, point : il les défie. Evidemment puisqu'il a ses solutions en portefeuille, ce concours ne peut lui servir qu'à bien leur montrer à tous sa supériorité. Et, dès le commencement, il dispose tout pour atteindre ce but, coûte que coûte. Quand le P. Mersenne proposa aux géomètres l'étude de la cycloïde, il leur donna un délai d'un an. Pascal au contraire ne leur accorde que trois mois. Tous réclament, surtout ceux de l'étranger qui ont besoin de plusieurs semaines au moins pour faire voyager leurs manuscrits jusqu'à M. de Carcavi. Il leur répond que la difficulté des transports ne le regarde pas, et de la sorte en évince un bon nombre. (*Œuvres de Pascal*, édit. Hachette, in-12, t. III, p. 329.) De plus il se livre à des distinctions si subtiles sur les erreurs de méthode qui compteront et les erreurs de calculs qui ne compteront pas, qu'il pourra ensuite ergoter tout à loisir sur la valeur des communications. (*Ibid.* t. III, p. 330.) On se débarrasse aisément de Wallis en lui reprochant d'être incomplet, bien que celui-ci proteste et s'estime mal jugé. Mais il faut aussi écarter Lalouère et, pour y parvenir, on commence à chercher un biais. D'abord, sous prétexte que M. de Carcavi est absent, on ne se met à examiner les manuscrits que le 24 novembre. Puis, dès le 1^{er} octobre, Pascal, qui devait publier aussitôt ses solutions, annonce qu'il ne les fera connaître qu'après le 1^{er} janvier.

Pourquoi cet atermoiement? Parce que, répond Pascal, « je voulais montrer parfaitement que le P. Lalouère ne pouvait rien qu'après moi » (*Ibid.*, p. 335), c'est-à-dire n'avait pas de solution et attendait la publication des théorèmes de Pascal pour se les approprier. Notez que le P. Lalouère aurait tout aussi bien pu dire que c'était Pascal qui attendait son travail pour en tirer profit. Mais

en tout cas la raison donnée par Pascal est si peu la bonne que M. de Carcavi ne la connaît pas et en donne une autre : le désir de prolonger le concours. (*Ibid.*, p. 363.) Bref, l'affaire est trainée en longueur, le débat s'use, l'attention publique s'en détourne et Pascal — *cunctando restituit rem*, aurait dit Ennius — reste maître du terrain.

Raoul Rosières.

LA FAUNE PÉLAGIQUE

On comprend sous le nom de *Faune Pélagique* l'ensemble des animaux qui peuplent les vagues de la haute mer; on les distingue ainsi des habitants des rivages, et de ceux qui sont descendus jusqu'au fond des océans.

I

Le plus grand nombre des êtres vivants se trouve sur les rivages de la mer, depuis la limite extrême où s'arrêtent les vagues, jusqu'à la profondeur où la lumière devient trop faible pour permettre le développement d'une végétation indépendante.

Dans cette zone côtière, aux conditions variées, les formes animales se sont diversifiées à l'extrême. De nombreuses espèces herbivores broutent les prairies de la mer, et servent de nourriture à des espèces carnivores, qui sont elles-mêmes la proie d'autres animaux mieux armés. D'autres encore, non moins utiles, trouvent leur subsistance dans les matières animales ou végétales en décomposition; et d'humbles commensaux mettent à profit les moindres restes de l'immense et perpétuel festin.

Variable avec les climats, avec les conditions particulières que présentent la mer et le sol, cette faune côtière a produit les deux autres : la faune abyssale et la faune pélagique. Ces deux dernières, adaptées à des conditions bien spéciales, mais pour chacune assez uniformes, présentent par suite, l'une et l'autre, des lacunes fort nombreuses; mais elles diffèrent surtout par un caractère important.

La lumière la plus vive des jours les plus clairs ne pénètre point dans la mer au delà d'une certaine profondeur. MM. H. Fol et Sarazin ont observé qu'au mois d'avril, en plein midi, une plaque photographique d'une sensibilité extrême cessait d'être impressionnée entre 390 et 400 mètres. Aussi, bien que les naturalistes de la *Plankton-Expédition* aient recueilli, entre 1.000 et 2.200 mètres, de nombreux exemplaires vivants d'une petite algue pélagique, l'*Halosphæra viridis*, il est, dans l'état actuel de la science, impossible d'admettre qu'ils se soient développés à ce niveau; car la chlorophylle ne

se produit pas dans l'obscurité. Par suite, les rares formes végétales qui habitent réellement les profondeurs doivent vivre, à la manière des animaux, de composés organiques déjà formés (1); et la faune des abîmes ne saurait comprendre que des carnivores, occupés à s'entre-dévorer, ou bien des êtres vivant des débris que les courants et les tempêtes leur apportent des rivages; et, bien plus encore, de ceux que la faune et la flore pélagiques laissent tomber, comme une manne inépuisable, sur le lit des océans.

À la surface, au contraire, le cycle de la vie organique est complet; et l'on trouve dans la faune pélagique un nombre considérable d'herbivores, qui vivent aux dépens de végétaux provenant sans doute comme eux originellement des rivages, et comme eux adaptés à ce mode particulier d'existence.

Ces végétaux pélagiques sont, en certaines régions, extrêmement abondants. En quelque point que l'on traîne un filet de gaze à la surface des océans, on peut être à peu près sûr d'y rencontrer des Diatomées. Ces algues pullulent tellement dans les hautes latitudes, qu'elles peuvent, sur de vastes espaces, changer la couleur de l'eau, teindre les glaces de leurs débris, et couvrir le fond de la mer de leurs carapaces siliceuses.

Dans la zone tropicale, leur rôle est en grande partie joué par d'autres algues inférieures, surtout des Oscillariées du genre *Trichodesmium*. En traversant la mer d'Arafura, entre le détroit de Torrès et les îles Arou, le *Challenger* a rencontré un immense espace tellement peuplé de ces végétaux que, sur toute l'étendue de l'horizon, la mer en

(1) On admettait, en effet, jusqu'ici, que la chlorophylle, ou matière verte des plantes, était seule capable de prendre, sous l'influence des radiations lumineuses, le carbone de l'acide carbonique, libre dans l'air ou dissous dans l'eau, et de le faire entrer dans des molécules organiques complexes. Les théories les plus généralement acceptées peuvent être remises en question. C'est ce qui s'est produit pour celle-là, depuis que ces lignes ont été écrites. Sans nous prononcer à cet égard, nous devons renvoyer le lecteur à l'article de M. Louis Olivier paru dans cette *Revue*, le 30 mai : *La synthèse de la matière organique sans chlorophylle ni lumière*.

était décolorée. Les rayons verticaux du soleil, tombant sur ces minces filaments, semblables à du foin coupé, les faisaient briller comme des paillettes de mica; et l'on sentait une forte odeur, analogue à celle qui s'exhale des marécages.

« Le capitaine Cook, dans son troisième voyage, remarque que les matelots donnent à ces végétaux le nom de *sciure de mer* », nous dit Darwin, qui les a lui-même observés avec soin pendant le voyage du *Beagle*, et les signale comme fort communs, surtout dans les mers qui avoisinent l'Australie.

De même Freycinet traversa, près des Philippines, une nappe d'eau teinte en rouge par des myriades d'algues microscopiques; et, sur les côtes occidentales de Ceylan, ces eaux rouges s'observent presque régulièrement pendant la mousson du Sud-Ouest. La mer Rouge présente quelquefois aussi, sur de vastes étendues, une coloration intense due au *Trichodesmium erythraeum*; et c'est l'explication la plus acceptable que l'on ait encore proposée du nom qu'elle porte depuis l'origine de notre histoire.

Parfois, dans ces marais flottants, des Diatomées se mêlent à des Oscillariées et à d'autres algues inférieures; mais ce ne sont pas seulement ces humbles végétaux qui peuvent ainsi vivre à la surface des mers. Tout le monde connaît, au moins de nom, les Sargasses de l'Atlantique, qui ont tant effrayé jadis les marins de Colomb, et sans doute été l'origine de la fable de l'Atlantide. Le *Fucus vesiculosus*, si commun sur nos côtes, peut aussi vivre en liberté, comme le Raisin des Tropiques ou *Sargassum bacciferum*; et le *Macrocystis pirifera*, algue géante de l'Océan austral, qui peut atteindre plus de 200 mètres de longueur, flotte souvent bien loin de toute terre.

Cependant ces algues croissent également attachées aux rochers des rivages; et ce n'est même que dans cette condition qu'elles produisent des spores. Peut-être quelques-unes de ces spores, entraînées en haute mer, peuvent-elles se développer sans fixation; mais quoi qu'on en ait dit, le fait est loin d'être démontré; et l'origine des plantes libres doit être plutôt attribuée à la fixation sur des galets ou des fragments de rochers. Lorsque l'algue atteint une taille suffisante, les flotteurs dont elle est munie lui donnent la force d'emporter la pierre; et Darwin a vu des *Macrocystis* en charrier ainsi de tellement lourdes qu'un homme avait peine à les soulever. Devenues pélagiques, ces plantes ne font plus que s'accroître et se multiplier par division. Ceci n'implique pas, comme on pourrait croire, une diminution, mais au contraire un accroissement d'énergie vitale. Chez les êtres qui possèdent les deux modes de multiplication, la reproduction agame se poursuit fréquemment tant

que les conditions d'existence sont favorables, et la nourriture abondante; tandis que, dans le cas contraire, on voit intervenir aussitôt la reproduction sexuée. C'est là une règle observée aussi bien chez les animaux (*Phylloxera* par Keller, *Infusoires ciliés* par Maupas) que chez les végétaux (*Entomophthorées* par Eidam). Il ne faut donc pas s'étonner que, rien que par la reproduction agame, la pullulation de ces algues flottantes puisse être énorme, comme on le voit surtout pour les Sargasses. Elles forment alors, dans les remous des grands courants marins, des prairies immenses dont les plus connues sont la mer des Sargasses de l'Atlantique, et celle qui se trouve dans le nord de l'Océan Pacifique.

Pour ces grandes algues du moins, il ne saurait donc être douteux qu'il s'agisse d'individus provenant des rivages, et qui, emportés à la mer, ont conservé la faculté de vivre et de prospérer dans ces conditions nouvelles d'existence. Et c'est précisément de cette même manière que l'on peut s'expliquer l'origine d'une grande partie de la faune pélagique.

Qu'ils soient libres mais sédentaires, enfouis dans le sable ou la vase, ou fixés aux rochers comme les algues, presque tous les animaux marins présentent en effet au cours de leur existence, au moins une phase, parfois éphémère mais constante, de vie indépendante et active.

Pour le plus grand nombre, cette phase correspond seulement à l'état larvaire; la dissémination de ces larves répond à celle des spores des végétaux inférieurs, et des graines des phanérogames. Chez d'autres animaux, les formes larvaires ne sont plus seules actives et mobiles; parfois même elles ne le sont plus. La phase indépendante comprend souvent alors la période de maturation sexuelle; et ce qui n'est, somme toute, qu'un perfectionnement de la dissémination si fréquente des produits génitaux, correspond à la dispersion plus limitée des anthérozoïdes des végétaux inférieurs et du pollen des phanérogames dioïques.

Ces formes sexuées et ces larves se rencontrent en grand nombre dans les filets de gaze que l'on promène à la surface de la mer à proximité des rivages, et constituent la majeure partie des récoltes auxquelles on donne fréquemment, mais à tort, le nom de pêches pélagiques, comme si tous les êtres nageurs étaient par cela même adaptés à la vie en mer libre. Elles sont toutes, en réalité, exposées à se trouver entraînées au large par les courants; et nul doute que cela se produise chaque jour pour un nombre immense d'entre elles. Alors, tandis que des myriades périssent, d'autres mieux favorisées peuvent sans doute subir un commencement d'adaptation qu'elles transmettront à leur

descendance; et tout amène à penser que c'est bien là l'histoire ancestrale de la plupart des formes pélagiques actuelles.

II

Cette adaptation à la vie pélagique peut se faire de deux manières différentes. La plus fréquente dans le monde animal est le développement d'ap-

très variés. Ce sont, chez les Vertébrés, des nageoires puissantes, construites sur un modèle assez uniforme, qu'il s'agisse des Cétacés, des Tortues ou des Poissons. Pour les Invertébrés, ce sont des queues aplaties chez les Appendiculaires, des lames membraneuses chez beaucoup de Mollusques, des rames chitineuses, de constitution du reste



Fig. 1. — VÉGÉTAUX MUNIS DE FLOTTEURS.

I. *Macrocytis pirifera* (Agardh), très réduite. — II. *Utricularia vulgaris* (L.), A, portion de la plante, de grandeur naturelle; B, un des flotteurs (gros); C, le même, coupé verticalement. — III. *Fucus vesiculosus* (L.), portion de fronde, grandeur naturelle; f, sac à air. — IV. *Sargassum bacciferum* (Agardh), A, touffe étalée, réduite; B, rameau, grandeur naturelle; f, flotteurs.

pareils locomoteurs servant au transport actif, ou leur conservation chez l'adulte s'ils existaient chez la larve; mais il peut apparaître aussi des dispositions fort diverses qui rendent possible le transport passif; les deux genres d'organes peuvent du reste coexister, ou se remplacer l'un l'autre d'une manière complète, comme j'en donnerai tout à l'heure un exemple dans un seul et même groupe, celui des Siphonophores.

Les appareils locomoteurs peuvent être de types

fort différente, chez les Crustacés et les Annélides; des cloches contractiles chez les Cœlentérés; et parfois d'autres dispositions encore plus singulières, dont nous aurons tout à l'heure à signaler quelques-unes. Enfin, chez divers types de Protozoaires, et presque toutes les larves, sauf celles des Arthropodes, ce sont des prolongements ténus du protoplasme, minces filaments animés d'un mouvement rythmique, et que l'on nomme des fouets ou des cils vibratiles.

Dans le règne végétal cette variété d'appareils n'existe pas : comme agents de locomotion active, on ne peut mentionner que des cils vibratiles, en tout semblables du reste à ceux des animaux, et qui se rencontrent sur les anthérozoïdes et les spores des végétaux inférieurs.

Le transport passif a pour agents les mouvements des eaux ou de l'air, ou bien encore la fixation plus ou moins permanente à des êtres, ou même à des objets flottants. Je ne veux que mentionner ici ce dernier mode de transport, que rien ne distingue de ce qui se passe à terre ou sur les rivages.

de l'atmosphère sur le transport des êtres marins demeure du reste tout à fait exceptionnelle, et nécessite la présence d'un appareil flotteur qui maintienne une partie de l'organisme au-dessus de la surface de la mer. Sans être aussi nécessaires au transport passif par les eaux, ces appareils flotteurs le facilitent beaucoup. Par suite, lorsqu'ils sont bien développés, on constate la réduction ou la disparition des organes locomoteurs. L'animal se trouve alors presque aussi complètement à la merci des courants que le sont les végétaux dont nous parlions tout à l'heure, et qui flottent du reste




Fig. 2. — ANIMAUX MUNIS DE FLOTTEURS.

I. Actinie (*Daetynomias flava*, Les.). — II et III. Siphonophores : II. *Physalia viriculus* (Esch.) ; III. *Porpita mediterranea* (Esch.). A, vu de côté ; B, le disque, ou flotteur, vu en dessus. — IV. Mollusque gastéropode (*Janthina fragilis*, Lamk.). A, l'animal et son radcau, vus de profil ; o, les œufs ; B, *Janthina* construisant son radcau (d'après Lacaze-Duthiers) ; c, coquille ; m, tête de l'animal ; p, son pied, embrassant une bulle d'air b, qu'il va ajouter au radcau r, dont une partie seulement est représentée.

Sans doute, l'Anatife qui se fixe aux bois flottants ou aux pierres poncees, la Tubicinelle et la Coronule qui s'enfoncent dans le cuir des Baleines, comme le Cyame qui se cramponne à sa surface, font partie de la faune pélagique, au même titre que tous les êtres qui vivent dans les prairies flottantes des sargasses comme ils vivraient parmi les algues des rivages. Mais, forcé de restreindre dans des limites assez étroites le cadre de cette étude, je m'attacherai de préférence aux dispositions organiques qui permettent aux animaux de mener, à la surface de la mer, une vie libre et indépendante.

Celles qui rendent possible le transport passif par les eaux, et surtout par les vents, sont dignes d'un grand intérêt. L'action directe des courants

grâce à une disposition essentiellement semblable.

Des appareils flotteurs existent en effet dans le règne végétal. Ils peuvent tirer leur origine de parties fort diverses ; mais ce sont toujours de petites poches remplies de gaz, comme on le voit par exemple chez les Utriculaires et les *Jussieu* des eaux douces, et parmi les espèces marines, pour ne citer que les algues dont nous avons parlé, chez le *Fucus vésiculeux*, la Sargasse et le *Macrocystis*.

Ces poches à air se retrouvent, dans le monde animal, chez plusieurs groupes de Siphonophores ; et pour certains d'entre eux, comme les Physalies, la vessie peut atteindre un volume considérable. Le flotteur des Actinies pélagiques est de même

nature, bien que morphologiquement différent ; le radeau de la Janthine joue également le même rôle. Chez les Vertébrés aussi, il existe très fréquemment un flotteur, constitué chez un grand nombre de poissons par une vessie natale, et chez les animaux à respiration aérienne (Cétacés et Reptiles) par des poumons fort développés.

Pour aider l'action de ces flotteurs ou rendre moins grand le déploiement de force nécessaire aux appareils locomoteurs, le corps, en général, s'allège autant que possible. Chez les Cétacés, ce résultat est principalement obtenu par le développement d'un énorme panicle graisseux, qui a également pour effet de s'opposer à la déperdition de la chaleur. Chez les Invertébrés, on voit souvent le corps se gélifier, au point que sa densité n'est plus que de fort peu supérieure à celle des eaux de la mer : et c'est encore l'explication la plus générale que l'on puisse donner de la transparence extrême que l'on constate chez un si grand nombre d'êtres appartenant aux groupes les plus divers. Il est sans doute difficile d'éliminer absolument des causes de cette transformation remarquable le *mimétisme* (1) et les avantages qu'il entraîne ; mais, il faut pourtant remarquer que la plupart de ces animaux si transparents possèdent des parties teintées de couleurs fort vives, soit quelques viscères, soit tout au moins, chez tous les animaux qui en sont pourvus, les organes visuels, où la présence d'un pigment est du reste indispensable.

De même que le squelette des Oiseaux bons voiliers s'est pneumatiqué, c'est-à-dire creusé de cavités remplies d'air, qui diminuent de beaucoup sa densité sans nuire à sa résistance, celui des Cétacés, devenu semblable en cela comme par d'autres caractères à celui des Poissons osseux, est formé par un tissu lâche, spongieux, à grosses mailles, imprégné de graisse liquide ; et, si les Sélaciens, qui sont toujours dépourvus d'appareil flotteur, ont néanmoins des espèces pélagiques, il est bon de remarquer que le squelette cartilagineux des animaux de ce groupe pèse relativement fort peu. La calcification entraîne nécessairement une augmentation de densité. Aussi les Cœlentérés chez lesquels elle se manifeste cependant d'une manière si fréquente, ne sont-ils représentés à la surface des mers que par des formes absolument dépourvues de tout squelette pierreux. Les Echinodermes (Oursins, Étoiles de mer, etc.) dont les tissus ne tardent pas à s'imprégner de calcaire, n'ont pu fournir aucune

forme à la faune pélagique, toutes leurs larves étant entraînées au fond dès que la calcification commence à se développer. Les Mollusques, eux aussi, sécrètent une substance calcaire ; mais elle ne pénètre pas tous les tissus, et ne forme au corps qu'une enveloppe adventice plus ou moins parfaite. On conçoit donc que cette coquille ait pu diminuer beaucoup de densité, se réduire même parfois à la matière organique qui sert normalement de gangue aux calcifications : ou disparaître enfin, sans laisser la moindre trace chez l'adulte.

Les considérations que nous venons d'exposer permettent d'expliquer l'origine d'une grande partie de la faune pélagique ; mais il faut cependant y joindre une cause sans doute fort active, et partout présente dans le monde organique, je veux dire la concurrence vitale. Elle seule a pu chasser jusqu'au milieu des océans des êtres aussi nettement adaptés à la vie terrestre que les Mammifères, les Oiseaux, et les Insectes. Sans doute aussi son action s'est étendue à bien des êtres marins chez lesquels elle ne se trahit pas avec autant d'évidence ; et c'est en cédant la place à des concurrentes mieux adaptées aux conditions de la vie côtière, que certaines espèces ont commencé l'existence pélagique ; tandis que d'autres, poussées par la même loi, s'en allaient peupler le fond des mers.

On comprend ainsi qu'un très grand nombre de formes diverses puissent faire partie de la faune de surface ; et nous devons maintenant examiner les principaux types qu'a fournis à cette faune chacune des grandes classes du règne animal.

III

Les Vertébrés n'y sont guère représentés, à l'époque actuelle, que par des Mammifères, des Oiseaux et des Poissons. S'il est encore des Reptiles qui vivent à la mer, et que l'on rencontre assez souvent très au large, comme certains Hydrophides parmi les Serpents et plusieurs espèces de Tortues, on ne saurait toutefois les considérer comme absolument pélagiques ; c'est-à-dire vivant toujours en haute mer. Les grands Enaliosauriens de l'époque secondaire, qui menaient ce genre d'existence, n'ont pas laissé de postérité ; et leur rôle est joué, depuis les dernières époques géologiques, par les divers types de *Cétacés* pisciformes. Ces Mammifères, dauphins et marsouins, cachalots ou baleines, se sont complètement adaptés à la vie pélagique et présentent, surtout dans leurs appareils respiratoire et circulatoire, des dispositions fort remarquables. Mais, sans doute, ils ont dû pendant longtemps revenir au rivage, comme le font encore de nos jours les Phoques et les autres Pinnipèdes, avant de pouvoir élever leurs petits même en pleine mer.

(1) On nomme ainsi la ressemblance que, sous l'influence de la sélection, l'organisme acquiert avec le milieu (inerte ou animé) où il vit, et grâce à laquelle il échappe à ses ennemis.

Les Oiseaux en sont encore là. Le nid flottant de l'Alcyon n'est qu'une poétique légende; et ceux de ces animaux qui se sont le mieux adaptés à la vie marine vont encore pondre à terre, comme les Tortues dont nous parlions tout à l'heure. Mais, à part cela, tous les *Pétrels*, de l'Albatros au minuscule *Thalassidrome*, font absolument partie de la faune pélagique, pouvant voler des journées entières sans se reposer, et dormir la nuit sur les vagues.

La plupart des Poissons vivent au fond de la mer, surtout le long des côtes. Au large, on rencontre relativement fort peu de ces animaux. Il faut cependant faire exception pour divers genres de l'active et puissante famille des *Squales*, surtout

parcourir dans l'air des trajets assez considérables, et parfois, entraînés par les vents, venir tomber en grand nombre sur le pont des navires. Contrairement à ce qu'on a soutenu, les nageoires pectorales sont alors animées d'un mouvement vibratoire, que j'ai constaté comme les naturalistes du *Challenger* et du *Talisman*. Fort justement, à mon avis, M. Moseley compare ce vol à celui d'un grand nombre de sauterelles, qui utilisent également une forte impulsion première, entretenue par la réaction de l'air sur les ailes, et qu'elles peuvent maintenir pendant un temps limité. D'autres poissons, moins bons nageurs, peuvent cependant aussi habiter la haute mer en se servant de moyens arti-




Fig. 3. — TUNICIERS.

. *Ciona intestinalis* (L.). Ascidié des rivages, fixée. — II. Les deux formes d'une même espèce de Salpe : A, forme isolée *Salpa demanorata* (Forsk.); B, forme en chaîne, *Salpa mucronata* (Forsk.). — III. *Salpa zonaria* (Pall.). Fragment de chaîne, comprenant cinq individus. — IV. *Pyrosoma giganteum* (Les.). Fragment de coupe radiale du manchon, passant par trois ascidiozoïdes. On voit, en outre, sur la gauche, qui correspond à la face extérieure du cylindre, les extrémités de plusieurs autres, à divers degrés de développement. — V. *Appendicularia sicula* (Vol.). A, l'animal dans sa coquille, vu de profil. B, l'animal isolé, vu de face. — C, l'animal isolé, vu de profil. — Les flèches indiquent partout la direction des courants respiratoires.

pour ceux qui atteignent une grande taille : Carcharias, Rhinodon, Carcharodon, etc. Un autre groupe important de Sélaciens, celui des Raies, qui se compose surtout d'habitants des fonds, a pourtant aussi quelques grandes espèces pélagiques, comme les *Myliobates* et les *Céphaloptères*. La puissance extrême de leur musculature permet à tous ces animaux de se passer de la vessie natatoire dont sont pourvus la plupart des *Poissons osseux* qui mènent la même existence, et qui, presque tous, appartiennent à la division des *Physoclistes*, ou poissons à vessie natatoire close. Les plus remarquables d'entre ceux-là sont les Thons, les Espadons, les Coryphènes et les Naucrates ou poissons pilotes, compagnons ordinaires des grands *Squales*. Tous sont aussi d'excellents nageurs; le développement des nageoires pectorales est même assez considérable chez deux types fort différents, l'Exocet et le Dactyloptère, pour que ces *poissons volants* puissent quitter leur élément naturel,

fiels de soutien. Tels sont le Remora, qui se fixe par une curieuse ventouse au corps des gros poissons, surtout des *Squales*, et l'*Antennarius*, qui sait se faire un nid en reliant ensemble, par un cordon gélatineux, les touffes flottantes des *Sargasses*.

IV

Mais la faune pélagique est surtout riche en Invertébrés. C'est parmi ces êtres que l'on observe les adaptations les plus variées, les couleurs les plus remarquables, depuis la transparence du cristal jusqu'à l'éclat des pierreries les plus brillantes; presque dans chacun de leurs groupes se rencontrent des formes étranges et splendides, qui justifient presque le lyrisme des descriptions qu'on en a données.

Les Tuniciers (fig. 3), que nombre d'auteurs placent immédiatement à côté des Vertébrés, sont principalement représentés dans cette faune par le groupe des *Thaliacés*, qui nous offre à considérer

un curieux mode d'adaptation. Les Ascidies des rivages, qu'elles vivent isolées ou réunies en colonies plus ou moins compactes, sont toujours de petits sacs munis de deux tubes ou siphons, placés à côté l'un de l'autre, et dirigés à peu près dans le même sens. L'eau nécessaire à la respiration de l'animal, et qui charrie aussi les particules nutritives, entre par l'un et sort par l'autre. Un être ainsi fait (fig. 3, I) est évidemment incapable d'une natation active; mais il suffit, pour la lui permettre, d'une modification bien légère. Il n'est, en effet, besoin que de disposer les deux siphons dans deux directions opposées. L'eau aspirée par l'un sort également par l'autre, après avoir traversé une sorte de tonneau sans fond qui renferme, dans ses parois mêmes, à peu près tous les organes de l'animal, sauf quelques appareils réunis en un *nucleus* ordinairement paré d'une brillante couleur. Les cercles du tonneau de cristal sont représentés par des groupes de muscles annulaires, dont la contraction successive détermine la progression du corps par la réaction de l'eau. Aussi a-t-on donné le nom de *Doliolum* à l'un des genres des Thaliacés; mais les plus connus, et surtout les plus répandus, appartiennent à la famille des Salpes (fig. 3, II), qui a fourni le premier exemple bien observé de ce que l'on désigne souvent encore sous le nom de *générations alternantes*. Ces animaux, comme beaucoup des Cœlentérés dont nous parlerons tout à l'heure, se présentent en effet sous deux formes. L'une, isolée (A), bourgeonne une double file d'êtres un peu différents d'elle-même, mais parfaitement semblables entre eux (B). Chacun de ceux-ci porte un œuf, ordinairement unique, dont la gestation lui est confiée, mais qui, en réalité, n'est point produit par lui-même. Cet œuf donne naissance à un nouvel être agame. Après sa mise en liberté, les salpes femelles ou pseudo-femelles développent des produits mâles, qui s'en vont féconder les œufs portés par une autre chaîne. Chacun des agames bourgeonne successivement un grand nombre de ces chaînes (fig. 3, III), qui peuvent atteindre une longueur considérable, et nager rapidement, par l'effet des contractions simultanées de tous les animaux qui les composent.

Le cycle des *Doliolum* est encore plus compliqué; mais la taille de ces animaux reste toujours fort petite, tandis que celle des grandes Salpes peut atteindre jusqu'à 25 à 30 centimètres (pour la forme solée de la *Salpa maxima*). On voit que ces animaux doivent pulluler, d'une façon prodigieuse. La mer en est parfois couverte sur de vastes espaces; et du reste il suffirait pour s'en faire une idée de voir les masses que peut amener sur les côtes une seule tempête. Au commencement de l'année 1881 le port d'Alger et les eaux avoisinantes en furent telle-

ment remplis, que les pêcheurs durent pendant quelques jours renoncer à se servir de leurs filets, immédiatement encombrés par cette gelée vivante.

Chez les *Pyrosomes*, les Ascidiozoïdes, au lieu de demeurer isolés ou de rester unis en longues chaînes, se pressent les uns contre les autres de manière à former un manchon, clos à l'une de ses extrémités, et qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long sur 0 m. 20 de diamètre. Chacun des êtres qui composent la colonie possède un nucléus d'une magnifique couleur de rubis, tandis que tout le reste de son corps est d'une transparence absolue. Les orifices d'entrée de l'eau sont à la surface extérieure, les orifices de sortie à l'intérieur du manchon. Mais les corps, pressés les uns contre les autres, ne jouissent plus d'une contractilité pareille à celle des Salpes; et ce sont presque exclusivement les courants respiratoires qui entraînent lentement la colonie tout entière, dans le sens de son extrémité close (fig. 3, IV).

On voit que Pyrosomes et Salpes, bien que fort différents, se sont cependant adaptés à la vie pélagique par une modification essentiellement de même nature. Quant aux *Appendiculaires*, dont la taille est toujours fort réduite, il leur a suffi de conserver la queue aplatie que possèdent les larves de presque toutes les ascidies simples ou composées (fig. 3, V); et nous voyons ainsi que des animaux du même groupe peuvent arriver au même résultat par des dispositions fort diverses.

Si des considérations tirées de l'embryogénie tendent à placer les Tuniciers dans le voisinage immédiat des Vertébrés, au point de vue de la perfection de l'organisme ce sont certainement les Arthropodes qui se rapprochent le plus des animaux supérieurs.

Ils sont représentés en haute mer par des types appartenant à leurs deux classes principales : les Crustacés et les Insectes.

Ces derniers, manifestement adaptés à la vie aérienne, n'ont qu'un genre dont les habitudes soient nettement pélagiques. Sans doute on pourrait assez souvent, comme l'a fait le naturaliste du *Beagle*, rencontrer au large, et bien vivants encore, des insectes habitués à vivre dans les eaux douces et que les courants auraient emportés à la mer; mais ce ne seraient là que des faits accidentels; et rien ne prouve que ces animaux puissent subsister longtemps dans des conditions si nouvelles. Au contraire les Halobates vivent entièrement à la mer; ils se trouvaient très fréquemment dans les filets de gaze des savants du *Challenger*. Ces Insectes, qui portent leurs œufs attachés à leur corps, ne vivent point à proprement parler dans la mer, mais sur la mer; ils ne nagent point comme certains de nos insectes d'eau douce, mais marchent sur les

eaux comme les Gerrys (fig. 4, I) et les Hydromètres dont tout le monde a pu contempler les ébats sur les rivières et les flaques d'eaux tranquilles; ils doivent se ranger tout près d'eux dans la famille des Hémiptères.

Les Crustacés pélagiques appartiennent à des types fort divers. Les plus élevés en organisation, les Décapodes, sont plutôt organisés pour la marche que pour la natation. A l'exception de ceux qui habitent les prairies d'algues flottantes et trouvent ainsi où se reposer, ces animaux ne vivent guère à la surface que pendant une période plus ou moins longue de leur vie larvaire. Mais, surtout il est

vie entière à la surface; mais ces animaux, assez mal organisés pour la natation, se logent en parasites dans les Méduses, les Salpes ou les Pyrosomes, comme les Hypéries et les Vibilies; ou bien encore, comme les Phronimes (fig. 4, V), dérobent aux Appendiculaires leur petit cylindre de cristal, dans lequel ils pondent et promènent leur jeune famille à la surface des mers.

Mais les Crustacés pélagiques par excellence sont de petits êtres, à peine longs de quelques millimètres, qui nagent à l'aide d'une paire d'antennes énormément développées, et qui appartiennent au groupe des Cladocères et surtout à celui des Copé-




Fig. 4. — ARTHROPODES.

I. *Gerrys rufoscutellata* (Latr.). Insecte hémiptère voisin des halobates; mais les halobates sont aptères. — II. *Cancer pagurus* (L.). Larve Zoé âgée (type de Zoé de brachyure). — III. *Hippolyte varians* (Leach.). Macroure du groupe des caridides : A, larve Zoé; B, larve mysidienne. — IV. *Mysis vulgaris* (Thomp.). Crustacé schizopode. — V. *Phronima sedentaria* (Forsk.), dans sa cloche. Crustacé amphipode. — VI. *Calanella*, crustacé copépode.

vrai dans le voisinage des côtes, les larves Zoés des Crabes (fig. 4, II), et plus encore les larves mysidiennes des Caridides (fig. 4, III, B) se rencontrent en nombre tel, que nous ne saurions omettre de les signaler ici. Ces larves, dites mysidiennes, doivent ce nom à la conformation de leurs pattes thoraciques, profondément bifurquées, et qui constituent des rames puissantes; car cet état, transitoire chez ces animaux, est au contraire permanent chez les *Schizopodes*, dont les Mysis (fig. 4, IV) sont le type le plus connu et le plus abondant. Aussi ces Crustacés, dont quelques uns cependant habitent les grandes profondeurs ou les rivages, se rencontrent-ils fréquemment à la surface, même assez loin de toute terre; les Mysis pullulent même en si grand nombre dans les parages du Groënland que, malgré leur taille de deux centimètres au plus, elles peuvent entrer pour une part importante dans l'alimentation des baleines.

Quelques *Amphipodes* peuvent aussi passer leur

podes (fig. 4, VI), un des plus anciens sans doute de la classe tout entière.

Il est bien rare que, par un temps calme, on puisse prendre seulement un verre d'eau à la surface de la mer sans qu'il s'y rencontre quelque copépode. Malgré leur petite taille, leur nombre est tel qu'ils jouent un rôle important dans la nourriture de la plupart des animaux pélagiques. Plus encore que celle des Mysis, leur multiplication peut être prodigieuse; et l'on en cite souvent pour exemple le *Cetochilus australis*, qui forme parfois dans les mers australes de véritables banes, donnant à l'eau une couleur rougeâtre sur des bandes longues de plus d'une lieue.

Les *Annélides*, si nombreuses et si variées sur les côtes, n'ont qu'un petit nombre de genres véritablement pélagiques. Les formes sexuées des Syllidiens et des Néréides, douées d'appareils natatoires fort puissants, peuvent se trouver accidentellement entraînées au large, comme nous le

disions plus haut; mais toutes les espèces qui passent leur vie entière en mer libre sont comprises dans les deux familles des Phyllodocés et des Alciopes (fig. 5, I, II); ou du moins s'y rattachent aisément, comme les Tomopteris. Ces dernières, presque entièrement dépourvues des soies chitineuses caractéristiques des Annélides, naissent au moyen de larges lames membraneuses (fig. 5, III);

quelques microscopiques *Rolifères*, les singuliers petits êtres auxquels leurs brusques mouvements rectilignes ont valu le nom de *Sagitta* (fig. 5, IV), et la curieuse némerte à laquelle les naturalistes du *Challenger* ont donné celui de *Pelagonemertes*. Cette némerte (fig. 5, V), aplatie en feuille transparente, paraît être seule à représenter en pleine mer le groupe des Rhynchocèles, de même que




Fig. 5. — VERS PÉLAGIQUES.

I. *Vanadis heterochaeta* (C. Vig.). Annélide chétopode, à lames formées de soies. — II. Une rame isolée d'*Alciops microcephala* (C. Vig.). — III. *Tomopteris Kefersteini* (Grell). Annélide chétopode à lames membraneuses; a, une rame isolée. — IV. *Spadella* ou *Sagitta cephaloptera* (Hertw.). — V. *Pelagonemertes Rollstoni* (Mos.). — VI. *Haplodiscus piger* (Weldon). A, l'animal vu de dos; B, coupe longitudinale; b, bouchon; c, cerveau.

mais toutes les autres portent, des deux côtés de chacun de leurs anneaux, un faisceau de soies grêles, qui peuvent se réunir en un étroit pinceau, ou s'épanouir à la volonté de l'animal, en lui fournissant ainsi une rame des plus efficaces. La plupart de ces Annélides, toutes transparentes, sont de taille fort petite. Quelques Alciopiens acquièrent cependant des dimensions plus considérables; l'*Asterope candida* atteint 0^m25 de longueur.

Parmi les autres animaux que l'on comprend sous le nom de Vers, nous citerons seulement, avec

l'*Haplodiscus* (fig. 5, VI), récemment découvert, y représenterait seul celui des Plathelminthes. Deux autres types, bien énigmatiques, sont la *Cæloplana* et la *Ctenoplane*, qui paraissent établir un passage entre les Planaires et les Cténophores; mais ces animaux sont encore trop peu connus pour que l'on puisse se prononcer à leur égard; et la parenté des deux groupes semble tout à fait problématique.

Camille Vigüier.

Directeur de la Station zoologique à Alger.

(La fin prochainement.)

LE CHOLÉRA EN ESPAGNE ET LES MESURES PROPHYLACTIQUES

Le choléra vient de faire une nouvelle apparition en Espagne. S'agit-il d'une importation récente, ou bien la maladie est-elle en quelque sorte née de ses cendres? C'est là une question difficile à trancher. Une enquête minutieuse serait probablement impuissante, surtout dans cette Péninsule, à résoudre le problème. Il est certain que cinq années se sont écoulées depuis la dernière épidémie, et l'on admet généralement que, passé ce temps, il est nécessaire d'introduire à nouveau le germe de la contagion puisé à ses foyers endémiques de l'Inde. Toutefois il n'est que juste d'avouer que, malgré les recherches actuelles, nos connaissances relatives à la durée et à la vitalité des virus sont encore fort embryonnaires. On ne peut, en tous cas, s'empêcher de réfléchir à deux

faits: c'est que d'abord le fléau frappe les villages atteints en 1885; secondement personne ne connaît en Europe un foyer cholérique capable d'avoir contaminé la province de Valence; personne jusqu'à ce jour n'a signalé le mode certain d'importation.

Le gouvernement français s'est hâté avec juste raison de prendre les mesures utiles pour la préservation du territoire. Il est équitable de dire que son action a été prompt; voyons comment elle s'est exercée:

Les chemins de fer rapprochant les distances, on a, avant toutes choses, établi des postes sanitaires à Cerbère et à Hendaye. Le personnel de ces postes se compose de docteurs en médecine directeurs, assistés d'étudiants empruntés pour la plupart aux Écoles et Facultés du Midi. Des commis-

saïres de police spéciaux et leurs inspecteurs s'occupent de l'administration; les diverses autorités, douane, gendarmerie, compagnies de chemins de fer, municipalités, ont été invitées par les ministères dont elles dépendent respectivement à prêter le concours le plus empressé. Dans chaque poste existe un lazaret pourvu de lits en nombre variable suivant l'importance du passage. Ces lazarets sont munis de tous les médicaments et solutions antiseptiques prescrits par le Comité d'hygiène de France. Des aides entretiennent le matériel et le local dans un état de propreté parfaite.

Quand un train arrive, les voyageurs sont contraints par la douane ou la gendarmerie à pénétrer tous sans exception dans l'intérieur de la gare; en passant par une porte unique; cette porte donne sur un couloir à l'extrémité duquel est placé un factionnaire ayant mission de faire défiler un à un chacun des voyageurs, qui passent alors devant les médecins. Ces médecins les examinent sommairement en se préoccupant spécialement de l'état des voies digestives. Si quelqu'un leur paraît souffrant, ils le retiennent pour l'examiner à nouveau et plus complètement; au besoin, ils ordonnent son transport à l'infirmerie, à l'aide d'un brancard. Si, au contraire, et c'est le cas le plus fréquent, les passagers se portent bien, les médecins les laissent aller. Les voyageurs ont alors affaire aux inspecteurs du commissaire de police. A l'aide des papiers et des billets, ces inspecteurs établissent rapidement un passeport sanitaire mentionnant le nom de la personne, son point de départ et le lieu d'arrivée. Ce passeport doit être remis au maire de la localité dans laquelle se rend le voyageur, ou encore au préfet de police, s'il s'agit de Paris. Quiconque ne remplit pas cette formalité est passible de peines sévères édictées soit par la loi du 3 mars 1822, soit par de récents décrets; je dois ajouter qu'au moment où ils subissent la visite, les passagers peuvent prendre aisément connaissance de toutes les prescriptions concernant le régime sanitaire, prescriptions qu'on a pris le soin de faire afficher dans la gare. Néanmoins, pour que les choses marchent plus régulièrement et plus sûrement, un second passeport est dressé, et ce dernier est expédié directement au maire à l'insu de la personne intéressée. Or, à l'arrivée de cette dernière, le maire est tenu de lui envoyer pendant cinq jours un médecin. Dans le cas où le porteur du passeport descend avant d'arriver au lieu qu'il a fixé, les agents des compagnies, chefs de gare, chefs de trains, sont obligés de le signaler aux autorités.

On doit considérer l'établissement de ce double passeport comme un réel progrès. Cette formalité n'apporte aucune entrave à la libre circulation; elle ne cause pas un instant de retard. En

revanche, si l'on tient compte du temps moyen qui s'écoule entre le moment où le voyageur quitte par exemple Valence et celui où il arrive à Clermont, Lyon, Paris, Orléans, on reconnaît que la durée de la surveillance est de sept à huit jours. Si, en franchissant la frontière, ce voyageur était porteur du germe cholérique dans ses entrailles, sans manifestation extérieure, si, en d'autres termes, le choléra était chez lui en incubation, cette sorte de mise en observation qu'il subit permettrait de reconnaître le mal dès les premiers symptômes; dès lors il deviendrait plus aisé d'isoler le malade avec promptitude et de circonscrire le fléau.

Lorsque les passagers ont reçu leur passeport sanitaire, il leur reste encore une formalité à remplir. Ils sont contraints de déclarer au commissaire spécial tout linge ou tout objet contaminé qui peut se trouver dans leurs bagages; le commissaire de police assisté de plusieurs aides procède d'ailleurs à la visite des malles. Cette opération n'entraîne pas grand inconvénient, puisque Hendaye et Cerbère sont des gares de douane. Les effets contaminés de chaque personne sont réunis en paquet; à chaque paquet on fixe un numéro métallique dont on remet le double au propriétaire. Ces paquets sont immédiatement portés à une étuve Geneste-Herscher qui se trouve placée à quelques mètres seulement de la salle de visite. Cette étuve, grâce à la fixité des heures des trains, est prête à fonctionner à l'instant voulu, de sorte qu'en quelques minutes, les linges sales sont soumis à une température de 120°. On les rend immédiatement après, contre l'échange du numéro, à leur possesseur qui peut constater facilement leur parfait état de conservation. Toutes ces opérations s'exécutent avec une grande rapidité, et l'arrêt réglementaire qui a lieu même en dehors des temps d'épidémie suffit, sauf exception, pour terminer la visite.

Outre les postes des voies ferrées, quelques autres on été établis sur des routes passant de France en Espagne, au Perthus, à Bourg-Madame, etc. On aurait pu craindre, que pour échapper aux visites de Cerbère et d'Hendaye, les voyageurs, après avoir quitté le train peu avant la frontière, ne cherchassent à pénétrer sur le territoire français en suivant une des voies de terre plus ou moins voisines. Ces craintes ne paraissent pas s'être réalisées; cela tient d'une part à ce que les mesures prises ne sont en rien vexatoires; cela tient d'autre part à ce que pareil mode de voyage coûterait et plus de temps et plus d'argent. Néanmoins les postes des routes ont à surveiller un certain nombre de passagers, et leur importance, bien inférieure à celle des postes d'Hendaye et de Cerbère, croîtrait rapidement si l'épidémie venait à se rapprocher des Pyrénées. En prévision, du reste,

de ce rapprochement, plusieurs d'entre eux, qui avaient fonctionné en 1885, ont été préparés. Les locaux, les aides, les médecins, tout est désigné, et, si besoin est, un ordre du ministère peut les mettre en activité dans les vingt-quatre heures. Si on ne les a pas réouverts dès maintenant, c'est que la plupart, comme Arles-sur-Tech, Montlouis, Merens, Bordes-sur-Lez, Seix, etc., ne surveillent que des voies qui, en Espagne, se réduisent à de véritables sentiers muletiers. Etant donné ce que nous disions plus haut, à savoir la grande distance qui sépare le siège actuel de l'épidémie des Pyrénées, il faudrait supposer une singulière résistance à un cholérique, ou encore une incubation d'une longueur inusitée, pour que le mal put pénétrer par ces fissures. L'utilité de ces postes de troisième ordre paraît donc nulle pour le moment, et, d'autre part, il convient de songer aux dépenses qu'entraîne le fonctionnement d'un poste sanitaire. Je dois ajouter que l'installation et le fonctionnement de ces postes de routes sont calqués sur ce que nous avons dit à propos de Cerbère. Il existe de véritables cadres d'un essai de mobilisation sanitaire. Toutefois, les postes secondaires sont encore dépourvus d'étuves, étant donné le prix élevé de ces appareils. La désinfection du linge s'y opère par l'eau bouillante et les solutions antiseptiques, suivant les prescriptions du Comité consultatif.

Les frontières de mer n'ont pas été oubliées par le gouvernement, et, dans les ports de la Méditerranée en particulier, les directions de la santé ont imposé de rigoureuses quarantaines et de sévères mesures de désinfection. De récents décrets ont prohibé l'importation de tous les fruits ou légumes poussant dans le sol ou au niveau du sol, car cette catégorie de produits alimentaires est exposée à être contaminée par l'eau des villes ou villages frappés par l'épidémie. Cette prohibition a eu une application toute spéciale et des plus utiles pour le petit port de la Nouvelle situé dans le département de l'Aude. Chaque année, de mai à juillet, ce port reçoit de quarante-deux à quarante-six bateaux presque uniquement chargés de tomates, à raison de quatre à cinq mille kilos par bateau. Or l'immense majorité de ces embarcations vient des ports de la province de Valence. Avant l'apparition des décrets, une assez grande quantité de tomates avait pu être débarquée et placée en magasins, quelques-unes même avaient déjà été vendues; on a dû faire saisir ces dernières sur les divers marchés du Midi, et l'on a détruit par le feu les approvisionnements réunis à la Nouvelle.

De nouvelles prohibitions ont interdit l'entrée des objets de literie, matelas, couvertures, des peaux, des chiffons, des drilles, etc.; d'après des mesures prises à Cerbère, les os, les cages vides,

mais destinées à être remplies d'animaux divers ne pénétrant qu'à la condition de ne pas répandre d'odeurs. Assurément il ne faut pas attribuer aux mauvaises odeurs tous les méfaits dont on a coutume de les accuser. Cependant il est nécessaire de reconnaître qu'en temps d'épidémie elles impressionnent péniblement le moral des populations; or ce point de vue ne doit en rien être négligé. Du reste on sait que certains gaz fétides sont capables d'engendrer des désordres intestinaux.

Telles sont rapidement résumées les principales mesures sanitaires prises par le gouvernement français dans le but de préserver du choléra qui sévit en Espagne le territoire de la République. Ces mesures sont simples, rapides, et n'attendent en aucune façon à la liberté des voyageurs; leur application ne réclame ni perte de temps, ni perte d'argent. Personne n'a le droit de se récrier; du reste, pourquoi se plaindrait-on? Si on est malade, on est soigné dans d'excellentes conditions; si on possède des objets contaminés, qui pourraient être dangereux pour leurs propriétaires comme pour les autres, ces objets subissent sans aucun dommage une désinfection absolue. C'est donc dire que, de toute façon, on rend service. Quant aux personnes bien portantes et qui sont du reste l'immense majorité, elles passent sans encombre et reprennent leur train sans subir de retard.

Les quarantaines maritimes sont possibles, faciles même dans certaines conditions. Les quarantaines terrestres sont impossibles, dangereuses. On ne peut, d'une part, étant données nos mœurs tirer, comme on l'a fait lors de la peste d'Astrakan et ailleurs, sur ceux qui fuiraient; d'un autre côté, ces lazarets deviennent des foyers de culture et de rayonnement. Dans ces conditions, il convient d'insister à nouveau sur les perfectionnements du service de santé publique. Les deux plus importants sont d'abord l'installation aux points principaux des étuves Geneste-Herschler; c'est, en second lieu, l'établissement du passeport en double. Les visites occasionnées par cette mesure se sont élevées à Paris à trois cents par jour.

Il est à peine besoin de dire que toutes les semaines chaque Directeur de poste adresse un rapport sur les principaux événements survenus durant les huit derniers jours et sur les modifications ou améliorations possibles. Le contact est perpétuel entre l'administration centrale et la frontière. Nous ajouterons en terminant, que déjà l'Espagne a envoyé plusieurs délégués à Cerbère. Tous ont fait de notre organisation le plus grand éloge. La France, suivant eux, a trouvé le moyen de faire vite et bien.

D^r A. Charrin

Directeur des postes sanitaires.

REVUE ANNUELLE DE CHIMIE PURE

La *Revue générale des Sciences* n'a pas une année d'existence; elle n'est pas liée par des précédents: elle crée ses traditions, et la *Revue de Chimie* qu'elle publie ne saurait être astreinte à énumérer seulement les progrès réalisés depuis quelques mois. Souvent on entend dire: nous vivons dans une période de transition; c'est une vérité naïve, car les choses changent tous les jours à notre insu, et la transition prétendue n'est que le résultat du contraste qu'on établit entre les faits anciens et présents sans tenir compte des intermédiaires. Il en est un peu des progrès de la science comme des variations de la mode dont on ne reconnaît l'influence qu'en regardant les vignettes d'il y a vingt ans.

Qu'il nous soit permis, pour commencer, de négliger le détail des acquisitions récentes au profit des solutions déjà anciennes et surtout de signaler, si cette tâche n'est pas trop ardue, les idées vers lesquelles tend la Chimie, celles qui lui donnent sa caractéristique actuelle.

I. — CHIMIE GÉNÉRALE





Il y a depuis quelques années, dans toute l'Europe, une tendance manifeste vers la Chimie générale, jadis si négligée d'un commun accord. Les questions de dissociation, de thermo-chimie, d'électrolyse, d'optique chimique donnent lieu à un nombre tel de travaux, qu'il s'est fondé il y a quatre ans un recueil spécial, le *Zeitschrift für Physikalische Chemie*, qui a, par sa collaboration, un caractère international. Les prodigieuses découvertes de la Chimie organique pure de 1840 à 1880 ont déterminé un courant à peu près exclusif en faveur de cette partie de la science, plus faite que la Chimie générale pour exciter l'enthousiasme, la passion chimique, qui peut être pour certaines natures une forme de la passion du jeu.

La Chimie organique nous met à même d'aborder les problèmes en nombre infini qui touchent aux phénomènes de la vie; par elle la pensée et la main de l'homme ont pu refaire les couleurs, les poisons et les parfums que la nature élabore; ce but synthétique lui assure la durée. Mais ce qu'il y a de plus élevé et de plus intéressant dans la chimie organique, c'est la création des méthodes générales qui rendent relativement facile et banale cette formation d'innombrables corps nouveaux, dont la production indéfinie constitue l'un des attraits secondaires de la science. C'est par ce point des méthodes que la Chimie organique prend contact avec la science générale, parce que, pour avancer, il lui faut une connaissance plus profonde

des propriétés et de la structure des molécules.

Aussi le caractère dominant du temps présent consiste-t-il dans l'évolution physique de la Chimie, évolution à laquelle prend part même la Chimie organique qui en paraît si éloignée. En Chimie organique, on s'est contenté, pendant de longues années, de formules représentant simplement les rapports de poids des combinaisons. La benzine, par exemple, n'était connue sous aucune autre formule que C^6H^6 . Bientôt on vit que l'hydrogène était remplaçable par sixièmes au moyen du chlore: quand un seul sixième d'hydrogène était remplacé par cet élément, le *dérivé* monochloré résultant, C^6H^5Cl était toujours identique à lui-même par toutes ses propriétés, de quelque manière qu'on l'eut préparé.

La formule C^6H^6 suffisait pour expliquer ce fait. Mais on put établir par la suite que lorsque deux sixièmes d'hydrogène, H^2 , étaient remplacés par Cl^2 , le *dérivé* bichloré résultant, $C^6H^4Cl^2$, pouvait, selon les conditions de l'expérience, être obtenu sous trois états différents par leurs propriétés physiques et chimiques, malgré l'identité de leur composition. Ce seul fait d'*isomérisie*, important il est vrai, montrait que la formule abstraite C^6H^6 avait fait son temps. M. Kékulé imagina alors une formule graphique *plane* ayant une symétrie *ternaire*: c'est le célèbre hexagone de la benzine dont on a numéroté les sommets:



Les préfixes ortho, méta et para, comme les nombres 1-2, 1-3, 1-4, représentent des positions déterminées sur la figure. Il est clair qu'une telle formule de la benzine non seulement admet, mais

exige ces trois isomères, qui ont si fort exercé la sagacité des chimistes, et n'en comporte pas plus. Jamais on n'a pu faire une observation chimique en désaccord avec cette règle, qui n'est assurément pas une des vérités de la nature, mais qui répond assez bien au degré de complexité du fait : isomérisme chimique des dérivés benzéniques. Ce fut là un immense progrès qui, venant après les travaux de M. Berthelot sur la glycérine et de Wurtz sur l'acide lactique, permit de généraliser les *formules de constitution* ou formules développées, toujours supposées planes, et construites avec des atomes de carbone doués d'une capacité de saturation égale à quatre (carbone tétratomique). On conçoit que pour tous les corps de la chimie on ait établi des formules de constitution représentant exactement les réactions connues de ces corps et se discutant en apparence comme des formules d'algèbre.

Mais on a constaté que certains corps avaient des propriétés physiques et même chimiques différentes, alors que leur formule de constitution était démontrée indubitablement identique. Pressés par un nouveau besoin de progrès, les chimistes ont pensé qu'il n'était guère philosophique de supposer les molécules ou les atomes fixés sur une surface sans épaisseur; on élargit la notion de position relative sur laquelle sont fondées les formules de constitution plane : on admit les *formules dans l'espace*. L'étude de ces formules figurées à trois dimensions a pris récemment, en Allemagne, le nom de *stéréochimie*. C'est un mot tout neuf pour une idée déjà vieille, car c'est en 1860 que M. Pasteur, dans son célèbre travail sur les acides tartriques présentant des facettes à droite ou à gauche, formula pour la première fois cette idée que la dissymétrie des cristaux est peut-être due à la position de leurs molécules sur des hélices tantôt *dextrorsum* tantôt *sinistrorsum* ou aux sommets d'un tétraèdre régulier. En 1874, Wislicenus, dans un travail sur les acides lactiques, reconnut une différence de propriétés pour deux corps de même constitution, ce qu'il attribua à la position des atomes dans l'espace. Les divergences de propriétés qu'on remarque entre deux corps de constitution identique sont le plus souvent d'ordre cristallographique, s'ils sont solides, et, sous les trois états physiques, des variations de propriétés optiques, notamment de pouvoir rotatoire droit, gauche ou nul. L'existence de ces variations, même dans les liquides et les vapeurs, montre qu'elles sont inhérentes aux molécules, car on ne peut invoquer là des actions élastiques à symétrie spéciale.

MM. Le Bel et Van't Hoff ont accru et précisé considérablement nos connaissances sur ce sujet intéressant; ils ont édifié toute une théorie des for-

mules dans l'espace, théorie hypothétique, il est vrai, comme toutes les théories, mais souvent consacrée par le succès expérimental, qui est la vérité même. Voici en quelques mots l'idée fondamentale de la stéréochimie. Le carbone est un élément dont l'atome (peut-être sphérique) est placé au centre d'un tétraèdre régulier; son action chimique s'exerce selon les quatre sommets du tétraèdre qui deviennent en quelque sorte autant de pôles d'affinité. Les formules stéréochimiques de quelques matières assez simples prises comme exemples sont les suivantes :




Fig. 1. — Méthane.




Fig. 2. — Ethane.





Fig. 3. — Ethylène.




Fig. 4. — Acétylène.

Ces figures donnent une idée suffisamment claire des formules dans ce mode de représentation. La conception du carbone tétraédrique ne s'est bien développée qu'à la suite de cette observation faite par MM. Le Bel et Van't Hoff que, dans la formule de constitution de tout corps doué du pouvoir rotatoire, il existe au moins un atome de carbone saturé dissymétriquement : ainsi l'un des corps les plus simples comme formule, parmi ceux qui font tourner le plan de polarisation de la lumière, est l'acide lactique



dans lequel tous les groupes saturant un même carbone sont dissemblables. Les corps dont la satu-


ration a deux valeurs symétriques sont par contre sans action sur la lumière polarisée. Exemples :



Il résulte de tout ceci qu'à la simple inspection d'une formule de constitution, on peut prévoir s'il y aura ou non pouvoir rotatoire. C'est là un résultat théorique et expérimental absolument acquis.


Il est admissible que si l'atome de carbone était parfaitement symétrique dans sa forme et dans son mouvement, les groupes CO^2H , H , OH , CH^3 , si fréquemment réunis selon les positions les plus diverses dans les molécules non rotatoires, n'auraient aucune influence.

Cette considération a fait reprendre l'idée du tétraèdre. Dans cette notation, si l'on ne représente que le tétraèdre *asymétrique*, l'acide lactique devient




Dans une semblable molécule on ne peut faire passer aucun plan partageant le tétraèdre en deux moitiés symétriques. Aussi conçoit-on que, si la lumière qui aborde la molécule est polarisée dans un plan donné, ce plan soit dévié à droite ou à gauche selon que l'action du groupe substituant de gauche ou de droite sera prééminente.

Dans cette théorie, lorsque deux tétraèdres sont liés par un sommet, comme dans l'acide tartrique,



on peut admettre que le signe de la rotation sera dû à la position de deux groupes particuliers par rapport à un plan de symétrie :



Même pour un corps rotatoire donné, droit ou gauche, ce signe pourra graduellement diminuer, puis

changer, si l'on augmente progressivement le poids atomique de l'un des groupes substituants : dans ce cas la molécule bascule véritablement sur son axe.

Ce dernier résultat, si intéressant comme argument à l'appui des conceptions qui précèdent, a été obtenu par M. Ph. A. Guye, qui prochainement traitera ici de la stéréochimie avec l'autorité d'un spécialiste. Je me borne à en faire une introduction élémentaire. Mais avant de quitter ce sujet, il convient d'effleurer quelques-unes des questions qu'on se pose dans cette stéréochimie encore bien obscure.

Nous avons avec la majorité des auteurs supposé régulier le tétraèdre de combinaison du carbone. Mais est-il logique d'admettre que les groupes substituants qui ont l'affinité la plus grande n'approchent pas plus de l'atome central que les autres ? Ils intercepteraient ainsi un plus grand nombre de paramètres sur les directions de combinaison du tétraèdre qui deviendrait irrégulier. M. Le Bel, très autorisé en pareille matière, fait nombre de réserves sur ce point ; derrière la notion du tétraèdre qu'il conserve, on sent poindre dans ses écrits une théorie dynamique des combinaisons carbonées. Là se trouve, croyons-nous, la vérité, car dans les choses de la chimie où la chaleur dégagée, les vitesses de réaction, les spectres, etc... nous indiquent partout le mouvement, on ne peut regarder comme définitive la notion jusqu'à ce jour statique du tétraèdre. En effet on se demande encore si les deux tétraèdres de la figure 2 sont fixes ou tournent sur leur axe. On peut supposer avec plus ou moins de probabilité que l'atome de carbone est un tétraèdre ; mais c'est une idée singulière que celle de ce tétraèdre fictif, qui n'est pas le carbone lui-même, et qu'on a fini par concevoir et décrire comme un pur assemblage de lignes, de directions d'affinité. On imagine un atome de carbone de forme indéterminée embusqué en quelque sorte au centre d'un tétraèdre réduit à ses lignes et tendant vers l'espace quatre bras qui font entre eux des angles de $109^{\circ}28'$.

Sans savoir en aucune manière si la vérité absolue est de ce côté, il paraît évident qu'une théorie dynamique de la combinaison calquée sur la cosmographie donnera, dès qu'on aura assez de prise sur les phénomènes pour l'établir, un grand nombre de coïncidences avec les faits.

Le but idéal et lointain de la Chimie n'est pas de faire de cette science une mosaïque pleine, un emboîtement plus ou moins compliqué de divers polyèdres, mais d'établir pour elle des lois analogues à celles de Képler et de Newton. Il semble qu'une telle théorie cosmographique de la chimie ait déjà préoccupé les esprits au commencement de ce siècle ; assurément les tétraèdres ne font que préparer les voies aux orbites.

La Chimie générale dans ces dernières années a fait une acquisition des plus précieuses : celle de la théorie dynamique des solutions étendues. Nous n'avons pas à revenir sur cet important sujet déjà traité ici-même (1). Mais peut-être est-il bon de dire que par le fait de cette science nouvelle et par les résultats qu'on est en droit d'en attendre, la Chimie se trouve directement reliée aux formules de la théorie mécanique de la chaleur. C'est là un rapprochement qui ne manquera pas d'être fructueux, car si les formules mathématiques qui représentent les actions physiques — et maintenant chimiques fondamentales, — ne peuvent s'établir qu'à la suite des découvertes de l'expérience, ces formules convenablement transformées montrent entre les faits des relations qui étaient restées inaperçues. A son tour l'équation réagit sur le fait expérimental. C'est par cette voie que se font aujourd'hui de nombreuses recherches et vérifications avec les formules de MM. Van der Waals et Sarrau, Gibbs et Le Châtelier, etc... Malheureusement, pour ces recherches on ne peut utiliser les corps nombreux que font les chimistes : il faudrait avoir des séries de déterminations numériques bien faites, portant sur les principaux corps simples et quelques-uns de leurs composés. Ce genre de travail est en assez grande défaveur, ce qui se conçoit du reste, car il est fastidieux. Sans difficulté et sans intérêt immédiat pour celui qui le produit, c'est du travail utile, et rien de plus. Il serait désirable pour la science, qu'il y eût des laboratoires dotés uniquement en vue de la production de documents numériques bien codifiés, quelque chose d'analogue aux bureaux d'employés aux écritures.

Les formules thermodynamiques appliquées avec tant de succès par MM. Van't Hoff et Arrhénius aux solutions étendues n'ont pas donné de résultats appréciables pour les solutions concentrées et n'expliquent pas le fait de la saturation donnant à chaque température des valeurs qui, portées comme ordonnées sur un graphique, constituent les courbes de solubilité.

L'auteur de cet article a montré que, si au lieu de représenter sur des courbes la quantité de sel que 100 p. d'eau peuvent dissoudre, on prend la quantité de ce sel contenue dans 100 p. de la solution saturée, cette notation simple conduit à des droites de solubilité qu'il est plus aisé d'étudier. D'ailleurs, dans ce système, les ordonnées qui représentent la quantité de sel, au lieu de varier de zéro à l'infini, sont nécessairement comprises entre 0 et 100° et l'on peut suivre du regard un graphique complet. Il résulte de cet examen qu'une droite de solubilité peut être connue dans toute son étendue

entre le point de congélation de la solution et le point de fusion ignée du sel. De ce dernier fait, l'auteur a tiré une conclusion nouvelle : à savoir que « la droite de solubilité est le lieu des points de fusion de mélanges de sel et d'eau. » La saturation dépendrait ainsi des lois qui régissent les fusions.


II. — CHIMIE INORGANIQUE

La Chimie inorganique est relativement délaissée. Le temps de la chimie par voie sèche, de cette belle chimie en creusets et en tubes de porcelaine que faisaient Ebelmen, Sainte-Claire-Deville, Wöhler, Roscoe, Frémy est passé. Il semble qu'on n'ait plus assez de temps dans une vie devenue, dit-on, moins facile pour s'occuper d'expériences forcément lentes. En observant sur un laps de temps assez considérable, on constate cependant d'importants progrès accomplis en chimie minérale.

La classification des corps simples d'après M. Mendeleef est, comme on sait, fondée sur la disposition continue des poids atomiques par ordre de valeurs croissantes; nous reproduirons un fragment de cette table parce qu'elle a été le point de départ de nombreux travaux récents :

Li = 7	Na = 23	K = 39	Cu = 63
Be = 9	Mg = 24	Ca = 40	Zn = 65
B = 11	Al = 27	Sc = 44	Ga = 69
C = 12	Si = 28	Ti = 48	Ge = 72
N = 14	P = 31	V = 51	As = 75
O = 16	S = 32	Cr = 52	Se = 78
F = 19	Cl = 35.5	Mn = 55	Br = 80

La classification ainsi comprise a donné une idée plus nette de l'analogie de propriétés des corps simples. A ce point de vue elle a peut-être diminué nos espérances sur la variété des combinaisons à trouver dans l'avenir : la plupart des corps sont destinés à donner bien peu de dérivés vraiment spécifiques. Mais la classification précitée a provoqué un important mouvement de vérification des poids atomiques. Par la voie chimique on a purifié plusieurs corps et fixé définitivement les poids de l'or, du platine, du palladium, de l'osmium, etc... On fera bien de ce défi des valeurs que donnent à ces matières les mémoires anciens ; par la voie physique, M. V. Meyer a pu prendre des densités de vapeur jusqu'à la température de 1,300° où la porcelaine se ramollit. Ces densités ont fixé la formule de diverses substances minérales composées ; elles ont montré que les molécules des corps simples se dissocient à haute température, mais nous ont bien peu fait avancer dans la question obscure par excellence : celle de l'atmicité ou valence des éléments. La capacité de combinaison des corps simples varie selon des lois tout à fait inconnues et la chaleur influe notablement sur elle. Selon la température, un chlorure métallique peut avoir l'une des deux formules :



(1) *Revue générale des Sciences*, 15 avril 1890, p. 193.

et le métal M sera tétra ou triatomique. On peut croire que la question est facile à trancher par la prise de densité de vapeur; il n'en est rien : cette densité varie trop avec les conditions thermiques pour qu'il soit possible de faire un choix certain entre les nombres fournis par l'expérience. Un cas heureux cependant a été celui de l'uranium auquel on donnait, il y a quelques années, le poids atomique 120 et qui doit prendre, comme le pensait M. Mendeleef et comme M. C. Zimmermann a pu le démontrer, la valeur 240.

L'uranium est actuellement le corps dont le poids atomique est le plus élevé : il termine la table continue du savant chimiste russe. C'est un fait remarquable que tous les poids des matières élémentaires se suivent de très près; aussi se demande-t-on, sans qu'aucune réponse soit intervenue encore, si le nombre de ces substances est très considérable, si au delà de l'uranium de nombreux corps seront découverts par la suite. En attendant, on a isolé quelques éléments nouveaux qui sont venus annuler les discontinuités de la série à nombres rapprochés que nous venons d'écrire.

Parmi ces corps simples, qui sont soulignés dans le tableau, le Gallium de M. Lecoq de Boisbaudran et le Germanium récemment découvert par M. Winkler comblent la lacune de dix unités existant entre $Zn = 65$ et $As = 75$. Ces intercurrences, prévues maintenant et attendues, font le succès de la théorie, mais en d'autres points l'abondance des corps simples lui est un grand inconvénient. Le groupe des métaux de la Cérîte et de l'Yttria tend à disloquer le tableau, comme l'a montré M. Demarçay dans l'étude qu'il a récemment publiée sur les *terres rares* (1). En raison de la compétence de ce savant, nous ne pouvons faire mieux que de renvoyer à l'article si intéressant où il expose la complexité du sujet et le rôle que tend à jouer dans la chimie minérale l'étude de ces éléments.

En chimie minérale encore une question importante a été élucidée : celle du Fluor. Le fluor était un de ces éléments un peu légendaires — comme il y en a encore quelques-uns — auxquels on croit sans les avoir vus. Celui-ci surtout causait une certaine irritation de curiosité en raison des tentatives vaines dont il avait été l'objet. M. Moissan a isolé le fluor par la méthode physique de l'électrolyse; nous n'avons pas à décrire cet élément; mieux vaut suivre la description donnée par l'auteur (2) qui a, chemin faisant, découvert une dizaine de gaz nouveaux et rendu son travail définitif en le complétant par les déterminations du spectre, de la densité, etc.. Quand on sait la réalité d'une chose,

on regrette presque le temps où elle nous tenait en haleine. Le fluor disparaît de la liste des problèmes qu'on se flattait de pouvoir peut-être résoudre. Il n'y aura plus que des travaux secondaires à poursuivre sur ce sujet.

Il est sur un progrès dont la Chimie inorganique a beaucoup bénéficié : c'est celui de l'industrie électrique. Le courant électrique est un agent puissant de séparations chimiques; on peut même dire qu'il est irrésistible et que toute combinaison, quelle que soit sa stabilité, peut être dissociée par lui. Autrefois dans les laboratoires on avait les ennuyeuses batteries de piles qui marchaient rarement; les procédés de mesure étaient aussi peu pratiques et l'on parlait simplement de courants forts, énergiques, moyens... Aujourd'hui bien des laboratoires sont outillés pour produire de l'électricité ou avoir des accumulateurs ainsi que des instruments de mesure simples, gradués sur cadran en volts et ampères. Aussi est-ce une tendance générale dans les opérations de chimie de se servir du courant. On cherche à se familiariser avec ce genre de travail qui ne laisse pas encore que d'être compliqué, car il faut doser l'électricité en fonction des résistances physiques du milieu et de la résistance propre que le composé oppose à sa séparation. L'industrie est arrivée à faire pratiquement des tonnes de cuivre pur par électrolyse et des quintaux de magnésium et d'aluminium en décomposant les chlorures fondus de ces métaux. Cette production réagit sur la chimie inorganique d'une autre façon : elle met à bon marché entre les mains des chimistes l'aluminium et surtout le magnésium qui est un précieux agent de réduction.

III. — CHIMIE ORGANIQUE.

Dans des articles spéciaux on peut parler avec exactitude; mais on éprouve quelque confusion à écrire sous le titre exigeant de Revue de chimie quelques colonnes seulement devant théoriquement traiter de tout et ne contenant en fait que des ébauches. Ce sentiment est encore plus vif quand on se propose de résumer dans le peu de lignes qui restent spécialement consacrées à la Chimie organique les milliers de pages qu'elle fait écrire bon an mal an.

La Chimie générale intéresse un nombre croissant de savants; elle est sans doute la science de demain; mais l'organique est encore maîtresse aujourd'hui : elle tient comme nombre la tête des publications. Le journal le plus spécialement consacré aux réactions organiques, les *Berichte der Chemischen Gesellschaft*, a publié, en 1888, 3.588 pages de mémoires originaux et 1159 pages d'extraits, soit en tout 4.747 pages. Il s'y publie des travaux de premier ordre : ceux de MM. Baeyer,

(1) Voyez la Revue du 15 juillet 1890, page 396.

(2) Revue gén. des Sciences, p. 366.


Fischer, V. Meyer entre autres; mais on y imprime une multitude de travaux qu'on fait pour le plaisir de les faire, sans but, sans chercher à démontrer quelque chose, à éclaircir une question générale. Ces expérimentations, qui d'ailleurs paraissent le plus souvent bien faites, doivent constituer les reliefs de recherches industrielles sur les matières colorantes ou des exercices universitaires tendant vers une thèse. Il serait peut-être plus intéressant de suivre les progrès de notre science sans ce contingent énorme de substances faites par substitution, c'est-à-dire par une méthode qui est l'âme même de la chimie organique, qui en a fait la grandeur, mais nous réserve de moins en moins de surprises. Cette méthode rappelle ce qu'on exécute sur le damier quand, enlevant un pion noir, on fait passer dans le jeu adverse divers pions blancs.

On arrive aujourd'hui à faire en chimie organique presque tout ce qu'on veut. On dessine sur papier la molécule singulière, compliquée, à laquelle on voudrait donner l'existence, et le plus souvent après deux mois — ou des années — de transformations, elle sort en réalité de quelque vase du laboratoire. La représentation théorique s'est si bien modelée sur l'agencement expérimental qu'on peut, en s'en donnant la peine, souder en tel ou tel point d'une molécule une pièce sensiblement quelconque, comme si l'on se servait simplement du fer à souder. C'est par le perfectionnement qu'a reçu cet art des soudures que la Chimie organique est devenue le puissant instrument de synthèse qu'on connaît, et il n'y aura pas lieu d'être surpris si d'ici à quelque temps on fait à partir des éléments la synthèse, depuis si longtemps entrevue comme un rêve, de la quinine ou du sucre de canne. On sait disséquer les molécules organiques naturelles, et, quand elles sont complexes, séparer un par un les groupements plus simples et par conséquent mieux connus qui les constituent; on les enregistre, on les numérote comme des pièces d'horloge et un jour on sait aussi les remonter. Ce travail est long et délicat, mais n'utilise que des ressources connues. C'est une sorte d'exécution comme en musique, et de même que dans celle-ci elle dépend de la composition: l'art difficile et supérieur de la chimie organique. En fait d'art, de progrès théorique la Chimie organique change assez peu; aussi parfois on entend reprocher aux chimistes qui cultivent cette science de ne plus découvrir de *fonctions* intéressantes comme autrefois. Le reproche est trop sévère. En organique la fonction est une portion de la formule développée qui symbolise une propriété importante. Exemple: l'acidité (CO_2H), la basicité (AzH^2) (AzH),..., le pouvoir réducteur (COH), l'hydratation (OH) et des conditions analogues de

relation, de position, etc. Ces symboles peuvent se cumuler dans une molécule. Mais la *fonction* est surtout une propriété très caractéristique, inhérente au corps simple: elle est tirée surtout de la chimie générale ou considérée au point de vue inorganique; par exemple dans l'acide lactique:



on trouve à la fois les fonctions acide — COOH et alcoolique — OH ; elles ne sont ici que les tenant-lieu de l'acide carbonique $\text{HO} - \text{COOH}$ et de l'eau $\text{H} - \text{OH}$. C'est en raison de cette origine qu'il ne faut pas se flatter de trouver en cette matière des choses nouvelles; c'est en élargissant trop la définition qu'on crée de nombreuses fonctions sans intérêt; car, en mettant entre parenthèses un fragment plus ou moins important de formule qu'on rencontre souvent en organique tel que



de ci-dessus, on en peut faire une fonction aussi.


Les composés organiques se font dans les laboratoires: mais ils sont toujours inspirés de loin par la nature dont on s'efforce d'imiter les produits et de connaître les procédés de travail. Une question capitale s'est longtemps posée dès qu'on abordait la synthèse organisée, c'est celle de l'origine de l'azote organique, de la fixation de l'azote. M. Berthelot a résolu la question dans ces dernières années. Indépendamment des phénomènes de nitrification élucidés par MM. Schloësing et Müntz et qui, eux, transforment les *composés azotés*, il a montré que la terre contenait des germes dont la fonction est de produire un premier degré d'assimilation de l'azote libre, qui passe ensuite dans les êtres vivants. Les expériences récentes sur les tubérosités parasitaires des racines, et les faits de symbiose, en général, montrent combien sont exactes les vues du savant auteur de cette théorie. Un autre élément, le carbone, pénètre dans les végétaux. Dans ce cas, on sait bien que c'est l'acide carbonique de l'air qui l'apporte. On en est ici au deuxième degré de complexité dans la nature des actions à élucider. Par quel mécanisme le carbone se transforme-t-il en produits organiques? Cette question est toute une science à faire, celle des réactions biologiques, déjà heureusement entamées par les travaux de M. Fischer sur la polymérisation de l'aldéhyde méthylque et des sucres qui en résultent (1).

Dans ce domaine de la théorie organique un point intéressant et qui s'est complètement développé est celui des cycles ou noyaux fermés.

Il y a quinze ans on parlait beaucoup des « passages » de la série grasse à la série aromatique: c'était alors une rareté. La série grasse est caracté-

(1) Voyez à ce sujet l'article de M. L. MAQUENNE sur la *Synthèse des sucres* dans la *Revue* du 30 mars 1890, page 165.


térisée par des formules ouvertes, telles que :




La série aromatique, par la formule fermée de la benzène.



Aujourd'hui on fait tous les passages qu'on désire de la série grasse aux séries fermées et vice-versa; de plus la notion de formule fermée a acquis son complet développement, autant qu'il semble, car on connaît des cycles à 3, 4, 5 et 6 atomes de carbone :



On sait que ces cycles peuvent se combiner entre eux pour réaliser des formules plus complexes :




Il est une chose remarquable : c'est que jamais en Chimie organique on n'a établi l'existence de polygones à plus de six côtés.

M. Baeyer explique cela par la théorie du tétraèdre dans lequel les sommets font, comme on sait, un angle au centre de $109^{\circ}28'$. Si l'on prend l'éthylène, $\text{CH}^2 = \text{CH}^2$, comme la chaîne fermée la plus simple et qu'on admette la combinaison des carbones par deux affinités, l'auteur pense que deux des directions de combinaison faisant primitivement $109^{\circ}28'$ deviennent parallèles. Chaque direction faisant une moitié du chemin, on aura pour l'angle d'écart, la flexion des axes en quelque sorte, $\frac{1}{2}(109^{\circ}28') = 54^{\circ}44'$. La molécule ainsi formée sera peu stable : elle tendra à se saturer par Br^2 , H^2 , etc... Le triméthylène, les chaînes triangulaires supposées équilatérales ayant un angle de 60° , celui-ci viendra en déduction de la flexion qui ne sera plus que de $24^{\circ}44'$. Pour les chaînes carrées, l'angle à retrancher étant de 90° , on n'aura que $9^{\circ}44'$, les pentagones de 108° et les hexagones de 120° n'auront plus que des flexions respectives

de $+0^{\circ}44'$ et $-5^{\circ}16'$. Pour les polygones dont les côtés sont plus nombreux, les valeurs négatives croissent assez vite. Et c'est pour cette raison du minimum d'effort de flexion des axes de combinaison que la benzène et les corps indoliques seraient particulièrement stables.

Les cycles devenus si importants en chimie organique ne sont d'ailleurs pas astreints à être homogènes en carbone. Chaque jour on découvre des combinaisons dans lesquelles un groupe CH placé en un angle quelconque des figures que nous avons faites est remplacé par Az, S ou d'autres corps :



Une autre question importante en chimie organique est celle des condensations. Pour arriver à faire ces cycles variés, homogènes en carbone ou plus ou moins substitués en soufre, azote, etc., on peut souvent partir de corps très simples qu'on chauffe longtemps avec un corps polymérisant, on pourrait dire soudant, et les molécules s'attachent entre elles ; comme les corps cycliques sont des plus stables, ce sont eux qui se font.

Nous avons déjà insisté sur l'importance des méthodes de travail en chimie, des outils. Les méthodes qu'on emploie le plus souvent aujourd'hui dans les constructions chimiques sont la polymérisation par le chlorure d'aluminium, découverte par M. Friedel, les condensations très nombreuses aux chlorures de zinc surtout et par le mélange d'acide sulfurique et de glycérine ou procédé de Skraup. Il reste encore une manière d'agir, mais qui se rattache plutôt à la chimie biologique : c'est cette sorte d'auto-condensation de l'acide cyanhydrique d'où M. A. Gautier a tiré ses belles synthèses de composés se rattachant à la série urique. C'est là un moyen d'action qui se rapproche tout à fait de ceux que la nature met en œuvre, car il ne comporte pas l'emploi des réactifs violents de la chimie ordinaire qui permet bien de faire des corps dits organiques, mais ne pourrait les produire dans des milieux « organisés ».

En excluant forcément bien des questions spéciales du plus grand intérêt qui, heureusement, ont été ou seront traitées dans cette *Revue* par des savants autorisés, — c'est le cas déjà des sucres et des terres rares, — j'espère être arrivé à donner aux lecteurs qui ne suivent pas d'ordinaire les travaux des chimistes, une idée des principales questions qu'ils ont résolues ou qui les préoccupent.

A. Etard,

Répétiteur à l'École Polytechnique.

(1) On suppose à chaque angle un groupe CH, CH^2 , Az H.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^o Sciences mathématiques.

Marie (Léon), Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, *actuaire de la Compagnie le « Phénix »*. — **Traité mathématique et pratique des opérations financières.** Un vol. grand in-8^o, Gauthier-Villars et fils, 1890.

Il serait inutile, comme le dit l'auteur dans l'introduction, de chercher dans cet ouvrage des théories nouvelles ou des travaux scientifiques inédits ; c'est le développement pur et simple des matières enseignées à l'Ecole des Hautes Etudes commerciales par MM. Margerie et Brasillier.

Ces deux professeurs, qui ont acquis dans cet enseignement spécial une grande notoriété, sont parvenus, par la recherche pénible de matériaux épars et par l'étude approfondie de procédés empiriques, à constituer un corps de doctrine ; ils y ont introduit de nombreux aperçus nouveaux qui leur appartiennent en propre.

Le livre de M. Marie, admirablement imprimé, comme tout ce qui sort de la maison Gauthier-Villars, sera utile à tous ceux qui s'engagent dans la carrière financière.

L. O.

Connaissance des Temps. Extrait à l'usage des écoles d'hydrographie et des marins du commerce pour l'an 1890. — *Publié par le Bureau des Longitudes, Gauthier-Villars et fils, in-8^o 90 pages, 1890.*

Les perfectionnements qui ont assuré à la Connaissance des Temps, cette aïeule vénérable des éphémérides astronomiques, un rang éminent parmi les publications similaires, ont beaucoup augmenté ce volume qui compte aujourd'hui près de 900 pages. Les astronomes ne s'en plaignront certes pas, mais beaucoup de marins préfèrent des Tables plus maniables et plus réduites comme volume et comme prix. Les explorateurs, qui font leur point à terre exactement comme les marins à la mer, doivent aussi se préoccuper d'économiser le poids mort à emporter. C'est à l'intention de ces lecteurs que le Bureau des longitudes a pris le parti d'extraire du grand recueil les chapitres indispensables. Les principaux articles de ce résumé sont :

Tables du soleil : lever et coucher ; ascension droite, déclinaison et temps sidéral, à midi moyen de Paris ; équation du temps, ou plutôt, afin d'éviter les erreurs de signes, temps moyen à midi vrai.

Tables de la lune : ascension droite ; déclinaison, parallaxe et demi-diamètre de 12 heures à 12 heures.

Distances lunaires ; un seul groupe par jour, ce qui suffit largement ; grâce au perfectionnement des chronomètres, ce genre d'observations n'est plus employé qu'exceptionnellement.

Positions des 30 étoiles les plus remarquables ;

Tables pour calculer l'heure et la hauteur de la marée dans les principaux ports du globe (partie importante et nouvelle) ;

Tables auxiliaires extraites de la Connaissance des temps.

Cet extrait, imprimé en grande partie avec la « composition » même du recueil original, présente par là des garanties d'exactitude supérieure qu'on ne trouve-rait pas au même degré dans les publications analogues. Offrant un choix judicieux des articles essentiels du Calendrier astronomique, il a pu être rendu réglementaire dans les écoles d'hydrographie.

S'il nous était permis d'exprimer quelques vœux, nous

demandierions au Bureau des longitudes d'ajouter les quatre planètes principales, surtout Vénus et Jupiter, que leur éclat permet souvent d'observer pendant le crépuscule, alors que l'horizon est encore bien net : il ne serait pas nécessaire de donner les coordonnées pour chaque jour, notamment pour Jupiter et Saturne dont la marche est lente et régulière.

Pour la lune, ne pourrait-on donner les positions corrigées d'après Newcomb ? L'erreur tabulaire atteint actuellement près d'une seconde 1/2 de temps en ascension droite : elle n'est donc pas négligeable.


Nous nous permettons de soumettre ces observations au Bureau des longitudes : elles ne nous sont inspirées que par le désir de voir cet utile recueil aussi complet que possible et d'en hâter ainsi la diffusion parmi les marins auxquels il est appelé à rendre les plus grands services.

E. C.

2^o Sciences physiques.

Sarasin (Ed.) et de la Rive (L.). — **Sur la résonance multiple des ondulations électriques de M. Hertz se propageant le long de fils conducteurs.** *Archives des sciences physiques et naturelles de Genève*, t. XXIII, p. 113, 1890.

Les auteurs ont été amenés à exécuter ce travail en répétant les expériences de M. Hertz, ce qui a été fait dans nombre de laboratoires, notamment à Paris par MM. Joubert et de Neville. Parmi ces expériences, il en est une particulièrement intéressante qui consiste à fixer, devant les deux capacités de l'excitateur primaire de M. Hertz, deux plaques de laiton desquelles partent normalement deux fils conducteurs, d'égale longueur, isolés à leur extrémité et perpendiculaires à l'axe du conducteur primaire :



Le circuit secondaire B (résonateur) déplacé entre ces deux fils, son plan restant perpendiculaire à leur direction et son interruption étant à la partie supérieure, montre à intervalles réguliers des périodes de croissance et de décroissance de l'étincelle ; cela résulte, suivant M. Hertz, de l'interférence des ondes électriques directes avec les ondes réfléchies à l'extrémité des fils. Pour que les nœuds, qui dans la figure sont indiqués par de petites croix, soient bien nets, il faut que la longueur des fils soit dans un rapport donné avec la longueur d'onde, ce que l'on réalise facilement par tâtonnements. — C'est cette expérience qui est le point de départ des recherches de MM. Sarasin et de la Rive.

Les dispositions générales de l'expérience restent les mêmes que celles de M. Hertz, mais les auteurs ont fait varier beaucoup les circonstances secondaires.

M. Hertz commençait par chercher un résonateur à l'émulsion avec l'oscillateur AA' ; en effet, avec un résonateur donné, l'étincelle est maxima lorsque l'oscillateur prend certaines dimensions, et réciproquement, avec un même oscillateur donné, il faut choisir un résonateur d'un certain diamètre afin d'obtenir l'étincelle maxima. — Au lieu de prendre des résonateurs

de même période que les *primaires* (oscillateurs), les auteurs, et c'est là le côté original de leurs recherches, emploient des cercles quelconques (interrompus) dont les dimensions varient de 26 centim. à 1 m. de diamètre; quel que soit le résonateur, l'expérience de M. Hertz réussit, le phénomène d'interférence subsiste. Si l'on associe un même primaire à des résonateurs différents, la valeur constante trouvée pour les divers internœuds varie d'une façon continue avec le résonateur circulaire, et l'internœud est sensiblement proportionnel au diamètre du résonateur. Inversement, si l'on associe un même résonateur à des primaires différents, la valeur de l'internœud est constante, quel que soit l'oscillateur.

D'après M. Hertz, l'extrémité libre des fils correspond à un ventre de vibration; MM. Sarasin et de la Rive ont trouvé que, par une nouvelle analogie avec l'onde sonore dans un tuyau ouvert, une perturbation à l'extrémité fait que le ventre se trouve à quelques centimètres au delà; dans ce cas, la distance du premier nœud à l'extrémité libre du fil est égale à la moitié de la circonférence du résonateur. On voit, de nouveau, le résonateur intervenir nettement.

Puisqu'un résonateur donné ne peut révéler qu'une longueur d'onde, toujours la même, qui lui est propre, il faut que celle-ci appartienne également à l'oscillateur; le système ondulatoire produit par celui-ci doit par conséquent contenir toutes les longueurs d'onde possibles entre certaines limites, chaque résonateur choisissant dans cet ensemble complexe, pour en montrer les ondes stationnaires, l'ondulation dont la période est identique à la sienne propre. C'est ce que les auteurs appellent la *résonance multiple* des ondules électriques, phénomène dont les conséquences ont été si nettement formulées par M. Cornu devant l'Académie des sciences (1).

Le travail de MM. Sarasin et de la Rive paraît très consciencieusement fait; les auteurs font remarquer toutefois qu'il ne s'agit dans leurs recherches que d'expériences qualitatives et non quantitatives, et qu'il ne peut pas conclure de leurs résultats que les dimensions de l'oscillateur sont absolument sans influence sur la longueur d'onde de l'oscillation principale dans les fils.

Disons pour terminer que la longueur maxima des fils étant de 10^m60, les auteurs estiment que les nœuds sont mesurés à 10 centimètres près.

E. MATHIAS.

Spring (W.). — Influence de la capillarité et de la diffusion sur l'énergie dissolvante des liquides. *Zeitschrift für physikalische Chemie*, 4. 1890.

Klobukow. — Même sujet. *Zeitschrift*, Mars 1890.

M. Walther Spring ayant remarqué que, lorsqu'un corps soluble est plongé dans un liquide, la portion qui est à la surface disparaît plus rapidement que les autres, crut pouvoir en conclure qu'il existait à la surface une augmentation de l'énergie dissolvante. C'est un fait bien connu, par exemple, que les zincs de pile se rongent beaucoup plus rapidement au niveau qui correspond à la surface libre du liquide acide, que dans la partie plongée.

M. Klobukow, reprenant les expériences de Spring, a fait voir que tous ces phénomènes s'expliquent très simplement, sans force spéciale. Si un cylindre d'un sel soluble est plongé dans l'eau, la dissolution tombe au fond du vase au fur et à mesure qu'elle se forme au contact du sel. Le liquide pur n'arrive par suite au contact direct du sel qu'à la partie supérieure et les portions inférieures sont protégées par une couche de dissolution déjà formée. Ce qui montre bien que la capillarité n'intervient pas, c'est que, si on plonge complètement un cylindre de sel dans l'eau en protégeant,

la partie supérieure par une couche de vernis, on voit le cylindre se creuser plus profondément au-dessous du vernis comme cela avait lieu auparavant à la surface libre.

Georges CHAMPY.

Villiers (A.) — *Tableaux d'analyse qualitative des sels par voie humide*. Un vol. in-8° de 100 pages. Paris, Octave Doin, éditeur, 1890.

Le livre que vient de publier M. Villiers ne fait pas double emploi avec les traités d'analyse parus jusqu'à ce jour. Ceux-ci renferment trop de détails et les méthodes de reconnaissance qui y sont exposées acquièrent souvent de la complication par ce fait que l'auteur a voulu qu'elles puissent s'appliquer à la fois aux corps les plus communs et à ceux que l'on ne rencontre que rarement; par suite ils rendent assez pénible aux commençants l'étude de la chimie analytique.

M. Villiers a tenu à éviter cet écueil et ses tableaux analytiques qui ne renferment que les métaux et les acides que l'on rencontre le plus communément seront d'un grand secours à tous ceux qui commencent l'étude de la chimie.

H. GAUTIER.

3^e Sciences naturelles.

Berghaus' Physikalischer Atlas. — 75 Karten in sieben Abteilungen, vollständig neu bearbeitet und herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Berghaus. In-folio (en livraisons). (En cours de publication depuis 1886). Gotha, Justus Perthes, 1890.

La première édition de l'*Atlas physique* remonte à 1836; depuis cette époque, toutes les branches des sciences naturelles ont fait de tels progrès qu'une refonte complète de l'œuvre de Heinrich Berghaus était devenue nécessaire. Le savant cartographe de Gotha, M. Hermann Berghaus, s'est chargé de cette tâche, avec le concours de spécialistes éminents, MM. Drude, Gerland, Hann, Hartlaub et Marshall, G. Neumayer, Zittel. Déjà quatre sections sur sept : Météorologie, Magnétisme terrestre, Géographie botanique, Géographie zoologique) sont complètement terminées, et les autres sont en voie d'achèvement rapide : sur les 25 livraisons de trois cartes dont se composera l'*Atlas*, 20 ont paru. Nous donnons ci-dessous le sommaire des feuilles publiées en 1888 et 1889 :

XIV^e livraison : N° 43. *Océanie* 1 : 30,000,000. Carte géologique dressée par H. Berghaus. Cartouches : Victoria, d'après Brough Smyth, 1 : 5,000,000; Tasmanie, d'après Johnston et Sprent, 1 : 5,000,000; isthme d'Auckland, d'après Hochstetter, 1 : 500,000; territoire de la catastrophe de Tarawera (10 juin 1886), avant et après l'éruption, 1 : 50,000 et 1 : 500,000; Mauna Loa et Kilanea, 1 : 500,000; types principaux de récifs coralliens du Pacifique (12 fig.), 1 : 500,000.

N° 26. *Indes occidentales*, carte hydrographique, par H. Berghaus. Cartouches : Côte des Etats-Unis au nord du cap Hatteras; port de New-York, embouchure du Mississippi, isthme de Panama (1 : 500,000); trois exemples de transformations littorales (baie de Galveston, port de Sabanilla, golfe d'Uraba), 1 : 500,000; diagrammes indiquant les températures sous-marines observées par le *Challenger*, d'Halifax et de New-York aux Bermudes.

N° 43. *Variations de la déclinaison magnétique de 1600 à 1838*, par G. Neumayer. Quatre planisphères indiquant le tracé des lignes d'égalité déclinaison (isogones) en 1600 (d'après Chr. Hansteen), en 1700 (d'après Halley), en 1800 (Hansteen) et en 1838 (Amirauté anglaise).

XV^e livraison : N° 3. *Activité interne du globe* par H. Berghaus. Mappemonde indiquant la distribution géographique des volcans et les changements de niveau des rivages; mappemonde indiquant l'aire des principaux tremblements de terre connus; cartouches : détroit de la sonde, volcans Tengger et Semiru (Java), Santorin, Stromboli, île Saint-Augustin (Alaska), 1 : 500,000.

N° 25. *Indes orientales et Chine* (archipel asiatique),

(1) Voyez à ce sujet l'article de M. Ch.-Ed. Guillaume sur la discussion des expériences de M. Hertz dans la *Revue* du 30 janvier 1890, page 63.

carte hydrographique par H. Berghaus. 8 cartouchesap au 1 : 500,000 pour les points les plus intéressants des côtes; 11 diagrammes indiquant la répartition verticale des températures, d'après les sondages du *Challenger*.

N° 71. *Afrique vers 1880*, carte ethnographique au 1 : 30,000,000, par G. Gerland; cartouches : Nubie, Sénégal, Kilima-njaro, lac Tchad, région du Cap vers 1650 (1 : 12,500,000); grands États africains anciens et modernes, 1 : 60,000,000.

XVI^e livraison : N° 6. *Carte des glaciers*, par H. Berghaus : glaces intérieures du Groënland, 1 : 15,000,000. 18 cartouches au 1 : 500,000 représentant la topographie des principaux glaciers du globe : gl. de Frederikshaab, d'après Jensen; Groënland du sud d'après Holm; gl. de Kenai (Alaska); Monts Tacoma et Shasta (États-Unis), d'après Bailey Willis et Diller; gl. de Justedal, Jotun feld (Norvège); Oberland bernois, Glockner, Ötztal, massif du Pelvoux; Kasbek, Adai-Khoh (Caucase), d'après Dechy; gl. de Biafo (Karakorum); gl. du Zerachâne (Turkistan), d'après Mouchkétoff; Alpes Néo-zélandaises, d'après Lendenfeld; Nevada de Chillan (Chili), d'après Philippi; gl. de Ross (terres australes); gl. de San Rafael (Patagonie), 1 : 1,500,000. Profil indiquant la hauteur de la ligne des neiges persistantes et l'altitude à laquelle descendent les glaciers dans les diverses parties du globe.

N° 66. *Distribution géographique des races humaines vers 1500 et en 1880*, deux planisphères, par G. Gerland.

N° 69. *Carte ethnographique du Sud-Est de l'Asie* (populations indigènes) vers 1880, 1 : 15,000,000, par G. Gerland.

XVII^e livraison : N° 12. *Afrique*, 1 : 30,000,000, carte géologique, par H. Berghaus. Cartouches : Abyssinie. Atlas, Région du Cap, 1 : 10,000,000; cours du Congo, partie montagneuse, d'après Pechuel-Loesche et Dupont, 1 : 2,000,000; monts Kameroun, Kilima-njaro, Oasis de Chargeli, 1 : 1,500,000; pic de Ténériffe, monts Bou-Chail (Algérie), Ambas d'Abyssinie, 1 : 500,000.

N° 41. *Lignes d'égale inclinaison magnétique (isoclines)*, pour 1885, O. par G. Neumayer; cartouches : isoclines pour 1885, O. dans les régions polaires; isoclines du globe en 1600, 1700 et 1780.

N° 68. *Asie jusqu'en 1880*, carte ethnographique, 1 : 30,000,000, par G. Gerland. Cartouches : Région des sources du Jenisséï, Tianchan.

XVIII^e livraison (1889) : N° 21. *Courants marins*, par H. Berghaus. Cartouches : température moyenne de la surface de la mer; température de l'eau au fond de la mer; région des moussons de l'Inde en hiver; répartition verticale des températures dans l'Atlantique et l'Océan indien (d'après les sondages du *Challenger*).

N° 42. *Lignes d'égale intensité horizontale magnétique* pour 1885, O. exprimée en unités électriques (C. G. S.), par G. Neumayer. Cartouches : régions polaires; lignes d'égale intensité totale (isodynames) jusqu'en 1838, d'après Sabine; idem pour l'époque 1840-45, d'après Sabine.

N° 67. *Europe vers 1880*, carte ethnographique, 1 : 15,000,000, par G. Gerland. Cartouches : populations romaines des Alpes, 1 : 3,000,000; populations du Caucase, d'après Seidlitz, 1 : 7,500,000.

XIX^e livraison, N° 14. *Asie, carte géologique*, 1 : 30,000,000, par H. Berghaus. Cartouches : chaîne du Sel (Pandjab), 1 : 7,500,000; Java d'après Junghuhn, 1 : 15,000,000; Japon et Corée, d'après Naumann et Gottsche, 1 : 15,000,000; coulée de laves de l'Assama Jama (Japon), 1783, au 1 : 1,000,000.

N° 39. *Lignes d'égale déclinaison (Isogones)*, pour 1885, O. par G. Neumayer. Cartouches : régions polaires; variation séculaire de la déclinaison magnétique pour la période 1870-1890; variation diurne de la déclinaison magnétique.

N° 75. *Carte ethnographique de l'Europe au commencement du II^e siècle de notre ère*, par G. Gerland. Cartouches : Italie environ 1000 ans avant Jésus-Christ, 1 : 7,500,000; Afrique pendant les premiers siècles

avant Jésus-Christ, 1 : 60,000,000; Asie environ 100-150 ans avant Jésus-Christ, 1 : 60,000,000; Europe centrale au commencement du VI^e siècle.

XX^e livraison : N° 9. *Europe, carte géologique*, 1 : 15,000,000, par H. Berghaus. Cartouches : Spitzberg, d'après Nathorst et Suess, 1 : 10,000,000; Caucase, d'après E. Favre et Abich, 1 : 7,500,000; Pyrénées franco-espagnoles, d'après Carez, 1 : 5,000,000; Scanie, d'après les levés géologiques de la Suède, 1 : 5,000,000; région volcanique de Laki (Islande) d'après Hellund, 1 : 1,000,000; îles Volcano et Lipari, avant l'éruption de 1886, 1 : 500,000; glaciers de l'Adai-Koh (Caucase), 1 : 500,000.

N° 22. *Courants marins et température de l'eau de mer à la surface en février et en août*, par H. Berghaus (4 planisphères). Cartouches : mer du Nord en janvier-février et en juillet-août; courants du golfe de Guinée, courants du Pacifique; 5 coupes montrant la distribution verticale des températures dans l'Atlantique et le Pacifique, d'après les sondages du *Challenger*, de la *Gazelle* et du *Valorous*.

N° 40. *Courbes méridiennes magnétiques et lignes d'équilibre (R)* en C. G. S., par G. Neumayer. Cartouches : isodynames en C. G. S. pour 1885, O (planisphère); idem (régions polaires); lignes d'équilibre magnétique pour 1840, d'après Gauss et Weber.

Nous nous réservons d'apprécier en détail les mérites du *Physikalischer atlas*, lorsque la publication en sera terminée.

EMM. DE MARGERIE.

Seunes (J.). — Recherches géologiques sur les Terrains secondaires et l'Eocène inférieur de la région sous-pyrénéenne du Sud-Ouest de la France (Basses-Pyrénées et Landes). In-8°, 250 p. 9 pl. Thèse de Doctorat, présentée à la Faculté des Sciences de Paris. Vve Ch. Dumod, 1890.

La chaîne des Pyrénées est celle des grandes régions de la France dont la connaissance présente pour le géologue le plus de lacunes à combler. La succession des terrains y est connue dans ses grandes lignes, mais le moment paraît encore éloigné où il sera possible d'embrasser dans une œuvre de synthèse l'histoire de la formation du système de montagnes qui sépare notre pays de la péninsule Ibérique.

Ce n'est que par des travaux de détail, par des monographies régionales patiemment élaborées que l'on peut espérer trouver la solution des problèmes qui se dressent à chaque pas. Chaque travail de ce genre portant sur la région pyrénéenne mérite donc d'être accueilli avec faveur par le public scientifique. Les recherches de M. Seunes portent sur les Basses-Pyrénées et sur la partie méridionale du département des Landes; le volume dans lequel les résultats en sont consignés constitue une des meilleures thèses de géologie présentées à la Faculté des Sciences dans ces dernières années.

L'auteur a porté toute son attention sur les Terrains secondaires du territoire qu'il a parcouru.

Le Trias est représenté dans la plaine sous-pyrénéenne par des argiles gypsifères et salifères affleurant au milieu des terrains crétacés ou tertiaires. Leur âge avait fait l'objet de longues controverses, on les avait placées tour à tour dans le Tertiaire, dans le Crétacé ou dans le Jurassique. L'auteur a nettement établi leur position en montrant qu'elles étaient recouvertes en certains points par des lambeaux calcaires contenant des fossiles de l'Infrafas.

M. Seunes a pu décrire dans les Pyrénées occidentales une succession qui est la plus complète qu'on ait signalée dans la chaîne.

Les différentes assises du Lias, du Bajocien, du Callovien, de l'Oxfordien sont bien développées et sont fossilifères; seules les couches supérieures du système n'ont pas fourni de fossiles. Mais ce sont les dépôts

crétacés qui méritent d'attirer plus particulièrement l'attention du lecteur.

Le Néocomien fait défaut, la série crétacée débute par des calcaires à rudistes qui représentent l'Apvien.

C'est dans l'étage du Gault qu'il faut ranger les calcaires coralliens à *Horiopleura Lambertii* et *Polyconites Verneuli*. M. Seunes est le premier à avoir assigné à ces calcaires leur véritable position : jusqu'à présent on les avait toujours confondus avec les calcaires à rudistes de l'Apvien et c'est la première fois que l'on démontre d'une manière certaine la présence dans le Gault d'un faciès corallien. Ce même faciès envahit aux environs d'Orthez tout l'étage cénomanien. En d'autres points, par contre, cet étage est représenté tout entier par des dépôts puissants de calcaires marneux ou de grès en dalles, que l'on avait rangés à tort dans le Sénonien. On n'y rencontre guère que des empreintes de fucoides et *Orbitolina concava*, foraminifère caractéristique du Cénomanien. M. Seunes rapproche ce faciès particulier du Flysch des Alpes Suisses.

Le Turonien et le Sénonien inférieur sont mal représentés dans les Basses-Pyrénées. Le Sénonien supérieur renferme à Tercis de nombreux fossiles qui ont permis de le paralléliser avec les dépôts crétacés des régions septentrionales.

Le Danien de la région sous-pyrénéenne présente deux niveaux bien distincts. Le niveau inférieur est constitué par des calcaires marneux blanchâtres : il est riche en échinides du genre *Stegaster* et contient *Pachydiscus Jacquoti* Seunes et *Fresvillensis* Seunes, deux ammonites qui se retrouvent dans le calcaire à Baculites du Cotentin. Ce sont les dernières ammonites qui ont vécu dans les mers d'Europe : le Danien supérieur n'en contient plus. Il est constitué par des calcaires marneux maculés de rouge et contient *Nautilus danicus* et des échinides des genres *Echinocorys*, *Hemister*, *Coraster*. Ce niveau supérieur est franchement marin, tandis que dans les Pyrénées centrales il est représenté par des dépôts saumâtres et lacustres connus sous le nom d'étage garumien.

Les Echinides du Sénonien et du Danien des Basses-Pyrénées ont déjà fait l'objet de deux notes intéressantes de M. Seunes.

Le Danien est recouvert par des grès et des conglomérats à *Operculina Heberti* et *Nummulites spileensis*, appartenant déjà à l'Eocène inférieur.

Un chapitre spécial est consacré à un aperçu de la structure de la région parcourue et aux épanchements de roches ophitiques.

Des coupes nombreuses et une carte géologique au 1:50,000 du territoire étudié aident beaucoup à l'intelligence du beau mémoire de M. Seunes.

Emile HAUG.

Zacharias (E.). — Sur les Cellules des Cyanophycées. *Botanische Zeitung*, 1890, Nos 4 à 5.

Plusieurs faits conduisent à supposer que le noyau est un élément essentiel de la cellule. La substance qui le caractérise chimiquement (*nucléine*) a été extraite d'un certain nombre de Cryptogames où jamais noyau n'a pu être aperçu. D'autre part, depuis quelques années le progrès de la technique micrographique a permis de déceler la présence d'un noyau véritable à l'intérieur d'un grand nombre de cellules qu'on en avait crues dépourvues. Pour le mettre en évidence on utilise le pouvoir électif que possèdent, à l'égard de certaines matières colorantes, les parties du noyau principalement constituées par la nucléine.

En appliquant cette méthode à l'étude des cellules chez les Algues Cyanophycées, M. Zacharias a remarqué que leur région centrale peut se colorer autrement que le protoplasme pariétal. Mais cette réaction n'est pas constante et, de l'aveu de l'auteur, ne suffit pas pour témoigner d'une localisation de la nucléine. Jusqu'alors on n'a jamais réussi à l'observer nettement chez les Bactériacées, les *Saccharomyces*, quantité d'Algues et de Cham-

pignons. Vu la délicatesse des procédés d'investigation dont nous disposons aujourd'hui, l'insuccès des efforts tentés pour découvrir le noyau dans toutes les cellules nous paraît suggérer l'hypothèse que, si une matière propre existe dans toutes, — ce qui semble probable, — du moins elle ne forme des corps figurés d'une certaine complexité que dans les cellules les plus différenciées ; celles des organismes tout à fait inférieurs ne la renfermeraient, pour ainsi dire, qu'à l'état de diffusion dans le protoplasme.

L. O.

4^e Sciences médicales.

Reclus et Noguès (P.). — Traitement des perforations traumatiques de l'estomac et de l'intestin. *Rev. de chir.*, Paris, 1890, t. X, p. 89 et 419.

Les auteurs cherchent, par la réunion de nombreuses observations, à démontrer que l'abstention lors de perforation traumatique de l'estomac ou de l'intestin, donne des résultats meilleurs que la laparotomie. Les statistiques semblent confirmer au premier abord cette opinion ; la mortalité est moindre dans les plaies de l'abdomen traitées par l'expectation que dans celles où l'on est intervenu par la laparotomie. C'est là un fait indiscutable, mais qui pourrait peut-être trouver, en partie, son explication dans cet autre fait non moins indiscutable que bon nombre des plaies de l'abdomen traitées par l'abstention étaient des plaies sans grands symptômes, des plaies bénignes d'allure. Ces statistiques brutales ne démontrent nullement que, pour des séries de cas identiques, la laparotomie eût donné des résultats inférieurs à ceux de l'abstention.

MM. Reclus et Noguès sont, du reste, les premiers à reconnaître qu'il y a plaie de l'abdomen et plaie de l'abdomen. Ils n'hésitent pas à conseiller l'opération lors d'hémorragie, d'issue de gaz ou de matières intestinales par la plaie, de tympanisme généralisé avec sonorité particulière de la région hépatique, lors de traumatisme grave, coup de pied de cheval par exemple, enfin lors de réaction péritonéale. La question reste encore indécise et de nouveaux faits bien observés sont nécessaires pour permettre de poser d'une manière définitive les indications de traitement en présence de chaque cas.

D^r HARTMANN.

Coupard et Saint-Hilaire. — Contribution à l'étude des céphalalgies, névralgies et migraines d'origine nasale. *Tribune médicale*, n° 8, 9, 10 et 12, 1890.

Dans une série d'expériences sur les réflexes d'origine nasale, M. François Franck a reproduit chez les animaux tous les phénomènes objectifs, vaso-moteurs et autres, de la migraine et a démontré physiologiquement l'influence des irritations nasales sur la production de certaines névroses. Depuis les travaux de Hack en 1882, cette influence a souvent été observée en clinique et dans des cas où la preuve a pu être faite qu'il y avait là plus qu'une simple coïncidence, mais relation intime de cause à effet. A l'appui de cette thèse, MM. Coupard et Saint-Hilaire ont apporté leur contingent d'observations, passant successivement en revue l'influence des altérations de la muqueuse nasale sur la simple céphalalgie ; sur les névralgies crâniennes, surtout les sus et sous orbitaires, rapportant, entre autres, un fait remarquable d'une névralgie datant de 20 ans, rebelle à tout traitement et guérie après de simples cautérisations nasales ; enfin sur la migraine. Assurément il faudrait bien se garder de trop généraliser, mais il n'en est pas moins vrai que souvent les migraines peuvent avoir une origine nasale ; aussi, ne voyons-nous que des avantages à conclure avec les auteurs que chez toute personne atteinte de migraines il est bon d'examiner attentivement l'état de la muqueuse nasale, et de la traiter, s'il y a lieu.

D^r E. DE LAVARENNE.

Nicolas (D^r A.). — Le brouillard. (Rapport à la Société française d'hygiène.) Paris, 1890.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

Les Sociétés de Physique et de Chimie de Londres, la Société de Physique de Berlin, l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, l'Académie royale des Lincei sont entrées en vacances.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 7 juillet 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. O. Callandreau** étudie quelques cas particuliers de la capture des comètes par les planètes et montre que ces cas s'expliquent parfaitement par la théorie générale de la capture, bien qu'on ait voulu les opposer à cette théorie. — **M. G. Rayet** : Sur une photographie de la nébuleuse annulaire de la Lyre, obtenue à l'Observatoire de Bordeaux, le 24 juin 1890. — **M. J. Léotard** communique : 1^{re} Une observation de l'éclipse partielle de Soleil du 17 juin 1890; 2^{de} Une observation de l'occultation par la lune de l'étoile double β Scorpion, le 19 juin 1890. — **M. Mouchez** présente des photographies spectrales d'étoiles, de **MM. Henry**; ce sont les premières obtenues à l'Observatoire de Paris, et elles sont déjà aussi bien réussies que les plus belles qui aient été faites ailleurs.

2^{de} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Gouy** avait montré qu'une onde lumineuse, en passant par un foyer réel, gagne une avance de $\frac{\lambda}{2}$, conformément à la théorie dé-

duite par lui du principe de Huygens; de nouvelles expériences l'ont conduit à penser que le phénomène est général, qu'il s'agit d'une *propagation anormale des ondes*, qui ne paraît pas limitée aux seules ondes lumineuses. — **M. Neyreneuf** avait indiqué que la loi relative à l'écoulement du son par les tuyaux cylindriques est identique à la loi de Poiseuille sur l'écoulement des fluides par les tuyaux capillaires; il présente un mémoire dans lequel il étudie cette loi en détail. — **M. Schutzenberger** a fait de nouvelles recherches pour confirmer ses conclusions antérieures, sur le transport des éléments de l'eau du dehors dans l'intérieur des tubes à effluve. En faisant agir le flux électrique, non plus sur une masse confinée; mais sur un courant d'acétylène ou d'oxyde de carbone, il a vérifié que les éléments de l'eau pénètrent à travers le verre; ils pénètrent séparément, et non en tant qu'eau en nature, par suite d'une espèce de transport électrolytique. — **M. C. Lefèvre**: Action par la voie sèche des différents arséniates de potasse et de soude sur quelques sesquioxides métalliques. — **M. G. Rousseau** prépare l'azotate basique de cuivre cristallisé, enchauffant en tube scellé, en présence d'un carbonate alcalino-terreux, l'un ou l'autre des deux hydrates de l'azotate neutre de cuivre; ce sous-azotate correspond à la formule de Gerhardt, et non à celle de Berzelius et Graham. — **M. G. Geisenheimer**: Sur les bromures doubles de phosphore et d'iridium. — **M. A. Berg** décrit quelques chromioidates qu'il a obtenus. — **M. A. de Gramont** a reproduit la boracite par voie humide, en chauffant à haute température en tube scellé une partie de borate de soude et deux parties de chlorure de magnésium avec une petite quantité d'eau. — **M. Prud'homme** expose quelques faits relatifs aux nitro-prussiates. — **MM. Berthelot, André et Matignon** emploient l'oxygène sous pression, en présence de l'eau, pour oxyder le soufre des composés organiques sulfurés et le transformer en acide sulfurique, en vue du dosage; cette transformation difficile et pénible par les procédés ordinaires, s'accomplit ainsi facilement et sans pertes. La méthode s'applique même au sulfure de carbone. Les mêmes auteurs ont déterminé la

chaleur de combustion de quelques corps organiques sulfurés, thiophène, taurine. — **MM. Berthelot et Matignon** ont déterminé la chaleur de combustion de quelques principes sucrés, Erythrite, Arabinose, Xylose, Rafinose, Inosite. — **M. André Bidet** a reconnu que divers composés de la série aromatique, qui se colorent sous l'influence de l'air et de la lumière, doivent cette altérabilité à des traces d'impuretés; parfaitement purs, ils restent indéfiniment incolores, même au soleil. — **M. Adolphe Renard**: Sur le phényl-dithiénylène. — En traitant le glucose en solution concentrée par l'amalgame de sodium, **M. J. Meunier** a obtenu l'acétal dibenzoïque de la sorbite. — **MM. C. Vincent et Delachanal**, en hydrogénant la sorbine par l'amalgame de sodium, ont reproduit la sorbite; en oxydant la sorbite par le brome et l'eau, ils ont obtenu du glucose. — **M. A. Haller** étudie les éthers dicyanacétiques qu'il obtient par l'action de l'alcoolate de sodium, sur les éthers cyanacétiques: ces éthers sont très acides.

3^{de} SCIENCES NATURELLES. — En faisant fermenter des liquides, mais à la fois par les Saccharomyces et par les ferments lactique ou butyrique, **M. G. Jacquemin** a obtenu dans les produits de la fermentation l'éther lactique et l'éther butyrique. — À propos de la communication récente de **M. Müntz, M. P. Péchard** rappelle qu'il avait constaté la production d'ammoniaque aux dépens des engrais, avant toute trace de nitrification. — **M. A. Chauveau** a cherché dans l'étude du dégagement de chaleur qui accompagne le phénomène, les lois de l'élasticité active du muscle et la détermination de l'énergie employée à sa création dans le cas de contraction statique; ces recherches lui ont montré que l'échauffement est proportionnel d'une part au poids soutenu, d'autre part au raccourcissement du muscle. Ces recherches ont été faites sur les biceps de l'homme. — **M. R. Dubois** a constaté que l'organe de l'olfaction, chez les *Mellie*, est constitué essentiellement par les grands tentacules; ces tentacules, séparés du corps et de leur ganglion terminal, présentent encore des contractions s'ils sont soumis à une vapeur odorante; l'auteur voit là l'analogue du système avertisseur myoépithélial qu'il a décrit chez la Pholade. — **M. J. Blake**, étudiant l'action physiologique des sels du thallium, a vu que les sels thalleux agissent exclusivement sur les vaisseaux pulmonaires, et que les sels thalliques agissent à la fois sur ces vaisseaux et sur le système nerveux central; l'auteur pense qu'on peut établir une relation entre ces actions physiologiques et les propriétés spectroscopiques des sels considérés. — **M. A. Laboulbène** a reconnu que les caractères de la ladrerie dans la viande de veau et de bœuf disparaissent très rapidement après l'abatage, par suite de l'affaissement des vésicules des Cysticérques; ces caractères se conservent au contraire très bien dans la viande plongée dans l'alcool. — **M. G. Pruvot** montre que l'organe désigné chez les *Némomèles* sous le nom de cœur est en réalité un repli conjonctif en rapport avec les glandes génitales. — Par des observations directes, **M. H. Prunho** a constaté que les oursins se servent de leurs pédicellaires gemmiformes comme de moyens de défense; les piquants se couchent contre la carapace pour permettre l'action des pédicellaires plus courts; ceux-ci restent toujours dans la morsure qu'ils ont faite. — **M. L. Jammes**, étudiant l'histologie des Nématodes, a trouvé des connexions très étroites entre la couche dite

granuleuse et l'anneau nerveux periesophagien. — M. Marcellin Boule décrit les éruptions basaltiques de la vallée de l'Allier. — M. A. Lacroix a reconnu que les roches volcaniques recueillies par Sainte-Claire-Deville à la Martinique sont constituées principalement par des andésites et des labradorites riches en hypersthène. — M. H. Lasne a pu établir, sur de nombreuses observations, une corrélation entre les diaclases de la craie, et les *rideaux*, c'est-à-dire les ressauts brusques du terrain qu'on observe dans la Somme.

Séance du 15 juillet 1890

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Cels : Sur les équations différentielles ordinaires. — M. H. Faye examine deux travaux récents sur la rotation du soleil. Le premier est de M. Wilsing de Posdam, qui s'efforce par l'étude des facules substituée à celle des taches, de démontrer que la vitesse angulaire est la même pour toutes les latitudes; M. Faye montre combien l'observation des facules prête à l'erreur. Le second travail est de M. Duner, d'Upsal, qui a utilisé pour la détermination de la vitesse le déplacement des raies du spectre fourni par les bords du soleil, suivant l'idée émise par M. Fizeau; cette méthode, délicate, mais précise a l'avantage de s'appliquer à toutes les zones de la surface solaire et à toutes les périodes. Les résultats concordent d'une façon satisfaisante avec ceux que M. Faye a déduits des observations de M. Carrington sur les taches; il s'en suit que la vitesse angulaire décroît de l'équateur vers les pôles.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — MM. Mascart et Bouasse indiquent les conditions dans lesquelles on peut obtenir de bonnes photographies des franges des cristaux. — M. Bouasse propose une méthode générale de mesure de la différence de phase des composantes rectangulaires d'une réfraction lumineuse. — M. G. Charpy propose d'employer l'hygromètre à condensation pour déterminer les tensions de vapeur des dissolutions. — M. Schœsing indique le dispositif pour la congélation des viandes adopté par la commission du ministère de la guerre présidée par M. Berthelot : une tourelle centrale remplie de coke reçoit un courant continu de solution de chlorure de calcium refroidie au-dessous de zéro, et, après s'être refroidi au contact de la solution, pénètre dans une enceinte concentrique où sont suspendues les viandes. — M. G. Guilbert indique le moyen de prévoir, par l'observation simultanée du baromètre et de la succession nauséuse, la vitesse probable du vent. — M. A. Colson a cherché, dans divers faits de la chimie organique, l'explication des exceptions constatées aux lois de Berthollet sur les doubles décompositions; il a trouvé que la thermochimie les explique, et que les lois de Berthollet ne s'appliquent pas quand la différence des chaleurs de combinaison est assez grande. — M. E. Leidié a fait des recherches sur les nitrites doubles du rhodium; il compte utiliser notamment le nitrite double de rhodium et de potassium pour extraire le rhodium à l'état de pureté. — M. E. Léger a constaté que les combinaisons du camphre avec les phénols, bien que très instables, existent réellement, comme le prouvent l'existence de rapports simples entre les composants, et la variation du pouvoir rotatoire des solutions alcooliques de camphre après adjonction de phénols. — M. L. Mourgues a obtenu l'hexachlorhydrine de la mannite par l'action du perchlore de phosphore sur la mannite. — En traitant par l'ammoniaque l'éther nitrotriatric de méthyle, et de divers autres alcools, M. Maquenne a obtenu des composés β pyrazoliques, qui montrent que dans la réaction, l'alcool est passé par l'état d'acétone, tandis que l'acide nitrique passait à l'état nitreux. Cette réaction est générale dans la saponification des éthers nitriques.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Chauveau continue l'étude du dégagement de chaleur qui accompagne la création de l'élasticité active dans le muscle : dans le cas des contractions dynamiques, c'est-à-dire dans le

cas où le muscle soulève lentement un poids donné à une hauteur donnée, et le ramène ensuite lentement à sa position première, on trouve les mêmes lois que dans le cas de contraction statique : dégagement de chaleur proportionnel au poids soulevé et au raccourcissement du muscle. — M. Henneguy a retrouvé dans les cellules de segmentation de l'œuf de la Truite, les *sphères attractives* signalées par Van Beneden chez l'Ascaris comme jouant un rôle important dans la multiplication cellulaire, et retrouvées chez divers invertébrés. — M. R. Blanchard et J. Richard décrivent les crustacés brachiopodes et copépodes qui vivent dans les Sebkhias et les Chotts de l'Algérie. — M. L. Mangin donne une classification des divers réactifs colorants qui permettent de différencier les substances fondamentales de la membrane cellulosique des végétaux, pectine, callose, cellulose. — M. H. Le Chatelier a constaté que la courbe de dilatation par la chaleur qui est régulière pour la silice amorphe, est très irrégulière pour les diverses formes de silice cristallisée. — M. A. Terrell donne la composition de la Ménilite de Villejuif.

L. LAPICQUE

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 15 juillet 1890.

M. Boucheron fait une communication sur les ophtalmies sympathiques qui sont dues : les récentes à une action microbienne par propagation suivant les nerfs optiques du côté lésé au côté sain, les anciennes à un état pathologique des nerf ciliaires, et conseille contre celles-ci la névrotomie cilio-optique, les branches ciliaires superficielles assurant la conservation de l'œil. — M. Guérin, à propos des accidents de la chloroformisation, dit qu'il a administré des milliers de fois le chloroforme sans avoir d'accidents. Il conseille, au début, de faire respirer le malade seulement par la bouche, à la dernière période, de laisser le malade respirer de l'air pur de temps en temps, de ne jamais commencer l'opération avant anesthésie complète. — M. Labbé rappelle qu'en 1882 il a conseillé de donner le chloroforme à doses aussi petites que possible et à dose continue, sans la moindre intermittence, en agissant toujours comme si le cas était défavorable. En cas d'accident, il faut faire de suite l'immersion du corps et pratiquer avec persévérance la respiration artificielle. — M. Lagneau fait une communication sur les mesures propres à rendre moins faible l'accroissement de la population en France, où les mariages sont tardifs et de moins en moins nombreux, la natalité, le tiers de celle d'Angleterre, de Russie, d'Allemagne; bien que la mortalité plus élevée dans les villes que dans les campagnes n'ait pas beaucoup changé depuis quelques années, cependant l'excédent des naissances sur les décès n'est que de 1,19, pour 1,000, de sorte que dans cent ans au plus, la France ne pourra plus fournir que la moitié des soldats qu'elle a actuellement. — M. Javal fait connaître une proposition qu'il soumettra à l'Académie, attirant l'attention des pouvoirs publics sur ces faits. — MM. Marchand et Loir sont élus associés nationaux.

Séance du 22 juillet 1890.

M. Laboulbène fait une communication sur les moyens de reconnaître la ladrerie bovine, due aux cysticerques du *tœnia saginata*. Il a constaté avec MM. Guichard et Georges Pouchet qu'au contact de l'air, le cysticerque se réduit de lui-même et devient à peine perceptible, à moins qu'il soit recouvert par une couche aponevrotique. Le kyste réduit réapparaît si on le mouille d'eau pure, surtout si elle est additionnée d'acide nitrique. Cuite suffisamment, la viande est inoffensive : 50 à 60° suffisent; la viande crue, pulvée avec soin et tamisée, n'est pas nuisible. — M. Maurice Hache (de Beyrouth) présente quatre observations d'abcès du foie et préconise le traitement par l'incision franche de la collection purulente. — M. Lagneau continue sa communication sur la dépopulation en

France, en indiquant les moyens d'y remédier. Particulièrement en étudiant comment on pourrait restreindre le célibat et la natalité illégitime; empêcher l'extension de la syphilis; réduire au temps strictement nécessaire la durée de présence des hommes dans l'armée; diminuer la morbidité, la mortalité et la mortalité par la création de maternités-ouvroirs, l'application des lois sur la protection de la première enfance; les règlements d'hygiène des grandes villes; la substitution de camps ruraux aux casernes; restreindre l'immigration des campagnes dans les villes; favoriser la naturalisation des étrangers, tout en leur faisant partager nos charges. — M. G. Sée commence une communication sur l'usage du *cannabis indica* dans le traitement des dyspepsies et des névroses gastriques.

D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 12 juillet, 1890.

M. Gley présente des tracés de tétanos du cœur, obtenus par l'excitation électrique du myocarde sur des grenouilles ayant reçu du sulfure d'allyle. — M. A. René donne l'observation d'un cas d'anémie. — MM. Dejerine et A. Tuillat signalent l'existence constante d'un rétrécissement du champ visuel dans la syringomyélie; ce rétrécissement est en général plus prononcé pour le vert que pour les autres couleurs. — M. Henneguy a retrouvé la *sphère attractive* cellulaire de M. Van Beneden dans les cellules embryonnaires de la truite. — M. A. Borrel a repris l'étude de la question des coccidies dans les épithéliomas; il a bien retrouvé les formes signalées par divers auteurs comme appartenant à des sporospermies, mais d'après ses observations, il ne peut leur attribuer que la signification d'éléments dégénérés; en aucun cas, il n'a observé ni pu obtenir une forme caractéristique de l'évolution de la coccidie. — M. Dareste a constaté chez divers pigeons hybrides inféconds la présence, chez le mâle, de spermatozoïdes normaux. — MM. Charria et Gley ont observé chez un lapin un ostéome infiltré de staphylocoques; ils donnent le cas comme exemple de l'infection après coup d'une tumeur préexistante. — M. A. Piélot décrit l'estomac à poches multiples d'un lamantin. — MM. Laborde et Malbec ont étudié comparativement la toxicité des sels de strontium et de baryum; ces deux métaux, chimiquement voisins, diffèrent entièrement dans leur action physiologique, le strontium étant à peu près inoffensif, tandis que le baryum est très vénéneux.

Séance du 19 juillet 1890

M. Thumas (de Varsovie) enregistre de la façon suivante la vitesse du courant sanguin à la périphérie chez l'homme; un doigt, anémié par la pression d'une bande de caoutchouc analogue à un plethysmographie, est introduit dans un récipient plein d'eau; la bande est enlevée, le sang afflue et déplace l'eau, dont l'écoulement s'inscrit sur un cylindre. Le temps nécessaire pour le remplissage du doigt varie chez un sujet normal de 9 à 13 secondes. — M. Gasser a employé la décoloration des couleurs d'aniline par le bacille typhique, comme moyen de distinguer ce dernier des autres microbes. Cette réaction ne peut servir à le distinguer du *bacterium coli* qui décolore également les plaques colorées; il est vrai que la forme des cultures est un peu différente. — M. Laguesse a étudié la façon dont les très jeunes écrevisses s'attachent à l'abdomen de la mère : la fixation se fait d'abord par un filament chitineux, reste de la première mue; plus tard, la jeune écrevisse se tient par la pince. — M. Rebourgeon a trouvé le microbe du *beriberi* dans la moelle des malades morts de cette affection; les cultures injectées aux chevaux ont produit chez ces animaux le *quebrabum*, qui n'est qu'une forme équine du *beriberi*. — MM. Debray et Legrain adressent une note sur la production d'hydrogène sulfuré par les bactéries. —

MM. Combemale et François ont étudié les propriétés physiologiques et thérapeutiques du bleu de méthylène; cette substance ne produit aucunement l'anesthésie chez les animaux, mais elle a donné plusieurs succès dans des cas de névralgie chez l'homme. — MM. Charria et Gley ont analysé le mécanisme physiologique par lequel les produits solubles du bacille pyocyanique s'opposent à l'inflammation. Ces produits paralysent les centres vaso-dilatateurs, comme le démontre la suppression de l'action réflexe du dépressant du cœur et du nerf de l'oreille chez les lapins ayant reçu ces produits en injection intra-veineuse. — M. Déjerine a eu l'occasion de faire l'autopsie d'un cas de *névrite apoplectiforme*, qui avait frappé un bras du sujet. Il a trouvé autour du plexus brachial un nodule de tissu scléreux, en partie ossifié, avec amas d'hématoidine; aucune lésion cérébrale ni médullaire. Il s'agit donc bien dans ce cas d'une hémorragie soudaine enveloppant les troncs nerveux. — M. Krogus (de Helsingfors) a trouvé dans les urines de malades atteints de pyélite un bacille spécial (*arobacillus liquefaciens septicus*) qui décompose l'urée et tue rapidement les lapins avec hyperthermie. Ce microbe semble jouer un rôle important dans les accidents de l'infection urinaire.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 18 juillet 1890.

M. Lucien Poincaré : forces électromotrices dans les électrolytes fondus. — M. Bouty fait au nom de M. Stoletoew une communication sur les phénomènes actino-électriques. Les deux pôles d'une pile sont attachés respectivement aux deux armatures A et B d'un condensateur plan. A est une lame pleine, B est un grillage métallique. Un galvanomètre intercalé dans le circuit n'indique aucune déviation, mais vient-on à projeter sur B un faisceau de lumière violette, un courant s'établit aussitôt qu'il est indiqué par le galvanomètre. M. Stoletoew a cherché l'influence qu'exerce sur l'intensité de ce courant la pression du gaz séparant les deux armatures. A cet effet la lame A est enfermée dans une boîte parallélépipédique fermée sur l'une de ses faces, par une lame de quartz qui laissera pénétrer les radiations violettes; la lame B est obtenue en argentant la face interne de la lame de quartz et enlevant avec un tracelet l'argenteure le long de traits parallèles, à la manière des constructeurs de réseaux. Les pressions sont exactement mesurées, les plus faibles avec une jauge de MacLeod. L'intensité du courant ne varie pas proportionnellement à la force électromotrice; pour une force électromotrice donnée, l'intensité augmente d'abord avec la pression, quand celle-ci est assez forte au début, passe par une valeur critique, puis décroît lentement; pour de faibles pressions le courant demeure au contraire presque invariable. — M. Bouty fait ensuite une communication sur le résidu des condensateurs; la *Revue* rendra compte de ce travail. — M. Dufet étudie les indices de réfraction des différents quartz; on ne savait pas jusqu'à présent si le quartz possède ou non un indice de réfraction absolument fixe, indépendant de la nature de l'échantillon considéré; les mesures effectuées étaient peu concordantes, et ne pouvaient être comparées entre elles. Les expériences de l'auteur prouvent, que pour tous les quartz limpides l'indice est rigoureusement le même à une température bien déterminée; pour les quartz enfumés il varie un peu plus irrégulièrement; pour toutes les améthystes il conserve une même valeur, un peu plus forte que celle correspondant au cristal de roche ordinaire. Dans toutes ses déterminations, M. Dufet s'est servi avec avantage du réfractomètre de M. Pulfrich, cet appareil peu connu en France, fréquemment employé en Allemagne, utilise la méthode de la réflexion totale; il permet d'éviter les erreurs systématiques, et l'influence des variations de température.

LUCIEN POINCARÉ.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 19 juin 1890

1^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. H. Griffiths présente une note sur la détermination de quelques points d'ébullition et de congélation au moyen du thermomètre de platine. Ses expériences ont eu pour but : 1^o de comparer les lectures faites sur des thermomètres de platine, fabriqués avec des échantillons différents de fil, arrangés de différentes manières et isolés par des substances différentes ; 2^o de trouver une méthode exacte pour graduer ces thermomètres sans recourir à l'emploi direct du thermomètre à air ; 3^o de déterminer certains points d'ébullition et de congélation. M. Griffiths donne des détails complets sur la construction de ces thermomètres. Voici les conclusions auxquelles il arrive : 1^o bien que les courbes de température fournies par les différents thermomètres varient considérablement, les températures moyennes déduites de ces courbes sont pratiquement d'accord ; 2^o les thermomètres, construits et gradués, de la manière indiquée, peuvent être employés pour la détermination exacte des températures jusqu'à 500° C. environ. — M. W. C. Dampier Whetham présente une note sur le prétendu frottement à la limite d'un liquide en mouvement. Il a observé le temps d'écoulement d'un volume connu d'eau à travers un tube de verre ; l'intérieur du tube a alors été argenté, et on a pris une nouvelle observation avec la même pression et le même volume d'eau. A la suite de quatre séries d'observation sur trois tubes différents, M. Dampier Whetham a constaté que les temps d'écoulement dans les tubes de verre étaient à 0,7 près les mêmes que les temps d'écoulement dans les tubes argentés, bien que l'on se soit servi de tubes recouverts de diverses épaisseurs d'argent et que la vitesse (gradient of velocity) ait été poussée jusqu'aux limites du mouvement linéaire. M. Dampier Whetham a expérimenté aussi sur des lacons oscillants, ordinaires et argentés, et a montré qu'il n'y a pas de frottement avec les solides qui se laissent mouiller par le liquide dont on se sert. Ces résultats sont entièrement opposés à ceux auxquels était arrivé M. Helmholtz. — M. H. J. Chaney a déterminé à nouveau le poids d'un ponce cubique d'eau. Le meilleur moyen pour déterminer le poids d'un volume donné d'eau est de déterminer le poids de l'eau déplacée par un corps ou gravimètre dont les poids dans l'air et dans le vide, et les dimensions linéaires peuvent être précisément déterminées. M. Chaney s'est servi pour ses expériences de trois gravimètres différents : (C). Un cylindre circulaire creux en bronze recouvert de platine de 9 pouces de diamètre et de hauteur, (Q) Un cylindre de quartz de trois pouces de diamètre et de hauteur, (S) Une sphère creuse de diamètre de 6 pouces. Il a trouvé que dans l'air un ponce cubique d'eau distillée, exempté d'air, pèse à la température de 62° F.

C.....	252.297 grains
S.....	252.301 —
Q.....	252.261 —

On est arrivé à une plus grande exactitude avec la sphère qu'avec les cylindres, aussi en calculant le poids du ponce cubique a-t-on assigné une plus haute valeur à S ; un ponce cubique d'eau pèse donc $252,286 \pm 0,002$ grains. — M. W. H. Dines présente une note sur la pression du vent sur une surface inclinée. Il s'est servi pour ses expériences d'une table tournante de 56 pieds de diamètre ; les observations ont porté sur des plaques carrées et circulaires. Les expériences faites avec une plaque circulaire exposée au vent dans diverses positions (son plan étant toujours vertical, mais faisant différents angles avec la direction du vent) montrent que la composante tangentielle de la pression du vent est si petite en comparaison de la pression normale, qu'on peut la négliger. M. Dines a aussi étudié

l'effet des surfaces rugueuses et la distribution des lignes de courant sur la surface de la plaque. La pression sur la plaque varie avec la hauteur barométrique. Les expériences ont été faites à diverses températures de 28° F à 68° F —, mais il ne semble pas que l'élevation de la température ait grand effet, peut-être cependant élève-t-elle la pression. — Le professeur W. Stroud présente une note préliminaire sur un nouveau magnétomètre. Cette nouvelle méthode pour déterminer H, la composante horizontale du champ magnétique de la terre, semble supérieure à la méthode de Gauss aux points de vue suivants : 1^o On n'a pas besoin de déterminer un temps de vibration ; 2^o on n'a pas besoin de déterminer un moment d'inertie ; 3^o on n'a pas besoin de déterminer la distance entre les deux pôles de la boussole de déclinaison ; 4^o la variation du moment magnétique de la boussole de déclinaison au cours d'une expérience ne produit pas d'erreur, non plus que la variation dans l'action inductrice de la terre ; 5^o l'aimant n'a besoin que d'être très faiblement aimanté puisque son action sur l'aiguille est due à la somme des actions des deux pôles ; 6^o il ne faut que quelques minutes pour déterminer H quand les constantes de l'instrument sont une fois déterminées ; 7^o l'instrument, sans le télescope et l'échelle, ne coûte que quelques shillings. — M. Ch. Davison présente un rapport sur les tremblements de terre d'Angleterre en 1889. Après avoir décrit les cinq tremblements de terre de 1889 dont les points épicentaux étaient dans l'aire des îles anglaises, il a indiqué les différences entre les tremblements de terre de Suisse et de Grande-Bretagne. Ceux-ci sont rares et les aires qu'ils occupent sont plus ou moins circulaires, ce qui implique des fentes de peu de longueur, ceux de Suisse au contraire sont fréquents et leurs aires sont allongées, leurs axes étant parallèles à ceux des chaînes de montagnes voisines, les canaux sont par conséquent longues. — M. Charles Tomlinson donne une note sur l'action des huiles sur le mouvement du camphre à la surface de l'eau. Lord Rayleigh a présenté un mémoire sur ce sujet à la Société royale le 27 mars (*Revue générale des sciences*, n° 8) ; M. Tomlinson appelle l'attention sur quelques recherches qu'il avait faites antérieurement sur cette question.

2^o SCIENCES NATURELLES. — M. C. H. Beever présente un mémoire sur le trajet des fibres du *Cingulum* et des parties postérieures du corps calleux chez le singe marmoset. Le but de ce mémoire est l'étude microscopique du trajet, dans le cerveau, de certains tracts de fibres qui n'ont pas encore été examinés en détail. La partie horizontale du *Cingulum* au-dessus du corps calleux n'est pas faite de fibres qui s'étendent dans toute sa longueur, mais de fibres qui vont du *gyrus fornicatus* au centre ovale ; la partie antérieure en avant du corps calleux unit les nerfs olfactifs à la région frontale ; la partie postérieure va de l'extrémité postérieure du corps calleux à l'extrémité antérieure du lobe temporo-sphénoïdal ; elle contient des fibres qui vont du gyrus de l'hippocampe à la surface inférieure du lobe temporo-sphénoïdal. Le *cingulum* n'est pas uni au lobule de l'hippocampe et au noyau de l'amygdale qu'il contient, comme le croyait Broca. La partie postérieure du corps calleux se divise en trois régions : 1) Le corps, dont se détache le tapetum, qui fournit des fibres à l'écorce des cornes postérieures et descendantes du quatrième ventricule ; 2), le splénium, qui finit dans le *forceps major*, et qui envoie des fibres à la partie interne du lobe occipital au-dessous de la fente de l'éperon, 3) une région intermédiaire qui forme la voûte de la corne supérieure avec le tapetum, et qui envoie des fibres à l'écorce de la lèvre supérieure de la fente de l'éperon. — MM. Walter, Spencer et Victor Horsley présentent une note sur les changements produits dans la circulation et la respiration par l'accroissement de la pression ou tension intra-cranienne. La conclusion c'est que l'accroissement de la pression intra-cranienne agit sur la circu-

lation et la respiration en diminuant l'activité physiologique de la moelle; les troubles produits par l'accroissement de pression sont d'autant plus intenses que l'activité de la moelle est plus diminuée.

Richard A. GRÉGOY.

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE BELGIQUE

Séance du 5 juillet 1890.

M. le secrétaire perpétuel communique de la part de M. le marquis de Caligny, associé étranger (Versailles), une nouvelle note sur un moyen d'employer son tube oscillant automatique à élever l'eau, sans qu'il s'arrête quand la chute motrice est notablement changée par une affluence d'eau dans le bief d'amont. Il propose de combiner le tube mobile, avec un flotteur dans une capacité en communication avec le bief d'amont, ce qui permettra d'augmenter la quantité d'eau débitée à chaque période et par suite la force de succion qui ramènera alternativement le tube sur son siège. Comme les dimensions de ce flotteur pourront être assez grandes et que la force de succion précitée cessera d'agir quand il touchera son siège, il faut pour contrebalancer l'action du flotteur de bas en haut, une force qu'on trouvera en élargissant convenablement le tube mobile au-dessus de son anneau inférieur, pourvu que le bief d'aval ne s'élève pas d'une quantité trop considérable. On trouvera de nombreux détails sur cet appareil, dans l'état où, abandonné à lui-même, il continuait à fonctionner quand le niveau d'amont baissait considérablement : Voir l'ouvrage de l'auteur intitulé : « Recherches théoriques et expérimentales sur les oscillations de l'eau et les machines hydrauliques à colonnes liquides oscillantes », pages 783 à 857. Cet ouvrage n'est pas un traité. C'est un recueil des principes découverts par l'auteur, et des machines qu'il a inventées. — M. Terby lit une note dans laquelle il résume, en ces termes, les dernières observations qui ont été faites sur les Canaux de Mars et qui semblent confirmer d'une manière certaine les découvertes de M. Schiaparelli : « Les conditions défavorables dans lesquelles se présente Mars cette année ne m'ont permis jusqu'ici de l'étudier utilement, avec mon huit pouces, que les 23, 24 et 25 juin; j'ai vu alors avec une certitude parfaite les canaux *Astusapes* et *Astobars*, la *Nilosyrte*, la *Boressyrte*, le *Protonibus* avec le lac *Isenius*, le *Callirhoe*, le *Nepenthes*, la *Libye*, sans parler des grandes lignes de la configuration qui étaient on ne peut plus visibles; l'accord avec la carte de M. Schiaparelli était remarquable. Un astronome anglais bien connu, M. Stanley Williams, a bien voulu me faire connaître les résultats de ses observations faites avec un télescope à miroir de six pouces et demi de Calver et des grossissements de 320 et de 430 fois; la netteté inusitée qui caractérise les dessins de Jupiter de M. Williams et qui contraste avec l'aspect nuageux et vague que l'on rencontre généralement dans les représentations de cette planète, faisait bien augurer des résultats à attendre de cet astronome; car, notons-le bien, la vue de l'observateur a une influence énorme dans ces recherches et il n'est pas donné à tous de pouvoir comparer l'image de Mars à une gravure sur acier, condition *sine qua non* de visibilité des détails les plus délicats. M. Stanley Williams a eu le bonheur de pouvoir reconnaître quarante-trois canaux de M. Schiaparelli et en a dédoublé distinctement six, à savoir : *Nilokeros*, *Erebus*, *Cerberus*, *Titan*, *Euphrates* et *Gigas*. M. Schiaparelli lui-même a pu commencer ses observations le 16 mai avec son dix-huit pouces; ses nouveaux dessins confirment ses découvertes précédentes et montrent le phénomène de la gémination dans un développement extraordinaire; il semble que nulle formation à la surface de cette planète n'y soit soustraite. Pour ne citer ici que deux exemples, nous dirons que le lac du Soleil, cette tache arrondie, si connue, observée pour

la première fois par Mädler, en 1830, nommée *Mer de Lockyer* par M. Proctor, n'a pu se soustraire au principe de la gémination, comme le lac *Tithonius*, elle est double aujourd'hui. Le *Golfe Sabocus*, dessiné par Huygens, en 1659, l'une des régions les plus visibles et les plus connues de Mars, appelé par M. Proctor *Détroit d'Herschell II*, est aujourd'hui formé de deux bandes noires très larges, rectilignes, parallèles et difficilement séparables. C'est au point que l'on se demande si l'astronome à l'œil d'aigle, le Rév. Dawes, en dédoublant pour la première fois la baie qui porte son nom, le 22 septembre 1862, n'était point le premier témoin d'une de ces géminations mystérieuses, comme il fut aussi, sans s'en douter, le premier observateur de quelques canaux de Mars. — M. Folie fait une lecture sur un sujet qu'il a traité récemment dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris. Les astronomes avaient calculé théoriquement la longueur de la période des variations de la latitude et l'avaient trouvée égale à 395 jours environ, dans l'hypothèse d'une Terre solide, d'où le nom de décimennuelle qu'ils lui avaient donné. Les résultats qu'ils avaient obtenus étaient discordants quant à l'origine de cette période. La discussion d'observations faites à Dorpat par M. Struve en 1823-24-25 et par Preuss en 1838 a fait voir à M. Folie que la période n'est pas de 395 jours mais bien de 336,7 jours. En adoptant ce nouveau nombre, il est parvenu à mettre d'accord entre elles toutes les valeurs trouvées pour l'origine de la période, les siennes propres résultant des observations de Struve et de Preuss (1823-1838), et celles de Peters (1842), Nyrén (1850) et Downing (1872). Il est donc manifeste que la période de 395 jours, calculée dans l'hypothèse d'une terre solide, ne répond pas aux observations et qu'il faut, pour y satisfaire, admettre une période de 336,7 jours; c'est-à-dire que la Terre est, non pas solide, mais bien, comme M. Folie l'a supposé pour établir l'existence de la nutation diurne, composée d'une écorce solide se mouvant sur un noyau intérieur également solide en majeure partie, mais fluide à sa surface. Il termine sa note par ces lignes, qui sont une réponse indirecte, mais frappante, à ceux qui ne croient pas à l'existence de cette dernière nutation : « J'engage les adversaires de la nutation diurne à réfléchir à cette conséquence et à tâcher d'expliquer autrement que je ne l'ai fait, c'est-à-dire par une hypothèse autre que la mienne sur la constitution du globe, la différence qui existe entre la longueur de la période calculée par les astronomes dans l'hypothèse d'une Terre solide et celle qui lui est assignée, avec une précision remarquable, par les observations. » — M. Van der Meensbrughe traite des propriétés physiques de la surface commune à deux liquides soumis à leur affinité mutuelle. Il rappelle d'abord que la couche de contact de deux liquides 1 et 2 ne se mêlant pas est soumise à une force contractile égale à

$$F_1 + F_2 - 2 \cdot F_{1-2},$$

F_1 étant la tension de la surface libre du liquide 1, F_2 celle du liquide 2 et F_{1-2} l'action mutuelle des deux substances; mais si l'affinité réciproque des deux liquides est assez forte, le trinome ci-dessus est négatif; dès lors la surface commune est douée, non plus d'une tension en vertu de laquelle elle tend vers un minimum, mais bien d'une force d'extension qui sollicite au contraire la couche de contact à augmenter de plus en plus. Tandis que, dans le premier cas, chaque point de la surface est soumis à une force normale dirigée vers le centre de courbure, dans le second cas il est sollicité par une force dirigée en sens inverse du rayon de courbure. Telle est la propriété fondamentale que l'auteur énonce pour la première fois et qu'il croit n'avoir jamais encore été démontrée. M. Van der Meensbrughe cite alors une série d'expériences qui mettent cette propriété en pleine lumière; il décrit d'abord l'action de la vapeur d'éther ou d'alcool sur l'eau ainsi que les mouvements tumultueux

qui se manifestent lors du contact de l'eau et de l'éther; puis les secousses périodiques qu'éprouve une bulle d'air placée dans l'eau sous un plan de verre quand on fait arriver lentement, à travers un fil de verre creux, un filet extrêmement mince d'alcool à la surface limite de cette bulle; enfin il signale les mouvements que doit prendre une petite masse liquide enveloppée d'un autre liquide, chaque fois qu'il se produit une action chimique en un ou plusieurs points du contour. — M. E. Van Beneden entretient l'Académie des résultats de la récente expédition scientifique allemande qui a exploré la surface et le fond des mers depuis les régions boréales jusque sous les tropiques.

F. F. Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 3 juillet 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Gustave Kohn : sur un nouveau mode de génération des surfaces du troisième ordre. De même qu'une courbe de troisième ordre est engendrée par les points où les coniques d'un faisceau linéaire touchent un faisceau de droites, de même une surface du troisième ordre peut être engendrée par les points où les cubiques d'un faisceau linéaire touchent les droites d'un complexe linéaire. Ce mode de génération conduit immédiatement pour les courbes du troisième ordre à la connaissance d'une infinité simple de quadrilatères, dont les sommets et les points diagonaux reposent sur la courbe; la nouvelle manière d'engendrer les surfaces du troisième ordre que propose l'auteur conduit d'une façon tout à fait analogue à la connaissance d'une infinité simple de pentagones gauches dont les sommets et les points diagonaux sont sur la surface. — M. S. Holetschek : Sur la connexion entre l'éclat des comètes et la longitude héliocentrique du périhélie à l'époque du passage au périhélie. Les comètes, en dehors de leur véritable grandeur, sont d'autant plus visibles qu'elles atteignent un plus grand éclat. Pour une comète déterminée, cet éclat est maximum quand la distance à la terre prend la valeur la plus voisine possible de la distance au soleil; plus la comète s'approche de ces conditions, plus petite est la différence entre la longitude héliocentrique du périhélie l et la longitude héliocentrique de la terre $L \pm 180$ lors de l'époque T du passage au périhélie; les comètes sont alors au moment où elles sont le plus faciles à apercevoir. L'auteur a, pour vérifier cette règle, calculé la différence $l - L \pm 180$ pour 31 comètes. Il résulte de l'examen du tableau ainsi formé que les comètes qui confirment le mieux la règle sont presque toutes périodiques, et ont un temps de révolution assez court.

2^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Jules Miesler : Recherches photographiques quantitatives sur les oscillations électriques. L'auteur a déterminé avec l'aide de la photographie la durée des oscillations de la décharge d'une batterie de bouteilles de Leyde. Il détermine en microfarads la capacité des bouteilles dont il se sert, et en quadrants le coefficient de self-induction de l'excitateur, et calcule d'après ces données la durée d'oscillation d'après la formule $\tau = \pi \sqrt{CL}$. Les durées d'oscillation trouvées par la méthode photographique sont en accord très satisfaisant avec celles que l'on calcule par la formule. — M. A. Schrauf : Sur la métacinnabérine d'Ildria. On a trouvé à Ildria un nouveau minéral de mercure que l'on a communiqué à l'auteur. Ses recherches l'ont conduit à penser que le nouveau minéral est, en réalité, identique à la métacinnabérine de Moore, que l'on n'avait jusqu'ici rencontrée exclusivement qu'en Californie. — M. Alfred Klauer étudie la Xylylhydrazine.

3^{re} SCIENCES NATURELLES. — M. Sigmund étudie un ferment séparateur des matières grasses dans le règne végétal; il est parvenu à isoler un ferment dans la

graine des plantes oléagineuses. Les recherches ont surtout porté sur les graines de colzas. On isole par l'alcool de l'extrait aqueux un corps dont l'aspect rappelle le blanc d'œuf et qu'on fait agir sur de l'huile grasse, (principalement de l'huile d'olive); dans les mêmes conditions on fait agir de l'albumine pur d'œuf. Ces recherches prouvent que le corps isolé exerce une bien plus grande action sur le corps gras que l'albumine pure. — MM. Richard Kerry et S. Fraenkel : Influence du bacille de l'œdème malin sur les hydrates de carbone. Les auteurs étudient les effets de ce bacille sur le sucre de raisin et trouvent qu'il se produit de l'alcool éthylique, de l'acide butyrique et de l'acide lactique. — M. Alfred Rodler étudie les Mammifères de la Faune de Maragha. Parmi les animaux que l'on rencontre on peut signaler des antilopes *Palxoryx Pallassii* Gaudry (sp. Wagner), *Gazella deperdita*, Gervais (sp.), *Gazella Capricornis* n. sp., *Heliophora rotundicornis* Weithofer, etc...]


Séance du 10 juillet 1890.

1^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Gottlieb Adler : « Sur l'énergie magnétique des corps à coefficient d'aimantation variable. L'auteur a démontré que l'on peut aisément arriver à l'expression suivante du travail d'aimantation d'un corps à coefficient d'aimantation variable :


$$E = - \int \left(\frac{1}{2} J \mu \cos(J, \mu) + \mu^2 \left(\frac{1}{2K_1} - \int_0^1 \frac{b^2 dy}{C} \right) \right) dv$$

L'intégration s'étend à tous les éléments dv du volume du corps magnétique. J est l'intensité primitive du champ au point considéré, μ le moment magnétique final au même point, (J, μ) l'angle de ces deux directions, enfin K_1 est la valeur du coefficient d'aimantation correspondant à la valeur finale du moment magnétique. Comme l'a déjà fait Stéphan, on considère ce coefficient comme une fonction du moment magnétique et K désigne la valeur qu'il possède à chaque instant, quand le moment magnétique est égal à la partie 0μ de sa valeur finale μ . Pour des substances dont le coefficient d'aimantation serait invariable, on aurait $K = K_1$; alors la valeur du travail se réduirait à la première partie de l'intégrale; la seconde exprime au contraire l'influence du changement de la valeur du coefficient sur l'expression de l'énergie. L'auteur discute les diverses conséquences que l'on peut tirer de là; il en résulte, en particulier, que dans les expériences de détermination du coefficient d'aimantation, par l'attraction exercée sur le corps magnétique dans un champ, on doit, à cause du changement dans la valeur du coefficient, trouver un nombre plus petit que le nombre réel. — M. Karl Exner : Sur la polarisation par diffraction. L'auteur a repris, en les modifiant et en les perfectionnant, les expériences bien connues de Stokes sur cette question. Il a trouvé, d'ailleurs, des résultats en parfait accord avec ceux obtenus par ce physicien. — M. Franz Exner : Observations sur l'électricité atmosphérique aux tropiques. L'auteur, qui s'était déjà occupé de cette question, reprend la discussion des mesures connues. Il recherche si la connexion qui existe dans nos contrées entre les chutes de potentiel et de pression s'étend aussi bien aux tropiques. Les variations périodiques quotidiennes de l'électricité atmosphérique sont bien moins prononcées au tropique que chez nous; ceci était à présumer à cause de la constance extraordinaire de l'état atmosphérique; dans la plupart des jours, il est même impossible d'apercevoir les maxima. — M. Alph. Spitzer : Sur la tétraméthylphorylucine. — M. S. Zeisel présente un mémoire : Nouvelles observations sur les dérivés des phénols : 1^{re} dérivés éthyliés de la résorcine; 2^{re} dérivés éthyliés de la métaorine symétrique, fait en collaboration avec M. J. Hertzog. En faisant réagir sur la résorcine successivement la potasse et l'iode d'éthyle, il se produit non seulement, comme on le savait déjà, l'éther diéthylique de

la résorcine, mais encore en quantité appréciable une série de dérivés plus éthylés. On a pu isoler une tétraéthylrésorcine, qui contient seulement un groupe éthyloxy et pas d'hydroxyle. L'étude de cette substance montre quelle est l'éther éthylique de la triéthylrésorcine secondaire-tertiaire. Sa formule est donc :



En dehors de ce corps, on a isolé une substance huileuse insoluble dans la potasse dont la formule brute est $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$: elle paraît être un mélange de deux triéthylrésorcines isomères que l'on ne peut séparer par distillation. On a aussi pu obtenir l'éther diéthylique de la résorcine sous forme cristalline ; il n'était jusqu'ici connu que sous forme liquide. La préparation des dérivés éthylés de l'orcine donne des résultats analogues : on obtient comme précédemment un produit tétraéthylé, on n'obtient cependant pas de triéthylorcine comparable à la triéthylrésorcine insoluble dans la potasse, il existe donc une deuxième tétraéthylorcine que l'on peut très probablement considérer comme l'éther diéthylique de la diéthylorcine tertiaire :



— M. Richard Maly. Transformation simple de la thionurée en urée.

2^e SCIENCES NATURELLES. — M. Gejza Bukowski adresse de Smyrne une troisième communication sur son voyage en Asie Mineure. — MM. Holl : Sur le développement des cellules dans les œufs de poule. Dans l'ovaire du poussin éclos on trouve la plus grande partie des cellules de l'œuf encore réunies en un amas. Les cellules sont nues, en parties rondes ou elliptiques, en partie polygonales. L'auteur examine la formation et le développement de ces cellules. — M. Joseph Schaffer : Sur les canaux de Roux dans les dents humaines. Ces canaux apparaissent quand les dents ont longtemps séjourné dans l'eau ; ils ont la plus grande analogie avec ceux qu'avait signalés M. Roux chez certaines espèces et que lui-même a rencontrés dans beaucoup de fossiles. Les formes et les caractères distinctifs de ces canaux les rapprochent beaucoup de ceux que MM. Bornet et Flahault ont rencontrés dans les coquillages marins ; c'est en partant de cette analogie que M. Schaffer compte entreprendre sur ce sujet des recherches expérimentales.

Emil WEYR,
Membre de l'Académie.

CORRESPONDANCE

LA CONFERENCE TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE ET L'HEURE UNIVERSELLE

A l'occasion de l'article de M. E. Caspari, sur l'Unification des longitudes et l'Heure universelle, récemment publié (1), M. Tondini de Quarenghi, représentant de l'Académie des Sciences de Bologne, nous fait l'honneur de nous adresser la communication suivante :

Il serait à souhaiter que la double question du méridien initial et de l'heure universelle fût toujours traitée avec la clarté, la précision et le courage de ses convictions qui caractérisent M. Caspari. Aussi l'Académie des sciences de Bologne poursuit-elle, depuis deux ans, la tâche d'en faire accepter les idées à tous les Etats (2). J'en fais juge le lecteur :

La Conférence télégraphique internationale a été saisie d'un mémoire distribué à chacun de ses membres et ayant pour titre : *Exposé des raisons appuyant la transaction proposée par l'Académie des Sciences de Bologne au sujet du méridien initial et de l'heure universelle*. Voici le texte de cette transaction, placé en tête de l'Exposé (pp. 9-10) :

« I. — L'Académie des sciences de Bologne suggère, d'abord, qu'on s'en tienne, en ce qui regarde les limites de l'unification soit des heures, soit des longitudes, aux propositions mêmes de la France en 1884, à savoir : 1) *statu quo*, c'est-à-dire *libre usage du méridien national*, dans la marine, l'astronomie, la topographie et la cartographie locale. 2) Double graduation — d'après le méridien national et l'international — dans la cartographie géographique générale, pour faire ainsi servir l'enseignement même de la géographie à rappeler et à nourrir conjointement l'amour de la patrie et celui de l'humanité. 3) Application de l'heure du méridien initial — conjointement avec l'heure locale — à la télégraphie, au profit non moins du commerce et des relations internationales que des observations scientifiques.

« II. — 4) Ensuite, et pour ce qui est du choix du méridien initial, l'Académie des sciences de Bologne demande qu'on veuille bien prendre en considération les raisons alléguées dans le rapport ci-après en faveur du méridien de Jérusalem, celle surtout tirée de la coïncidence logique des longitudes, employées comme mesure du temps, avec l'ensemble de la chro-

nologie en usage chez tous les peuples civilisés. « Quant à la double graduation, l'une en lignes noires et l'autre en lignes rouges ou en pointillé, suggérée pour la cartographie géographique générale, c'est là, évidemment, une mesure à introduire peu à peu, au fur et à mesure qu'on éditera de nouvelles cartes. »

Le 17 juin dernier, les représentants de 43 Etats et de 24 compagnies télégraphiques émettaient le vœu suivant que le général Menabrea, ambassadeur d'Italie et membre correspondant de l'Institut, communiquât, le 15 juillet, à l'Académie des Sciences :

« La Conférence télégraphique internationale, tout en ne se reconnaissant pas compétente pour trancher la question du méridien initial devant fixer l'heure universelle ; « Applaudit aux efforts de l'Académie royale des Sciences de l'Institut de Bologne pour trouver une solution qui concilie tous les intérêts ;

« Et émet le vœu que ce projet trouve bientôt sa réalisation et qu'on arrive, enfin, à l'unification dans la mesure du temps.

Un mot sur l'unique point où l'Académie des Sciences paraît ne point se rallier à l'opinion de M. Caspari, à savoir le choix du méridien initial.

« Le premier méridien neutre, dit M. Caspari, ne doit couper aucun continent important pour ne pas introduire de discontinuité dans les longitudes du même pays, afin de reporter en mer le saut de date, c'est-à-dire le point où les bâtiments faisant le tour du globe changent leur date. On avait proposé de repérer ce méridien une fois pour toutes par ses distances aux observatoires existants, suffisamment connues aujourd'hui pour l'objet qu'on se propose, puisqu'il est entendu que les astronomes qui, seuls, ont besoin d'une précision supérieure, seraient hors de cause (1). »

Distinguons, ici, l'essentiel de l'accidentel. La France ayant voté, à Washington, pour la double numération des longitudes, ce qui implique leur discontinuité, les points essentiels demeurent les suivants : 1) Que les astronomes soient hors de cause. Et ils le sont : (*Trans. art. 1^{er}*). — 2) Que le saut de date soit reporté en mer. Et il l'est en effet, à cause de la coïncidence (*ib. art. 4^e*) du jour universel avec le jour « chronologique » qui commence, à quelques secondes près, à minuit de Jérusalem. 3) Enfin, le point essentiel entre tous, c'est que le méridien

(1) Voyez la Revue du 15 juin 1890, page 321.

(2) Voir la Revue scientifique du 27 octobre 1888.

(1) Revue gén. des Sciences, p. 321.

initial ne soit fixé par aucun Observatoire national, mais qu'on le définisse « en le repérant aux observatoires existants. » Or, dans ma brochure : *Caban de l'heure universelle*, etc. (1), le méridien de Jérusalem se trouve déjà repéré à toutes les localités, plus de 260 en nombre, dont l'*Annuaire du Bureau des longitudes* de la même année donne la position géographique (2). Un pacte international pourrait garantir à ce méridien le « caractère réel d'internationalité » qu'il possède aujourd'hui.

J'ai mentionné plus haut le courage de ses convictions de M. Caspari. Je ne saurais mieux lui rendre hommage que par l'imitation. Il me paraît difficile d'admettre que 25 Etats se soient fait représenter en 1884, à Washington, pour une question offrant peu ou point d'importance. Et si les puissances acceptent la transaction que l'Académie de Bologne a empruntée aux remarquables travaux de M. Caspari, ce serait là, si je ne me trompe, un beau succès pour la France — et pour M. Caspari aussi.

CÉS. TONDINI DE QUARENGHI.

Représentant de l'Académie des Sciences de Bologne.

M. Caspari, à qui nous avons communiqué la note précédente, y répond par les remarques que voici :

Il n'y a pas en réalité de grande divergence entre l'opinion de M. Tondini de Quarenghi et la mienne. Les propositions de l'Académie de Bologne reviennent au fond aux conclusions du rapport que j'ai fait en 1884 au nom de la commission française. L'étude publiée ici le 13 juin (*Revue*, p. 321), exposait les raisons scientifiques et pratiques qui militent en faveur de ces conclusions : les réflexions qu'elle suggères à des juges compétents semblent prouver qu'elle répondait assez bien au sentiment général. Je n'ai donc pas grand mérite à avoir le courage de mon opinion. L'astronomie, la géographie et la navigation étaient et restent hors de cause. Pour les télégraphes j'insistais sur la nécessité de transmettre avant tout l'heure locale, sans exclure la transmission simultanée d'une heure conventionnelle unique, si elle était reconnue désirable. Le vœu émis depuis lors par le Congrès international de Télégraphie n'infirme pas cette manière de

voir, et n'apporte aucun élément nouveau au débat.

M. Tondini de Quarenghi pense que la présence des représentants de vingt-cinq Etats à Washington est une preuve de l'importance de la question. Il me permettra de lui faire observer que l'Académie de Bologne elle-même, en réduisant le débat à ses limites actuelles conformément aux conclusions de mon rapport, a donné pleinement raison aux considérations présentées alors au nom de la France. La conférence de Washington visait en effet bel et bien une réforme de grande portée qui aurait bouleversé dans beaucoup de pays les habitudes des astronomes, des géographes et des navigateurs, aussi bien que celles des services civils. On reconnaît aujourd'hui que c'est à recommencer, mais sur une échelle singulièrement réduite : je n'ai pas dit autre chose.


M. Tondini de Quarenghi résume les divers arguments qu'on peut faire valoir en faveur du choix du méridien de Jérusalem comme origine du temps universel. Les raisons invoquées par l'Académie de Bologne à l'appui de cette proposition méritent une discussion sérieuse et détaillée qui nous entraînerait beaucoup trop loin : il faudrait alors examiner les titres du méridien de Ptolémée, de ceux du détroit de Behring et de la grande Pyramide, sans oublier les méridiens en usage. Mon étude ne visait pas plus le méridien de Jérusalem que tout autre : ayant entrepris de démontrer le peu d'intérêt que présentait la réforme, surtout au point de vue français, il eût été contradictoire de s'arrêter à en discuter à fond les moyens d'exécution. Si la question est en effet arrivée « à l'état aigu » et s'il s'agit de décider entre les solutions aussi nombreuses qu'inconciliables qui surgissent et peuvent surgir de tous côtés : fuseaux horaires pour les chemins de fer, heure unique pour la télégraphie, heures locales et nationales, concurrence des méridiens, etc., il est fort à craindre que ces tentatives de simplification n'aboutissent à la pire confusion. Ainsi que le fait observer fort justement le journal le *Monde* (numéro du 14 juillet 1890), « Babel menace de redevenir de l'histoire contemporaine. » Je désire vivement ne pas y contribuer pour ma part.

E. CASPARI.

NOUVELLES

LA DÉCOUVERTE DU BIOPHÈNE

M. Louis E. Lévy, professeur de chimie à l'Institut de Massachussets, vient d'obtenir un corps nouveau de la série aromatique, répondant à la formule :



Ce composé, nommé *Biophène*, est intéressant en

raison de sa constitution qui le rapproche, comme on voit, du Thiophène de M. Victor Meyer et permet de le considérer, au moins théoriquement, comme un dérivé dihydrosubstitué de la benzène. Le *Technology-Quarterly* de Boston (3) indique qu'on le prépare en traitant l'acide thiodiglycolique par le trisulfure de phosphore, réaction analogue à celle qui produit le Thiophène.

Comme on devait s'y attendre, ses propriétés sont voisines de celles de ce dernier corps.

L. O.

(1) Paris, Gauthier-Villars, 1888.

(2) Voici à quelle distance Jérusalem se trouve des Observatoires mentionnés dans l'*Annuaire* : Paris : 32° 52' 32"; 2° 11' 32". — * Bénarès : 47° 42' 36"; 3° 10' 50". — Berlin : 51° 49' 23"; 1° 27' 18". — Berne : 27° 46' 40"; 1° 51' 7". — Bologne : 23° 51' 53"; 1° 35' 28". — Breslau : 18° 16' 31"; 1° 22' 43". — Bruxelles : 30° 50' 55"; 2° 3' 21". — Bucle ou Ofen : 16° 9' 55"; 1° 4' 40". — Cadix : 41° 25' 26"; 2° 45' 42". — Carlsruhe : 26° 43' 58"; 1° 47' 16". — Christiania : 24° 29' 41"; 1° 37' 59". — Copenhague : 22° 38' 24"; 1° 30' 34". — Cracovie : 15° 45' 26"; 1° 1' 2". — Edimbourg : 38° 24' 0". — Florence : 23° 57' 44"; 1° 35' 51". — Glasgow : 29° 30' 45"; 2° 38' 3". — Greenwich : 35° 43' 6"; 2° 20' 53". — Hambourg : 25° 44' 41"; 1° 40' 59". — Helsingfors : 10° 15' 50"; 0° 41' 4". — * Kazan : 13° 54' 12"; 0° 55' 36". — Königsberg : 14° 43' 22"; 0° 58' 51". — Leipzig : 22° 49' 36";

1° 31' 49". — Lisbonne : 44° 24' 29"; 5° 24' 57". — * Madras : 15° 14' 43"; 0° 3' 6". — Madrid : 38° 54' 23"; 2° 35' 38". — Mannheim : 26° 45' 30"; 1° 47' 25". — * Moscou : 25° 21' 12"; 0° 9' 24". — Munich : 23° 36' 36"; 1° 34' 26". — Naples : 26° 57' 59"; 1° 23' 32". — Odessa : 4° 27' 32"; 0° 47' 50". — * Pékin : 81° 15' 6"; 5° 21' 59". — Prague : 26° 47' 33"; 1° 23' 41". — Québec : 166° 25' 17"; 74° 5' 42". — Reykjavik : 37° 8' 6"; 3° 48' 33". — Rio Janeiro : 78° 23' 27"; 5° 13' 35". — Saint-Petersbourg : 1° 53' 44"; 0° 49' 35". — Saint-Polène : 10° 57' 6"; 2° 43' 49". — Santiago : 105° 53' 37"; 7° 38' 35". — Stockholm : 17° 9' 36"; 1° 8' 39". — * Sydney : 115° 50' 16"; 7° 43' 56". — Tiflis : 9° 36' 41"; 0° 38' 24". — Trieste : 21° 27' 6"; 1° 25' 50". — Turin : 27° 32' 39"; 1° 50' 11". — Varsovie : 14° 44' 10"; 0° 56' 45". — Vêrone : 24° 14' 20"; 1° 36' 37". — Rome (*Obs. du Capit.*) : 22° 44' 0"; 1° 30' 56".

J'ai contrôlé cette liste avec la *Connaissance des Temps* de 1890. Les Observatoires marqués d'un * sont à l'Est.

(3) Numéro de mai 1890.

CHRONIQUE

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES. — CONGRÈS DE LIMOGES 7-14 AOUT

La session tenue cette année à Limoges par l'Association française s'ouvrira le 7 août sous la présidence de M. A. Cornu, membre de l'Institut; la clôture aura lieu le 14 août et sera suivie d'une excursion finale les 15, 16 et 17 août, passant notamment à Brives, Périgueux et Angoulême.

Les membres de l'Association ont été invités par la Municipalité de la Rochelle à assister aux fêtes d'inauguration du bassin de la Palice qui auront lieu le 19 août, fêtes pour lesquelles l'escadre de l'Océan se rendra dans les eaux de la Rochelle et auxquelles assistera le Président de la République. La Compagnie des chemins de fer de l'État, pour faciliter la visite de la Rochelle, a décidé d'accorder pour cette année aux membres de l'Association demi-place à l'aller et demi-place au retour avec possibilité d'arrêts à La Rochelle. D'autre part le bureau a demandé à la Compagnie d'Orléans de bien vouloir accorder diverses facilités pour le retour des personnes qui ont à emprunter son réseau. Les indications détaillées seront données au Congrès de Limoges; mais les membres de l'Association sont prévenus que la visite à La Rochelle ne fait pas partie des excursions du Congrès et que, par suite, ils auraient à régler eux-mêmes leur voyage à partir d'Angoulême après l'excursion finale et à s'assurer d'un logement à La Rochelle, en s'adressant à la Municipalité.

Nous donnons ci-après la liste des savants étrangers qui ont promis de prendre part aux travaux de la session et une liste de communications annoncées.

SAVANTS ÉTRANGERS

MM.

Beilstein, professeur de chimie à l'Institut technologique de Saint-Petersbourg.

le R. P. Denza, directeur de l'Observatoire de Moncalieri.

Franchinot, professeur de chimie à l'Université de Leyde.

Kozloff (V.), colonel russe.

le D^r Lavisé, chirurgien des hôpitaux, à Bruxelles.

de Llaurodo, ingénieur en chef du district forestier de Madrid.

de Loriot, géologue suisse.

Malaise, membre de l'Académie royale de Belgique.

Monnier, professeur de chimie biologique à la Faculté des sciences de Genève.

le D^r Petersen (C. J.), professeur à l'Université de Copenhague.

le D^r Putzeys, professeur d'hygiène à l'Université de Liège.

MM.

Ragona (Prof. Domenico), directeur de l'Observatoire de Modène.

le D^r Schmidt (Valdemar), professeur à l'Université de Copenhague.

Schoute (P. H.), professeur de mathématiques à l'Université de Groningue.

le D^r Semmla, sénateur, professeur et directeur de la clinique thérapeutique à l'Université de Naples.

le chevalier J. da Silva, architecte de S. M. le roi de Portugal.

Sylvester (J. J.), professeur à l'Université d'Oxford.

le D^r J. Thiriar, professeur agrégé suppléant à l'Université de Bruxelles, membre de la Chambre des représentants de Belgique.

Vilanova y Piera, professeur de paléontologie à l'Université de Madrid.

le D^r De Martin, professeur à l'Université de Gand.

COMMUNICATIONS ANNONCÉES

I^{er}. — SCIENCES MATHÉMATIQUES

MM.

Barbarin. Propriétés de l'Hyperbole déduites de la géométrie descriptive sur une équation du second ordre.

Casalunga (D. A.). De la machine à vapeur dite « Compound » par rapport à un cylindre. Avenir de la machine à vapeur en général.

Fontaneau. Note sur l'équilibre d'élasticité des corps isotropes.

Garrigou-Lagrange (Paul). Observations sur le choc.

Gohierre de Longchamps. Intégration de l'équation de Brassiné par les fonctions hyperbernoulliennes, à clef du second degré.

MM.

Matrot. Sur la décomposition d'un entier quelconque en une somme de carrés. — Sur les résidus quelconques.

Rebière (Alphonse). Note sur quelques mathématiciens.

Sauvage. Etude sur la transformation du mouvement rectiligne en mouvement circulaire, et vice versa.

Schoute (P. H.) Plans osculateurs et aux points tangentiels d'une série de courbes gauches.

Tarrade. Système de navigation aérienne. — Système de sécurité absolue pour les voyageurs en chemin de fer.

II. — SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

MM.

Béchamp (A.). Considérations sur le phénomène de coagulation.

Blanc (E.). Notes sur l'origine et le mode de formation des dunes sahariennes.

le D^r Carret (Jules). Le froid des nuages.

Casalunga (D. A.). Considérations générales élémentaires sur la chaleur.

le D^r Fines. Vitesse de direction du vent à Perpignan. Variations horaires de l'électricité de l'air.

Garrigou-Lagrange (Paul). De quelques particularités du climat limousin.

MM.

Hautecœur. Irrégularités du courant de l'Atlantique-Nord. — Les courants de l'Atlantique-Nord en 1889, d'après les épaves flottantes. — Le printemps de 1890.

Maccé de Lépinay. Sur l'achromatisme des franges d'interférence des demi-lentilles de Billet.

Peyrussou (Edouard). Une question de chimie céramique.

Ruffin (A.). De l'huile de lin et de sa falsification par l'huile de poisson. — Observations relatives à l'emploi du polarimètre pour les recherches et le dosage du sucre dans les urines.

le D^r Vincent. De la vue ascendante verticale ou plus ou moins oblique. — Du paratonnerre portatif et du paratonnerre improvisé.

III. — SCIENCES NATURELLES

MM.

le D^r d'Arsonval. Origine de l'électricité animale.**le D^r Ballet** (Gilbert). La dyspepsie et l'anémie des mangeurs de soupe.**Béchamp** (A.). Nouvelles recherches sur les laits de vache, de chèvre, d'ânesse et de femme.**le D^r Bérillon** (E.). Indications de l'hypnotisme dans le traitement de l'ataxie locomotrice (*Tabes dorsalis*).**le D^r Bertin** (G.) et **Picq** (Jules). Essai sur la prophylaxie de la tuberculose et la substitution de la chèvre à la génisse comme sujet vaccinifère.**le D^r Boulland** (H.). Des plis du pavillon de l'oreille au point de vue de l'identité.**le D^r Brénaud.** Procédé d'abaissement de la cataracte. — Divers procédés de provocation de l'accouchement prématuré.**Caraven-Cachin** (Alfred). De l'âge des conglomérats tertiaires du Tarn et de l'Aude. — Etude sur les argiles virulantes Lutéliennes du Tarn. — Descriptions des argiles rutilantes Barbonniennes du Tarn.**le D^r Carret** (Jules). La grotte de la Doria.**le D^r Chénieux.** Statistique opératoire sur l'ovariotomie et l'hystérectomie abdominale. — Présentation de malades.**le D^r Doursout.** Préparations anatomiques. — Procédé de conservation de la flexibilité des ligaments articulaires.**de Foville** (A.). La propriété bâtie en France.**Goreix.** Etude des gisements de diamants dans l'Etat de Minas-Geraes et conclusions qu'on peut en tirer sur l'origine de cette pierre précieuse. — Le terrain Archéen dans le plateau central de Minas-Geraes. — Etude de quelques minéraux rares de Minas-Geraes.**Jardin** (Edelestan). Coup d'œil sur la flore du Gabon.**le D^r Jaquet.** Sur les lésions du foie dans la syphilis héréditaire.**le D^r Lemaistre.** Empoisonnement saturnin par la meule d'un moulin.

MM.

le D^r Lemaistre (J.). Structure du voile du palais. Abcès des amygdales et des glandes des lèvres.**le D^r Léon Petit.** L'œuvre des enfants Tuberculeux.**le D^r Ch. Livon.** L'innervation du muscle crico-tyroïdien.**Malinvaud** (Ernest). Les genres critiques de la Flore de la Haute-Vienne.**le D^r Manouvrier** (L.). Détermination expérimentale de la série suffisante pour l'évaluation du degré de fréquence des caractères anthropologiques. — Etude des squelettes humains trouvés à Andresy (Seine-et-Oise). — Epoque mérovingienne.**Olivier** (Louis). Application des recherches bactériologiques à l'extinction d'une épidémie localisée de fièvre typhoïde.**le D^r Petit** (L. H.). La coxalgie tuberculo-arthritique.**le professeur Potain.** Sur le bruit de Galop.**Prieolan.** De la tuberculose avancée, consécutive à la tuberculose osseuse.**le D^r Queirel.** Curetage de l'utérus.**le D^r Raymond.** Traitement des hernies étranglées, enflammées ou irréductibles par Kélotomie suivie de cure radicale.**Rivet** (Joseph). Du carcinome encéphaloïde, envisagé au point de vue de sa fréquence, de la rapidité de son développement et des maladies qu'il peut occasionner. — De l'éclampsie, au point de vue de ses causes. — De l'hématurie enzootique des vaches de la Creuse.**Soulé** (Albert). Observations sur quelques Annélides de la station zoologique de Cette.**le D^r Tronchet.** L'épidémie de l'Influenza à la Rochelle.**Captaine Trivier.** Traversée de l'Afrique de l'Atlantique à l'Océan Indien.**M. Künckel d'Herculais.** 1^{re} Les parasites des Acridiens. — 2^o Du parasitisme comme cause des migrations. — Des Acridiens vulgo sauterelles. — 3^o Résultats de la campagne de 1889-1890 contre les Acridiens vulgo sauterelles.

IV. — SCIENCES ÉCONOMIQUES

MM.

Andouard. Projet de filtrage de l'eau de la Loire pour l'alimentation de la ville de Nantes.**Auriol.** De la reconstitution du vignoble dans le département de l'Aude.**le D^r Baraduc.** Note sur la conservation indéfinie et l'ingestion du sang défilbriné (Globules et serum) dans la chlorose, l'épuisement nerveux, les méthorrhagies. Electricité intra-stomacale et dilatation d'estomac.**le D^r Bérillon** (E.). Nouvelles applications de la suggestion à la pédagogie pénitentiaire.**Biny.** Méthode de correction pour la triangulation d'une carte géographique ou topographique. — Procédé rapide permettant de vérifier a priori, d'après une carte quelconque, si deux positions géographiques élevées peuvent communiquer par le télégraphe optique.**Bourgeois** (J.). Coup d'œil sur la distribution géographique des Coleoptères Malacodermes et appartenant à la tribu des Licédes.**Casalunga** (D. A.). De la propriété industrielle de quelques-uns des articles de lois ou règlements qui régissent les brevets d'invention.**Callot** (Ernest). De l'enseignement des langues anciennes. **Colard** (Charles). Quelques considérations sur l'impôt foncier.

MM.

Dehéran. Dosage de la potasse dans la terre arable et de l'emploi du sel de potasse. — Rôle de l'humus dans la terre arable. — Maturation du blé en 1888 et 1889 au champ d'expériences de Grignon.**Ducourtieux** (P.). Des écoles de hameau en Limousin. **le D^r Dunoyer.** Note sur les fosses de Ferglas. Un cas d'ascite congénitale.**Grodet** (Albert). Le Crédit foncier colonial en France, ses résultats depuis son institution.**De Gurrac** (Jules). Sur la faune pélagique de quelques lacs du Jura français.**Lucas** (Ch.). De la reconstitution des écoles provinciales d'Art en France.**le D^r Masse.** Etudes de topographie cérébrale.**Peyrusson** (Edouard). La purification de l'air.**Raffalovich** (Arthur). Du rôle de la spéculation. — La réglementation du travail en Russie. — Les habitations ouvrières, au point de vue économique et financier. — L'enquête décennale sur les institutions d'utilité publique de la Haute Alsace.**Rebière** (Alphonse). Un dictionnaire de Mathématiques.**le D^r Suarez de Mendoza.** Sur la suture de la cornée dans l'opération de la cataracte. — Sur l'audition colorée.**Tarrade.** Alphabet automatique.

Le Gérant: OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LES PROGRÈS DE LA PALÉONTOLOGIE

Les visiteurs de notre Exposition universelle de 1889 ont constaté le développement que les sciences d'application ont pris à la fin de ce siècle. Mais ils n'ont pu se rendre compte du développement non moins extraordinaire qu'a pris la science pure. A côté du mouvement tumultueux des affaires et des plaisirs, bien des travailleurs passent leur paisible existence à observer, à méditer, et notamment beaucoup d'entre eux, peu soucieux de leurs intérêts matériels, s'occupent du monde passé plus que du monde présent. Une curieuse preuve en est fournie par un livre qui vient de paraître sous le nom d'*Annuaire géologique universel pour 1888*.

Il y a quelques années, le Dr Dagincourt a fondé un recueil destiné à donner chaque année un résumé des travaux de géologie et de paléontologie. Ce recueil a bientôt atteint de vastes proportions. Le volume destiné à faire connaître les publications de 1888 comprend une liste de livres, brochures ou notes qui, pour cette année seulement, arrivent au chiffre incroyable de 3550; il occupe 1261 pages. La partie géologique a été dirigée par M. le Dr Carez, auteur de la nouvelle carte géologique de la France; la partie paléontologique a été dirigée par M. Douvillé, Ingénieur en chef des Mines, professeur de Paléontologie à l'Ecole des Mines. Ces savants ont choisi pour collaborateurs des spécialistes très habiles: à Paris, MM. Bergeron de la Sorbonne, Brongniart du Museum, Cossmann, Dollfus, Gauthier, Haug de la Sorbonne, de Margerie, le Dr Trouessart, Zeiller, professeur à l'Ecole des Mines; à Caen, M. Bigot, chargé de cours à la Faculté; à Laval, M. Oehlert;

à Bourges, M. Péron; à Lyon, le professeur Depéret; à Grenoble, M. Kilian, chargé de cours à la Faculté; à Bordeaux, le professeur Fallot; à Marseille, M. Le Verrier, Ingénieur en chef des Mines; en Belgique, MM. Rutot et Van den Broeck; en Suède, M. Svedmark; en Hongrie, M. Pethő; en Russie, le professeur Pavlow; en Portugal, M. Choffat; en Italie, MM. Aichino et Johnston-Lavis.

Comme on le voit, l'*Annuaire géologique* est devenu une œuvre collective, internationale. Les savants qui s'y dévouent n'ont d'autre mobile que la généreuse pensée d'être utiles à leurs compagnons d'étude en leur donnant le moyen de se tenir au courant des innombrables publications qui se font chaque année. Mais en même temps ils apportent une démonstration singulièrement frappante du développement des sciences géologiques et paléontologiques. Le progrès de ces sciences paraît prodigieux, lorsqu'on réfléchit qu'elles n'existaient pas dans le siècle dernier; la lumière projetée sur l'histoire des âges passés et sur la formation du monde organisé n'est pas un des résultats les moins étonnants des efforts de l'esprit humain dans le XIX^e siècle.

La Société géologique de France, chargée de propager dans notre pays l'étude de la géologie et de la paléontologie, a eu une grande part dans le progrès de ces sciences. Depuis sa fondation en 1830, elle a fait de volumineuses publications; ses Bulletins et ses Mémoires ont une importance considérable. Cependant ils sont devenus insuffisants; de nombreux travaux paléontologiques ont dû paraître soit dans d'autres recueils, soit dans

des ouvrages particuliers. On a pensé qu'il était nécessaire d'ajouter aux publications de la Société géologique des Mémoires uniquement consacrés à la paléontologie, pour lesquels il y aurait des souscripteurs spéciaux. Ces Mémoires rempliront le même but que ceux de la *Palaeontographical Society* de Londres, de la *Palaeontographica* allemande, de la *Société paléontologique suisse*, les *Beiträge zur Paläontologie Österreich-Ungarns*.

Le premier fascicule des nouveaux Mémoires paléontologiques de la Société géologique de France vient de paraître¹. Il commence par un travail fait par l'auteur de cet article; il a pour objet la comparaison du Dryopithèque avec l'homme et les singes les plus élevés; une planche dessinée par Formant montre à côté les unes des autres les mâchoires de la Vénus Hottentote, du Chimpanzé, du Gorille et du Dryopithèque. Un second mémoire dû à M. Seunes, de la Sorbonne, présente une étude des dernières Ammonites qui ont paru dans le monde; on y voit les figures de trois espèces d'Ammonites du danien de Fresville, dans la Manche. Le troisième travail du nouveau fascicule est le commencement d'un mémoire de M. Depéret sur les animaux pliocènes du Roussillon. Le D^r Donnezan a formé au Serrat d'en Vacquer, près de Perpignan, des collections de vertébrés si importantes qu'elles rivalisent avec celles des plus riches gisements de la France, tels que Sausan, Perrier, le mont Léberon, Caylux. On

pourra en voir de beaux spécimens dans le Museum de Paris, car la générosité du D^r Donnezan égale le talent avec lequel il sait découvrir les fossiles. Son compatriote le professeur Depéret s'est chargé de décrire les curieux animaux tirés du pliocène de Perpignan. Il a débuté par l'étude du *Dolichocephalus* dont M. Donnezan a trouvé une tête presque entière et de nombreux ossements; c'est la première fois, depuis les fouilles faites à Pikermi, que l'on a découvert une tête de singe fossile.

D'autres fascicules suivront prochainement; ils comprendront des travaux du marquis de Saporta sur des plantes fossiles de la Provence, de M. Nicklès sur des Ammonites crétacées d'Espagne, de M. Depéret sur les Mammifères du Roussillon, de M. Douvillé sur les Rudistes, etc.

Nous ne pouvons pas laisser perdre les trésors scientifiques enfouis dans le sol de la France; aucun pays de l'Europe n'a fourni d'aussi nombreux Mammifères fossiles. La Paléontologie a été fondée dans notre Jardin des Plantes; c'est pour nous un devoir d'honneur de développer cette étude qui a découvert à l'esprit humain des horizons si vastes et si inattendus. Espérons que les nouveaux Mémoires de paléontologie recevront bon accueil et contribueront à répandre la grande science qui traite des origines du monde organisé.

Albert Gaudry

Membre de l'Académie des Sciences.

ESSAI D'UNE THÉORIE DE L'INFECTION

MALADIE, GUÉRISON, IMMUNITÉ, VIRUS, VACCIN

Il est possible, je crois, de formuler aujourd'hui une théorie systématique de la maladie infectieuse, avec ses accidents locaux ou généraux, de la guérison, de l'immunité acquise et de l'immunité naturelle. En face de ces conceptions qui visent l'homme ou l'animal, on peut donner aussi la théorie de la virulence et de l'atténuation: ce qui a trait au microbe.

Avant d'aborder cette synthèse, il est nécessaire d'analyser les procédés par lesquels les microbes peuvent influencer un organisme animal, et les

moyens par lesquels l'organisme animal peut agir sur les microbes.

1. — PROCÉDÉS PAR LESQUELS L'ORGANISME ANIMAL INFLUENCE LES MICROBES

Il est des espèces animales dont le corps, à l'état vivant, ne peut pas permettre le développement de certains microbes. D'autres espèces sont particulièrement favorables à la vie de certaines bactéries. Entre ces termes extrêmes, on observe des degrés innombrables dans l'immunité et dans la réceptivité.

L'impossibilité où se trouve tel microbe d'attaquer tel organisme animal ne tient pas nécessairement à la vie de ce dernier, car dans les tissus et dans les humeurs d'animaux rendus réfractaires on peut constater que le développement de certains mi-

¹ Mémoires de la Société géologique de France. Paléontologie, tome I, fascicule 1. Grand in-4°, chez Baudry, 15, rue des Saints-Pères, 1890. — Pour les renseignements relatifs à la rédaction, on pourra s'adresser à M. Bergeron, secrétaire de la Société géologique, au siège de la Société, 7, rue des Grands-Augustins.

crobes est devenu difficile, parfois impossible, même quand ces tissus sont pris sur l'animal mort, même quand ces humeurs extraites de l'organisme sont filtrées et débarrassées de toute cellule.

Mais il est des circonstances où la vie de l'animal exerce une influence manifeste sur la difficulté qu'éprouve le microbe à l'envahir. Je n'en veux pas d'autre preuve que ce simple fait : un animal vivant est réfractaire à une bactérie, qu'elle soit ou non pathogène pour tout autre animal; il meurt et ses tissus ou ses humeurs se trouvent être un excellent milieu de culture pour cette bactérie. Donc l'immunité est quelquefois liée à la vie, d'autres fois elle en est indépendante. C'est dire que l'homme comme les autres animaux n'a pas une arme défensive unique contre les agents infectieux, qu'il assure contre eux son intégrité ou qu'il la rétablit par des procédés multiples.

Je n'ai pas l'intention de faire ici l'exposé et la critique de tous les procédés par lesquels on a imaginé que les animaux échappent aux entreprises des microbes. J'en veux retenir deux cependant, parce qu'aujourd'hui tout l'effort de la discussion porte sur deux moyens de défense que, dans des vues exclusives, on s'efforce d'opposer l'un à l'autre, tandis que, j'espère le démontrer, ils se trouvent toujours associés et se prêtent d'ordinaire un mutuel appui. Dans l'une de ces conceptions, l'immunité résulte d'une condition statique, c'est-à-dire chimique, de l'organisme; dans l'autre elle est assurée par une condition dynamique, par la participation de la vie, par la mise en jeu d'activités cellulaires. J'ai nommé l'état bactéricide et le phagocytisme¹. Chacun de ces deux procédés est réellement un moyen de défense de l'organisme et se montre utile, soit pour empêcher le développement de la maladie, soit pour activer sa terminaison favorable. Aucun des deux pris isolément n'est capable de garantir ou de rétablir l'intégrité de l'économie. C'est, en général, par le concours et l'association des deux procédés que l'immunité est assurée ou que la guérison s'effectue.

Des deux procédés de défense, l'un est général, je pourrais dire universel, c'est le phagocytisme; l'autre est accessoire et contingent, c'est l'état bactéricide. Mais nous verrons bientôt que, dans l'immunité acquise, c'est grâce à l'état bactéricide seulement que le phagocytisme peut s'effectuer et que, sans l'état bactéricide, il n'y aurait ni guérison, ni vaccination, la tendance au phagocytisme, l'effort curateur se trouvant entravé ou empêché jusqu'au moment où s'opère la transformation chimique des humeurs de l'individu malade. A ce

moment, le milieu étant changé, la bactérie pathogène va se modifier à son tour et perdre l'une de ses propriétés par laquelle elle avait su se soustraire jusque là à l'action destructive des cellules animales. L'importance de l'état bactéricide, cette condition de défense que je dis accessoire et contingente, grandit donc en face du phagocytisme que je disais être le moyen de protection général, universel. Il se trouve que le phagocytisme, qui est une fonction constante dans l'état de santé, ne l'est plus dans l'état de maladie et qu'il ne s'exerce que contre les microbes non pathogènes ou contre les microbes pathogènes atténués. Sans doute. Mais qu'est-ce qui fait qu'un microbe n'est pas pathogène? C'est souvent, comme je vais bientôt l'établir, qu'il est dépourvu d'une certaine sécrétion dont le produit empêche les vaisseaux de laisser sortir les leucocytes. Et qu'est-ce qui fait qu'un autre microbe est pathogène? C'est souvent qu'il possède cette sécrétion dont le produit s'oppose à la diapédèse et par conséquent au phagocytisme.

Phagocytisme. — Dans toute la série des êtres du règne animal, une détérioration locale provoque dans la partie lésée ou menacée une accumulation des cellules mésodermiques qui affluent vers le foyer du mal et le circonscrivent, qui englobent et dissolvent quelquefois les particules nuisibles. Ce rôle, chez les Vertébrés, est accompli par des cellules capables de migration, par les globules blancs du sang ou par les leucocytes de la lymphe; il est complété par les cellules fixes de certains tissus. L'acte primordial, c'est donc la sortie des cellules blanches du sang ou de la lymphe en dehors des espaces où elles sont normalement contenues.

Le passage des globules blancs du sang des vaisseaux dans les interstices du tissu environnant, quand il se fait avec quelque abondance, est toujours un acte pathologique provoqué par une irritation locale de la partie dans laquelle s'opère la diapédèse. Les particules solides ne provoquent pas seules la diapédèse, qui est également sollicitée par certaines substances liquides ou dissoutes, essences, diastases, alcaloïdes, etc. C'est par l'intermédiaire de telles substances que bon nombre de microbes (pathogènes ou non) déterminent la sortie des globules blancs en dehors des vaisseaux.

A côté de cette diapédèse pathologique des globules blancs du sang à noyaux multiples, provoquée par l'irritation locale que déterminent certains microbes, il s'effectue normalement et constamment une migration de cellules lymphatiques à noyau unique vers la surface du tégument interne. Cela s'observe spécialement dans des points où, malgré l'intégrité du revêtement épithélial, des particules ténues et en particulier des microbes

¹ Sur le *Phagocytisme*, voir l'article de M. Metchnikoff dans la *Revue* du 30 juillet 1890, pages 425-431. (*Note de la Rédaction.*)

peuvent, sans effraction, passer de la surface muqueuse dans la profondeur du tissu sous-jacent; cela a lieu dans les alvéoles pulmonaires, sur les amygdales, sur les plaques de Peyer. Les microbes entrent, cela est indubitable, mais normalement ils ne vont pas au delà du fond du tissu lymphatique sous-muqueux; et dès qu'on constate leur présence, même dans les interstices des cellules épithéliales, ils sont déjà inclus dans des cellules lymphatiques. Avec ces cellules, quand parfois elles rebroussement chemin, ils peuvent gagner la profondeur du tissu lymphoïde. En général, dans ce trajet, les microbes subissent une dégénérescence qui s'accuse davantage à mesure qu'ils s'éloignent de la surface épithéliale et qui peut aller jusqu'à la mort et même à la dissolution. Certains microbes pathogènes sont capables de franchir les surfaces pulmonaire ou intestinale saines et échappent à cette destruction; mais par le mécanisme que je viens d'indiquer, l'entrée du sang, dans les conditions normales, est interdite aux microbes si nombreux des cavités respiratoire et digestive, aux microbes non pathogènes d'abord, mais aussi aux pyogènes et au streptocoque capsulé de la pneumonie, qui sont nos hôtes ordinaires, habituellement inoffensifs.

Hippocrate savait, et c'est une notion qu'il avait reçue en héritage de ce qu'il appelait déjà l'*ancienne médecine*, que le froid est cause des maladies aiguës, fébriles, nous dirions aujourd'hui des phlegmasies infectieuses, amygdalites, pneumonies, pleurésies, arthrites, etc. Le froid, dans ces cas, n'a pas apporté un microbe du dehors et n'a pas produit la solution de continuité par où aurait pu pénétrer l'une de nos bactéries familières; mais il a pu troubler la série des actes par lesquels les cellules lymphatiques arrêtent et détruisent les microbes pathogènes, nos commensaux, quand ils tentent de forcer les barrières et de passer de nos surfaces tégumentaires dans nos tissus ou nos humeurs. Je pense avoir établi expérimentalement la réalité de cette interprétation. Comme beaucoup d'autres, j'ai vérifié l'exactitude de cette affirmation de Pasteur que le sang normal ne renferme pas de bactéries; mais j'ai réussi à provoquer, sans vulnération, l'apparition rapide de microbes dans le sang d'animaux sains en soumettant ces animaux à l'application des causes qui provoquent chez l'homme le développement des maladies infectieuses dites spontanées, de celles qui sont causées par ces microbes pathogènes qui habitent nos cavités, et qui restent inoffensifs jusqu'au jour où quelque cause banale rend possible leur pénétration et leur pullulation. J'ai voulu d'abord agir avec le froid intense. Des cobayes sont plongés dans l'eau froide. En moins d'une demi-heure leur

température rectale peut descendre à 31°, et, le plus souvent, l'animal meurt, incapable de surmonter ce collapsus. Le sang des animaux soumis à cette brusque et intense réfrigération, semé sur milieu nutritifs, est resté stérile. Je fis alors cette réflexion que la douche ou le bain froid ne sont pas chez l'homme cause de pneumonie, tandis qu'on voit cette maladie apparaître à la suite d'un refroidissement modéré, mais graduel et prolongé.

Je provoquai alors la réfrigération chez un grand nombre d'animaux par l'immobilisation, par le séjour dans la glacière, par la faradisation cutanée, par le vernissage. Au bout de deux heures, chez un animal sur quatre, parfois chez un sur trois, une goutte de sang mise en culture donne des colonies bactériennes.

L'inanition qui n'a pas été prolongée au-delà de vingt-quatre heures n'a donné que des résultats négatifs.

Dans une expérience de Charrin et Roger, où ils avaient pensé d'abord étudier l'action du surmenage, un cobaye maintenu pendant quatre heures dans une roue comparable à celles des cages d'écureuil et animée d'un mouvement continu de rotation, avait un sang tellement envahi qu'une seule goutte donna huit colonies bactériennes. Il ne s'agissait pas là de surmenage: l'animal avait été passif; il n'avait pas couru, mais avait été roulé pendant quatre heures. L'action de la frayeur et des ehocs avait provoqué un véritable état d'arrêt des actes nutritifs qui se traduisait par l'abaissement de la température. Au moment de la prise du sang, le thermomètre ne montait dans le rectum que jusqu'à 34°.

Les influences nerveuses inhibitoires entravent donc le phagocytisme normal qu'accomplissent, dans l'épaisseur du tégument interne, les cellules lymphatiques aux prises avec les microbes pathogènes qui vivent sur nos surfaces sans nous nuire. La suspension passagère de ce phagocytisme normal a pour effet de permettre à ces microbes de passer du poumon, du pharynx ou de l'intestin dans le sang. Nous verrons que des causes nerveuses du même ordre entravent aussi le phagocytisme pathologique, celui qu'accomplissent dans l'intimité des tissus les globules blancs du sang; et que, du même coup, la maladie infectieuse s'aggrave ou se généralise.

Qu'on le considère dans les conditions normales ou dans les conditions pathologiques, le phagocytisme est l'une des manifestations de la *nature médiatrice*, l'un des modes de l'effort naturel préserveur et curateur. L'envahissement de l'organisme par certains microbes empêche, ou amoindrit, ou retarde cet effort. Cette entrave est l'une

des causes qui rendent la maladie infectieuse *possible ou grave ou durable*.

État bactéricide. — L'état bactéricide est le second moyen par lequel l'organisme animal résiste à l'invasion des bactéries ou triomphe de celles qui ont réussi à le pénétrer. J'entends par état bactéricide, non pas seulement ce qui tue ou dissout les microbes, mais ce qui ralentit leur croissance ou leur multiplication, entrave leur nutrition, amoindrit leurs fonctions.

De même que je ne suis pas entré dans le détail de la découverte de Conheim ni de celle de Metchnikoff, de même je ne rappellerai pas les faits de Grohmann, de Fodor, de Flügge, de Nuttal, de Nissen, de Petruchky, de Buchner sur lesquels a été fondée la notion de l'état bactéricide des humeurs normales d'un certain nombre d'animaux sains. Quand on sait quelles minimes différences dans la composition chimique des milieux inertes rendent plus ou moins active la végétation des microbes; quand on peut par l'addition ou la soustraction de faibles doses d'une substance chimique arrêter toute manifestation de la vie bactérienne ou la laisser subsister en imposant au végétal des modifications considérables dans la rapidité de sa pullulation, dans sa forme, dans ses fonctions et en particulier dans celle de ses fonctions chimiques qui constitue sa virulence; quand on fait ainsi subir à la bactérie des dégénérescences ou des atténuations qui peuvent se continuer héréditairement pendant un temps plus ou moins long, même quand on la replace dans son milieu accoutumé; quand, par d'autres modifications du milieu inerte, on peut au contraire augmenter l'intensité de la vie du microbe, restituer et même exalter sa virulence, — on comprend que les variations dans la composition des humeurs des animaux vivants puissent produire les mêmes résultats. Et, en effet, pour des raisons purement chimiques et nullement dynamiques, suivant les humeurs et suivant les espèces ou les races animales qui fournissent ces humeurs, les bactéries qu'on y sème peuvent être tuées et même dissoutes, ou simplement empêchées dans leur développement; ou bien elles peuvent atteindre un très haut degré d'intensité dans leur vie et leur fonctionnement; enfin, entre ces deux extrêmes, elles peuvent présenter tous les degrés de l'atténuation ou de l'exaltation.

Un certain nombre de ces résultats ont été obtenus par la culture de bactéries pathogènes dans des humeurs animales débarrassées de toute cellule.

Mais ces faits si intéressants expliquent-ils pourquoi telle maladie infectieuse se développe facilement dans telle espèce animale et ne peut se réaliser chez telle autre? Nullement. Metchnikoff

et Hesse ont dit avec raison que le sang des animaux naturellement réfractaires à un microbe peut être bon milieu de culture pour ce microbe. Lubarsch a fait les mêmes constatations; mais il a reconnu de plus, et après lui Charrin et Roger, que le sang d'animaux non réfractaires à un microbe peut être bactéricide pour ce microbe. Ces faits paradoxaux prouvent que l'immunité naturelle ne dépend pas de l'état bactéricide et que la réceptivité n'est pas liée à l'absence d'état bactéricide. C'est pour l'immunité acquise que l'état bactéricide prend toute son importance.

Metchnikoff sème la bactérie charbonneuse dans le sang d'animaux vaccinés; la culture se développe bien, mais ne tue pas les animaux non réfractaires auxquels on l'inocule; la culture faite dans le sang d'animaux non réfractaires ou d'animaux naturellement réfractaires se développe également, mais conserve sa virulence. Metchnikoff a pu penser que cette atténuation produite par le sang des vaccinés était due à l'action des leucocytes qui exerceraient, même dans le sang extravasé, leur action défavorable aux microbes. J'interprète autrement cette mémorable expérience: J'y vois la première démonstration de ce fait que la maladie infectieuse, quand elle n'est pas mortelle, produit, en même temps que l'immunité, une modification durable des humeurs qui les rend bactéricides, c'est-à-dire capables de produire, si on l'y sème, l'atténuation d'un microbe de la même espèce que celui qui a produit la maladie. J'y vois encore la preuve que cet état bactéricide qui se développe en même temps que l'immunité acquise diffère, au moins par le degré, de celui que présentent naturellement les humeurs d'animaux sains, qu'ils soient ou non réfractaires. Gamaleïa a fait une constatation analogue. Il avait déjà reconnu que le bacille charbonneux inoculé au mouton *très vacciné* provoque l'œdème sans diapédèse et que cependant il se détruit dans cet œdème. Dans une autre expérience, il sème le *bacillus anthracis* dans l'humeur aqueuse extraite des deux yeux d'un mouton qui avait été vacciné dans la chambre antérieure de l'un des yeux; il n'obtient qu'une végétation grêle, analogue au virus atténué, et cela est vrai pour l'humeur aqueuse de l'œil non inoculé comme pour celle de l'œil inoculé. La virulence dans d'autres expériences analogues lui parut amoindrie. Charrin et Roger ont reconnu que, tandis que le sérum sanguin du lapin est un milieu favorable au bacille pyocyanique, le sérum du lapin vacciné est bactéricide pour ce microbe qui s'y développe assurément, mais tardivement et peu abondamment, avec des formes grêles, sans sécréter de pyocyanine, et qui, transporté ensuite dans un milieu

plus favorable, se montre encore incapable, pendant plusieurs générations, de recouvrer l'intégrité de ses sécrétions.

Charrin a pu établir que l'atténuation subie par l'agent infectieux quand on le sème *in vitro* dans les humeurs de l'animal vacciné se produit également et, sans doute par le même procédé, quand le microbe est introduit dans le corps de l'animal vacciné vivant. Charrin a vu également, avec Gamaleïa, en se servant du bacille pyocyanique, ce que Emmerich et di Mattei avaient déjà reconnu pour le bacille du rouget, que l'atténuation dans le corps des vaccinés se fait avec une extrême rapidité.

Charrin a encore constaté que cette atténuation du microbe virulent se fait spontanément dans le corps de l'animal malade, quand la maladie infectieuse guérit. On sait que si le bacille pyocyanique peut tuer en vingt-quatre heures, le même bacille puisé au même instant dans la même culture, doué par conséquent de la même virulence, provoquera une maladie beaucoup plus longue, capable de se terminer par la guérison, à la condition que la culture soit injectée sous la peau ou que la quantité de culture injectée dans les veines ait été très faible; on sait aussi que cette maladie confère l'immunité à l'animal guéri; on sait encore que cette immunité s'accompagne de l'état bactéricide des humeurs; enfin j'ai démontré que cet état bactéricide existe déjà pendant la maladie. Chez un lapin inoculé avec de petites doses de bacille pyocyanique virulent et qui présente la forme chronique et curable de la maladie, Charrin prélève chaque jour une goutte de sang qu'il dépose sur la gélose nutritive. Pendant les premiers jours, la culture est riche en pyocyanine, puis dans les cultures suivantes, le bacille qui se développe encore ne produit plus la pyocyanine, il sécrète seulement le pigment verdâtre qui ne se laisse pas dissoudre dans le chloroforme; on arrive enfin à des atténuations de la fonction chromogène et en même temps de la fonction virulente tellement profondes, qu'il faut de nombreuses cultures faites successivement sur milieux très riches pour rendre au microbe ses fonctions perdues.

Tout est microbicide dans le corps des vaccinés, les solides comme les humeurs constituantes. Roger détache les deux membres postérieurs chez deux cobayes, l'un vacciné par le bacille du charbon symptomatique, l'autre sain. Dans un des membres provenant de chaque animal il injecte la culture virulente et place les quatre membres à l'étuve. Le lendemain, la cuisse inoculée provenant du cobaye sain est emphysemateuse et crépète sous le doigt. Il n'y a pas de gaz dans la cuisse inoculée provenant du cobaye vacciné; il n'y en a

pas dans les membres non inoculés provenant l'un du cobaye sain, l'autre du cobaye vacciné. Comme on pourrait dire que les tissus sont rendus bactéricides par le sang qu'ils contiennent, Roger répète, avec les mêmes résultats, son expérience en ayant soin de faire passer, immédiatement après la mort, un courant d'eau salée par l'aorte des deux animaux, les veines étant largement ouvertes.

On a déjà donné pour cinq microbes la preuve que la vaccination produit l'état bactéricide : cela semble résulter pour le bacille du charbon des expériences de Gamaleïa et de Nuttal. Cela a été établi pour le bacille pyocyanique par Charrin et Roger, pour le bacille du charbon symptomatique par Charrin et Roger, pour le vibron cholérique par Zasslein, pour le vibron de Metchnikoff par Behring et Nissen. Plusieurs de ces expérimentateurs ont reconnu que l'état bactéricide produit par un microbe peut nuire aussi au développement de quelques autres microbes.

J'ai indiqué sommairement les conditions qui permettent à l'homme d'agir sur les microbes. Passons à l'examen des procédés à l'aide desquels les microbes peuvent agir sur l'homme.

II. — PROCÉDÉS PAR LESQUELS LES MICROBES INFLUENCENT L'ORGANISME ANIMAL

De même que j'ai laissé dans l'ombre les hypothèses par lesquelles on a pensé expliquer la réaction de l'organisme animal contre les agents pathogènes, quand ces hypothèses ne reposaient pas sur une base expérimentale digne d'être discutée, de même je négligerai l'examen d'autres théories également hypothétiques qui ont prétendu éclairer l'action qu'exercent certains microbes sur l'économie vivante.

Une notion me paraît acquise : c'est que les bactéries agissent sur les animaux par les matières qu'elles sécrètent. L'intensité de cette action chimique est proportionnelle à la masse de la substance chimique qui la produit. Cette assertion semble aller à l'encontre de la distinction admise entre la virulence et l'intoxication; et l'on ne manquera pas d'objecter qu'une bactérie unique qui pèse tout juste la millionième partie d'un millièbre de milligramme, peut causer la maladie et la mort, et que la matière sécrétée par cette seule cellule bactérienne est certainement incapable de produire le moindre effet. Sans doute, mais il faut tenir compte de la multiplication des microbes. Cette multiplication se fait avec une vitesse qui peut ne pas paraître très grande, mais qui suffit pourtant à augmenter leur nombre suivant une progression qui devient bientôt vertigineuse. Buchner et Riedlin estiment que le vibron cholé-

rique met pour doubler un temps qui varie entre 19 et 40 minutes. A ce compte un seul vibron pourrait en engendrer un milliard en moins de dix heures. Grâce à cette pullulation, les produits bactériens arrivent à constituer une masse qui n'est plus négligeable. Ces produits, même pour une seule espèce bactérienne, sont nombreux : la chimie commence à les discerner ; la physiologie n'a pas attendu qu'ils fussent isolés pour étudier leurs actions. On connaît aujourd'hui huit propriétés physiologiques des produits bactériens par lesquels les microbes pathogènes peuvent influencer les organismes animaux : Je dis huit propriétés et non huit substances différentes.

Sécrétions bactériennes qui provoquent la diapédèse.

— Par les matières qu'ils secrètent, certains microbes pathogènes peuvent produire localement une action défavorable sur les tissus et les adapter ainsi à leurs besoins ; leurs diastases peuvent hydrater, dédoubler la substance des cellules et amener leur dissolution ou leur mortification. Mais le plus souvent leur action chimique n'atteint pas à ces degrés extrêmes, et, sans être assez profonde pour supprimer la vie d'une portion de l'organisme, elle est suffisante pour provoquer des phénomènes réactionnels. Cet état irritatif se traduit dans certaines cellules par le gonflement et la karyokinèse¹, dans d'autres par les dégénérescences diverses, grasseuses, colloïdes, vitreuses ; du côté des vaisseaux par l'exsudation et la diapédèse. Grauwitz et de Bary, puis Scheurlen, puis Christmas, puis Karlinsky ont constaté que la culture stérilisée du *Staphylococcus aureus* est pyogène ; mais, comme l'a reconnu Christmas, le pus ainsi produit n'est pas pyogène, et, comme l'a indiqué Karlinsky, il est capable de se résorber. Deux substances différentes donnent à cette culture stérilisée son pouvoir pyogène : une diastase que Christmas rend inactive en la chauffant à 115°, une ptomaïne que Leber a isolée. D'autres diastases ont une action locale phlogogène : celle, par exemple, qu'Arloing a signalée parmi les produits du microbe de la péri-pneumonie épizootique et qui provoque l'œdème inflammatoire. D'autres ptomaïnes aussi ont une action locale phlogogène : en effet Grauwitz, puis Behring, ont démontré que la cadavérine provoque la suppuration sans microbes. L'œdème et la suppuration résultant de l'exsudation et de la diapédèse sont l'expression d'actes réactionnels accomplis par les vaisseaux ; mais la réaction vasculaire est-elle directe, résultant de l'action chimique immédiate des produits bactériens sur les vaisseaux ? Je ne le crois pas. Dans le tissu où s'opèrent les phé-

nomènes locaux de l'infection, il n'y a pas que les cellules ou les vaisseaux pour subir l'irritation que provoquent les substances sécrétées par les microbes ; il y a aussi les nerfs. L'irritation des filets nerveux provoque un réflexe, qui se traduit, dans la région d'où est partie l'excitation, par une dilatation vasculaire active qui place les vaisseaux dans la situation étudiée par Conheim comme étant le stade préalable de la diapédèse : la colonne des globules rouges au centre, la zone claire du plasma entre les globules rouge et la paroi vasculaire, et dans cette zone claire les leucocytes qui gagnent la surface interne du vaisseau, s'y appliquent, s'y étalent et s'insinuent entre les endothélium.

La diapédèse est le résultat d'une dilatation vasculaire active qui se produit dans la région où est encore circonscrite l'infection ; et cette dilatation est l'effet d'un réflexe sollicité par l'irritation des nerfs de cette même région, mis au contact des produits bactériens.

Dans les cas où la maladie infectieuse se généralise d'emblée sans s'accompagner de lésion locale au point d'introduction, c'est-à-dire sans que l'agent infectieux provoque la diapédèse, faut-il supposer que les choses se passent de la sorte parce que les microbes qui causent ces maladies ne sécrètent pas de matières capables de produire l'irritation locale, et qu'ils font l'infection générale parce qu'ils sont incapables de faire la lésion locale ? C'est possible ; mais j'affirme que ce ne peut être que l'exception. Je n'en veux qu'une seule preuve : les agents pathogènes qui provoquent l'infection générale d'emblée sans lésion locale n'amènent plus l'infection générale, si on les atténue, mais produisent alors une lésion locale. Je ne suppose pas que l'atténuation les dote d'une fonction sécrétoire nouvelle qui les rendrait capables d'exercer une action irritante locale. La règle, c'est que les microbes de cette sorte sécrètent des matières irritantes, mais qu'ils sécrètent aussi une matière qui empêche la diapédèse de s'effectuer.

Sécrétions bactériennes qui empêchent la diapédèse.

— J'ai mis deux ans à établir la réalité des substances qui s'opposent à la diapédèse et indirectement au phagocytisme.

Ayant appris que les matières sécrétées par les microbes, prises en bloc, ont une action vaccinante, j'avais imaginé qu'on obtiendrait plus vite l'immunité et qu'on hâterait la guérison en injectant dès le début de la maladie une dose notable de produits bactériens. Le résultat de l'expérience a trompé mon attente. Ces matières qui quatre jours après l'injection empêchent le microbe de produire la maladie ont une action toute différente quand on les introduit dans le corps de l'animal

¹ On nomme ainsi la division indirecte du noyau cellulaire. (Note de la Rédaction).

au moment même de l'inoculation ou très peu de temps avant ou après cette inoculation. Elles rendent la maladie plus rapide et plus grave; elles la rendent possible alors quelle n'aurait pas dû se développer soit en raison de l'exiguïté de la dose de virus inoculé soit en raison de l'état réfractaire de l'animal. Elles triomphent, en effet, de l'immunité, de l'immunité naturelle aussi bien que de l'immunité acquise.

Cette aggravation de la maladie, ce renforcement apparent de la virulence causés par l'injection actuelle des produits d'un microbe, je les ai constatés d'abord avec le bacille pyocyannique; Courmont les a observés avec un bacille qui produit chez la vache une pseudo-tuberculose. Roger les a vérifiés avec le bacille du charbon symptomatique et le *prodigiosus*, Monti avec le *proteus* et quelques autres saprophytes. Je les ai vus encore avec trois pathogènes, la bactériémie charbonneuse, le *Staphylococcus aureus*, le bacille du choléra des poules. En même temps qu'elle aggrave la maladie ou suspend l'immunité, l'injection des produits d'un microbe empêche de se produire la diapédèse et secondairement le phagocytisme, que provoque naturellement ce microbe. Je l'ai démontré en suivant heure par heure à l'aide de cellules capillaires placées sous la peau, l'activité avec laquelle se faisait la sortie des leucocytes et l'englobement des microbes chez les animaux inoculés dont les uns recevaient la culture stérilisée, les autres n'étaient pas injectés avec ce liquide. En injectant les produits de la bactériémie charbonneuse, du bacille pyocyannique, du *Staphylococcus aureus*, du bacille du choléra des poules, j'ai supprimé la diapédèse et le phagocytisme que provoquent ces microbes quand on les inocule à des animaux vaccinés ou à des animaux naturellement réfractaires. Par l'inoculation des produits solubles de la bactériémie virulente, j'ai empêché le phagocytisme que détermine chez les animaux non réfractaires l'inoculation du charbon atténué. Par l'injection des produits solubles d'un microbe pathogène, j'ai rendu impossible la diapédèse et le phagocytisme que provoque l'inoculation d'autres microbes, que ces derniers ne soient nullement pathogènes ou qu'ils soient des pathogènes atténués, ou qu'ils soient des virulents que j'inoculais à des animaux doués de l'immunité naturelle ou acquise.

Ce que l'examen microscopique démontrait dans tous ces cas éclatait en quelque sorte dans une expérience très saisissante. L'inoculation du bacille pyocyannique au lapin, animal peu réfractaire, donne l'infection générale sans lésion locale. Charrin a vu que chez le cobaye, animal plus réfractaire, la même inoculation ne provoque pas l'infection générale, mais amène au lieu inoculé le développement

d'une gomme qui s'ulcère et s'élimine lentement. Chez le lapin vacciné l'inoculation qui ne produit plus l'infection générale m'a permis de reproduire la même lésion locale que chez le cobaye. Si j'inocule au cobaye ou au lapin vacciné le bacille pyocyannique, en même temps que j'injecte à ces animaux les produits solubles de ce bacille, je produis chez tous deux l'infection générale, mais je ne vois plus se développer la lésion locale qui n'est que l'expression grossière de la diapédèse.

Supposerez-vous que cet arrêt de la diapédèse est dû, non à l'action des produits bactériens sur l'animal, mais à un effet empêchant qu'ils exerceraient sur le microbe inoculé, effet empêchant qui réduirait celle de ses sécrétions dont l'action irritante produit la diapédèse? Dans ce cas l'obstacle à la diapédèse devrait être surtout marqué quand l'injection est faite dans le foyer même de l'inoculation; or, j'ai constaté que cette action n'est guère plus manifeste dans ce cas que lorsqu'on fait l'injection sous-cutanée dans un point du corps très éloigné de la région inoculée; un effet incomparablement plus énergique est obtenu quand l'introduction des produits bactériens est faite par voie intraveineuse. Une autre expérience de mon laboratoire est encore confirmative de ma manière de voir. Il n'y a pas que les bactéries, il n'y a pas que les produits bactériens qui, par irritation locale, fassent naître la transsudation et la diapédèse. Elles sont sollicitées également par divers agents physiques et par d'innombrables substances chimiques. Si le gonflement inflammatoire que provoque infailliblement l'une de ces substances fait défaut quand on injecte à l'animal les produits d'un microbe pathogène, il faudra bien admettre que les produits bactériens empêchent la diapédèse par une action générale sur l'organisme animal. L'expérience a été conçue et exécutée par Charrin et Gamaleia. Chez deux lapins, une des oreilles est frottée pendant le même temps, avec la même quantité d'huile de croton; à l'un des deux on injecte dans les veines 10 centimètres cubes de culture stérilisée du bacille pyocyannique. Au bout de quatre heures, l'oreille du lapin qui n'a pas reçu les produits solubles est rouge, chaude, considérablement épaissie, son épiderme se soulève en phlyctènes. L'oreille frottée du lapin injecté est absolument saine, la vascularisation n'y est pas plus apparente que sur l'oreille du côté opposé. L'action inhibitoire de l'injection s'épuise au bout de six à huit heures et si on ne renouvelle pas les injections, l'inflammation est simplement retardée; elle fait absolument défaut si, pendant deux jours, on répète la même injection trois ou quatre fois dans les vingt-quatre heures.

Il restait à établir sur quelle portion de l'orga-

nisme agissent ces matières qui s'opposent à la diapédèse : sur les leucocytes, sur les vaisseaux ou sur l'appareil nerveux vaso-moteur ? Deux expériences de Charrin et Gley répondent à cette question.

Chez un lapin curarisé on excite le bout central du nerf déresseur, la pression artérielle tombe brusquement par le fait de la dilatation de tous les vaisseaux ; la pression redevient normale quelques instants après la cessation de l'excitation. On injecte alors dans les veines de l'animal 10 centimètres cubes de culture pyocyannique stérilisée, et immédiatement après, on excite de nouveau le bout central du nerf déresseur, l'abaissement de la pression sanguine est nul ou insignifiant, le centre vaso-dilatateur ne répond plus à l'excitation : il est paralysé.

Chez un autre lapin curarisé, on excite le bout central du nerf auriculo-cervical d'un côté ; l'oreille du même côté rougit immédiatement ; tous ses vaisseaux se dilatent. On injecte alors dans les veines 10 centimètres cubes de culture stérilisée du bacille pyocyannique, et on excite de nouveau le bout central du nerf auriculo-cervical : la dilatation vasculaire ne se produit plus.

Je puis donc dire maintenant que les microbes pathogènes ou ceux d'entre eux sur lesquels a porté mon étude sécrètent une substance qui paralyse le centre vaso-dilatateur et que même s'ils fabriquent des substances capables de produire une irritation locale, la paralysie vaso-dilatatrice qu'ils provoquent empêche les phénomènes inflammatoires de se produire dans la partie lésée, et spécialement la dilatation vasculaire, l'exsudation et la diapédèse. De cette façon les microbes sont soustraits à l'une des causes de destruction, le phagocytisme, et peuvent se développer, pulluler et sécréter en liberté.

On comprend maintenant comment les perturbations nerveuses, le froid, les commotions physiques ou morales, la fatigue, les veilles, le chagrin deviennent si souvent l'occasion du développement ou de l'aggravation d'une maladie infectieuse en amoindrissant l'action du centre vaso-dilatateur, en rendant plus difficile la diapédèse et par conséquent le phagocytisme.

J'ai étudié expérimentalement le mode d'action de ces causes banales auxquelles on attribue légitimement tant de maladies qui sont pourtant des maladies infectieuses. Des lapins vaccinés reçoivent sous la peau la culture pyocyannique dans des cellules capillaires ; les uns sont immobilisés en vue de produire la réfrigération spontanée, les autres sont laissés en liberté. Les cellules extraites à des intervalles réguliers chez les animaux des deux séries montrent chez ceux qu'on a laissés

libres une abondante migration de leucocytes ; chez les animaux refroidis, au contraire, la diapédèse est sensiblement moins intense ; les leucocytes renfermant des bacilles sont plus rares. C'est de cette façon sans doute que le surmenage, comme l'ont vu Charrin et Roger, rend l'infection plus rapide et plus grave et supprime l'immunité. On comprend aussi comment Roger a pu voir l'injection des produits du *Bacillus prodigiosus* rendre possible chez le lapin, animal réfractaire, le développement du charbon symptomatique ; comment Monti a pu penser que les produits du *Proteus vulgaris* exaltent la virulence du streptocoque de l'érysipèle ou du pneumocoque. On explique enfin ces faits depuis longtemps établis par la clinique, montrant qu'une première infection favorise l'apparition d'infections secondaires, signalant l'envahissement des articulations par le streptocoque à la suite d'infections causées dans les amygdales, le vagin, le colon par d'autres microbes. On se rend compte enfin du rôle que jouent les fermentations intestinales ou les émanations qui se dégagent de foyers putrides, dans la genèse de certaines maladies infectieuses et en particulier des inflammations suppuratives.

Tous ces faits deviennent intelligibles quand on sait que les microbes pathogènes, et même certains saprophytes, sécrètent des substances qui, paralyquant le centre vaso-dilatateur, rendent plus difficile la diapédèse et, par suite, le phagocytisme. L'action de ces substances est presque immédiate : dès qu'elles sont dans le sang, leur effet devient manifeste ; mais il cesse rapidement si de nouvelles quantités de ces matières ne remplacent pas celles qui s'éliminent ou se détruisent.

Sécrétions bactériennes vaccinantes. — En face de ces matières nuisibles, je puis signaler, parmi les produits bactériens, des substances utiles à l'organisme animal infecté : je veux parler de ce qu'on a appelé les matières vaccinantes. Je ne retracerai pas, une fois de plus, l'histoire de cette question. C'est à Washington, au dernier Congrès médical international, qu'elle est entrée enfin dans la phase expérimentale par les travaux de Salmon et Smith sur le choléra des porcs. Un mois après, Charrin rendait la découverte plus complète et la démonstration définitive en vaccinant le lapin par la culture stérilisée du bacille pyocyannique. La liste des vaccins chimiques grossit chaque jour.

On crut d'abord que ces matières agissaient par contamination, que, déposées dans l'organisme animal, elles y rendaient impossible par leur présence, la vie du microbe qui les avait fabriquées. Je pense avoir rendu peu vraisemblable cette opinion quand j'ai établi que les matières vaccinantes s'éliminent par les urines. Charrin et A. Rüffer ont fait voir qu'il faut quatorze jours pour que leur

élimination soit complète; mais après ce temps, l'état d'immunité ne persiste pas moins. Quand on vaccine en injectant des cultures stérilisées, l'état réfractaire n'est obtenu que le quatrième jour après l'injection, alors qu'une très grande partie de la matière vaccinante est déjà éliminée; il est nul immédiatement après l'injection, quand cette matière est au *maximum* dans le corps de l'animal. L'action des matières vaccinales qu'on ne constate pas quand elles sont présentes, qu'on constate quand elles sont absentes, n'est donc qu'une action indirecte. L'immunité est un effet secondaire de l'action des matières vaccinales. Qu'elle soit produite par un vaccin chimique ou par un virus vivant, l'immunité, je l'ai démontré, résulte dans le premier cas, comme dans le second, de l'état bactéricide des tissus et des humeurs, état qui est provoqué par le passage des substances vaccinales à travers l'économie et qui se maintient après leur élimination. Or les humeurs ne sont que ce que les cellules les font. C'est dire que les cellules imprégnées, même passagèrement, par les matières vaccinales élaborent et restent capables d'élaborer la matière d'une façon nouvelle; que leur type nutritif est changé définitivement. L'état bactéricide, condition statique de l'immunité acquise, est donc le résultat d'une modification permanente de la nutrition provoquée par le passage de certains produits bactériens à travers l'organisme. Si ce résultat est durable, il se produit tardivement. J'ai établi que l'état bactéricide est nul au moment où l'on vient d'injecter les produits bactériens dans le sang, qu'il est douteux pendant les vingt-quatre premières heures, nettement accusé au bout de quarante-huit heures, plus évident au bout de soixante-douze heures et de quatre-vingt-seize heures. C'est au bout de ce temps seulement que l'immunité est solidement établie.

Les matières vaccinales secrétées par les microbes pathogènes dans le corps des animaux infectés, comme elles le sont dans les cultures, produisent des effets expérimentalement démontrables seulement au bout de deux jours, et ces effets ne sont pratiquement utiles que le quatrième jour; mais ces matières se montrent présentes et agissantes pendant quatorze jours; quant à l'effet qu'elles ont une fois produit, il persiste d'une façon permanente. Quelle différence avec les matières qui s'opposent à la diapédèse! Dès quelles sont dans le sang, leur effet est manifeste. Six ou huit heures après leur introduction il est nul.

Les matières vaccinales ne sont ni toxiques ni pyrétogènes; ou du moins elles peuvent vacciner à des doses où elles ne produisent ni effet toxique ni fièvre, ce qui prouve, pour le dire en passant, que l'immunité acquise n'est pas la conséquence

d'un état fébrile et qu'elle n'est pas davantage l'accoutumance aux poisons bactériens.

Quelques autres actions des produits bactériens. — D'autres produits bactériens sont mieux connus, d'autres ont moins d'importance; je ne les signalerai que sommairement.

La fièvre des maladies infectieuses est toxique; elle a été reproduite par Charrin et A. Rüffer en injectant des poisons bactériens. Elle est provoquée par des diastases et par des alcaloïdes: par des diastases comme celle qu'a étudiée Roussy, par des ptomaines telles que la mydaléine de Brieger.

D'autres substances sont des poisons, à proprement parler: les uns agissent de préférence sur le système nerveux, les autres modifient également le fonctionnement d'autres cellules et même leur nutrition. C'est à ces poisons qu'il faut attribuer, dans les maladies infectieuses, la céphalée, le délire, les convulsions, le coma, les troubles sécrétoires, les dégénérescences musculaires, ou viscérales. La plupart de ces poisons paraissent être des ptomaines, quelques-uns sont des diastases comme celle à laquelle Gamaleïa attribue la diarrhée que provoque l'injection des cultures stérilisées du vibron cholérique.

Les expériences de Massart et Bordet¹ tendent à faire admettre que les matières secrétées par certains microbes mettent en jeu l'irritabilité des leucocytes, de telle sorte que ces cellules cheminent dans les solutions de produits bactériens des parties plus diluées vers les parties plus saturées, ce qui amènerait les phagocytes au contact des microbes.

L'impossibilité de l'englobement de certaines bactéries par les leucocytes a donné à penser qu'elles secrétaient une matière stupéfiante pour les leucocytes.

Il y a enfin des matières bactériennes qui tuent les leucocytes, dont les cadavres sont les cellules du pus; et ces matières, comme je l'ai déjà dit, sont les unes des alcaloïdes, les autres des diastases. Est-ce tout? je suis loin de le prétendre; j'ai même tendance à penser que certains microbes secrètent des diastases qui, comme celles du jequirity ou comme la papaine, facilitent le développement de l'infection générale sans empêcher la diapédèse.

Il ne me reste plus qu'à conclure, à grouper dans une synthèse les faits qui se dégagent de cette analyse.

III. — THÉORIE DE L'INFECTION

Une bactérie virulente est introduite par effraction dans nos tissus, ou l'un de ces microbes patho-

¹ Voyez à ce sujet la *Revue* du 15 juillet 1890, page 414.

gènes qui habitent nos cavités, trompant, à la faveur d'une perturbation nerveuse, la surveillance des cellules lymphatiques, passe dans nos humeurs; la maladie n'a pas encore commencé pour cela. L'agent pathogène tombe dans un milieu plus ou moins favorable à son développement. Si nos humeurs sont très bactéricides, il ne se fait pas de végétation, pas de multiplication, partant pas de maladie. Si nos humeurs sont favorables au microbe, le développement est immédiat. Si elles sont modérément microbicides, il y a une première phase de dégénérescence pendant laquelle un certain nombre de bactéries peuvent disparaître, mais pendant laquelle aussi les diastases sécrétées modifient la matière dans la zone envahie. L'adaptent aux besoins du microbe, comme la diastase de la levûre qui transforme en glycose fermentescible la saccharose et la lactose. Alors le développement de l'agent pathogène s'effectue. Que ce développement ait été immédiat ou qu'il arrive seulement après cette phase de dégénérescence, la maladie a commencé.

A partir de ce moment le végétal pullule et sécrète; la masse de ses produits de sécrétion est proportionnelle à son nombre et aussi à l'intensité de sa vie. Ces poisons peuvent causer des détériorations locales par altération chimique du tissu envahi. Ils sont aussi absorbés et provoquent les accidents pyrétiqûes, nerveux et dystrophiques qui varient suivant la nature des produits absorbés, c'est-à-dire suivant l'espèce du microbe qui les sécrète. Ces phénomènes locaux et généraux de l'infection apparaissent à l'instant précis où le nombre des microbes fait que la masse des produits bactériens n'est plus une quantité négligeable.

Ainsi, en continuant à pulluler, le microbe pousse l'intoxication jusqu'à la mort, malgré les efforts que fait l'organisme pour reculer cette échéance, en éliminant les poisons par les reins, en les transformant dans le foie, en les brûlant dans le sang ou dans les tissus: *à moins que* l'organisme dirige contre la vie des microbes les deux moyens de défense par lesquels il peut agir sur eux: le phagocytisme qui les détruit, l'état bactéricide qui modère et arrête leur pullulation, qui restreint et supprime leur sécrétion. De ces deux moyens, l'un, l'état bactéricide, n'est qu'une arme d'emprunt qui n'est donnée à l'organisme que par le microbe; il n'apparaît d'ailleurs que tardivement.

L'autre, le phagocytisme, appartient en propre à l'organisme, mais suppose la diapédèse, qui, pour s'effectuer, exige une sollicitation du microbe. Si cette sollicitation manque, si l'action irritative locale est nulle, l'infection générale d'emblée peut amener la mort avec une rapidité presque sou-

droyante. Sauf ce cas le phagocytisme est un moyen de défense, le seul pendant les deux ou trois premiers jours. Dans les infections bénignes il peut, à lui seul, produire certaines guérisons.

Mais beaucoup de microbes ont le moyen d'empêcher l'effort phagocytaire d'aboutir; ce sont ceux dont les sécrétions paralysent le centre vaso-dilatateur: ce sont aussi peut-être ceux qui par d'autres produits paralysent les leucocytes. Ces sécrétions font le danger de certains microbes, plus encore que les sécrétions pyrétogènes ou vénéneuses. En face de ces microbes, l'organisme est désarmé ou ne dispose que de moyens palliatifs.

Mais heureusement, pendant que la bactérie virulente verse dans les tissus et dans le sang ces substances délétères dont la présence se traduit immédiatement par de graves perturbations, elle sécrète aussi une autre substance qui, pendant plusieurs jours, ne va se révéler par aucun phénomène appréciable, mais qui pénètre les cellules, change leur nutrition et les incite à élaborer la matière suivant un type nouveau: l'état bactéricide s'établit. A ce moment précis, la maladie a atteint son acmé, elle n'a plus qu'à décroître. Dans les humeurs modifiées la pullulation se ralentit, le microbe s'atténue. Les poisons vont être livrés au sang en quantité décroissante et les émonctoires vont suffire à leur élimination. Mais surtout le poison qui paralyse le centre vaso-dilatateur arrive aussi en moindre quantité, la diapédèse, jusque-là entravée, se produit et le phagocytisme désormais possible s'accomplit sans obstacle sur des bactéries déjà atténuées et achève leur destruction commencée par l'état bactéricide.

Dans cette conception de la maladie infectieuse il y a une première période où les microbes en paralysant le centre vaso-dilatateur font que l'infection et l'intoxication sont graduellement croissantes. Pendant ce temps ils préparent la seconde période où l'état bactéricide atténue le microbe, diminue ses sécrétions toxiques et l'oblige enfin à laisser s'accomplir le phagocytisme qui termine le drame.

Dans la maladie infectieuse, les matières bactériennes nuisibles agissent d'emblée; les matières utiles agissent tardivement. Mais l'effet nuisible cesse rapidement, tandis que l'effet utile dure longtemps.

Théorie de la vaccination. — La guérison est la première manifestation de l'immunité. Les matières vaccinales ont rendu possible la guérison en produisant l'état bactéricide, l'effet utile qui dure longtemps. C'est en effet cet état bactéricide qui constitue la vaccination ou l'immunité acquise. Le microbe qui a produit la première maladie, s'il

est de nouveau introduit dans les tissus y trouvera un terrain singulièrement modifié, beaucoup plus défavorable. Son développement y sera beaucoup plus difficile et peut-être impossible. Mais tout ne se borne pas à cela. Inoculez le même virus fort à un animal sain et à un animal vacciné : il ne provoquera pas de diapédèse chez l'animal sain ; il en provoquera une abondante chez le vacciné. Charrin nous a donné l'explication de ce fait ; elle complète la théorie de la vaccination. La bactérie virulente se développe chez le vacciné ; elle se développe mal, donne une végétation grêle et ses sécrétions sont amoindries. Elle est capable de produire encore une irritation locale qui sollicite la diapédèse, elle ne secrète plus en quantité suffisante la matière qui s'oppose à la diapédèse. Le phagocytisme s'exécute donc en toute liberté.

Les choses se passent après l'inoculation chez le vacciné de la même manière que j'ai indiquée pour la fin de la maladie évoluant pour la première fois.

L'inoculation d'un virus fort chez un vacciné n'est autre chose que l'inoculation d'un virus atténué. Seulement l'atténuation, au lieu d'être faite au préalable dans le laboratoire, se fait dans les tissus du vacciné. Charrin et Gamaleïa nous ont montré que cette atténuation est complètement effectuée en quarante minutes.

Nous sommes loin des conceptions d'après lesquelles l'état du vacciné n'était que l'énergie acquise par les leucocytes pendant un premier combat ou que l'accoutumance aux poisons bactériens, une sorte de mithridatisation. Quand on vaccine avec les produits solubles et non avec les microbes, les leucocytes ne subissent et ne livrent aucun combat et cependant ils accomplissent désormais leur rôle de phagocytes. Quand on injecte à un animal sain et à un vacciné les produits solubles du microbe qui a vacciné l'un des deux, il faut exactement la même dose pour tuer les deux animaux. Ne parlons donc plus d'entraînement des leucocytes et d'accoutumance des cellules nerveuses aux poisons bactériens : c'est pure rhétorique.

Définition des virus et des vaccins. — Un virus est un microbe pour lequel les humeurs d'un animal, envisagées au point de vue de leur composition, sont un milieu habitable et qui de plus possède les moyens de lutter, souvent avec avantage, contre les procédés de destruction dont dispose l'organisme animal. Le plus puissant des moyens de dé-

fense de ce microbe, c'est la propriété qu'il possède de sécréter des matières qui s'opposent au phagocytisme.

Le vaccin est un virus qui a la propriété de sécréter des matières qui modifient lentement et d'une façon durable la nutrition au point de créer l'état bactéricide, et qu'on amène par des artifices d'éducation à perdre quelques-unes de ses sécrétions nuisibles, en particulier celle qui empêche la diapédèse, tout en gardant ses sécrétions vaccinales.

Conception de l'immunité naturelle. — La théorie de l'immunité acquise n'est pas applicable à l'immunité naturelle, car, par une circonstance paradoxale, l'état bactéricide manque souvent chez les espèces qui possèdent l'immunité, et d'autres qui ont la réceptivité ont des humeurs bactéricides.

Chez l'animal doué de l'immunité naturelle, le virus fort provoque, comme chez le vacciné, la diapédèse et le phagocytisme. Ce n'est pas parce que le virus s'atténue comme chez le vacciné ; c'est, je suppose, parce que le système nerveux de cet animal réfractaire est moins sensible au poison qui empêche la diapédèse, que le système nerveux des espèces qui ont la réceptivité. Mais cette différence n'est pas essentielle, elle n'est qu'affaire de degré et il suffit pour forcer l'immunité naturelle, pour produire l'infection générale et pour empêcher la diapédèse, d'augmenter, comme je l'ai fait, la dose des produits bactériens. Une expérience de Roger est instructive à ce point de vue. Chez un lapin, animal réfractaire, il inocule dans la chambre antérieure le bacille du charbon symptomatique. Dans ce milieu dépourvu de leucocytes, le végétal se développe, ce qui prouve que les humeurs n'étaient pas bactéricides. Ace moment Roger fait une seconde inoculation à la cuisse : la tumeur crépitante s'y développe et l'infection générale se produit. Dans cette expérience, la culture dans la chambre antérieure a jeté dans la circulation assez de matière pour empêcher la diapédèse, et l'infection s'est produite, comme quand on inocule chez cet animal le même microbe en l'accompagnant d'une grande quantité de ses produits. J'ai terminé. Le système que je soumets n'est sans doute pas exempt d'hypothèses, mais pour les points essentiels, il repose, je crois, sur des faits expérimentalement démontrés.

D^r Ch. Bouchard

Membre de l'Académie des Sciences.

GAY-LUSSAC ⁽¹⁾

Gay-Lussac est né à Saint-Léonard, près de Limoges, le 6 décembre 1778. Son père était magistrat; compromis pendant la Terreur, il se trouva fort dépourvu pendant les années suivantes et ne réussit qu'à grand'peine à envoyer son fils à Paris, pour le préparer à l'École polytechnique qui venait d'être fondée.

Des difficultés d'approvisionnement, dont nous n'avons plus heureusement que le souvenir, rendaient fort précaire la position des maîtres de pension. Menacés à chaque instant de ne plus pouvoir nourrir leurs élèves, ils fermaient leurs établissements les uns après les autres : Gay-Lussac changea plusieurs fois d'institution, mais il n'était pas homme à se laisser retarder par ces premiers obstacles qui n'arrêtaient que les irrésolus et les faibles. En 1798, il entra à l'École Polytechnique, s'y distinguant, fut classé dans les Ponts et Chaussées et était encore élève à l'École des Ingénieurs quand une circonstance heureuse décida de sa carrière. A son retour d'Égypte, Berthollet avait repris ses travaux : il réorganisa rapidement son laboratoire et demanda à l'École des Ponts et Chaussées des élèves pour l'aider dans ses recherches. Gay-Lussac fut désigné; dès son installation, Berthollet lui communique ses idées sur un sujet qui le préoccupait, lui indique les expériences à exécuter pour obtenir les résultats qu'il prévoit; l'élève se met à l'œuvre, se réjouissant sans doute de confirmer les vues du maître, mais... l'expérience est rebelle à son désir, elle se prononce contre l'hypothèse entrevue. Ce premier travail qui contredit le professeur va-t-il tourner contre l'élève? Il n'en est rien. Berthollet, frappé de la netteté des conclusions de son jeune collaborateur, de son respect de la vérité, lui écrit : « Jeune homme, votre destinée est de faire la science. »

La prévision ne tarda pas à se réaliser. Le 11 pluviôse an X, à vingt-quatre ans, Gay-Lussac, encore élève ingénieur à l'École des Ponts et Chaussées, lit devant la première classe de l'Institut son mémoire sur la dilatation des gaz et des vapeurs; il s'astreint à ne mesurer les changements de volume des gaz que lorsqu'ils sont dépouillés de vapeur d'eau, et éliminant les perturbations qui avaient obscurci les observations de ses prédécesseurs, il reconnaît que tous les gaz soumis à

la même élévation de température se dilatent de la même fraction de leur volume.

Du premier coup, Gay-Lussac découvre non un fait isolé, mais une loi générale que la postérité désigne sous le nom de loi de Gay-Lussac, comme elle avait donné le nom de Mariotte à l'énoncé des changements que subit le volume des gaz soumis à diverses pressions.

Personne ne s'y trompa, un maître s'était révélé : Berthollet, fier de son élève, l'introduit dans sa Société d'Arcueil. C'est là que Gay-Lussac rencontre Alexandre de Humboldt, qui, oubliant la verdeur avec laquelle le jeune savant avait critiqué quelques-unes de ses expériences, va vers lui et contracte bientôt, avec son adversaire d'un jour, une amitié qui ne devait s'éteindre qu'avec la vie. Une question importante préoccupait de Humboldt, le grand voyageur : L'air a-t-il, sur tous les points du globe, la même composition? Partout où il avait passé, de Humboldt avait recueilli des échantillons d'air, mais il hésitait sur les méthodes à employer pour les analyser; il consulte Gay-Lussac, s'associe à lui, et après discussion, on décide de faire usage de l'eudiomètre; son emploi exige des études préliminaires, il faut savoir exactement suivant quels volumes s'unissent l'oxygène et l'hydrogène, de façon à pouvoir déduire de la diminution de volume que détermine le passage de l'étincelle, dans l'air additionné d'hydrogène, la quantité d'oxygène qu'il renfermait.

Ce travail préliminaire est un chef-d'œuvre, on aperçoit ni les incertitudes ni les hésitations d'un débutant; la question est clairement posée, les expériences nettement décrites, les chiffres obtenus ne conduisent cependant à aucun résultat simple : comme Lavoisier, Gay-Lussac et Humboldt trouvent seulement d'abord que deux volumes d'hydrogène prennent pour former l'eau une quantité d'oxygène voisine d'un volume, mais Gay-Lussac est déjà pénétré, par son premier travail, de l'idée que les lois qui régissent les gaz ont une précision mathématique; les résultats sont discutés, les résidus analysés par une nouvelle méthode, on y reconnaît de petites quantités d'azote, et cette cause perturbatrice éliminée, le résultat apparaît dans sa majestueuse simplicité : deux volumes d'hydrogène prennent *exactement* un volume d'oxygène pour former deux volumes de vapeur d'eau. Auquel des deux collaborateurs appartient cette idée de la simplicité des rapports suivant lesquels les gaz entrent en combinaison, il serait cruel de l'ignorer : Humboldt n'hésite pas à le déclarer, l'idée appartient à Gay-Lussac, et il est

⁽¹⁾ La ville de Limoges vient d'élever une statue à Gay-Lussac. L'inauguration a eu lieu lundi dernier 11 août. L'Académie des Sciences avait délégué M. P. P. Dehérain pour la représenter à cette fête; ce savant y a prononcé un discours, d'où il a bien voulu extraire, pour nous en donner la primeur, la présente étude. (Note de la Rédaction.)

bien probable que dès cette époque, dès 1805, Gay-Lussac avait l'intuition que le fait trouvé pour l'oxygène et l'hydrogène n'était pas isolé, mais devait s'étendre à toutes les combinaisons gazeuses, ce ne fut cependant qu'en 1809 qu'il généralisa cette admirable observation.

Aussitôt qu'ils ont entre les mains une méthode exacte d'analyse, les deux amis examinent les échantillons d'air recueillis par de Humboldt, et trouvent que l'air a sensiblement sur tous les points du globe la même composition; en est-il de même de celui des hautes régions de l'atmosphère? Gay-Lussac n'hésite pas à tenter une ascension en ballon pour aller en recueillir. Il est poussé, en outre, à exécuter ce voyage aérien par le désir de vérifier des assertions singulières émises en Allemagne sur les changements que présenteraient les propriétés magnétiques quand on s'élève dans l'atmosphère; dans une première ascension, exécutée avec Biot, il atteint 4,000 mètres, dans une seconde, il monte seul jusqu'à 7,000 mètres : corrige l'erreur qu'avaient commise les physiciens allemands, recueille l'air des hautes régions, dès le lendemain le soumet à l'analyse et lui trouve une composition identique à celui de la surface.

La puissante impulsion que Lavoisier avait donnée à la chimie, un instant ralentie par sa mort tragique, s'était fait sentir de nouveau au commencement du siècle; les découvertes se succédaient rapidement; en 1807, à l'aide de la pile, H. Davy décompose la potasse et la soude, mais n'obtient par cette méthode que de petites quantités des métaux alcalins. Les chimistes cependant avaient grand intérêt à posséder ces agents énergiques et singuliers qui prennent feu au contact de l'eau. Gay-Lussac s'unit à Thenard, et bientôt les deux chimistes français réussissent à préparer des quantités notables de potassium et de sodium en chauffant à très haute température les alcalis en présence du fer, décomposition curieuse dont l'interprétation n'a pu être donnée par H. Sainte-Claire Deville, qu'après ses travaux sur les phénomènes de dissociation.

Entre des mains habiles, ces puissants agents ne restent pas inutiles, et la découverte du bore, séparé de l'acide borique par le potassium, montre combien des puissances les affinités des nouveaux métaux dont la science vient de s'enrichir.

La manipulation journalière d'un corps comme le potassium n'est pas sans danger : Gay-Lussac l'apprit à ses dépens, il fut cruellement atteint par une explosion; le visage en sang, aveuglé, on le reconduisit péniblement de l'École Polytechnique à sa maison de la rue des Poules; pendant un mois on crut qu'il avait perdu la vue; la leur

d'une petite veilleuse dont se servait Mme Gay-Lussac pour lui faire la lecture était la seule lumière que pouvaient supporter ses yeux malades.

La crainte de rester aveugle à trente ans, quand on se sent appelé à de hautes destinées, pourrait conduire au désespoir; d'autres se seraient abandonnés, mais Gay-Lussac était de taille à se mesurer avec l'adversité. Il supporta stoiquement sa souffrance; lentement il guérit, la faiblesse de sa vue lui rappela longtemps cependant le cruel accident auquel il avait failli succomber.

Parmi les travaux qui illustrèrent la collaboration de Gay-Lussac et de Thenard, il faut citer encore le mémoire sur l'acide muriatique oxygéné; on sait que Berthollet, le maître de Gay-Lussac, avait non seulement apporté d'importants perfectionnements à l'industrie du blanchiment en utilisant les propriétés décolorantes du chlore, mais qu'il avait, dès 1785, contribué à faire admettre que le gaz découvert par Scheele était une combinaison de l'acide muriatique avec l'oxygène.

Quelle est la matière unie à l'oxygène qui donne comme premier terme de la combinaison l'acide muriatique, comme second l'acide muriatique oxygéné? Telle est la question abordée par Gay-Lussac et Thenard; en voyant une dissolution de chlore dans l'eau dégager de l'oxygène aussitôt qu'elle est exposée au soleil, ils étaient en droit de supposer qu'en soumettant l'acide muriatique oxygéné à l'action du charbon rouge de feu, ils obtiendraient facilement de l'acide carbonique ou de l'oxyde de carbone et de l'acide muriatique ou peut-être même le radical encore inconnu qu'il renferme; or, l'acide muriatique oxygéné résiste à l'action du charbon porté au rouge : il traverse sans changements les tubes dans lesquels on l'expose à cette puissante action réductrice, on ne recueille aucun autre gaz. Ce résultat, si contraire aux prévisions, ouvre les yeux des deux chimistes, la lumière se fait dans leur esprit, ce prétendu corps est très mal nommé, ce n'est pas une matière oxygénée, c'est un corps simple; mais, comment soutenir cette opinion devant Berthollet, comment lui faire admettre qu'il s'est trompé, comment travaillant à Arcueil, chez lui, avec ses réactifs et ses instruments, se servir des uns et des autres pour détruire un des travaux sur lesquels s'est fondée sa réputation?

La condescendance que montrèrent à cette occasion Gay-Lussac et Thenard leur coûta cher; dans leur mémoire sur l'acide muriatique, ils écrivent : « Toutes les propriétés de l'acide muriatique oxygéné s'expliquent très bien en admettant que c'est un corps simple », mais, bien malgré eux sans doute, ils continuent par cette phrase malencon-

treuse : « Nous ne chercherons point cependant à défendre cette hypothèse, parce qu'il nous semble que ces propriétés s'expliquent encore mieux en regardant l'acide muriatique oxygéné comme un corps composé. »

Malgré la forme dubitative sous laquelle ils l'avaient émise, l'hypothèse de Gay-Lussac et Thenard fit son chemin, un chimiste industriel resté obscur, dont le nom est loin d'avoir l'éclat qu'il mérite, Curaudau, montre très bien ¹ qu'on ne peut tirer d'oxygène du prétendu acide muriatique oxygéné qu'en présence de l'eau, que l'oxygène qu'il dégage souvent provient de l'eau décomposée, dont l'hydrogène s'unit au radical pour former l'acide muriatique.

Sir H. Davy apporta enfin, à l'appui de la manière de voir de Gay-Lussac et Thenard, des arguments décisifs ² ; aucun lien d'amitié ne l'attache à Berthollet ; sans ménagement, il déclare que son acide muriatique oxygéné est un corps simple ; il lui donne le nom de chlore, qui est resté, et partage ainsi avec Gay-Lussac et Thenard une gloire qui aurait dû leur rester tout entière.

Ce fut seulement, au reste, quelques années plus tard et à la suite d'une nouvelle découverte de Gay-Lussac que la simplicité du chlore fut complètement admise. Un salpêtrier nommé Courtois découvre dans les eaux mères des soutes extraites des varechs une matière nouvelle ; le temps lui manque pour se livrer à une étude approfondie ; il reconnaît cependant que cette matière forme avec l'ammoniaque une poudre très explosive ; puis, désespérant de pouvoir continuer ses recherches, remet la matière nouvelle à Clément, celui-ci la garde pendant deux ans sans en rien faire et très légèrement la donne à H. Davy, de passage à Paris ; aussitôt que Gay-Lussac apprend cette imprudence, il comprend que peut-être une découverte importante va échapper à notre pays ; il court chez Clément, chez Courtois, réunit le peu de substance qu'ils ont conservé et, en quelques semaines, improvise un magnifique mémoire dans lequel il démontre que la nouvelle substance est un corps simple voisin du chlore, qui sera désigné sous le nom d'iode, à cause de la belle couleur violette de sa vapeur.

Huit jours plus tard, H. Davy, publiait à son tour un travail remarquable et arrivait aux mêmes conclusions que Gay-Lussac, mais celui-ci ne s'était pas laissé devancer par un émule redoutable, et la découverte était restée à la France ³.

Quelques années auparavant, Gay-Lussac avait complété la découverte ébauchée dans le mémoire

publié avec de Humboldt sur l'eudiométrie ; c'est en 1809 qu'il lut à la Société d'Arcueil son mémoire sur les combinaisons des gaz et montra qu'ils s'unissent toujours suivant des rapports simples en volumes, et que les produits formés, considérés à l'état de gaz, sont encore dans un rapport simple avec les volumes des constituants.

Ces lois, qui conservent le nom de Gay-Lussac, rapprochées de celle qu'il avait trouvée déjà sur la dilatation des gaz, de celle de Mariotte, de la loi des proportions multiples de Dalton, permirent à Avogadro et à Ampère d'introduire les fécondes hypothèses sur lesquelles se sont greffées toutes nos connaissances actuelles sur les gaz.

Ces lois occupent une place à part dans l'œuvre immortelle de Gay-Lussac et ne sauraient être mises en parallèle qu'avec son mémorable travail sur l'acide prussique, dans lequel il dévoile la constitution et les propriétés du cyanogène, de cet azoture de carbone qui, se comportant comme un corps simple, a donné le premier exemple de ces radicaux composés dont la chimie organique a fait un si fréquent usage pour représenter la constitution des matières complexes qu'elle étudie.

Les lois sur les combinaisons gazeuses, le cyanogène, fixeront à jamais dans la mémoire des hommes le nom de Gay-Lussac. La valeur d'une découverte se mesure à sa fécondité. Or, les lois sur l'union des gaz ont servi de base à la théorie atomique, à celle de l'atmicité des éléments ou des combinaisons, qui guident aujourd'hui les chimistes et leur permettent de faire sortir du laboratoire ces légions de corps nouveaux, qui justifient chaque jour davantage l'admirable expression de M. Berthelot : « la chimie crée l'objet de ses études » ; et, sans l'hypothèse des radicaux composés dont le premier exemple a été fourni par le cyanogène, la classification de ces combinaisons nouvelles deviendrait impossible, leur étude inextricable ; il faudrait renoncer à pénétrer dans cette forêt prodigieusement luxuriante que représente aujourd'hui la chimie organique ; l'œuvre de Gay-Lussac a non seulement puissamment contribué à sa croissance, elle a permis en outre d'y tracer les grandes voies qui facilitent son accès.

A ces travaux de chimie s'ajoutent des mémoires de physique du plus haut intérêt, notamment les études sur la force élastique du mélange des gaz et des vapeurs, puis des applications industrielles de premier ordre : il n'est pas de matière première plus importante que l'acide sulfurique ; le produire à très bas prix est une condition de prospérité pour nombre d'industries, les perfectionnements apportés par Gay-Lussac y ont contribué pour une large part.

De tous les services qu'il a rendus, l'un des plus

¹ Mémoire lu à l'Institut, le 5 mai 1810.

² Mémoire lu à la Société Royale, le 12 juillet 1810.

³ Le mémoire a été lu le 1^{er} août 1814.

marquants a été de substituer, dans nombre de cas, la mesure des volumes liquides aux pesées; dans la chlorométrie, dans les analyses alcalimétriques il a recommandé l'emploi des liqueurs titrées, mais c'est surtout dans l'analyse des alliages monétaires que ses méthodes aussi rapides qu'exactes se sont substituées complètement à celles qu'on employait jadis, il a régularisé l'emploi des alcoomètres pour mesurer la richesse en alcool des liquides, il a donné des instructions précises sur la graduation de ces instruments, il a fait exécuter le calcul des tables nécessaires pour corriger les lectures faites à des températures différentes de celles où avait eu lieu la graduation, il a mis ainsi entre les mains de tous les commerçants des instruments aussi fidèles que faciles à employer.

L'œuvre écrite de Gay-Lussac est donc considérable, son enseignement n'a pas été moins fécond; toute la première partie de sa carrière a été consacrée à l'École Polytechnique: c'est là qu'il a exécuté ses plus grands travaux, c'est là aussi qu'il a donné le modèle de ces leçons claires, précises, où il dédaigne les formes oratoires encore en usage à cette époque, ne cherchant que la vérité et s'élevant seulement par la grandeur des faits exposés. « Quelle réserve modeste dans son langage lorsqu'il exposait ses propres découvertes, quel entraînement lorsqu'il exposait celle des autres! » a dit de lui un de ses contemporains.

Gay-Lussac avait cette froide résolution qui fait braver les plus grands dangers, toutes les fois que l'exige un sérieux intérêt scientifique: ses travaux sur le potassium, sur l'acide cyanhydrique, le plus violent de tous les poisons, ses ascensions à une époque où l'emploi des aérostats était peu répandu, en font foi.

Il avait horreur de la lâcheté et de la perfidie et cet homme froid et réservé se jetait résolument en avant pour les combattre; en 1815, quelques jours après la seconde Restauration, dans un des conseils tenus à l'École Polytechnique, un royaliste fougueux demanda si un professeur bien connu pour ses opinions libérales avait signé l'Acte additionnel des Cent Jours; Gay-Lussac sent la perfidie

de cette question: « Je ne sais, dit-il, si M. Arago a signé l'Acte additionnel, mais je déclare que moi je l'ai signé, estimant que, devant l'ennemi, tous les Français doivent être unis. » Le questionneur se tut; on vit, en haut lieu, que l'épuration irait trop loin et l'affaire fut abandonnée. De la Faculté des Sciences, où il avait été chargé d'organiser l'enseignement de la Physique, Gay-Lussac passa en 1832 au Museum d'Histoire naturelle: c'est là que se sont écoulées les dernières années de sa vie, il venait cependant chaque été se reposer de ses fatigues dans la propriété qu'il avait achetée aux environs de Limoges, car il avait toujours conservé la plus vive affection pour son pays natal. Ses compatriotes l'envoyèrent à la Chambre des Députés de 1831 à 1838; en 1839, il entra à la Chambre des Pairs, il y était attendu; Berthollet, sentant sa fin approcher, lui avait, quelques années auparavant, légué son épée de pair de France, pour le désigner comme son successeur.

A la fin de l'année 1849, la santé de Gay-Lussac commença à donner de vives inquiétudes à ses proches et à ses amis. Il était ici; on profita d'un mieux fugitif pour le ramener à Paris. L'amélioration ressentie pendant quelques jours disparut. Gay-Lussac était trop habitué à tirer les conséquences probables des faits pour ne pas prévoir l'issue prochaine de sa maladie; il ne voulut rien laisser d'incomplet et fit brûler un *Traité de philosophie chimique* qu'il n'avait pu terminer; peu à peu il déclina, et entouré de ses amis, soutenu par l'affection de sa femme et de ses enfants, il mourut le 9 mai 1850.

Quand une ville a vu naître un grand homme, dont le nom ne rappelle que des bienfaits, cette ville doit à ce grand homme un bronze dont la vue éveille les jeunes courages, élève les cœurs et les anime d'une noble ambition; il est bon que sur notre terre de France se dresse au-dessus de nous un peuple de statues; il est bon qu'aux jours où le poignant souvenir de la défaite nous courbe la tête, nous puissions, en levant les yeux, retrouver dans les gloires du passé l'espérance en l'avenir!

P. P. Dehéraïn

Membre de l'Académie des Sciences

SUR LES CYCLONES

A l'occasion d'une récente communication de M. Faye à l'Académie des Sciences de Paris, je désirerais présenter quelques remarques sur un point important de sa théorie des cyclones.

« De quelque manière qu'on s'y prenne pour faire

monter de l'air dans l'atmosphère, écrit l'éminent astronome (1), il faut de la chaleur ou de la force. Dans le premier cas, la chaleur doit être appliquée en bas, et c'est là l'origine de la théorie régnante en Météo-

(1) *Comptes rendus*, Académie des Sciences, 23 juin 1890, t. CX, p. 1298 et Note.

rologie. Dans le second cas, il faudrait placer en haut, dans les nues, un appareil d'aspiration actionné par une force motrice. Les girations à peu près horizontales qui naissent dans un courant supérieur aux dépens des inégalités de vitesse n'ont rien de commun avec un tel appareil. Nous voyons bien des girations produire, dans les cours d'eau, des tourbillons capables de transporter et de concentrer de la force dans leurs spires progressivement rétrécies, mais ces tourbillons sont invariablement descendants, ainsi que l'eau dont les spires sont formées.

« Disons aussi, incidemment, qu'il n'y a rien de cyclonique dans les maxima de pression auxquels on donne le nom d'anticyclones, pas plus que dans les minima statiques auxquels on donne abusivement le nom de cyclones, etc... »

Je commencerai par rappeler que, dans les rivières, les courants générateurs des tourbillons se trouvent en *bas*, tandis que, pour les tourbillons aériens ces courants sont en *haut*, de l'avis même de M. Faye pour ces derniers. Dans l'eau, les entonnoirs ne prennent naissance que lorsqu'il existe des courants *inférieurs plus rapides que ceux de la surface*, comme il arrive dans des réservoirs dont le fond est percé d'un trou, ou près des vannes entr'ouvertes d'où l'eau s'échappe par le *bas* alors que l'entonnoir se creuse en amont; ou bien encore, à la suite d'un coup d'aviron plongeant à une certaine profondeur; l'extrémité de l'aviron donne alors aux veines liquides situées à cette profondeur une vitesse plus grande qu'aux veines superficielles... etc.

Dans tous les cas l'entonnoir se creuse autour de l'axe et le mouvement est *descendant*. C'est toujours vers la région inférieure où l'eau est enlevée avec le plus de vitesse que tend l'entonnoir et qu'afflue le liquide venant du haut pour remplacer les veines enlevées au bas. Les courants *inférieurs* constituent dans l'eau l'appareil d'aspiration.

Dans l'atmosphère nous voyons au contraire que les courants générateurs des tourbillons sont en *haut*, dans les régions supérieures, comme le dit M. Faye; pourquoi refuse-t-il donc d'y placer également l'appareil d'aspiration en question? Il dit en effet :

« Les girations à peu près horizontales qui naissent dans un courant supérieur aux dépens des inégalités de vitesse n'ont rien de commun avec un tel appareil. »

Je ne veux retenir, pour l'instant, que ces mots : « les girations à peu près horizontales qui naissent dans un courant supérieur ».

Voici donc ces girations engendrées par tel mode que l'on voudra; du moment qu'elles existent, on m'accordera bien que, si elles ont pris naissance, ce ne peut être dans un plan horizontal théorique,

mais bien sur une certaine épaisseur, cette épaisseur ne fût-elle que de vingt mètres. Nous voyons donc quelque part, dans les régions supérieures, un certain volume d'air d'un diamètre quelconque, une espèce de tore ayant vingt mètres d'épaisseur, tourner en rond autour d'un axe plus ou moins vertical.

Du moment que cet air tourne autour d'un axe, M. Faye, comme tout le monde, devra convenir que les particules de cet air sont soumises à la force centrifuge et qu'il se produira par suite, sur l'axe, une raréfaction, c'est-à-dire une dépression qui sera maxima au centre et ira en diminuant à mesure qu'on s'éloigne de l'axe.

Voici donc une région centrale en dépression par rapport aux couches d'air situées au-dessus et au-dessous du tore tournant et, dès lors, il n'est pas difficile de voir qu'*au-dessus*, le courant avoisinant l'axe, est *descendant* et qu'*au-dessous* il est *ascendant*. Comme nous supposons que la cause quelconque qui produit le mouvement de giration continue son effet, cet air arrivant du haut et du bas est entraîné dans le tourbillonnement et augmente sans cesse le volume du tore en y pénétrant par les régions voisines de son plan équatorial.

Les girations supérieures, concédées par M. Faye, remplissent donc bien la condition d'un appareil d'aspiration placé *en haut* et cet appareil est tout à fait analogue à celui qui est placé *en bas* dans les cours d'eau. Si donc ce dernier appelle les couches d'eau supérieures vers le fond, le premier fera l'appel des couches d'air inférieures vers le haut.

Pour peu qu'on y réfléchisse un peu plus, on comprend facilement que, si la cause première continue son action, le tourbillon entier descendra jusqu'à la surface de la mer tout en conservant son mouvement ascensionnel intérieur; je l'ai démontré ailleurs depuis longtemps.

Prenons maintenant ce tourbillon lorsque sa base inférieure vient se fermer sur la mer et lécher sa surface : c'est toujours de l'air tournant autour d'un axe vertical et se déplaçant horizontalement, mais, du moment que cet air continue à tourner autour de l'axe, nous pouvons voir que ses particules sont retenues sur des spires et ballotées entre la force centrifuge qui tend à les rejeter en dehors, et la dépression axiale qui tend à les rappeler en dedans.

Les particules tout à fait inférieures, celles qui, en tournant, lèchent directement la surface de l'eau, éprouvent un frottement dont l'effet est de ralentir leur vitesse. Il en résulte pour elles une diminution correspondante de force centrifuge, en sorte qu'elles obéissent alors à l'action devenue prépondérante et provenant de la dépression intérieure; elles exécutent des spirales centripètes.

Théorie et expériences ne laissent aucun doute à ce sujet.

Il faut remarquer, cependant, que toutes les particules d'air léchant directement la surface de l'eau, ne gagnent pas toutes le centre même. En effet, si un nombre quelconque de ces particules peut tenir sur le contour extérieur du tourbillon, ce même nombre sera trop grand pour occuper les emplacements de plus en plus rétrécis vers l'intérieur. La plupart d'entre elles quittera donc la surface immédiate de l'eau et sera reprise aussitôt dans le mouvement tourbillonnaire général, en sorte que l'air formera un véritable tube laissant sur l'axe la dépression barométrique centrale constatée dans les cyclones ou dans les trombes.

L'air monte donc vers l'appareil d'aspiration su-

périeur, non pas sur l'axe même, comme on le dit souvent par erreur, mais bien sur une nappe conique dont le grand pavillon est en haut. Cet air redescend ensuite par l'extérieur ¹.

Disons enfin que, malgré le mouvement ascendant de la nappe intérieure d'un tourbillon, les cirrus ou vapeurs supérieures peuvent descendre dans cette nappe et en sens inverse de son mouvement ascendant. Ici encore la théorie de même que les expériences ne laissent place à aucun doute. C'est même là le phénomène qu'on aperçoit surtout dans une trombe marine proprement dite, lorsque le fuseau nuageux s'étire vers la mer, et, dans mes expériences, j'ai pu réaliser complètement cet effet qui paraît si paradoxal au premier abord.

Ch. Weyher.

LA FAUNE PÉLAGIQUE ¹

(Suite et Fin).

Voisins des Annélides sont les *Mollusques*. Leurs larves possèdent une forme typique à peu près semblable; mais s'en différencient bientôt par l'apparition du *pied*, organe tout à fait caractéristique, et qui, suivant que ses éléments médians ou ses parties latérales se développent plus ou moins, change absolument la physiologie de l'animal et ses conditions d'existence. C'est à la forme de ce pied qu'est entièrement empruntée la classification des mollusques dont nous avons à nous occuper ici : Gastéropodes, Pléropodes et Céphalopodes.

I

Les *Gastéropodes* proprement dits, ceux dont l'escargot vulgaire peut donner une idée, au moins pour la forme extérieure, sont évidemment mal faits pour une natation active. Une de leurs espèces peut cependant vivre en haute mer à l'aide d'un artifice singulier. Le pied sur lequel notre escargot ne peut que ramper, la Janthine ² s'en sert pour emprisonner dans le mucus qu'il secrète une série de bulles d'air, qui finissent par former un petit radeau, capable de supporter le poids de l'animal; poids fort léger du reste, la coquille s'étant réduite à une mince lame transparente teintée d'un beau bleu violet. La Janthine attache aussi ses œufs à la face inférieure de ce radeau, et passe sa vie à réparer les avaries incessantes de sa frêle construction. Les jeunes, à peine éclos, montent sur le radeau maternel; et

c'est là qu'ils commencent le leur, avant de pouvoir à leur tour mener une vie indépendante.

Chez les autres *Gastéropodes* vrais qui habitent la haute mer, la coquille a disparu. Le pied lui-même, déjà fort rétréci sur les *Aplysies* de nos côtes, devient linéaire chez les *Scyllées* qui rampent sur les Sargasses, mais doivent fréquemment nager; il n'est plus distinct sur les formes essentiellement pélagiques : *Glaucus* (fig. 1, I), *Acara*, *Phyllirhoe* (fig. 1, II).

Ce même pied s'est, dans le groupe des *Gastéropodes Hétéropodes*, entièrement réduit à ses éléments médians; le postérieur reste distinct; les deux antérieurs fusionnent, constituant à ces animaux une large nageoire membraneuse (fig. 1, III, IV), située dans le plan médian du corps, et dont les mouvements ondulatoires déterminent une lente progression. Rien n'est plus étrange que la natation de ces êtres bizarres qui, renversés sur le dos, agitent au-dessus d'eux cette sorte d'étendard vivant.

Seules les plus petites espèces du groupe, les *Atlantes* (fig. 1, IV), se rétractent entièrement dans

¹ A ce sujet, si certains météorologistes n'ont pas constaté le mouvement descendant extérieur à un tourbillon formant cyclone ou trombe, cela tient simplement à ce que la vitesse de retour peut être extrêmement lente par rapport à la vitesse d'ascension intérieure. En effet, si l'on considère un anneau d'air à la base intérieure et inférieure d'un tourbillon, et dans la partie ascendante, cet anneau sera relativement petit et d'un faible volume. Ce même volume, en montant sur la nappe conique intérieure, s'élargit de plus en plus et finit par atteindre les diamètres extérieurs du tourbillon; il devient alors insignifiant par rapport au volume total de telle sorte que la vitesse de redescense ne peut être saisie qu'en de rares occasions et lorsque les circonstances sont particulièrement favorables.

² Voyez la *Revue* du 30 juillet 1890, page 433.

¹ Voir la *Revue* du 30 juillet 1890, page 436 (fig. 2, IV).

une coquille enroulée en spirale aplatie. Dans la famille des Ptérotrachéides, où la taille devient assez considérable, la coquille n'est plus, chez les Carinaires, qu'un mince cornet abritant quelques organes, mais en dehors de laquelle le mollusque demeure presque tout entier; chez les Firoles (fig. 1, III), cette enveloppe protectrice a complètement disparu.

Les Hétéropodes, généralement doués d'une transparence remarquable, habitent tous la haute

raux du pied qui, plus ou moins complètement avortés chez les Gastéropodes, prennent ici un grand développement; tandis que la partie moyenne, qui constitue la nageoire de l'Hétéropode, demeure par contre à l'état rudimentaire. Ces petits êtres (fig. 1, V, VI), parfois nus, parfois logés dans des coquilles de formes très diverses, coques ventrues, arrondies ou pyramidales, cornets étroits et pointus comme des aiguilles, ou bien encore coquilles spiralées semblables à celles de l'Escargot, pré-




Fig. 1. — MOLLUSQUES PÉLAGIQUES.

I, II. Gastéropodes : I. *Glaucois atlanticus* (Forster) ; II. *Phyllirhoe bucephalus* (Lamarek). — III, IV. Hétéropodes : III. *Pterotrachea mutica* (Les) ; IV. *Atlanta turriculata* (d'Orb.). — V, VI. Pécropodes : V. *Spiralis rostralis* (Soul.) ; A, face ; B, côté ; VI. *Hyalea trispinosa* (Les). — VII. Céphalopode : *Enoploteuthis leptura* (d'Orb.).

mer. Quelques-unes de leurs formes sont au nombre des pélagiques les plus fréquents, et pullulent au point de former de véritables bancs. Aussi les coquilles des Atlantes prennent-elles parfois une part assez grande à la formation des dépôts que l'on désigne sous le nom de vases à Ptéropodes. Mais ces vases sont principalement constituées, comme ce nom l'indique, par les débris de petites coquilles provenant de mollusques fort différents.

Les Ptéropodes, tous également pélagiques, nagent à l'aide de deux lames membraneuses dont ils battent l'eau avec une grande énergie. Cet appareil natatoire, qui leur a valu d'être appelés les papillons de la mer, est formé par les éléments laté-

sentent aussi presque toujours une grande transparence; mais fréquemment quelques-uns de leurs organes sont colorés des nuances les plus délicates du rose, du violet ou du brun. Ils se rencontrent quelquefois en nombre si considérable que leurs coquilles peuvent, malgré leur petitesse et leur fragilité, former des couches puissantes au fond de certaines mers.

Si l'on en excepte le Nautilé, dont le genre de vie est fort contesté, tous les Céphalopodes actuels (fig. 1, VII), se partagent en deux groupes : les Octopodes qui n'ont que huit bras comme le Poulpe; et les Décapodes, comme la Seiche, qui possèdent en outre deux bras fort différents. Le premier est

principalement représenté en haute mer par les *Tremoctopus* et les *Argonautes*; le second par les diverses espèces des Oigopsides, et peut-être les Spirules. Une coquille externe fort mince existe chez la femelle des *Argonautes*, autrefois si célèbre. Ailleurs le corps est nu; mais il peut exister une mince lame cornée, logée dans un repli du manteau. Ces animaux, parfois les *Argonautes*, mais surtout les Calmars, peuvent aussi former des bancs immenses; comme cela a été observé pour

ont valu leur nom, et qui semblent formés par des prolongements latéraux de la partie moyenne du pied.

II

Un petit sac allongé, ouvert à l'un de ses bouts, et formé seulement de deux couches de cellules, séparées par une mince membrane; voilà la forme la plus simple sous laquelle on puisse concevoir le *Cœlentéré*. Mais cette forme ne semble permanente que chez un seul type, la *Protohydra* (fig. 2, I). Or-




Fig. 2. — Cœlentérés.

I. — *Protohydra Leuckarti* (Greeff). — II. Colonie de polypes hydriques : *Podocoryne carnea* (Sars); A, polypes; D, polype sans bouche ni tentacles (Dactylozoïde); E, Dactylozoïdes transformés en épinés; M, bourgeons médusoïdes en voie de développement. — III. Méduse libre de la même espèce. — IV. *Aurelia aurita* (L.), méduse acalèphe. — V. Jeune scyphistome, avec deux stolons. — VI. Scyphistome se divisant (strobile).

Ommastrephes sagittatus dans les parages de Terre-Neuve, et pour l'*O. giganteus* sur les côtes du Chili. Aussi jouent-ils un rôle des plus importants dans la nourriture des grands animaux. En ouvrant les Cétacés ou les grands poissons de haute mer, on trouve presque constamment leurs débris; on a pu s'assurer ainsi que plusieurs de leurs espèces nous demeurent encore inconnues. Quelques-uns, les Calmars surtout, peuvent atteindre une taille considérable; beaucoup d'entre eux présentent une transparence absolue. Tous ces animaux se déplacent surtout au moyen du mouvement de recul que leur imprime la réaction de l'eau quand ils se contractent brusquement; mais ils peuvent aussi nager à l'aide des bras céphaliques qui leur

dinairement, il ne tarde pas à se montrer, sur la paroi extérieure du sac, des bras flexibles qui souvent se disposent en un cercle; et parfois (*Tubularia*) en deux cercles concentriques, au centre desquels se trouve la bouche. C'est la forme commune des Polypes hydriques (fig. 2, II). Ces polypes peuvent en bourgeonner d'autres, qui se séparent bientôt du parent chez les hydres d'eau douce, mais le plus souvent demeurent en relation intime avec lui par des stolons semblables aux tiges rampantes d'un grand nombre de végétaux. Les êtres ainsi produits présentent assez souvent un polymorphisme remarquable, suivant qu'ils sont plus spécialement adaptés à telle ou telle fonction. L'ensemble arrive généralement à former des colonies

ramifiées plus au moins touffues, et qui couvrent d'un velours vivant les algues, les coquilles ou la surface des rochers. Ce n'est point du reste par ce seul procédé que les Hydraïres se multiplient. A certaines époques, des éléments sexuels apparaissent sur quelques uns des membres de la colonie; et les jeunes larves ciliées qu'ils produisent vont se fixer aux corps voisins, pour se transformer en polypes qui seront les fondateurs de colonies nouvelles. Mais, souvent, ce ne sont point les larves qui sont mises en liberté tout d'abord; les conceptacles où se sont développés, ou même où doivent se développer plus tard les éléments sexuels, quittent la colonie sous la forme d'une petite cloche contractile, munie d'un battant (*manubrium*) à l'extrémité duquel se trouve la bouche, et que l'on nomme une *Méduse*. Cette individualité nouvelle (fig. 2, III), est regardée par certains auteurs comme l'équivalent d'un seul polype (à forme de *Tubularia*); tandis que d'autres, et cette hypothèse explique beaucoup mieux ce que nous verrons chez les Siphonophores, la croient produite par la réunion d'un verticille de polypes autour d'un polype central.

Les Méduses nées de polypes hydraïres, et dont les produits devront à leur tour passer par la même forme, ne dépassent généralement guère quelques millimètres; mais d'autres, qui leur ressemblent beaucoup, donnent naissance à des larves pouvant se transformer directement en méduses, et qui, dès lors affranchies de toute fixation, sont devenues des êtres entièrement pélagiques. Toutes les Trachyméduses sont dans ce cas.

Quant aux *Acalèphes*, ou grosses Méduses (fig. 2, IV), qui peuvent atteindre jusqu'à un pied et plus de diamètre, elles naissent en général de polypes fort différents (fig. 2, V), et qui, sans demeurer toujours solitaires, ne forment jamais des colonies semblables à celles des Hydroides. Ces polypes, dits Scyphistomes, à certaines époques s'allongent considérablement, puis se divisent en une série de segments, superposés comme une pile d'assiettes (fig. 2, VI). Chacun de ces segments, mis en liberté, grandit et se transforme en une Méduse, qui produira des larves devant passer à leur tour par la forme de Scyphistome. Le groupe des Acalèphes renferme du reste, comme celui des Hydroides, des êtres où la forme polype produit directement les larves; où par conséquent la phase Méduse n'existe pas: ce sont les Lucernaires, qui sont ainsi forcément exclues de la faune pélagique. Il en comprend aussi quelques autres où les larves nées de Méduses peuvent se transformer directement en Méduses sans passer par la forme de polype, comme on le voit par exemple chez les Pélagies. Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, celles-ci sont franchement pélagiques; tandis que les deux tiers au

moins des Discophores ne méritent guère ce nom, et fréquentent surtout la proximité des rivages. C'est là qu'elles peuvent former, à certaines époques, des troupes si nombreuses que les navires à vapeur mettent des heures à les traverser, si compactes que les canots à rames ont peine à s'y frayer une route. Il semble aussi que quelques espèces effectuent de véritables migrations; mais cela est dû sans doute, comme pour bien d'autres pélagiques, aux courants marins qui entraînent la masse des animaux produits dans une même région. Représentées dans toutes les mers, les Méduses forment un des groupes les plus abondants de la faune de surface; et, bien que quelques-unes de leurs espèces s'avancent fort loin dans le Nord, elles se rencontrent surtout dans les régions tropicales, qui renferment au moins 80 pour 100 des espèces connues de Coelentérés.

Les Coralliaires, presque tous, produisent un squelette calcaire; ils ont cependant un de leurs groupes qui n'en sécrète jamais. Les Actinies qui, sans se fixer d'une manière définitive, rampent dans la vase ou sur les rochers, out ainsi pu donner à la faune pélagique quelques espèces vivant en parasites sur des Méduses (*Philomedusa*), et d'autres où le disque pédieux, pouvant comme le pied de la Janthine enfermer de l'air dans le mucus qu'il sécrète, s'est transformé en appareil flotteur (fig. 2, I).

Les Acalèphes et les Coralliaires qui, dans deux directions différentes, semblent le terme actuel de toute une longue série de transformations, paraissent avoir perdu la plasticité que conservent les Hydroides. C'est encore de ces derniers que dérivent, sans nul doute, les formes si étonnamment variées des *Siphonophores*.

Le Siphonophore est, somme toute, une individualité de même ordre que la colonie d'hydraïres. Mais comme il s'agit ici d'êtres toujours libres et flottants, le fondateur de la colonie ne saurait être un polype: c'est en effet une méduse. Déjà certaines Méduses hydroides montrent une grande tendance à bourgeonner, soit par la sous-ombrelle (*Syncoryne*), soit par le *manubrium* qui cependant ne s'allonge pas (*Lizzia*) ou bien au contraire présente une elongation remarquable (*Sarsia*). Les êtres ainsi produits sont, il est vrai, dans ces cas, également des méduses. Mais si l'on admet que la forme Méduse est une individualité de second ordre, formée par la réunion autour d'un polype central (*manubrium*) d'un verticille de polypes qui se sont soudés les uns aux autres comme les segments primitifs du périanthe d'une fleur gamopétale, on peut aisément concevoir que tantôt l'un, tantôt l'autre des individus primaires constituant cette individualité complexe, se développe indépendamment. Nous pourrions avoir ainsi, outre des

Méduses complètes, des Méduses dépourvues de *manubrium* (cloches natatoires); d'autres où, non seulement le manubrium, mais une partie de la cloche fait défaut (bractées, boucliers); et d'autres enfin où le manubrium, ou polype central, s'est développé seul, et constitue le polype astome ou muni d'une bouche (siphon) qui a valu leur nom aux Siphonophores.

Ces êtres bizarres se répartissent en deux groupes bien distincts. Dans l'un (Discoïdes) le manubrium de la Méduse primitive reste toujours court; et l'on voit se développer au sommet de la cloche un appareil flotteur, composé dans le cas le plus simple (*Discalia*) d'une chambre centrale, et de huit autres disposées en cercle autour d'elle et correspondant aux huit segments de la Méduse. Chez les autres discoïdes (Porpites et Véléelles) ce flotteur se complique par l'adjonction d'autres chambres, disposées concentriquement, et qui donnent à l'ensemble l'aspect que l'on voit sur la figure 2, III¹. A ce grand développement du flotteur

correspond une absence complète de tout organe de locomotion active; mais dans une des familles (Véléllides) le transport passif est facilité par une crête membraneuse, sur laquelle peuvent agir les vents lorsque la colonie se tient à la surface des eaux.

Le deuxième groupe, qui embrasse tout le reste des Siphonophores, paraît, suivant Hæckel, dériver d'autres méduses, présentant une symétrie bilatérale au lieu de la symétrie radiaire, et chez lesquelles le manubrium peut subir une grande élongation. Il devient alors la tige creuse par laquelle demeurent en relation tous les êtres qu'il a bourgeonnés, et qui présentent toutes les variétés de formes dont nous parlions tout à l'heure. Ici, d'après les observations du savant d'Iéna, l'involution des légumes qui aboutit à la formation du flotteur ne se produit pas au sommet de la cloche de la

Méduse primitive, mais au contraire latéralement. Jamais ce flotteur n'atteint le degré de complication que nous avons vu chez les Discoïdes; mais cependant il peut suffire au transport, soit qu'il garde un faible volume (Rhizophyses), soit qu'il subisse au contraire un développement considérable (Physalies)¹. Dans ce cas, les cloches natatoires font également défaut; mais il peut se développer aussi une crête membraneuse (Physalies) qui joue le même rôle que chez les Véléelles. Ordinairement le *pneumatophore* est insuffisant à faire flotter la colonie. Il ne sert qu'à maintenir la tige dans la

position la plus favorable au jeu des cloches natatoires qui se développent au-dessous de lui en séries longitudinales ou en verticilles plus ou moins nombreux (voy. fig. 3, II). On conçoit aisément que le nombre de ces organes locomoteurs soit en raison inverse de leur puissance; et que, lorsque leur efficacité est suffisante, le pneumatophore ne se développe plus. Le nombre des cloches varie en effet de plus de 600

(*Forskalia tholoides*) à 2 (*Dicymba diphyopsis*) chez les espèces qui gardent un pneumatophore. Dans celles où il avorte, les cloches sont toujours puissantes; aussi n'en voit-on jamais plus d'une dizaine (*Polyphe*), ordinairement deux, et parfois même une seule (voy. fig. 3, I). Signalons encore, avant de quitter ce groupe, la disposition curieuse qui n'a encore été vue que chez le *Lychnagalma vesicularia*, où l'on trouve des flotteurs accessoires alignés en série sur les filaments pêcheurs, qu'ils soutiennent exactement comme les flotteurs du *Macrocystis* supportent la longue tige de cette algue.

Quelles que soient les variétés de formes qu'ils présentent, tous les Cœlentérés dont nous venons de parler ont un organe natatoire absolument identique: une cloche contractile que la réaction de l'eau repousse dans la direction de son extrémité




Fig. 3. — SIPHONOPHORES.

I. *Monophyes princeps* (Hæckel). — II. *Nectalia loligo* (Hck.); pn, pneumatophore; cl, cloches natatoires; b, boucliers; p, polypes; f, filament pêcheur. — III. Pneumatophore d'*Epibolia Ritteriana* (Hck.); c, cavité aérienne; gl, glande. — IV. — Pneumatophore de *Rhotalia miranda* (Hck.); m, méduse transformée en pompe (Aurophore).

¹ Voir la *Revue* du 30 juillet 1890, page 436.

¹ Voir la *Revue* du 30 juillet 1890, page 436 (fig. 2, II).

close. Deux types de ce groupe font seuls exception à la règle générale : un petit être fort curieux, le Tétraptère (fig. 4, I), dont j'ai contribué à faire connaître l'organisation, et qui nage à l'aide de quatre ailes membraneuses; et les Ctenophores.

C'est sans doute aussi de Méduses hydroïdes à symétrie bilatérale, qu'ont dérivé ces derniers. Mais bien qu'une méduse cladonémide, la *Ctenaria ctenophora*, présente toute une réunion de caractères fort intéressants à cet égard, on n'est point encore

sont les *Rhizopodes* dont nous parlerons tout à l'heure, des *Infusoires ciliés* appartenant surtout à la famille des Tintinnides (fig. 3, I); et, parmi les formes indécises entre le végétal et l'animal, les *Péridiniens*, (fig. 3, II), auxquels se rattache le groupe des *Cystoflagellés*. Celui-ci ne comprend jusqu'ici que deux types bien distincts; car les *Pyrocystis* recueillis par le *Challenger* ne sont à peu près sûrement que des formes enkystées. Le *Leptodiscus*, observé par Hertwig à Messine, et que je




Fig. 4. — Cœlentérés pélagiques.

I. Tétraptère *Tetraptalia rotians* (Busch.), avec ses ailes déployées. — II, III, IV. Ctenophores : II. *Ocyrops maculata* (Rang.); III. *Cestum Veneris* (Lcs). L'animal a été injecté en noir, mais il est en réalité d'une transparence absolue; IV. *Cydippe pileus* (Esch.). Un des tentacules a été coupé; A, dessin schématique montrant la disposition des palettes vibratiles.

parvenu à expliquer d'une manière satisfaisante comment, abandonnant le mode ordinaire de locomotion, ils ont acquis leur appareil natatoire si particulier. Tous ces animaux, exclusivement pélagiques et de formes très variées (voy. fig. 4), arrondis en manchons ou même en boule, aplatis en rubans ou découpés en lobes, peuvent nager fort rapidement à l'aide de huit rangées de palettes vibratiles, que l'on doit considérer comme des groupes de cils vibratiles soudés ensemble. La lumière, en se décomposant sur ces minces rames de cristal, produit d'admirables colorations, qui ont valu à l'un de ces êtres gracieux le nom de Ceste ou Ceinture de Vénus.

III

Les *Protozoaires* les plus importants à signaler

n'ai vu que deux fois à Alger, semble fort rare; ce qui n'est peut-être dû qu'à son extrême fragilité. Quant aux Noctiluques, on les rencontre dans toutes les mers; et, après en avoir fait diverses espèces, on tend aujourd'hui à les regarder toutes comme appartenant à une seule, la *N. miliaris* (fig. 3, III). De même que chez certaines espèces de Péridiniens proprement dits, leurs petites sphères transparentes, à peine d'un millimètre de diamètre, et d'une coloration absolument insensible quand on observe des animaux isolés, peuvent cependant, par leur énorme accumulation, teindre la mer en rouge brique sur des lieues entières d'étendue.

Ces amas prodigieux qui exhalent une forte odeur tout à fait spéciale, et qui sont encore regardés par la plupart des gens de mer de nos

côtes comme du frai de poisson, et surtout de sardine, sont une des principales causes du phénomène magnifique de la phosphorescence des mers.

Un très grand nombre d'autres pélagiques peuvent aussi contribuer à la produire, soit qu'ils émettent une lumière qui leur est propre, soit qu'ils brillent de lueurs empruntées. Mais je ne veux point m'attarder sur un sujet qui mérite d'être exposé en détail aux lecteurs de la *Revue*; car la luminosité des êtres marins est toujours à l'étude, et

cages de verre, ils viennent meurtrir leurs corps délicats en essayant de franchir ces murailles invincibles; et ne tardent pas à retomber sur le fond décoloré et flétris. Complètement adaptés à la vie en mer libre, le moindre choc leur est fatal. Aussi n'est-ce guère que par un temps calme, quand la mer se montre unie comme un miroir, ou que les grandes vagues paisibles ne se frangent pas d'écume blanche, qu'on les voit apparaître en grand nombre à la surface des eaux.




Fig. 5. — PROTOZOAIRES PÉLAGIQUES.

I. Infusoire cilié : *Tintinnopsis beroidea* (Stein). — II. Péridinien : *Ceratiurn tripos* (Ehrbg.). — III. *Noctiluca miliaris* (Sur); A, individu complet; B, zoospore; C, état de régénération. — IV. Radiolaire : *Spongurus cylindricus* (Hck) vivant, avec les pseudopodes étalés. — V, VI. Foraminifères : V. *Globigerina* (*Hastigerina*), *Murrayi* (W. Thoms), vivant, avec les pseudopodes étalés; VI. *Globigerina bulloides* (d'Orb). La coquille seule, vue par la base, et ne montrant que les quatre chambres les plus jeunes.

peut encore faire l'objet d'intéressantes recherches

Du reste si, grâce aux ressources de la technique moderne, on connaît assez bien l'organisation des Invertébrés dont nous avons fait une énumération aussi incomplète que rapide, il n'en est pas de même de leur histoire. Celle d'un grand nombre réserve sans doute encore des surprises au naturaliste favorisé par le sort. Ce n'est en effet que par une série d'heureux hasards, servis par une patience souvent admirable, que l'on est arrivé à connaître le développement complet de quelques-uns d'entre eux. Les observations sont impossibles à prolonger dans le milieu naturel où vivent ces animaux; et ceux que l'on essaie de tenir en captivité ne tardent généralement pas à mourir. C'est qu'il leur manque, presque toujours, leur nourriture ordinaire : c'est qu'il leur manque, plus encore, l'espace et la liberté. Prisonniers dans nos étroites

Leur vrai milieu, c'est la mer tranquille : beaucoup en ont la transparence et l'azur; de même que les animaux des rivages revêtent souvent la livrée des rochers ou des herbes marines au milieu desquelles ils passent leur existence, de même les habitants des prairies flottantes prennent fréquemment la couleur vert jaunâtre des Sargasses, et jusqu'aux taches blanches que forment sur elles les colonies des Membranipores.

Les courants de la mer font voyager sans cesse ces légions errantes, et presque absolument cosmopolites; la différence de climat est la seule barrière qui les arrête. Mais lorsque le vent commence à fouetter la crête des flots, la plupart des pélagiques ne tardent pas à disparaître. Il en est qui, surpris par les tempêtes, sont roulés de vague en vague, et finissent même par venir échouer sur les côtes; mais la plupart s'enfoncent et vont

gagner des couches d'eau plus paisibles. Ils agissent de même lorsqu'une pluie abondante vient modifier d'une façon passagère la salure de la surface, et par suite la densité de l'eau. Les Cœlentérés surtout, ou du moins la plupart d'entre eux, sont tellement sensibles à l'action de l'eau douce, qu'elle détermine la macération presque immédiate de leurs épithéliums, ou même les tue instantanément. Aussi la mer la plus peuplée de pélagiques paraît-elle bientôt déserte lorsque de fortes averses viennent à tomber. J'ai vérifié bien souvent cette remarque d'Agassiz.

Mais ce ne sont pas seulement ces causes, pour ainsi dire accidentelles, qui déterminent la descente des animaux pélagiques. S'il est un certain nombre d'entre eux qui semblent demeurer constamment à la surface, la plupart ne montent que pendant la nuit, et redescendent au lever du jour. La marche des saisons n'est pas non plus sans influence sur leurs mouvements; et la faune de surface se montre ordinairement, dans nos climats, plus pauvre en été qu'en hiver. Des observations recueillies par divers savants, et surtout par le professeur Chun, ont prouvé que beaucoup d'animaux qui se rencontrent à la surface lorsque les journées sont courtes, ne se retrouvent plus qu'à une certaine profondeur lorsque le soleil demeure longtemps au-dessus de l'horizon. Ces pêches ont aussi fait constater l'existence d'une faune pélagique profonde, paraissant très riche, et comprenant, outre des espèces qui semblent ne s'élever jamais au-dessus d'un certain niveau, la plupart des animaux qui se montrent à la surface, soit accidentellement, soit à des époques régulières. Quelles sont donc les causes déterminantes de ces changements de niveau, de ces véritables migrations en profondeur? Pour Chun, elles ne seraient autres que les variations de la température; l'ascension ou la descente seraient même directement déterminées par les changements de densité qu'elles produisent. Mais un travail tout récemment publié par Groom et Loeb semble démontrer, comme l'avait déjà supposé Fuchs pour la répartition bathymétrique des animaux marins, que l'on doit accorder à la lumière une influence prépondérante. D'après les expériences qu'ils ont faites à la station zoologique de Naples, sur les *nauplius*, c'est-à-dire les larves, du *Balanus perforatus*, et qui du reste confirment ce qui avait été déjà observé pour des spores d'algues (Strasburger), ces larves montreraient un véritable héliotropisme, positif lorsqu'elles ont séjourné dans l'obscurité, négatif après un certain temps d'éclairage; et qui les ferait, en définitive, se diriger vers une faible lumière, et fuir au contraire une lumière trop intense. Comme, en mer libre, l'obscurité ne se trouve qu'en gagnant la

profondeur, ces êtres, accordés en quelque sorte pour une intensité lumineuse déterminée, et assez faible, devraient s'enfoncer de plus en plus à mesure que la lumière devient plus vive à la surface, et remonter au contraire vers le déclin du jour. Si l'on admet que la montée et la descente s'exécutent avec la même vitesse, nous aurions aussi l'explication des migrations saisonnières; car il est évident que, si les jours deviennent plus longs que les nuits, les nauplius en question, et tous les animaux qui réagissent de même, s'enfonceront de plus en plus, les périodes de descente étant plus longues que celles de montée. Quand, au contraire, ce sont les nuits qui deviennent plus longues, ils n'ont plus le temps de gagner les profondeurs, et doivent se retrouver régulièrement à la surface de la mer. Cela expliquerait aussi la richesse plus constante des régions tropicales, où la longueur relative des jours et des nuits ne varie pas autant que dans nos climats ¹.

Les flotteurs ne sont point, du reste, un obstacle au plongement; tout au moins chez les Siphonophores, où le pneumatophore demeure presque toujours bien ouvert. Alors même qu'il serait clos, la résorption des gaz pourrait sans doute s'effectuer, comme on le voit chez les Poissons à vessie natale close. Pour remonter à la surface, il doit falloir que les glandes qui garnissent le pneumatophore (fig. 3, V), isolent une nouvelle bulle de gaz, exactement comme les corps rouges de la vessie des Poissons; mais ce n'est que dans un groupe singulier (Auronectides) qui paraît habiter les profondeurs, que l'on trouve une des cloches transformée en véritable pompe (*aurophore* d'Hæckel) (fig. 3, IV), refoulant dans le gros pneumatophore les gaz qu'elle produit, et pouvant sans doute les y puiser pour les rejeter au dehors. Peut-être le disque pédieux des Actinies pélagiques est-il aussi capable d'isoler des gaz; mais les observations manquent à cet égard. En tous cas, il semble bien, d'après ce que nous disions plus haut, que la Janthine soit incapable de plonger autrement que par un accident survenu à son flotteur; si elle quitte la surface, on ne conçoit guère comment elle y pourrait revenir.

¹ La répartition bathymétrique des animaux flottants, et l'amplitude de leurs excursions verticales sont des questions encore à l'étude, et même en quelque sorte à l'ordre du jour. On ne pense plus guère, avec Agassiz, qu'entre la faune pélagique et la faune des abîmes s'étende une masse d'eaux à peu près inhabitées; mais, pour élucider tous les points douteux, il faudrait faire usage de filets à fermeture hermétique, ne s'ouvrant qu'à une profondeur déterminée et se refermant avant d'avoir quitté ce niveau. Aucun des instruments employés jusqu'ici ne me paraît répondre complètement à cette double nécessité; je me permettrai de renvoyer le lecteur à l'article que j'ai publié sur ce sujet dans la *Nature* du 21 juin, en donnant la description du nouvel appareil que je propose.

Quant aux Noctiluques, leur descente est facile à constater, beaucoup moins à expliquer. On ne saurait évidemment l'attribuer à une natation active; et je ne vois guère à invoquer qu'une différence de densité. Je doute fort, il est vrai, qu'elle puisse être produite par une variation de température; et serais plutôt porté à admettre qu'en se contractant les Noctiluques expulsent, par leur bouche, une partie du cytoplasme le plus clair, dont la densité serait inférieure à celle de l'eau de mer. Accroissant ainsi leur poids spécifique, elles descendraient; et ne pourraient remonter ensuite qu'en reprenant une eau suffisamment débarrassée de ses sels pour ramener la densité de l'ensemble au-dessous de celle de l'eau de mer.

Après leur mort, la descente de la plupart des invertébrés pélagiques s'effectue, malgré la faible densité de leur corps, beaucoup plus rapidement qu'on ne serait tenté de le croire. Moseley a calculé qu'une Salpe ne devait mettre que quatre jours pour atteindre un fonds de 2000 brasses (3.250 mètres); et qu'elle pouvait y arriver ainsi bien avant que la putréfaction, retardée du reste par la salure de l'eau, s'oppose à ce qu'elle serve de nourriture à des animaux du fond. Des expériences analogues, portant sur de grosses Équorées et sur des Béroés, m'ont donné le chiffre peu différent de quatre jours et demie pour 3.000 mètres. Si l'on se rappelle que, pour un grand nombre, le point de départ n'est pas la surface, mais comme nous le disions tout à l'heure, une profondeur parfois considérable, on voit qu'au début de ce travail je n'exagérerais point l'importance de la faune pélagique au point de vue de l'alimentation des habitants des abîmes. Mais les myriades sans nombre des êtres flottants qui sécrètent un squelette ou calcaire ou siliceux sont encore bien plus importantes par le rôle qu'elles jouent dans la formation du sol sous-marin.

Nous avons déjà parlé des dépôts que peuvent former les enveloppes siliceuses des Diatomées, ou les coquilles calcaires des Ptéropodes. Les squelettes des Rhizopodes sont en masses encore plus considérables. Radiolaires et Foraminifères ne sont, presque tous les uns et les autres, que de microscopiques grumeaux de protoplasme, dont la surface s'étire en minces filaments. Chez les Radiolaires (fig. 5, IV), le corps protoplasmique sécrète un squelette treillisé de silice pure. C'est au contraire du carbonaté de chaux que prennent à l'eau de l'océan les Foraminifères, qui s'en font une mince coque percée, pour le passage des pseudopodes, des innombrables trous auxquels est dû leur nom. Les espèces de ces animaux se comptent par milliers. La petitesse de leurs coquilles, des Globigérines

par exemple (fig. 5, V), est parfois si grande que, dans un gramme de sable, d'Orbigny en a compté près de 8000; mais leur pullulation est telle, qu'ils sont au premier rang des bâtisseurs de mondes. Il est vrai que, d'après des observations faites à bord du *Challenger*, lorsque les animaux pélagiques meurent à la surface d'une mer trop profonde, le temps que leurs dépouilles mettent à gagner le fond suffit pour que les minces coques calcaires se redissolvent. Les coquilles des Ptéropodes ne se trouveraient pas au delà de 1.500 brasses, la vase à Globigérines au delà de 2.500. Mais, dans des eaux moins profondes, les vases à Ptéropodes, et surtout les boues à Globigérines, elles peuvent arriver à former de puissantes assises; et sur les bancs que les dépouilles de ces animalcules exhausent à un niveau suffisant, viennent parfois, comme dans les parages de la Floride, se fixer des larves de madrépores, qui hâteront le travail de reconstruction des terres.

On a pu dire que toutes les roches calcaires, quelle que soit la puissance de leurs strates, n'ont pas une de leurs molécules qui n'ait passé par un organisme vivant. Cela paraît surtout vrai pour les énormes assises des terrains Crétacés, presque exclusivement formées de microscopiques dépouilles de Foraminifères. Quant aux Diatomées et aux Radiolaires, qui sans doute ne faisaient point défaut dans les mers de cette époque, leurs squelettes ne se retrouvent plus; mais l'on voit, entre les assises calcaires, des masses ou rognons de silice, dont on attribue l'origine à de l'eau qui s'en était surchargée en dissolvant les carapaces de ces petits êtres, et sans doute aussi les spicules des éponges siliceuses.

Ces silex de la craie eurent une importance capitale dans l'histoire de l'humanité. C'est d'eux surtout qu'à l'aurore de son évolution intellectuelle, l'homme s'est fait ses premières armes pour se défendre contre les animaux féroces. C'est d'eux encore qu'il tira les premiers outils, informes et rudes, qui lui permirent de s'en procurer de plus parfaits, et, dans la lente course des siècles, d'arriver à la puissance mécanique grandiose qu'il sait mettre en œuvre aujourd'hui. En songeant au rôle qu'ils ont joué dans la vie de nos ancêtres, on peut se demander ce que serait à l'heure présente la civilisation de l'Europe, si, dans les mers d'autrefois, n'avaient vécu des myriades d'êtres infimes, semblables à ceux qui flottent encore dans l'écume des vagues, et dont les dépouilles prennent part à la formation des continents futurs.

Camille Viguier

Directeur de la Station Zoologique à Alger.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Villié (E.), ancien Ingénieur des Mines, Docteur ès Sciences, *Doyen de la Faculté libre des Sciences de Lille. — Compositions d'Analyse, Mécanique et Astronomie données depuis 1885 à la Sorbonne pour la Licence ès sciences mathématiques, suivies d'exercices sur les variables imaginaires. Énoncés et solutions, seconde partie, 1 vol., in-8° Gauthier-Villiers et fils, Paris, 1890.*

En 1885, M. Villié a publié un volume dans lequel étaient énoncées et résolues toutes les questions d'Analyse et de Mécanique données en composition à la Sorbonne, depuis 1869, pour les examens de la licence ès sciences mathématiques ; le succès de cet ouvrage a été tel que l'auteur s'est décidé à faire paraître un second volume contenant la solution de tous les problèmes posés à la Faculté des Sciences de Paris depuis 1885.

Il a développé spécialement, en Analyse, les chapitres relatifs aux variables imaginaires ; en Mécanique, ceux qui traitent de la cinématique et de la dynamique des systèmes. L'ouvrage se termine par l'examen de divers exercices d'Astronomie.

Le nouveau livre de M. Villié présente les qualités de clarté et d'élégance qui ont été unanimement appréciées dans ses publications précédentes.

L. O.

Dwelschauvers-Dery (V.), professeur à l'Université de Liège. — *Sur le frottement dans les machines à vapeur. Revue universelle des mines et de la métallurgie, des travaux publics, des sciences et des arts, appliqués à l'industrie, 33^e année, t. VIII, deuxième numéro, novembre 1889, paru en janvier 1890, Noblet, éditeur à Liège.*

La question du frottement dans les machines est l'une des plus importantes de la mécanique pratique ; par son étude on peut, dans une certaine mesure, améliorer le rendement des moteurs ; aussi le professeur Thurston, dans son magnifique laboratoire de l'Université Cornell à Ithaca (New-York), s'est-il proposé de reconnaître, par de nombreuses expériences, faites sur diverses machines, comment le frottement variait avec la charge et comment il était réparti entre les différentes pièces frottantes.

Ces belles expériences, ingénieusement combinées et longuement poursuivies, sont insérées dans tous leurs détails aux *Transactions de la Société des Ingénieurs Mécaniciens d'Amérique* (tome VIII et suivants) ; les résultats obtenus sont assez considérables pour que M. Dwelschauvers-Dery ait jugé utile de les faire connaître en les résumant.

Il signale que le frottement de la machine est constant et indépendant de la charge, qu'il représente une fraction du travail total développé en pleine charge, fraction qui varie d'une machine à l'autre ; il montre que cette fraction égale à 0,12 pour une machine Straight-Line à tiroir non équilibré, tombe à 0,09 avec le tiroir équilibré et est comprise entre 0,135 et 0,175 pour les Compound ; il en conclut que le coefficient de frottement des surfaces en contact décroît lorsque la charge de la machine et la pression des pièces frottantes deviennent plus fortes.

Il examine ensuite la grandeur relative de chaque frottement ; celui des tourillons de l'arbre principal est de beaucoup le plus considérable, il atteint quelquefois la moitié du frottement total. Le frottement du tiroir vient après, lorsque ce tiroir n'est pas équilibré, puis le frottement du piston et de sa tige, puis enfin les autres frottements qui sont de beaucoup moindre

importance. La conclusion pratique de ces recherches c'est qu'il est possible, en prenant certaines précautions, de récupérer sur les frottements 5 % au moins du travail développé sur le piston.

Enfin M. Thurston a fait toute une série d'expériences pour déterminer l'influence du degré d'admission, de la pression et de la vitesse ; il a reconnu que le frottement augmente lentement avec le degré d'admission ; qu'il croît avec la pression quand elle est basse, mais en devient indépendant si elle s'approche de la valeur normale ; qu'il varie proportionnellement à la vitesse dans les machines à vide ; qu'il est un peu plus grand en charge qu'à vide ; que jusqu'à 500 tours il augmente assez lentement avec la vitesse pour les machines en charge et enfin, qu'à partir de là jusqu'à 625 tours, limite des expériences, il croît plus rapidement et d'une façon sensiblement proportionnelle à la vitesse.

Ces expériences de M. Thurston que seul, peut-être, en raison de l'installation dont il dispose, il était capable de mener à bonne fin, présentent un haut intérêt pratique et M. Dwelschauvers a rendu un véritable service à la mécanique en contribuant à faire connaître leurs résultats. Nous croyons toutefois devoir faire observer que certains de ces résultats sont bien inattendus, que l'étude du frottement dans les machines est hérissée de difficultés, que les différences d'interprétation peuvent se produire aisément sur un tel sujet et nous demandons, malgré l'autorité considérable de M. Thurston, à faire de prudentes réserves avant d'accepter définitivement ses conclusions.

H. LÉAUTÉ,
de l'Académie des Sciences.

2^{es} Sciences physiques.

Couette (Maurice). — *Etude sur le frottement des liquides. — Thèse de doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris 1890.*

Le mémoire de M. Couette renferme la description détaillée et la discussion complète de ses très intéressantes expériences sur la viscosité des liquides dont nous avons déjà entretenu les lecteurs de la *Revue* (1).

L'auteur traite d'abord complètement le problème de la rotation d'un liquide visqueux entre deux cylindres concentriques supposés indéfinis, l'un étant immobile, l'autre animé d'une vitesse constante ; pour déduire de l'expérience le coefficient de frottement, il faut mesurer le moment du frottement par rapport à l'axe de rotation. M. Couette prend comme paroi fixe un cylindre auquel il laisse une certaine mobilité autour de l'axe et qu'il maintient en repos en équilibrant le frottement du liquide par la torsion d'un fil ou par des poids attachés à un système de poulies ; afin de pouvoir considérer la surface comme découpée dans un cylindre indéfini, on la prolonge par des cylindres de garde et l'on donne au cylindre tournant une hauteur supérieure à la hauteur totale des cylindres fixes. Grâce à de nombreuses précautions, cet appareil conduit à d'excellents résultats, pourvu toutefois qu'on détermine sa constante par une expérience sur un fluide dont le coefficient soit connu ; les difficultés de centrage rendent difficiles les mesures absolues. L'auteur démontre cependant que le frottement est minimum quand le centrage est parfait : cette remarque permettrait d'obtenir des valeurs absolues correctes.

La méthode de Poiseuille est la plus simple de toutes ;

(1) V. N° 3, p. 79 ; nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter à cet article pour l'explication de la théorie.

M. Couette démontre qu'elle peut devenir la plus exacte; il faut avoir grand soin de tenir compte de l'influence des extrémités du tube d'écoulement; l'analyse rend compte de cette influence; pour l'éliminer, on peut employer des procédés différents qui sont indiqués dans le mémoire. L'un, en particulier, qui s'explique dans tous les cas, rappelle l'artifice imaginé par Wertheim dans ses recherches classiques sur les tuyaux sonores; on produit un écoulement simultané et dominant le même débit dans deux tubes de même rayon, embouchés de la même manière et de longueurs différentes.

Les deux méthodes ont conduit l'auteur à des résultats identiques; elles lui ont permis de confirmer un fait signalé déjà par Darcy: le mouvement des liquides présente deux régimes différents; le premier, conforme aux intégrales les plus simples des équations de Navier, se produit seul pour les vitesses les plus faibles; le second, non conforme à ces intégrales, se produit également seul, mais pour les vitesses les plus grandes; tandis que pour les vitesses intermédiaires les deux régimes se présentent alternativement. Il résulte des expériences que la vitesse critique varie avec la nature du liquide et est sensiblement en raison inverse des diamètres des tubes.

Quelle que soit la nature du tube par lequel se fait l'écoulement, toutes choses restant égales d'ailleurs, on trouve que le temps d'écoulement est le même; on doit conclure de là une conséquence très importante: les liquides, même ceux qui ne mouillent pas, adhèrent sans glissement à la surface des solides; mais on doit observer que dans le second régime la vitesse varie très rapidement au voisinage de la paroi.

En terminant son remarquable mémoire, M. Couette discute la méthode de Coulomb; il établit qu'elle est mauvaise pour les liquides de faible viscosité, et que, dans les cas où l'on peut s'en servir, il convient d'employer, pour éliminer l'influence perturbatrice des parties accessoires de l'appareil, une méthode particulière de calcul.

LUCIEN POINCARÉ.

Renard (A.), *Docteur ès Sciences, Professeur de Chimie appliquée à l'Ecole supérieure des Sciences de Rouen. — Traité de chimie appliquée à l'industrie. Un vol. grand in-8° avec 225 figures dans le texte, 816 pages. Baudry et Cie, éditeurs, Paris, 1890.*

Les traités de chimie industrielle ne manquent pas, et chacune des grandes questions de technologie chimique possède sa monographie complète dans laquelle les spécialistes puisent selon leurs besoins.

Les traités de chimie élémentaire dans lesquels les questions industrielles se trouvent à peine effleurées sont plus nombreux encore et nous ne voyons que trop souvent se perpétuer à travers les volumes ces figures d'un autre âge représentant des appareils depuis longtemps abandonnés, complétant la description de procédés également hors d'usage.

M. A. Renard a très judicieusement pensé qu'entre les premiers, qui ne sont utiles qu'au petit nombre et les seconds, auxquels se trouvent réduits la plupart des lecteurs, il y avait place pour un livre intermédiaire procédant des uns pour la quantité et des autres pour la qualité et il présente aujourd'hui aux chimistes et aux élèves des écoles industrielles et de l'enseignement spécial un ouvrage qui sera très certainement apprécié.

Après une courte introduction dans laquelle sont résumées très brièvement les premières définitions et les lois qui régissent les combinaisons chimiques, ainsi que les notions indispensables sur la notation et la nomenclature, l'auteur aborde l'étude des métalloïdes et leurs composés classés par ordre d'atomicité. Laisant de côté les questions d'histoire, les faits relatifs aux points d'ordre purement scientifique tels que l'établissement des formules et les propriétés

utiles pour la classification, mais n'ayant pas encore reçues d'application, il insiste surtout sur les modes de préparation qui permettent d'obtenir ces corps facilement et en grande quantité.

Les métaux et leurs dérivés sont traités d'une manière analogue avec des données métallurgiques concises, mais suffisantes. Signalons, en passant, la fabrication des sels de soude, de l'aluminium, les derniers perfectionnements apportés à la fabrication du chlore où, sans entrer dans les détails, l'auteur a su donner une idée juste des procédés les plus récents appliqués dans l'industrie. Ces développements comprennent 400 pages environ.

La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à la chimie organique. La partie théorique prend nécessairement ici une importance plus grande que dans les précédents chapitres; l'auteur a su condenser très clairement en une cinquantaine de pages les définitions relatives aux fonctions chimiques. On y trouve des exemples suffisamment nombreux et bien choisis des principaux modes de formation de ces fonctions ainsi que leurs plus importantes propriétés et il devient facile, en parcourant cette portion du livre, de conserver toujours présentes à l'esprit ces définitions des principaux groupes qui sont véritablement les clefs de la chimie organique moderne.

Les chapitres les plus intéressants de cette seconde partie sont ceux relatifs aux carbures saturés, aux pétroles et à leur industrie, aux alcools, aux sucres, corps gras et savons.

L'ouvrage se termine par l'étude de la série aromatique dans laquelle il est donné surtout des notions importantes sur les matières colorantes qui se rattachent à cette immense série, devenue aujourd'hui une chimie dans la chimie.

Après cela, il est resté à l'auteur une trentaine de pages pour résumer les séries du furfuran, du thiophène, du pyrrol, la série pyridique, les alcaloïdes et les matières albuminoïdes.

Les figures tout à fait schématiques et très claires sont de véritables figures de démonstration dessinées le plus souvent en coupe. Elles sont pour la plupart nouvelles et cadrent bien avec le texte.

Nous croyons que ce livre convient non seulement aux élèves de l'Enseignement spécial et des Ecoles industrielles, mais encore aux industriels qui désirent se tenir au courant des questions modernes et avoir d'une manière claire et précise un bon résumé de l'état actuel de la chimie appliquée; il vient honorablement se placer à côté du *Traité des matières colorantes* et du livre *Sur les corps gras* qu'on doit au même auteur.

A. VERNEUIL.

3° Sciences naturelles.

Welsch (Jules). — *Les terrains secondaires des environs de Tiaret et de Frenda (Département d'Oran, Algérie.) Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris, 1890.*

La thèse que M. Jules Welsch vient de présenter à la Faculté des Sciences de Paris, a pour sujet l'étude géologique d'une région de l'Algérie fort peu connue et sur laquelle nous ne possédions jusqu'ici que des renseignements vagues ou même erronés en partie. C'est une région qui s'étend sur la limite du Tell et des hauts plateaux de la province d'Oran, au voisinage immédiat de celle d'Alger.

Les formations qui en composent le sol appartiennent à la période secondaire. Les terrains tertiaires n'y occupent qu'une surface très restreinte et le terrain quaternaire ne s'y montre que dans le fond des vallées et à la surface de quelques plateaux.

Parmi les terrains secondaires, ce sont le Jurassique supérieur et la Crétacé moyen et supérieur qui sont surtout développés.

En outre de quelques masses rocheuses, encore mal déterminées, qui semblent représenter l'étage bathonien, le terrain jurassique comprend deux séries d'assises très distinctes: 1^{re} A la base, des marnes verdâtres, remplacées, sur quelques points, par des calcaires rouges ammonitiformes. Ces assises appartiennent à l'étage oxfordien; M. Welsch y a reconnu l'équivalent des zones à *Ammonites transversarius*, à *A. bimammatus* et à *A. tenuilobatus* d'Europe; 2^o au-dessus des assises précédentes, une masse puissante de bancs dolomitiques qui renferment une partie de la faune de l'Astartien de La Rochelle.

Parmi ces horizons, quelques-uns avaient déjà été reconnus en Algérie, notamment par nous-même dans le Djebel-Ben-Ammad à l'est de Tiaret et par MM. Brossard et Le Mesle dans le Djebel Bou-Thaleb; mais les faunes des zones à *Ammonites bimammatus* et *A. tenuilobatus*, n'avaient pas encore été signalées dans le Nord de l'Afrique.

Les terrains crétacés de Tiaret constituent, comme ceux de l'époque jurassique, deux séries distinctes qui, même, sont entre elles en discordance marquée.

La première comprend une succession de couches gréseuses, calcaires et marneuses, dans lesquelles l'auteur retrouve les étages albiens et cénomanien constitués tels que nous les avons observés en Algérie, dans les environs de Bou-Saada, et tels que M. Choffat les a observés en Portugal.

La deuxième série, transgressive à la première, est composée des épaisses assises calcaréo-marneuses de la craie supérieure et plus particulièrement de celles qui constituent le Sénonien inférieur, ou étage Santonien de notre nomenclature algérienne.

C'est la première fois que les étages albiens et sénoniens sont signalés dans les Hauts-Plateaux oranais; l'étage cénomanien seul y avait été indiqué par M. Pomel près de Tiaret.

Un autre fait intéressant signalé par M. Welsch, c'est la transgression générale des terrains crétacés sur les couches plus anciennes, en allant de l'Est à l'Ouest.

De nombreuses coupes, relevées avec soin, montrent la succession des faunes et la disposition des strates sur les points les plus intéressants de la région. Les relations entre la nature géologique et lithologique de la contrée et sa structure orographique sont clairement établies ainsi que les conséquences des divers accidents géologiques, plissements, failles, dénudations, etc., que l'auteur a observés. Enfin une carte géologique, embrassant tous les environs de Tiaret et de Frenda, complète heureusement le travail de M. Welsch, en montrant l'extension et la répartition géographique de chacune des formations.

En résumé, le mémoire que nous analysons a fait faire un notable progrès à nos connaissances géologiques sur notre colonie algérienne. Les faits énoncés y sont clairement démontrés, soit par la disposition stratigraphique des assises, soit avec l'aide de la paléontologie. Tous ces faits concordent bien d'ailleurs avec ceux déjà observés sur d'autres points de cette vaste région des Hauts-Plateaux. Il n'y a guère qu'en ce qui concerne la constitution de l'étage turonien, que nous sommes obligé d'apporter quelques réserves aux conclusions de M. Welsch. Cette division nous semble avoir été un peu trop amplifiée par le bas, aux dépens du Cénomanien et par le haut aux dépens du Santonien.

A. PERON.

Gaudry (Albert), de l'Institut. — **Darbois**, de l'Institut, doyen de la Faculté des Sciences de Paris. — **Tannery**, Sous-Directeur de l'Ecole normale supérieure. — **Bertrand** (Marcel), Président de la Société géologique de France. — **Bergeron**, Docteur ès sciences. — *Discours prononcés aux funérailles* de M. **Edmond Hébert**, Membre de l'Institut, doyen de la Faculté des sciences de Paris, commandeur de la Légion d'honneur, le 8 avril 1890, au cimetière Montparnasse.

Fouqué de l'Institut. — **Munier-Chalmas**, Sous-Directeur du Laboratoire de recherches à l'Ecole pratique des Hautes études. — **Vélaïn** (Ch.), maître de Conférences de Géologie à la Sorbonne, chargé de Cours de Géographie physique. — *Discours prononcés à l'inauguration du Médaillon déposé sur la tombe* de M. **Edmond Hébert**, membre de l'Institut, doyen honoraire de la Faculté des sciences de Paris, commandeur de la Légion d'honneur, le 4 juin 1890. — Imprimerie Delalain. Paris, 1890.

Richet (Ch.), Professeur à la Faculté de Médecine. — *De l'influence du chloral sur les combustions respiratoires chez le chien. Archiv. de physiologie, avril 1890.*

Ce mémoire fait suite aux recherches, déjà publiées, de l'auteur sur la fonction respiratoire. Dans un précédent travail, M. Richet s'était attaché à démontrer l'influence prépondérante qu'exerce la surface tégumentaire sur les échanges respiratoires; il revient sur ce sujet si important en physiologie, mais pour montrer cette fois qu'il s'agit là d'un phénomène de régulation, placé sous la dépendance des centres bulbo-encéphaliques.

Chez les chiens profondément chloralisés, chez lesquels par conséquent les centres supérieurs ont perdu leur activité, ce rapport entre la surface et l'intensité des combustions respiratoires est supprimé; la lutte contre le refroidissement a cessé et l'animal ne respire plus que pour fournir à ses tissus la quantité d'oxygène minima qui leur est nécessaire; dans ces conditions le poids seul de l'animal doit intervenir dans le chiffre des combustions; c'est en effet ce que montrent les chiffres obtenus. Tandis que sur des chiens normaux l'écart dans les combustions d'acide carbonique par kilogramme et par heure varie, pour des animaux de 25 kilogrammes et ceux de 4 kilogrammes, de 0 gr. 925 à 1 gr. 750, chez les mêmes chiens chloralisés les chiffres extrêmes sont respectivement 0,550 et 0,609.

L'étude de la fonction respiratoire, envisagée sous ces divers points de vue, comme le fait M. Richet dans ses mémoires successifs, devient de plus en plus intéressante en permettant de dissocier, pour ainsi dire, les facteurs si divers qui influent sur les variations des fonctions organiques en général.

L. O.

4^e Sciences médicales.

Cabadé (Dr). — *Leçons sur les maladies microbiennes, professées à l'Ecole de médecine de Toulouse, in-8^e de 642 p, Paris, G. Masson, 1890*

M. Cabadé a réuni en trente leçons les notions fondamentales que l'on possède actuellement sur la morphologie et la biologie générale des microbes pathogènes ainsi que sur leur rôle dans les maladies infectieuses. Après avoir résumé en quelques leçons les propriétés physico-chimiques et vitales des microorganismes, ainsi que l'action qu'exercent sur eux les différents milieux, l'auteur consacre un intéressant chapitre à la théorie des vaccinations, de l'immunité et de l'hérédité. Puis il passe en revue les principales maladies microbiennes de l'homme. Cette étude comprend non seulement les affections qui relèvent de microbes bien définis et connus, mais aussi celles dont la nature bactérienne n'est pas encore démontrée expérimentalement comme la syphilis, les fièvres éruptives, la coqueluche, etc... Le livre de M. Cabadé expose, dans un style élégant et plein de clarté, l'état actuel de nos connaissances en bactériologie et contribuera avec succès à vulgariser ces notions qui ont pris une importance si grande dans la médecine moderne.

Dr R. WERTZ.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

La Société française de Physique, la Société chimique de Paris, la Société royale de Londres, les Sociétés de Physique et de Chimie de Londres, la Société de Physique de Berlin, l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, l'Académie royale des Lincei sont en vacances.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 21 juillet 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Boussinesq fait hommage à l'Académie du tome second et dernier de son Cours d'Analyse infinitésimale. — M. R. Lipschitz : Sur la combinaison des observations. — M. Kozloff décrit un *diagrammètre* ; auxiliaire mécanique pour les études des courbes. — M. Coggia a découvert une comète à l'observatoire de Marseille. — M. Ch. V. Zenger, en faisant éclater des charges électriques sur des plaques de verre ou des sphères métalliques recouvertes de noir de fumée, a obtenu des figures semblables à celles qu'on observe à la surface du soleil.

2^e SCIENCES PHYSIQUES. — M. Van der Mensbrugghe, avait antérieurement donné la formule de la tension superficielle de la couche de contact entre deux liquides non miscibles ; de cette formule on peut déduire que si l'affinité réciproque des deux liquides est nulle ou faible, cette force tendra à diminuer la surface de contact ; si l'affinité est assez forte, l'effet sera inverse et tendra à augmenter la courbure du ménisque. L'auteur rapporte quelques expériences pour démontrer ce dernier fait. — M. Bernard Brunhes indique le dispositif qu'il a employé pour étudier la réflexion cristalline interne et l'influence du milieu contre lequel se fait cette réflexion. — M. F. Beaulard a étudié la double réfraction elliptique du quartz, suivant l'axe optique, lorsqu'on associe au pouvoir rotatoire naturel la double réfraction que produit une compression exercée normalement à l'axe optique, les résultats expérimentaux, comparés à ceux que donne la théorie de M. Gouy, ont vérifié cette théorie. — M. Th. Moureaux signale une anomalie magnétique, qui affecte tous les éléments magnétiques dans le nord de la France et à Paris même ; les choses se passent comme si le pôle nord de l'aiguille était attiré de part et d'autre vers une ligne presque droite dirigée de Fécamp à Châteauneuf-sur-Loire. — M. Berthelot a étudié la chaleur de formation de divers sels d'aniline, les uns stables, tels que le sulfate, l'azotate, et le chlorure ; les autres instables, tels que l'acétate et le benzoate. La comparaison des quantités de chaleur dégagées par ces combinaisons, entre elles et avec les sels de soude et d'ammoniaque contenant les mêmes acides, confirme la proposition de l'auteur, à savoir que l'inégalité entre les chaleurs de formation des sels d'une base forte et d'une base faible s'exagère quand on passe des sels à acide fort aux sels à acide faible. C'est dans ces faits qu'il faut chercher l'explication de la stabilité relative des sels. — MM. Berthelot et Fogh ont constaté que la formation des anilides dégage plus de chaleur que celle des amides correspondants. — M. L. Ouvrard : Recherches sur les phosphates doubles de titane, d'étain et de cuivre. — MM. Ph. Barbier et L. Roux ont continué leurs recherches sur la dispersion dans les composés organiques, par les éthers-oxydes. Conformément à l'équation qui représente la formation d'un éther-oxyde, son pouvoir dispersif spécifique moléculaire s'obtient en retranchant le pouvoir dispersif de l'eau de la somme des pouvoirs dispersifs des deux alcools générateurs. — M. Villard a obtenu cristallisés, par le froid sous pression, les hydrates des

fluorures d'éthyle et de méthyle, du chlorure d'éthyle et de l'iodure de méthyle. — M. L. Boutroux en oxydant du glucose ou de l'acide gluconique au moyen d'une bactérie, a obtenu un acide réducteur, l'acide *oxygluconique*, qui ressemble à l'acide donné par M. Fischer comme l'acide glucronique. — M. Ed. Mohler a étudié la valeur pratique des divers réactifs pour déceler les impuretés de l'alcool. — M. E. Boyer indique que l'acide benzoïque, ajouté aux sucres, facilite l'incinération de ceux-ci en vue de la détermination des matières minérales qu'ils renferment. — M. Ad. Carnot donne la composition des eaux des sources minérales de Cransac (Aveyron). — M. J.-J. Landerer a étudié l'angle de polarisation de diverses roches ignées, considérées dans leur complexité ; il compte appliquer les données ainsi obtenues à l'étude de la surface de la Lune.

SCIENCES NATURELLES. — M. Chr. Bohr signale plusieurs combinaisons dissociables de l'oxygène avec l'hémoglobine, distinctes de l'oxyhémoglobine classique. — M. A. Chauveau avait indiqué que la loi des dégagements de chaleur du muscle qui travaille est la même à l'état statique et à l'état dynamique ; en réalité, il y a un léger excès pour ce dernier état, et cet excès s'accroît avec la fréquence des contractions ; l'auteur rapporte cet excès au travail des plaques motrices. — MM. P. Fischer et E. L. Bouvier ont étudié le mécanisme de la respiration chez les *Ampullarides*, gastéropodes munis à la fois d'un poumon et d'une branchie. — M. Moynier de Villepoix a analysé la façon dont le test de l'Andonote se reconstitue, lorsqu'il a subi des pertes de substances. — M. R. Dubois a constaté plusieurs analogies entre la façon dont se coagule la substance séricigène du *Bombyx Mori* et la coagulation du sang. — M. A. Laboulbène indique que l'on peut faire réapparaître les Cysticercus affaiblis dans une viande desséchée, en arrosant celle-ci d'eau acidulée. — M. G. Ville insiste sur la sensibilité avec laquelle les plantes apprécient et traduisent par l'état de leur végétation les plus minimes différences de composition chimique de leur milieu. La levure de bière est particulièrement remarquable à ce point de vue. — MM. Prillieux et G. Delacroix décrivent sous le nom de gangrène de la tige de la Pomme de terre, une maladie qui frappe aussi le *Pélargonium*, et qui est produite par un bacille, le *B. caulivorus*. — M. R. Botey, possibilité des injections trachéales chez l'homme, comme voie d'introduction des médicaments. M. Guéniot : réclamation de priorité au sujet de la craniectomie.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 29 juillet 1890.

M. Vaslin (de Nantes) : Sur l'application de la trépanation dans les accidents éloignés consécutifs aux lésions traumatiques du crâne. — M. Semmola (de Naples) : Contribution expérimentale à la pathogénie de l'albuminurie et de la néphrite brightiques. — M. Hayem, à propos de la communication précédente, fait des réserves sur l'ensemble des faits énoncés et particulièrement sur les altérations de l'albumine du sang. — M. G. Sée continue l'exposition d'un impor-

tant mémoire sur les usages du *Cannabis indica* dans le traitement des névroses et des dyspepsies gastriques. — **M. Dujardin-Beaumetz** s'associe aux conclusions de M. G. Sée et fait des réserves pour ce qui a trait à la pathogénie des dyspepsies. — **M. Hayem** a analysé le suc gastrique de 160 dyspeptiques et il résulte de ces observations que la dyspepsie nerveuse sans trouble concomitant dans le chimisme stomacal n'existe pas.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 26 juillet 1890.

M. Moscher, dans un cas de maladie de Friedreich bien caractérisé, a trouvé une altération des nerfs périphériques sensitifs, consistant dans l'absence de la myéline; ce fait confirme l'hypothèse que cette maladie est un arrêt de développement du système nerveux. — **M. Féré** a constaté que l'attention modifie la courbe de la contraction musculaire volontaire; elle rend l'ascension plus brusque. — **M. Netter** présente une statistique des diverses manifestations morbides provoquées par le pneumocoque. — **M. Guignard** a recherché de quelle façon se répartissent, dans les tissus des Crucifères, la myrosine et le myronate de potasse, dont la réaction réciproque donne naissance au sulfo-cyanure d'allyle; la myrosine occupe quelques cellules différenciées; le myronate est diffus dans le parenchyme. — **MM. Pouchet et Chave** signalent un *Ténia* parasite du Cachalot, caractérisé par la présence des lignes rouges sur ses anneaux médians. — **M. Boucheron** décrit plusieurs nerfs nouveaux de l'œil. — **M. Chabry** propose une expression mathématique nouvelle, du travail du cœur. — **M. Charrin** signale cinq cas de maladie pyocyanique chez l'enfant, observés par **MM. Ehlers et Neumann**. — **M. Brissaud** a observé sur les nerfs périphériques de plusieurs sujets, les altérations décrites généralement comme une dégénérescence; aucun trouble de la sensibilité n'avait révélé ces lésions pendant la vie. **M. Brissaud** conteste toute signification physiologique à ces prétendues névrites.

L. LAPICQUE.


ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 17 juillet 1890.


1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. L. Gegenbauer** : Quelques propositions sur les déterminants d'un ordre élevé.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — **M. J. Unterweger** : Sur les taches solaires de courte période et leur relation avec quelques phénomènes périodiques terrestres. L'auteur est conduit à supposer qu'il existe des taches de courte période, l'aspect en est très irrégulier et rendu plus compliqué encore par suite de la rotation du Soleil. Il semble probable que l'on doit distinguer au moins trois périodes simultanées, dont la superposition seule est observée. D'après diverses observations sur les orages, les constantes magnétiques terrestres et les apparitions d'aurore boréale, on peut conclure que ces phénomènes terrestres se rattachent aussi bien aux périodes des taches qu'étudie **M. Unterweger**, qu'aux taches de longue période précédemment étudiées. — **M. I. Klemencic** étudie les ondulations de Hertz à l'aide d'une pile thermoelectrique, soudée entre les extrémités du circuit secondaire, en employant deux circuits dont l'un sert d'étalon, tandis que l'autre est déplacé dans le champ, on mesure la distribution de l'énergie le long d'un axe perpendiculaire, et le long d'un axe parallèle à l'excitateur. — **M. Lippick** : Sur la théorie des saccharimètres à pénombre. — **M. Svante Arrhénius** étudie les variations de la conductibilité électrique de la flamme d'un bec de Bunsen causées par l'introduction de vapeurs salines. Le courant qui traverse la flamme n'obéit qu'à la loi de Ohm pour de faibles forces électromotrices; au contraire, lorsque la force électromotrice atteint une certaine valeur, la loi


semble devenir exacte. La conductibilité spécifique est alors proportionnelle à la racine carrée de la concentration, et pour de grandes dilutions, indépendantes de l'élément électronegatif du sel introduit. La conductibilité des vapeurs alcalines croît avec le poids atomique du métal, les sels ammoniacaux et ceux des métaux lourds ne sont pas conducteurs. Si l'on introduit dans la flamme deux électrodes, une à platine, l'autre en fer ou en nickel, il se produit entre elles une différence de potentiel qui produirait un courant allant dans la flamme, du fer au platine. — **M. Mathias Cantor** : Sur la chimie des accumulateurs. La partie la plus importante de ce travail est consacrée à l'étude du processus de la charge des électrodes. On a, à cet effet, utilisé des électrodes en platine, inattaquables, comme secondes électrodes. En observant les dégagements gazeux et les variations de concentration déterminées par des titrages, on remarque que dans la charge de la plaque négative, l'hydrogène se dégage à l'état gazeux aussitôt que l'électrolyse le sépare; il est donc certain que l'électrode n'absorbe pas d'hydrogène; en étudiant ce dégagement à la cathode d'un élément chargé mais non fermé, on constate qu'il est lié à une formation équivalente de SO_3 , on en conclut qu'il doit y avoir une action locale entre SO_3H_2 et le plomb récemment réduit. La charge de l'élément semble en somme être accompagnée de deux gaz inverses. 1^o Réduction du sulfate de plomb par l'hydrogène dégagé électrolytiquement, et formation de plomb et d'acide sulfurique. 2^o Formation de sulfate de plomb en partant du plomb avec dégagement d'hydrogène. La charge est terminée lorsqu'on arrive à un état d'équilibre. — **M. Félix Schiff** : Sur l'orthodibromobenzol et ses dérivés. — **M. Krauss** : Contribution à l'étude de la papavérine. — **M. Fauchs** : Action des hydrosulfites alcalins sur les phénols et les oxy-acides. — **MM. D. Mauthner et W. Suida** préparent une quantité notable de glycolle (28 % du rendement théorique) par l'action de l'ammoniaque aqueuse en excès sur l'acide chloracétique, à condition d'éviter toute élévation de température. — **M. Brauner** a imaginé plusieurs méthodes volumétriques très ingénieuses pour le dosage du tellure; elles sont fondées sur les réactions suivantes :



On dose l'excès de chlorure d'étain par l'iode



On dose alors l'excès d'iode par l'acide arsénieux



On triture avec l'acide oxalique ou le sulfate de fer et l'ammoniaque jusqu'à décoloration, et l'on revient avec le permanganate. — **M. Srpek** : Substitution dans les carbures aromatiques. — **M. G. Neumann** : Contribution à l'étude des composés de l'étain. — **M. G. Pum** : Sur la glycosamine. — **MM. Swoboda et Fossek** : études de quelques alcools diatomiques dérivés de l'aldéhyde isobutyrique. — **M. G. Johann** : Action de l'acide cyanhydrique sur la méthylethylacroléine. — **M. H. Skraup** : Transformation de l'acide malique en acide fumarique. On sait depuis longtemps que beaucoup d'acides peuvent transformer même à température peu élevée l'acide malique en acide fumarique; on a cherché s'il n'existe pas une relation entre la vitesse de transformation et la conductibilité électrique. En réalité il n'y a pas proportionnalité mais la conductibilité des acides paraît avoir une certaine influence. — **M. M. S. Zeisel et Herzig**. Sur les transformations des phénols et des composés éthylys de la dirésorine. Présence de la dirésorine dans la floroglucine des synthèses. — **M. G. Firtsch**. Sur un nouveau minéral : la Rumpfite.

Emil WEYR,
Membre de l'Académie.

CHRONIQUE

LA COMPOSITION DES EAUX DE DRAINAGE

Notre éminent collaborateur, M. P. P. Dehéraïn, a communiqué à l'Académie des Sciences, dans sa séance du 4 août dernier, des expériences d'un haut intérêt.

On sait que le savant professeur du Museum et de l'Ecole d'agriculture de Grignon s'occupe depuis plusieurs années de déterminer les changements qui se manifestent dans un sol cultivé sans engrais; des parcelles du champ d'expériences de Grignon privées d'engrais depuis 1875 ne peuvent plus nourrir ni les betteraves ni le trèfle; l'avoine et le blé donnent encore cependant des récoltes bonnes ou passables. L'analyse a montré qu'entre ces terres et les voisines maintenues en bon état de fertilité, la plus grande différence portait sur les matières organiques, et c'est pour savoir si cette diminution entraînait une diminution sensible dans l'aptitude à retenir l'humidité et à produire des nitrates que les nouvelles expériences de M. Dehéraïn ont été entreprises.

Un graphique montre très clairement que si les terres épuisées laissent écouler l'eau un peu plus vite que les terres bien fermées, et produisent un peu moins de nitrates, on ne saurait trouver dans ces différences l'explication de la fertilité des unes et la stérilité des autres.

L'analyse des eaux de drainage montre en outre un fait curieux; ces eaux renferment au mois d'octobre une quantité de nitrates considérable. Quand la moisson est faite, que la terre découverte ne porte plus de plantes capables d'utiliser les nitrates formés, ceux-ci restent dans le sol jusqu'aux grandes pluies d'automne; à ce moment ils sont entraînés et perdus; en 1889-90 la perte à l'hectare a été en moyenne de 70 kilos d'azote nitrique, correspondant à une fumure de plus de 400 kilos de nitrate de soude, valant 88 francs.

Pour éviter cette perte, M. Dehéraïn propose de procéder rapidement après la moisson à un labour de déchaumage et de semer une graine qui donne en quelques semaines une plante vigoureuse: le colza ou la navette conviennent. Ces plantes enfoncées dans le sol au moment des grands labours de novembre ou de février lui donneront une copieuse fumure renfermant tout l'azote des nitrates qui aurait été perdu.

C'est là une méthode des plus ingénieuses, qui promet d'augmenter d'une façon considérable la fertilité du sol, et sur laquelle nous appelons, pour cette raison, l'attention des agronomes.

L. O.

NOUVELLES

LE DISCOURS DE M. A. CORNU AU CONGRÈS DE LIMOGES

L'Association française pour l'avancement des Sciences a ouvert jeudi dernier à Limoges son Congrès de 1890 sous la présidence de M. A. Cornu. L'éminent académicien a prononcé à cette occasion un discours qui a été très applaudi.

Traitant du rôle de la Physique dans les récents progrès des sciences, il a successivement passé en revue la glorieuse série des découvertes que la Chimie, l'Astronomie, etc., doivent à l'intervention de la Physique. Celle-ci n'a cessé de leur fournir instruments et méthodes d'observation. Lavoisier, Richter, Wenzel, Dalton lui ont emprunté la balance pour établir l'indestructibilité de la matière, les lois des proportions multiples et des équivalents; Dulong et Petit, le calorimètre pour découvrir l'égalité des chaleurs atomiques; Gay-Lussac, la chambre barométrique, lorsqu'il déterminait les relations numériques de la température, de la densité et de la pression des gaz, relations qui, avec Ampère et Avogadro, ont conduit à la notion du volume atomique. C'est encore à un appareil de physique devenu vulgaire, le thermomètre, que la chimie organique recourt pour fixer l'un des caractères les plus importants de ses séries. Des deux notions physiques de la température et de la calorie, M. Raoult a récemment tiré une méthode d'un secours inappréciable pour le chimiste, la *cryoscopie*; MM. Thomsen, Berthelot, Sarrau et Vieille, « cette nouvelle mécanique de l'affinité des atomes » qu'on appelle la *thermochimie*.

« Fruit des efforts associés d'un chimiste éminent, M. Bunsen, et d'un profond physicien, Kirchhoff », l'analyse spectrale a ouvert à la chimie de nouveaux horizons, et opéré dans le domaine de l'astronomie une révolution comparable à celle que Galilée et Newton y avaient produite en inventant la lunette et le télescope. La nouvelle méthode nous renseigne non seulement sur la constitution physique des astres les plus lointains, mais encore, comme l'ont montré Doppler et M. Fizeau, sur le sens et la vitesse de leurs mouvements. Réciproquement l'application du spectroscopie à l'examen des étoiles blanches a permis à M. Huggins de résoudre l'un des problèmes les plus importants de la

chimie: la détermination des raies propres à l'hydrogène pur, raies prises comme repères dans l'étude de tous les spectres.

Dans un autre ordre d'idées, l'électricité, née dans le laboratoire du physicien, envahit aujourd'hui ceux du chimiste et de l'ingénieur, qui y trouvent un puissant moyen d'analyse ou de transformation de l'énergie. On peut dire qu'elle est devenue comme une sorte de puissance sociale, un élément important de notre civilisation. Mais la science à laquelle nous devons l'électrolyse, le télégraphe, le téléphone, la lumière électrique, nous promet encore d'autres bienfaits. En l'étudiant à la suite des mathématiciens, Poisson, Fourier et Ohm, les philosophes expérimentateurs se sont élevés en ces dernières années à de très hautes conceptions. Helmholtz, Thomson, l'illustre et regretté Maxwell ont tenté de rattacher les phénomènes électriques aux lois générales de la Mécanique. Tout récemment ce pressentiment a semblé confirmé par les célèbres et retentissantes expériences de M. Hertz, d'où ce physicien conclut à l'identification des décharges électriques et des onduations lumineuses.

C'est qu'à mesure que la Physique progresse, les distinctions artificiellement établies entre les diverses sciences s'effacent, et « les théories tendent à s'unifier de plus en plus suivant les lois de la mécanique rationnelle. »

Ce remarquable discours que nous venons de résumer et celui de M. Dehéraïn, dont nous avons reproduit ci-dessus la partie principale, ont été les deux gros événements du Congrès de Limoges. — Dans les séances de chacune de ses sections l'Association française a reçu de très intéressantes communications sur des sujets qui prochainement seront traités ici.

L. O.

CHAIRES NOUVELLES AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS

Au Conservatoire des Arts et Métiers vont être créées deux chaires nouvelles affectées l'une à l'Électricité industrielle, l'autre à la Métallurgie et au Travail des métaux. Les candidats à ces chaires ont jusqu'au 1^{er} septembre pour produire leurs titres.

Le Gérant: OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

SUR LES TOURBILLONS ARTIFICIELS

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

Vous avez inséré dans votre excellente *Revue* des critiques de M. Weyher¹ sur une Communication que j'ai faite récemment à l'Académie à propos des Cyclones. Permettez-moi de répondre brièvement à ces critiques. Nous différons radicalement d'opinion sur un point capital, le seul que je veuille retenir ici. M. Weyher pense que dans les tourbillons aériens, trombes, tornados ou cyclones, l'air est ascendant; moi je soutiens depuis dix-sept ou dix-huit ans le contraire. La divergence de ces vues n'est pas chose indifférente. La mécanique des fluides y est profondément intéressée; la météorologie dynamique change du tout au tout suivant la solution adoptée; il n'y a pas jusqu'à la physique solaire où l'on n'ait besoin de savoir à quoi s'en tenir sur ce point.

Ce qui me frappe le plus dans l'article de M. Weyher, c'est la confiance avec laquelle il déclare à plusieurs reprises que, sur ses conclusions, *la théorie et l'expérience ne laissent place à aucun doute*. D'abord il n'y a pas encore, dans la mécanique des fluides, de théorie mathématique des mouvements tourbillonnaires: ce serait d'une telle théorie, si elle existait, qu'on pourrait tirer une démonstration ne laissant place à aucun doute. Quant à l'expérience, M. Weyher ayant fait usage de ventila-

teurs aspirants, il n'est pas étonnant que ses appareils produisent au-dessous d'eux une aspiration, et déterminent un courant d'air ascendant. La question est de savoir si les phénomènes ainsi produits ont quelque rapport avec les tourbillons de la nature tels que les cyclones, les trombes et les tornados. Je ne le pense pas.

Voici l'appareil de M. Weyher et le dessin de son expérience fondamentale.




Fig. 1. — Appareil de M. Weyher. — *abcd*, Tambour à ailettes. — *EF*, Bassin plein d'eau. — *GH*, Colonne sinucuse suivant laquelle monte l'air aspiré.

abcd est un tambour à ailettes intérieures, terminé en haut, tournant à grande vitesse autour d'un axe vertical. L'air n'est pas chassé horizontalement

¹ Voyez *Revue Générale des Sciences*, n° 15 du 15 août 1890, pages 480-482.

par ces ailettes à cause d'un rebord *ab-cd* qui ferme latéralement le tambour. Il est rejeté vers le bas, tout autour, en tournoyant, dans la direction des flèches de la figure dont les unes indiquent le mouvement de descente, les autres celui de la gyration. L'aspiration produite dans le sens de l'axe fait monter l'air suivant une colonne légèrement sinuée GH, et, comme un bassin plein d'eau EF est placé au-dessous du ventilateur, une partie de l'air expulsé d'en haut suivant des directions telles que *dkl* et *bmi*, vient alimenter par en bas la colonne ascendante et lui imprime une légère gyration. En disposant les choses convenablement, l'air qui converge vers G, de *i* ou de *l*, par exemple, fouette légèrement la surface de l'eau et en détache des gouttelettes qui retombent un peu plus loin tout autour de la colonne ascendante ¹.

Enfin le niveau de l'eau est lui-même légèrement surélevé sous la base G de la colonne ascendante, mais il ne faudrait pas croire que l'eau monte dans cette colonne comme le donnerait à penser la gravure ci-dessus (fig. 1). L'auteur, pour rendre visibles les détails de cette charmante expérience, fait chauffer l'eau du réservoir EF de manière à produire un peu de vapeur : c'est cette vapeur à l'état de brume que l'on voit dans le tube GH.

Mais il n'y a pas, dans la nature, au sein des nues, de ventilateur aspirant ni rien qui en tienne lieu. Dans l'embouchure d'une trombe ou d'un tornado les vitesses linéaires de gyration, très lentes à la périphérie, s'accroissent rapidement vers l'axe, ce qui est tout le contraire de ce qui se passe dans le ventilateur. De plus les gyrations deviennent immédiatement descendantes dans la nature, tandis qu'elles restent horizontales dans les expériences; aussi faut-il, dans ces mêmes expériences, recourir à un tour de main (en terme d'atelier) pour faire descendre l'air expulsé latéralement. Au pied d'une trombe ou d'un tornado l'eau des mers ou des étangs représentés ici par le bassin EF ne remonte pas verticalement le long de la colonne GH, pour retomber plus loin en gouttelettes comme sur la figure; elle est chassée au loin en nappes puissantes par les gyrations, tangentiellement au pied de la trombe et remonte jusqu'à une faible hauteur, à peu près comme cela aurait lieu, si une écope, emmanchée à un arbre tournant, venait à fouetter l'eau avec furie. Enfin on n'a jamais rien vu qui pût donner à croire que l'air descende des nues tout autour de la trombe en *dkl* et en *bmi*... pour aller rejoindre en bas l'air aspiré dans la colonne GH.

Au fond, et, sauf un tour de main fort ingénieux,

l'expérience précédente revient à celle de M. Colladon, de Genève, et de beaucoup d'autres auteurs. Dans celle de M. Colladon, le fluide est expulsé latéralement par les ailettes d'un tourniquet aspirateur dénué du rebord *abcd*. Cette eau, rencontrant l'obstacle des parois cylindriques d'un vase qui contient le tout, redescend en partie le long des parois, en tournoyant, et remonte en bas dans la colonne ascendante que ledit aspirateur provoque dans la masse liquide. Ce vase n'existant pas dans la nature où les trombes se produisent au sein d'un milieu indéfini, M. Weyher l'a remplacé par une paroi cylindrique de 30 centimètres de hauteur, qui enferme latéralement son ventilateur et qui produit à peu près, à l'air libre, le même effet que les parois d'un vase. Mais ni le vase de M. Colladon, ni le rebord *abcd* de M. Weyher n'existent dans la nature, pas plus, du reste, que leur ventilateur aspirant, pas plus que les mouvements extérieurs de descente gyroïre qui entourent leur prétendue reproduction d'une trombe.

Il y a longtemps qu'on cherche à réaliser expérimentalement les tourbillons de la nature sans y réussir. Presque tous les expérimentateurs ont eu recours à un tourniquet, comme MM. Colladon et Weyher. Le seul qui soit sorti de cette voie stérile est M. Hirn, dans sa belle *Etude d'une classe particulière de tourbillons*. Le célèbre auteur ne s'est pas mépris sur le sens du mouvement; il l'a obtenu descendant; mais, pour le réaliser, il a dû recourir à un artifice qui ne se retrouve pas non plus dans les phénomènes naturels. Cette impuissance de l'expérimentation n'est pas chose surprenante. Il y a des phénomènes qui ne se y prêtent pas. Tel celui de la grêle. Il suffit de rappeler la célèbre expérience de Volta, par laquelle on croyait avoir reproduit la formation des grêlons entre deux nuages hypothétiques, l'un glacé, l'autre relativement chaud, et chargés d'électricités contraires. On sait aujourd'hui, par les observations de Lecoq sur les puits d'Auvergne et par les observations plus récentes et aussi décisives exécutées au sommet du Pikes Peak par les météorologistes des États-Unis, qu'il s'agit là d'un phénomène tourbillonnaire analogue aux trombes et aux tornados, ayant son origine à un niveau beaucoup plus élevé et se rattachant, comme les tornados eux-mêmes, comme les orages et les grandes averses, au flanc droit de quelque cyclone traversant au loin le pays.

Pour moi, ne pouvant invoquer une théorie rationnelle, puisque la mécanique actuelle ne nous en offre pas les éléments, ne pouvant recourir à l'expérience qui n'a jamais complètement réussi, j'ai suivi une autre marche, celle qui consiste à consulter les observations. Elle est plus longue, mais elle est sûre. J'ai donc étudié les phénomènes tour-

¹ C'est là ce que M. Weyher assimile au *buisson aqueux* dont le pied des trombes marines est entouré.

billonnaires partout où ils se présentent, dans les cours d'eau, rivières ou fleuves, où ils jouent un rôle fort net, mais assez restreint, dans notre atmosphère où ils se présentent sous la forme grandiose des tempêtes, des trombes ou des tornados, sur le Soleil où ils jouent un rôle encore plus considérable et président à la merveilleuse circulation verticale de l'hydrogène incandescent. Cette étude m'a montré qu'il existe une analogie frappante de structure et de fonctions entre tous ces phénomènes si disparates de prime abord. Le trait commun, le plus saillant, c'est qu'ils se produisent tous dans des courants dont les filets juxtaposés ont des vitesses différentes. Tous suivent le fil de ces courants, aussi bien sur notre globe que sur le Soleil, et c'est ce caractère commun qui se retrouve dans cet admirable fait que les tempêtes décrivent toutes, sur le globe terrestre, d'immenses trajectoires d'une figure presque géométrique. Dans la nature, il n'y a pas de tourbillons pareils sans courants générateurs; leur mouvement de translation n'est pas un accident; c'est la cause déterminante, et c'est même là ce qui rend si difficile leur reproduction artificielle.

Ce premier point étant acquis, je veux dire ayant reconnu l'analogie profonde qui existe entre les mouvements tourbillonnaires à axe vertical des cours d'eau, des courants de la photosphère du Soleil et de notre propre atmosphère, il restait à chercher dans quel sens les fluides se meuvent dans leur intérieur. Or, pour deux de ces trois ordres de phénomènes, la chose est évidente. S'il s'agit des cours d'eau, tout le monde sait que les tourbillons sont descendants. S'il s'agit du Soleil, le noyau relativement noir des taches et toutes les observations d'analyse spectrale conduisent à la même conclusion. Mais lorsque, raisonnant par analogie, j'en ai conclu que l'air, dans les tourbillons de notre atmosphère, devait être aussi descendant, ce fut, dans le camp des météorologistes, un *tolle* général. Je me heurtai à un préjugé dont je n'avais mesuré ni la force ni l'universalité. Les objections théoriques me vinrent de toutes parts. MM. Colladon et Weyher représentent, dans cette longue discussion, les objections tirées de l'expérimentation. Quant aux observations, que de fois ne m'a-t-on pas objecté le fait prétendu que les trombes exercent nécessairement en bas une aspiration puissante puisqu'elles pompent jusqu'aux nues l'eau des mers ou des étangs!

Heureusement ces phénomènes, qui avaient pris aux États-Unis une importance capitale, y étaient observés avec soin par une puissante organisation, celle du *Signal Office* de l'armée fédérale. Les agents

de ce service avaient pour consigne de noter tous les faits sans se laisser guider par des idées préconçues, quelque plausibles que ces idées pussent leur paraître. Ces agents, des sous-officiers bien stylés ou des officiers instruits, dessinent, sur les cartes topographiques, la trajectoire de chaque tornado, suivent pas à pas les désastres occasionnés par ces terribles phénomènes, dessinent les maisons renversées, avec leurs débris, notent les directions où les débris ont été lancés, consignent dans leurs rapports la forme des tornados, leur vitesse, tous les phénomènes météorologiques qu'ils ont précédés ou suivis, etc., etc... C'est à ces précieux documents, recueillis par des hommes imbus de l'idée qu'ils remplissent un devoir envers leur pays, qu'il faut recourir si l'on veut savoir ce que c'est qu'une trombe ou un tornado. C'est là que j'ai puisé les documents dont je me suis servi dans mes études, pour établir par les faits, la conclusion à laquelle je suis arrivé, à savoir que « les trombes et les tornados sont des tourbillons descendants à axe vertical qui prennent naissance dans les courants supérieurs de l'atmosphère et qui transportent en bas, en la concentrant sur un très petit espace, l'énergie due aux inégalités de vitesse de ces courants ».

L'étude des tempêtes, dans les régions où leur figure typique n'est pas encore altérée par des déformations progressives, m'a conduit aux mêmes résultats; aussi ces idées nouvelles commencent-elles à pénétrer dans le monde météorologique, où j'espère qu'elles finiront par être complètement adoptées.

C'est ainsi, du reste, que la Science a presque toujours marché. L'observation précède la théorie et lui montre la voie. Les lois de Kepler, par exemple, sont le fruit de l'observation pure. Les géomètres, informés par ces lois de la véritable nature des mouvements célestes, en ont déduit celle de la force qui y préside. Puis l'analyse a écrit les équations différentielles de ces mouvements, et l'intégration de ces équations a permis de remonter plus haut que ces lois elles-mêmes, d'en montrer le vrai sens, d'en corriger ou d'en étendre les énoncés et d'en déduire avec certitude tout ce qu'elles contenaient en germe. De même ici, pour que la mécanique rationnelle pût un jour attaquer les grands mouvements de l'atmosphère, il fallait d'abord déduire de l'observation la structure de ces phénomènes et la vraie nature des mouvements qui s'y exécutent. C'est cette dernière tâche que je me suis proposée.

H. Faye

Membre de l'Académie des Sciences.

LES EAUX ABYSSALES

Il est d'un grand intérêt pour l'Océanographie proprement dite aussi bien que pour l'Histoire Naturelle, de posséder des notions positives sur les eaux qui remplissent les abîmes de l'Océan. Leur composition chimique est-elle partout la même et comparable à celle des eaux superficielles; quelle est la nature et la proportion relative des gaz contenus, et, avant tout, ces eaux ont-elles un mouvement d'ensemble comparable à celui d'un fleuve, ou demeurent-elles immobiles, et leur mélange, s'il a lieu, n'est-il effectué que par des phénomènes de diffusion? Dans l'état actuel de nos connaissances, ces problèmes ne peuvent pas être résolus directement. Sous les énormes pressions des profondeurs, il est douteux que les bouteilles destinées à recueillir l'eau soient étanches pour les gaz; les appareils mesureurs de courants ne fonctionnent plus; on en est donc réduit aux inductions.

I

On admet généralement que les eaux océaniques, obéissant à diverses causes parmi lesquelles il faut compter la chaleur solaire, l'évaporation, la rotation terrestre et les vents réguliers, sont animées, dans chaque hémisphère, d'un mouvement de translation de l'équateur vers les pôles, à la surface. Parvenues dans les hautes latitudes, par suite du refroidissement qu'elles éprouvent, elles descendent dans les profondeurs, rampent sur le lit de l'Océan depuis le pôle jusqu'à l'équateur, remontent alors perpendiculairement et gagnent la surface pour y continuer le cycle de cette circulation dite verticale.

Cette théorie est soutenue par M. Krümmel dans son traité classique d'océanographie ¹. Il fait dépendre la distribution de la température, d'une circulation générale, sans laquelle le fond des mers serait partout à la température minimum d'hiver à la surface en chaque lieu considéré. Supposant l'Océan divisé en parallélipèdes verticaux à minces parois possédant la même conductibilité thermique que l'eau, il pense que l'eau contenue dans chacune de ces sortes de boîtes, au bout d'un temps suffisamment long, refroidie en hiver au contact de l'air jusqu'à prendre la température minimum de celui-ci, descendrait au fond où elle s'accumulerait. Comme l'observation prouve qu'il n'en est pas ainsi, on doit admettre l'existence d'une circulation générale se faisant sentir dans les abîmes les plus profonds de l'Océan.

Le savant océanographe, dans son hypothèse, ne paraît pas tenir compte de la chaleur communiquée par l'été à la nappe d'eau supérieure que les couches refroidies à la surface pendant l'hiver sont obligées de traverser pour se rendre au fond, et au contact desquelles elles se réchauffent, ce qui ne tarde pas à arrêter leur mouvement de descente. La chaleur spécifique de l'eau de mer fait de celle-ci un puissant régulateur de température, en surface comme en profondeur. Sauf dans un océan peu profond, la climatologie de l'air aura une influence sur l'épaisseur de la zone supérieure à température variable de la mer, mais cette influence ne dépassera pas une certaine limite, déterminable en chaque point par l'observation directe et au delà de laquelle commencera une région de repos. En outre, le froid ne peut pas augmenter indéfiniment. Le point de congélation de l'eau de mer est peu élevé et la glace, corps mauvais conducteur, constitue une enveloppe protectrice pour l'eau sous-jacente, ainsi qu'on le reconnaît dans les contrées polaires.

M. Krümmel consacre un chapitre spécial à la circulation verticale océanique, et y résume les principaux arguments à l'appui de cette théorie :

1° « La preuve la plus frappante en faveur de « l'équilibre de densité qui s'accomplit dans les « Océans grâce à la circulation verticale, est le rem- « plissage de tous les fonds de mer au-dessous de « 2000 mètres de profondeur par une eau de tempé- « rature uniforme comprise entre 0° et 3° et de den- « sité maxima. » On ne voit pas pourquoi, cet équi- libre de densité, serait une preuve en faveur d'une circulation verticale s'effectuant continuellement, sans un moment d'arrêt, et l'on y trouverait plutôt une preuve du contraire. Si, en effet, le fond des océans est dans un état d'équilibre offrant le maximum de stabilité, il n'existe aucune cause de changement; tout doit demeurer dans un calme absolu, car l'eau du fond possédant le maximum de poids par litre, ne se mettra certainement pas en mouvement afin de céder la place à une eau plus légère.

2° « Le fait que les températures de fond les plus « basses, ont été constatées là où les grands océans « ont la communication la plus large et la plus « profonde avec les bassins polaires, et que ces « températures augmentent d'autant plus, que l'eau « doit accomplir un trajet plus long pour se rendre « du bassin polaire jusqu'au lieu de l'observation, « prête un puissant appui à l'hypothèse de la cir- « culation verticale. »

La véritable façon de traiter cette discussion, serait d'avoir une carte exacte et détaillée du relief

¹ O. Krümmel, *Handbuch der Oceanographie*, II, 284.

sous-océanique, et des séries de coupes thermiques suivant les divers méridiens terrestres, indiquant la température annuelle moyenne et maxima de l'air en chaque point et, à partir de la surface de température constante, le profil des diverses couches isothermes jusqu'au fond. Au grand bénéfice de la vérité, on discuterait alors des chiffres et non des opinions personnelles à tel ou tel auteur. Malheureusement, ces documents précis font défaut. Le relief sous-marin, même dans les océans les mieux étudiés, présente encore de vastes lacunes que chaque océanographe remplit d'une façon arbitraire. Les instruments qui récemment encore servaient à mesurer la température sont d'une précision discutable; les thermomètres Miller-Casella à maxima et à minima, les seuls connus à l'époque du mémorable voyage du *Challenger*, possèdent de nombreux inconvénients et offrent bien des causes d'inexactitude; ils ne sont plus aujourd'hui en usage, et M. Krümmel lui-même est d'avis que les indications thermométriques du *Challenger* sont trop hautes de plus d'un demi-degré Fahrenheit. Or les températures du fond des diverses mers présentent de très faibles différences, et sur les thermomètres Negretti et Zambra, les plus perfectionnés des instruments de mesure, de beaucoup supérieurs aux Miller-Casella, même en laissant de côté toutes les causes d'erreur dues aux effroyables pressions des profondeurs, à la dilatation de la colonne mercurielle coupée sous l'influence des élévations subséquentes de température, les intervalles correspondant à 1° C. étant de 0,002 m. environ, il est impossible à un observateur, si habité qu'il soit aux lectures, de garantir le dixième de degré, c'est-à-dire d'apprécier sûrement à l'œil une longueur de 1/3 de millimètre en plus ou en moins. S'il s'agit de degrés Fahrenheit, plus petits de moitié, la lecture du dixième de degré sera encore plus douteuse.

En l'état actuel, on peut dire que les températures les plus basses du fond ont été observées là où le fond est lui-même plus bas. Les grandes profondeurs sont plutôt dans l'hémisphère Sud que dans l'hémisphère Nord. En se servant des cartes du magnifique atlas physique de Berghaus (nos 19 et 21, Hydrographie nos IV et VI), on reconnaît que les plus basses températures du fond se trouvent surtout dans l'Océan glacial arctique au nord de l'Islande, du Spitzberg, de la Sibérie, de l'Amérique et dans la mer de Baffin. Ces régions où la profondeur de l'eau est remarquablement faible et le climat particulièrement rigoureux sont en majeure partie, sinon en totalité, au-dessus de la surface de variation nulle.

Les autres aires à température de fond minima sont situées le long des côtes du Pérou et du Chili,

au large de l'embouchure de la Plata, dans l'Atlantique, et à l'est des Kouriles, précisément aux points correspondant dans l'hémisphère Nord aussi bien que dans l'hémisphère Sud aux profondeurs océaniques maxima. Elles sont à contour fermé et ne se relient point au pôle le plus proche. Il ne reste que les environs du pôle Sud où l'on rencontre à la fois de grandes profondeurs et un climat rigoureux.

Quant à l'hypothèse de l'eau capable d'acquiescer de la chaleur en marchant, et d'autant plus qu'elle marcherait plus longtemps du pôle sud vers le pôle nord, dans le cas même où la basse température de la fosse des Kouriles, placée aussi loin que possible du pôle sud, et pour ainsi dire presque complètement séparée de l'Océan arctique par le détroit de Behring, ne lui donnerait pas un démenti formel, il n'y a pas lieu de la discuter.

3° « On ne trouve point de températures froides « profondes polaires dans les bassins maritimes « limités par des seuils sous-marins. La température du fond y dépend de la hauteur du seuil « ou, ce qui revient au même, de la profondeur « maxima du canal de jonction avec le plein Océan. « On connaîtra cette température par la règle suivante : si la température moyenne d'hiver au-dessus du bassin fermé est plus basse que la température de l'Océan voisin au niveau du seuil, la portion du bassin fermé placée au-dessous de ce niveau sera remplie d'eau à cette température d'hiver. Si, au contraire, la température d'hiver est plus élevée que celle de l'Océan voisin au niveau du seuil, le bassin sera rempli d'eau ayant la température de l'Océan à ce niveau. Rien ne montre mieux que l'origine des couches profondes à température basse de l'Océan n'est pas locale, mais polaire. »

La loi revient à dire : la température de l'Océan au niveau du seuil d'un bassin fermé étant, par exemple, de 3°, celle du bassin au-dessous du niveau du seuil sera de 2°, si la température d'hiver de l'air situé au-dessus est de 2° et de 3°, si cette température aérienne est de 4°. L'origine polaire des eaux froides profondes n'est point discutée et le présent travail se propose, non pas d'expliquer cette origine, mais d'émettre des doutes sur l'existence d'une circulation verticale profonde océanique. La loi établit simplement que les eaux du fond sont à la température la plus basse que les circonstances leur permettent de prendre, ce qui est évident, puisqu'elles auront alors, par unité de volume, le maximum de poids qu'elles puissent posséder.

4° « Dans les endroits où les couches superficielles de la mer sont mises en mouvement par « de forts courants et où ont lieu les remous de

« ces courants, les nappes à température plus haute sont séparées par une couche intermédiaire distincte de l'eau profonde située par-dessous. « Tandis que dans ces couches, la température décroît régulièrement avec la profondeur, on constate dans la couche intermédiaire un abaissement de température soudain, très rapide, jusqu'à 4° ou 5°, provenant de la couche superficielle de la masse de l'eau profonde, et qui atteint même 3° à 2000 mètres de profondeur environ. Ce phénomène s'observe particulièrement dans l'Atlantique septentrional ; il montre que la masse des eaux profondes n'est point touchée par les mouvements des couches superficielles, qu'aucun courant de vitesse sensible n'y pénètre, et que le cycle entier de la circulation océanique doit s'accomplir dans les couches supérieures. »

Les phénomènes décrits, loin d'appuyer la théorie de la circulation verticale profonde, sont donc en complète contradiction avec elle.

5° M. Krümmel reconnaît que dans les régions polaires, l'observation prouve que la densité de l'eau de mer augmente partout avec la profondeur, de sorte que, malgré l'alternance des couches de diverses températures, la succession de celles-ci a cependant lieu régulièrement selon les lois de la pesanteur.

Ces lois obligent précisément à douter d'une circulation verticale qui déplacerait des eaux profondes, lourdes et froides par des eaux superficielles, légères et chaudes. Si l'on admet que des eaux superficielles se refroidissent et s'alourdissent en se rendant de l'équateur aux pôles, comment croire que des eaux profondes, froides et lourdes à l'équateur, se décident à s'élever verticalement à travers plusieurs milliers de mètres de couches plus légères.

Tout en croyant à la circulation verticale¹, M. Krümmel lui suppose une vitesse tellement faible, qu'à l'exception de quelques rares endroits, elle ne peut être directement mesurée. Il se borne ensuite à énoncer que les couches superficielles de l'Océan sont mises en mouvement par deux puissantes forces, le vent et l'évaporation agissant dans le même sens que la circulation verticale et l'entretenant. Or, personne ne songe à nier la circulation superficielle ; mais, comme jusqu'à présent rien ne semble prouver l'existence d'une circulation verticale profonde, que ceux qui l'admettent font d'ailleurs presque nulle, on est en droit de la considérer comme absolument nulle et de conclure que la circulation superficielle forme, à elle seule, son cycle et se suffit à elle-même.

II

M. Dittmar a cru trouver une preuve d'un mouvement des eaux se faisant sentir jusqu'au fond des abîmes dans la proportion relative des gaz que contiennent des échantillons d'eaux récoltés à diverses profondeurs.

« Tandis que la proportion d'azote contenue dans l'eau de mer reste constante avec la profondeur, dit M. Dittmar², la proportion d'oxygène devient de plus en plus faible malgré les phénomènes d'oxydation qui s'effectuent dans les profondeurs et sans compensation. Il en résulte que, s'il y avait quelque part dans l'Océan stagnation absolue, la proportion d'oxygène dissous pourrait finir par être réduite à zéro. Parmi les nombreux échantillons d'eaux profondes analysées au point de vue des gaz, aucun ne s'est trouvé complètement privé d'oxygène absorbé, ce qui confirme notre conviction que la stagnation absolue n'existe nulle part dans l'Océan, pas même dans ses abîmes les plus profonds. »

La conclusion de l'éminent chimiste ne paraît point justifiée ; rien n'est à oxyder dans les grands fonds océaniques, au moins de manière à exercer une influence assez puissante pour priver totalement d'oxygène l'eau ambiante. La meilleure preuve est la couleur des argiles rouges caractéristiques de ces fonds et dans lesquelles le fer, l'élément oxydable de beaucoup le plus important, est à son maximum d'oxydation. Les sédiments marins partent des rivages, s'acheminent vers les abîmes ; en passant par les faibles profondeurs sans cesse agitées, ils s'oxydent de plus en plus, des vases vertes aux vases bleues, aux argiles grises et enfin aux argiles rouges incapables d'absorber la moindre quantité d'oxygène, car elles en sont saturées. Or, puisque rien n'absorbe l'oxygène des eaux profondes, il serait très étonnant de ne leur en point trouver.

L'uniformité de composition de l'eau de mer dont on a voulu faire aussi un argument en faveur d'une circulation générale brassant la masse entière de l'Océan, dans les abîmes comme à la surface, n'existe pas. M. Dittmar² le reconnaît et M. L. Schmelck du *Vöringen* a démontré que ni la chaux, ni la magnésie, ni l'acide sulfurique, ni le chlore ne sont en quantités rigoureusement constantes³. Les différences sont faibles, ce qui s'explique par le volume d'eau en mouvement,

¹ Professeur William Dittmar. F. R. S. *Report on researches into the composition of ocean water collected by H. M. S. Challenger during the years 1873-1876. Report on the scientific results...* Physics and Chemistry, vol. I, p. 223.

² Dittmar, *loc. cit.*, p. 199.

³ L. Schmelck. *Chemistry; on the solid matter in sea water.* The Norweg. North-Atl. Exped. t. IX.

¹ Krümmel, *loc. cit.*, II, 294.

même dans les couches superficielles; les analyses présentent d'extrêmes difficultés pratiques, et nous savons que sous les effroyables pressions de sept ou huit mille mètres d'eau, les instruments destinés à récolter les échantillons ne permettent guère de garantir l'absolute pureté de ceux-ci. M. Weith, de Zurich ¹, a observé que, bien que la proportion de carbonate de chaux contenue dans les rivières suisses fût très variable en différents endroits et à diverses époques, la composition des lacs qui totalisent les eaux des rivières n'a pas subi, en vingt ans, de variation sensible aux procédés d'analyse les plus délicats. Or il est évident que ces variations ont lieu, mais elles sont en deçà de la sensibilité des procédés actuels d'investigation. Ce qui est vrai d'un lac l'est davantage encore des couches, même superficielles, de l'Océan.

La solubilité dans l'eau de mer des corps qui prennent naissance dans les abîmes s'oppose à ce que ces abîmes soient occupés par une eau en mouvement. Les cristaux de christianite ou philipsite et les nodules manganésiens des argiles rouges du Pacifique, au lieu de se former, se dissoudraient et disparaîtraient dans une eau renouvelée, quelque faible que fût d'ailleurs son courant. Les corps ne peuvent se créer qu'au sein d'un liquide saturé des éléments qui y prennent l'état solide. D'après les expériences de Pfaff ² qui a étudié l'extrême lenteur de la diffusion, l'épaisseur de ces eaux saturées en contact immédiat avec le sol sous-marin est peut-être assez faible. Cette saturation augmenterait encore la densité et ne serait nullement en contradiction avec la loi physique de la stratification des liquides par ordre de densités croissantes de la surface au fond.

III

L'hypothèse d'un mouvement horizontal des eaux par une sorte de reptation tout le long du lit de l'Océan a contre elle une raison mécanique. Le lit océanique ne s'abaisse point régulièrement des pôles à l'équateur; il est accidenté et comprend des dépressions profondes, diversement orientées et isolées, qui sont la contre-partie de certaines vallées montagneuses continentales où l'air même, fluide éminemment plus subtil que l'eau, est comme soustrait à la circulation par la ceinture des hauteurs environnantes, et demeure presque stagnant. Les pentes, pour être plus adoucies sous les eaux que sur les continents, n'en existent pas moins et il n'est pas admissible qu'un courant d'eau soit capable de les remonter. Le Gulf-Stream n'est

point un exemple à citer. Ce courant devient, il est vrai, plus mince à mesure qu'il se rapproche des bancs de Terre-Neuve, mais il coule sur un lit liquide et non sur un lit solide; il n'a pas au-dessus de lui une masse d'eau haute de plusieurs milliers de mètres et en outre il ne remonte pas une pente, il diminue d'épaisseur par le bas. Cette diminution s'explique par la température élevée de ses eaux qui, s'élargissant en surface, pénètrent dans une masse liquide plus froide qui les refroidit de plus en plus et en quelque sorte les use progressivement en profondeur. Il en est ainsi jusqu'au moment où, sur les bancs de Terre-Neuve, le Gulf-Stream, coupé par le fleuve de Cabot et par le courant du Labrador, se transforme en un simple courant de dérive, tout en surface ¹. Alors qu'on admet la stagnation des eaux au fond des golfes, des fjords ou des mers en bassins comme la Méditerranée, séparés de l'Océan par un seuil, pourquoi considérerait-on le même phénomène d'équilibre stable permanent comme impossible pour l'Océan lui-même.

Si un courant entraînait les eaux sur le fond même de l'Océan, il emporterait les vases infiniment légères qui le tapissent. Le lit des mers serait donc recouvert symétriquement, de chaque côté de l'équateur en remontant vers les pôles, de sédiments de plus en plus grossiers. Les globigérines pourraient peut-être résister jusqu'au moment où, par dissolution, elles auraient été réduites à l'état de boue, mais alors elles seraient emportées et jamais, sauf près de l'équateur, on ne les trouverait mélangées à des particules fines. Les vases et les argiles seraient charriées. Il est probable en outre que les échantillons d'eau puisés au voisinage du fond seraient souillés de sédiments en suspension, ce qui n'a jamais été constaté.

On a cherché encore à appuyer la théorie de la circulation verticale par des expériences synthétiques J. Francon Williams décrit l'expérience suivante ².

Dans un bassin parallélépipédique à parois de verre et rempli d'eau, on place à une extrémité un bloc de glace et à l'autre extrémité une lame métallique en contact avec l'eau et chauffée par une lampe. On ajoute un peu de liquide colorant bleu au voisinage de la glace et de liquide rouge près du métal chaud. On remarque aussitôt la production d'un courant se dirigeant du métal vers la glace en surface, descendant ensuite verticalement, puis suivant le fond du bassin en sens inverse de la direction de surface, enfin remontant per-

¹ W. Weith, *Chemische Untersuchungen Schweizerischer Gewässer mit Rücksicht auf deren Fauna*.

² F. Pfaff, *Allgemeine Geologie als exacte Wissenschaft*, p. 306.

¹ J. Thoulet, *Considérations sur la structure et la genèse des bancs de Terre-Neuve*, Bulletin de la Société de géographie de Paris, X, 203, 1889.

² J. Francon Williams, *The Geography of the oceans*, p. 94.

pendiculairement au-dessous du métal chaud de manière à fermer le cycle.

Cette expérience est sans doute une de celles¹ dont parle le D^r Carpenter en l'attribuant au Professeur Buff² et que critique d'ailleurs Wyville Thomson³. J'ai essayé de la répéter. Dans un aquarium à parois de verre mesurant 50 centimètres de longueur, 30 centimètres de largeur et 23 centimètres de profondeur, en partie rempli d'eau, j'ai placé à une extrémité une plaque rectangulaire de cuivre épaisse de 4 millimètres, large de 7 centimètres et longue de 23 centimètres, portant rivées trois bandes du même métal, de même épaisseur, larges de 4 centimètres, deux fois coudées à angle droit et dont l'extrémité était, pour chacune d'elles, chauffée avec un brûleur Bunsen. A l'autre bout du bassin, une cuve en zinc contenait des morceaux de glace. Le cuivre était chauffé jusqu'au rouge. Je projetais alors sur la lame chaude et en divers points de l'aquarium des cristaux de permanganate de potasse qui en se dissolvant donnaient lieu à des sortes de nuages fortement colorés et destinés à indiquer par leurs ondulations les plus faibles mouvements de l'eau.

Avec l'eau douce, je n'ai obtenu aucun résultat. Avec de l'eau fortement salée, j'ai porté la plaque immergée à une profondeur de 1 centimètre à une température assez élevée pour que des vapeurs se dégagent dans l'air. Au bout d'un certain temps, la surface de l'eau était à 22° tandis que le fond, à 40 centimètres au-dessous, était à 12° seulement, à cause du contact de la cuve glacée. Malgré cette différence de température considérable, surtout en ayant égard à la courte distance, l'eau chaude s'étendait en nappe sur le fond et c'est à peine si l'on constatait, pour les nuages rouges de permanganate, de très faibles traces d'inclinaison dans le sens indiqué par la théorie pour le courant profond.

Afin de me convaincre davantage, j'ai préparé un bassin en bois doublé extérieurement en zinc et mesurant 1 mètre de longueur, 63 centimètres de largeur et 40 centimètres de profondeur. Je l'ai en partie rempli d'eau. A la surface de celle-ci, j'ai enfoncé et maintenu une cuve en cuivre longue de 50 centimètres, large de 10 centimètres, présentant deux portions horizontales plates au-dessous desquelles deux rampes à gaz portaient chacune 23 becs. A l'autre extrémité du bassin était suspendue une cuve parallélépipédique en zinc de 50 centi-

mètres sur 7 centimètres de large et 12 centimètres de profondeur, pleine de morceaux de glace. Pas plus que la première fois, il ne se produisit de courant; la main approchée de la cuve n'éprouve aucune sensation de chaleur. Cependant, au-dessus de la partie chauffée de la cuve, l'eau en couche épaisse de 1 millimètre à peine dégagait encore des vapeurs; le thermomètre accusait un épaississement très lent de la couche chaude par en haut et de la couche froide par en bas, mais aucune trace sensible de courant.

On pourrait objecter que toutes proportions gardées, les 46 becs de gaz échauffant ma cuve produisaient un effet très inférieur à celui de la chaleur solaire sur les mers tropicales. Il m'était difficile de prendre des moyens de chauffage plus violents; il me semble encore plus difficile, en présence du résultat si absolument négatif de mes expériences, d'admettre que l'action du soleil sur la mer se propage soit directement, soit indirectement par évaporation et augmentation de densité au delà d'une profondeur relativement faible. Cet échauffement qui produit peut-être des mouvements dans le sens vertical ayant une influence sur les courants de surface est incapable de donner naissance à un courant aussi puissant que le suppose une circulation unique, continue et continuelle descendant jusqu'aux abîmes les plus profonds pour en remonter ensuite.

IV

La théorie de la circulation verticale profonde s'appuie enfin sur les cartes de densités océaniques, publiées pour la première fois dans les *Reports du Challenger*¹, qui ont été recopiées par divers auteurs et qu'on retrouve notamment dans l'atlas de Géographie physique de Berghaus². Nous prendrons comme exemple celle qui représente une coupe de l'Atlantique depuis 32°41' lat. N., jusqu'à 27°54' lat. S. et qui porte le n° III dans le Rapport de M. J.-Y. Buchanan. Elle montre l'Océan occupé par des eaux de densité 1.0260 — 1.0265, surmontées d'eau à la densité 1.0265 — 1.0270. Une immense nappe de densité 1.0260 — 1.0265 remplit la plus grande partie du fond, se recourbe et revient vers la surface pour envelopper un amas, épais de 3,000 mètres, d'eau à 1.0255 — 1.0260 au sein duquel demeurent suspendus des noyaux isolés d'eaux plus lourdes (1.0260 — 1.0265), tandis que près de la surface sont des eaux dont la den-

¹ *The Gulf-Stream*, a letter from D^r Carpenter to the editor of « Nature » August 11, 1870. *Nature*, vol. II, p. 334.

² *Familiar Letters on the Physics of the Earth*, treating of the chief movements of the land, the water and the air and the forces that give rise to them, by Henry Buff, Professor of Physics in the University of Giessen.

³ Wyville Thomson, *les Abîmes de la mer*. Traduction Lortet, p. 311.

¹ *Report on the specific gravity of samples of ocean water observed on board H. M. S. Challenger during the years 1873-76* by J.-Y. Buchanan Esq. M. A.; F. R. S. E. Chemist and physicist of the Expedition. Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger, Physics and Chemistry, vol. I.

² Carte n° 19; Hydrographie n° IV.

sité atteint 1.0270 et même 1.0275. On a ainsi l'image d'un vase où des nappes de mercure enveloppent et surnagent de l'eau contenant dans son sein des masses d'huile et de mercure flottant isolément.

Il est inadmissible qu'un pareil dessin représente la réalité et jamais, pas plus dans un vase que dans l'Océan, un liquide lourd ne flottera au-dessus d'un liquide léger.


L'erreur provient de deux causes.

générale de la nature le rôle qu'on souhaite de découvrir. Il faudra donc :

1° Evaluer la densité de l'eau à la température qu'elle possédait au moment et à l'endroit même où on l'a récoltée.


2° Faire subir à cette densité la correction de compressibilité qui est fonction de la profondeur à laquelle se trouvait l'échantillon.

On pourra alors, en plaçant chaque valeur ainsi obtenue sur le dessin à la place correspondant à



Loin de présenter, même à l'équateur où les sondages sont pourtant relativement assez rapprochés, la moindre trace de courant horizontal ou vertical, les couches sont maintenant régulièrement disposées depuis le fond jusqu'au jour par ordre de densités décroissantes; leurs plans de séparation sont horizontaux conformément aux principes de la physique et ils ne s'ondulent légèrement qu'au voisinage de la surface, conséquence très naturelle des différents climats qui se succè-

baissent régulièrement du sud au nord à partir de 21 degrés latitude S. environ. On observe en outre, une anomalie remarquable au sondage thermométrique exécuté le 31 mai 1876 par 35°37' longitude W. et 26°21' latitude S. qui au fond, à la profondeur de 5,422 mètres, a donné une température de 3°,1, alors que le sondage le plus voisin, du 24 juillet, à la profondeur moindre de 2,400 mètres indiquait 2°,5. En admettant que ces mesures soient exactes ou du moins entachées d'une erreur cons-



Nous n'avons pas discuté l'origine des eaux froides des abîmes de l'Océan; leur température est peut-être la conséquence d'un état d'équilibre remontant dans le passé jusqu'aux périodes géologiques antérieures. Qui saurait apprécier le rôle que l'époque glaciaire par exemple, relativement si voisine, peut avoir joué dans l'économie thermique actuelle des mers? L'eau du fond ne serait-elle pas une eau fossile comparable à la glace fossile qu'on retrouve intercalée entre des couches de roche près

d'une nappe au sein de laquelle ont lieu tous les phénomènes de la circulation océanique. La couche inférieure est la région du repos, l'autre la région du mouvement. L'épaisseur exacte de cette dernière, variable en divers lieux, est inconnue quoique relativement faible : elle ne sera déterminée que par l'observation directe, qui fixera la profondeur de la zone subissant les alternatives climatiques du froid et du chaud, et qui est limitée par la surface de température constante. Là s'accomplissent,




Fig. 3. — Section de l'Atlantique. Températures.

du détroit de Behring¹? De telles discussions ne reposent sur rien de précis et n'ont par conséquent aucun intérêt. La distribution actuelle des eaux est conforme aux lois de l'équilibre; la science n'a rien à voir en deçà.

V

Nous avons essayé de montrer que rien n'autorise encore à croire à l'existence d'une circulation verticale profonde, caractérisée par un mouvement général des eaux de l'équateur aux pôles à la surface, en sens inverse sur le fond du lit de l'océan et remontant verticalement sous l'équateur afin de fermer le cycle. De sérieux motifs, au contraire, nous engagent à penser que l'Océan est occupé par une couche d'eau relativement stagnante, surmontée

et effectuent leur cycle entier, tous les phénomènes ayant pour résultante les courants marins, le problème le plus compliqué de l'océanographie.

On ne saurait trop insister sur la nécessité d'exécuter des mesures très nombreuses, très précises surtout, avec des instruments soigneusement étalonnés et de les résumer sur des cartes qui parlent aux yeux, seules capables de résoudre les phénomènes naturels, en apparence les plus compliqués, en laissant apparaître leur succession, leur variation à travers l'espace et le temps, et leurs anomalies. Même inexactes, elles ne cessent pas d'être utiles, car elles permettent aisément de reconnaître et de corriger l'erreur qui les entache. Je crois avoir fourni la preuve que, telles qu'elles sont, les cartes de M. J.-Y. Buchanan ne sont point la représentation de la vérité, je les modifie

¹ De Lapparent, *Traité de géologie*, p. 296. F. Savy. Paris.

d'une façon qui me semble juste, mais leur principe, basé sur des mesures précises, demeure si peu attaqué et est si peu attaquant, qu'elles constituent toujours le document fondamental sur lequel s'appuie le problème de la circulation profonde océanique. Une carte schématique a la puissance irrésistible des faits dont elle est la représentation. Or, on ne discute pas des faits, on se borne à chercher le lien qui les réunit entre eux de manière à faire des uns la conséquence fatale des autres. Les théories ont rarement une durée qui dépasse celle de la vie et de l'influence

de leur auteur; tout peut s'expliquer par le raisonnement pur et la valeur de l'explication ne dépend guère que de l'habileté de celui qui la donne. Au fond, elle est nulle ou inutile, car la Science n'est plus une dissertation comme au temps d'Aristote, ou au Moyen Age; elle est l'exposé d'une collection de faits, l'énoncé de la loi mathématique qui les gouverne et le droit pour l'homme de les prévoir, de les prédire et d'en tirer parti.

J. Thoulet

Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy.

LES PILES CHLOROCHROMIQUES DU COMMANDANT RENARD

Les piles du Commandant Renard sont des piles de grande intensité, pouvant s'appliquer soit à la production directe de la lumière; soit à celle de la force motrice.

Sous ce rapport, elles ne sauraient être comparées qu'aux piles de Bunsen, aux piles au bichromate de potasse et aux accumulateurs.

Les accumulateurs ne peuvent être employés que là où l'on dispose d'une source électrique extérieure. Mais, lorsque cette source manque, l'emploi des piles primaires devient indispensable.

La pile de Bunsen à deux liquides, très encombrante, d'un usage fort incommode, dégage en outre, comme on le sait, des vapeurs d'acide hypozotique qui en rendent l'emploi impossible dans les maisons.

Les piles au bichromate à deux liquides ou à un seul liquide sont restées fort imparfaites comme mode d'agencement. Leur capacité électrique est faible, et leur décharge irrégulière en raison des phénomènes de polarisation qui y sont très intenses. Après la décharge le liquide de ces piles cristallise, ce qui en rend le nettoyage difficile.

La pile Renard est très supérieure aux précédentes et cette supériorité tient à deux causes :

1° La composition du liquide qui sert à la charge.

2° Le mode d'agencement des éléments.

I. COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS DES LIQUIDES EMPLOYÉS AU CHARGEMENT DES PILES RENARD.

Liquide normal. — Le liquide normal des piles Renard, est un mélange uniquement composé d'eau, d'acide chlorhydrique, et d'acide chromique. Ce liquide est cinq ou six fois plus actif que le liquide des piles au bichromate et peut donner jusqu'à 40 et 50 watts par décimètre carré de zinc.

Liquides atténués. — Mais pour beaucoup d'applications le liquide normal serait trop énergique. On arrive aisément à l'atténuer en y remplaçant une partie de l'acide chlorhydrique par une quantité chimiquement équivalente d'acide sulfurique.

Les liquides ainsi obtenus ont moins d'activité que le liquide normal, et ils en ont d'autant moins qu'ils contiennent plus d'acide sulfurique.

On les désigne sous le nom de liquides atténués.

Un liquide est dit atténué à 20 % par exemple, quand il renferme les acides sulfurique et chlorhydrique dans les proportions de :

20 équivalents d'acide sulfurique

80 équivalents d'acide chlorhydrique.

20 est le degré d'atténuation.

Quel que soit le degré d'atténuation, un volume donné de liquide renferme toujours la même quantité totale d'énergie. Les liquides atténués donneront donc un courant plus faible mais plus prolongé.

Ce qu'ils font perdre en intensité, ils le font exactement regagner en durée.

Grâce à l'emploi de liquides diversement atténués, une même pile peut être employée aux usages les plus divers, grande intensité et faible durée, ou faible intensité et longue durée.

Influence de la température. — La température a une grande influence sur le débit de la pile, de telle sorte qu'un liquide qui convient pour l'été pourrait être trop faible en hiver et réciproquement.

Pour chaque genre d'application, il y a donc lieu de déterminer le degré d'atténuation du liquide pour l'été et pour l'hiver.

Dosage des liquides. — Méthodes des volumes égaux.

La manière la plus rapide d'obtenir les liquides des piles Renard, consiste à préparer à l'avance

dans des flacons de un litre, trois liquides élémentaires A, B, B_{cl}.

A (liquide rouge).....	Acide chromique... 0 ^h 550	} = 1 litre
Densité 1,300 — degré Baumé 33°	Eau..... 0,770	
B ₁ (liquide incolore.....	Acide sulfurique... 0 ^h 450	} = 1 litre
degré Baumé 29°5	(ordinaire à 66°) Eau..... 0,800	
B _{cl} (incolore).....	Acide chlorhydrique 87°500	} = 1 litre
degré Baumé 17°5	(ordinaire à 20°) Eau..... 125°500	

Le liquide pour pile s'obtiendra toujours en ajoutant un litre de liquide A à un litre de liquide B, ce dernier liquide étant un mélange en proportions variables de B₁ et de B_{cl} suivant le degré d'atténuation qu'on veut obtenir.

Si l'on veut atténuer à 20 % par exemple, un litre de liquide B renfermera 200 cm³ B₁ et 800 cm³ de B_{cl}.

Ce liquide B sera alors désigné par le symbole B₂₀, et le liquide pour pile renfermant un litre de A et un litre de B₂₀ sera désigné par le symbole AB₂₀.

D'après cela B₀ ne renferme pas d'acide sulfurique, AB₀ est le liquide normal non atténué, de même B₁₀₀ ne renferme pas d'acide chlorhydrique,

mum en décharge intermittente avec longs repos.

Ces chiffres sont établis dans l'hypothèse où la décharge se fait pour chaque élément au potentiel normal de 1 v. 25 mesuré aux bornes. C'est dans ces conditions qu'on obtient le meilleur rendement mais on peut aller de 1.10 à 1.40 sans qu'il soit sensiblement altéré.

Le tableau suivant donne la composition et l'usage des liquides à divers degrés d'atténuation.

Débit quintuplé ou sextuplé. — L'énergie du liquide normal est considérable. Si l'on charge deux éléments identiques, l'un avec le liquide ordinaire au bichromate, l'autre avec le liquide chlorochromique normal, l'énergie par seconde est 5 à 6 fois plus grande dans




Fig. 1.

PILES RENARD. — Composition et propriétés des liquides de ces piles

DÉNOMINATION DES LIQUIDES	VOLUME A EMPLOYER POUR DEUX LITRES DE LIQUIDE			DÉBIT APPROXIMATIF EN WATTS PAR DÉCIM. CAR. DE ZINC, A CX TEMPERATURES CI-DESSOUS			A LA TEMPÉRATURE DE +15°		STABILITÉ ET PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES
	A	B ₁	B _{cl}	+5°	+15°	+25°	Densité	Degré Baumé	
	litre	litre	litre						
AB ₀	1,000	0,000	1,000	30	50	50	1,23	27°	Peu stable, dégage au bout de 24 h. une assez forte odeur de chlore. Ne doit être préparé que peu de temps avant de s'en servir.
AB ₁₀	1,000	0,100	0,900	26	35	44	1,23	27	Encore peu stable, peut être préparé 4 ou 5 jours à l'avance surtout en hiver.
AB ₂₀	1,000	0,200	0,800	22	30	37	1,24	28	Déjà plus stable, peut être placé dans la pile 7 à 8 jours à l'avance.
AB ₃₀	1,000	0,300	0,700	19	25	31	1,24	28	Stabilité passable excepté dans les grandes chaleurs. Dans les piles pneumatiques on peut le charger 15 jours à l'avance.
AB ₄₀	1,000	0,400	0,600	15	20	25	1,25	29	Encore plus stable.
AB ₅₀	1,000	0,500	0,500	12	16	20	1,25	29	A peu près inaltérable sauf par les grandes chaleurs.
AB ₆₀	1,000	0,600	0,400	10	14	17	1,26	30	Peut servir à charger les piles un mois à l'avance et même davantage.
AB ₇₀	1,000	0,700	0,300	9	12	15	1,26	30	Stable même en été.
AB ₈₀	1,000	0,800	0,200	7	10	12	1,27	31	Très stable, ne s'altère plus même après plusieurs mois. Dégage cependant à la longue une légère odeur de chlore.
AB ₉₀	1,000	0,900	0,100	6	8	10	1,27	31	Stabilité à peu près absolue.
AB ₁₀₀	1,000	1,000	0,000	4	5	6	1,28	32	Inaltérable, mais à peu près impossible à employer à cause des phénomènes de polarisation qui y préviennent une très grande importance.

N. B. — Au point de vue des phénomènes de polarisation le liquide AB₀ est le seul qui en soit à peu près dépourvu.

Les liquides AB₁₀, AB₂₀ et AB₃₀ en présentent quelques symptômes.

De AB₄₀ à AB₇₀ l'affaiblissement initial du courant est plus marqué. Mais les liquides donnent ensuite un courant bien régulier.

Les liquides AB₈₀, AB₉₀ et AB₁₀₀ donnent lieu à des phénomènes de polarisation d'abord très marqués mais au bout de quelques minutes le courant se relève et redevient bien constant.

Le liquide AB₁₀₀ donne lieu à des courants dont l'intensité varie sans cesse sans pouvoir se fixer. On n'en fait jamais usage.

et AB₁₀₀ serait un liquide assez semblable aux liquides au bichromate. Il n'est d'ailleurs jamais employé dans les piles Renard.

Quel que soit leur degré d'atténuation, ces liquides ont la même capacité par litre.

Cette capacité s'élève à 53 watt-heure utilisables en décharge continue, et à 40 watt-heure au mini-

le second que dans le premier élément. Aussi les effets obtenus sont-ils extraordinaires. On a pu construire une pile ne pesant que 5 kilogrammes et alimentant une lampe à arc de 300 bougies. On a construit des piles pesant 25 k. 00 et développant un cheval électrique. Cette augmentation si considérable de l'énergie par seconde est accompagnée

d'une augmentation notable de l'énergie totale.

A poids égal, le liquide Renard dégage une fois et demie plus d'énergie en tout que le liquide au bichromate.

Amalgamation. — Avec le liquide Renard, l'amalgamation des zincs est inutile; le liquide ne dissolvant pas plus rapidement le zinc ordinaire que le zinc amalgamé. On évite ainsi une opération ennuyeuse et une dépense notable.

Le liquide Renard ne forme jamais de cristaux et le nettoyage de la pile est instantané; lors même qu'elle a été laissée longtemps en repos après épuisement du courant.

II. — MODE D'AGENCEMENT DES ÉLÉMENTS

On a hésité jusqu'à présent à se servir des piles à cause des difficultés de montage, de démontage,

de chargement et d'entretien de ces engins.

Nettoyage des éléments, nettoyage et amalgamation des zincs, nettoyage des vases, enlèvement des cristaux, remplissage des éléments (exigeant des dosages et des manipulations d'acide pénibles et dangereux), etc., telles sont les opérations auxquelles on est condamné et qui sont de nature à faire rejeter l'emploi des piles pour les usages domestiques.

Avec les piles Renard tous ces inconvénients disparaissent. Ses éléments invisibles, dissimulés dans une enveloppe commune, constituent un ensemble compact. Toutes les communications des éléments entre eux sont établies en permanence sur la plaque d'ébonite E dite plaque de jonction. On n'a jamais à faire aucun décapage. Les vases de verre A sont tous scellés dans une même plaque de cuivre F par l'intermédiaire des douilles K.

On remarque sur la figure 2 que le vase A est percé d'un trou O. Ce trou met en communication le vase A avec le collecteur ou récipient général qui reçoit la charge du liquide (fig. 3).

Cette charge est versée dans le collecteur par un orifice supérieur A (fig. 3), quand la charge est complète le liquide ne monte qu'en III (fig. 2 et 3) et ne baigne pas les éléments proprement dits (zinc et platine) qui restent inactifs aussi longtemps qu'on le désire.

Pour mettre la pile en activité, il suffit, après avoir bouché l'orifice, d'insuffler de l'air dans le collecteur au moyen de la poire en caoutchouc P (fig. 3), le liquide monte alors simultanément dans tous les éléments jusqu'en H'H' et il ne reste




Fig. 2. — Élément de pile Renard.

N. B. — Le vase A est un cylindre de verre. L'électrode B est un cylindre d'argent platiné. L'ensemble constitue un élément tubulaire. — A. Vase en verre ou en ébonite contenant le liquide. — B. Electrode + en argent platiné par laminage. — C. Crayon de zinc engagé dans le porte-zinc en laiton D et serré par la vis V. — G. Guide en ébonite servi sur l'électrode en argent platiné et empêchant le zinc de le toucher. — Les lames d'argent platiné ont 8/100 de millimètre d'épaisseur et la couche de platine a 1/500 de millimètre d'épaisseur seulement.

Cette plaque F constitue le couvercle du vase ou collecteur qui dissimule et renferme tous les éléments.




Fig. 3.

plus qu'à fermer le circuit pour faire jaillir le courant.

Pour diminuer l'intensité du courant, on laisse rentrer de l'air en dévissant le bouchon B (fig. 3). Pour l'augmenter on ferme B et on souffle de nouveau par la poire P.




Fig. 4.

Pour remettre les piles au repos, on dévisse le bouchon B jusqu'à ce que le liquide ait repris un niveau inférieur.

La figure 4 représente l'opération du chargement de la pile par l'orifice A.

La figure 5 représente le dispositif employé pour vider le collecteur quand le liquide est épuisé.

Le bouchon étant enlevé on introduit par le trou A un tube en ébonite TT qui plonge jusqu'au fond du collecteur. Ce tube est mis en relation par le tuyau flexible T' avec un tube T'' également en ébonite et plongeant jusqu'au fond du flacon F.




Fig. 5.

Le bouchon B en caoutchouc de ce flacon porte un 2^e tube d'ébonite T³ communiquant avec la poire aspirante Q. En agissant avec cette poire on fait le vide dans F et le liquide du collecteur s'écoule par les tuyaux TT'' dans ce flacon dont la capacité est calculée pour renfermer toute la charge épuisée.

On peut aussi se servir du flacon F pour remplir la pile. Il suffit d'y verser la charge neuve, de retourner la poire Q qui devient alors une pompe soufflante, et d'agir sur cette poire pour refouler le liquide qui se rend de F en A.

Nous pouvons maintenant résumer les opérations à faire pour se servir de la pile Renard.

1^o Charger la pile vide : Dévisser le bouchon A, verser le liquide par l'orifice A, soit au moyen de l'entonnoir soit au moyen du flacon F, placer les crayons de zinc dans les porte-zinc D (fig. 2) et les serrer au moyen des vis V ; serrer le bouchon A. La pile est alors au repos et peut y rester indéfiniment.

2^o Mettre la pile en activité : Souffler de l'air au moyen de la poire P.

3^o Diminuer le courant : Laisser rentrer de l'air par le bouchon B (fig. 3).

4^o Augmenter le courant : Souffler de nouveau avec la poire P.

5^o Ramener la pile en repos : Ouvrir B jusqu'à ce que le liquide cesse de baigner les éléments.

6^o Vider la pile épuisée : Enlever les zincs après avoir dévissé les vis de pression V. Vider le liquide au moyen du flacon F et de la poire aspirante.

Telles sont les opérations simples auxquelles l'usage de la pile donne lieu.

Il est inutile de décaper les contacts, de nettoyer les zincs, de les amalgamer, de laver les éléments, etc. En un mot les manipulations se réduisent au placement des zincs et au versement du liquide dans un seul vase. Nous avons donc bien affaire à un appareil domestique aussi facile à soigner qu'une lampe à huile ordinaire et d'un entretien moins délicat puisqu'il ne renferme aucun mécanisme. De loin en loin un lavage sommaire du collecteur, obtenu en y versant une charge d'eau pure, pourra être utile, mais cette précaution si simple n'est même pas indispensable.

Autres dispositifs.

Le dispositif pneumatique que nous venons de décrire n'est pas le seul qui ait été appliqué aux piles Renard ; on peut aussi, dans certains cas, grouper les éléments sur une même plaque d'ébonite et les faire plonger tous à la fois dans des vases séparés. C'est la pile plongeante en usage dans les laboratoires, mais le dispositif pneumatique est le seul qui convienne aux usages domestiques.

III. APPLICATIONS DIVERSES DE LA PILE RENARD

1^o *Lampe portative domestique.* P. A. — Cette lampe dont la fabrication est installée aujourd'hui, est représentée en élévation dans la figure 1. La lampe est portée par la pile qui comprend sept éléments.

Voici les données principales qui se rapportent à cette lampe :

Poids total (chargement compris).....	16 ^k
Hauteur de la pile.....	0 ^m 38
— totale avec la lampe.....	0.81
Diamètre du corps de la lampe.....	0.20
— du renflement inférieur.....	0.30
Intensité de la lumière en bougies.....	20
Durée normale.....	5 heures
Durée maxima.....	7 à 8 heures
Prix de la bougie, heure.....	0 fr. 015

2^o *Lampe à arc de 300 bougies.* — Spécialement applicable à l'éclairage des grands espaces et aux ateliers de photographie. Cette lampe pèsera environ 70 kilogs, elle pourra fournir cinq à six heures d'une lumière continue et égale à trente ou quarante carrels, au prix de 0 fr. 008 la bougie-heure.

3^o *Petite lampe.* — Pour l'éclairage intérieur des voitures de luxe. Cette lampe donnera de quatre à cinq bougies et pèsera 4 kilogs ; sa durée de marche sera de cinq heures.

La pile accrochée devant la voiture actionne la lampe fixée au plafond du coupé. La poire de caoutchouc à portée de la main du voyageur lui permettra de la mettre en activité.

4^o *Force motrice.* — La pile Renard s'applique à

merveille à la production de la force et en particulier à la locomotion de luxe ou de fantaisie et à la production des petites forces (mise en mouvement de machines à coudre, de scies à découper, etc.)

Le prix du cheval-heure est de 5 francs environ, on en déduit les conséquences suivantes :

1° *Pile pour machine à coudre.* — La force à produire est de 3 kilogrammètres environ, soit $\frac{1}{25}$ de cheval.

Le prix de l'heure serait donc de $\frac{1}{25} \times 5$ francs ou 0 fr. 20. Cette dépense, assez considérable pour une ouvrière, est négligeable pour une personne qui se sert accidentellement de sa machine pour des travaux de fantaisie ou d'agrément. Tout le monde connaît les inconvénients des machines à pédale au point de vue hygiénique. L'application d'une petite pile Renard aux machines à coudre de nos maisons supprime sans grande dépense ces inconvénients.

2° *Propulsion d'un tricycle.* — Si le poids de l'appareil est de 200 kilogs y compris le poids du voyageur et du mécanisme, la résistance en terrain horizontal sera de 5 kilogs environ. Chaque myriamètre parcouru coûtera 50000 kilogrammètres (soit un peu moins de $\frac{1}{5}$ de cheval-heure) et coûtera 1 franc ou 0 fr. 10 par kilomètre.

Cette somme, en réalité, sera moindre, parce que le voyageur ne se servira pas constamment de son moteur électrique.

3° *Navigation électrique.* — D'après des expériences faites sur la Seine au moyen d'une pile Renard de un cheval, un canot, capable de porter quatre personnes, peut acquérir une vitesse de 40 kilomètres à l'heure au prix d'une dépense horaire de 5 francs environ.

Un grand nombre d'amateurs considéreront cette

dépense comme bien faible eu égard aux avantages si grands de ce mode de propulsion, silencieux, docile et propre, qui est véritablement le seul qu'on puisse appliquer aux petites embarcations de plaisance.

Applications diverses.

Enfin la pile Renard a sa place marquée : 1° Dans les laboratoires, où elle remplacera avantageusement la pile Bunsen, si incommode et cependant si répandue encore parce qu'elle est jusqu'ici la seule qui donne un courant énergique et constant. 2° Dans les théâtres, pour les effets de scène où l'on emploie encore exclusivement la pile Bunsen quand on n'a pas d'installation mécanique. 3° Dans les salles de conférence, pour les projections. 4° A bord des navires, pour l'exécution des signaux.

Une foule d'autres applications de cette pile peuvent d'ailleurs surgir d'un moment à l'autre sans qu'il soit possible de les prévoir toutes à l'avance.

Ce qu'on doit prévoir, c'est qu'elle remplacera un jour une partie des sources d'électricité encore employées aujourd'hui dans les lieux où l'on ne dispose pas d'une installation mécanique produisant le courant à bon marché.

Si l'on ajoute à ces applications à poste fixe les appareils de locomotion électrique pour lesquels la pile Renard ne saurait être remplacée par rien, on voit que le champ ouvert à la nouvelle pile est incontestablement des plus vastes, et on peut prévoir qu'elle est appelée, dans un avenir prochain, à prendre une place des plus importantes dans les applications industrielles.

G. Fribourg.

Inspecteur général des Télégraphes.

REVUE ANNUELLE DE CHIRURGIE

Chargé de faire l'exposé des progrès accomplis par la Chirurgie dans le cours de l'année qui vient de s'écouler, nous nous sommes trouvé fort embarrassé. Outre qu'une énumération des diverses opérations pratiquées récemment eût été forcément sèche et aride, nous nous trouvions dans l'impossibilité de dire où était le progrès accompli. La chirurgie n'est pas une science exacte dont les progrès se marquent immédiatement par telle ou telle découverte. De ce qu'une opération nouvelle vient d'être faite, et même faite avec succès, il ne s'ensuit nullement qu'il y ait progrès. Pour que celui-ci puisse être affirmé, il faut la sanction de

l'observation continue des malades, il faut que l'avenir ait démontré que l'opération nouvelle est non seulement bonne dans ses résultats immédiats, mais aussi bonne dans ses conséquences éloignées. Il faut de plus, comme l'a dit récemment le professeur Le Fort, en présence de la furie opératoire de quelques-uns, « que le bénéfice, que le malade doit ou peut en retirer, soit proportionné aux dangers auxquels elle l'expose ». Aussi ne chercherons-nous pas à donner dans cette revue une description de toutes les pratiques nouvelles; nous nous contenterons d'indiquer les tendances générales de la chirurgie actuelle, les voies dans lesquelles elle s'en-

gage, pensant arriver ainsi à une idée plus nette des progrès accomplis qu'en énumérant successivement les diverses opérations récentes, dont beaucoup n'auront pas de lendemain.

I. — CHIRURGIE GÉNÉRALE

La découverte des agents microbiens, celle des divers modes d'anesthésie, l'emploi de la force-pressure au cours des opérations sont les trois grandes découvertes qui ont transformé la chirurgie dans la seconde moitié de ce siècle.

A. — Connaissant les microbes et leur rôle pathogénique, on a entamé la lutte avec eux; on a cherché à les détruire et surtout à les éviter; on a veillé à la propreté des pansements; on a fait de l'*antisepsie* opératoire, préopératoire et post-opératoire.

Connaissant les transports à distance des agents septiques, on ne s'est pas contenté de faire l'antisepsie de la région où l'on opérât, on a cherché aussi à faire celle de tout l'individu, de manière à supprimer non seulement les causes locales, mais aussi les causes éloignées de l'infection. On a pansé avec soin les plaies, écorchures ou pustules que pouvait porter, en divers points du corps, le malade à opérer; on a fait, dans la mesure du possible, l'antisepsie des cavités naturelles, du tube digestif en particulier.

On est arrivé à supprimer ainsi la suppuration. A moins d'opérer dans un milieu septique, pour une lésion de sa nature infectée, à peu près impossible à antiseptiser complètement, on est sûr d'obtenir, après l'intervention, une réunion exacte et complète de toutes les parties cruentées. Un malade a aujourd'hui le droit d'être opéré sans fièvre, sans inflammation, sans suppuration. Le changement dans les suites opératoires a été si absolu, si radical, que l'on serait presque tenté de demander, comme dans certains États américains, que le chirurgien soit responsable en justice des suppurations qu'il provoque par ses interventions.

Dans certaines opérations, les antiseptiques ont cependant certains inconvénients; ils tuent bien les microbes, mais quelquefois aussi ils altèrent les tissus de la région où l'on opère; le fait arrive en particulier dans les opérations abdominales. De là une diminution dans la résistance des tissus, une perte dans leur pouvoir phagocytaire et, comme la suppression absolue de tout agent infectieux est pratiquement à peu près impossible à assurer d'une manière mathématique, le danger de l'emploi des antiseptiques dans certaines circonstances. Ce danger paraît d'autant plus grand que l'on a décrit à la suite de leur emploi des néphrites toxiques. Aussi dans ces derniers temps, quelques chirurgiens ont-ils cherché à obtenir non plus l'an-

tisepsie, mais simplement l'*asepsie*, aussi complète que possible, du foyer.

Déjà mise en pratique depuis des années par les laparotomistes anglais, par Lawson Tait et Bantock en particulier, la recherche de la simple aepsie au cours des opérations tend à être de plus en plus répandue. Un des chefs de la chirurgie française, M. F. Terrier, n'a plus guère recours qu'à elle dans ses opérations abdominales, et ces jours derniers, Bergmann prononçait, au Congrès de Berlin, un panégyrique de la chirurgie aseptique; depuis deux ans, cet opérateur s'en tient à l'asepsie lorsqu'il s'attaque à des foyers primitivement aseptiques. Après avoir bien aseptisé la peau du sujet par un savonnage, un lavage à l'eau stérilisée, un essuyage et une friction avec une serviette aseptique, un lavage à l'alcool, puis enfin au sublimé, le chirurgien, dont les mains sont soigneusement désinfectées au sublimé, recouvre les parties voisines de compresses stérilisées; il ne se sert que d'instruments simplement bouillis et a grand soin de ne suturer la plaie qu'après une hémostase parfaite. Le pansement est fait avec de la ouate stérilisée.

Il y a loin, on le voit, de cette simple propreté aux flots d'acide phénique qui coulaient jadis autrefois. Ces pratiques toutefois ne sont pas de mise lorsqu'on opère dans des foyers infectés; il est alors absolument nécessaire de recourir aux divers agents microbiocides; mais ici encore, l'acide phénique, triomphant il y a quelques années, est aujourd'hui détrôné; et, confiants dans les travaux de laboratoire, les chirurgiens ont accordé au sublimé la faveur dont jouissaient autrefois les solutions phéniquées.

B. — Malgré tout le soin apporté dans l'administration des *anesthésiques*, on observe encore trop fréquemment des accidents à la suite de leur emploi. Aussi, dans l'impossibilité où l'on est de pouvoir s'en passer, cherche-t-on dans des perfectionnements de la technique à en prévenir les dangers. Tandis qu'à Paris on emploie le chloroforme, à Lyon, on se sert plus volontiers de l'éther, à Londres, tantôt de l'un, tantôt de l'autre; la question du plus ou moins d'innocuité de tel ou tel anesthésique reste toujours pendante. Cette année, divers travaux ont été publiés qui, tous, ont pour but de donner un mode d'administration prévenant tout accident, au dire de son auteur.

M. Dastre, se fondant sur ce fait que les accidents de la chloroformisation résultent d'une excitation exagérée du pneumogastrique et de son noyau bulbaire, conclut que le meilleur moyen de les éviter est de supprimer l'excitabilité de ce nerf. De là résulte ce fait que pour remédier aux dangers de la chloroformisation, on a deux moyens ration-

nels : 1° Supprimer l'activité du pneumogastrique, ce que l'on peut faire au moyen d'une dose suffisante d'atropine; 2° Economiser le chloroforme, seule condition capable d'éloigner le dernier et le plus constant accident des anesthésies prolongées, la mort par apnée toxique résultant d'une imprégnation excessive de l'organisme par l'agent anesthésique. Mais l'atropine ne peut être employée seule, elle produit des phénomènes d'excitation excessifs; aussi faut-il l'associer à son antidote la morphine.

Dans la méthode, préconisée par MM. Dastre et Morat, on injecte sous la peau, un quart d'heure avant l'opération, une solution de chlorhydrate de morphine et de sulfate d'atropine; il suffit alors de quelques centimètres cubes de chloroforme pour produire une anesthésie durable. Cette méthode employée au début par quelques chirurgiens lyonnais, par Aubert en particulier, a cette année été expérimentée de divers côtés à Paris. Les résultats obtenus n'ont pas répondu à l'attente générale et, dans une discussion récente de la Société de Chirurgie de Paris, M. Brun seul a dit en avoir retiré des avantages.

Aussi a-t-on en général abandonné ce mode d'emploi du chloroforme. Une pratique préconisée par M. Boncour, élève de M. L. Labbé, et M. Péraire, élève de M. Terrier, tend, au contraire, à se vulgariser: c'est celle qui consiste à donner le chloroforme en petite quantité et d'une façon continue. Cette méthode est très différente de la méthode classique, qui voulait dans l'administration du chloroforme, des intermittences régulièrement calculées, puis sidérait le malade par des quantités considérables d'anesthésique. Elle a l'avantage d'économiser considérablement le chloroforme et de n'en faire absorber que de très faibles quantités au patient. L'avenir dira si ce mode d'emploi présente moins de dangers que les autres. L'important étant de surveiller d'une manière continue le malade, il est à souhaiter que l'on introduise en France les chloroformisateurs de métier au lieu d'employer pour l'anesthésie des chirurgiens plus tentés qu'un spécialiste de jeter de temps à autre un coup d'œil sur l'opération.

L'importance de la pureté du chloroforme et la rapidité avec laquelle il s'altère ont été bien établies par M. Reynier, qui en a conclu à la nécessité de ne jamais employer que du chloroforme rectifié de la veille ou conservé en vases pleins et clos, à l'abri de la lumière.

Une discussion toute récente de l'Académie de Médecine a enfin montré, par l'unanimité des membres de la Société qui ont pris la parole, le danger des réflexes provoqués pendant la première période de la chloroformisation et la néces-

sité qu'il y avait à ne commencer une opération qu'une fois l'anesthésie complète obtenue. C'est, avec l'utilité de la chloroformisation à petites doses, le seul principe utile à retenir des longues discussions suscitées par l'anesthésie, tant à l'Académie de Médecine qu'à la Société de Chirurgie et au Congrès de Physiologie qui s'est tenu à Bâle cette année.

Les dangers inhérents à toute anesthésie générale ont, on le comprend, fait le succès du chlorhydrate de cocaïne comme *anesthésique local*. Malgré quelques critiques, les faits ont démontré entre les mains de chacun que, dans bien des circonstances, cette substance est d'un emploi excellent. Maintenu en application à la surface d'une muqueuse pendant une dizaine de minutes, ou injectée sous la peau, elle détermine une anesthésie parfaite, de durée courte, il est vrai, mais néanmoins suffisante pour permettre bon nombre de ces petites interventions que l'on est souvent amené à faire dans la pratique courante.

C. — La *forcipressure* ou pincement des vaisseaux au cours des opérations, préconisée et vulgarisée depuis de longues années par deux chirurgiens français, Kœberlé et Péan, a depuis longtemps atteint son dernier degré de perfection. Tous les modèles possibles de pincettes ont été successivement inventés et rien de nouveau n'est à signaler à cet égard. Disons toutefois que dans ces derniers temps on a craint moins qu'autrefois de laisser pendant 36 ou 48 heures ces pincettes à demeure dans les tissus et qu'actuellement même après les laparotomies, les chirurgiens n'hésitent plus à laisser des pincettes à demeure dans le ventre par la plaie restée entr'ouverte; pour peu que la ligature du vaisseau pincé paraisse offrir quelque difficulté. C'est là une pratique qui a donné de nombreux succès entre les mains de MM. Péan, Richelot et Terrier.

II. — CHIRURGIE DE L'ABDOMEN

Ce sont surtout les affections abdominales qui ont bénéficié des progrès de la chirurgie moderne.

Le traitement des plaies pénétrantes de l'abdomen, déjà discuté à maintes reprises en France et en Amérique, l'a été de nouveau dans nos sociétés savantes. Depuis 1888, époque où M. Reclus, avec son talent oratoire bien connu, soutenait au Congrès de Chirurgie que la laparotomie, n'ayant encore donné aucun succès en France, « on ne devait y avoir recours que si les signes avant-coureurs de la péritonite apparaissaient », la question a notablement progressé. MM. Vasilin, Bouilly, Jalluier et Ch. Nélaton ont ouvert le ventre de leurs malades et les ont guéris. De nombreuses statistiques nous sont venues d'Amérique; depuis celle de Stimson qui donne une mortalité de

80,64 après la laparotomie, nous avons vu paraître il y a quelques mois celle de Morton qui, réunissant 234 cas de laparotomie pour traumatismes divers de l'abdomen, ne donne qu'une mortalité de 58,97. Aussi les partisans de l'intervention après les traumatismes graves de l'abdomen, MM. Chauvel, Lucas Championnière, Terrier, etc., ont-ils considérablement gagné de terrain. M. Reclus lui-même est beaucoup revenu de son opinion première et cette année il nous déclare admettre la laparotomie non seulement lors de symptômes avant-coureurs de péritonite, mais encore lors d'hémorragies, d'issue immédiate de gaz ou de matières intestinales, lorsque le doigt introduit dans la plaie ramène des matières fécales, lors de tympanisme s'étendant à la région hépatique, lors de traumatisme violent tel qu'un coup de pied de cheval, en somme, toutes les fois qu'il y a des signes permettant de soupçonner l'existence d'une ouverture capable de laisser fuser sinon des matières liquides, tout au moins des gaz contenus dans l'intestin.

Il est probable que le jour où nos services hospitaliers seront mieux installés, où les opérateurs français sauront faire la chirurgie intestinale, ils hésiteront beaucoup moins encore à ouvrir le ventre de leurs blessés ; ils feront d'emblée la laparotomie comme le préconisait, il y a quelques années déjà, Mac Cormac en Angleterre, comme le conseillait ces jours derniers en Amérique A. Schachner de Louisville. C'est là surtout une question de technique, de rapidité opératoire ¹ et pour l'instant nous aimons mieux croire à des progrès dans l'avenir qu'à un piétinement sur place.

Les succès obtenus en chirurgie abdominale ont amené les laparotomistes à ouvrir le ventre, même dans les cas de *péritonite tuberculeuse*. Au Congrès qui vient d'avoir lieu à Berlin, König a pu réunir 131 laparotomies pour tuberculose du péritoine, avec 84 guérisons, soit 63 0/0.

Les *maladies du foie* ont aussi largement bénéficié des modifications apportées à la pratique chirurgicale dans ces dernières années. Les kystes hydatiques et les abcès ont fourni les premiers des succès opératoires. Aujourd'hui c'est aux maladies des voies biliaires que le chirurgien ne craint plus de s'attaquer. La cholécystotomie, déjà pratiquée depuis quelques années par les chirurgiens allemands et anglais, est entrée dans la pratique française. La cholécystectomie a donné des succès entre les mains de MM. Michaux et Terrier. Enfin, dans un

cas d'obstruction des voies biliaires avec distension de la vésicule et accidents généraux graves, ce dernier chirurgien a établi une fistule entre la vésicule et la première portion de l'intestin grêle, rétablissant ainsi le cours normal de la bile.

Un cas de kyste suppuré de la rate a permis à M. Quénu de montrer qu'on pouvait s'attaquer à ces kystes en employant les mêmes procédés que pour les kystes du foie.

M. Terrillon enfin, dans un cas de kystes multiples du foie, a réséqué une portion de ce viscère, en pédiculisant avec un lien élastique les tissus malades et en fixant ensuite le pédicule dans la plaie.

La *chirurgie du pancréas*, étudiée en Amérique par Senn, commence à l'être en France et nous voyons paraître en ce moment un intéressant mémoire de Boeckel de Strasbourg sur cette question.

Les *interventions sur l'estomac* se multiplient et si les opérations de résection pour cancer préconisées par Billroth et Czerny n'entrent guère dans la pratique, de même que la gastro-entérostomie faite cependant par Wolfner, Hacker, Czerny, Pozzi et Roux, les gastrostomies pour ablation de corps étrangers de l'estomac ne se comptent plus. Disons toutefois qu'à propos d'un cas opéré avec succès, M. Terrier s'est fait le défenseur de l'incision médiane qui permet une exploration plus facile que l'incision parallèle aux côtes, généralement pratiquée. La gastrostomie ou bouche stomacale faite pour permettre l'alimentation des malheureux porteurs d'une obstruction de l'œsophage a paru utile entre les mains de MM. Terrier, Terrillon et Tuffier. Le premier de ces chirurgiens recommande de suturer le péritoine stomacal au péritoine pariétal, la muqueuse à la peau et de faire une ouverture aussi petite que possible ; là serait, suivant lui, le succès de l'opération.

III. — CHIRURGIE DU RECTUM

Les lecteurs de la *Revue* connaissent déjà les divers procédés opératoires préconisés contre le *prolapsus du rectum* ¹, nous n'y reviendrons pas ; mais nous dirons un mot du traitement du *cancer du rectum*. Réduits autrefois à ne pouvoir extirper que les cancers de la portion ano-rectale, nous ne pouvions le plus souvent pratiquer que des opérations palliatives, telles que la rectotomie ou l'anus artificiel iliaque. Aujourd'hui, grâce à une voie artificielle créée par l'ablation partielle du sacrum, on va attaquer des cancers haut placés. Suivant l'exemple de Kraske et des chirurgiens

¹ Korte et son assistant sont à Berlin en communication directe, par téléphone, avec leur salle d'opérations ; le service est installé de telle façon que, moins d'une demi-heure après l'entrée du malade à l'hôpital, le chirurgien peut procéder à la laparotomie.

¹ Voir *Revue Générale des Sciences*, n° 1 du 15 janvier 1890, page 25.

allemands, Bardenheuer, König, Czerny, Heinecke, Hochenegg, etc., Routier, Terrier, Quénu, etc. y ont eu recours avec avantage. On peut dire, en présence d'une aussi affreuse maladie, que c'est là une nouvelle conquête de la chirurgie.

IV. — FIXATION D'ORGANES DÉPLACÉS

La sécurité avec laquelle les chirurgiens interviennent aujourd'hui, les a engagés à entreprendre le traitement de déplacements d'organes que l'on se sentait incapables de soigner autrefois.

La fixation du rein mobile ou *néphropexie*, pratiquée déjà depuis nombre d'années, a été suivie, dans ces derniers temps, d'autres opérations de même ordre faites pour maintenir en situation normale des organes déplacés.

L'*hystéropexie abdominale*, introduite en France par M. F. Terrier, a été pratiquée avec succès dans un grand nombre de cas; le mois dernier un élève de ce chirurgien, M. Marcel Baudouin, soutenait une thèse excellente où l'on trouve réunies 235 observations de malades ayant subi cette opération. Elle consiste en une fixation de la face antérieure de l'utérus à la paroi abdominale. Les adhérences qui s'établissent à la suite de cette fixation suffisent à maintenir l'organe dans sa nouvelle situation. L'opération présente deux ordres d'indications : les prolapsus invétérés de la matrice, surtout lorsqu'ils s'accompagnent de lésions des annexes, et les rétrodéviations adhérentes. Dans ces deux circonstances, un insuccès certain suit les diverses autres opérations que l'on peut pratiquer, telles que le raccourcissement des ligaments ronds et la réfection du plancher périméal.

Cette année même d'autres chirurgiens ont tenté d'appliquer au simple déplacement de la vessie, à la cystocèle, une opération de même ordre, la *cystopexie*; de Vlaccas, Tuffier, Dumoret ont fait cette opération qui n'a pas été accueillie avec beaucoup de faveur. Mieux inspiré, un chirurgien américain, Byford, a cherché à soulever et à fixer, non plus le sommet ou les parties latérales de la vessie, mais sa base, autrement dit la cloison vésico-vaginale. Il a élevé et attiré celle-ci vers les anneaux inguinaux qu'il avait préalablement incisés, faisant ainsi ce qu'il a appelé une *colporrhaphie inguinale*.

Dans le même ordre d'idées nous avons vu s'introduire dans la pratique chirurgicale la fixation du testicule arrêté dans sa migration au fond des bourses. Cette *orchidopexie* pratiquée tout d'abord avec trop peu de discernement à ses indications aujourd'hui parfaitement établies. Il ne faut pas y recourir chez le jeune enfant dont le testicule

est susceptible de descendre spontanément par le simple fait du développement. Il est inutile d'y recourir chez l'adulte dont le testicule ectopié a subi une dégénérescence scléreuse qui le rend inapte à tout fonctionnement ultérieur. C'est chez l'adolescent, ou immédiatement avant la puberté, qu'il faut y recourir. Pour qu'elle donne un résultat, pour que le testicule fixé au fond des bourses par quelques points de suture ne remonte pas vers l'anneau en entraînant le scrotum avec lui, il faut, comme l'a bien fait remarquer M. Richelot, avoir grand soin de le libérer complètement de ses adhérences avant de procéder à sa descente.

V. — GYNÉCOLOGIE

Les progrès de la gynécologie ont été immenses dans ces derniers temps. Passé des mains des médecins dans celles des chirurgiens, le traitement des maladies des femmes est devenu beaucoup plus actif et beaucoup plus fécond en résultats.

Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer, à propos des fixations d'organes déplacés, certaines opérations nouvelles, pratiquées contre les déplacements utérins. Il en est d'autres encore que nous devons mentionner. Contre les *rétrodéviations*, Schücking en Allemagne, Nicoletis en France ont imaginé des procédés de redressement à l'aide de sutures vaginales. Schücking, après avoir redressé l'organe, fixe, au moyen d'une suture, le fond de l'utérus à la paroi antéro-latérale du vagin. Nicoletis, après amputation du col utérin, redresse le corps de l'utérus et le fait basculer en avant, en prenant point d'appui sur la paroi vaginale postérieure et en attirant vers elle la partie antérieure du moignon d'amputation utérine.

Les *inflammations péri-utérines* ont fait l'objet de travaux nombreux. Il a été établi que, le plus souvent, elles étaient déterminées par des salpingo-ovarites, et, sous l'impulsion de Lawson Tait, on a procédé à une véritable débauche opératoire. On a enlevé les annexes de toutes les femmes qui souffraient quelque peu dans le ventre. Aujourd'hui on revient de cette furie opératoire et on cherche à réagir contre elle. Malheureusement nous sommes encore bien ignorants à l'égard de ces affections, et de nouveaux travaux sont nécessaires pour permettre d'arriver à des diagnostics précis absolument indispensables pour poser des indications raisonnées de traitement. Dire qu'il faut enlever les trompes et les ovaires suppurés, laisser les simples salpingites catarrhales, est très bien en théorie; mais en pratique, les plus forts s'y trompent, et l'on n'a pas encore de signes sûrs permettant de distinguer dans tous les cas ces divers états.

Les *fibromes* ont été de même l'objet de traitements nombreux. Les travaux de Péan, de Terrillon, de Bouilly ont montré les avantages que l'on pouvait retirer de la voie vaginale pour l'extirpation de ces tumeurs. Malheureusement il n'est pas toujours possible, même après morcellement, d'extraire ces tumeurs par le vagin et l'on est trop souvent obligé d'opérer après laparotomie, ce qui ne laisse pas de présenter des dangers des plus sérieux. Les uns ont fixé le pédicule utérin dans la plaie; les autres l'ont réduit dans le ventre. Cette dernière pratique, vulgarisée dans les années précédentes par les chirurgiens allemands, semble aujourd'hui en voie d'abandon par un certain nombre de ceux qui l'ont préconisée.

Toujours on a eu une mortalité énorme après ces interventions. Aussi comprend-on la vulgarisation du traitement électrique, défendu par M. Apostoli en France, par les Keith en Angleterre, traitement qui malheureusement n'est pas, lui non plus, indemne de tout danger, quoi qu'on en ait dit.

Le *cancer de l'utérus* est, lui aussi, l'objet de discussions nombreuses; ces jours derniers encore le Congrès de Berlin nous montrait que l'immunité n'était encore acquise à aucun mode de traitement. Tandis que les uns veulent qu'on se contente d'une ablation partielle, les autres prétendent qu'il faut enlever la totalité de l'organe pour maintenir plus sûrement la maladie à l'abri de la récurrence. Les statistiques à cet égard disent, comme cela arrive le plus souvent, ce qu'on veut leur faire dire. Il serait, croyons-nous, intéressant de posséder une étude complète d'une série de cas de récidives consécutives à des amputations partielles de l'utérus. Si la récurrence avait lieu dans le moignon, la question serait tranchée: ce serait à l'hystérectomie totale qu'il faudrait avoir recours.

Le traitement des *métrites* s'est lui-même considérablement ressenti des modifications profondes de la pathologie générale. Tandis qu'on ne voyait souvent dans ces affections que le résultat d'une altération constitutionnelle, d'un vice du sang, de la dartre ou de la scrofule, on y reconnaît aujourd'hui la trace d'une infection locale que l'on traite localement. Les cautérisations, si fréquemment pratiquées autrefois, sont aujourd'hui abandonnées, et si quelques gynécologues, MM. Dumontpallier et Polaillon en particulier, ont tenté un dernier effort pour sauver ce mode de traitement, ils n'y sont point parvenus. Dans tous les pays, aujourd'hui, on reconnaît la gravité de ces cautérisations aveugles et l'on s'en tient, soit simplement à un traitement antiseptique local, soit à un curetage de l'utérus, suivi d'un traitement antiseptique bien ordonné.

VI. — APPAREIL URINAIRE

Les maladies de l'appareil urinaire ont été, dans ces dernières années, l'objet de nombreux travaux, et si les tentatives opératoires ont été moins multipliées dans notre pays qu'ailleurs, les résultats pratiques n'en ont peut-être été que meilleurs. Sous l'impulsion du professeur Guyon, on a vu paraître une série de travaux, de Guillet sur les cancers du rein, d'Hallé sur les urétropylélites, de Récamié sur les rapports du rein, de Vignard sur la prostatectomie, de nous-même, sur les névralgies vésicales et sur les inflammations douloureuses de la vessie. Dans ces derniers temps, ce sont surtout les questions bactériologiques qui ont été étudiées à la clinique de Necker. A la suite de la découverte par Clado d'une bactérie septique dans les urines, MM. Albarran et Hallé ont montré le rôle capital de cet organisme dans les inflammations suppuratives de l'appareil urinaire et dans les infections générales qu'elles peuvent engendrer.

En même temps, M. F. Guyon a recherché d'une manière plus parfaite qu'autrefois à assurer l'asepsie dans le cathétérisme en aseptisant les sondes par divers procédés. L'antisepsie de l'appareil urinaire par l'ingestion de substances antiseptiques à l'intérieur, préconisée il y a quelques années par M. Terrier, s'est aujourd'hui vulgarisée. Mais au lieu du bi-borate de soude qu'employait ce chirurgien, on utilise aujourd'hui le salol, dont l'action antiseptique sur l'appareil urinaire serait beaucoup plus grande, d'après les recherches de M. Albarran.

La suture immédiate et totale de la vessie a été pratiquée par divers chirurgiens, entre autres par Pozzi, Schwartz et Tuffier. M. Kirmisson a, dans un même ordre d'idées, conseillé la suture immédiate après l'uréthrotomie externe.

Les perfectionnements apportés dans la fabrication des appareils ont permis de voir le fond de l'urèthre et l'intérieur de la vessie. Grâce aux instruments excellents, mais malheureusement difficiles à bien désinfecter, de Nitze, on arrive à diagnostiquer de petites tumeurs vésicales impossibles à reconnaître autrement. L'endoscopie urétrale bien que moins répandue a cependant fait l'objet d'un important mémoire de Burkhardt de Bâle.

VII. — EXTRÉMITÉ CÉPHALIQUE

Les trépanations pour tumeur cérébrale et aussi pour abcès intracrâniens tendent à se répandre aujourd'hui; cela tient à deux raisons, la première que, grâce à la connaissance des localisations, on arrive à faire le diagnostic du siège des lésions,

la deuxième que, grâce à l'antisepsie on peut sans danger ouvrir la calotte crânienne. Les travaux de Horsley en Angleterre, d'E. Mears en Amérique, de Champouanière et de Péan en France, sont là pour l'établir.

VIII. — MEMBRES

Bien qu'ayant subi des modifications beaucoup moins considérables que celle des viscères, la chirurgie des membres a cependant fait l'objet d'un certain nombre de travaux pendant l'année qui vient de s'écouler. Le traitement des anévrysmes en particulier semble actuellement se modifier. L'extirpation abandonnée autrefois, vient d'être vigoureusement soutenue par M. P. Delbet et son maître Trélat; elle rentre en faveur aujourd'hui.

Le redressement du pied bot, à l'aide de petites interventions, a été obtenu par M. Ch. Nélaton. Nous avons déjà eu l'occasion d'en entretenir les lecteurs de la *Revue* ¹.

Le traitement des fractures de la rotule par la suture osseuse, bien qu'ayant fait l'objet d'un important mémoire de M. Championnière, ne semble pas encore près de se vulgariser parmi nous. Il a cependant été employé dans un cas de fracture itérative par M. Kirmisson et dans une fracture non consolidée par M. Delens.

A propos des luxations anciennes, M. Ch. Nélaton a établi, suivant l'enseignement de son maître Farabeuf, l'utilité qu'il y avait à faire l'arthrotomie du côté opposé au déplacement dans les cas de luxations irréductibles; nous-même dans un travail, fait en collaboration avec M. A. Broca, sous l'inspiration du même maître, avons montré le rôle des décollements périostiques dans certaines luxations récidivantes, et leur importance trop souvent méconnue.

La chirurgie opératoire du pied s'est enrichie d'une nouvelle opération, celle de Vladimiroff-Mikulicz qui, pratiquée par M. Chaput, a été bien étudiée par M. P. Berger. Elle consiste à souder l'avant-pied au bas de la jambe dans des cas de lésions affectant principalement le talon.

IX. — QUESTIONS DIVERSES

Arrivé au terme de cette revue rapide des progrès de la chirurgie dans le courant de l'année qui vient de s'écouler, nous voyons que ce sont surtout les opérations nouvelles qui ont préoccupé les chi-

rurgiens. Les travaux de science pure n'ont toutefois pas été complètement laissés de côté : la présence des psorospermies dans les épithéliomas a été établie par les travaux de Malassez, de Darier, de L. Wickham, d'Albarran; M. F. Vidal a spécifié l'importance du streptocoque dans les diverses variétés de l'infection puerpérale, jusque dans les plus bénignes, celles uniquement caractérisées par l'apparition d'une phlegmatia. MM. Lannelongue et Achard nous ont appris que certaines formes d'ostéomyélite pouvaient reconnaître comme unique cause la présence du *Staphylococcus albus*. M. Lannelongue continuant les études si intéressantes qu'il poursuit depuis une quinzaine d'années sur les maladies de l'enfance, a étudié complètement les kystes dermoïdes de la fente intermaxillaire et de la région sus-hyoidienne; ces jours derniers il nous montrait la possibilité de déterminer, par la craniectomie, des améliorations considérables dans l'état des microcéphales ¹, etc.

La chirurgie expérimentale semble aussi rentrer en faveur; les travaux du professeur Guyon et de son élève Albarran sur la rétention d'urine, de Tuffier sur le rein et la vessie, de Delbet sur le lavage et le drainage du péritoine, de Chaput sur les anus contre nature et les sutures intestinales, de Senn et de Schachner sur la chirurgie de l'intestin sont là pour l'attester.

Mais, en somme, ce sont, comme nous l'avons dit, les questions purement opératoires qui ont surtout préoccupé les chirurgiens. Le fait se comprend, si l'on songe à la révolution complète qui s'est faite en chirurgie depuis dix ans, révolution telle qu'on a pu proposer pour chaque affection un traitement nouveau. Chacun apporte aujourd'hui des matériaux à l'édifice, mais on manque encore de notions suffisantes sur les résultats définitifs. Nous traversons en ce moment une jeune époque chirurgicale; plus tard viendra, avec l'expérience de la chirurgie nouvelle, la raison, qui permettra d'arriver à des conclusions précises et de poser exactement les indications de chacune de ces opérations. Beaucoup de points sont déjà acquis, et, quoi qu'il advienne dans l'avenir, on peut dire, dès aujourd'hui, que l'époque actuelle est certainement, dans l'histoire de la chirurgie, une des plus fécondes en résultats.

D^r Henri Hartmann.

Prosecteur à la Faculté de Paris.

¹ Voir *Revue générale des Sciences*, n° du 15 juin 1890, page 344.

¹ Voyez sur ce sujet l'article du Professeur Lannelongue dans la *Revue générale des Sciences*, du 15 juillet 1890, n° 13, pages 393-395.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^o Sciences mathématiques.

Blutel (E.), Professeur de Mathématiques spéciales au Prytanée militaire. — Recherches sur les surfaces qui sont, en même temps, lieux de coniques et enveloppes de cônes du second degré. *Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris. Gauthier-Villars et fils. Paris le 23 juin 1890.*

Parmi les surfaces, d'ordre supérieur à 2, celles qui sont engendrées par le mouvement d'une conique, constituent une famille remarquable, dont les propriétés sont relativement simples. Il y a, dans cette donnée, d'un ordre très général, le germe éminemment fécond, croyons-nous, d'un vaste sujet de recherches; la thèse fort intéressante que M. Blutel vient de présenter à la Faculté des Sciences de Paris, donnera à tous ceux qui la liront la preuve de l'assertion que nous venons de formuler. Nous allons nous efforcer de la faire connaître ici dans ses lignes principales.

Comme le rappelle l'auteur, avec raison, dans l'introduction de sa thèse, les surfaces qui sont des lieux de coniques ont fait déjà l'objet de recherches nombreuses; parmi les travaux les plus importants qui ont été écrits sur cette matière, on doit citer ceux de MM Steiner¹, Kummer, Clebsch, Darboux², Königs et Demartres³. Les surfaces étudiées par M. Blutel, comme il l'observe (*Thèse*, p. 5), peuvent, indifféremment, être considérées comme étant l'enveloppe de cônes roulant sur deux développables, ou comme engendrées par le mouvement de coniques roulant sur deux courbes fixes. Si l'on ne retient, comme on en a le droit d'après cette propriété, que la seconde génération, on voit qu'au fond M. Blutel a utilisé, mais avec le plus grand succès, l'idée si féconde de Clebsch, celle que M. Königs a mise en pleine lumière dans ses nombreux et remarquables mémoires, et que nous pouvons rappeler en le citant lui-même :

« On sait combien il est avantageux, dit, en effet, M. Königs dans un de ses mémoires (4), pour certaines recherches géométriques, d'adopter comme élément générateur de l'espace, non plus le point, mais une courbe (ou une surface) dépendant d'un certain nombre de paramètres. »

L'élément générateur adopté par M. Blutel est une co-

(1) La célèbre surface de Steiner qui correspond, en coordonnées tétraédrales, à l'équation

$$\sqrt{Ax} + \sqrt{By} + \sqrt{Cz} + \sqrt{Dt} = 0,$$

possède trois droites doubles. En faisant tourner un plan autour de l'une de ces droites, on obtient, abstraction faite de la droite double, une conique. En outre, on sait que tout plan tangent coupe la surface suivant deux coniques; on obtient ainsi une quatrième génération de la surface de Steiner, par le mouvement d'un système de deux coniques.

(2) Voyez : 1^o Sur une classe remarquable de Courbes et de Surfaces algébriques; Gauthier-Villars, 1873. — 2^o Leçons sur la théorie générale des Surfaces; id., 1887; p. 107.

(3) Les surfaces à génératrice circulaire (*Annales de l'École normale*, 3^e série, t. II, p. 123).

Il existe beaucoup d'autres travaux relatifs à ce sujet; toutes les surfaces réglées du troisième ordre rentrent dans la famille étudiée par M. Blutel; ainsi que les surfaces du quatrième ordre possédant une droite double; et beaucoup d'autres, comme celles que M. Blutel a signalées (*Thèse*, p. 25).

Le cas particulier où la conique mobile est une circonférence est remarquable. Cette considération conduit aux fameuses surfaces Cycloïdes.

(4) Sur une classe de formes de différentielles, etc. *Comptes Rendus*, mars 1887, et *Acta mathematica*, octobre 1887.

nique; les équations de cette conique, équations fondamentales du travail de la base duquel nous cherchons à donner ici une idée précise, sont (1) :

$$\frac{x-x_0}{f_1} = \frac{y-y_0}{f_2} = \frac{z-z_0}{f_3} = \frac{t}{f_4} = F.$$

dans lesquelles f_1, f_2, f_3, f_4 représentent des fonctions du second degré d'un paramètre t . On voit facilement que les équations (F) représentent une conique, quand t varie. Si l'on suppose alors que les coefficients des formes f_1, f_2, f_3, f_4 renferment un autre paramètre variable μ , à chaque valeur de μ correspond une conique C_μ , et le lieu décrit par C_μ est une surface unicursale S_λ, μ . Cette surface est ainsi engendrée par le mouvement d'une conique dans l'espace, et l'on peut se proposer d'en faire l'étude, soit en restant dans toute la généralité de la question, soit en se plaçant dans des cas particuliers conduisant à des surfaces remarquables.

Nous ne pouvons entrer ici dans une analyse plus détaillée de la thèse de M. Blutel, et nous devons nous borner à signaler, parmi les points qui ont été de sa part l'objet d'une recherche spéciale, la détermination des directions asymptotiques des surfaces S_λ, μ , et celle des trajectoires orthogonales des coniques génératrices. Toute cette partie est traitée avec beaucoup d'élégance, et nous ne pouvons mieux résumer l'impression faite sur nous, par la lecture de la thèse de M. Blutel, qu'en proclamant, qu'elle fait le plus grand honneur au jeune professeur qui l'a écrite, et qu'elle sera, nous en sommes persuadé, le point de départ d'autres travaux sur le même sujet.

G. DE LONGCHAMPS.

Mouchez, (Contre-Amiral), Directeur de l'Observatoire.

— Rapport annuel sur l'état de l'Observatoire de Paris pour l'année 1889. *Gauthier-Villars et fils, Paris, 1890.*

L'Amiral Mouchez, directeur de l'Observatoire, a présenté son rapport au Conseil, le 4 mars 1890. Le frontispice du Rapport représente le projet d'équatorial coudé (objectif 0.60, distance focale 18 mètres). Cet instrument a été construit par M. Gautier, sur les plans de M. Lowy; il possède plusieurs avantages sur les grands télescopes construits sur un principe différent. Le bâtiment qui lui est destiné sera bientôt terminé. M. Lowy a surveillé les détails de l'installation de ce nouvel instrument, qui remplacera avec avantage l'équatorial de 0,74 d'ouverture qui est maintenant à Meudon, où les conditions atmosphériques sont plus favorables à son grand pouvoir optique que celles que l'on peut trouver à Paris.

Le service méridien de l'Observatoire a été entravé par la continuité du mauvais temps; on a pu faire cependant un grand nombre d'observations de passage. Depuis quelques années, toutes les forces de l'Observatoire ont été consacrées au service méridien, pour achever la réobservation des étoiles du catalogue de Lalande. Ce travail a été commencé il y a 20 ans, et a fait négliger les autres branches de l'Astronomie. Il est maintenant presque terminé, et l'Amiral Mouchez propose au Conseil la création d'un service spécial de Spectroscopie. Quelques-uns des résultats obtenus grâce à cette nouvelle création ont été présentés à l'Académie des Sciences le 7 juillet dernier.

MM. Lowy et Puiseux ont continué leurs recherches sur les constantes de réfraction et d'aberration, et ils

(1) Nous changeons légèrement la notation pour être mieux suivi par le lecteur.

n'ont plus besoin maintenant, pour les compléter, que de déterminer la température de l'air.

MM. Paul et Prosper Henry ont continué leurs travaux sur la photographie stellaire, 38 grands clichés d'étoiles ont été obtenus pendant l'année 1889; il a été fait de plus 5 clichés pour l'étude de la parallaxe de Victoria. MM. Henry ont en outre obtenu par agrandissement direct, quelques belles photographies de la lune de 40 centimètres de diamètre. Ils ont construit des tables pour la détermination de la réfraction photographique.

Il a été fait un grand nombre d'observations de comètes.

M. G. Bigourdan a fait 300 mesures complètes de nébuleuses, et Mlle Klumpke a tiré bon parti du grand équatorial.

A la fin de son rapport, M. Mouchez mentionne l'inauguration de la statue de Leverrier en juin 1889, et soumet au Conseil une proposition tendant à ce que la statue d'Arago qui est encore à l'Exposition soit installée sur la terrasse sud de l'Observatoire. Il propose également qu'il soit percé au sud de l'Observatoire une avenue de 40 m. de largeur pour dégager l'horizon dans le sens du méridien.

Le Rapport contient un grand nombre d'autres détails; il est dans son ensemble très satisfaisant.

Richard A. GREGORY.

2° Sciences physiques.

Joubert (J.). — Traité élémentaire d'Électricité.
1 vol. in-12, G. Masson, Paris, 1890.

Il est toujours fort difficile d'indiquer à un commentateur un livre capable de lui donner avec netteté et précision, les premières notions d'une science telle que l'Électricité. Combien de traités élémentaires, sous le prétexte de rester à la portée de leurs lecteurs, énumèrent une longue suite d'exposés sans démonstration suffisante, de sèches descriptions d'appareils, de procédés industriels à peine indiqués! Quand au contraire l'auteur tient à la rigueur du raisonnement, bien souvent il se laisse entraîner à des méthodes de calcul peu simples, supposant chez le lecteur une forte instruction préalable.

Aussi, malgré le grand nombre des traités d'électricité, la publication du livre de M. Joubert rend-elle un réel service à tous ceux, qui, n'ayant point suivi de cours spéciaux, veulent se mettre au courant des principes de l'électricité, soit dans un simple but de curiosité scientifique, soit avec le désir d'arriver sans perte de temps à une intelligente application de ces principes à la pratique industrielle.

Ce traité, à la portée d'un lecteur dont les connaissances ne dépassent pas celles que l'on acquiert en mathématiques élémentaires, expose l'ensemble des lois et phénomènes électriques et magnétiques, et les principales applications qui s'y rattachent. Écartant toute hypothèse, M. Joubert se borne à exposer les faits, à en suivre l'enchaînement logique, et à rendre un compte exact des phénomènes.

Sans faire une analyse des trente-cinq chapitres de l'ouvrage, nous donnerons seulement une idée de ses grandes divisions : la partie purement théorique, tout à fait au courant des derniers progrès de la Science, traite de l'électrostatique, de l'électrodynamique, du magnétisme, de l'électromagnétisme, de l'induction. Les chapitres suivants, décrivent les principales méthodes de mesures, et les appareils qu'elles emploient; la théorie des unités y est développée avec une remarquable clarté. Enfin, l'auteur aborde l'exposé sommaire des applications : machines, éclairage, galvanoplastie, télégraphie, téléphonie. Un chapitre relatif à l'électricité atmosphérique et divers tableaux de constantes, terminent le Traité.


Après l'étude de cet excellent ouvrage, le lecteur possèdera des notions générales fort étendues. Il se trouvera parfaitement en mesure d'aborder avec fruit,

des traités plus spéciaux, développant à un point de vue pratique, en quelque sorte professionnel, l'une quelconque des nombreuses branches que comporte l'industrie électrique.

F. DE NERVILLE.

Auger (Victor). — Sur les chlorures d'acides bibasiques. — Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris le 1^{er} juillet. Gauthier-Villars et fils, Paris, 1890.

Tous les chimistes connaissent les travaux de MM. Friedel et Crafts, en France, et de M. Baeyer, en Allemagne, relatifs aux composés phthaliques; ils se rappellent surtout l'étonnement que suscita cette conclusion de leurs recherches, que le chlorure de phthalyle, loin de renfermer deux fois le groupe COCl qu'on était accoutumé à voir dans les autres chlorures d'acides, possédait une structure dissymétrique et doit être formulé



Un pareil fait semblait contraire à toutes les règles de la théorie : la vérité est qu'on ne connaissait rien de semblable. C'est à peine si, quelques années plus tard, on osait en rapprocher cette observation de Saytzeff, que le produit qui se forme dans la réduction du chlorure de succinyle, produit qu'il avait considéré d'abord comme l'aldéhyde succinique, est en réalité la lactone

γ oxybutyrique $\text{C}^{\text{H}} \text{H}^{\text{I}} \begin{array}{c} \diagup \text{CH}^{\text{I}} \diagdown \text{O} \\ \quad \quad \quad \diagdown \text{CO} \end{array}$, c'est-à-dire un corps dissymétrique.

Maintenant que nous savons, par expérience, que les molécules dans lesquelles on rencontre deux points singuliers en position relative 1-4, ont tendance à fermer leur chaîne par jonction de ces deux points, ces faits n'ont plus tant lieu de nous surprendre : l'acide succinique, l'acide phthalique qui renferme ses deux carboxyles en ortho, remplissent l'un et l'autre cette condition, et si la chaîne de leurs chlorures doit se fermer, ce ne peut être qu'à la suite d'une migration moléculaire qui nécessairement vient rompre la symétrie du système primitif.

Mais, avant d'avoir reçu la sanction de l'expérience, ce parallèle entre les lactones et les chlorures de phthalyle ou de succinyle n'était qu'une spéculation sans fondement. M. Auger a eu l'heureuse idée d'entreprendre, à ce point de vue, une étude spéciale des chlorures d'acides bibasiques, et de chercher dans quels cas ces composés sont symétriques ou non.

Pour mener à bien ce travail, il fallait une méthode : M. Auger s'est d'abord servi du chlorure d'aluminium qui, ainsi qu'il résulte des belles recherches de MM. Friedel et Crafts, permet d'unir la plupart des chlorures organiques à la benzène ou à ses homologues. Les chlorures d'acides bibasiques devaient ainsi donner des diacétènes renfermant deux fois le groupe benzoyle $\text{C}^{\text{H}} \text{H}^{\text{I}} \text{CO}$ dans le cas où leur structure est symétrique, un oxyacide diphenyle, avec le groupement $\text{C}(\text{OH})(\text{C}^{\text{H}} \text{H}^{\text{I}})_2$, ou la lactone correspondante, si au contraire le chlorure est constitué comme le chlorure de phthalyle.

Remarquant à ce propos, que dans les réactions du chlorure d'aluminium, toujours complexes et parfois violentes, il peut se produire des transpositions moléculaires, l'auteur varie ses procédés, et ne tire une conclusion, qu'après avoir acquis la certitude que les résultats obtenus sont indépendants des circonstances extérieures.

Il utilise ensuite l'action de l'ammoniaque sur les mêmes chlorures d'acides; les composés symétriques formant ainsi des diamides normales, les composés dissymétriques devaient fournir un dérivé à structure de lactone, d'où un autre moyen de distinguer les deux séries d'isomères.

L'action de la benzène sur le chlorure de phthalyle, en présence du chlorure d'aluminium, ayant déjà été

étudiée par MM. Friedel et Crafts, M. Auger applique seulement à ce produit sa deuxième méthode et il arrive à préparer ainsi la phthalamide dissymétrique

$$\begin{array}{c} \text{C}^6\text{H}^1 \diagup \\ \text{CO} \diagdown \end{array} \text{O} \cdot \text{Ce corps, sous l'influence des acides, perd de l'ammoniaque, et donne l'isomère dissymétrique, non encore signalé, de la phthalimide. Tous ces produits repassent d'ailleurs à l'état symétrique, plus stable, quand on les chauffe vers 140°.$$

Ces observations étant d'accord avec les résultats acquis antérieurement, M. Auger, sûr de ses méthodes, leur soumet d'abord le chlorure de succinyle, qui peut

s'écrire $\text{C}^2\text{H}^1(\text{COCl})^2$ ou $\text{C}^2\text{H}^1 \begin{array}{c} \text{CCl}^2 \\ \diagdown \\ \text{CO} \end{array} \text{O}$. Ici les deux

atomes de carbone typiques, occupent respectivement les mêmes situations, que ceux du chlorure de phthalyle, c'est-à-dire la position favorable à la liaison lactonique.

Il n'a pas de peine alors à reconnaître que ce produit est un mélange du corps symétrique (8 à 10 pour cent) avec beaucoup de son isomère; en le traitant par la benzine et le chlorure d'aluminium il obtient à la fois

la lactone γ diphényloxybutyrique $\text{C}^2\text{H}^1 \begin{array}{c} \text{C}(\text{C}^6\text{H}^1)^2 \\ \diagdown \\ \text{CO} \end{array} \text{O}$ et le dibenzoylthane $\text{C}^2\text{H}^1(\text{CO}\cdot\text{C}^6\text{H}^1)^2$ dont il démontre la fonction diacétonique en préparant et analysant son oxime; enfin l'ammoniaque lui fournit de la succinamide ordinaire, ainsi que son isomère dissymétrique non transformable en imide.

Le chlorure de succinyle, conformément aux indications théoriques, se comporte donc, à très peu de chose près, comme le chlorure de phthalyle.

L'auteur examine ensuite le sulfosuccinyle de Weselsky, pour lequel il propose de nouveaux modes de préparation.

L'action de la phénylhydrazine sur ce composé, lui donne de nouveaux corps, qu'il nous est impossible de décrire ici, quoiqu'ils présentent plus d'un point intéressant à l'étude, et que cette partie du travail prête à la critique plus que les autres : ainsi la formule attribuée à l'acide *isothiosuccinophénylhydrazique* n'est peut-être pas suffisamment établie; la dénomination de *succinophénylhydrazide symétrique* appliquée à l'anilide

de la succinimide $\text{C}^2\text{H}^1 \begin{array}{c} \text{CO} \\ \diagdown \\ \text{CO} \end{array} \text{Az} - \text{AzHC}^6\text{H}^6$ rappelle

beaucoup trop la dihydrazide $\text{C}^2\text{H}^1(\text{COAz}^2\text{H}^2\text{C}^6\text{H}^3)^2$, mais ce ne sont là que des objections de détail, et il ressort nettement de cet ensemble de recherches, toutes irréprochables au point de vue de l'expérience, que le sulfosuccinyle est dissymétrique comme le chlorure d'où il dérive, et qu'on doit l'écrire

$\text{C}^2\text{H}^1 \begin{array}{c} \text{CS} \\ \diagdown \\ \text{CO} \end{array} \text{O}$

c'est l'anhydride d'un acide thiosuccinique $\text{C}^2\text{H}^1 \begin{array}{c} \text{CSOH} \\ \diagdown \\ \text{COOH} \end{array}$ dont l'acide *isothiosuccinophénylhydrazique* de M. Auger constitue vraisemblablement la monohydrazide, du côté sulfuré.

M. Auger passe alors aux acides dicarboxylés dans des positions autres que 1 et 4. L'acide oxalique ne lui a rien donné; on pouvait s'y attendre; mais, sous l'action du chlorure de thionyle SOCl_2 , l'acide malonique lui a fourni le chlorure de malonyle qu'on avait cherché vainement jusqu'ici. Ce chlorure donne avec la benzine et le chlorure d'aluminium le dibenzoylméthane $\text{CH}^2(\text{COC}^2\text{H}^2)^2$: il est donc symétrique, ainsi d'ailleurs que le chlorure d'éthylmalonylène qui, dans les mêmes conditions, forme l'éthylidibenzoylméthane.

Enfin il en est de même du chlorure de glutaryle $(\text{CH}^2)^2(\text{COCl})^2$ et du chlorure de sébacyle $(\text{CH}^2)^3(\text{COCl})^2$

qui donnent l'un et l'autre naissance à des diacétone symétriques dans la réaction au chlorure d'aluminium.

La principale conclusion du travail de M. Auger est que les seuls acides pouvant donner des chlorures dissymétriques, sont ceux dans lesquels les groupes carboxyles sont en situation γ , autrement dit dans les positions 1-4. Il y a là un rapprochement manifeste avec la production des lactones et des lactames, dont l'importance n'échappera à personne. Si nous reproduisons seulement cette conclusion, c'est qu'elle nous paraît suffire à caractériser un excellent travail, remarquable par l'exactitude des observations, et où, dans ses grands traits, la théorie suit pas à pas l'expérience, sans jamais s'égarer.

L. MAQUENNE.

3° Sciences naturelles.

Kloos (Dr J. H.). — *Entstehung und Bau der Gebirge erläutert am geologischen Bau des Harzes*. In-8, vii, 92 p. avec 21 fig. dans le texte et 7 planches. Brunswick, G. Westermann, 1890.

On peut dire sans exagération, que l'étude des Alpes a, depuis quinze ans, renouvelé la géologie; les travaux de Suess, Heim et Baltzer, ont en effet considérablement élargi le cercle des idées jusque-là régnantes, en permettant d'éliminer du même coup une foule d'hypothèses qui avaient cours au sujet de la formation des chaînes de montagnes. Le rôle passif des roches éruptives, la distinction des deux régimes orogéniques correspondant aux pays de failles et aux zones plissées, la continuité et l'allure curviligne en plan des plissements, la fréquence des plis couchés, l'importance des phénomènes de dénudation — tels sont, parmi beaucoup d'autres, les principaux faits que ces nouvelles études ont mis en évidence.

M. Kloos s'est proposé de résumer l'ensemble de ces recherches dans un langage accessible à tout esprit cultivé; profitant du voisinage du Hartz, il a pris de nombreux exemples dans ce petit massif, en s'appuyant sur les travaux de Lossen, von Groddeck, Kayser, etc. L'opuscule du professeur de Brunswick, sans rien présenter de bien nouveau, sera lui néanmoins avec intérêt, comme renfermant un bon exposé de l'état actuel de la science sur la matière.

Les figures reproduisent, pour la plupart, des coupes antérieurement publiées par divers auteurs.

Emm. de MARGERIE.

Daguillon (Aug.). — *Recherches morphologiques sur les feuilles des Conifères. Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris, le 19 Mai*. P. Klincksieck, Paris, 1890.

Toutes les feuilles d'une même plante ne se présentent pas toujours avec des caractères identiques. Cette différenciation, parfois provoquée par un changement de milieu (Renoncule d'eau, Mâcre, etc.), peut être simplement liée à l'âge de la tige; c'est ainsi que les feuilles de la base de la tige peuvent présenter une forme différente de celles qui en occupent le milieu (Campanules). Si l'on accorde à la structure des feuilles une certaine valeur taxinomique, il est utile de dire exactement quelles sont les feuilles qu'il s'agit d'étudier. Le travail que M. Daguilleon vient de mener à bien, nous prouve que, c'est surtout vrai, pour les végétaux de la famille des Conifères. L'auteur s'est proposé de suivre pas à pas le développement des feuilles à partir de la germination, et de montrer la différenciation progressive de ces organes. Dans le mémoire qu'il vient de présenter à la Faculté des Sciences, il a limité ses recherches à la tribu des Abietinées.

Chez l'*Abies pectinata* par exemple, il a trouvé à partir de la germination, trois formes de feuilles : 1° Les cotylédons disposés au nombre de 5 à 7 en un verticille; ils ont une section triangulaire, ne portent des stomates qu'à leur face supérieure et ne possèdent qu'un seul faisceau libéro-ligneux. 2° Un deuxième verticille de

feuilles en même nombre que les cotylédons, et alternant avec ces derniers; elles ont une section elliptique, ne possèdent, comme les cotylédons, qu'un seul faisceau libéro-ligneux, mais portent leurs stomates à la face inférieure. 3^e Enfin à partir de la deuxième année, la tige porte des feuilles alternes et non plus verticillées, à section elliptique comme les précédentes, mais un peu plus aplaties; elles possèdent un hypoderme scléreux; enfin elles ont deux faisceaux libéro-ligneux au lieu d'un seul.

Chez le *Pinus pinea*, les cotylédons au nombre de 12 et formant un verticille, ont une section triangulaire, avec un seul faisceau libéro-ligneux, et des stomates seulement sur les deux pans de leur partie supérieure. La pousse qui continue la tige pendant le cours de la première année porte des feuilles éparses à section elliptique, pourvus d'un seul faisceau et possédant des stomates sur leurs deux faces. Enfin, à partir de la deuxième année, à l'aisselle d'écaillies alternes correspondant aux feuilles dont nous venons de parler, naissent de courts rameaux portant deux feuilles à section demi-circulaire, portant des stomates sur tout leur pourtour, mais se distinguant surtout des précédentes, au point de vue de leur structure, par l'existence d'un hypoderme scléreux et la bipartition du faisceau libéro-ligneux.

La même marche d'étude appliquée aux diverses espèces d'*Abies*, *Picea*, *Pinus*, *Larix*, *Cedrus*, etc., a conduit l'auteur à cette conclusion importante, qu'il existe toujours chez les Abiétinées des feuilles primordiales placées entre les cotylédons et les feuilles de la plante adulte. Il s'établit dans la morphologie interne des feuilles, à partir de la germination, une différenciation très nette, qui se manifeste par une modification phyllotaxique, par un changement d'état de la surface épidermique, par l'apparition d'un hypoderme scléreux et enfin par une altération de la nervure médiane.

Le mémoire de M. Daguillon est accompagné de quatre planches consacrées aux détails histologiques; mais, il faut surtout savoir gré à l'auteur de l'heureuse idée qu'il a eue d'intercaler dans le texte un grand nombre de figures schématiques qui le complètent heureusement et qui contribuent à en rendre la lecture facile, agréable et instructive.

Henri LECOMTE.

Moussu, *Chef des travaux anatomiques à l'École vétérinaire d'Alfort*. — De l'innervation des glandes parotides chez les animaux domestiques. *Archives de physiologie normale et pathologique*, Paris, 1890.

Après un historique très clair et concis sur la découverte des nerfs sécrétoires salivaires, M. Moussu expose ses propres recherches, anatomiques et physiologiques, sur les nerfs sécrétoires de la parotide. Chez tous les mammifères domestiques les nerfs excito-sécrétoires parotidiens sont des dépendances apparentes du nerf maxillaire inférieur.

Chez le bœuf, les filets parotidiens constituent un cordon nerveux assez volumineux (de 0^m002 de diamètre environ), qui se détache du buccal sous le muscle maséteur, se rend au bord antérieur de ce muscle, et s'accrole intimement au Canal de Sténon en suivant un trajet récurrent jusqu'à la glande parotide. Chez le cheval, le nerf excito-sécrétoire de la parotide, est constitué par quatre ou cinq filets qui se détachent du trijumeau, vers le ganglion de Gasser, pour se diriger vers le bord antérieur de la parotide, en descendant à la surface de la poche gutturale au milieu du plexus sous-zygomatique. Les nerfs parotidiens du mouton, au nombre de deux, ont un trajet rétrograde : comme ceux du bœuf, ils se détachent du buccal. La parotide du porc, possède deux nerfs excito-sécrétoires différents : l'un est destiné au lobe inférieur, l'autre au lobe supérieur. Par la méthode des sections et des excitations, M. Moussu est arrivé à des résultats nouveaux très intéressants. Il conclut de ses expériences : 1^o que les mouvements de mastication seuls, n'ont aucun rôle sur la parotide; 2^o que la sécré-

tion succède à l'impression de certains nerfs sensitifs, dentaire et buccal; 3^o que les fibres sensitives du lingual, et les fibres sécrétoires de la corde du tympan, semblent former un couple, et que les fibres sensitives des dentaires et du buccal, d'une part, et les parotidiens, d'autre part, semblent former un autre couple; 4^o que les nerfs excito-sécrétoires des parotides, partent de la racine motrice du trijumeau, et non du facial. M. Moussu a constaté un autre fait très curieux, c'est l'impossibilité apparente d'arriver à l'épuisement de la glande par l'irritation des nerfs sécrétoires. Une excitation prolongée pendant quatre heures n'a pas suffi pour amener l'épuisement de la sécrétion chez le bœuf.

M. KAUFMANN.

Boschetti (F). — *Le leggi dell'eriderarula con nuove ipotesi fisio-embriologico. Festa et Tarzo. Turin, 1890.*

L'étude de M. Boschetti comprend deux parties. Dans les premiers chapitres, qui constituent une simple introduction à la partie essentielle et originale de son ouvrage, l'auteur passe en revue les deux grandes thèses qui règnent encore sur l'origine des espèces. Il groupe autour de deux noms les partisans plus ou moins divergents de chacune d'elles, les transformistes ayant pour point de ralliement *Darwin* et *Settegast*, tandis que les non-transformistes sont placés sous le vocable non moins étonnant : *Linnae-Sanson*.

La seconde partie est originale, avons-nous dit, et ce mot peut être pris dans ses deux acceptions françaises. Il nous suffira d'indiquer les propositions soutenues par l'auteur. 1^o Il existe dans les centres nerveux un centre spécial de reproduction — et d'autre part une localisation ovulo-spermatique (localizzazione ovulo-spermatica); c'est-à-dire que chaque partie de l'organisme dépend ontogéniquement soit de la cellule mâle, soit de la cellule femelle procréatrice. 2^o Le centre de reproduction exerce une influence spécifique sur l'endoderme et l'ectoderme, et simplement prépondérante sur le mésoderme. 3^o Le tempérament dépend essentiellement du reproducteur mâle; mais le tempérament tel que le définit M. Boschetti, ne correspond nullement, à ce que l'on entend habituellement par ce mot. C'est ainsi que ce que nous appelons tempéraments sanguin, lymphatique, M. Boschetti le désigne sous le nom de constitutions sanguine, etc. Le tempérament procède uniquement des modifications du système nerveux. Quant aux constitutions, elles dérivent soit de la mère, si elles dépendent du feuillet interne du blastoderme, soit de la mère ou du père quand il s'agit du feuillet moyen. Le sexe relève du centre nerveux reproducteur paternel, bien que l'auteur soit forcé, étant donné certains faits d'observation, établissant l'influence psychique maternelle, d'admettre également le rôle d'un centre nerveux reproducteur de ce côté.

Il nous est impossible de résumer les chapitres dans lesquels l'auteur expose les données sur lesquelles il s'efforce d'établir ses vues assurément nouvelles, mais pour le moins hypothétiques.

L. O.

Yung (Emile). — *Propos scientifiques. Paris, C. Reinwald, Genève, R. Burkhardt, 1890.*

Les questions de zoologie occupent la plus large place dans l'ouvrage de M. Emile Yung. L'auteur s'attache particulièrement aux expériences, qui mettent en évidence l'action des milieux extérieurs et de la lumière sur la vie et le développement des animaux.

L'action de la lumière a été l'objet de recherches spéciales, et à ce propos, ayant exposé les expériences montrant à quelle profondeur pénétrèrent les rayons lumineux, soit dans l'eau de mer, soit dans l'eau douce, M. E. Yung donne un aperçu de la faune profonde des lacs suisses et, d'après M. Forel, une ingénieuse théorie de l'origine de cette faune.

Examinant ensuite, l'influence des milieux physico-chimiques sur le développement des êtres vivants, l'auteur rapporte des expériences personnelles. Elles ont porté sur un même animal, la Grenouille vulgaire (*Rana esculenta*), et ont eu pour but d'examiner l'influence des diverses sortes d'aliments, sur le développement et la production du sexe. Les résultats, très intéressants, conduisent à repousser l'hypothèse de Semper, de l'existence d'une substance inconnue favorisant la croissance des animaux. M. Yung montre que les tétards nourris de viande de bœuf se développent le plus rapidement; une nourriture exclusivement végétale, est en revanche nuisible à la croissance. De plus, une nourriture spéciale favorise le développement de la glande femelle. Ce résultat est remarquable et vient confirmer les expériences du Dr Born de Breslau, s'ajoute aux observations de Siebald, Leuckart, vient à l'appui de la loi de production des sexes, énoncée par le professeur Thury, et montre enfin que dans la nature, où l'alimentation des jeunes n'est pas spécialisée, la production de mâles et de femelles doit se faire également.

A côté de ces questions principales, M. Yung rapporte d'autres résultats, auxquels il a été amené dans le cours de ses expériences: le développement des animaux, est d'autant plus lent, que le nombre d'individus est plus considérable, et que la surface d'aération est plus petite. Enfin, l'eau salée est nuisible à la croissance du tétard de la Grenouille: néanmoins en procédant graduellement, on peut arriver à obtenir des adultes dans des dissolutions de chlorure de sodium à 80‰. A une dose supérieure, le sel marin tue plus ou moins rapidement les animaux.

Le titre de l'ouvrage de M. Yung montre qu'il ne s'agit pas d'un mémoire scientifique. C'est une causerie variée dans laquelle, à côté des faits importants qu'on vient de relater, on trouvera des détails sur l'organisation des Stations maritimes de Banyuls, Roscoff et Naples, sur la pêche et la conservation de la Sardine, et un chapitre qui se rattache plutôt à la Météorologie, sur la présence constante du fer dans les poussières atmosphériques, quel que soit le lieu où elles sont recueillies, — fer, auquel il est impossible d'attribuer une origine terrestre.

II. GUÈRE.

4° Sciences médicales.

Fauvel et Saint-Hilaire. — *Etat du larynx dans la grippe.* Tribune médicale n° 16, Paris 1890.

MM. Fauvel et Saint-Hilaire ont remarqué, lors de la dernière épidémie de grippe, que le larynx avait été rarement et peu gravement atteint, alors qu'on observait de nombreuses inflammations des voies respiratoires supérieures, des bronches et du poumon. Les manifestations laryngées, consistaient en une simple inflammation sous-muqueuse de la région sus-glottique surtout aryénoïdienne, avec gonflement et sécrétion catarrhale plus ou moins abondante; les cordes vocales inférieures étaient presque toujours intactes ainsi que l'épiglotte.

D^r E. DE LAVARENNE.

Cornil (D^r A. V.). Professeur à la Faculté de Médecine de Paris; et **Babès (V.).** Professeur à la Faculté de Médecine de Bucharest. — *Les Bactéries et leur rôle dans l'Étiologie, l'Anatomie, et l'Histologie pathologiques des maladies infectieuses.* 2 vol. in-8° de chacun 600 pages, avec 385 figures en noir et en couleur dans le texte, et 12 planches. 2^e édition, F. Alcan, Paris 1890.

Cette deuxième édition d'un ouvrage qui a déjà obtenu un grand et légitime succès, mérite d'être particulièrement signalée, en raison des importantes additions qu'elle a reçues. Il ne faut pas y chercher l'exposé com-

plet et en quelque sorte philosophique de nos connaissances actuelles en microbie. Conformément au titre du livre, la partie purement spéculative de la science y est peu développée. Quelques chapitres seulement, — les premiers, — sont consacrés aux généralités sur la biologie des Bactéries. C'est à dessein que les auteurs ont peu insisté sur ce sujet, malgré le progrès récent de nos connaissances à cet égard; médecins tous deux, ils ont voulu étudier les Bactéries non en elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais au seul point de vue de leurs relations causales avec les maladies infectieuses. Ce sont donc les rapports des parasites microbiens avec leurs hôtes, — Homme et Animaux domestiques, — qu'ils se sont efforcés de mettre en lumière. Aussi ont-ils fait très large part à l'anatomie pathologique. C'est en cela surtout que leur ouvrage est original. La plupart des traités de bactériologie ne donnent que des indications sommaires sur l'état histologique des tissus envahis par les microbes. Cette étude offre cependant un grand intérêt. Depuis quelques années les recherches de M. Metchnikoff et celles que ses travaux ont suscitées, ont fait faire un grand pas à la question; elles ont vivement attiré l'attention des observateurs sur les réactions cellulaires de l'organisme, à l'égard des agents infectieux. Il est aujourd'hui nécessaire d'en tenir compte dans la discussion de tous les problèmes relatifs à l'établissement de l'immunité totale, partielle ou nulle dans chaque maladie virulente. Sous ce rapport la première édition de MM. Cornil et Babès demandait à être complétée: les auteurs ont tenu à l'enrichir, chapitre par chapitre, des plus récentes acquisitions de la science et à décrire, pour chaque affection, dans la mesure de nos connaissances actuelles, l'état particulier des cellules, fixes ou libres, en lutte avec les microbes.

De nombreuses figures, coloriées avec art, représentent avec une fidélité remarquable des coupes de tissus infectés. La plupart de ces coupes ont été faites par les auteurs eux-mêmes et dessinées sous leur direction, car, — c'est le grand intérêt de leur livre, — ils se sont presque toujours imposé la tâche de vérifier les faits les plus importants avant de les exposer. Cette utile revision, jointe à l'apport déjà considérable de leurs propres investigations, imprime à l'ouvrage de MM. Cornil et Babès le cachet d'une œuvre en quelque sorte personnelle, bien que ce caractère semble au premier abord un peu masqué par la richesse de leur érudition.

La partie expérimentale a été également très soignée, et mise, dans la deuxième édition, au courant des dernières acquisitions de la science. Les beaux travaux de M. le professeur Armand Gautier sur les ptomaines et leucomaines, ont introduit dans la conception de la vie normale et pathologique, des idées nouvelles dont il était utile de montrer l'application à l'étude des maladies infectieuses. La découverte du rôle que peuvent jouer, comme matières virulentes, vaccinales ou diversément modificatrices de l'économie, certaines excréments des microbes pathogènes, réclamait aussi la grande place qui lui a été faite dans la seconde édition. On y trouve en outre de curieuses observations sur l'une des questions les plus neuves de la microbie: celle des associations bactériennes. M. Babès, qui en a fait l'objet de recherches fort ingénieuses à son Institut de Bucharest, a pris soin de les décrire dans un grand nombre de maladies, en particulier dans la tuberculose.

Enfin, indépendamment des idées générales qui se sont fait jour en bactériologie depuis quelque temps, la cause microbienne de plusieurs affections jusqu'alors peu étudiées à ce point de vue a été reconnue ou soupçonnée, MM. Cornil et Babès ont fait profiter de ces recherches leur seconde édition. On peut donc dire qu'elle résume de la façon la plus complète, l'état actuel de nos connaissances en bactériologie médicale.

L. O.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

La Société de Biologie, la Société française de Physique, la Société chimique de Paris, la Société royale de Londres, les Sociétés de Physique et de Chimie de Londres, l'Académie des Sciences et la Société de Physique de Berlin, l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, l'Académie des Sciences de Vienne, l'Académie royale des Lincei sont en vacances.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 28 juillet 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Stephan : Observations, orbite et éphéméride de la comète découverte par M. Coggia à l'observatoire de Marseille, le 18 juillet 1890¹. — MM. Rambaud et Sy : Observations de la nouvelle planète *Charlois*, faites à l'observatoire d'Alger. — MM. Picart et Courty : Observations de la comète Coggia faites à l'observatoire de Bordeaux. — Mlle D. Klumpke : Observations de la comète Coggia faites à l'observatoire de Paris. — M. A. de la Baume Pluvinel expose les conditions dans lesquelles il a observé, à la Canée, l'éclipse annulaire de soleil du 18 juin 1890. — M. F. Caspary : Sur une nouvelle méthode d'exposition de la théorie des fonctions θ éta, et sur un théorème élémentaire relatif aux fonctions hyperelliptiques de première espèce. — Le R. P. Colin, décrit cinq tremblements de terre qui ont eu lieu à Madagascar dans les six premiers mois de l'année, il indique les déviations que les secousses ont fait subir aux instruments astronomiques de l'observatoire de Tananarive.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Marguerite-Delacharlonny a analysé un sulfate d'alumine neutre naturel cristallisé dont la composition vérifie la formule qu'il avait donnée pour ce sel. — M. P. Chabot a étudié le pouvoir rotatoire du camphre en dissolution dans les huiles; le pouvoir rotatoire moléculaire dans ces dissolutions augmente un peu à mesure que la dilution devient plus grande. — M. G. Massol a étudié les chateurs de formation des malonates de lithine. Il a ainsi formé et étudié à ce point de vue le malonate d'argent. — MM. Ph. Barbier et L. Roux ont étudié la dispersion dans les acides gras; les pouvoirs dispersifs croissent avec la complication moléculaire. — Les recherches de M. L. Lindet sur les divers alcools commerciaux lui ont fait reconnaître que le furfural est un produit accidentel, dû à divers procédés de fabrication et non un produit normal de la fermentation. — M. A. Baur : Contributions à l'étude du musc artificiel (trinitroisobutyltoluène).

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Marey a commencé à appliquer sa nouvelle méthode photochronographique (photographies successives sur une bande de pellicule sensible qui se déroule) à l'étude de la locomotion aquatique. Il a photographié les mouvements de l'ombrelle de la Méduse, les ondulations des nageoires de la Raie et du Calmar, le mouvement des bras de la Comatulie, le jet du siphon du Poulpe. — MM. Charrin et Gley ont constaté que les produits solubles du bacille pyocyanique, injectés à des lapins, suppriment ou au moins diminuent chez ces animaux les réflexes vaso-dilatateurs; ces produits ont donc pour effet de mettre obstacle à la diapédèse et à la phagocytose par lesquels l'organisme lutte contre l'invasion des microbes. — M. Chr. Bohr explique par la coexistence dans le sang de plusieurs hémoglobines distinctes les contradictions des auteurs au sujet de cette substance. — M. Paul Pelseneer a retrouvé chez les Pélécy-podes en suivant la série depuis les genres les plus primitifs, la disposition normale du système nerveux des Mollusques. — MM. P. Fischer et Ehlert comparent les

Brachiopodes recueillis par le *Travailleur* et le *Talisman* dans l'Atlantique, avec ceux de la faune Pliocène du sud de l'Italie, et ceux qui vivent actuellement dans les profondeurs de la Méditerranée; cette comparaison établit que les Brachiopodes méditerranéens sont en voie d'extinction, probablement parce que les eaux profondes de la Méditerranée s'échauffent de plus en plus. — M. L. Guignard : sur la localisation des principes qui fournissent les essences sulfurées des Crucifères.

Séance du 4 août 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. E. Cosserat : Observation de la comète Coggia (18 juillet 1890) faites à l'observatoire de Toulouse. — M. Charlois : Éléments et éphémérides de la comète Denning (23 juillet 1890). — M. P. Tacchini : Résumé des observations solaires faites à l'observatoire royal du Collège romain pendant le second trimestre de 1890.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. A. Leduc remarque que les chiffres donnés par Regnault pour la densité de l'azote et celle de l'oxygène sont inconciliables avec la proportion centésimale de ces gaz dans l'air, telle que l'ont établie Dumas et Boussingault. Des raisons théoriques et quelques expériences préliminaires lui font croire que c'est le chiffre de la densité de l'azote qui doit être augmenté, d'un millième environ. — Dans des communications précédentes, M. A. Witz a signalé la variation qui se produit dans la résistance d'un tube de Geissler soumis à l'action d'un champ magnétique. Etudiant le cas où la pression dans le tube varie, il a reconnu que cette action, toutes choses égales d'ailleurs, diminue d'intensité à mesure que la pression croît; considérable dans le vide presque complet, elle est nulle à la pression de trois kilogrammes. — M. A. Colson signale quelques réactions qui ont lieu conformément aux lois de Berthollet, et en opposition avec les lois thermochimiques, c'est-à-dire qu'elles sont endothermiques, que l'on considère les chaleurs de formation des composés, soit dans l'eau, soit en dehors de l'eau; exemple, la piperidine déplace le calcium, et la pyridine, l'aniline, de leur combinaison avec l'acide chlorhydrique. — M. G. Chesneau a étudié la façon dont l'acide sulfhydrique se partage entre les métaux de deux sels dissous, lorsqu'on l'ajoute sans excès; le temps pendant lequel dure le contact influe sur le résultat final. — M. A. Combes a obtenu, à partir de l'acétyle, l'acétone, l'alcool dicétane β .

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Charles Henry a étudié la sensibilité thermique en partant d'une notation spéciale des températures, fondée sur le principe de Carnot et étudiée en 1887 par M. F. Lucas. Il a observé des variations dans la grandeur de la plus petite différence perceptible qui le conduisent à admettre une forme rythmique pour la sensibilité thermique. — MM. Combemale et François ont étudié les troubles nerveux que produit chez le chien l'empoisonnement par le plomb. Diverses causes occasionnelles, de petites doses d'alcool, par exemple, font éclater des accidents graves là où le saturnisme chronique était resté latent. — M. Christian Bohr décrit plusieurs combinaisons de l'hémoglobine avec l'acide carbonique. — Les expériences de M. Louis Blanc montrent, contrairement à l'opinion reçue, que les diverses matières colorantes ajoutées à l'alimentation des vers à soie ne teintent pas la soie; quelques-unes seulement imprègnent la couche extérieure de gris. — En étudiant la

¹ Voir page 528 de la *Revue générale des sciences*.

division cellulaire chez le *Spirogyra orthospira*, au moyen d'une technique nouvelle, M. Degagny a constaté : dans le noyau, l'existence de granulations chromatiques indépendantes du nucléole ; ces granulations gagnent les pôles du fuseau dès le début de la carylolyse et plus tard forment la portion externe de chacun des nouveaux noyaux. — M. A. de l'Écluse indique que, pour protéger la vigne contre le *Black-Rot*, il faut asperger du composé cuprique les deux faces des feuilles. — M. P.-P. Dehérain. Sur l'épuisement des terres par la culture sans engrais. — Étude des eaux de drainage. (Voir à ce sujet la Chronique parue dans le n° 15 de la Revue générale des Sciences du 15 août 1890 page 496).

Séance du 11 août 1890.

SCIENCES PHYSIQUES. — M. de Gerson présente une lampe électrique, dite lampe *Stella*, construite sur les données d'une commission anglaise pour l'éclairage des mines. — M. Berthelot rappelle que la statique chimique est régie par deux principes : celui du travail maximum, qui tient compte seulement des énergies intérieures des systèmes et détermine les réactions exothermiques ; tandis que celui de la dissociation fait intervenir les énergies calorifiques extérieures et détermine les réactions endothermiques. C'est le jeu simultané de ces deux lois différentes qui donne l'interprétation des faits que l'on a voulu opposer à l'une d'entre elles. Considérant en particulier les réactions données par M. Colson comme contradictoire avec les lois thermo-chimiques, M. Berthelot fait voir d'abord, que l'action de la piperidine sur les sels de chaux ne consiste pas en un déplacement de la chaux, mais bien dans la formation d'un précipité complexe, où la piperidine s'unit à la chaux. Quant à l'action de la pyridine sur les sels d'aniline, il n'y a pas la déplacement total, mais un partage de l'acide déterminé par l'état de dissociation des sels des deux bases antagonistes. — MM. Berthelot et Friedel ont examiné la météorite de Magura (comté d'Arva, Hongrie), dans le but de déterminer s'il s'y trouvait du diamant. Après qu'on eût éliminé toutes les autres variétés du carbone qui auraient pu s'y rencontrer, il est resté une très petite quantité d'une substance cristalline, rayant le rubis ; il a été reconnu que cette substance était du quartz. Il n'a pas été trouvé trace de diamant. — M. Villard a obtenu à l'état solide l'hydrate de propane et les hydrates des fluorures de carbone. — M. E. Gérard a trouvé dans l'huile de *Datura* un acide gras, intermédiaire à l'acide stéarique et à l'acide palmitique ; il lui donne le nom d'acide *daturique*.

SCIENCES NATURELLES. — M. Aug. Letellier a cherché à déterminer quel est le produit odorant qui prend naissance en même temps que la pourpre par l'action de la lumière sur la bandelette du *Purpura lapillus* ; cette substance est en trop petite quantité pour qu'on ait pu l'isoler, mais l'auteur a constaté la présence du soufre et diverses réactions propres au sulfure d'allyle. — M. Maupas a cultivé et fait reproduire dans diverses conditions l'*Hydatina senta* (Rotateurs). Il a constaté la réalité de la fécondation, et la coexistence de ce mode de reproduction à côté de la parthénogénèse. — M. C. Sauvageau décrit le pore aquifère qui existe à l'extrémité des feuilles de *Polamogeton*, et ses rapports avec la nervure médiane. — M. Raphaël Dubois montre que le liquide de l'urne des *Nepenthes* ne possède pas par lui-même la propriété de digérer l'albumine, et qu'il doit l'action observée dans divers cas aux micro-organismes qui l'envahissent. — M. M. Brandza a étudié dans quelques plantes hybrides la façon dont les caractères anatomiques des parents se mêlent ou s'excluent chez le descendant.

Séance du 18 août 1890

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A. Quinet : Essai d'une théorie concernant une classe nombreuse d'annuités viagères sur plusieurs têtes et exposition d'une méthode propre à les formuler rapidement.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. H. Poincaré fait remarquer que M. Hertz, en calculant la période de son excitateur primaire, a commis une erreur telle que cette période doit être divisée par $\sqrt{2}$ pour être exacte.

Quant au rapport qui doit exister entre la longueur d'onde observée et la période calculée d'après la théorie de Maxwell, M. Poincaré estime qu'il faudrait faire le calcul d'une façon rigoureuse avant de pouvoir comparer la théorie aux résultats expérimentaux. Il montre comment on peut effectuer ce calcul dans un cas particulier. — M. C. Decharme indique divers procédés par lesquels on peut obtenir l'aimantation transversale d'un barreau ou d'une lame, en opérant par touches avec des aimants. — M. G. Trouvé donne la description d'un appareil d'éclairage électrique destiné à l'exploration des couches de terrain traversées par les sondes. — Il donne également la description d'une lampe électrique portable de sûreté, inventée par lui et déjà employée pour les poudrières, etc. ; il en propose l'emploi pour l'éclairage de mines grisouteuses. — M. Mascart présente en son nom et au nom de M. H. Wild les *Tables météorologiques internationales* qu'ils ont rédigées conformément aux décisions du Congrès météorologique international, pour rendre uniformes dans tous les pays le calcul et la réduction des observations. — M. L. L. Fleury a étudié expérimentalement les sons rendus par des tuyaux coniques non tronqués, c'est-à-dire réduits à un point à leur partie supérieure. Selon lui, un tuyau conique donne la même note qu'un tuyau cylindrique ouvert. Les tuyaux coniques octavaient d'ailleurs beaucoup plus facilement que les tuyaux ouverts. — M. L. Barthe a obtenu l'éther allylcyanosuccinique ; il a aussi obtenu et étudié les cyanosuccinate et cyanotricarballylate de méthyle. — M. C. Viollette décrit un procédé d'analyse des beurres permettant d'évaluer avec précision la quantité des divers acides gras, volatils et fixes ; de la proportion entre ces divers acides, il est facile de conclure la présence ou à l'absence de margarine dans le produit étudié. — Le même auteur propose d'appliquer à cette recherche les procédés optiques. — M. Ferreira da Silva signale une réaction odorante qui permet de caractériser la cocuïne ; traitée par l'acide nitrique fumant, puis par une solution alcoolique concentrée de potasse, cet alcaloïde dégage une odeur particulière, qui le différencie de tous ceux du même groupe.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. A. Trecul décrit la façon dont se forment les premiers vaisseaux dans les fleurs de quelques *Tragopogon* et *Scorzonera*. — MM. J. Grancher et H. Martin ont obtenu sur le lapin la vaccination contre la tuberculose. Ils avaient déjà consigné leurs premiers résultats dans un pli cacheté du 19 novembre 1889. Ils ont obtenu d'abord des cultures de virulences graduellement décroissantes ; puis, ils ont inoculé ces cultures par la voie intraveineuse, dans l'ordre de virulence croissante, jusqu'à celles qui sont sûrement et rapidement mortelles. Les lapins inoculés dans ces conditions, comparativement avec d'autres recevant d'emblée les cultures mortelles, ont présenté constamment une survie considérable ; quelques-uns même vivent encore ; les lapins sont toujours morts rapidement.

L. LAPIQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 12 août 1890

MM. Vibert et Borda, ayant constaté sur des petites filles atteintes de vulvites à la suite d'attouchements, la présence de micro-organismes, ayant tous les caractères des gonocoques, alors que les inculpés n'avaient pas trace d'écoulement urétral, concluent à l'impossibilité de diagnostiquer la nature blennorrhagique des vulvites par les micro-organismes que contient l'écoulement. — M. Paul Gibier relate ses expériences sur l'eau oxygénée, comme antiseptique, desquelles il résulte que lorsqu'elle est bien préparée elle possède une action destructive

des microbes presque instantanée, agissant probablement sous forme d'ozone. — M. Terrillon présente l'observation d'une femme de 53 ans à laquelle il a fait par ligature élastique une résection étendue du foie. Guérison en trente jours. — M. Le Dentu fait une communication sur l'éléphantiasis peri-testiculaire et epididymaire coïncidant ou non avec l'éléphantiasis du scrotum, qu'il a observé plusieurs fois sur des sujets nés dans les pays chauds et auquel il attribue une origine paludéenne.

D^r E. DE LAVARENNE.

ASSOCIATION TECHNIQUE MARITIME

Séance du 26 juin 1890

M. J. A. Normand présente une « note sur les actions réciproques du gouvernail et de l'hélice ». La puissance giratoire du gouvernail est sensiblement diminuée, lorsqu'il se trouve placé en avant de l'hélice. Aussi cette position relative des deux organes d'évolution et de propulsion est-elle généralement considérée comme inadmissible; elle serait pourtant, dans cet inconvénient capital, préférable à la position qui leur est attribuée d'ordinaire. L'auteur établit que la diminution du moment de giration provient de ce que l'hélice, par suite de la déflexion de l'eau due au gouvernail qui la précède, exerce une action latérale en sens inverse de celui-ci. Mais d'autre part, on peut constater expérimentalement au moyen d'une ligne munie de flotteurs qu'on laisse filer le long du safran du gouvernail d'un navire rapide, un torpilleur par exemple, que la déviation des filets liquides ne s'étend qu'à une faible distance, deux mètres au plus, sur l'arrière. Il en résulte qu'on pourra placer le gouvernail devant l'hélice, sans craindre que leurs actions se contrarient, à la seule condition de ménager entre eux un intervalle suffisant. Cette disposition aurait de sérieux avantages sur le système usuel : elle supprimerait en effet les trépidations du massif arrière qui nuisent à la justesse du tir et ébranlent dans les navires à grande marche le rivetage de l'étambot : on regagnerait la vitesse que font perdre les chocs de l'eau projetée par l'hélice, et l'on aurait une meilleure utilisation; l'émergence du gouvernail dans le tangage, qui le rend inutile

et l'expose aux coups de mer, et aux projectiles, ne serait plus à craindre. M. Normand fait une application de cette nouvelle disposition sur un torpilleur actuellement en construction dans ses chantiers. — M. Cuiziner communique les résultats d'expériences qu'il a entreprises sur la résistance de l'acier employé dans les constructions navales. Des essais de traction et des essais de choc exécutés sur l'acier coulé qui a remplacé depuis peu d'années le fer forgé dans la fabrication des étraves, étambots et gouvernails ont donné des résistances moyennes de 52 kg à la rupture, avec 18 % d'allongement : la marine n'exige que 45 kg et 8 %. Il rapporte ensuite des essais de tôles à la flexion, qui ont pour but de rechercher le meilleur écartement à donner aux rivets des joints étanches. Il trouve que cet écartement doit être fonction, non seulement du diamètre des rivets, mais aussi de l'épaisseur des tôles, et propose de substituer à la règle ordinaire des constructeurs la formule $E = \alpha(c + d)$ où E représente l'écartement des rivets, d leur diamètre, c l'épaisseur de la tôle, et α un coefficient qu'on peut prendre égal à 2,5 pour le rivetage simple, et à 3 pour le rivetage double. En troisième lieu, des essais à la traction des tôles percées de trous de rivets permettent de comparer la valeur relative des différents modes de perçage. L'infériorité des tôles poinçonnées, relativement aux tôles forées, ou à celles dont les trous ont été alésés, est d'environ 12 % sur la résistance et 50 % sur l'allongement. Le recuit après poinçonnage rend à la tôle ses qualités et donne les mêmes résultats que l'alésage. Enfin, M. Cuiziner étudie la question du rivetage en acier. Il est prudent de n'employer pour les rivets que des aciers très doux, donnant 25 % d'allongement minimum, avec une résistance comprise entre 40 kg et 43 kg. Il est important en outre de déterminer la pente des fraises d'après la qualité de l'acier; d'une part, en effet, cette pente doit être d'autant plus grande que le métal est plus doux; d'autre part, plus elle est forte, plus est sensible l'écaillage des rivets. En général on exagère cette pente. Des expériences faites par l'auteur, il résulte que la pente de 15° est suffisante pour des aciers rompant sous une charge de 40 kg.

L. VIVET.

COURRIER D'AMSTERDAM

Presque tout le mouvement scientifique des Pays-Bas se produit à l'Académie royale d'Amsterdam. A chacune de ses séances, qui sont mensuelles, cette compagnie accueille les recherches que lui communiquent ses membres et souvent aussi les mémoires des savants nationaux. C'est de quelques-uns de ces travaux que nous entretiendrons aujourd'hui les lecteurs de la Revue.

1. Appelés d'abord leur attention sur les expériences de M. Pechelharz relatives à la destruction des spores du bacille du charbon par le sang du lapin. (1) Cet auteur enveloppait les bacilles dans du papier de pergament et introduisait le tout sous l'épiderme d'un lapin à l'abri des phagocytes ; quelque temps après, non seulement les bacilles, mais même leurs spores étaient morts. Cette observation éclaira la question, restée jusqu'alors assez obscure, du mode de destruction des microbes dans l'organisme. M. Pechelharz poussa plus loin l'analyse du phénomène ; il ensemena bacilles et spores dans un bouillon, dont il remplaça l'air par de l'acide carbonique. Les bacilles moururent, tandis que les spores conservèrent leur vitalité ; elles n'évoluaient pas, mais ce qui prouve qu'elles n'y périssaient pas, c'est qu'à la sortie de ce milieu elles germaient dans les bouillons où l'oxygène avait accès. Au contraire ces

mêmes spores perdaient la faculté de germer ultérieurement lorsqu'on les semait *in-vitro*, dans du sang de lapin insuffisamment oxygéné. Il y a donc dans le sang de cet animal une substance qui, en de certaines circonstances, agit chimiquement sur les spores du charbon pour les tuer. L'activité de cette substance n'offre qu'une durée limitée ; elle s'affaiblit avec le temps. Ainsi s'explique la différence d'action des humeurs sur les spores, suivant qu'elles se trouvent introduites dans la circulation par injection sous-cutanée, ou localisées sous l'épiderme à l'intérieur du sac de pergament. Il était utile d'établir cette distinction qui met bien en lumière l'une des conditions les plus importantes de l'action microbicide des humeurs.

2. M. Forster s'est occupé aussi de cette importante question de la destruction des Bactéries, mais à un autre point de vue. Il s'est efforcé de déterminer l'influence que la fumigation exerce sur leur vitalité et leur virulence. Ses expériences, ayant porté sur des viandes infectées de tuberculose, offrent un intérêt considérable pour la science pure et l'hygiène publique (1). L'auteur avait déjà constaté que la salaison de la viande est impuissante à y détruire le bacille de Koch. Aussi eut-il l'idée de la soumettre à une fumigation continue pendant quelques jours, après l'avoir

¹ Mémoire présenté à l'Académie royale d'Amsterdam, le 29 mars 1890.

¹ Ibidem, 25 avril 1890.

préalablement salée durant dix jours suivant le procédé qu'emploient les bouchers. A première vue la viande ainsi traitée ne différait de la viande saine que par le pointillé qu'y avaient produit les tubercules. On se trompait cependant, si on la considérait comme saine. Introduisez en quelques parcelles dans le sac péritonéaux lapins, ces animaux mourront d'une maladie intestinale, et vous y reconnaîtrez, à l'autopsie, la tuberculose avec ses bacilles caractéristiques. Donc, contrairement à l'opinion accréditée, la fumigation ne stérilise pas la viande. On lui en avait attribué le pouvoir à la suite d'expériences où l'on avait inoculé aux animaux de l'extrait de viande qui avait subi la fumigation; mais précisément ce n'est pas cet extrait qui renferme les bacilles; du moins est-il rare de les y trouver, tandis qu'ils abondent dans les tissus. De là la discordance des résultats obtenus par M. Forster et les expérimentateurs qui s'étaient occupés du même sujet avant lui.

— M. Forster fit une enquête au sujet de la viande provenant d'animaux tuberculeux, abattus alors qu'ils semblaient menacés de consommation; dans 43 0/0 des cas leurs chairs contenaient des bacilles et pouvaient ainsi propager l'infection. Salées ou fumées, ces viandes sont donc extrêmement dangereuses; elles le sont surtout pour les personnes chez qui la digestion est défectueuse, car, plus que toutes autres, ces personnes sont prédisposées à l'infection. Souhaitons avec M. Forster, que les pouvoirs publics prennent définitivement des mesures énergiques pour exclure de la consommation toute viande infectée, destinée soit à la consommation immédiate, soit à la conservation.

3. Dans un tout autre ordre d'idées, M. Max Weber vient de faire une observation fort intéressante: il s'agit de l'hermaphroditisme chez les Oiseaux¹. Un Pinson commun (*Fringilla caelebs*, L.) lui fut envoyé de Marderwyk en mars dernier. Le plumage offrait cette particularité curieuse et saillante d'être divisé en deux parties nettement distinctes: toute la moitié droite du corps de l'oiseau était revêtue du plumage qui, dans cette espèce, caractérise les mâles, tandis que la moitié gauche portait la livrée d'une femelle. La ligne médiane du corps constituait la limite précise et bien tranchée de ces deux plumages. La constatation de ce fait singulier conduisit M. Weber à penser qu'il correspondait peut-être à un cas d'hermaphroditisme interne. Il disséqua l'animal et trouva dans son abdomen

un testicule à droite, un ovaire à gauche. La longueur du testicule était de 0^m0015; l'ovaire mesurait 0^m0035 dans un sens et 0^m002 dans l'autre. Ces glandes et leurs produits étaient-elles normales? M. Weber fit à ce sujet des recherches comparatives. Il trouva que, chez les femelles ordinaires du Pinson commun, l'ovaire mesure 0^m0045 sur 0^m0035; il ne diffère donc que très peu de l'ovaire du sujet hermaphrodite. La structure anatomique est d'ailleurs la même; dans l'un et l'autre l'auteur trouva les follicules au même degré de maturité en rapport avec la saison. L'ovaire du Pinson hermaphrodite devait donc être considéré comme normal. Cette constatation, jointe à l'examen du testicule, établit le caractère absolument hermaphrodite de l'animal. C'est là un fait important, car c'est le premier de ce genre qu'on signale d'une façon précise chez les oiseaux. Jusqu'à présent en effet, on n'avait jamais examiné comparativement les glandes génitales chez les oiseaux à plumages combinés de mâle et de femelle. Cabanis a décrit un Bouvreuil portant à droite la livrée du mâle, à gauche celle de la femelle. En 1887 M. Lorentz fit une observation analogue sur un coq de bruyère du Caucase. Les faits de cette sorte ne sont pas rares dans la littérature ornithologique, mais il semble qu'on s'en soit tenu à l'observation des plumes. On sait que certaines femelles revêtent quelquefois la livrée du mâle. Dans ce cas, qui est assez rare, l'animal devient stérile par suite d'une dégénérescence (*arenoïdia*) de l'ovaire bientôt incapable de produire des œufs. De semblables individus restent toujours des femelles, mais des femelles stériles. D'autre part on a signalé aussi des mâles revêtant une livrée semblable à celle des jeunes femelles. Mais en aucun cas l'hermaphroditisme interne n'avait été reconnu. M. Weber vient de montrer au contraire que la couleur de l'animal, son plumage, sa livrée, sont sous la dépendance des glandes génitales, la couleur définitive se manifestant au moment de la puberté. Sans doute on ne saurait sans témérité tirer d'un fait isolé une conclusion générale. Mais c'est déjà beaucoup de savoir dans quel sens il faut chercher. J'usurai donc, en terminant, de la publicité de cette Revue pour signaler aux naturalistes l'intérêt des investigations poursuivies dans cette direction: l'observation si suggestive de M. Weber témoigne de l'utilité de les entreprendre.

J. BREDÉ DE HAAÏ.

CHRONIQUE

DYNAMOMÈTRE UNIVERSEL A LECTURE DIRECTE DU TRAVAIL

L'appareil que nous décrivons sous ce titre a été imaginé par M. G. Trouvé pour servir à la fois de dynamomètre et de frein d'absorption et de transmission.

Un ressort à lames élastiques plates constitue la partie essentielle et en occupe l'axe; sa torsion, causée par l'effort, est utilisée, pour mesurer cet effort, au moyen de deux plans inclinés dont l'un est fixe; l'autre, mobile, entraîne l'aiguille indicatrice des efforts sur un cadran gradué empiriquement.

Le ressort travaille à la torsion, dans les deux sens, loin de sa limite d'élasticité, et l'absorption se fait, pour les petites forces, au moyen de palettes indéformables, en rotation dans l'air (fig. 1).

Comme la vitesse est le second facteur du travail, le tachymètre de M. Trouvé est en tout semblable, mais en réduction, à son propre dynamomètre.

Lorsqu'il s'agit de mesurer des forces plus considérables, l'absorption se fait par une dynamo (fig. 2).

Mais l'appareil tachymétrique reste toujours le même, qu'il soit placé dans le prolongement de l'axe (fig. 3), ou commandé indirectement par transmission sans glissement (fig. 2).




Fig. 1. — Dynamomètre d'absorption pour les petites forces et divers modèles de compte-tours.

A. Moteur en expérience pouvant développer 30 à 40 kilogrammètres. — B, B. Frein dynamométrique d'absorption à palette carrée ou circulaire, approprié à la mesure des petites forces, depuis celles

¹ Ibidem, 31 mai 1890.

de quelques grammes, jusqu'à celles de 30 à 40 kilogrammes. — C. dynamomètre à indication curviligne de l'effort sur un cadran dont on voit les détails amplifiés au sommet de la figure. — D. compte-tours en S agissant par aspiration sur le manomètre E. — E. manomètre à liquide. — F. compte-tours en S, à section carrée. — G. Compte-tours en S, à section ovoïde. — H. compte-tours à branches droites, avec ajutages mobiles aux extrémités, pour fonctionner dans les deux sens. — I. Autre disposition du dynamomètre pour l'indication rectiligne de l'effort, par le jeu d'un manchon à crémaillère et à pignon. — J. Presse-étoupe pour assurer l'étanchéité entre le tourniquet D et le manomètre E. — K. Détails amplifiés du dynamomètre : 1, manchon universel à la Cardan, s'adaptant sur l'arbre du moteur en expérience; 2, dynamomètre à ressort plat fixé par chacune de ses extrémités à deux tubes concentriques constituant l'axe du système et dont les positions relatives déterminent les différents degrés de torsion du ressort dynamométrique indiqués par une aiguille sur le cadran 3; 3, cadran gradué empiriquement, indiquant les efforts; 4, plans inclinés, transformant le mouvement de torsion du ressort en mouvement longitudinal actionnant soit l'aiguille du cadran 3, soit la crémaillère du mouvement rectiligne de l'index du dynamomètre I; 5, ressort antagoniste léger ramenant la partie mobile du manchon dans sa position normale; 6, gorge profonde sur le manchon mobile dans laquelle s'engage l'arbre coudé de l'aiguille pour l'entraîner dans son mouvement; 7, coupe transversale du ressort dynamométrique, qui peut être composé de plusieurs lames.




Fig. 2. — Dynamomètre d'absorption par machine dynamo-électrique.

A. Cadran indicateur des efforts. — B, B', manchons à plans inclinés; B est fixe sur l'arbre C, B' est mobile dans le sens longitudinal et transforme ainsi le mouvement de torsion du ressort dynamométrique en un mouvement rectiligne qui actionne l'aiguille du cadran A. — C. Arbre du dynamomètre. — D', tourniquet à section, remplacé par l'appareil OLM, ou indicateur des vitesses angulaires, réduction du dynamomètre proprement dit. — E (fig. 2) Machine dynamo d'absorption. — F. Ressort antagoniste ramenant le manchon mobile B' sur le manchon fixe B, de façon que les deux plans inclinés coïncident dans la position normale au repos. — G. Gorge profonde dans laquelle pénètre la petite crémaillère qui entraîne l'aiguille du cadran A. — H, I (fig. 3). Poulies fixe et folle de commande recevant la courroie du moteur. — HII (fig. 2). Colliers à écrous réunissant l'appareil dynamométrique au moteur K et à la dynamo E. — K. Machine motrice à vapeur. — L. Cadran indicateur des vitesses angulaires. — OLM. Appareil indicateur des vitesses, en tout semblable au dynamomètre proprement dit, composé des mêmes organes, mais en réduction. M est un volant à palettes légères indéformables.

La figure 3 montre le dynamomètre disposé en transmission avec le tachymètre à ailettes.

Lorsque l'absorption se fait par des ailettes (fig. 1), pour une même palette, l'effort est fonction de la vitesse, et l'on peut inscrire le travail directement sur le cadran.

Trois courbes d'étalonnage, établies une fois pour toutes, permettent de connaître par une seule observation l'effort, la vitesse et le travail.

Dans les machines marines, le ressort dynamométrique est l'arbre même de la machine qui peut être assimilé à un ensemble de lames juxtaposées; l'hélice du bâtiment sert de frein d'absorption.

Les efforts de torsion sont alors enregistrés comme dans les appareils précédemment décrits et par les mêmes organes : plans inclinés, cadran des efforts et cadran des vitesses.

En résumé, le dynamomètre Trouvé est à lecture directe du travail, et ses indications peuvent être, à chaque instant, établies, lues et interprétées sans le secours d'opérations mathématiques. Ses résultats sont constants et permanents, ce qui permet de les




Fig. 3. — Dynamomètre de transmission.

enregistrer et de comparer le prix de revient au travail produit. Son emploi est universel, puisqu'il convient aux petites forces comme aux grandes, qu'il s'adapte entre la puissance et la résistance, sans qu'on ait à s'occuper ni du sens du mouvement, ni de la position des machines entre elles, et qu'il sert aussi de tachymètre.

L'emploi du ressort plat évite les frottements, les effets de la force centrifuge, les chocs, et l'on peut, grâce à lui, proportionner la puissance de l'appareil au travail à mesurer par le nombre des lames, et cela sans augmenter son volume.

La simplicité de ces dynamomètres de transmission et d'absorption est une des garanties de leur bon fonctionnement, et le frottement tout à fait négligeable des organes de mesure est une des raisons de l'exactitude de leurs indications.

L. O.

NOUVELLES

DEUX NOUVELLES COMÈTES

La première a été découverte par M. Coggia, à Marseille, le 18 juillet dernier, vers dix heures et demie du soir. Elle se trouvait alors entre les Gémeaux et la grande Ourse, elle était assez brillante, mais invisible à l'œil nu, sans queue, avec condensation centrale; son diamètre était de 1',5 à 2'. Comme elle se rapprochait de l'équateur et que d'ailleurs son éclat allait en diminuant, elle est aujourd'hui très difficile à apercevoir parce qu'elle disparaît à l'horizon avant la fin du crépuscule; aussi a-t-elle été peu observée. Les orbites calculées avec les premières observations ont montré

qu'elle a passé au périhélie le 8 juillet, dix jours avant sa découverte. Elle paraît être nouvelle; cependant ses éléments présentent quelque ressemblance avec ceux de la comète qui parut en 1580 et qui fut observé par Tycho-Brahé.

La seconde comète a été découverte par M. Denning, à Bristol, le 23 juillet dans la petite Ourse. Elle était alors, et est encore très faible, mais son éclat va en croissant. Elle passera au périhélie vers le 23 septembre, et paraît également être nouvelle.

G. B.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LAGRANGE ET D'ALEMBERT D'APRÈS LEUR CORRESPONDANCE ¹

Parmi ceux même qui ne tiennent pas à afficher pour le XVIII^e siècle un mépris qui, dit-on, est de mode, mais qui n'est pas toujours désintéressé, je ne trouve pas que, d'habitude, on mette d'Alembert à la place qu'il mérite. Les purs lettrés le regardent sans doute comme trop géomètre; quelques mathématiciens sont disposés à le ranger parmi les philosophes, et ce terme est assurément une injure. Pourtant, comme mathématicien, s'il n'est pas du premier ordre, d'Alembert y touche. A la vérité, il était moins préoccupé des spéculations de la science pure que des problèmes naturels; mais il a abordé ces problèmes avec un esprit vraiment scientifique. Comme homme, il prit la vie au sérieux; cet éloge-là n'est pas banal, et il convient d'ajouter que, dans le siècle où il vivait, la frivolité, qui n'était pas rare, a su quelquefois être charmante. Comme écrivain, il est admirable : dans la correspondance de Voltaire, ses lettres étonnent par le contraste : au lieu des petites phrases courtes, volontiers ironiques, parfois un peu sèches de Voltaire, ce sont de grandes périodes qui, par leur bel et harmonieux arrangement, rappellent le siècle précédent, avec quelque chose de plus voisin de nous, de moins abstrait et de plus coloré : la verdeur des expressions ne l'effraye pas, mais la pensée est toujours sérieuse : les plaisanteries n'y sont pas pour faire rire; les haines qui secouaient

si fort les nerfs de Voltaire, et qui lui arrachaient des cris si aigus, sont chez d'Alembert bien plus profondes et plus intérieures.

Sa correspondance avec Lagrange est tout autre, simple, familière, cordiale malgré le « cher et illustre ami » que se renvoient les deux géomètres; au travers des formules mathématiques dont elle est parfois hérissée, elle permet souvent de pénétrer dans le caractère intime de l'un et de l'autre et force le lecteur à respecter et même à aimer les deux grands hommes.

Combien ils se ressemblaient peu ! Ils n'ont guère qu'un trait commun, la façon simple et modeste dont ils parlent de leurs œuvres, et le peu d'entêtement qu'ils ont à se convaincre mutuellement d'erreur, quand ils se font des objections :

« Je ne me ressouvrens pas plus que vous, écrit d'Alembert, de ce que je vous ai mandé sur les courbes élastiques et des objections que j'avais faites contre votre théorie. J'ai dans mes papiers quelques barbouillages là-dessus; je vous prie seulement de mettre à part la lettre dont le contenu est une espèce d'extrait de ces barbouillages, sur lesquels je reviendrai peut-être dans quelque temps pour voir si j'y retrouverai le sens commun, et, dans cette supposition (très douteuse au moins) je vous demanderai un mot de réponse aux objections de ma lettre. Jusqu'à ce moment, je serais fâché que vous sacrifiassiez à ces misères des moments que vous pouvez mieux employer. »

C'est sur le même ton que lui répond Lagrange. Celui-ci, d'ailleurs, disait que le mérite est en

¹ Correspondance inédite de Lagrange et d'Alembert, publiée d'après les manuscrits autographes et annotée par Ludovic Lalanne : 1 vol. in-4°; Paris, Gauthier-Villars et fils, 1890. (Tome XIII des œuvres complètes de Lagrange.)

raison inverse des prétentions : d'Alembert ne manque pas de faire, de cette formule mathématique, des applications dans les deux sens : les unes, qui s'adressent à Lagrange, sont aussi flatteuses que justes; les autres ne sont pas sans méchanceté.

A l'époque où s'ouvre la correspondance (vers 1760), d'Alembert, en pleine possession de son génie, était déjà illustre. En relation avec la plupart des savants de son temps, s'appliquant à bien juger ceux qui étaient connus et à deviner les autres, il jouissait d'un grand crédit auprès de Frédéric : on le voit s'en servir continuellement, pour rendre service à des hommes du premier mérite, pour leur procurer des moyens de travailler librement et sans soucis matériels, pour relever leur situation morale ou pécuniaire : c'est d'abord Lagrange lui-même auquel il fait donner à l'Académie de Berlin la situation d'Euler, qui veut s'en aller à Pétersbourg. Lagrange végétait à Turin, avec une misérable pension de 250 écus, qui n'avait pas été augmentée depuis dix ans; on l'y « regardait comme une personne entièrement inutile » : d'Alembert lui fait donner 1,500 écus à Berlin, s'ingénie à lui faire obtenir son congé du roi de Sardaigne et à lui procurer les moyens de voyager agréablement d'Italie en Allemagne, en passant par Paris. Lagrange au reste lui conserva une reconnaissance qui se trahit dans presque toutes ses lettres, et souvent d'une façon touchante.

Pendant les vingt-trois ans que dure leur correspondance, on sent grandir l'amitié et la confiance mutuelle des deux géomètres; chacun se réjouit des succès de l'autre; c'est d'Alembert au reste qui a le plus souvent l'occasion de se réjouir; vers cinquante ans le rude travailleur se sentait vieux; et bien souvent il se plaignait de ne pouvoir supporter la tension d'esprit qu'exigent les recherches mathématiques; Lagrange avait une vingtaine d'années de moins que lui, et, dès cette époque, il ajoutait les uns aux autres des mémoires qui devaient faire l'admiration non seulement de d'Alembert, mais de tous les géomètres à venir. Son ami l'excite à concourir pour les prix proposés par l'Académie des Sciences de Paris, l'encourage, le renseigne, lui fait pressentir ses succès, les lui annonce joyeusement, et cherche à lui faire parvenir, par la voie la moins coûteuse, la valeur de ces prix : il le fait enfin nommer Associé étranger de l'Académie et, à ce propos, écrit à Frédéric :

« Permettez-moi de commencer cette lettre par le compliment que je crois devoir à Votre Majesté sur les succès d'un savant que ses bontés ont fait connaître à l'Europe; succès dont la gloire rejaillit sur votre Académie, dans laquelle vous avez bien voulu lui donner une place distinguée : M. de la Grange vient de remporter, pour la qua-

trième ou la cinquième fois, le prix de notre Académie des Sciences, avec les plus grands éloges et les plus mérites, et je crois pouvoir annoncer d'avance à Votre Majesté qu'il sera élu dans quelques jours associé étranger de notre Académie. Ces places sont très honorables, parce qu'elles sont en très petit nombre, fort recherchées, occupées par les savants les plus célèbres de l'Europe, qui ne les ont obtenues que dans leur vieillesse, au lieu que M. de la Grange n'a pas, je crois, trente-cinq ans. Je me félicite tous les jours de plus en plus, Sire, d'avoir procuré à votre Académie un philosophe aussi estimable par ses rares talents, par ses connaissances profondes et par son caractère de sagesse et de désintéressement ».

Frédéric lui répond :

« Vous distribuez des billets de grand homme à ceux qui se distinguent parmi les nations étrangères. Je suis bien aise que notre La Grange soit de ce nombre; je suis trop ignorant en géométrie pour juger de son mérite scientifique, mais je suis assez éclairé pour rendre justice à son caractère plein de douceur et à sa modestie ».

Lagrange, au reste, n'est pas le seul que d'Alembert essaie de servir; on voit ce dernier s'entremettre en faveur de Foncenex, de Lambert, de Beguelin, du jeune Cassini, de Scheele, de Laplace et de bien d'autres : il le fait d'ailleurs avec l'habileté d'un homme qui veut atteindre son but, mais avec une franchise qui n'a rien de timide, et un souci continu de « faire parler la science avec dignité ».

Les lettres qui concernent Laplace méritent d'être citées, quand ce ne serait que pour celui qui en est l'objet.

« J'ai, mon cher et illustre ami, écrit d'Alembert le 1^{er} janvier, 1773, une affaire qui m'intéresse à traiter avec vous. Je vous prie de m'aider, de me diriger, et surtout de me parler avec la vérité que je vous connais.

Il y a ici un jeune homme nommé M. de la Place, professeur de mathématiques à l'Ecole militaire, où je l'ai placé. Ce jeune homme a beaucoup d'ardeur pour la géométrie et je lui crois assez de talent pour s'y distinguer. Il désirerait s'y livrer entièrement, et, comme sa place de professeur lui prend beaucoup de temps, il en voudrait une qui le laissât entièrement libre. Notre Académie ne pourrait le satisfaire à ce sujet, parce que les pensions viennent très tard, quelquefois au bout de vingt-cinq ans, et que d'ailleurs il n'en est pas encore, s'étant vu préférer, très injustement, malgré mon suffrage et celui de presque tous nos géomètres, un sujet très inférieur à lui et qui, étant professeur au Collège royal, se trouvait appuyé d'un grand nombre d'académiciens. Il a pensé qu'il trouverait peut-être à Berlin ce qu'il ne pouvait avoir à Paris, que le roi et l'Académie voudraient peut-être bien le recevoir à votre recommandation et à la mienne : je dis à votre

recommandation, car il m'a montré une lettre de vous par laquelle il me paraît que vous êtes content de quelque chose qu'il vous a envoyé. Je crois qu'on rendrait service aux sciences en mettant ce jeune homme à portée de s'y livrer sans réserve. La question est de savoir : 1^o s'il peut actuellement être placé à l'Académie de Berlin ; 2^o s'il pourrait y jouir dès son entrée, d'un revenu suffisant pour vivre, comme de 3000 ou 4000 livres, argent de France ; 3^o si vous êtes dans une position à vous intéresser pour lui sans vous faire de tracasseries ; 4^o si, dans la supposition où vous ne voudriez pas vous en mêler, je pourrais écrire au roi et lui proposer M. de la Place comme un sujet que je connais, que j'estime, et dont vous pourriez vous-même lui rendre témoignage. Je vous serai très obligé, mon cher ami, de vouloir bien me répondre à ce sujet le plus tôt qu'il vous sera possible. Vous voudrez bien me dire aussi, dans le cas où je pourrais proposer M. de la Place au roi, s'il n'y aurait pas d'indiscrétion à demander pour lui 4000 livres de France, faisant environ 1000 écus d'Allemagne. Réponse, je vous prie, et directement par la poste, car ce jeune homme, pour lequel je m'intéresse fort, désirerait de savoir ce qu'il peut espérer et tenter... »

Voici la réponse de Lagrange (19 janvier) :

« Mon cher et illustre ami, pour répondre à la confiance que vous me témoignez dans votre dernière lettre du premier janvier, je vais vous dire avec toute la sincérité possible ce que je pense sur l'affaire dont il s'agit. Je suis d'abord très convaincu que l'Académie ferait une excellente acquisition dans la personne dont vous me parlez ; cette acquisition serait même d'autant plus importante pour elle, que la classe de mathématiques est très mince, n'étant composée que de MM. de Castillon, Bernoulli et moi ; ainsi vous jugez bien que je serais très charmé et flatté de pouvoir contribuer en quelque manière à rendre ce service à l'Académie et à ma classe en particulier. Mais, 1^o je suis bien éloigné de croire que j'aie auprès du Roi le crédit nécessaire pour faire réussir une pareille affaire, et je craindrais même qu'il ne trouvât mauvais que je prisse la liberté de lui en écrire ; 2^o je doute fort que l'Académie voudrait faire, à ma réquisition, quelque démarche pour cela auprès de Sa Majesté, car je ne pourrais guère compter sur les voix des membres de ma classe, et encore moins sur celles des autres ; d'ailleurs je ne regarde pas sa recommandation comme fort efficace, puisque, une seule fois qu'elle s'est hasardée à proposer au roi quelques sujets pour la classe de philosophie, elle n'a reçu aucune réponse. Tout bien considéré, je crois que le mieux ce sera que vous proposiez vous-même directement et immédiatement à Sa Majesté la personne en question. Si elle est acceptée, l'affaire est faite, et l'Académie recevra ordre de la mettre au nombre de ses membres et de lui assigner la pension sur sa caisse : c'est de quoi j'ai déjà vu plusieurs exemples. Je vous conseillerais même de ne faire aucune mention de moi dans la lettre que vous écririez au roi dans cet objet, et cela pour éviter tout air de

cabale, qui ne pourrait que nuire au succès de l'affaire. Voilà, mon cher ami, mon avis sur la meilleure manière de traiter cette affaire. Quant à la pension, je crois comme vous qu'elle ne doit pas être au-dessous de 1.000 écus, argent de ce pays, et je compte qu'avec cela votre ami pourra vivre ici aussi bien qu'avec 2.000 livres à Paris. Il est vrai que la plupart de mes confrères ont des pensions moindres, mais aussi se plaignent-ils, et je ne voudrais pas qu'il vint ici augmenter le nombre des mécontents. Comme je n'ai aucune part au maniement des affaires économiques de l'Académie, je ne puis pas vous dire au juste combien sa caisse pourrait encore fournir par an, mais je crois bien qu'elle pourra encore supporter une pension de 1.000 écus, et même au delà. Je crois avoir répondu à tous les articles de votre lettre, mais, comme je m'intéresse véritablement pour la personne que vous désirez de servir, tant à cause de son propre mérite que parce qu'elle est de vos amis, je crois devoir encore ajouter deux mots, pour que vous puissiez prévenir cette personne sur quelques points essentiels : 1^o il est très rare que les académiciens reçoivent des augmentations de pension, quelque bien ou mal qu'ils soient, de sorte que, pour que votre ami ne soit jamais dans le cas de regretter d'être venu ici, il faut qu'il puisse se promettre d'avance d'être toujours également content de ce qu'il obtiendra à son arrivée ; 2^o il faut que l'attrait des sciences et l'envie de s'y livrer entièrement soient assez forts en lui pour pouvoir lui tenir lieu des agréments et des avantages qui sont attachés au séjour et à la société de Paris. Toute personne qui peut se suffire à elle-même et qui ne veut se mêler que de ce qui la regarde immédiatement peut être assurée de trouver ici toute la tranquillité nécessaire au bonheur d'un philosophe.

Il faut donc que votre ami se tâte bien là-dessus avant de s'engager à rien ; surtout je ne voudrais pas que le dépit de s'être vu préférer à l'Académie un concurrent inférieur en mérite à lui entrât pour la moindre chose dans la résolution qu'il doit prendre : car, au bout de quelque temps, il commencerait à se repentir du parti qu'il aurait pris, surtout en voyant que ceux qui sont actuellement après lui auraient déjà fait leur chemin, tandis que lui en serait toujours au même point. Car quoique dans votre Académie les pensions viennent assez tard, cependant il paraît que le titre d'académicien est une recommandation suffisante pour obtenir des places et des pensions étrangères ; on en voit un grand nombre d'exemples parmi vos confrères. Il y a encore une autre considération importante à faire sur cette matière : c'est qu'il est bien difficile que quelqu'un s'expatrie sans conserver une espèce d'envie ou de velléité de retourner tôt ou tard dans son pays, et il me semble que les Français, et surtout les Parisiens, sont encore plus dans ce cas que ceux des autres nations. Il s'agit donc d'examiner si votre ami, en quittant la place qu'il a à Paris, pourrait conserver quelque espérance d'en obtenir encore quelque-une lorsqu'il voudrait y retourner.

Je vous prie de vouloir bien lui faire mes compliments et de lui dire combien je serais charmé de l'a-

voir pour mon confrère. Comme la lettre qu'il vient de m'écrire n'exige point une prompte réponse, j'attendrai à la faire que la chose dont il s'agit soit décidée; en attendant, je vous prie toujours de l'assurer de mes très humbles services en tout ce qui pourra dépendre de moi¹ ».

J'ai tenu à donner un long extrait de cette lettre parce qu'il me semble qu'elle permet, au moins en la rapprochant de quelques autres passages de la correspondance, de se représenter Lagrange sous des traits assez précis.

Il était timide; il n'avait ou ne croyait pas avoir d'influence : à coup sûr il n'en désirait pas; il cherchait l'isolement, et de Castillon va jusqu'à l'accuser d'être difficile à vivre; rien au resté ne paraît justifier cette accusation, portée par un homme âgé, malade, et qui peut-être ne l'avait pas vu, sans une secrète aigreur, venir prendre à l'Académie de Berlin la direction de la Classe de Géométrie. Sa timidité était, comme il arrive souvent, doublée de prudence : dans une lettre où il témoigne à d'Alembert, d'une façon très touchante, la joie que lui cause l'espoir qu'il a de le voir bientôt à Berlin, il ajoute :

« Notre Académie aurait doublement à se féliciter de votre venue, et par l'honneur de vous recevoir et par les services que vous pourriez lui rendre, non seulement auprès du Roi, mais aussi de son successeur, qu'on m'a dit ne pas lui céder dans ses sentiments pour vous; j'ignore ce qu'il pense de moi, parce que je n'ai eu que très peu d'occasions de lui parler, et que mon genre de vie retiré et mon caractère éloigné des intrigues m'ont empêché de chercher à m'en procurer davantage. Je ne souhaite rien, sinon qu'il ne me juge pas indigne de la place que j'occupe : ailleurs je ne devrais peut-être avoir aucune inquiétude là-dessus; mais ici il n'en est pas de même. Si vous venez à Berlin, vous serez à portée de connaître ses intentions et de dire quelques mots en ma faveur; si vous ne venez pas et qu'il survienne un changement, à quoi il semble que nous soyons depuis quelque temps exposés tous les hivers, oserais-je vous prier d'avance de me recommander à sa bienveillance en lui écrivant sur son avènement à la couronne? J'ai voulu profiter, pour vous entretenir sur cette matière, de l'occasion de cette lettre, qui doit vous être remise en mains propres... »

Les désirs de Lagrange sont modestes, on en conviendra, mais il faut bien remarquer que sa lettre est de 1776, et que le grand Frédéric ne mourut que dix ans plus tard.

Assurément Lagrange souhaitait fort d'être utile aux gens qui travaillaient; toute sa correspondance en témoigne, mais Laplace n'est pas le seul pour lequel il charge d'Alembert de faire les démarches,

et pour lequel il lui recommande de ne pas y mêler son nom afin d'éviter « tout air de cabale ». On sent qu'il avait peur, même des apparences. A l'envers de son « illustre ami », qui était si terriblement armé pour la lutte, il déteste et fuit la polémique; d'Alembert a beau l'y exciter, il ne se décide pas à « donner sur les doigts » aux gens qui l'attaquent. Fontaine, qui conteste, d'une façon assez impertinente, ses recherches sur les isopérimètres, a jadis parlé de lui avec éloges et « le souvenir de ses anciennes bontés » pour lui l'empêche « de lui vouloir du mal ». Le P. Frizi a bien « une espèce de suffisance qui cadre mal avec la géométrie; mais il faut lui pardonner cela en sa qualité de moine ». Cependant « les assertions du pauvre homme » sont « aussi étranges que la confiance avec laquelle il en parle, mais il est si loin de résoudre la difficulté qu'il ne s'en doute même pas. Il faut dire avec le jésuite Lemoine : c'est ainsi que Dieu, qui est juste, donne aux grenouilles de la satisfaction de leur chant ». Le P. Boscowich qui est, pour d'Alembert « un drôle bien avantageux et bien insolent » s'en tire encore à meilleur marché, et même « il n'est pas indigne d'être » de l'Académie des Sciences, « où tous les membres ne sont pas des d'Alembert ». D'ordinaire Lagrange cherche à adoucir son ami, dont les haines n'étaient pas médiocres, et il est aux nues quand il apprend qu'il y a une espèce de raccommodement entre lui et Lalande, dont le nom, dans les premières lettres de d'Alembert, est invariablement accompagné d'une épithète qui, sans doute, était peu polie, car l'imprimeur l'a remplacée par des points. Il n'y a jamais de ces points-là dans les lettres de Lagrange; on n'y trouvera pas non plus de petites oraisons funèbres comme celles-ci : Deparcieux « était un de ces hommes qu'il est bon d'avoir dans les Académies, afin que les gens en place soient persuadés qu'elles sont bonnes à quelque chose ». Fontaine « était un homme de génie, mais d'ailleurs un fort vilain homme; la société gagne à sa mort encore plus que la géométrie n'y perd. » Je crois bien que les haines et les batailles de son siècle effarouchaient un peu Lagrange : son jugement sur Voltaire, avec qui il a diné, et qui était « ce jour-là, en humeur de rire » est délicieux : « C'est en vérité, dit-il, un original qui mérite d'être vu. »

Il était bien, lui, l'homme qui peut se suffire à lui-même, le philosophe jouissant de la tranquillité, incapable de se mêler de ce qui ne le regarde pas immédiatement. On aime à se le représenter dans son cabinet, loin de la cour, du monde, du bruit, des intrigues et des querelles, travaillant à quelque un de ses admirables mémoires qui remplissent aujourd'hui quinze gros volumes in-4°, et dont il lisait souvent deux par mois, à des gens

¹ On sait que Laplace resta à Paris.

qui ne les comprenaient point; peut-être ne pensait-il pas à cette postérité qui devait placer son nom parmi les plus glorieux; non, au plaisir qu'on éprouve aujourd'hui à le lire, lui, le plus clair des géomètres, lui qui a donné, avec Euler, les premiers et, peut-être, les plus parfaits modèles de l'élégance mathématique, on devine les jouissances qu'il a dû éprouver en produisant des œuvres aussi parfaites. En vérité, il est bien plus pur mathématicien que d'Alembert: Sans doute celui-ci était capable de goûter la beauté d'un théorème et la simplicité d'une démonstration, mais, par les problèmes qu'il se pose, on est porté à croire que ce qui l'intéresse vraiment, c'est de trouver les principes qui permettent d'aborder quelqu'un de ces problèmes, c'est aussi d'en être venu à bout; en lisant les mémoires de Lagrange, on se dit que c'est toute la solution qui devait le passionner, avec ses intermédiaires; avec la beauté de son développement et l'élégance des transformations analytiques d'où elle résulte. Aussi bien, il ne se borne pas aux seules questions de la *philosophie naturelle*; ses mémoires sur la pure algèbre et sur l'arithmétique ne sont pas moins beaux que ceux qui roulent sur l'astronomie ou la mécanique. Il parle timidement à d'Alembert de ses recherches sur la théorie des nombres; il s'excuse presque de ce qu'elles l'empêchent de penser aux perturbations de la lune ou des comètes; il lui conseille de ne pas les lire, mais on sent qu'il aurait pu dire comme Gauss : *illicebis harum questionum ita fui implicatus ut eas deserere non potuerim*.

Et, si les deux amis ne cherchaient pas la même chose dans les mathématiques, on s'expliquera peut-être pourquoi leurs méthodes de travail étaient si différentes: Lagrange s'occupait avec intensité du sujet qu'il traitait, mais pendant un temps limité et après avoir refait au besoin, et plusieurs fois, son mémoire, il ne voulait plus, dès qu'il en était « passablement content, » y repenser; « à force de remanier la même matière, j'en prends, dit-il, un si furieux dégoût, qu'il m'est comme impossible d'y revenir encore. » Et d'Alembert lui répond¹:

« Vous êtes étonné que j'aie la patience de revenir si souvent aux mêmes objets. Ce n'est que par ce moyen que j'ai pu faire en ma vie quelque chose de passable, car il n'est pas trop dans la nature de mon esprit de m'occuper de la même chose fort longtemps de suite: je la laisse bientôt, mais je la reprends ensuite autant de fois qu'il me vient en fantaisie, sans me rebuter, et d'ordinaire cette opiniâtreté *éparpillée* me réussit, lorsque souvent je n'aurais rien gagné par une opiniâtreté trop longtemps continue. »

A ce « furieux dégoût » de Lagrange pour ce

qu'il a fait ou laissé de côté, ne sent-on pas que c'est la production même qui le passionne?

Cette passion-là lui suffisait: si l'on en voulait une preuve, on la trouverait dans la plaisante histoire de son mariage. Il faut bien la citer, cette histoire, quoiqu'elle soit vraisemblablement destinée à grossir le tas d'anecdotes qui servent à prouver que les savants sont un peu ridicules. Voici d'abord un fragment de lettre d'Alembert²:

« Mon cher et illustre ami, on m'écrit de Berlin que vous avez fait ce qu'entre nous autres philosophes, nous appelons le *saut périlleux* et que vous avez épousé une de vos parentes que vous avez fait venir d'Italie; recevez en mon compliment, car je compte qu'un grand mathématicien doit avant toutes choses savoir calculer son bonheur et qu'après avoir fait ce calcul vous avez trouvé le mariage pour solution.... »

Lagrange lui répond³:

« Mon cher et illustre ami, j'ai reçu vos lettres et vos compliments; je vous en remercie de tout mon cœur. Je ne sais si j'ai bien ou mal calculé; ou plutôt je crois n'avoir point calculé du tout, car j'aurais peut-être fait comme Leibnitz, qui, à force de réfléchir, ne put jamais se déterminer. Quoiqu'il en soit, je vous avouerai que je n'ai jamais eu de goût pour le mariage, et que je ne m'y serais jamais engagé, si les circonstances ne m'y avaient en quelque façon obligé. Etant dans un pays étranger, sans amis et sans liaisons, avec une santé assez délicate, j'ai cru devoir engager une de mes parentes, que je connaissais depuis longtemps, et avec qui j'avais déjà vécu quelques années dans la maison de mon père, à venir partager mon sort et avoir soin tant de moi que de tout ce qui me regarde. Voilà l'histoire exacte de mon mariage. Si je ne vous en ai point fait part, c'est qu'il m'a paru que la chose était si indifférente d'elle-même, qu'elle ne valait point la peine de vous en entretenir. »

Ce n'est pas sur ce ton que d'Alembert parle de Mlle de Lespinasse⁴: « Je passe mes tristes journées auprès d'une ancienne amie malade, languissante et dans le plus grand danger, qui a besoin de consolation, de société et de secours, et qu'il m'est impossible d'abandonner. Plaignez-moi et prenez part à ma peine, car elle est grande, et l'espérance d'en sortir est bien faible. » Et un peu plus tard⁵: « Je ne suis pas en état de vous parler plus longtemps. La perte que j'ai faite a anéanti toutes les facultés de mon âme et ne me laisse la force de m'occuper de rien... »

Mais, en vérité, il est injuste d'opposer ainsi la façon assez singulière dont Lagrange confirme à son ami la nouvelle de son mariage aux plaintes

¹ 21 septembre 1767.

² 20 novembre 1767.

³ 27 avril 1776.

⁴ 16 août 1776.

⁵ 7 août 1769.

passionnées qu'arrache à d'Alembert la maladie et la mort de Mlle de Lespinasse. Celle-ci, si nous en jugeons par les lettres que nous avons d'elle, était une personne extraordinairement exaltée, et elle paraît avoir eu tout ce qu'il faut pour faire souffrir ceux qui l'ont aimée. Sans doute, Mme Lagrange ne lui ressemblait pas, et l'on peut croire *qu'en soignant son mari et tout ce qui le regardait*, en assurant autour de lui ce calme dont il était si jaloux, elle parvint à se l'attacher; sa mort semble aussi avoir causé à Lagrange une peine profonde; la lettre où il annonce son deuil à d'Alembert ne nous a pas été conservée, mais il nous reste la réponse bien touchante que celui-ci, à demi mourant, lui envoya à cette occasion : elle clôt dououreusement le volume ¹ :

« Mon cher et illustre ami, je suis si faible, que je n'ai pas la force d'écrire et à peine de dicter quelques mots. Je prends la part la plus tendre à votre malheur et ce que vous me dites là-dessus m'a pénétré jusqu'au fond de l'âme. J'ai reçu votre beau mémoire, qu'à peine j'ai pu parcourir, dans le triste état où je suis. Au nom de Dieu, ne renoncez pas au travail, la plus forte pour vous de toutes les distractions. Adieu, peut-être pour la dernière fois; conservez-vous quelque souvenir de l'homme du monde qui vous chérit et vous honore le plus.....

Tous D'ALEMBERT ».

Je n'ai pas parlé de ce que contient cette correspondance au point de vue purement mathématique : tout d'abord on y trouvera, pour l'histoire de la science, d'utiles renseignements sur l'ordre dans lequel ont été faites les recherches que Lagrange a publiées entre 1760 et 1783; on peut aussi noter les préoccupations des deux géomètres touchant certains points qui n'ont été entièrement éclairés qu'après eux, la légitimité de l'emploi des séries, convergentes ou non, le rôle des solutions singulières des équations différentielles, la représentation analytique d'une fonction entièrement arbitraire. Le reste s'analyserait difficilement. D'ailleurs, il n'y a qu'un assez petit nombre de lettres qui se rapportent essentiellement aux mathématiques, et elles sont presque toutes au commencement de la correspondance; dès le début, d'Alembert se plaint de fatigues de la tête et des yeux, qui l'empêchent de travailler avec continuité; au moins il peut encore lire les travaux qui se font autour de lui.

« Je suis, dit-il, comme les vieux gourmands, qui, ne pouvant plus digérer, ont encore du plaisir à voir manger les autres. »

Puis sa santé s'altère plus gravement :

« ...J'ai déjà bien des matériaux; mais je ne me met-

traî pas sitôt à ce travail, ayant résolu, pour reposer ma tête, de m'abstenir au moins pendant une année de tout travail mathématique; j'y supplée par quelques occupations littéraires, et principalement par l'histoire de l'Académie française, dont je fais la continuation et que j'ai fort avancée cet hiver. Ce travail, sans m'intéresser à beaucoup près autant que la géométrie, met au moins dans ma vie un remplissage qui me la fait supporter.... »

Cette plainte, et cette façon méprisante de parler d'occupations qui ne sont qu'un « pis aller » reviennent continuellement et assombrissent ses lettres.

Pour ne pas finir sur cette impression pénible, voici le récit d'une de ces plaisanteries féroces où d'Alembert aimait à sortir de la tristesse qui l'envahissait; le grand Frédéric était homme à savourer ces plaisanteries, et, de celle-là il prit sa bonne part.

La classe de philosophie spéculative, à l'Académie de Berlin, avait proposé en 1777 un sujet de prix qui était vraiment de la *chresme philosophale*. Il ne s'agissait pas de savoir, à la vérité, *utrum chimæra, bombymans in vacuo, posset comedere secundas intentiones*; non, il suffisait de répondre, comme il faut, à la question suivante :

« Quelle est la nature distincte de cette force primitive et substantielle qui, lorsqu'elle est déterminée, produit l'effet, ou, en d'autres termes, quel est le *fundamentum virium*?

Or, pour concevoir comment cette force peut être déterminée, il faut ou prouver qu'une substance agit sur l'autre ou démontrer que les forces primitives se déterminent elles-mêmes.

Dans le premier cas, on demande en outre : quelle est la nature distincte de la puissance passive primitive? Comment une substance peut agir sur l'autre? Et enfin comment celle-ci peut pâtir de la première?

Dans le second cas, il faudra expliquer distinctement..... »

Je laisse ce qu'il faudra expliquer distinctement, de peur que le lecteur n'éprouve quelque peine à comprendre. En lisant ce programme, à l'Académie française, Condorcet ne put retenir un fou rire. D'Alembert écrivit à Frédéric pour lui proposer un autre sujet, qu'on va lire : le roi de Prusse n'hésita pas, et par son ordre, la malheureuse Classe de philosophie spéculative dut mettre au concours la question de savoir *s'il est utile de tromper le peuple*.

D'Alembert assure Frédéric que Lagrange avait été entièrement étranger à la rédaction du premier sujet; on peut l'en croire, puisque son ami *ne se mêlait que de ce qu'il regardait immédiatement*; on peut être sûr aussi qu'il n'aurait pas inventé le second.

Jules Tannery,

Directeur des Études scientifiques
à l'École Normale Supérieure.

LES FEUILLES ET LES LOIS DE LEURS FORMES

Ces années dernières j'ai consacré quelques-uns de mes loisirs à l'étude des feuilles. Je me bornerai dans cet article à indiquer d'une façon très sommaire les principaux résultats auxquels je suis arrivé.

Les formes des feuilles sont infiniment-variées. Voici en quelle langue pittoresque en parle Ruskin : « Elles prennent les formes les plus étranges, comme si elles voulaient nous inviter à les regarder. Il y en a en forme d'étoiles, en forme de cœur, en forme de lances, en forme de flèches; il y en a de ciselées, de frangées, de fendues, de sillonnées, de dentelées, de sinuées; elles sont disposées en couronnes, en touffes, en spires, en guirlandes; indéfiniment expressives, décevantes, fantastiques, changeant sans cesse du bas de la tige au bouton elles semblent toujours solliciter notre attention et prendre plaisir à dépasser sans cesse notre étonnement. » Maintenant pourquoi cette merveilleuse variété, ce trésor inépuisable de formes gracieuses? Résulte-t-elle de quelque tendance innée à chaque espèce? A-t-elle pour but de charmer l'œil de l'homme, ou bien la forme de la feuille et sa taille et sa texture ont-elles quelque rapport avec la structure et l'organisation, les habitudes et les besoins de la plante tout entière?

I

Position de la feuille. — Il est impossible de classer les plantes d'après les formes de la feuille. Dans bien des cas des espèces très voisines ont des feuilles très différentes; ainsi il y a plusieurs genres où certaines espèces ont des feuilles dressées et certaines autres des feuilles étalées. Le *Plantago major* et le *Drosera rotundifolia* par exemple ont des feuilles larges et étalées tandis que le *Plantago lanceolata* et le *Drosera longifolia* ont des feuilles étroites et dressées. La largeur ou l'étroitesse des feuilles dépend de conditions variées. Dans les plantes herbacées et sans tige les feuilles étalées ont une tendance à être larges, les feuilles dressées à être étroites. C'est ainsi que les *Gramens* ont des feuilles longues et étroites. Dans d'autres cas la largeur est déterminée par la distance entre les bourgeons et dans d'autres encore par le nombre des feuilles d'un cycle.

Feuilles cerclees ou lobées. — Il y a deux types distincts de feuilles larges : les feuilles ovales et les feuilles palmées. Les monocotylédones telles que les graminées, les glaïeuls, les lys, les jacinthes ont

généralement des feuilles étroites et dressées; quand elles sont plus larges, comme par exemple dans la bryone noire, c'est surtout à la base; et en conséquence les nervures se séparent à la base pour se réunir de nouveau à l'extrémité de la feuille; aussi sommes-nous tentés de regarder cette disposition comme le type primitif d'une feuille large. Il y en a cependant un totalement différent : la feuille est palmée comme une main et s'élargit vers l'extrémité libre : ici les nervures ont une direction rectiligne et divergent les unes des autres; elles ne servent pas seulement à fortifier la feuille, mais à lui porter des aliments, ce qui est sans aucun doute un avantage. Une autre raison peut-être de cet arrangement, c'est que les feuilles sont généralement repliées comme un éventail quand elles sont dans le bourgeon.

Évaporation par les feuilles. — Si nous cueillons quelques feuilles, si nous ne mettons point la tige dans l'eau, elles se fanent bientôt en raison de l'évaporation qui se produit à leur surface. Lorsque la feuille est attachée à la plante, cette perte d'eau est constamment compensée par la nouvelle quantité d'eau qu'apporte la sève; mais il existe cependant un grand nombre de dispositions destinées à empêcher l'évaporation d'être trop rapide. C'est, naturellement, dans les contrées chaudes et sèches que les feuilles ont surtout besoin d'une telle protection. La surface des feuilles est, en certains cas, protégée par une sorte de vernis, en d'autres cas, par des excréments salines ou calcaires; dans d'autres encore, le même but est atteint grâce à la viscosité de la sève. Chez certaines plantes, les feuilles ont une position verticale et présentent ainsi une surface plus petite aux rayons du soleil. Des poils laineux servent aussi souvent à protéger la feuille : les plantes des steppes sont fréquemment couvertes d'un feutrage épais de poils; quelques espèces, qui sont glabres dans le nord, tendent à devenir velues dans le sud. Les espèces qui poussent au printemps tendent à être glabres, tandis que celles d'été et d'automne sont plus poilues. Les usages des poils des plantes sont très variés : ils servent, comme nous déjà dit, à empêcher l'évaporation trop rapide; ils constituent une protection pour les stomates; et la conséquence, c'est que comme les stomates se trouvent surtout à la face inférieure des feuilles, lorsqu'une des faces de la feuille est couverte d'un feutrage de poils blancs, comme cela arrive dans le peuplier blanc par exemple, c'est toujours la face inférieure. Dans

d'autres cas, les poils sont destinés à protéger la feuille contre l'eau; ce rôle est important dans certaines plantes alpines et certaines plantes de marais. Si les stomates sont obstrués par l'humidité, par le brouillard, par exemple, ou par la rosée, ils deviennent incapables d'accomplir leurs fonctions : les poils les préservent de l'humidité et les tiennent au sec. Les poils constituent donc une protection contre la trop grande sécheresse et contre la trop grande humidité. Une autre fonction des poils qu'il ne faut point oublier, est de défendre la feuille contre la trop brillante lumière et la trop grande chaleur. Les poils servent aussi de protection contre les insectes et même contre les animaux de plus grande taille. Les piquants de l'ortie peuvent servir d'exemple, et les poils rudes et laineux déplaisent souvent aux animaux herbivores.

Les feuilles caduques caractérisent spécialement l'atmosphère comparativement froide et humide des régions tempérées. Pour des raisons différentes, les feuilles persistantes sont plus nombreuses dans les régions alpestres et sous les Tropiques. Dans les régions alpestres, il est nécessaire que les plantes ne laissent rien perdre du court été : aussi les espèces vivaces et à feuilles persistantes sont-elles proportionnellement plus nombreuses que sous nos climats. Les feuilles coriaces comme celles du chêne vert et de l'olivier sont plus capables de résister à la chaleur et à la sécheresse des pays du Midi que les feuilles comparativement tendres de nos arbres à feuilles caduques qui perdraient trop rapidement leur humidité.

La texture et la structure des feuilles est une question fort intéressante et très vaste, mais dans cet article, je dois me borner à parler de leur forme.

J'ai parlé ailleurs du hêtre, et peut-être dois-je revenir brièvement sur ce sujet. Le poids des feuilles qu'une branche peut porter dépend naturellement de sa position et de sa force. Le mode de croissance du hêtre et celui du charme sont très semblables, mais les branches du charme sont plus minces, et, par suite, les feuilles plus petites. Si nous coupons une branche de hêtre au-dessous de la sixième feuille, nous constaterons que la surface totale des feuilles qu'elle porte est d'environ dix-huit pouces carrés. Mais dans notre climat, la plupart des feuilles cherchent à avoir autant de soleil qu'elles peuvent s'en procurer, et c'est ce qui détermine leur arrangement. La largeur des feuilles du hêtre, qui est d'environ un pouce trois quarts, est déterminée par la distance moyenne des bourgeons; si les feuilles étaient plus larges, elles se recouvriraient. Nous connaissons

la surface, d'une part, et la largeur, de l'autre; la longueur est donc déterminée, puisque, pour obtenir une surface de dix-huit pouces, la largeur des feuilles étant d'un pouce trois quarts, leur longueur doit être d'environ deux pouces. Appliquons ces considérations à d'autres cas, et prenons pour exemple le châtaignier d'Espagne (*Castapla vesca*) et le peuplier noir (*Populus nigra*). Les branches du châtaignier d'Espagne sont beaucoup plus fortes que celles du hêtre; elles peuvent, en conséquence, porter une plus grande surface de feuilles; mais, comme la distance entre les bourgeons est à peu près la même, les feuilles ne peuvent être beaucoup plus larges; aussi sont-elles proportionnellement plus longues, ce qui leur donne leur forme caractéristique, celle d'une épée.

Si nous regardons l'extrémité d'une branche de peuplier noir et si nous la comparons à celle d'une branche de peuplier blanc, deux choses nous frappent tout d'abord; on ne peut étaler sur un morceau de papier les feuilles attachées à la branche, de telle sorte qu'elles ne se recouvrent pas : elles sont trop nombreuses et trop larges; secondement dans le peuplier blanc les deux faces de la feuille sont très différentes l'une de l'autre; la face inférieure est couverte d'un feutrage épais de poils qui lui donne sa couleur blanche. Dans le peuplier noir au contraire, les deux faces sont à peu près semblables; ces deux caractères sont corrélatifs l'un de l'autre, car tandis que dans le peuplier blanc les feuilles sont horizontales, dans le peuplier noir, au contraire, elles sont verticalement disposées; en conséquence les deux faces se trouvent dans des conditions très analogues : elles doivent donc présenter une structure semblable; c'est aussi parce qu'elles sont verticales qu'elles ne se recouvrent pas les unes les autres. Dans les arbres comme le hêtre et le tilleul (*Tilia europæa*) les feuilles sont dans un même plan. Tel n'est point le cas pour d'autres arbres tels que les érables, les marronniers d'Inde etc. Un autre ordre de considérations entrent alors en jeu. Considérons pour le moment le grand groupe des Conifères. Pourquoi par exemple certains d'entre eux ont-ils des feuilles longues et d'autres des feuilles courtes? Je crois que cela dépend de la force des branches et du nombre d'années que durent les feuilles; les longues feuilles tombent l'une après l'autre tous les deux ou trois ans, tandis que les espèces à feuilles courtes gardent leurs feuilles un assez grand nombre d'années; le sapin par exemple garde les siennes huit ou dix ans, l'*Abies pinsapo* les garde jusqu'à dix-huit ans. Avant de donner plus de détails sur quelques-uns de ces cas particuliers, je crois utile d'appeler l'attention sur le cas des jeunes plantes.

II

Jeunes plantes. — J'en viens maintenant à la seconde partie de ma tâche, les formes des cotylédons. Tous ceux qui ont regardé une plante qui vient de lever, ont dû être frappés de ce fait que les premières feuilles diffèrent entièrement de celles qui leur succèdent; elles diffèrent non seulement de la forme définitive des feuilles, mais encore des feuilles qui leur succèdent immédiatement. On appelle ces premières feuilles cotylédons: on a soigneusement décrit la forme d'un grand nombre de cotylédons, mais on n'a donné aucune raison de ces formes et l'on n'a point cherché à expliquer pourquoi elles diffèrent si profondément de celles des feuilles qui leur succèdent. Klebs dit, dans son intéressant mémoire sur la germination, que c'est tout à fait une énigme.

La moutarde et le cresson ont fait les délices et l'étonnement de notre enfance et il n'est jamais arrivé à personne, à moi du moins, de se demander pourquoi ils ont la forme qu'ils ont; ils poussent ainsi et il ne m'est pas venu à l'esprit, et je pense qu'il en est de même pour la plupart des gens, de chercher au delà. J'ai cependant, me semble-t-il, donné des raisons plausibles de telle ou telle forme dans bien des cas, je vais produire quelques-unes de ces explications.

Les cotylédons diffèrent beaucoup de forme.

Formes des cotylédons. — Certains cotylédons sont étroits, ceux par exemple du *Feniculum* et de la *Férule* dont les feuilles adultes sont très divisées; le *Platane* et l'*Érable* dont les feuilles adultes sont palmées et le *Chenopodium album* dont les feuilles sont plus ou moins triangulaires ont également des cotylédons étroits. Je puis citer comme exemple de cotylédons larges ceux du hêtre et de la moutarde. Il y a des espèces dont les cotylédons sont étroits et les feuilles larges; il y en a d'autres dont les cotylédons sont larges et les feuilles étroites. Dans un grand nombre de cas nous rencontrons dans la même famille des plantes dont les unes ont des cotylédons larges, les autres des cotylédons étroits. Nous pouvons citer comme exemples le mouron et l'œillet qui appartiennent tous deux à la famille des Caryophyllées.

Quelquefois même dans le même genre nous trouvons des cotylédons larges et des cotylédons étroits, comme c'est le cas pour les différentes espèces de *Galium*. Dans certains cas les deux cotylédons sont inégaux, comme par exemple dans la moutarde, le chou, le radis. Dans certains autres les deux moitiés de chaque cotylédon sont inégales: exemple les géraniums, ou bien elles sont

dissymétriques de quelque autre manière comme par exemple dans le lupin ou le *Laburnum*.

Quelquefois les cotylédons sont sessiles comme dans l'*Érable*, le *Laburnum*, etc.; quelquefois ils sont pétioles et les pétioles sont quelquefois unis. Ces différences se retrouvent parfois dans des espèces très voisines, par exemple dans certaines espèces de *Delphinium* les cotylédons sont sessiles, tandis que dans d'autres ils sont pétioles. Généralement les cotylédons sont entiers, mais quelquefois ils sont crénelés ou lobés, par exemple dans la mauve. Souvent ils sont émarginés; exemples: la moutarde, le chou, le *Convolvulus*. Ils sont quelquefois bifides, par exemple dans l'*Eschscholtzia*; ou trifides, par exemple dans le cresson; ou partagés en quatre longs lobes, comme dans le *Pterocarya*. Quelquefois ils sont auriculés à la base. Quelquefois ils sont larges; quelquefois ils sont petits. D'ordinaire ils ont l'apparence de feuilles; mais quelquefois, comme dans le chêne, le noisetier, les pois, les fèves, etc., ils sont épais et charnus.

Voyons si nous pouvons jeter quelque lumière sur les causes de ces différences. Si nous ouvrons une graine, nous trouvons à l'intérieur la future plante: quelquefois, comme dans le pied d'alouette, c'est un petit corps ovale; quelquefois, comme dans le frêne ou le ricin, c'est une petite plante en miniature, avec une courte et forte racine et deux feuilles bien formées, qui enferment entre elles le rudiment de la future tige; le tout est enveloppé dans le périsperme qui constitue les réserves alimentaires de la jeune plante. Quelquefois, au contraire, l'embryon occupe tout l'intérieur de la graine; les réserves alimentaires sont alors accumulées, non pas autour des cotylédons, mais dans les cotylédons mêmes.

Les pois et les fèves, les amandes, les noix et les noisettes sont des exemples familiers de cette disposition. On trouve ordinairement les pois secs fendus; qui est-ce qui les fend en réalité? Si vous les regardez, vous verrez qu'ils sont trop régulièrement et trop bien fendus, pour que cela ait été fait par des mains humaines. En réalité, ces deux moitiés sont les deux cotylédons charnus: à dire vrai, on ne les a pas séparés, car ils n'ont jamais été unis.

Cotylédons étroits. — Commençons par les espèces qui ont des cotylédons étroits et voyons si nous pouvons expliquer ce caractère. Le problème est assez simple dans un cas comme celui du platane, où nous avons à la fois des cotylédons étroits et une graine longue et étroite qui renferme un embryon étroit. Dans le frêne également les cotylédons sont parallèles à l'axe de la graine, qui est étroite et longue. Mais ces cas-là sont comparati-

vement rares; et il y a beaucoup d'espèces dont les graines sont larges et même orbiculaires et qui ont cependant des cotylédons étroits.

Dans ce dernier cas les cotylédons sont d'ordinaire disposés transversalement.

Le sycamore a aussi des cotylédons étroits, mais l'arrangement est un peu différent. Le fruit est ailé, la graine est obovoïde et périspermique, c'est-à-dire que l'embryon, au lieu d'être enveloppé par les réserves nutritives occupe toute la cavité de la graine. Si nous voulions faire tenir une feuille dans une cavité de cette forme, nous verrions qu'il faudrait en choisir une qui eût la forme d'une large bande et la rouler sur elle-même de façon à en faire une sorte de balle. Telle est, je crois, la raison qui détermine chez le sycamore cette forme des cotylédons.

III

Passons maintenant aux plantes qui ont des cotylédons larges. Dans le ricin, le fusain ou le pommier par exemple, la plantule s'élargit dans la graine qui est fort large et les cotylédons font comme elle. Dans le genre *Coréopsis*, une espèce, le *Coreopsis auriculata*, a de larges cotylédons et une autre, le *Coreopsis filifolia*, a des cotylédons étroits; la première a de larges graines, la seconde des graines étroites.

Dans un grand nombre d'espèces, les cotylédons sont émarginés, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins profondément entaillés à leur extrémité. Il y a à cela diverses causes. L'un des cas les plus simples est celui du chêne, où les deux cotylédons charnus remplissent la graine; les parois de la graine s'épaississent un peu à l'extrémité et font légèrement saillie à l'intérieur de la graine, ce qui produit dans les cotylédons une dépression correspondante.

Dans des cas comme ceux de la moutarde, du chou et du radis, l'émargination est due à des causes tout à fait différentes. La graine est oblongue, épaisse et légèrement plus étroite à un bout qu'à l'autre. Il n'y a pas de périsperme, de telle sorte que l'embryon occupe la graine tout entière, et comme la cavité a quelque profondeur, les cotylédons, pour occuper tout l'espace, se replient et s'arrangent l'un sur l'autre comme deux feuilles de papier; la racicule est repliée le long du bord de la feuille.

Si l'on prend un morceau de papier, qu'on le plie et qu'on le coupe dans la forme de la graine de telle sorte que le pli se trouve le long du bord de *maf*, puis qu'on le déplie, on verra clairement pourquoi les cotylédons sont ainsi faits.

Mais on peut dire que les contours de la graine de la giroflée sont pareils et que cependant ses

cotylédons ne sont pas émarginés. La raison, c'est que la graine de la giroflée est plus comprimée que celle de la moutarde et du radis; la conséquence, c'est que les cotylédons ne sont pas repliés, de telle sorte que ce n'est pas la moitié de chaque cotylédon, mais le cotylédon tout entier dont la forme correspond à celle de la graine.

Cotylédons lobés. — Les cotylédons sont en grande majorité entiers, mais quelques-uns sont plus ou moins lobés. Par exemple les cotylédons de la mauve sont larges, ovales, très peu émarginés, cordés à la base, bilobés vers la pointe; il ont trois nervures; une pour chaque lobe. L'embryon est vert, courbé, il occupe une grande partie de la graine. Les cotylédons sont appliqués, l'un contre l'autre, face à face; lorsqu'ils se développent, la pointe se recourbe et se replie en formant un sillon médian, de telle sorte que les deux plis s'emboîtent l'un dans l'autre. De cette façon l'embryon occupe presque toute la graine; il laisse un petit espace libre entre les cotylédons; cet espace est occupé par le périsperme. Peut-être réussira-t-on à mieux comprendre cet arrangement de la manière suivante : découpez un morceau de papier en forme d'œuf, tournez l'un vers l'autre deux côtés, et ensuite tournez vers le bas la partie pointue; il en résultera un angle aigu; alors, si on ôte cet angle et ouvre le papier, on a un objet avec une pointe aiguë; l'existence de cette pointe ne concorde pas avec la forme arrondie de la graine. Si maintenant nous coupons cette pointe et si nous déplaçons le morceau de papier, nous verrons qu'il a la forme des cotylédons de la mauve et qu'il porte une entaille de chaque côté.

Les cotylédons du tilleul ont une forme très particulière. Ils sont parfaitement divisés en 5 lobes, le lobe central est le plus long, de telle sorte qu'ils ont grossièrement la forme d'une main. La graine est un sphéroïde aplati, dont la forme ressemble à celle d'une orange; l'embryon est enveloppé dans un albumen semi-transparent. Il est d'abord droit; la racicule est épaisse et obtuse, les cotylédons sont ovales et obtus, plans-convexes, charnus, d'un vert pâle, appliqués face contre face. Ils se développent considérablement et lorsqu'ils atteignent la paroi de la graine, ils se recourbent en arrière sur eux-mêmes et s'enroulent en suivant le contour général de la graine. Si l'on prend une tasse à thé ordinaire, et qu'on essaye de la tapisser intérieurement avec une feuille de papier, ce papier fera tout naturellement des plis. Si l'on coupe ces plis et qu'on ne conserve du papier que ce qui peut s'appliquer sur les parois intérieures de la tasse, sans qu'aucune portion de la feuille chevauche sur une autre, on constatera qu'elle est découpée en lobes qui ressemblent plus ou moins à

ceux des cotylédons du tilleul. Réciproquement si on découpe un morceau de papier en lobes analogues à ceux des cotylédons du tilleul, on peut tapisser avec ces morceaux de papier l'intérieur de la tasse. C'est un cas qui est presque le même que celui de notre main, qu'on peut ouvrir et fermer aisément parce que les cinq doigts sont séparés.

Cotylédons inégaux. — Dans les cas dont j'ai parlé jusqu'ici les deux cotylédons sont égaux, mais il y a plusieurs cas où l'un des cotylédons est plus grand que l'autre. Ces cas n'ont pas échappé à l'attention de Darwin; il a attribué cette différence au fait « que des réserves alimentaires s'accumulent en quelque autre partie, comme dans l'hypocotyle ou l'un des cotylédons ». J'avoue que je ne vois pas en quoi cela peut expliquer le fait. La supposition que j'ai faite, c'est que cette différence est due à la position relative des deux cotylédons dans la graine, qui en certains cas favorise l'un des deux aux dépens de l'autre. Ainsi dans la moutarde les cotylédons sont inégaux, et nous avons déjà vu qu'ils sont repliés l'un dans l'autre; le cotylédon externe a donc plus de place pour se développer et devient plus grand. Dans beaucoup d'autres crucifères, bien que les cotylédons ne soient pas repliés l'un dans l'autre, ils sont repliés sur la radicule, et le cotylédon externe a plus de place que l'autre.

Cotylédons asymétriques. — Dans d'autres cas, comme dans les géraniums, le laburnum, les lupins etc., il y a inégalité, non pas entre les deux cotylédons, mais entre les deux moitiés de chaque cotylédon. Chez les Géraniums, cela est dû à la manière dont les cotylédons sont pliés. Dans le chou et la moutarde l'un des cotylédons est, ainsi que nous l'avons dit, enveloppé dans l'autre: chez le Géranium, une moitié de chaque cotylédon est enveloppée dans une moitié de l'autre, les deux moitiés internes sont aussi les plus petites, les deux moitiés externes les plus grandes (*convolution*).

Dans le laburnum au contraire, l'inégalité des deux côtés du cotylédon est due à l'inégalité des deux côtés de la graine.

Cotylédons souterrains. — J'ai déjà fait remarquer que dans certains cas les cotylédons remplissent la graine tout entière; dans le cas des graines plus ou moins sphériques, c'est tantôt en se repliant sur eux-mêmes, tantôt parce qu'ils s'épaississent plus ou moins comme dans les pois et les fèves, les noisettes et les châtaignes. C'est pour cette raison que ces graines se séparent plus ou moins facilement en deux moitiés: la radicule et la plumule sont si petites en comparaison que d'ordinaire elles passent inaperçues; lorsque le marron d'Inde est pelé

cependant, la radicule apparaît comme une sorte de queue.

Dans certains cas les cotylédons arrivent au jour, dans d'autres comme dans celui du chêne et du marronnier d'Inde, ils n'abandonnent jamais la graine et ne sortent jamais du sol; ils ont perdu leurs fonctions de feuilles et ne sont plus que des dépôts de provisions.

Vous est-il jamais arrivé de vous demander en mangeant des noix pourquoi leur structure est si complexe, pourquoi la partie comestible est divisée en tant de plis et de lobes compliqués? L'histoire de ce développement est fort intéressante.

Dans la noix, les cotylédons ne quittent jamais la graine, mais dans une espèce voisine, les *Pterocarya*, ils viennent au jour, comme c'est la règle; ils ont une forme très particulière et sont très profondément quadrilobés. La raison en est fort curieuse. Le fruit est originairement beaucoup plus grand que la graine; mais lorsque la maturité approche, le tissu ligneux se résorbe en quatre endroits, laissant ainsi quatre vides. Dans ces espaces vides la graine envoie quatre prolongements et dans chacun d'eux, chaque cotylédon envoie un lobe. C'est là l'origine des quatre lobes. C'est à peu près la même chose qui arrive pour la noix, mais avec cette différence que les espaces vides sont beaucoup plus grands, de telle sorte qu'on n'a pas l'impression d'une paroi solide dont les dépressions seraient occupées par la graine, mais qu'il semble que la graine se soit plissée et que la paroi du fruit ait poussé des prolongements entre les plis. Pour remplir tous ces vides, les cotylédons se sont repliés et ont pris l'apparence que nous leur voyons. Le fruit du *Pterocarya* est beaucoup plus petit que celui du marronnier d'Inde, qui certainement n'était pas tout d'abord aussi gros qu'il l'est maintenant. A mesure qu'il a grossi, les cotylédons sont devenus plus charnus et ont eu plus de peine à sortir de la graine, de telle sorte qu'à la fin ils ne l'ont plus essayé. Ces curieux plis qui nous sont si familiers sont le résultat des efforts faits par les cotylédons originairement foliacés pour occuper l'intérieur de la noix. Si on les sépare, on trouve aisément la petite radicule et la plumule avec de cinq à sept paires de petites feuilles.

Mais peut-être me demandera-t-on pourquoi j'ai supposé que les cotylédons s'étaient modelés sur la graine. La forme de la graine ne serait-elle pas au contraire déterminée par celle des cotylédons? La taille, la forme des graines est cependant évidemment en rapport avec l'état, les conditions d'existence de la plante mère.

Prenons un exemple: Les cotylédons du syc-

more sont longs, étroits en forme de bande, ceux du hêtre sont courts, fort larges et en forme d'éventail. Les deux espèces sont aërispermiques, l'embryon occupe tout l'intérieur de la graine. La graine du sycomore est un sphéroïde plus ou moins aplati, les longs cotylédons rubannés se roulent en forme de boule et la remplissent exactement (le cotylédon interne est souvent un peu plus court que l'autre). D'autre part les graines du hêtre sont plus ou moins triangulaires : si les cotylédons étaient disposés comme ceux du sycomore, il resterait nécessairement des vides. Aussi sont-ils repliés comme un éventail, mais comme un éventail plus compliqué, de telle sorte qu'ils remplissent admirablement toute la graine triangulaire.

Mais pouvons-nous aller plus loin? Pourquoi la graine du sycomore est-elle globuleuse et celle du hêtre triangulaire? Est-il évident que les cotylédons sont faits de manière à s'adapter à la graine? Ne pourrait-on dire que c'est la graine qui est adaptée aux cotylédons? Pour répondre à cette objection il nous faut examiner le fruit; nous constatons que dans les deux cas la cavité du fruit est à peu près sphérique. Mais le fruit du sycomore est comparativement petit ($\frac{1}{5}$ de pouce de diamètre), et ne contient qu'une graine qui s'adapte exactement à la cavité où il est enfermé, tandis que, dans le

hêtre, le fruit est d'une taille au moins double et contient de deux à quatre fruits, qui sont par conséquent obligés, pour occuper tout l'espace, de prendre, comme les quartiers d'une orange, une forme plus ou moins triangulaire. Dans ces cas-là, c'est donc la forme du fruit qui détermine celle de la graine, et la forme de la graine qui détermine celle des cotylédons. Mais bien que les cotylédons s'adaptent souvent à la forme de la graine, ce n'est pas toujours le cas; d'autres facteurs doivent être pris en considération; mais si nous en tenons compte, nous pouvons, telle est de moins mon opinion, jeter beaucoup de lumière sur les raisons qui font que telle ou telle plantule prend une forme ou une autre.

J'ai essayé d'indiquer quelques-uns des principes dont dépendent, me semble-t-il, les formes des feuilles et des plantules et de les appliquer à certains cas particuliers; mais cet ordre d'études est encore dans l'enfance, le nombre et la variété des espèces de feuilles est presque infini, et la question tout entière offre, j'ose le dire, un champ de recherches et d'observations au nombre des plus intéressantes de toute l'histoire naturelle.

Sir John Lubbock.

de la Société royale de Londres.

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU GRISOU

On sait que le grisou est formé par de l'hydrogène proto-carboné ou formène qui est enfermé entre les feuillettes de la houille sous une pression parfois considérable. Pendant l'abatage de la houille, ce gaz se dégage en produisant un bruissement particulier, analogue au bruit de la pluie, et il se rassemble à la partie supérieure des galeries, de préférence dans des excavations auxquelles on donne le nom de cloches. La quantité de grisou qui se dégage dans une galerie est variable d'un jour à l'autre. On a cherché à rapprocher ces variations de celles de la pression atmosphérique; mais il est impossible d'établir une relation nette, comme l'a montré M. Le Chatelier, dans un mémoire paru aux *Annales des mines*. Lorsque la proportion de grisou contenue dans l'air atteint de 6 à 18 pour cent environ, le mélange est combustible et peut détoner en produisant des accidents très graves. L'inflammation a lieu, soit par contact avec la flamme d'une lampe (ordinairement à feu nu, mais dans certains cas les lampes de sûreté peuvent

provoquer l'inflammation), soit par le contact avec les gaz chauds provenant du tirage d'un coup de mine. De 1881 à 1887 on a enregistré 93 accidents de grisou sur lesquels 59 causés par l'emploi des lampes faisaient 115 victimes (34 morts, 81 blessés) tandis que les 36 causés par des coups de mine étaient beaucoup plus graves et faisaient 276 victimes (194 morts, 92 blessés). Il était donc absolument nécessaire de préciser les précautions à prendre pour éviter, autant que possible, la production de semblables explosions. Les différents gouvernements européens ont nommé dans ce but des commissions spéciales qui ont déjà publié d'importantes recherches.

Les travaux de la commission française ont été conduits comme des recherches scientifiques et se distinguent en cela de ceux des commissions étrangères. La plupart des expériences effectuées sont des expériences de laboratoire, mais elles ont conduit à des résultats nettement formulés que les essais pratiques ont pleinement vérifiés. Ces re-

cherches font le plus grand honneur au corps des ingénieurs de l'État. Nous allons essayer d'en résumer les principaux résultats, en laissant de côté la partie technique.

I

Dans ces dernières années, plusieurs ingénieurs avaient émis l'idée que les poussières de houille jouaient un rôle important dans les explosions de grisou. Les expériences récentes ont montré que les poussières ne sont dangereuses qu'autant qu'elles sont plongées dans un mélange détonant par lui-même, et n'en augmentent pas l'inflammabilité. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte pour déterminer les conditions de sécurité, et il suffira d'expérimenter sur le mélange d'air et de grisou.

La question qui s'imposait tout d'abord était l'étude de la combustion des mélanges grisouteux, sur laquelle on n'avait que des données fort incertaines, dues pour la plupart à Davy. Cette étude a été effectuée par MM. Mallard et Le Châtelier, ingénieurs au corps des Mines, et leurs recherches étendues à un grand nombre de mélanges gazeux détonants ont été résumées dans trois mémoires parus aux *Annales des mines* en 1883. Le premier traite de la température d'inflammation, le second de la vitesse de propagation de la combustion, le troisième de la pression développée et de la température de combustion.

1° *Température d'inflammation.* — Lorsque l'on élève progressivement la température d'un mélange gazeux détonant, la combinaison se produit peu à peu par une véritable combustion lente. Il fallait donc porter brusquement le mélange à une température donnée. Voici la disposition qui a été employée : un matras de porcelaine dans lequel on a fait le vide est chauffé dans un four à gaz. Quand la température est devenue stationnaire, on le met en communication avec un gazomètre contenant le mélange gazeux, et du volume de gaz qui est entré dans le matras on déduit s'il y a eu contraction de volume et par suite combinaison. On recommence ensuite à une autre température et on arrive ainsi à comprendre la température d'inflammation entre deux limites déterminées.

Ces expériences ont conduit aux résultats suivants :

La température d'inflammation d'un mélange gazeux est sensiblement indépendante de la proportion de gaz inerte ajouté au mélange tonnant. Cette température est d'environ 650° pour les mélanges grisouteux.

Le mélange d'air et de grisou présente une particularité remarquable. L'inflammation ne se pro-

duit pas instantanément; et le retard, qui peut atteindre une dizaine de secondes, est d'autant plus faible que la température à laquelle on porte le gaz est plus élevée.

L'inflammation d'un mélange d'air et de grisou est donc fonction de deux facteurs : la température et le temps pendant lequel agit cette température.

2° *Vitesse de propagation.* — Différentes méthodes ont été employées successivement. On a cherché d'abord quelle vitesse il fallait donner à un courant gazeux s'écoulant à travers un orifice en mince paroi pour que la flamme produite à cet orifice ne pût pas rentrer dans le tube. Dans d'autres séries d'expériences, MM. Mallard et Le Châtelier ont étudié la propagation de la flamme dans un tube plein de mélange détonant en enregistrant le passage de la flamme en des points donnés, soit par des signaux électriques, soit par des signaux pneumatiques, soit enfin par inscription photographique.

Ils ont trouvé par ces différentes méthodes que, pour le mélange de formène et d'air, la vitesse de propagation, sensiblement nulle quand il y a 6 % de formène, atteint un maximum égal à environ 0^m60 par seconde pour le mélange contenant 12,2 % de formène et redevient nulle pour le mélange à 18 %.

La vitesse de propagation dépend de la température du mélange gazeux et, au-dessous d'une certaine limite, du diamètre du tube qui contient le mélange. Pour un diamètre suffisamment petit, la vitesse devient nulle même pour les mélanges les plus détonants, et la combustion ne peut se propager.

La vitesse de propagation maximum de 0^m60 ne suffit pas à expliquer les effets mécaniques considérables que peuvent produire les explosions de grisou. Mais il faut remarquer qu'elle se rapporte au mélange gazeux en repos. L'agitation du gaz a une influence considérable sur la vitesse de propagation, ainsi que l'avaient déjà fait remarquer MM. Schlesing et de Mondésir. MM. Mallard et Le Châtelier ont pu, dans des expériences de laboratoire, obtenir des vitesses de propagation de 20 mètres par seconde en agitant le gaz, et, on peut concevoir que, dans certaines conditions, les explosions qui se produisent dans les mines atteignent des vitesses beaucoup plus grandes. Ce fait a une importance considérable au point de vue des effets produits par les explosions de grisou et explique pourquoi les dégâts sont souvent moins considérables au point où s'est produit l'inflammation que dans les galeries voisines, l'état d'agitation des gaz augmentant à mesure que la combustion se propage.

3° Pression développée et température de combustion —

Cette troisième partie des recherches de MM. Mallard et Le Châtelier est de beaucoup la plus considérable. Les expériences consistaient à étudier, au moyen d'un manomètre enregistreur, les pressions développées par l'explosion du mélange gazeux enfermé dans un eudiomètre métallique, et à déduire de la variation de cette pression la marche du refroidissement des produits de la combustion. Connaissant la pression maxima développée, on peut calculer la température de combustion, pourvu qu'on connaisse les produits qui prennent naissance. L'étude du refroidissement des produits de la combustion a permis de déterminer à ces températures très élevées (environ 2.000°) les chaleurs spécifiques des gaz formés. MM. Mallard et Le Châtelier ont trouvé ainsi que les chaleurs spécifiques des gaz à volume constant sont fonctions de la température, et peuvent en général se représenter par des formules simples telles que

$$C = a + bt.$$

Ce résultat est excessivement important au point de vue du calcul de la température de la détonation d'un explosif, calcul que nous retrouverons à propos de l'emploi des explosifs dans une atmosphère grisouteuse.

II

La flamme du mélange grisouteux le plus combustible ne peut se propager dans un tube de 3,2 millimètres de diamètre environ, mais elle y pénètre de 30 millimètres avant de s'éteindre. En prenant ces tubes de plus en plus étroits, on diminue graduellement la longueur de pénétration, et comme la flamme s'arrête toujours à une certaine distance des parois par suite de l'action refroidissante qu'elles exercent, on peut arriver à un diamètre de tube pour lequel la longueur de pénétration est nulle. Une toile métallique suffisamment fine pouvant être assimilée à un assemblage de tubes très étroits et très courts arrêtera donc la flamme d'un mélange gazeux combustible. C'est sur ce principe qu'est basée la construction de la lampe de sûreté de Davy.

Mais la sécurité donnée par une toile métallique dépendant de la vitesse de propagation de la flamme est par cela même fonction de la composition du mélange gazeux, de son degré d'agitation et de la température à laquelle il est porté. Telle lampe qui sera absolument sûre dans certaines conditions ne présentera plus dans d'autres la moindre sécurité. Il importe donc d'examiner les différents cas qui peuvent se présenter.

L'agitation du mélange gazeux est la cause qui

intervient le plus fréquemment pour modifier la sécurité d'une lampe à toile métallique. On conçoit en effet que la vitesse de translation d'un mélange gazeux traversant une toile métallique s'ajoute à la vitesse de propagation de la flamme, vitesse qui a déjà été considérablement accrue par l'état d'agitation du gaz. Il suit de là qu'une toile métallique qui arrête la flamme d'un mélange gazeux au repos pourra fort bien se laisser traverser par la flamme du même mélange, lorsque celui-ci sera animé d'un mouvement de translation ou lorsqu'on déplacera la lampe plus ou moins rapidement.

L'inflammation peut se transmettre à travers le treillis par un autre mécanisme : si le mélange gazeux peut se renouveler à l'intérieur de la lampe assez vite pour que la flamme arrêtée à la toile métallique ne s'éteigne pas, la toile métallique va s'échauffer peu à peu, et au bout d'un temps plus ou moins long, les gaz brûlés sortiront de la lampe à une température suffisamment élevée pour enflammer le mélange gazeux extérieur. Le pouvoir refroidissant de la toile métallique aura alors une grande importance. Il intervient aussi en ce que, la vitesse de propagation augmentant notablement avec la température, une toile métallique donnée se laissera traverser d'autant plus facilement qu'elle sera portée à une température plus élevée.

Enfin quand la lampe est plongée dans un mélange gazeux en repos, il peut se présenter des circonstances où l'explosion intérieure traverse la toile métallique. Ces circonstances ont été précisées par M. Marsaut. Si une lampe de sûreté a pu se remplir presque complètement de mélange détonant sans qu'il y ait explosion, au moment où l'inflammation se produira à la partie inférieure, la vitesse de la flamme augmentera rapidement à mesure qu'elle se propagera par suite de l'état d'agitation que prendra le gaz, et au moment où la flamme arrivera sur la toile métallique elle pourra posséder une vitesse suffisante pour la traverser. Ces conditions peuvent se présenter quand on élève une lampe, brûlant à petit feu dans une cloche pleine de mélange grisouteux, opération que l'on effectue souvent pour rechercher le grisou. Ce cas ne sera pas très fréquemment dangereux, l'inflammation ayant lieu le plus souvent avant que le mélange gazeux ait rempli la lampe. Mais il importe néanmoins d'en tenir compte. Le plus ou moins de sécurité d'une lampe dans ces conditions dépendra essentiellement de ses dimensions, c'est-à-dire du point où se fera l'inflammation du mélange gazeux dans le cas le plus défavorable, et de la grandeur des mailles de la toile métallique.

Un grand nombre de modèles de lampes de sûreté ont été proposés pour éviter ces causes de danger. Dans toutes ces lampes on a entouré la flamme

d'un manchon en verre pour augmenter le pouvoir éclairant, qui est très faible dans la lampe Davy.

Ces lampes se distinguent en deux classes, suivant la façon dont elles sont alimentées d'air. Les lampes à alimentation directe, où l'air arrive par un treillis placé à la partie inférieure du manchon de verre; les lampes à alimentation renversée où l'air arrive par la partie inférieure du treillis qui surmonte le manchon de verre, contourne la flamme et remonte ensuite par la partie centrale.

Les lampes à alimentation directe sont celles qui éclairent le mieux, mais elles s'éteignent très facilement par l'agitation et présentent un inconvénient grave : le mélange gazeux arrivant par la partie inférieure de la lampe, la flamme, une fois produite, persiste à la partie supérieure. Il en résulte que la lampe s'échauffe peu à peu, ce qui peut amener la rupture du verre ou le passage de la flamme à travers la toile métallique.

Dans les lampes à alimentation renversée, au contraire, les produits de la combustion s'échappant moins facilement, il en résulte que, en général, lorsque l'inflammation se produit à l'intérieur, les fumées sont rabattues sur la flamme de la lampe qui s'éteint. De plus, on cherche en général à disposer la lampe de telle sorte qu'il se produise dans les gaz brûlés un remous capable de les mélanger partiellement au gaz frais à son entrée dans la lampe. Le mélange gazeux qui pénètre dans la lampe est ainsi rendu moins combustible, ce qui augmente considérablement la sécurité.

Les deux lampes les plus employées actuellement en France appartiennent toutes deux à ce type. Ce sont les lampes Marsaut (fig. 1) et Mueseler (fig. 2).

Dans la lampe Marsaut, le treillis métallique est entouré d'un manchon métallique plein que l'air est obligé de contourner avant d'entrer dans la lampe. On évite ainsi l'influence des mouvements gazeux. Les expériences de la commission du grisou ont montré que cette lampe ne laissait pas passer la flamme, lorsqu'on la plaçait dans des courants gazeux animés d'une vitesse comprise entre cinq et dix mètres par seconde. Le treillis métallique est en général doublé et quelquefois même triplé, et les mailles choisies de façon à assurer le reflux des produits de la combustion. Cette lampe s'éteint immédiatement quand on l'introduit dans un mélange détonant.

Dans la lampe Mueseler (fig. 2), l'air traverse d'abord une toile métallique *a* qui surmonte le verre, puis un second treillis horizontal *b*; les produits de la combustion s'échappent ensuite par une

cheminée étroite *c*, ce qui en assure le reflux. Cette lampe résiste parfaitement aux courants horizontaux animés d'une vitesse de dix mètres par seconde. Avec des courants très obliques, la flamme peut passer pour des vitesses beaucoup moindres; mais, en diminuant le diamètre de la cheminée, on peut obtenir une lampe qui résiste à des courants de cinq mètres par seconde.




Fig. 1. — Lampe Marsaut à manchon métallique plein.




Fig. 2. — Lampe Mueseler. *a*, toile métallique; — *b*, treillis horizontal; — *c*, cheminée.

Les nombreuses expériences effectuées par la commission du grisou sur les diverses lampes ont montré que, si on laisse de côté la lampe de Davy, très sensible aux mouvements gazeux, les types décrits ci-dessus ne présentent pas de danger dans les conditions ordinaires, lorsqu'ils sont en bon état. La plupart des accidents dus aux lampes doivent être rapportés, soit à leur ouverture, soit à une fermeture incomplète ou à une dégradation du treillis.

Enfin la lampe de sûreté doit indiquer au mineur la présence de proportions relativement faibles de grisou par l'aspect de la flamme. Celle-ci présente un allongement notable et il se forme sur son contour une auréole bleue. Cette auréole est difficilement observable dans les conditions ordinaires. MM. Mallard et Le Chatelier ont proposé l'emploi soit d'une lampe à alcool qui donne une flamme incolore en temps ordinaire, soit d'un système d'écrans qui cache la partie éclairante de la flamme et laisse observer l'auréole sur un fond obscur.

III

Les explosifs sont employés dans certaines mines pour l'abatage de la houille, et ils sont absolument indispensables dans les travaux au rocher. De nombreux accidents avaient montré que le tirage à la poudre allume presque à coup sûr un mélange grisouteux. Par contre les explosifs brisants tels que la dynamite, le coton poudre, etc., semblaient moins dangereux. Ces résultats s'expliquent aisément d'après l'étude de l'inflammation des mélanges grisouteux. L'inflammation étant soumise à un certain retard, les gaz chauds provenant d'une explosion pourront, quoique leur température initiale soit très élevée, ne pas allumer un mélange détonant, s'ils se refroidissent suffisamment vite. Or le refroidissement de ces gaz dépend de deux causes : leur détente et leur mélange avec l'air froid environnant. L'explosion étant presque instantanée dans les explosifs brisants, les gaz produits se trouveront au premier instant condensés à une pression considérable sous un volume à peine supérieur à celui de l'explosif ; ils se détendront donc très brusquement et subiront ainsi un refroidissement bien plus rapide que cela n'a lieu avec la poudre dont la combustion est graduelle. La théorie, d'accord avec l'expérience, indiquait donc la suppression du tirage à la poudre et l'emploi exclusif des explosifs brisants. Parmi ceux-ci, ceux qui détonent à la température la plus basse sont ceux qui présenteront le plus de sécurité. Il y avait donc à étudier : 1° La température maxima que peuvent atteindre les gaz provenant d'une explosion pour qu'ils ne puissent enflammer un mélange détonant. C'est ce que la Commission du grisou appelle la *température apparente d'inflammation*. 2° La température de détonation des différents explosifs actuellement en usage. 3° Les moyens propres à abaisser la température des gaz provenant de l'explosion, soit en faisant varier la nature de l'explosif, soit en changeant les conditions dans lesquelles se produisait la détonation.

Les recherches expérimentales destinées à éclaircir ces différents points ont été effectuées à la poudrerie de Sevran-Livry par une sous-commission spéciale. Les expériences étaient faites au moyen d'une chaudière de 10 mètres cubes de capacité au sein de laquelle on introduisait le mélange grisouteux dans les proportions les plus favorables à la détonation. La chaudière communiquait avec un manomètre à eau indiquant les variations de pression intérieure, et l'explosif en essai était suspendu au milieu du mélange gazeux. Cette chaudière a été employée aussi dans d'autres conditions. Lorsqu'on la remplissait d'air et qu'on y faisait détoner un explosif, elle se comportait comme un

calorimètre et de la connaissance des variations de pression on pouvait déduire la quantité de chaleur dégagée et par suite la *température de détonation*¹.

Il y a une grande différence entre les actions produites par un explosif, suivant que la détonation a lieu à l'air libre ou au sein d'une enveloppe résistante. Dans le second cas, les réactions s'effectuent plus complètement, et, de plus, les gaz arrivent au contact du mélange grisouteux à une température plus basse, car ils ont d'abord à effectuer un certain travail pour disloquer l'enveloppe résistante et en projeter les fragments. C'est sur ce phénomène qu'on s'est basé pour déterminer la température apparente d'inflammation du mélange grisouteux. (On ne s'est naturellement occupé que du mélange le plus inflammable.)

Une cartouche de 50 grammes de dynamite à 25 % de silice, détonant à l'air libre, enflamme à coup sûr le mélange grisouteux. La température de détonation est voisine de 2940°. En enveloppant cette cartouche de tubes de plomb ou d'étain d'épaisseurs variées, on peut abaisser graduellement la température que possèdent les gaz provenant de l'explosion au moment où ils viennent au contact du grisou. Et dans chaque cas, on pourra mesurer cette température par une expérience faite dans la chaudière fonctionnant comme calorimètre. On a obtenu ainsi les résultats suivants : en entourant la cartouche d'un tube de plomb tel que la température des gaz de l'explosion fût abaissée à 2280°, l'inflammation se produit. Mais si, prenant un tube plus fort, on abaisse la température des gaz à 2150° environ, l'inflammation ne se produit plus. La température apparente d'inflammation du mélange grisouteux le plus inflammable peut donc être fixée à 2200° environ.

Ces expériences font ressortir en outre l'influence considérable que possède le travail effectué par les gaz de l'explosion sur le danger qui en résulte. On peut en déduire qu'un coup de mine est d'autant moins dangereux qu'il travaille plus, et par suite on doit apporter le plus grand soin au bourrage. Ce résultat est encore confirmé par les expériences suivantes : si dans un même tube on fait varier la densité de chargement, c'est-à-dire le rapport du volume occupé par l'explosif au volume total, le travail effectué par les gaz sera d'autant moindre que la densité de chargement sera plus faible. En effet les gaz, ayant subi une détente avant d'arriver au contact du tube, en pro-

¹ La variation de pression est proportionnelle, non à la température que prend le gaz, mais à la quantité de chaleur dégagée. C'est un véritable thermomètre à calories, comme le thermomètre de Diess et le thermocalorimètre de Favre et Silbermann.

jetteront les fragments avec une vitesse moindre que lorsque le contact est immédiat. L'abaissement de température subi de ce fait sera donc plus faible, et l'on constate en effet qu'un tube qui empêche l'inflammation de se produire lorsque la dynamite y est exactement bourrée, ne produit plus d'effet lorsque l'explosif est placé dans un mince tube de verre au milieu du tube de plomb.

On pourra donc diminuer beaucoup le danger présenté un explosif en ayant soin de l'employer de façon qu'il travaille le plus possible. Mais il peut se produire dans certains cas que le coup de mine débouffe et ne travaille pas. Comme il faut toujours prévoir les conditions les plus dangereuses, c'est donc la température de détonation à l'air libre que l'on devra déterminer.

La température de détonation d'un explosif T peut être calculée, quand on connaît la chaleur Q dégagée par la réaction et la chaleur spécifique moyenne C des produits de la combustion, au moyen de la formule :

$$Q = CT$$

Q se détermine au moyen de la chaudière transformée en calorimètre. On peut d'ailleurs le calculer directement au moyen des données thermochimiques quand on connaît les réactions qui se produisent. Les valeurs de C pour les différents gaz ont été données par MM. Mallard et le Châtelier sous forme d'expression à 2 termes telles que $C = a + bT$. On peut donc ainsi calculer la température T.

La température de détonation en vase clos peut se déterminer par une autre méthode quand on connaît la pression développée par l'explosion. Connaissant le volume et la pression d'une masse gazeuse, on peut par l'application des formules de Clausius, Sarrau ou Van der Waals, calculer la température. Les données nécessaires à ce calcul ont été fournies par de nombreuses expériences de MM. Berthelot, Sarrau et Vieille. En comparant les résultats fournis par ces deux méthodes, on a constaté que les résultats sont concordants, c'est-à-dire que les réactions sont les mêmes à l'air libre et en vase clos, pour quelques explosifs, entre autres la dynamite. Mais pour un grand nombre d'autres, il y a une différence indiquant que les réactions sont incomplètes à l'air libre. En général cela abaissera la température de détonation et par conséquent ne sera pas dangereux, mais il est certains cas où la détonation d'un explosif à l'air libre dégage plus de chaleur que la détonation en vase clos. Ce cas s'est présenté par exemple pour des coton-poudres peu nitrés, et s'explique par ce fait que les produits de la déto-

nation, étant combustibles, viennent brûler au contact de l'air. On devra donc chercher un explosif qui dans aucune condition ne présente un mode de décomposition capable d'enflammer le grisou. Parmi les explosifs simples, le seul dont la température de détonation soit inférieure à 2200° est l'azotate d'ammoniaque. Mais ce corps présente une très faible aptitude à la détonation et sa décomposition est toujours très incomplète. On est donc conduit à rechercher des explosifs binaires qui détonent facilement et dont la température de détonation soit suffisamment basse.

Ces explosifs peuvent être formés par le mélange avec un explosif donné, soit d'une substance inerte, soit d'une substance décomposable par la chaleur, soit enfin d'un autre explosif détonant à basse température, qui devra être par conséquent l'azotate d'ammoniaque.

Les deux premiers cas conduisent au même résultat : les expériences de la commission ont montré en effet que les substances décomposables par la chaleur, mélangées à l'explosif (carbonate de soude hydraté, chlorhydrate d'ammoniaque, etc.) n'ont pas le temps de subir une décomposition notable pendant la durée de l'explosion et se comportent par suite comme des substances inertes, comme la silice dans la dynamite. Il faut alors, pour obtenir un effet utile, augmenter considérablement la proportion de matière mélangée à l'explosif qui devient encombrant.

On est donc ramené à chercher des mélanges d'un explosif avec l'azotate d'ammoniaque. Ceux-ci se sépareront encore en deux groupes, suivant que les explosifs détoneront indépendamment l'un de l'autre, ou que les produits de la détonation pourront réagir mutuellement. La commission du grisou recommandait surtout dans le premier groupe les mélanges de dynamite et d'azotate d'ammoniaque ne renfermant pas plus de 40 % de dynamite et dans le 2^e groupe les mélanges de coton-poudre et d'azotate d'ammoniaque à 20 % de coton-poudre, les mélanges de binitro-benzine et d'azotate d'ammoniaque à 10 % de binitro-benzine.

Ces différents explosifs ont été essayés aux mines d'Anzin, Firminy, Blanz et Ronchamp en 1889. Les cartouches employées pesaient de 50 à 100 grammes. Il ne faut pas oublier en effet que le poids de l'explosif employé a une influence considérable sur la sécurité qu'on peut en attendre, et que les expériences de la commission n'ont jamais porté sur des cartouches de plus de 200 grammes. Le but de ces essais était principalement de déterminer si les nouveaux explosifs qui satisfont aux conditions reconnues nécessaires pour l'emploi dans les mines à grisou sont d'un usage commode et peuvent fournir un effet utile suffisant.

Les essais ont été très satisfaisants, mais les résultats fournis par les différentes mines peu concordants au point de vue de l'effet que peuvent produire les différents explosifs, ce qui tient à ce que les moyens de comparaison employés n'étaient pas les mêmes. Les résultats les plus probables indiquent que les mélanges à 20 et 30 % de dynamite possèdent une force explosive sensiblement égale aux $\frac{2}{3}$ de celle de la dynamite, soit le double de celle de la poudre noire.

En résumé, les expériences de la Commission relatives à l'emploi des explosifs dans les mines à

grisou ont montré nettement que l'inflammation se produit toujours (pour le mélange le plus inflammable) quand la température de détonation est supérieure à 2200°. Au-dessous de ce chiffre, l'inflammation peut se produire dans certains cas, mais d'autant plus difficilement que la température sera plus basse. A 1600°, on aura une sécurité très grande, et cette température peut être atteinte avec des explosifs présentant une aptitude suffisante à la détonation.

Georges Charpy.

Professeur de Chimie à l'École Monge.

LA TRÉPANATION DU CRANE

L'ouverture du crâne par la trépanation remonte aux temps préhistoriques. Les récentes recherches des anthropologistes français, Broca ¹, Prunières, de Mortillet établissent que nos ancêtres de l'époque néolithique eurent la hardiesse d'enlever sur leurs semblables des parcelles de la boîte crânienne. Dans le principe, l'opération eut un caractère sacré. Comme toutes les névroses convulsives, l'épilepsie (*morbus demoniacus*) dut être attribuée à quelque esprit mauvais enfermé dans la tête et la trépanation avait pour but de l'en faire sortir. Les opérés survivaient-ils, on les considérait comme des êtres surnaturels, dignes d'une haute vénération et on gardait après leur mort, à titre d'amulettes, des fragments de leur crâne, détachés au pourtour de l'orifice artificiel. Broca pense même que la tonsure des prêtres, qui a été signalée dans l'Inde avant l'ère chrétienne, n'est qu'un souvenir de cette initiation barbare.

I

C'est avec un silex qu'on pratiquait la trépanation dans l'âge de pierre. M. Lucas-Championnière ² a montré qu'avec un fragment de pierre taillée, mince et étroite, mise en mouvement de rotation par la main, on perforait un crâne en quelques secondes. C'est ainsi que les bergers de la Lozère ouvrent en vrillant, avec la pointe de leur couteau, le crâne de leurs moutons atteints de tourments (D^r Prunières) ³.

On retrouve encore la coutume de la trépanation très enracinée chez certaines peuplades de l'Océanie et surtout chez les Kabyles de l'Aurès, dans la province de Constantine. Les auteurs qui ont étudié les migrations humaines expliquent comment la tradition a

pu perpétuer chez ces tribus une pratique de la plus haute antiquité. Les populations de l'Aurès descendent des Numides qui avaient leur capitale à Cirta (la Constantine moderne); d'après Salluste, les Numides descendaient eux-mêmes des Perses qu'il considère comme des débris de l'armée d'Hercule (D^r Védrenes) ⁴.

Quoi qu'il en soit, l'usage de la trépanation est spécial aux indigènes du massif de l'Aurès, population d'humeur batailleuse, fréquemment exposée aux plaies de la tête. L'opération est le privilège des thébibs, prêtres trépaneurs qui y procèdent avec le *brima* (*tarière*). Conformément aux préceptes formulés dans le livre *El Harounéia*, « on panse avec de l'huile d'œuf et du lait de femme et on couvre le tout d'un morceau de plomb pour empêcher la matière cérébrale de sortir ». Les Aurasieus semblent se jouer de cette opération, qu'ils tiennent pour bénigne. Dans le village de Sidi Ocba un thoubib disait en 1881, à M. Lucas-Championnière, qu'il avait été trépané quatre fois et son père douze fois. Un seul de ces spécialistes compte à son actif 350 trépanations. Or, si l'on examine de près les trépanations préhistoriques, les ouvertures des crânes que le général Faidherbe a fait extraire des dolmens de Rocknia (province de Constantine), enfin les instruments des thébibs, on est conduit à penser que les Aurasieus sont, en matière de trépanation, les continuateurs de l'âge de pierre (fig. 1).

Avec Hippocrate l'opération devint classique. Il la pratiquait avec une couronne dentée qu'un archet mettait en mouvement. Celse décrit avec détails le trépan à couronne (*χρυσίς* des Grecs) et la tarière (*terebra*) ⁵. Au moyen âge l'opération était abandonnée à des empiriques « ciculatores », puis

¹ Broca. *Bulletin de la Société d'Anthropologie*, 1876.

² *Étude historique et clinique sur la trépanation du crâne*, 1878.

³ *Association Française*, Lille, 1874.

⁴ De la trépanation du crâne chez les indigènes de l'Aurès, *Revue de chirurgie*, 1883.

⁵ Celse. Livre VIII, chap. III.

avec Guy de Chauliac et Ambroise Paré elle revint en honneur. Vers le milieu du siècle dernier, les plus illustres représentants de l'Académie royale de chirurgie se prononcèrent en faveur du trépan :




Fig. 1. — Instruments des Kabyles de l'Aurès pour la trépanation; a, scie à dents larges; b, crochet fait d'un manche de cuiller; c, tarière.

tels Quesnoy et J. L. Petit. En Angleterre Percival Pott allait encore plus loin et professait que dans toutes les fractures du crâne, à très peu d'exception près, la trépanation s'imposait. C'était excessif. La réaction commença avec Desault, qui avait été découragé par la mortalité fréquente de ses opérés dans le déplorable milieu nosocomial de l'Hôtel-Dieu. Elle fut vigoureusement poursuivie en France par Malgaigne et Gama, et en Allemagne par Stromeyer, qui déclarait que, pour entreprendre l'opération, il fallait avoir soi-même la tête fêlée.

C'est de nos jours qu'une série de travaux remarquables ont réhabilité la trépanation. On trouve souvent citée l'opération hardie de Dupuytren qui ouvrit un abcès du cerveau après avoir trépané son malade. Celui-ci mourut quelque temps après. Broca, Trélat, Sedillot, le P^r Le Fort se sont montrés partisans convaincus du trépan. Legouest, interprétant les statistiques des guerres de Crimée et de Sécession en Amérique, arrivait à conclure qu'il faut trépaner « toutes les fois que l'on doute qu'il y a lieu de le faire ».

Les découvertes récentes des physiologistes sur les localisations cérébrales ont guidé les chirurgiens, tandis que l'avènement de la méthode antiseptique rendait l'opération de moins en moins grave.

En 1861, Broca découvrait dans la troisième circonvolution cérébrale frontale gauche le centre du langage articulé. Dix ans après, trépanant un aphasique à ce niveau, il évacuait un abcès, montrant ainsi la portée pratique de sa découverte. Depuis, les travaux de Fritsch et Hitzig (1874), de Ferrier, du P^r Charcot, d'Horsley ont établi qu'il existe sur l'écorce cérébrale, autour du sillon profond qui descend obliquement sur la face externe des hémisphères (sillon de Rolando) (fig. 2) une série de foyers




Fig. 2. — R, sillon de Rolando; C, cervelet; B, bulbe.

ou centres distincts dont les lésions se traduisent par des symptômes localisés : d'où la possibilité de conclure du symptôme à la lésion et d'aller par le trépan réparer les altérations qu'un traumatisme a déterminées. Les recherches de Broca qui enfonçait des fiches dans le cerveau à travers des trous percés à la vrille, celles de Féré, de la Foulhouse, Lucas-Championnière, Terrillon, Pozzi, ont ensuite précisé les rapports des divers centres corticaux avec les parois crâniennes et servi beaucoup la trépanation. « Localisons, localisons, écrivait M. Ledentu, dans son rapport à la Société de Chirurgie, il en restera toujours quelque chose »¹.

II

A l'heure actuelle, on a recours à la trépanation, soit après un traumatisme crânien, soit en dehors de tout traumatisme.

Contre les traumatismes graves du crâne qui sont très généralement des fractures, l'opération du trépan peut être appliquée à une période plus ou moins éloignée du jour de l'accident. Eu égard à ces périodes, le trépan est distingué d'abord en

¹ Bulletin de la Société de Chirurgie, Séance du 24 juillet 1878.

préventif et curatif. On dit qu'il est *préventif* lorsque, *prévenant* les complications qui pourraient survenir, il sert à débarrasser le cerveau d'une compression dangereuse. Tel est le cas d'une fracture avec enfoncement de fragments osseux dans la substance cérébrale. L'opération consiste alors à soulever la pièce osseuse qui blesse le cerveau et fait redouter l'apparition de troubles inflammatoires ou convulsifs. Il est dit *curatif* si des accidents se sont déclarés déjà, dont il faut guérir le blessé. Dans ce cas, on distingue trois variétés d'interventions chirurgicales, d'après le moment de la trépanation. Les accidents sont-ils immédiats, s'agit-il, par exemple, de faire cesser une compression de l'encéphale déterminée par un épanchement de sang qui s'étale entre sa surface et la boîte crânienne, et qui se révèle par une paralysie limitée à un membre supérieur, le trépan est *primitif*. Il est *consécutif* si déjà l'inflammation du cerveau et des méninges est venue compliquer la situation. Bien aléatoires sont alors ses bénéfices. On dit enfin qu'il est *tardiv* lorsque les premiers effets de l'accident étant dissipés, on l'applique (beaucoup plus efficacement alors) pour une paralysie limitée à une moitié du corps, à un bras, ou encore pour des douleurs intolérables persistant en un point fixe de la tête et privant le malade de tout sommeil, enfin, et surtout, pour les attaques d'épilepsie, dite traumatique, parce qu'elle succède aux lésions accidentelles et graves de la tête. C'est surtout contre les épilepsies traumatiques qu'on a eu recours à la trépanation tardive. Où convient-il alors d'appliquer la couronne de trépan? Souvent une cicatrice, une douleur fixe dirigeant le chirurgien, mais, si cet indice fait défaut, il lui reste les données de la localisation cérébrale. Horsley communiquait en 1886 à l'Association médicale britannique deux succès de trépanation fondés exclusivement sur la théorie des localisations cérébrales. Il trouvait une cicatrice sur l'écorce du cerveau, l'enlevait et les accès d'épilepsie disparaissaient. Telle est la valeur de cette théorie que, si l'indice extérieur se trouvait en désaccord avec elle, mieux vaudrait encore s'en référer à la théorie seule pour fixer le lieu du trépan. C'est l'avis du professeur Lannelongue¹. En se fondant sur cette seule doctrine des localisations, le P^r Demons (de Bordeaux) a pu guérir un malade de ses convulsions épileptiformes².

Des corps étrangers et surtout des projectiles de guerre pénètrent dans la boîte crânienne. Assez longtemps les chirurgiens militaires avaient tendance à trépaner dans ces circonstances pour aller à la recherche de ces projectiles; mais, après le

P^r Verneuil, après Otis, on y renonce aujourd'hui, se rappelant que, suivant l'expression de Guillaume de Salicet, « la nature se familiarise avec eux. » J'ai moi-même apporté des documents nouveaux à l'appui de l'abstention dans les coups de feu à la tête³.

Les heureux résultats déjà mentionnés, la sûreté que procurent et la doctrine des localisations cérébrales et la méthode antiseptique, ont rendu plus entreprenants les chirurgiens, et de nos jours on ne craint plus d'ouvrir le crâne en dehors du traumatisme pour enlever une tumeur de ses parois ou du cerveau. Grossmann le premier, dès 1695, a trépané pour une tumeur des méninges. Parmi les cas heureux on peut citer ceux de Mac Ewen, de Durante, de Horsley, de Péan⁴. La bénignité de la trépanation semble certaine en particulier pour les tumeurs de la paroi crânienne, puisque la thèse de Guary (1886) sur 8 cas mentionne 8 succès.

A diverses reprises, dans ces derniers temps, tant à l'Académie de Médecine qu'à la Société de Chirurgie, M. Lucas-Championnière est revenu sur l'innocuité et l'efficacité du trépan appliqué en dehors du traumatisme⁵. Il y a eu recours pour des douleurs avec bruits dans la tête et vertiges, pour des cas d'épilepsie native ou acquise, pour une hémorragie cérébrale avec succès complets ou partiels. En fait d'épilepsie, non seulement l'intervention a été innocente dans ses onze opérations, mais encore trois cas semblent être des guérisons définitives et trois autres ont assuré une amélioration notable.

Le résultat est d'autant meilleur que le sujet est plus jeune et que son cerveau n'a pas encore pris l'habitude invétérée de ces crises nerveuses. C'est aux médecins qu'il incombe de ne pas laisser passer pour leurs malades la période de l'intervention utile, après laquelle les efforts des chirurgiens restent infructueux. Pour assurer les résultats opératoires, l'administration prolongée du bromure de potassium s'impose dans la suite.

Une nouvelle preuve de l'innocuité de la trépanation est fournie par les heureux résultats qu'obtient M. Pasteur. Nombre de fois il a trépané ou fait trépaner, sans accidents, singes, chiens, lapins, pour inoculer la rage par la voie cérébrale.

Peut-être la trépanation agit-elle chez certains sujets en décomprimant l'encéphale, qui, au moment de l'ouverture des méninges, a paru comme enserré dans son enveloppe calcaire.

¹ Castex. Congrès français de Chirurgie, 1885. *Comptes-rendus*, p. 294.

² Académie de Médecine, 19 février 1889.

³ Bulletin de la Société de Chirurgie, 27 juin 1888. *Académie de médecine*, 20 août 1889.

⁴ Bulletin médical, 1 janvier 1888.

⁵ Congrès de Chirurgie, 1885.

Voici que le professeur Lannelongue vient de retrancher chez une fillette de quatre ans microcéphale un longue bande de paroi crânienne. Je n'insiste pas davantage, les lecteurs de la *Revue* ayant pris connaissance de l'importante étude du P^r Lannelongue dans le numéro du 15 juillet dernier.

Horsley (de Londres), vient de déclarer au Congrès de Berlin que l'intervention opératoire est indiquée toutes les fois que le cerveau a été atteint par un accident grave, surtout s'il s'agit d'un enfant qu'on peut ainsi préserver de l'épilepsie, de la démence ou d'un arrêt de développement. Même dans le cas de tumeur trop volumineuse pour être enlevée en totalité, il veut qu'on opère. L'extirpation ne fut-elle que partielle, le soulagement procuré au malade sera considérable. C'est cette ligne de conduite que nous avons adoptée récemment avec mon ami le D^r Regnier, chirurgien de l'hôpital Tenon, dans un cas de trépanation pour tumeur des méninges. L'opération est trop récente pour que le résultat nous soit connu.

G. Burekhardt fait plus encore : il applique la trépanation à divers types de folie. Le cerveau mis à nu, il en retranche telle circonvolution que la physiologie lui signale comme pouvant être le foyer des hallucinations et trois fois sur six, nous dit-il, le résultat a été satisfaisant.

Il est difficile d'aller plus loin dans cette voie que ne le fait W. Keen (de Philadelphie) pour les hydrocéphales. Il les trépane, puis enfonce un drain de caoutchouc dans la cavité qui occupe le centre de chaque hémisphère cérébral et qu'on désigne sous le nom de ventricule latéral; après quoi, il fait passer, d'un ventricule à l'autre, une solution tiède d'acide borique, et le malade de déclarer aussitôt : « Cela fait du bien. »

Cette chirurgie ne dépasse-t-elle pas les bornes? L'avenir répondra.

III

Par quel procédé topographique le chirurgien parvient-il à marquer sur la boîte crânienne le point correspondant au centre de l'écorce cérébrale qu'il se propose d'atteindre? J'ai dit que la plupart des foyers fonctionnels récemment découverts sont disposés autour du sillon de Rolando qui descend obliquement en avant sur la partie moyenne des hémisphères. Le problème est de marquer ce sillon sur le crâne pour choisir ensuite tel foyer particulièrement visé.

Voici le procédé que recommande M. Lucas-Championnière (fig. 3). Mener à partir de l'apophyse orbitaire (a) une horizontale de sept centimètres. Elever à son extrémité (b) une perpendiculaire de trois centimètres. C'est là le point inférieur du sillon rolandique (c). Pour avoir son extrémité

supérieure, marquer sur le sommet du crâne, avec l'équerre flexible de Broca la ligne verticale qui passe par les deux conduits auditifs. A quarante-sept millimètres en arrière (d) de ce point-sommet qui est le bregma, se trouve l'extrémité supérieure de la scissure de Rolando.




Fig. 3. — Tracé topographique du sillon de Rolando.

Dans un mémoire qui va paraître incessamment et qu'il a bien voulu me communiquer, le D^r Poirier précise et étend encore nos connaissances en topographie cranio-encéphalique. Il donne de nouveaux repères pour la découverte des centres sensoriels. J'y renvoie le lecteur.

La technique opératoire ne doit pas m'arrêter ici. Il me suffira de dire que le trépan actuel consiste en un cylindre-denté qu'un vibrequin met en rotation. Il en existe de différents diamètres. En appliquant plusieurs couronnes à côté les unes des autres ou en attaquant les bords de la brèche osseuse avec une pince-gouge, on parvient à découvrir toute la portion voulue de l'écorce cérébrale. Ultérieurement l'os peut se reproduire; mais, à son défaut, la vaste baie se couvre d'un tissu résistant qui protège suffisamment l'organe. Des expériences sur la réimplantation des rondelles osseuses après la trépanation, communiquées à l'Académie de Médecine (30 octobre 1888), par mon ami le D^r Mossé, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier, il est permis de conclure que, dans certaines conditions données, on peut compter sur la réussite de cette greffe.

Wagner exécute des résections temporaires de la paroi crânienne, en réappliquant la portion soulevée, à la fin de l'opération².

Telle est, rapidement esquissée, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, l'histoire de la trépanation. Nous avons vu, dans ces dernières années, la chirurgie diriger successivement ses tentatives vers les grandes cavités du corps, abdomen, poitrine, articulations et obtenir de brillants succès là où des échecs réitérés avaient découragé nos devanciers. Dans cette suite d'efforts heureux la chirurgie de cerveau semble être l'importante question du jour.

D^r And. Castex.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques.

Sinigaglia (F.), ingénieur. — *Traité des machines à vapeur*, traduit par M. de Billy, ingénieur des mines, avec une préface de M. H. LÉAUTÉ, membre de l'Académie des Sciences, O. Doit, Paris, 1890.

La littérature des machines à vapeur vient de s'enrichir d'un ouvrage nouveau par sa forme autant que par son contenu, le *Traité des machines à vapeur* de notre distingué collaborateur, l'ingénieur italien F. Sinigaglia. Son but est de fournir au constructeur les moyens de mettre à profit les faits révélés par la thermodynamique appliquée à l'étude physiologique des machines à vapeur, et aussi les nouvelles conquêtes de la science au sujet de la régularisation du mouvement. L'auteur ne s'attarde pas à exposer la théorie mathématique de la chaleur, il entre droit au cœur du sujet, s'adressant à un public en possession des lois fondamentales et notamment de la notion de l'équivalent mécanique de la calorie. Il lui présente tout d'abord, avec une méthode plus réelle qu'apparente, un amas de faits groupés et reliés entre eux par une sorte de ciment principalement composé de bon sens, d'où sont écartées les broussailles de formules compliquées. En s'arrêtant à la lecture de ces renseignements présentés dans toute leur simplicité, le constructeur, comme l'acheteur des machines, aura déjà trouvé d'utiles avis. Mais l'auteur va plus loin; il formule, comme je l'ai fait moi-même le premier en 1880, la théorie expérimentale de Hirn, sa *théorie pratique*, applicable non à l'étude d'un projet, mais à celle de la marche la plus économique d'un moteur exécuté; et il l'étend aux machines polycylindriques. Nécessairement, il y fallait ajouter des conseils précis et formels pour la rédaction des projets, et c'est ce qu'a fait M. Sinigaglia dans la seconde partie de son ouvrage.

La tâche qu'il s'est proposée n'est ni si modeste ni si aisée qu'il paraît à première lecture. L'auteur parle, il est vrai, pour ceux qui ont des notions positives sur la chaleur et la vapeur et les moteurs thermiques, et son livre n'aurait d'autre introduction que le rappel de certaines définitions, unités de mesure, notations, etc., si le savant académicien, M. Léauté, n'avait déposé au seuil même un petit chef-d'œuvre qui invite avec grâce à pénétrer plus avant, mais sans cacher les difficultés dont sont hérissés les problèmes posés. Là, nous voyons dans ses grandes lignes l'histoire du développement de la machine à vapeur depuis sa naissance jusqu'à nos jours, l'exposition des questions qu'elle a posées à la pratique, et, parmi elles, celles qui ont reçu une solution définitive acceptée dans le domaine public, et celles sur lesquelles l'accord n'est pas établi, et qui font l'objet des méditations et des expériences des amis du progrès. Parmi ces dernières, M. Léauté signale spécialement les hautes pressions, les grandes vitesses, le meilleur degré de détente, la multiplicité des cylindres, les enveloppes, la surchauffe, la compression dans l'espace mort.

Sur toutes ces questions pendantes, M. Sinigaglia donne son opinion, non basée sur des raisonnements dont l'apparence est souvent plus séduisante que le fond réel, mais sur des faits qu'il expose tout d'abord et qu'il recueille dans les écrits des maîtres en l'art d'expérimenter et d'interpréter les résultats de l'expérience, Hirn, Hallauer, Mair, Willans, etc. Cet ensemble de documents bien choisis et bien classés donne de l'autorité à l'opinion qu'il émet sur les machines à plusieurs cylindres en cascade et qui n'est pas entiè-

rement conforme à celle qui prévalait aujourd'hui, qui est à la mode, oserait-on dire peut-être. Avec la réserve des hommes habitués à considérer la nature telle qu'elle est, dépourvue des déguisements que lui prête l'imagination, l'auteur cherche dans quelles conditions et pour quelles raisons, ce sont tantôt les machines monocylindriques qui ont la supériorité, tantôt les polycylindriques; dans quels cas les unes ou les autres répondent mieux aux circonstances locales. « En résumé, dit-il, dans bien des cas il y aura des raisons d'ordre pratique qui feront préférer les machines Compound aux machines simples. En particulier elles permettront d'employer favorablement les hautes pressions, ce qui est certainement un avantage.... Aujourd'hui la tendance des constructeurs est d'augmenter les applications des machines à plusieurs cylindres. Ceci s'explique parfaitement, nous l'avons dit, pour les machines marines. Mais à mon sens on exagère dans bien des cas et pour les pressions ordinaires, lorsqu'il s'agit de machines fixes où l'on peut obtenir une marche bien régulière, par l'emploi d'un volant et par l'accomplissement de plusieurs machines à un cylindre, ce qui conduit au même résultat avec des frais d'installation et d'entretien bien moindres. On ne peut obtenir une bonne répartition du travail entre les cylindres pour les divers degrés de détente qu'en muissant le cylindre à basse pression d'une détente variable dont le mécanisme compique la machine.... On conçoit que le prix doive entrer en ligne de compte. Enfin la machine à un cylindre se prête mieux à travailler sous des régimes différents, sans compter que la détermination a priori de ses éléments est moins incertaine... » On trouve ensuite un parallèle savamment établi par M. Bour (de Lyon) entre les détentes polycylindriques appliquées soit aux machines marines soit aux machines fixes; et sa conclusion est que la multiplicité des cylindres, favorable au cas des machines marines, n'est pas désirable pour les machines fixes.

Il serait trop long d'énumérer ici les opinions émises par M. Sinigaglia sur les différentes questions énoncées ci-dessus. L'exemple précédent suffit pour démontrer qu'elles n'ont rien d'absolu, mais que, sagement, elles tiennent compte de tous les éléments qui interviennent.

Dans la deuxième partie de son ouvrage, l'auteur essaie d'établir des formules nécessaires à la détermination des dimensions du cylindre et de la consommation probable de vapeur. Il corrige l'ancienne formule qui ne tenait compte ni de la dépression pendant l'admission, ni des avances, ni de la compression, ni de la surpression à la décharge; il conserve la facile loi de Mariotte pour la détente et l'adopte pour la compression. Tenant compte de toutes ces circonstances, il constitue un diagramme probable, qu'il nomme diagramme prévu, et qui lui sert au calcul des éléments principaux susdits, tant pour les machines monocylindriques que pour les compound ou les machines à triple expansion.

Il corrige enfin le diagramme prévu pour avoir égard aux forces d'inertie des pièces à mouvement alternatif; c'est l'objet d'un chapitre spécial où il est traité non seulement au point de vue de la recherche des dimensions des pièces, mais encore de l'effet de ces forces d'inertie sur la régularité de la marche. L'étude de ces forces et de leurs variations est hérissée de difficultés mathématiques dont il importait de se débarrasser au prix d'un peu d'inexactitude; M. Sinigaglia suppose la vitesse de rotation constante et la bielle infinie d'abord et finie ensuite, et établit sur cette hypothèse la recherche de l'accélération des pièces en

question. De là il déduit la grandeur de la réaction à chaque instant, la rapporte à l'unité de surface du piston comme la pression de la vapeur; il l'introduit dans le diagramme prévu, en transformant celui-ci d'abord de manière que l'ordonnée du diagramme transformé représente la résultante de la pression et de la contrepression de la vapeur sur le piston. A cette résultante il ajoute ou retranche la réaction d'inertie calculée et ainsi obtient le diagramme corrigé ou définitif. Ce dernier, bien entendu, varie avec la vitesse de rotation de la machine; mais, en tenant compte de cette circonstance, on peut l'utiliser notamment au calcul du volant. A cet effet on trace deux diagrammes des efforts effectifs exercés par l'intermédiaire de la bielle et estimés suivant la direction de la tangente à la circonférence décrite par le centre du bouton de la manivelle : dans l'un n'entre que la pression de la vapeur seulement, dans l'autre en outre la réaction de l'inertie. Il est ainsi facile de voir que les masses en mouvement alternatif contribuent pour leur part à la régularisation du mouvement de rotation. La conclusion est que, dans le calcul du poids à donner au volant, il vaut mieux n'en pas tenir compte. Mais dans le calcul des dimensions des autres pièces, c'est une nécessité qui s'impose surtout au cas des grandes vitesses de rotation.

L'établissement des régulateurs de vitesse entraine nécessairement dans le cadre de l'ouvrage de M. Sinigaglia.

En 1878, M. Charles Beer et moi, nous avons publié (chez Desoer à Liège) une *Théorie nouvelle des régulateurs* dans laquelle nous avons égard à un élément de la plus haute importance qui, jusque là, n'avait pas été pris en considération : la résistance que les communicateurs opposent au mouvement du manchon, qu'il tende à descendre ou à monter, et qui s'exerce dans un sens ou dans l'autre, toujours contrairement à cette tendance. Les théories précédentes avaient simplement étudié le *tachomètre isolé*, comme s'il n'avait eu aucune liaison avec la machine dont il devait régulariser la marche. On cherchait la vitesse qui, pour une position donnée du manchon, établissait l'équilibre entre la force centrifuge, le poids des masses centrifuges et celui du manchon ; on négligeait même les frottements ou résistances internes du tachomètre qui s'opposaient au mouvement du manchon quand il y avait une petite altération de la vitesse de rotation. L'idéal a longtemps été de composer un tachomètre *isochrone*, c'est-à-dire pour lequel la *vitesse* d'équilibre fût la même pour toutes les positions du manchon ; ou tout au moins *quasi-isochrone*, pour lequel la *vitesse* d'équilibre fût la même pour les positions extrêmes du manchon et peu différente pour les positions intermédiaires. Les tachomètres ainsi calculés étaient appliqués à des machines à vapeur pour en régulariser le mouvement et l'on ne remarquait pas que les conditions réelles de marche seraient tout autres que les conditions purement imaginaires qu'on avait supposées, dès le moment où le tachomètre aurait à faire le travail nécessaire pour surmonter les résistances opposées par les communicateurs au mouvement du manchon. Car on ne peut déplacer les pièces qui commandent l'admission de la vapeur au cylindre sans vaincre des efforts parfois grands, toujours déterminés, et absolument indépendants du tachomètre lui-même. Le résultat était tout différent des prévisions : on le corrigeait avec plus ou moins de succès en tâtonnant. On avait évité bien des mécomptes si l'on avait introduit dans les calculs la résistance que nous nommerons R_1 , qui s'oppose à ce que le manchon obéisse sans délai aux moindres variations de la vitesse de rotation. Ces résistances se composent d'abord des frottements internes R_1 , et ensuite des efforts pour mouvoir les organes modificateurs de la force motrice de la machine, dont nous appellerons R_2 l'équivalent estimé suivant la direction du mouvement du manchon. Ainsi l'on a $R = R_1 + R_2$.

Afin de montrer d'une manière plus frappante l'effet

de la prise en considération de ces résistances, nous prendrons l'exemple d'un pendule de Watt que nous considérerons comme tachomètre isolé, avec ses frottements internes seulement, et non relié à aucune machine pour la régler. Supposons qu'au premier moment considéré, le manchon soit au milieu de sa course et que la vitesse de rotation soit telle qu'il ne bouge pas de cette position. On croirait pouvoir dire qu'il y a en ce moment équilibre entre la force centrifuge et la pesanteur agissant sur les boules et le manchon. Il peut cependant n'en être rien : en effet, admettons qu'au départ cet équilibre soit réel, mais que la vitesse vienne à augmenter petit à petit et d'une manière continue. Alors les boules acquièrent une tendance à s'écarter et à faire monter le manchon, et elles le feraient effectivement monter dès le premier instant, si cette tendance même ne donnait naissance à des frottements dans les articulations. A mesure que la vitesse augmente, la tendance à élever le manchon, augmentant aussi, fait croître le frottement. Mais le frottement atteint bientôt une valeur maxima, et à un moment donné, il y a équilibre strict entre les forces qui agissent réellement sur l'appareil, la force centrifuge, la pesanteur et ce frottement ou résistance R_1 . A partir de là, si la vitesse, devenue w , continue à croître, le moindre excès fait commencer l'ascension du manchon. Si la vitesse d'équilibre réel (R_1 compris), est la même et égale à w dans les positions supérieures du manchon, rien ne l'empêchera d'aller jusqu'en haut et de venir frapper avec plus ou moins d'énergie la bague supérieure. L'énergie sera d'autant plus grande, pour un même excès de vitesse, que la masse à mouvoir (réduite au manchon) sera plus petite. Le tachomètre sera *instable* pour cette vitesse w . Si, au contraire, dans les positions suivantes, la vitesse d'équilibre réel était plus grande que w , le manchon pourrait s'arrêter avant d'arriver à la bague supérieure, ou tout au moins son mouvement d'ascension serait retardé, toutes choses étant égales d'ailleurs. Ainsi le tachomètre aurait plus de *stabilité*. Le diagramme dont les ordonnées seraient égales aux distances du manchon à sa position inférieure et les abscisses proportionnelles aux vitesses w , serait donc propre à montrer le plus ou moins de stabilité du tachomètre.

Les mêmes phénomènes se seraient produits en sens inverse, si, au lieu de croire dès l'origine, la vitesse de rotation avait diminué jusqu'au moment où le frottement évoqué, R_1 , qui s'oppose à la descente du manchon, aurait été vaincu par la pesanteur. Soit v la vitesse de rotation à ce moment précis ; c'est la *vitesse d'équilibre à la descente*. Elle est plus petite que la *vitesse d'équilibre à l'ascension*, w . On voit donc qu'il existe deux vitesses d'équilibre et non pas une seulement. Et pour toute vitesse comprise entre v et w , le manchon n'est pas en équilibre, mais il ne bouge pas. Le tachomètre est *insensible* à toute variation de vitesse qui ne fait pas dépasser les limites v et w . La *sensibilité* du tachomètre est donc d'autant plus grande que $w - v$ est plus petit ; et, si l'on représente par u une vitesse moyenne de régime à laquelle on compare les autres, on appellera *coefficient de sensibilité* le rapport $\frac{u}{w - v}$. Les

vitesses w et v ne sont différentes que parce que la résistance R_1 , due aux frottements existe en réalité. Le seul tachomètre qui aurait une sensibilité infinie serait donc celui où tout frottement aurait été supprimé, ce qui est impossible. Mais, qu'on le remarque, le tachomètre *isochrone* avec frottements n'est ni plus ni moins sensible qu'un autre avec les mêmes frottements. Il importe donc de ne pas confondre sensibilité avec stabilité.

Ce qui précède suffit pour faire voir que si, en faisant la théorie des régulateurs, on n'a pas égard à la résistance R au manchon, on ne parvient même pas à donner une définition acceptable de la *sensibilité* d'un tachomètre ; à plus forte raison de celle d'un régulateur appliqué à une machine et mis là pour surmonter des

résistances extérieures en vue de déplacer les modificateurs de la force motrice de la machine. On a souvent confondu la sensibilité avec l'affolement des régulateurs isochrones et obscurci les idées les plus claires, faute d'avoir égard à la résistance R. En 1878, et pour la première fois, il a été remarqué par M. Beer et moi qu'il y avait pour tout régulateur deux vitesses d'équilibre à chaque position du manchon; et non pas une seulement. Et nous en avons donné le diagramme double, ce qui nous a permis d'ausculter les régulateurs et de nous assurer si et dans quels cas ils avaient les qualités vantées par leurs inventeurs.

M. Sinigaglia a suivi notre méthode jusqu'à un certain point. Après avoir exposé la théorie du tachomètre isolé et sans résistance interne (une seule vitesse d'équilibre), il passe à celle du régulateur avec une résistance R au mouvement du manchon; mais il est resté attaché, au fond, à la théorie ancienne et généralement reçue; et je dois reconnaître que je suis loin d'être d'accord avec les adeptes de cette théorie non seulement sur certaines dénominations que mon ami a adoptées, mais même sur les meilleures conditions de fonctionnement d'un régulateur. A ce sujet donc je fais mes réserves, en me hâtant d'ajouter que je tiens toute son œuvre en très haute estime; j'ai la conviction que praticiens et théoriciens en reconnaîtront le mérite et l'utilité.

V. DWELSHAUVERS-DERY.

2° Sciences physiques.

Vogt. — Sur le rapport des deux coefficients d'élasticité des corps isotropes. (*Wied. Ann.*, décembre 1889.)

Les propriétés élastiques d'un corps solide homogène et isotrope sont complètement déterminées quand on connaît deux coefficients caractéristiques, qui sont les coefficients d'élasticité du corps. En introduisant dans la théorie une hypothèse complémentaire, à savoir que les forces élastiques sont des résultantes d'actions exercées entre les molécules prises deux à deux, et que l'action mutuelle entre deux molécules données s'exerce toujours comme si elles étaient seules, et ne dépend point des molécules environnantes, Poisson faisait dépendre la connaissance de toutes les propriétés élastiques d'un corps isotrope, d'une constante unique: entre les deux coefficients précédents devait exister, selon lui, un rapport qui serait le même pour tous les corps isotropes: ce rapport σ devait être égal à $\frac{1}{2}$.

Or, l'expérience n'a pas vérifié cette conclusion. Le nombre σ a une signification physique simple. Un prisme soumis à une traction dans le sens de sa longueur, subit un allongement dans ce sens, et en même temps une contraction latérale: sa section se rétrécit. Si on suppose que le prisme devient un cube, le rapport de la contraction latérale à l'allongement est précisément σ . On a pu ainsi mesurer σ pour plusieurs corps solides; on ne l'a trouvé égal à $\frac{1}{2}$ que pour quelques-uns, comme le verre de Saint-Gobain; dans d'autres, dans les métaux par exemple, σ a des valeurs fort différentes de $\frac{1}{2}$. En doit-on conclure que l'hypothèse introduite par Poisson est inexacte?

M. Vogt ne le pense pas. Il attribue l'écart entre la théorie et l'expérience à un défaut d'isotropie des solides étudiés. Sans doute ces solides pris dans leur ensemble peuvent avoir les mêmes propriétés dans toutes les directions; mais il peut arriver, et c'est très probablement le cas pour les métaux, qu'ils soient constitués par des éléments cristallisés orientés de toutes les manières possibles. A ces corps, que M. Vogt appelle *quasi-isotropes*, on n'est pas en droit d'appliquer les modes de raisonnement qui conviennent aux corps isotropes.

En supposant les éléments cristallisés qui constituent le corps *quasi-isotrope* très petits par rapport aux dimensions du corps, mais grands par rapport au

rayon d'activité moléculaire, et composés eux-mêmes de molécules auxquelles l'hypothèse de Poisson est applicable, M. Vogt arrive par le calcul à cette conclusion, que les propriétés élastiques des corps *quasi-isotropes* sont définies par la connaissance de deux coefficients; et que le rapport σ entre ces coefficients, variable avec le corps considéré, est complètement déterminé quand on connaît la forme cristalline de l'élément constituant et les propriétés élastiques d'un pareil cristal. Si les éléments constituants étaient isotropes eux-mêmes, on retrouverait le résultat de Poisson $\sigma = \frac{1}{2}$.

Restait à chercher des vérifications expérimentales. M. Vogt en a donné quelques-unes. Il détermine les coefficients d'élasticité d'un corps qui peut exister soit à l'état amorphe soit à l'état cristallisé; et il calcule le rapport σ des coefficients du corps amorphe en admettant qu'il soit formé de cristaux élémentaires identiques aux cristaux connus de la même substance: l'accord entre le calcul et l'observation est assez satisfaisant.

Bernard BRUNHES.

Walter, — Doumer, — Barbier et Roux. — Indices de réfraction des solutions salines. 1889-90¹.

M. Walter, étudiant la réfraction des solutions salines, trouve qu'elle est soumise à des lois analogues à celles que présente l'abaissement du point de congélation. Ainsi, l'indice de réfraction d'une solution saline est proportionnelle à la quantité de sel dissous; des solutions contenant le même nombre de molécules de sels analogues possèdent le même indice de réfraction.

A la suite de la publication de ce mémoire, MM. Doumer d'une part, Barbier et Roux d'autre part, ont présenté à l'Académie des Sciences, des recherches sur le même sujet.

Il est intéressant de comparer les résultats obtenus, les trois séries de recherches n'ayant pas été dirigées de la même manière.

M. Walter considère l'expression $\frac{n-n_0}{p}$ (n étant l'indice de la solution, n_0 celui de l'eau, p le poids de sel anhydre dissous dans 100 grammes du mélange) et considère les solutions assez concentrées pour que cette expression qu'il appelle pouvoir réfringent ait une valeur constante. Il trouve ainsi, que les pouvoirs réfringents moléculaires (c'est-à-dire les produits des pouvoirs réfringents par les poids moléculaires), ont la même valeur pour les sels formés par des métaux monoatomiques et des acides monobasiques. Les sels des métaux monoatomiques et acides bibasiques ont un pouvoir réfringent moléculaire qui est sensiblement le double du précédent, et, enfin, les sels des métaux diatomiques et acides bibasiques conduisent à une valeur triple.

M. Doumer désigne sous le nom de pouvoir réfringent l'expression $\frac{n^2-n_0^2}{d}$, d étant la densité du sel

dans la solution, c'est-à-dire le poids de sel contenu dans l'unité de volume de la dissolution; et il considère les solutions dans un état de dilution tel que la densité d , prise par rapport à l'hydrogène, soit égale au poids moléculaire du sel. Dans ces conditions, ses recherches le conduisent à énoncer la loi suivante.

Les pouvoirs réfringents moléculaires des sels, qui appartiennent à des types différents, sont sensiblement des multiples d'un même nombre. La valeur de ce multiple est déterminée par la valence de l'élément métallique qui entre dans la composition du sel.

Enfin MM. Barbier et Roux ont étudié le pouvoir dispersif des solutions salines. Ils appellent pouvoir dis-

¹ Walter, *Wiedemann Annalen*, n° 9, 1889. — Doumer, *Comptes rendus*, 6 janvier, 20 janvier, 5 mai, 1890. — Barbier et Roux, *Comptes rendus*, 3 mars, 10 mars 1890.

persif le coefficient B de la formule de Cauchy qui donne l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde.

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

MM. Barbier et Roux trouvent que le pouvoir dispersif reste, pour un grand nombre de sels, proportionnel à la concentration, celle-ci variant de 100 grammes par litre jusqu'à la saturation.

Le quotient du pouvoir dispersif par la densité, varie très lentement avec la concentration, et, si l'on prend la valeur moyenne pour les différents sels, on trouve une valeur sensiblement constante. Cette valeur moyenne n'est pas très bien définie, puisque les limites de concentration ne sont pas les mêmes pour les différents sels; aussi les valeurs données par MM. Barbier et Roux oscillent-elles entre 0,310 et 0,396, c'est-à-dire qu'on a des variations de plus de 20 %. Ce n'est donc là qu'une constance très relative.

Quand on calcule l'accroissement moléculaire de dispersion, c'est-à-dire la quantité $\frac{B-b}{p}$, B, b étant le

pouvoir dispersif de la solution, b celui de l'eau, p le poid sel contenu dans un litre, M le poids moléculaire, on trouve des valeurs sensiblement constantes pour les sels du même type. Si l'on considère en particulier les chlorures, les chlorures MCl donnent une valeur moyenne de 0,020, les chlorures MCl₂ donnent 0,044, valeur très voisine du double de la précédente.

Georges CHARPY.

3^e Sciences naturelles.

Rothpletz (A). — *Das Karwendelgebirge. In-8* 75 p. 29 fig. dans le texte, 9 pl. et 1 carte géol. Munich, 1888 (*Extrait du Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins*).

Le massif du Karwendel (2753 m.) qui fait partie de la zone calcaire septentrionale des Alpes, se dresse entre la vallée de l'Isar et la dépression de l'Achensee, à la limite entre Tyrol et la Bavière, sur le méridien de Munich ou d'Innsbrück. Il y a quelques années, le Club Alpin Allemand-Autrichien prit l'initiative d'en faire relever une carte topographique et géologique à l'échelle du 1 : 50 000. Le travail de M. Rothpletz est le fruit de cet ensemble de recherches, auxquelles ont pris part MM. W. Clark, Eb. Fraas, G. Geyer, O. Reis, R. Schaefer et l'auteur.

Nous n'aurions pas parlé de cette monographie locale, abondamment illustrée de coupes et de vues pittoresques, si M. Rothpletz n'y avait développé des considérations qui présentent une certaine importance pour l'orogénie des Alpes et des chaînes de montagnes en général.

La région décrite est constituée par une série de crêtes parallèles, orientées de l'E. à l'O., et où les calcaires et les dolomies triasiques jouent le rôle principal; ces crêtes, ainsi que les vallées intermédiaires, se montrent en relation avec autant de plis synclinaux et anticlinaux, dirigés de la même manière et tronqués, dans le sens transversal, par de nombreux décrochements horizontaux. Le régime structural du Karwendel est donc essentiellement celui d'une zone plissée; mais M. Rothpletz, frappé de certaines déviations locales qui ne lui paraissent pas susceptibles de rentrer dans le plan d'ensemble des rides alpines, est amené à proposer l'explication suivante: Avant d'être plissée, la région a été morcelée par un grand nombre de cassures, qui en ont dénivelé la masse dans tous les sens, sans toutefois faire disparaître l'horizontalité primitive des couches. Malheureusement, cette hypothèse, qui n'a rien d'admissible en elle-même, n'est étayée, il faut bien le reconnaître, sur aucun fait probant: il suffit de comparer les deux coupes données par M. Rothpletz, l'une réelle, l'autre reconstituée en supprimant les

plis (pl. XI.) pour sentir combien elle est artificielle, et combien l'hypothèse contraire, de failles consécutives au plissement, est plus en harmonie avec les faits.

Autrefois, les géologues voyaient des failles partout et des plis nulle part: le compromis proposé par M. Rothpletz nous paraît un dernier reste de cette habitude fâcheuse; et nous serions tenté de croire également que l'importance attribuée aux cassures, dans la carte du Karwendel et dans les coupes qui l'accompagnent, est excessive. Rappelons-nous ce que sont devenues les « failles » de Lory dans les Alpes Occidentales et celles de Magnan dans les Pyrénées: il devient manifeste aujourd'hui que ces accidents ne sont que des plis exagérés, comme l'ont toujours dit les géologues suisses. Le même sort est sans doute réservé à une bonne parties des prétendues « failles préalpines » du professeur de Munich.

La carte jointe au mémoire comprend quinze divisions stratigraphiques, dont dix pour le Trias et le Rhétien.

EMM. DE MARGERIE.

Lalanne (G.) — *Recherches sur les catactères anatomiques des feuilles persistantes. Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris, 1890.*

Des plantes très voisines, appartenant parfois au même genre, possèdent, les unes des feuilles caduques, les autres des feuilles persistantes. Il était intéressant de rechercher par quelle suite d'adaptations, des différences aussi profondes ont pu s'établir. Le travail de M. Lalanne, consacré tout entier à cette étude, comprend deux parties principales: dans la première, il suit les modifications qui apparaissent dans la structure des feuilles persistantes aux diverses phases de leur existence; dans la seconde, il compare la structure des feuilles persistantes et des feuilles caduques chez les diverses espèces d'un même genre.

Nous n'insisterons pas sur les caractères qui s'établissent peu à peu chez les feuilles persistantes: épaissement et parfois lignification des membranes des cellules épidermiques; présence d'un grand nombre de stomates; développement inusité du collenchyme; existence de formations subéreuses, etc. C'est qu'en effet, il n'est peut-être pas très légitime de considérer ces caractères, qui s'établissent souvent fort tard, comme étant la cause intime d'une longue durée, puisqu'ils peuvent tout aussi bien en être la conséquence. Laisant de côté ces détails, nous signalerons deux faits mis en lumière par l'auteur. D'abord, il a trouvé que les diverses feuilles appartenant à une même pousse paraissent présenter, au moins dans le nombre et la disposition de leurs faisceaux libéro-ligneux, une dégradation successive à mesure qu'on va de la feuille la plus inférieure de la pousse à la feuille la plus élevée. Ensuite il a constaté que le système formé, sur la section transversale du pétiole, par l'ensemble du faisceau libéro-ligneux, est susceptible de modifier peu à peu sa disposition; si, par exemple, ce système ne représente pas une courbe fermée au début de la première année d'existence, cette courbe peut se compléter, soit à la fin de la première année, soit au commencement de la deuxième.

Ces deux faits, qui se dégagent du travail de M. Lalanne, ne manquent pas d'importance, et méritent d'attirer l'attention des botanistes qui ont cru trouver dans la structure des feuilles, et surtout dans l'arrangement des faisceaux du pétiole, des caractères taxinomiques de première valeur.

Nous nous permettrons une légère critique. Dans un travail de cette nature, l'histiologie devait tenir la première place, et, en effet, l'auteur s'étend longuement dans le texte sur les modifications que subissent les membranes de certaines cellules; mais, il nous semble qu'il pourrait peut-être accorder plus d'attention au contenu de ces mêmes cellules, et aux substan-

ces de réserve qui peuvent y être accumulées. Enfin, les planches laissent quelque peu à désirer. Nous n'y verrons que demi-mal, si ce résultat engage une fois pour toutes les éditeurs à ne plus faire exécuter à l'étranger des travaux que les graveurs français peuvent mener à bien.

Henri LECOMTE.

Heymans (G.-F.). — Exposé de l'état actuel de nos connaissances et observations personnelles sur la terminaison des nerfs dans les muscles lisses de la sangsue. Une broch., in-4° de 63 pages avec 4 planches. Bruxelles, 1889.

Après avoir donné une liste bibliographique complète des travaux publiés sur l'innervation des muscles lisses en général, l'auteur résume avec soin les recherches de ses devanciers Gschleider, Ranvier, Hansen et Vignal, sur les terminaisons nerveuses dans les muscles lisses du tube digestif et des vaisseaux, et dans les muscles du corps de la sangsue. Dans la seconde partie de son travail, M. Heymans expose les résultats de ses recherches personnelles. La méthode qu'il a employée est celle de M. Ranvier : traitement par le jus de citron, puis par le chlorure d'or au centième et réduction dans une solution d'acide formique au quart.

En poursuivant ses études sur les terminaisons nerveuses dans les muscles, l'auteur a découvert dans le tube digestif de la sangsue, au-dessous de la couche musculaire circulaire déjà connue, une couche musculaire longitudinale formée de fibres lisses à ramifications et anastomoses nombreuses, et constituant un réseau contractile continu. Il a reconnu également que le système nerveux viscéral qui entoure le tube digestif est formé par trois nerfs longitudinaux, un nerf ventral (nerf de Brandt) et deux nerfs dorsaux qui n'avaient encore été signalés par aucun auteur. Le plexus longitudinal ganglionnaire formé par les branches latérales de ces trois nerfs longitudinaux est situé entre la couche musculaire circulaire et la couche musculaire longitudinale. Une même fibre musculaire de la couche circulaire reçoit des plexus fondamental et périphérique, une, parfois plusieurs fibres terminales à tache motrice et, en outre, plusieurs fibrilles terminales sans tache motrice. L'innervation de la couche musculaire longitudinale paraît être analogue à celle de la couche circulaire; mais les observations incomplètes de M. Heymans ne lui permettent pas de se prononcer nettement à cet égard.

Dans les vaisseaux contractiles de la sangsue, la tunique musculaire se compose d'une couche externe circulaire et d'une couche interne longitudinale. La fibre circulaire passe à un moment donné sous les fibres circulaires voisines, devient ainsi oblique et longitudinale: une seule et même fibre forme donc ces deux couches musculaires et détermine par sa contraction le rétrécissement et le raccourcissement du vaisseau. Les nerfs vaso-moteurs de la sangsue forment dans la tunique adventice de la paroi vasculaire un plexus périphérique non ganglionnaire; de ce plexus nerveux se dégagent des fibres se terminant par une tache motrice ovoïde dans la partie périphérique de la gaine contractile, sur un point quelconque du trajet de la fibre musculaire.

Les nerfs moteurs qui se rendent aux muscles lisses volontaires de la sangsue ne possèdent pas de cellules ganglionnaires à leur périphérie; ils se ramifient sans s'anastomoser et chaque branche se termine par une tache motrice granuleuse dans la périphérie de la gaine contractile. Les taches motrices, parfois au nombre de deux sur une même fibre musculaire, se trouvent, comme dans la musculature des vaisseaux, en un point quelconque du trajet de cette fibre et ne sont jamais en contact ni avec le noyau, ni avec le cylindre protoplasmique.

F. HENNEGUY.

Richet (Ch.). *Professeur à la Faculté de Médecine. — Mesure des combustions respiratoires chez le chien.* Archiv. de physiologie, G. Masson. Paris, 1890.

Les recherches de M. Ch. Richet ont été poursuivies avec l'appareil construit par lui et M. Harriot et qui consiste en trois compteurs à gaz, enregistrant le premier la quantité d'air inspiré, les deux derniers l'air expiré. Des colonnes d'eau chargées de chaux ou de potasse, intercalées entre les deux derniers compteurs, absorbent l'acide carbonique. On peut ainsi, en notant les différences entre les compteurs 1 et 3, déterminer la quantité d'oxygène absorbée, et, entre 2 et 3, la quantité d'acide carbonique produit. Un appareil enregistreur permet d'inscrire immédiatement ces différences.

L'appareil est volumineux, difficile à monter, par suite de la tuyauterie compliquée qu'il exige; il présente en outre ce grave inconvénient de ne donner d'indications que pour des expériences de longues durées; mais ces inconvénients sont compensés par la facilité extrême des dosages qui sont, pour ainsi dire, automatiques et qui ont lieu sur la masse totale de l'air ventilé et non sur une très petite quantité, comme dans certains appareils où l'erreur la plus infime se trouve alors multipliée.

Les mesures des combustions respiratoires ont porté sur 33 chiens. C'est un nombre considérable, si l'on songe que ce chiffre représente précisément un nombre égal aux expériences faites par Regnault et Reiset, Pettenkofer et Voit, Bauer et Leyden, Senator Wood, Quinquand, etc., avec des appareils très différents. Dans cette recherche, M. Ch. Richet s'est attaché à mettre de nouveau en lumière cette loi si importante de physiologie générale, sur laquelle il avait déjà insisté dans ses travaux antérieurs, que la quantité des combustions organiques est proportionnelle à l'étendue tégumentaire chez les individus de même espèce.

L. O.

4° Sciences médicales.

Hayem (Dr G.). — Les médications. *Leçons de thérapeutique professées à la Faculté de Médecine de Paris, (2^e série), Paris, G. Masson, 1890.*

M. le professeur Hayem continue la publication de ses leçons de thérapeutique, dont la première partie a paru dans le courant de l'année 1887. Cette étude des *médications* est le point de départ nécessaire, la seule base vraiment rationnelle et scientifique du traitement des maladies. Les modes de traitement peuvent, en effet, se ramener à deux types : les traitements empiriques, les traitements fondés sur la méthode des médications. Les déterminations que l'on adopte en thérapeutique, dit M. Hayem, dépendent de l'examen sérieux des maladies et de la connaissance des effets des remèdes; cette dernière notion est précisément le but que l'auteur s'est proposé et qu'il a atteint avec l'exactitude et l'attrait qui sont les caractéristiques de son enseignement.

Les trois premières leçons constituent un exposé magistral de l'action médicamenteuse : c'est là une question des plus importantes et des plus intéressantes de la thérapeutique générale. Les travaux contemporains, en nous initiant à la physiologie des maladies microbiennes, ont fait ressortir ce qu'il y avait d'insuffisant dans la théorie, cependant si remarquable, de Claude-Bernard, relative à l'interprétation de l'action des médicaments. Si les phénomènes d'ordre pathologique et thérapeutique sont, dans certains cas, soumis aux mêmes lois que ceux d'ordre physiologique, la conception que l'action thérapeutique des médicaments découle de leur action physiologique est, dans beaucoup de circonstances, tout à fait incapable d'interpréter l'action spécifique de quelques médicaments, action qui s'adresse alors, non plus à l'organisme, mais aux germes

morbides, c'est-à-dire aux causes mêmes des maladies.

Tandis qu'un médicament ordinaire est destiné à produire, dans l'organisme, des modifications plus ou moins profondes, capables d'enrayer l'évolution des phénomènes pathologiques et de rendre l'individu malade plus résistant, les médicaments spécifiques exercent une action plus ou moins directe sur les causes pathogènes elles-mêmes; et cela à des doses assez faibles pour que tout phénomène physiologique proprement dit fasse défaut : c'est là la caractéristique du *spécifique*. Hier encore, les vitalistes soutenaient que le médicament agissait seulement au contact de la maladie; on pourrait dire justement, aujourd'hui, que les spécifiques n'agissent qu'au contact des causes morbides.

Le hasard a fait découvrir certaines médications spécifiques, le mercure pour la syphilis, la quinine pour les fièvres palustres; il semble que ce soit dorénavant l'expérience qui puisse permettre d'arriver à opposer à chaque maladie nettement individualisée un remède spécifique.

Au sujet de la conception actuelle de la maladie, M. Hayem fait ressortir un curieux rapprochement. Le but de la médication est, dans beaucoup de cas, de détruire les germes morbides, causes des maladies spécifiques, ou, tout au moins, d'empêcher leur prolifération; et cela semble un retour aux idées ontologiques des anciens qui regardaient la maladie comme une entité contre laquelle l'organisme devait lutter pour arriver à *chasser le mal*. Les évolutions morbides qui peuvent être réalisées par l'organisme ne sont que des modalités particulières de cet organisme; mais, pour les mieux spécifier des maladies, les causes sont des entités, des êtres vivants qui cherchent à s'emparer de l'individu : c'est à ces causes qu'il faut rapporter les notions que les anciens appliquaient à la maladie elle-même; car, en définitive, la maladie microbienne n'est autre chose qu'une lutte engagée entre des éléments vivants sur le terrain des besoins nutritifs.

Il serait du plus grand intérêt de connaître les modifications apportées dans la constitution des éléments cellulaires par les médicaments; mais il est encore actuellement impossible d'expliquer comment, et par quelle série de phénomènes, un changement physico-chimique du protoplasma des cellules peut se transformer en actes physiologiques; il faut s'en tenir à la détermination, aussi précise que possible, des conditions dans lesquelles se produit l'action médicamenteuse, réservant à l'avenir le soin de pénétrer plus avant dans cette intéressante question.

Au point de vue de la thérapeutique générale, il faut distinguer pour chaque médicament, les effets physiologiques des effets thérapeutiques, non pas que ces deux catégories présentent toujours entre elles des différences fondamentales, mais parce qu'il est indispensable de séparer nettement, pour l'étude, le cas dans lequel l'organisme est sain de celui où il est malade : il est évident que l'on passe quelquefois, par transitions insensibles, de l'effet physiologique à l'effet thérapeutique; mais bien plus nombreux sont les cas dans lesquels un médicament, produisant chez tous les sujets les mêmes effets physiologiques, déterminera, suivant les circonstances morbides, des effets thérapeutiques absolument différents.

Les leçons suivantes ne sont que l'application de ces principes généraux, développés avec une largeur de vues à laquelle nous a depuis longtemps habitués le savant professeur de thérapeutique de la Faculté de Paris. Il est impossible d'analyser, sans entrer dans le détail, chacune des médications qui sont exposées avec une clarté et une logique qui en rendent la lecture facile et attrayante; il faut nous borner à énumérer la médication antihydrique, la médication hémostatique, la médication reconstituante, la médication de l'anémie, la médication du diabète sucré, et enfin, les médications de l'obésité et de la douleur.

En raison des travaux originaux depuis longtemps poursuivis par M. Hayem, au sujet de certaines médications, les leçons qui traitent de la cure des anémies, de la reconstitution des forces et de la médication hémostatique sont particulièrement intéressantes et nouvelles. La partie consacrée aux anesthésiques est un exposé critique fort complet des méthodes et des théories; l'auteur indique les raisons qui peuvent servir de guide dans le choix d'un anesthésique et il étudie les moyens propres à combattre les accidents de l'anesthésie générale, ainsi que les contre-indications à l'emploi des anesthésiques.

La marche adoptée pour l'étude de chacune de ces médications comporte d'abord la description physiologique de l'élément morbide, puis l'exposé des conditions générales qui sont capables de favoriser son développement, les indications qui en résultent, enfin les méthodes pharmacodynamiques qui en sont la conséquence.

Le livre de M. Hayem, remarquable par sa clarté et sa rigueur scientifique, est bien fait pour montrer que la thérapeutique, ainsi comprise, est une véritable science et non plus un recueil de faits et de recettes empiriques : c'est le couronnement rationnel et scientifique des connaissances médicales.

Dr Gabriel POUCHET

Bouloumié (Dr). — Manuel du candidat aux divers grades et emplois de Médecin et de Pharmacien de la réserve et de l'armée territoriale. Paris, Société d'éditions scientifiques, 1890.

A l'heure actuelle, tous les médecins sont appelés jusqu'à quarante-cinq ans à faire partie de l'armée; mais si tous comprennent leur devoir patriotique, il en est certainement un grand nombre qui seraient embarrassés dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions, non point en ce qui concerne le savoir professionnel, mais au point de vue des connaissances d'organisation et d'administration militaires, connaissances qui sont indispensables au bon fonctionnement du service. D'autre part on sait que l'avancement aux grades supérieurs à celui d'aide-major ne se fait qu'à la suite d'un examen réglé par le décret du 19 décembre 1889.

C'est pour répondre à ces desiderata que M. le docteur Bouloumié a écrit le livre que je présente aux lecteurs de la *Revue générale des Sciences*; c'est un manuel que l'auteur a composé de la substance des leçons qu'il avait faites à un certain nombre de confrères en vue précisément de la préparation à cet examen; mais afin de le rendre plus utile et de lui donner plus d'extension, l'auteur y a condensé les éléments essentiels de tout ce qu'il est nécessaire de savoir ou de connaître pour faire un service militaire dans un grade ou une fonction quelconque de la hiérarchie. Tous nos confrères apprécieront la clarté de l'exposition où l'on retrouve toutes les qualités inhérentes à l'esprit de l'auteur.

L'ouvrage se trouve divisé en trois parties :

Première partie. Organisation de l'armée et du service de santé, contenant différents chapitres sur le recrutement, l'avancement et l'administration générale.

Deuxième partie. Fonctionnement de l'armée et du service de santé; on y trouve les détails sur la vie dans l'armée, sur le rôle du service de santé à l'intérieur, dans les hôpitaux et en campagne.

Troisième partie. Notions d'hygiène militaire : cette dernière partie est naturellement fort courte et ne contient que ce qu'il est nécessaire de connaître à un point de vue exclusivement militaire. C'était, selon nous, le chapitre le plus difficile à faire, et l'auteur s'en est tiré avec un véritable talent.

En somme, excellent ouvrage que tout médecin ou pharmacien voudra posséder, pour ne pas être taxé d'ignorance, le jour où par malheur il serait obligé de mettre en pratique les notions qu'il contient.

Dr H. DUBIEF.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

La Société de Biologie, la Société française de Physique, la Société chimique de Paris, la Société royale de Londres, les Sociétés de Physique et de Chimie de Londres, l'Académie des Sciences et la Société de Physique de Berlin, l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, les Sociétés savantes d'Odessa, l'Académie des Sciences de Vienne, l'Académie royale des Linnéi sont en vacances.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 25 août 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. G. Bigourdan : Observations de la comète Denning (1890, juillet 23) à l'Observatoire de Paris. — Mlle D. Klumpke : observations de la nouvelle planète Palisa (Vienne, 17 août 1890) à l'Observatoire de Paris. — M. Charlois : Éléments et éphéméride de la planète (291) découverte à l'Observatoire de Nice le 15 juillet 1890.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Teisserenc de Bort communique les premiers résultats de son enquête sur l'orage du 18 août à Dreux. De ses observations il résulte que l'orage a été accompagné d'une grande trombe semblable aux *tornados* des États-Unis. Il indique la marche du météore, diverses circonstances de son apparition et l'étendue de ses ravages. — A l'occasion des récentes perturbations atmosphériques, M. Chapel fait remarquer la coïncidence de ces phénomènes avec la rencontre des *Perséides*. — M. G. Trouvé décrit deux gyroscopes électriques auxquels nous consacrerons prochainement une notice. — M. Fortin présente l'appareil qui lui a servi à prévoir, au moyen des déviations magnétiques, les retours des tempêtes et l'apparition des taches solaires. — Dans la préparation de l'acide oxamique et de l'oxamide au moyen de l'azotate d'ammonium fondu, il se forme, suivant M. E. Mathieu-Plessy, un troisième produit, qui est un azotate d'un nouvel alcali fixe, la nitramide.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Ch. Contejean a étudié la respiration chez la Sauterelle et constaté que chez cet animal l'abdomen seul exécute des mouvements respiratoires. L'inspiration est passive, due à l'élasticité des pièces du squelette externe et à la réaction des viscères. L'expiration est active; on peut l'accélérer par l'excitation électrique des ganglions cérébroïdes ou la suspendre par l'excitation (douloureuse) des ganglions protothoraciques. Dans les cordons nerveux de la Sauterelle, M. Contejean n'a pas trouvé une différenciation en partie inférieure sensitive et partie supérieure motrice. Sous ce rapport les Orthoptères seraient inférieurs aux Coléoptères, apparus d'ailleurs après eux à la surface de la terre. — M. Raphaël Dubois présente sur la production de la lumière par les animaux et les végétaux, de nouvelles recherches, d'où il conclut que, chez tous les êtres vivants où elle se manifeste, cette lumière résulte de la transformation de granulations protoplasmiques colloïdales en granulations cristalloïdes sous l'influence d'un phénomène respiratoire. — M. P. Lebesconte indique la série des sédiments qui représentent le terrain carbonifère en Bretagne, et de l'examen des fossiles du calcaire de Quenon conclut que cet horizon se rapporte au carbonifère supérieur; il semble correspondre au calcaire de Visé; peut-être est-il un peu plus ancien que le calcaire de Saint-Roch (Mayenne). — M. A. Gaudry signale la première découverte d'os de Phoque dans le quaternaire de la France, découverte faite par M. Hardy dans une grotte de la Dordogne. M. Gaudry décrit ces débris et énumère les mammifères et oiseaux trouvés dans la même grotte. De la détermination de ces espèces il conclut qu'à

l'époque du Renne il faisait presque aussi froid dans le Périgord que dans les régions arctiques.

Séance du 1^{er} septembre 1890

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Faye, en présentant le 213^e volume annuel de la *Connaissance des Temps* (volume pour 1892), rappelle que, grâce aux améliorations successives apportées par le Bureau des Longitudes à cette publication, notre Ephéméride nationale, plus de deux fois séculaire, est parvenue à un point d'achèvement qu'il sera difficile de dépasser.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Bourgeat décrit plusieurs observations relatives au cyclone du 19 août dans le Jura : 1^o Sur tout le parcours du cyclone la journée de la veille avait été très chaude et lourde; 2^o le cyclone a commencé dans la région d'Oyonnax où le ciel s'illumina alors d'éclairs incessants; 3^o sur le parcours du cyclone il n'est tombé que quelques gouttes de pluie; 4^o nulle part en France il n'est tombé de grêle sur les bords de la zone atteinte par l'ouragan; 5^o le cyclone s'est déplacé en ligne droite, prenant en écharpe les grandes arêtes du Jura; 6^o sur son parcours se sont produits de nombreux phénomènes électriques; 7^o la vitesse moyenne de translation du météore a été de un kilomètre à la minute; 8^o la pression atmosphérique a baissé subitement après le passage du cyclone; 9^o sur le côté droit du cyclone, c'est-à-dire sud-est, les arbres sont couchés vers le nord-est; sur l'autre bord, ils sont orientés vers le nord-ouest. Ce fait démontre un mouvement giratoire s'effectuant en sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. — A l'occasion de cette communication M. Faye fait remarquer que le météore du 19 août a consisté en une trombe, non en un cyclone. Ces deux termes désignent deux phénomènes qu'on ne doit pas confondre: la *trombe* (*tornado* aux États-Unis) est caractérisée 1^o par une trajectoire rectiligne, longue seulement de quelques lieues; 2^o par un diamètre compris entre une dizaine de mètres et un ou deux mille mètres. Le *cyclone* est tout différent: c'est un phénomène qui naît à quelques degrés de l'équateur et qui décrit sur le globe terrestre une immense trajectoire, en marchant d'abord à l'ouest-nord-ouest, puis au nord, puis au nord-est (sur notre hémisphère) et en couvrant finalement une étendue croissante de pays presque comparable à celle de la France.

3^o SCIENCES NATURELLES. — De ses expériences sur le Hêtre, le Bouleau, le Sycomore et les variétés à feuilles pourpres de ces espèces, M. H. Jumelle conclut que, chez les arbres à feuilles rouges ou cuivrées, l'assimilation chlorophyllienne est toujours plus faible que l'assimilation des mêmes arbres à feuilles vertes. Cette différence d'intensité peut atteindre le rapport de 1 à 6. Ce résultat s'accorde avec le fait, bien connu en horticulture, que les arbres à feuilles rouges ont un accroissement beaucoup moins rapide que les mêmes arbres à feuilles vertes. Ils donnent en même temps la raison de cette différence: la lenteur de l'accroissement trouve, en effet, son explication dans l'affaiblissement de l'assimilation chlorophyllienne. — M. G. Bonnier a cultivé à quelques latitudes élevées des plantes de plaines et constaté que chez ces plantes l'assimilation et la transpiration chlorophylliennes augmentent tandis

que la respiration et la transpiration à l'obscurité varient peu. Il en résulte que, pendant la courte saison des hautes altitudes, les végétaux élaborent avec plus d'intensité les principes nutritifs qui leur sont nécessaires. — Etudiant la formation des oospores chez les Oomycètes, **M. P. A. Dangeard** combat la théorie de Fisch suivant laquelle les noyaux des générateurs plurinucléés de l'oospore se fusionneraient en un seul.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 19 août 1890.

M. Verneuil donne les résultats de son enquête sur l'influence de la grippe sur les affections chirurgicales confirmant pleinement sa communication antérieures se traduisant par une action pyogénique évidente. — **M. G. Sée** pense que l'épidémie de grippe fait encore aujourd'hui des victimes; il observe des endocardites, des angines à streptocoques. — **M. Guernonprez** (de Lille) présente une observation de prothèse des apophyses géni pour remédier à la gêne des fonctions respiratoires qui résulte de la chute en arrière de la langue après amputation du corps du maxillaire inférieur. — **M. Cobes** lit un travail sur la respiration hypodermique artificielle, faite par injection dans le tissu cellulaire sous-cutané d'oxygène à l'état naissant, ne produisant aucune irritation, et pouvant être appliquée dans le traitement des maladies où il existe une diminution de l'hématose pulmonaire.

Séance du 26 août 1890.

M. Hache rapporte le cas d'un jeune homme, qui, à la suite d'un coup de couteau dans la région dorsale,

manifesta, autour du trajet fistuleux de la plaie, les symptômes du pyopneumothorax interlobaire sans communication avec les bronches. Au moyen d'un drain, la cavité fut lavée avec une solution de biiodure de mercure à 1⁰⁰/₁₀₀; 15 jours après, le drain fut enlevé et le malade guérit d'une façon complète. L'oblitération de la poche s'effectua par simple développement du poumon. **M. Hache** conclut à l'opportunité du drainage et de la suppression rapide des lavages. Il s'oppose aux résections costales multiples, quand les côtes sont intactes.

Séance du 2 septembre 1890.

M. Tarnier, président, annonce la mort de **M. Gavarret**, ancien président de l'Académie, professeur honoraire de physique à la Faculté de Médecine de Paris et inspecteur général honoraire des Facultés et Ecoles de Médecine de France. **M. le Président** lève la séance en signe de deuil, après avoir déposé sur le bureau le rapport de **M. Depasse** sur le service médical de la direction des travaux de Paris en 1889; — Une note de **M. Peronnet** sur la pratique de la variolisation dans la tribu des Beni-Menassers (Algérie); — Un mémoire de **M. Talon** rendant compte du fonctionnement du centre vaccino-gène d'Alger en 1889-1890; — Une étude de **M. Pigeon** (de Fourchambault) intitulée: Explication biologique de la susceptibilité des vaccinations à donner lieu à la syphilis, à la tuberculose, à la fièvre typhoïde, à la diphtérie; — Un mémoire de **M. Sutis** sur la loi Roussel et le rapport annuel du même auteur sur la protection des enfants du premier âge en 1889 à la Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne); — Le rapport annuel de **M. Barthès** sur le service de la protection des enfants du premier âge dans le Calvados en 1889.

COURRIER DE GENEVE

1. — Dans le courrier d'aujourd'hui je veux vous entretenir tout d'abord d'une série de recherches sur l'appareil dentaire qui ont été faites tout récemment au laboratoire d'histologie et d'embryologie normale de Genève dirigé par le Professeur Eternod. On sait, depuis les travaux de Meyer (de Zurich), J. Wolff et d'autres, que l'os, dans la disposition intime de ses trabécules, obéit aux lois de la mécanique. Le même fait a déjà été démontré par **M. Eternod** pour l'émail dentaire¹. Dans l'émail, de même que dans l'os, les trajectoires de traction et de pression se coupent à angle droit; les prismes de l'émail constituent sur chaque cuspide dentaire une sorte de voûte, de façon que la pression s'exerce sur la dent en un point quelconque, se divise, s'éparpille sur toute la surface de la couronne dentaire. On a ainsi l'explication du fait très curieux que des dents de force moyenne deviennent capables de broyer un morceau isolé d'émail coupé dans une dent beaucoup plus forte: la force agit suivant les lois de la statique dans le premier cas, en dehors d'elles dans le second. Voilà déjà un fait bien intéressant.

Un des élèves du Professeur Eternod, **M. Collaud**², vient de trouver une nouvelle application des lois de la statique, — cette fois dans les parties molles. Il s'agit du ligament alvéolo-dentaire, improprement appelé périoste, dont la structure n'est bien connue que depuis ces derniers temps, particulièrement depuis les recherches de **M. Malassez**. En raison de l'importance du sujet

traité par **M. Collaud**, nous nous y arrêterons un instant. Ses études ont été faites sur des dents de chat, de chien et de porc, vu la difficulté de se procurer des dents d'homme suffisamment fraîches. Les morceaux de maxillaire, préalablement injectés, étaient décalcifiés, coupés au microtome, soit parallèlement, soit perpendiculairement à l'axe de la dent, et les coupes soumises à des colorations diverses.

Dans l'agencement topographique général l'auteur a observé un fait qui n'avait pas encore été signalé: une partie de l'os alvéolaire, celle qui fait corps avec le ligament alvéolo-dentaire, forme une couche osseuse nettement distincte du reste de l'alvéole et que l'auteur propose d'appeler ciment alvéolaire. Dans les fibres du ligament il distingue, d'après leur direction, trois systèmes principaux qui s'entrecroisent à angle droit en marchant suivant les trois directions de l'espace: sur une coupe longitudinale, par exemple, on voit: des faisceaux allant du ciment alvéolaire au ciment de la racine; un second système de faisceaux, perpendiculaires aux premiers; puis enfin des sections transversales de faisceaux marchant dans un plan perpendiculaire à celui qui passe par les deux premiers systèmes; la même chose se retrouve sur des coupes transversales. Au sommet de la racine, les faisceaux deviennent presque parallèles à l'axe de la dent et ménagent entre eux des espaces remplis de tissu conjonctif lâche où se trouvent les vaisseaux et les nerfs dentaires. Au niveau de la substance osseuse de l'alvéole et du ciment radiculaire, les faisceaux connectifs pénètrent dans leur épaisseur sous forme de fibres de Sharpey, qu'on peut rendre visibles par l'imprégnation au nitrate d'argent. Les éléments cellulaires interposés entre les faisceaux du ligament sont des cellules à crêtes. De cette étude

¹ ETERNOD. Des lois mathématiques et mécaniques régissant la distribution des prismes de l'émail *Revue et Arch. Suisses d'Odontol.* Décembre 1887.

² COLLAUD. Etude sur le ligament alvéolo-dentaire *Internation. Monatsschr. für Anat. u. Physiol.* 1890, Bd. 7. H. 1 et 2.

histologique M. Colland conclut qu'il faut, conformément aux idées de M. Malassez, considérer le prétendu périoste alvéolo-dentaire comme un véritable ligament.

Mais, le point véritablement personnel de ses recherches est le suivant: en étudiant attentivement l'agencement des fibres de ce ligament, l'auteur a pu se convaincre que, de même que le tissu osseux de l'émail dentaire, le ligament alvéolo-dentaire est construit et fonctionne de manière à obéir aux lois de la statique: les groupes de faisceaux connectifs dessinent nettement les trajectoires de la statique se coupant à angle droit dans les trois directions de l'espace. Les pressions exercées en différents sens sur les dents, au lieu de se transmettre directement aux parties environnantes, se décomposent suivant le parallélogramme des forces, après s'être transformées en tractions. Exemple: quand la pression s'exerce verticalement sur le sommet de la dent, la racine tendrait à s'enfoncer dans l'alvéole comme un coin; mais les fibres du ligament se tendent et la dent, suspendue dans l'alvéole, tire sur le ligament au lieu de peser sur lui.

2. — Une autre question non moins importante, se rapportant également à l'appareil dentaire, a fait l'objet d'une étude de M. Frédel¹. Il s'agit de la question aussi ancienne (Ambroise Paré pratiquait déjà l'opération) que controversée jusqu'à nos jours, de la greffe dentaire. Par des expériences sur les animaux — les chiens se prêtent le mieux à ce genre d'études — l'auteur a pu reconnaître la manière dont se fait la consolidation de la dent réimplantée. La consolidation qui se fait ordinairement en dix ou quinze jours a lieu surtout aux dépens du périoste alvéolo-dentaire (ces recherches sont antérieures à celles de M. Colland et l'auteur se sert encore du mot périoste) dont les deux parties, séparées lors de l'extraction, se soudent. La pulpe se mortifie et est remplacée partiellement par un bourgeon charnu qui pénètre dans la cavité pulpaire; la nutrition de la dent paraît donc se faire exclusivement aux dépens du périoste alvéolo-dentaire après la réimplantation; c'est à la mortification de la pulpe qu'est due la coloration anormale de la dent observée dans quelques expériences. Une circonstance importante au point de vue pratique, c'est le fait que la consolidation est plus rapide vers le collet de la dent que vers la racine, ce qui est très favorable à la réussite de la greffe, car les chances d'infection se trouvent diminuées. Il se fait pendant la consolidation une forte résorption osseuse, surtout lorsque le périoste dentaire est enlevé partiellement; la consolidation peut paraître extérieurement parfaite, quoique une grande partie de la racine ait disparu.


Avant de réimplanter la dent dans l'alvéole, l'auteur a eu soin, dans quelques expériences, de lui faire subir quelques opérations: badigeonnage, rugination du périoste; résection du sommet de la racine; obturation de la cavité pulpaire — pour se rapprocher autant que possible de ce qui se passe chez l'homme. Le temps entre l'extraction et la réimplantation a varié entre quelques secondes et un quart d'heure. Une condition de réussite, c'est l'intégrité du périoste, de même que la coaptation exacte de l'alvéole et de la racine.

3. — Je ne saurais finir ce courrier sans mentionner les intéressantes recherches de MM. Soret et Rillet²;

ici nous sortons du domaine de l'histologie pour entrer dans celui de la physique. Ces auteurs ont commencé déjà depuis une dizaine d'années des recherches sur l'absorption des rayons ultra-violet par diverses substances; cette fois il s'agit des corps de la série grasse. Les auteurs insistent sur la difficulté d'obtenir ces corps à l'état de pureté, ce qui entrave la précision des résultats.

Les alcools présentent une assez grande transparence. La rectification et surtout la dessiccation complète amènent une décomposition ou une oxydation des alcools qui diminue souvent leur transparence. Il serait prématuré d'affirmer qu'il existe une différence déterminée de transparence entre les divers alcools supposés complètement purs; on ne saurait, par conséquent, confirmer la conclusion de Hartley et Huntington que la transparence des alcools va en diminuant à mesure que leur formule chimique se complique. Comme résultat pratique important, il est à noter que la mesure d'absorption des rayons ultra-violet constitue un moyen très délicat pour apprécier la pureté des alcools.

L'aldéhyde (*absolue*, dans le sens de non diluée) intercepte presque complètement les rayons ultra-violet. Les acétones sont très absorbantes; il est probable que c'est au groupe carbonyle CO qu'est due l'absorption énergique de l'aldéhyde et des acétones, car, en remplaçant ce groupe CO par O, on obtient des corps très transparents:



L'acétal est assez transparent malgré le grand nombre d'atomes dont est formée sa molécule, contrairement à l'aldéhyde qui est très absorbante avec une composition très simple; le mode de groupement des atomes a donc plus d'importance que leur nombre.

L'éther éthylique distillé sur du sodium est très transparent et vient après l'eau distillée.

Les divers éthers simples contenant le même élément électro-négatif (iode, brome, chlore) ne paraissent pas différer sensiblement dans leurs propriétés absorbantes; en d'autres termes la substitution d'un radical alcoolique agit peu sur la transparence.

Les sels halogènes de potassium (iodure, bromure, chlorure) sont notablement moins absorbants que les éthers correspondants; la substitution d'un métal alcalin à un radical alcoolique augmente donc la transparence.

Les divers éthers contenant un élément électro-négatif différent n'ont pas la même transparence, les iodures sont très opaques, les bromures le sont un peu moins, les chlorures sont assez transparents. Il n'y a pas d'analogie bien précise entre les éthers simples et les sels halogènes correspondants, ce qui indiquerait une différence du groupement moléculaire dans ces deux classes de composés.

Les éthers composés et les sels métalliques correspondants se comportent également d'une manière très différente au point de vue de l'absorption; cela se voit surtout sur les azotiles et les azotates.

Les auteurs ont encore fait des recherches sommaires sur l'absorption des rayons ultra-violet par les vapeurs de diverses substances organiques et ont pu démontrer que les liquides très opaques et suffisamment volatils donnent aussi des vapeurs exerçant une absorption sensible.

D^r CRISTIANI.

¹ FRÉDEL. De la greffe dentaire au point de vue historique et expérimentale. Vienne. Imprimerie Heinrich.

² J. SORÉT et A. RILLET. Recherches sur l'absorption des rayons ultra-violet par diverses substances. Arch. des Sciences phys. et nat. 1890, n° 1.

CORRESPONDANCE

SUR LES CYCLONES

Monsieur le Directeur,

Voulez-vous me permettre de répondre par quelques lignes seulement à l'article de M. Faye¹. Ce savant insiste tout particulièrement sur la différence capitale qu'il trouve entre mon tourniquet, c'est-à-dire l'appareil d'aspiration, et qui ce se passe dans la nature où, dit-il, il n'y a rien qui en tienne lieu. J'ai déjà répondu² à cet argument, notamment en décrivant l'expérience dans laquelle je produisais la trombe sans tourniquet, mais avec une simple sphère tournant à l'air libre. Cette trombe est identique à celle que donne le tourniquet et, dans toutes deux, les girations se font exactement comme dans la nature, c'est-à-dire que la vitesse angulaire est bien plus faible au pavillon supérieur qu'au sommet inférieur du cône et à la surface de l'eau, où se concentre toute l'énergie pour soulever l'eau ou les corps placés à sa surface.

Je ne prolongerai donc pas cette discussion, regrettant seulement que M. Faye n'ait jamais voulu accepter mes invitations à assister aux expériences; il aurait vu que nous sommes beaucoup plus d'accord qu'il ne le pense, puisque, dans mes expériences, comme dans la nature, le tourbillon descend du haut. Je regrette aussi que M. Faye n'ait répondu que par une négation pure et simple ou par le silence à deux points qui, suivant moi, sont capitaux :

1° Les girations à peu près horizontales qui naissent dans un courant supérieur de l'atmosphère, forment-elles, oui ou non, un appareil d'aspiration pour les couches aériennes situées au-dessus et au-dessous et dans les régions voisines de l'axe?

2° Les girations qui produisent les entonnoirs de rivière prennent-elles naissance oui ou non dans les courants inférieurs des cours d'eau?

C'est sur ces deux points que, pour moi et pour bien d'autres, théorie, expériences et j'ajouterai : observation, ne laissent place à aucun doute et répondent par l'affirmative.

Ch. WEYHER.

M. Faye, auquel nous avons communiqué ces critiques, nous adresse à ce sujet la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,

Je suis surtout sensible au reproche que M. Weyher me fait de n'avoir point assisté à ses expériences. Per-

mettez-moi de donner à ce sujet une explication bien simple. J'avais lu avec soin les descriptions de M. Weyher présentées par M. Mascart à l'Académie et je savais, par cet examen, que l'auteur se méprenait sur leur interprétation, faute d'avoir étudié d'assez près les phénomènes naturels qu'il cherchait à reproduire. Il me répugnait de lui rendre une visite qui ne pouvait aboutir qu'à lui faire verbalement cette déclaration. Plus tard j'ai dû répondre aux publications où j'étais mis en cause. Je l'ai fait de mon mieux, tout en rendant pleine justice à ces belles expériences¹, mais en déclarant que, dans ma pensée, elles ne reproduisent en aucune façon les trombes ou tornados de la nature.

Quant aux questions que me pose M. Weyher, je vais tâcher d'y répondre en quelques lignes de la manière la plus nettement négative. L'auteur confond sans cesse les tourbillons qu'il produit dans un fluide immobile, à l'aide d'un tourniquet, avec ceux qui naissent spontanément dans les courants sous l'influence de leurs simples inégalités de vitesse. Ces différences de vitesse entre des filets parallèles tendent bien à produire des gyration; mais, par le fait même que la masse fluide est en marche, sous forme de courant, ces gyration deviennent immédiatement descendantes. Ce sont, dès le début, des hélices coniques à axe vertical, sur lesquelles les vitesses linéaires croissent très rapidement vers l'axe, au lieu de décroître comme dans un tourniquet. Ces tourbillons naturels, dont le mécanisme est tout entier compris sous leur surface visible (cas des trombes ou des tornados) n'exercent en bas aucune aspiration. Au contact du sol, l'air entraîné dans les spires descendantes s'échappe tangentiellement au pied de la trombe, après avoir produit les ravages connus par son choc violent contre les obstacles. C'est ce que nous apprennent les phénomènes naturels quand on les examine sans idée préconçue, et c'est ce que ne réalisent pas les expériences de MM. Weyher et Colladon. Ces expériences ont été amplement vulgarisées; tout le monde peut contrôler aisément, sans les répéter, le jugement que j'en ai porté dans cette *Revue*, n° du 30 août, en mettant sous les yeux du lecteur le dessin de l'appareil principal de M. Weyher.

H. FAYE,

de l'Académie des Sciences.

CHRONIQUE

LE GISEMENT DE BRUSHITE DE LA GROTTÉ DE MINERVE (AUDE).

Notre éminent collaborateur, M. Armand Gautier, de l'Institut, et son frère, M. Gaston Gautier, ont exploré, il y a quelques mois, l'une des grottes les plus curieuses de l'Aude, celle de Minerve, et y ont fait une découverte scientifique d'une grande importance pour l'agriculture. Au-dessous d'une couche argileuse paléontologiquement caractérisée par les restes de squelettes d'animaux appartenant à la période quaternaire (*Ursus spelaeus*), ils ont reconnu l'existence d'un gisement considérable de brushite, minéral constitué par du phosphate bicalcique. En voici la composition :

Humidité à 130°.....	3.46 %
Porté au rouge.....	18.46
Acide carbonique.....	4.20
Silice.....	0.76
Alumine.....	8.13
Chaux totale.....	29.63
Acide phosphorique soluble dans le citrate.....	20.736
Acide phosphorique soluble dans les acides.....	11.128
Total.....	99.504

La formule chimique est : $\text{Ca}^2\text{PhO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$.

MM. Gautier, observant que ce corps se présentait souvent sous forme d'amas isolés dans les argiles encais-

¹ H. Faye : Sur les Cyclones, *Revue générale des Sciences* du 30 août 1890, page 497.

² Voyez ma dernière brochure sur les tourbillons, 2^e édition.

¹ Voir p. ex. ma brochure *Sur les Tempêtes*, 1887, p. 46 et 47. Librairie Gauthier-Villars.

santes, et non en couches régulièrement stratifiées, ont cherché à tirer parti de cette manière d'être pour expliquer la formation de ce minéral dans ces conditions spéciales de gisement.

Ils ont constaté que ces amas étaient toujours constitués par des croûtes ayant une épaisseur de quelques millimètres à 0^m10 centimètres, autour d'un noyau concentrique de roche calcaire de même composition que le calcaire nummulitique formant les parois de la grotte. Quand le fragment était petit, le noyau calcaire central n'existait plus; si le fragment était gros, le noyau persistait. Lorsqu'un fragment de roche était à moitié enfoui dans l'argile et à moitié hors de terre, la partie supérieure était surtout transformée en brushite, et l'épaisseur de la couche phosphatée diminuait à mesure qu'ils examinaient les portions plus profondément enfouies. Les blocs ainsi attaqués appartenaient tous à la roche nummulitique, calcaire, constituant les parois et la voûte de la caverne, et non à la roche calcaire devonienne formant le sous-sol, le plancher. En certains points il s'était formé dans des bas-fonds, au contact de la roche nummulitique, des dépôts horizontaux de phosphate bibasique. Enfin, dernière remarque, les cailloux roulés siliceux enfermés dans l'argile, venus du dehors, n'étaient recouverts d'aucune épaisseur de phosphate bi ou tribasique.

L'argile même qui constituait le sol de la grotte contenait 16 % d'acide phosphorique correspondant à 33 % de phosphates.

On peut calculer qu'il y a dans cette grotte plus de 25,000 tonnes de terres argileuses phosphatées.

En réunissant les données précédentes, il a été facile

à MM. Gautier d'expliquer le mécanisme de la formation de la Brushite.

Les eaux qui traversent la roche, et les couches d'humus supérieures, se chargent d'un excès d'acide carbonique. Se trouvant en présence d'ossements d'animaux accumulés en grand nombre, dans les terres argileuses, elles s'emparent de l'acide phosphorique de ces ossements. Au contact des roches calcaires, l'acide phosphorique dissous transforme peu à peu et plus ou moins profondément ces roches en phosphate de chaux. De plus les eaux acidifiées par l'acide carbonique en excès dissolvent une partie des phosphates transformés ainsi en phosphate bicalcique, finissent par imprégner les argiles de brushite, et même, par suite de l'évaporation de l'excès d'acide carbonique, par déposer ce phosphate bibasique dans les parties déclives, au contact et à la limite des couches imperméables.

Cette communication est des plus importantes 1^{re} parce qu'elle indique l'existence, dans le Midi de la France, d'une espèce de phosphate qui n'était connue jusqu'à présent que dans le guano des îles Azores et Sombrero, et dans les montagnes limitrophes de l'Espagne et du Portugal; 2^o parce qu'elle fournit à une région des plus étendues au point de vue vinicole, un engrais des plus précieux par suite de sa facile assimilation et de sa proximité; 3^o parce qu'elle met enfin sur la voie de trouver dans le Midi même de nouveaux gisements de brushite. — Nous pouvons dire, pour notre part, que ce travail de MM. Gautier nous a déjà permis de constater la présence du précieux engrais dans plusieurs autres localités pyrénéennes.

D^r F. GARRIGOU.

NOUVELLES

LES OBSERVATIONS SPECTROSCOPIQUES DE M. J. JANSSEN AU SOMMET DU MONT-BLANC

La question de la présence de l'oxygène dans les astres est, comme on sait, capitale en philosophie naturelle. Jusqu'à ces dernières années rien ne permettait de décider si ce corps existe dans l'atmosphère du Soleil. L'examen spectroscopique de la lumière qu'il nous envoie montre bien dans l'orangé et le rouge les groupes A, B et α . Mais cette simple observation ne saurait résoudre le problème, puisque la lumière analysée a subi, avant de nous parvenir, une énorme absorption du fait de l'oxygène gazeux et surtout de la vapeur aqueuse de notre atmosphère terrestre.

Pour établir la part — au moins collective — de ces deux facteurs, il importe d'examiner ce qui arrive quand leur puissance diminue.

C'est dans ce but qu'il y a deux ans (1888), M. J. Janssen s'était transporté aux Grands-Mulets. L'altitude de cette station (3050 mètres), les grands glaciers qui l'entourent et le froid qui y règnent devaient réduire d'une façon considérable l'action absorbante de notre atmosphère, notamment celle de la vapeur d'eau. Les résultats obtenus dans ces conditions par l'éminent astronome, le décidèrent à tenter cette année une expérience plus décisive encore. Il résolut de l'instituer au sommet même du Mont-Blanc (4810 mètres). L'entreprise, toujours très pénible et non exempte de péril, semblait être au-dessus des forces d'un homme de son âge. Elle paraissait d'autant plus audacieuse que M. Janssen est affligé d'une forte claudication. Mais rien n'arrêta l'impétuosité du savant. Marchant, porté, soutenu ou traîné sur la neige à travers les blocs de glace, il arriva le 18 août à la Cabane des Bosses, récemment construite à l'altitude de 4400 mètres. On doit ce refuge à la munificence de M. J. Vallot qui poursuit en ce lieu d'intéressantes recherches de météorologie, et, véritable Mécène des Alpinistes, leur offre gracieusement en son chalet le couvert et le vivre.

S'y trouvant cerné par l'orage, M. Janssen dut, à cause du mauvais temps, y demeurer jusqu'au 22 août. Ce jour-là le ciel fut admirable et il fut possible de gravir utilement les toits de glace qui séparent la cabane de la cime du Mont-Blanc. C'est sur ce sommet, le plus élevé de l'Europe, que M. Janssen a réalisé ses expériences. En raison des conditions particulièrement favorables où elles ont été effectuées, les résultats qui s'en dégagent doivent être tenus pour les plus précieux qui aient jamais été atteints dans cet ordre d'investigation.

En attendant la discussion que l'auteur se propose d'en faire, nous nous bornons à en signaler le haut intérêt. Aux altitudes élevées, l'influence perturbatrice de la vapeur d'eau n'existe plus, du moins en cas de basse température et de beau temps. On constate très nettement que raies et bandes de l'oxygène décroissent à mesure que le Soleil s'élève, l'épaisseur d'air traversée diminuant alors. Les bandes, dont la formation suit, comme M. Janssen l'avait reconnu à Meudon, la loi du carré de la densité, disparaissent du spectre lorsque le Soleil passe au méridien. Quant aux raies, soumises à une loi de production moins rapide, elles subsistent encore, assez affaiblies cependant pour rendre très probable l'induction qu'à la limite supérieure de notre atmosphère il serait impossible de les observer. L'oxygène, — du moins à l'état où nous le connaissons à la surface de la terre, — serait donc absent de l'atmosphère du Soleil. Les nouvelles expériences de M. Janssen apporteront, sans doute, à ce problème une solution définitive. Avant de les exposer en détail, nous avons la conviction de répondre au sentiment unanime de nos lecteurs, en rendant hommage au courage du savant qui, bravant fatigues et dangers, vient de porter si haut le drapeau de la science française.

LOUIS OLIVIER.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

ÉVOLUTION DES IDÉES SUR LA NATURE ET LE MÉCANISME DE LA VIRULENCE

Quels que soient l'éclat d'une découverte et l'étonnement qu'elle provoque dans les différentes classes de la société, il est bien rare que son avènement n'ait pas été préparé par des hommes dont le nom et les œuvres sont plus ou moins oubliés. Mais il faut reconnaître que si, aujourd'hui, les notions scientifiques jaillissent rarement pour la première fois du cerveau des savants, elles s'épurent et se complètent singulièrement, grâce à la rigueur et au perfectionnement de la méthode expérimentale.

Ces réflexions, suggérées par une foule de questions, sont confirmées par l'histoire de l'évolution des idées sur la nature et le mécanisme de la virulence. On pourra voir, dans le bref résumé qui va suivre, que le *Nihil novum sub sole* du poète latin est ici parfaitement justifié; toutefois, on se convaincra que si les expérimentateurs actuels n'ont pas toujours conçu l'idée première, ils l'ont établie sur de nettes et solides assises, au lieu de la laisser étagée sur des hypothèses nuageuses et flottantes.

La gravité des maladies virulentes, l'extension qu'elles ont prise à toutes les époques, ont vivement poussé les médecins et les naturalistes à la recherche des causes intimes ou de la nature de la virulence. Aussi est-il fort intéressant de suivre jusqu'à nos jours la série des hypothèses que l'esprit humain a enfantées sur cette question.

Tantôt la virulence fut comparée à la fermentation, tantôt rattachée au parasitisme.

I

Déjà au ix^e siècle, Rhazès attribuait la variole à une fermentation « comparable à celle du moût de raisin qui fermente et bouillonne pour se convertir en vin. »

Van Helmont, Stahl, Sydenham reproduisirent plus ou moins ces idées et, au commencement de ce siècle, en 1802, Brissay n'hésita pas à dire que les maladies contagieuses devraient s'appeler *maladies fermentatives*.

En 1831, dans un travail où il compare la fermentation à la contagion, Braconnot conclut à la similitude, en montrant que les substances antifermentescibles, telles que le chlore, l'acide nitrique, l'acide sulfureux, etc., sont précisément des antiseptiques.

Mialhe adopta cette opinion sans réserve : « Nul doute, dit-il, que les virus n'agissent sur l'économie à la manière de certains ferments..... Et la preuve,... c'est que tous les agents médicamenteux qui annulent l'action spécifique des virus sont ceux qui anéantissent le plus aisément l'action spécifique des ferments. »

Bouillaud intercala le passage précédent dans son traité de *Nosographie médicale* et émit l'espoir que les progrès dans l'étude des fermentations

profiteraient à la théorie des maladies contagieuses et infectieuses.

A peu près à la même époque, en 1847, un médecin anglais, Billing, écrivait, à propos du virus variolique, qu'une petite parcelle produit une inflammation semblable à celle d'où elle est tirée, comme un peu de levain fait soulever toute la masse dans la fermentation. Impossible d'exprimer plus nettement la similitude de la virulence et de la fermentation. Billing poursuit cette comparaison dans la période d'état, le déclin et la transmission des maladies virulentes. Il ne voit, dans les agents de leur propagation, que « des levains qui sont ou communiqués par contact ou transportés par l'air dans les poumons. »

Beaucoup de médecins s'élevèrent avec véhémence contre l'introduction d'une explication chimique dans un phénomène qui leur semblait de l'ordre vital. D'ailleurs à ce moment, l'acte de la fermentation était plus ou moins mystérieux, de l'aveu même des chimistes. Aussi pouvait-il paraître absolument chimérique de vouloir éclairer un phénomène par l'autre, puisqu'il y avait mystère des deux côtés, comme disait, en 1833, Ch. Anagla, professeur vitaliste de l'Ecole de Montpellier.

Malgré les critiques dont elle fut l'objet il y a une quarantaine d'années, cette hypothèse ne fut pas abandonnée. On lui reprochait d'être vague, mal définie. On s'efforça de trouver une explication satisfaisante des phénomènes de la fermentation et, simultanément, des phénomènes physico-chimiques qui transforment les humeurs de l'organisme en agents de léthalité.

Liebig, par exemple, voit dans toute fermentation : 1° un corps provocateur; 2° une matière susceptible de se décomposer au contact du précédent. Le corps provocateur se reproduit aux dépens des matières d'où il tire son origine première. Dans la fermentation du moût de bière, l'agent provocateur est la levûre; la substance azotée contenue dans le moût est la matière avec laquelle se forme la levûre au fur et à mesure de la transformation du sucre.

Pour les maladies contagieuses, Liebig admet, dans le sang du sujet sain, la présence du principe d'où peut naître l'agent provocateur: celui-ci se développe peu à peu aussitôt après l'introduction d'une parcelle du ferment virulent détaché d'un organisme malade. L'assimilation est complète, lorsqu'il accepte que le sang contient le second principe voué à la décomposition sous l'influence du premier.

D'où il conclut que la prédisposition d'un sujet, d'une espèce à contracter une maladie contagieuse est en raison de la masse de ce second principe. Ce dernier s'épuisant peu à peu dans le cours

de la maladie, la virulence de la fermentation ou de la décomposition décroît donc dans le même sens et on assistera au déclin et à la guérison de la maladie virulente.

L'explication proposée par Liebig jette l'esprit dans une grande perplexité. Il se demande ce qu'est cette parcelle de substance qui transforme une partie du sang en *corps provocateur*. Assurément, il s'agit d'une substance qui opère à la manière d'une levûre. Mais quelle est au juste cette substance? Liebig ne le dit pas. Il n'est donc pas surprenant que quelques auteurs aient profité de ce silence pour modifier la théorie de Liebig et supposer que le corps provocateur, que l'agent de décomposition ou de destruction, peut prendre naissance de toutes pièces dans les organismes sains sous l'influence de causes banales.

Dubois d'Amiens a pensé qu'un simple changement dans la proportion, le nombre, la quantité des éléments suffirait pour communiquer la virulence aux liquides organiques. Malheureusement la chimie a toujours été impuissante à découvrir et à déterminer ce changement qui devrait naturellement varier avec chaque état virulent.

Peut-être, est-ce en face de cette impuissance que Ch. Robin a regardé la virulence comme le résultat d'une modification de l'état isomérique des humeurs et des tissus vivants. Pour Robin, il n'y a pas de virus à proprement parler, il n'y a que des *états virulents* de la matière vivante. « Ces états sont divers, en raison de la complexité de la substance organisée, et chacun offre des degrés selon la constitution moléculaire propre du tissu ou de l'humeur altérés et les conditions qui ont déterminé l'altération. »

Cette opinion dispense de chercher une démonstration anatomique ou chimique de la virulence. Elle n'est pas plus solide pour cela. Car si elle permet de concevoir la contagion, l'inoculabilité des maladies virulentes par le transport de la substance organique modifiée hors de l'économie infectée, elle n'explique pas d'une manière satisfaisante l'origine des divers états virulents. Effectivement, outre qu'elle laisse la porte ouverte à la spontanéité de la virulence, elle admet que « les états virulents *peuvent survenir* partout où des animaux se trouvent agglomérés au delà de ce que permet la nature des milieux nécessaires à leur existence. » Or, conçoit-on que l'agglomération déterminera tantôt la variole, tantôt le typhus, tantôt la rougeole? Il est vrai que l'auteur croit à la modification de cette influence déterminante par celle du sol, des saisons, des climats, de la température, de l'humidité et par la constitution individuelle. C'est-à-dire que l'esprit flotte dans l'inconnu sur l'origine même des états virulents.

Malgré ces sérieuses imperfections, la théorie des états virulents de la matière organisée a occupé jusque dans ces dernières années une place importante en pathologie.

II

Avant les théories chimiques de la virulence et parallèlement à elles, s'est déroulée la théorie du parasitisme virulent.

L'idée de rattacher les maladies contagieuses au parasitisme est presque aussi vieille que le monde. Elle est exprimée dans les ouvrages des agronomes latins Varro et Columelle. Elle a été reprise aux ^{xvi^e} et ^{xvii^e} siècles par Langius, Zacutus, Kircher, Lancisi, Deidier de Montpellier, Linné, Réaumur, Rasori, etc.

Le parasitisme virulent de cette époque était souvent grossier, et néanmoins absolument hypothétique. Ainsi Deidier (1713) croyait que le *virus vénérien* était dû à la présence de petits vers vivants. Il ne les avait pas vus; mais leur présence devait être réelle parce que l'action exercée sur le radical du virus syphilitique par le mercure ressemblait à l'action toxique exercée par ce corps sur d'autres espèces de vers (Anglada).

Parfois, le parasitisme reposait sur des observations que la science moderne regarde comme erronées. Par exemple, Langius affirmait déjà avoir rencontré des microzoaires ou des infusoires dans la rougeole, Kircher, dans la peste, Zingler, dans les fièvres pétéchiiales, Zacutus et Porcellus dans la variole.

M. H. Mollière nous a appris, dans une étude rétrospective sur la virulence, que Goiffon, agrégé au Collège de médecine de Lyon, professait aussi, en 1721, que des insectes venimeux (invisibles) apportés de quelque contrée étrangère avec des marchandises pourraient se répandre dans les airs d'une ville et produire tous les funestes effets qu'on remarque dans la peste.

Les microscopes perfectionnés de nos jours n'ont jamais décelé au sein des parties virulifères de ces maladies des organismes aussi élevés dans la série des êtres vivants. Cependant, une confusion que l'on s'est depuis efforcé d'écarter, a donné corps à cette hypothèse pendant un certain temps.

En cherchant avec soin dans les dermatoses contagieuses, on a découvert le *sarcopte* de la gale, le *démodex* de l'acné, le *champignon* de la teigne. On a démontré que la contagion résulte de la transplantation de ces parasites sur une peau saine. Dans un empressement regrettable, Raspail a conclu que toutes les maladies contagieuses, telles que la variole, la rougeole, la scarlatine, le cow-pox, etc., sont des sortes de *sarcoptogénoses*. Il a même édifié, partant de cette hypothèse, sur la

non-récidive des maladies virulentes, toute une théorie que l'on a vu reproduire à peu près complètement dans ces dernières années.

Les parasites de Raspail vivent aux dépens des organismes qu'ils envahissent, épuisent certaines parties des suc nécessaires à leur entretien et à leur développement et en même temps les infestent du virus qui résulte de leur évolution. Tel serait le mécanisme de l'action morbifique de ces parasites.

Mais Raspail a confondu parasitisme et virulence, parce qu'il a pris garde seulement au caractère contagieux de ces deux états. Maintenus sur ce terrain, les recherches de Raspail étaient frappées de stérilité.

Ce micrographe espérait que les nosologistes détermineraient les habitudes et la conformation des *sarcoptes morbifères* qu'il avait entrevus avec les yeux de l'imagination. Il va sans dire que cet espoir a été déçu.

Plasse, vétérinaire à Niort (Deux-Sèvres), s'attacha à démontrer par des arguments, dont quelques-uns n'étaient pas sans valeur, l'origine cryptogamique de plusieurs maladies transmissibles ou infectieuses de l'homme et des animaux domestiques. Nous citerons la fièvre typhoïde, la variole, la morve, le farcin, la péri-pneumonie épizootique, le typhus du gros bétail.

Plasse aurait observé des relations étroites entre l'éclosion de ces maladies et l'usage d'aliments couverts d'efflorescences cryptogamiques. De là à regarder les moisissures comme la cause et l'agent de ces affections contagieuses, il n'y avait qu'un pas à faire. De 1823 à 1872, Plasse a défendu son opinion avec une ténacité que rien ne pouvait décourager. Dans l'impossibilité de montrer les cryptogames spécifiques pathogènes aux prises avec l'organisme, il a succombé sous l'incrédulité de ses contemporains, qu'il a réclamés souvent comme juges, et sous l'exagération et l'absolutisme de ses idées.

III

La nosologie se débattait donc entre les aspirations d'un parasitisme grossier, les illusions trompeuses de la transformation virulente de la matière organisée et les promesses jusque-là décevantes et mystérieuses des fermentations sur le vivant, lorsque des découvertes importantes vinrent mettre de l'ordre dans ce chaos.

a) D'abord les fermentations se dépouillèrent de leur caractère énigmatique.

La plus importante, la fermentation alcoolique, avait été l'objet d'un grand nombre de travaux. De ce phénomène on connaissait la plupart des conditions, les actes préparatoires, les produits essentiels, les agents mêmes. Mais le rôle de ces

agents était entièrement méconnu. Cependant il avait été entrevu, indiqué avec un grand bonheur d'expression par Cagniard-Latour. Cet auteur représentait les cellules de levûre comme des plantes « susceptibles de se reproduire par bourgeonnement et n'agissant probablement sur le sucre que par quelque effet de leur végétation ».

Malgré la simplicité de l'explication de Cagniard-Latour, Liebig réussit généralement à faire accepter la théorie dile « du mouvement communiqué, » dont nous avons déjà parlé et qui ne suscita aucune découverte dans le vaste champ des fermentations.

C'est en 1857 que commence l'ère des grands progrès. Elle s'ouvre par un *mémoire sur la fermentation lactique* présenté par M. Pasteur à l'Académie des Sciences de Paris. Sous forme de conclusion, l'auteur n'hésite pas à affirmer : *que la fermentation est corrélatrice de la vie, de l'organisation de globules, non de la mort ou de la putréfaction de ces globules, pas plus qu'elle n'y apparaît comme un phénomène de contact, où la transformation du sucre s'accomplirait en présence du ferment sans lui rien donner, sans lui rien prendre.*

L'étude de M. Pasteur sur la levûre de bière établit ces conclusions sur une base inébranlable.

Elle montre que les cellules de levûre vivent et se multiplient dans l'eau sucrée additionnée de sels minéraux cristallisés, mais dépourvue de toute manière organique en voie de décomposition. Elle montre encore qu'en vivant et se développant, ces cellules empruntent du carbone au sucre, de l'azote, du phosphore, du potassium aux matières minérales. La soustraction du carbone transforme le sucre en alcool et acide carbonique.

La fermentation est donc fonction de la vie d'êtres microscopiques que nous appellerons, dans ces exemples, ferment lactique, ferment alcoolique.

Un des côtés remarquables des travaux de M. Pasteur sur les fermentations est sans contredit la méthode de sélection des ferments à l'état de pureté, par les *cultures successives*. M. Pasteur en a tiré le meilleur parti, et après lui, ses élèves et ses imitateurs. C'est à l'emploi de cette méthode que nous devons encore la connaissance des ferments acétique, butyrique, gallique, nitrique, de ceux qui président à la transformation ammoniacale de l'urine, à la putréfaction des matières albuminoïdes, à la décomposition de la cellulose, etc.

Grâce à l'étude physiologique des ferments, le retour de la matière organisée à l'état inorganique n'a plus de mystères pour nous. Il n'y a plus à douter que les agents de la mort définitive ne soient des êtres vivants. Nous connaissons même leur origine. Presque toutes les eaux, excepté à leur source, l'air atmosphérique, excepté à de très grandes hauteurs, le corps même des animaux, sont peuplés de leurs germes. Ignorant autrefois

l'existence de ces germes, on a cru aux générations et aux fermentations spontanées.

Les germes de l'air atmosphérique étaient les plus discutés, malgré les démonstrations bien connues de Schwann, de Schultze, de Schröder et von Dusch. M. Pasteur a réussi à défier toute négation en filtrant l'air sur du coton, comme l'avaient fait ces derniers, et en prouvant qu'une parcelle de ce coton, projetée dans une infusion stérilisée, y provoque l'apparition d'une multitude de microorganismes ferments, qui déterminent bientôt l'altération du liquide.

L'air, débarrassé des microorganismes par un moyen quelconque, est absolument impropre à produire cette altération. Conséquemment, plus de germes atmosphériques, plus de fermentation.

M. Pasteur a prouvé de même que les maladies du vin, de la bière, du vinaigre sont causées par des ferments spéciaux. Si l'on tue ces germes parasites, ou si on les empêche de s'introduire au sein du liquide, on *guérira* ou on *préviendra* ces maladies. Les études de M. Pasteur sur ce point sont un des plus beaux monuments de la science contemporaine. Elles pourraient prendre le titre de *Physiologie des ferments*. Ne démontrent-elles pas, en effet, que la plupart des fermentations sont l'œuvre physiologique, œuvre gigantesque, d'organismes microscopiques, de ferments figurés et animés?

b) Pendant que ces conquêtes enrichissaient le domaine de la chimie, que se passait-il dans le champ de la pathologie?

En 1850, Rayer et Davaine, au cours d'expériences instituées pour déterminer la nature, les caractères de la maladie charbonneuse du mouton, connue sous le nom de sang de rate, signalèrent dans le sang des malades et des inoculés « de petits corps filiformes, ayant environ le double en longueur d'un globule sanguin ». Ces petits corps furent appelés plus tard *bactéridies*, puis *bacilles* du charbon. Après eux, en 1855 et 1857, Pollender et Brauell les trouvèrent aussi dans le sang des sujets charbonneux, sans en comprendre le rôle et l'importance. En 1860, Delafond les étudia le premier avec assez de sagacité pour en soupçonner la véritable nature et la propriété infectieuse. Par exemple, il est convaincu que les *baguettes* ou *bâtonnets charbonneux* sont des végétaux inférieurs. La preuve est qu'il chercha à les cultiver dans le sang hors des vaisseaux. Là, il les vit s'allonger et fournir « un mycélium remarquable formé de nombreux filaments déliés ». Malheureusement il ne parvint pas à leur faire produire des spores. Enfin, après s'être assuré que ces filaments végétaux se reproduisaient toujours dans le sang des animaux auxquels il les inoculait, il n'hésita pas à les signaler comme la cause du sang de rate.

Cette importante acquisition, la première qui fût nette et précise sur la nature des agents virulents, en était à ce point, lorsque parut le mémoire de M. Pasteur sur la fermentation butyrique, en 1861.

On se rappelle que M. Pasteur montra, dans ce travail, que l'agent de la fermentation est un organisme microscopique fort analogue à celui du sang des animaux charbonneux.

Davaine fut frappé de cette analogie et essaya aussitôt de prouver, par une série d'expériences ingénieuses, qu'à la bactériidie et à la bactériidie seule appartient la propriété virulente dans la transmission artificielle du sang de rate. Il ne réussit pas à débarrasser complètement la bactériidie des liquides qui la baignent. Néanmoins, pour tout esprit libre d'attaches théoriques ou d'idées préconçues, il n'était pas douteux que le développement de la bactériidie soit la cause et non le résultat de l'affection charbonneuse.

Dès 1868, M. Chauveau acceptait sans réserve les conclusions de Davaine et les étendait aux septicémies chirurgicales, à la pyémie, à la gangrène, au typhus, etc. Il prédisait même alors la généralisation rapide de l'application des travaux de M. Pasteur sur la fermentation putride, dans cette partie du domaine pathologique. Plus tard, en 1873, il entreprenait avec succès des expériences sur la détermination du ferment qui accompagne le processus gangréneux. Quelques années auparavant, en 1867, il démontrait que l'agent virulent dans les humeurs de la vaccine, de la variole humaine, de la clavelée du mouton, de la morve revêt toujours la forme *corpusculaire*.

Ces importants résultats laissaient tout au moins entrevoir une analogie morphologique entre les ferments figurés et les agents de la virulence.

Pour démontrer l'individualité spécifique de ces agents et leur analogie avec les ferments, que manquait-il? La preuve qu'ils sont aptes à vivre et à se multiplier en dehors de l'organisme; autrement dit, qu'on peut les cultiver artificiellement, *in vitro*, par les méthodes de sélection introduites dans l'étude des ferments ordinaires par M. Pasteur.

IV

Hallier, qui, le premier, essaya d'appliquer ces méthodes à la détermination des virus, s'égara dans les dédales du polymorphisme.

La science venait de s'enrichir de découvertes importantes sur les générations alternantes de certains animaux inférieurs et sur le polymorphisme de quelques champignons. Hallier, professeur de botanique à l'Université d'Iéna, crut pouvoir étendre ces données nouvelles au développement des organites que l'on signalait déjà de

tous côtés dans les lésions de plusieurs maladies transmissibles de l'homme et des animaux.

Il rattacha, ce qui fut une grave erreur, toutes les granulations ou tous les micrococci virulents à des champignons inférieurs. Suivant le milieu dans lequel tombaient ces granulations sporifères, elles évoluaient plus ou moins complètement vers le végétal adulte d'où elles dérivèrent. Si ce milieu était vivant, elles produisaient des affections différentes et plus ou moins graves. Par la culture artificielle sur du blanc d'œuf, des fruits, du pain, de la glycérine, des excréments, etc., Hallier prétendait pouvoir remonter toujours à la forme adulte.

Imbu de ces idées, il attribua: le choléra nostras aux formes élémentaires du *Penicillium crustaceum* qui croît sur un grand nombre de substances végétales humides, et à celles du *Tilletia caries* qui cause la carie des blés; le choléra asiatique, à l'*Urocystis Orize*, un champignon du riz.

Dans la sérosité des pustules varioliques, Hallier cultiva un micrococcus qui serait un état allotrope de la *Torula rufescens*, champignon que l'on trouve sur des fumiers ou des excréments desséchés. Zurn et Hallier assignèrent la même origine aux granulations virulentes du vaccin et rattachèrent celles de la clavelée du mouton à la *Pleospira herbarium* qui végète sur le bois de la vigne, sur les pommes et les prunes. Il n'est pas jusqu'au vulgaire *Mucor mucedo* qui, à son tour, d'après Weiss et Zurn, ne produirait sous forme de micrococcus la péripneumonie contagieuse des bêtes bovines, voire même la rougeole des enfants, d'après Hallier.

La doctrine cryptogamique du botaniste d'Iéna, qui paraissait reposer sur des expériences rigoureuses, avait de plus, au premier abord, l'avantage de concilier les idées régnantes sur le parasitisme avec l'observation anatomo-pathologique. Le microscope montrait dans les organismes infectés des micrococcus ou des bacilles. Le polymorphisme de Hallier permettait d'en saisir la source susceptible de s'épuiser et de renaître spontanément, de façon à expliquer l'apparition, la propagation et l'extinction des épidémies.

Toutefois, elle était passible d'objections sérieuses et surtout elle manquait d'une base solide: Hallier, en effet, n'a jamais démontré qu'il était capable de communiquer une maladie virulente avec le résultat de ses cultures.

Cette doctrine confuse et stérile fut combattue par de Bary et Cohn; elle fut éclipsée par les travaux de ces dix dernières années et tomba dans l'oubli.

M. Koch inaugura cette série (1876), en cultivant jusqu'à la sporulation le bacille du sang de rate dans le sérum ou dans l'humeur aqueuse, sur la

platine du microscope, d'après la méthode de Cohn, et en montrant que les produits des cultures successives conservent la virulence des bacilles ensemencés. M. Pasteur reprit, avec ses élèves MM. Joubert et Chamberland, la culture du bacille charbonneux dans des récipients où les microorganismes virulents pouvaient évoluer en toute liberté. Ce procédé était imité de celui que l'auteur avait employé autrefois pour la culture du ferment alcoolique, du ferment butyrique, etc.

Par la même méthode, M. Pasteur fit ressortir la nature animée de l'agent virulent de la pyémie et de la septicémie gangréneuse. Il reconnut enfin que, parmi ces organismes pathogènes, il en est qui, à l'exemple des ferments, recherchent pour évoluer, le contact de l'oxygène libre (*aérobies*), tandis que d'autres se développent en dehors de la présence de ce gaz (*anaérobies*).

Aussitôt, une suite ininterrompue de découvertes illumina le champ de la pathologie : Toussaint détermina le microorganisme producteur du choléra des poules, Klein, Pasteur et Thuillier, celui du rouget du porc, Arloing, Cornevin et Thomas, celui du charbon emphysemateux du bœuf, Bouchard, Capitan et Charrin, Löffler, celui de la morve, Toussaint, Koch, celui de la tuberculose. Ce dernier détermina aussi le microorganisme du choléra asiatique.

Assurément, cette énumération ne comprend pas toutes les maladies dans lesquelles on a cité l'existence de corpuscules animés. La liste en est beaucoup plus longue. Malheureusement, le rapport de cause à effet entre les microorganismes et la maladie n'est pas encore irréfutablement établi pour toutes ces affections. Quoi qu'il en soit, les esprits se sont affermis dans la conviction que la virulence est fonction de la vie d'organismes inférieurs.

V

On a hésité longtemps sur la place de ces organismes dans la série des êtres vivants. De là, les noms de microphytes, microzoaires, microgermes, micrococci, microzymas, vibrions, bactéries, leptothrix, etc., etc., sous lesquels on les a désignés, d'une manière générale. Frappé des inconvénients d'une synonymie qui soulevait à chaque instant des contestations entre savants, Sédillot proposa, en 1878, de désigner ces êtres par le terme de Microbes (*μῑκρος*, petit, *βίος*, vie) qui n'impliquait que l'existence de propriétés sur lesquelles tout le monde était d'accord.

Aujourd'hui, on est unanime pour ranger les microbes pathogènes dans le règne végétal et dans le groupe des Bactériens. Mais il ne faudrait pas supposer que la discussion fût close sur ce sujet.

Microbes n'a pas d'autre signification que microorganismes et Bactéries n'a pas un sens très précis. Les bactériens virulents sont nombreux; ils appartiennent à des espèces et à des genres distincts. Quelques-uns sont assez complètement étudiés pour recevoir une désignation et une place particulières. D'autres se distinguent seulement par leurs propriétés, critérium le plus important pour les microorganismes pathogènes et dont il faut se contenter momentanément.

La marche de la science ne peut être enrayée par une simple question de taxonomie ou de mots. Les meilleurs esprits se sont ralliés à cette opinion. Aussi voyons-nous grandir de jour en jour le nombre et l'importance des découvertes de la bactériologie ou microbiologie. Appliquées à la pathologie, elles démontrent de plus en plus que les virus et les ferments sont identiques.

Longtemps obscurcies par les théories et les systèmes, nos idées se sont éclairées tout à coup au flambeau de l'expérimentation.

Les microbes pathogènes sont nombreux et l'on aimerait à pouvoir leur assigner des caractères morphologiques précis. Malheureusement, la polymorphie, commune dans le monde des champignons, s'étend aux algues inférieures. Les assertions de M. Zopf sur ce point ont été confirmées en grande partie par plusieurs observateurs. Dans tous les cas, elles ne paraissent plus exagérées. On sait pertinemment qu'il suffit de modifier la composition du milieu nutritif, celle de l'atmosphère ambiante, de faire varier la température, pour changer notablement la forme extérieure et les dimensions d'un microbe, au point qu'il serait permis de le transporter tantôt dans un genre, tantôt dans un autre.

En présence de l'incertitude des caractères morphologiques, le microbiste s'est attaché aux propriétés pathogènes. Il a cru qu'un bactérien est surtout caractérisé par la maladie qu'il peut déterminer chez l'homme ou les animaux. Mais les progrès de la science lui enlevèrent jusqu'à cette planche de salut. On est parvenu à supprimer peu à peu la virulence d'un microbe pathogène, en lui conservant son pouvoir végétatif. Ainsi transformé, il vit et se multiplie comme un microbe vulgaire. Toutefois, les expériences de M. Pasteur sur le microbe du choléra des poules, celles de M. Arloing sur le streptocoque de la septicémie puerpérale et surtout celles de M. Chauveau sur le bacille du charbon, ont établi que si un microbe dépourvu de virulence rencontre dans la nature certaines conditions de milieu, il reprend plus ou moins rapidement toute sa malignité.

Plus on va, plus s'effacent les limites tranchées que l'on avait cherché à établir entre les bactéries

vulgaires et les bactéries virulentes, entre le *saprogénisme* et le *pathogénisme*.

VI

Cette revue serait incomplète, si nous n'examinions l'évolution des idées sur le mécanisme de la maladie dans les affections virulentes.

L'état solide et la nature animée des virus une fois démontrés, on a supposé que les microbes entraînaient la maladie et la mort soit en obstruant les vaisseaux sanguins dans les organes indispensables à la vie, soit en disputant victorieusement des éléments nutritifs à l'organisme assiégé par eux.

Il est probable que ces deux modalités de l'influence microbienne ne sont pas étrangères à la production de la maladie; mais elles ne constituent pas toute la pathogénie virulente. Ainsi, dans certaines affections, telle que la tuberculose, les microbes irritent les cellules des organes et provoquent des inflammations qui envahissent progressivement les tissus, les suppriment au point de vue fonctionnel et entraînent leur dégénération.

Bientôt, l'assimilation des microbes aux ferments est devenue plus complète. On leur a attribué la faculté de sécréter des poisons qui se mélangent aux liquides nutritifs et provoquent des troubles divers, dont la description reproduit toute la symptomatologie des maladies virulentes. Expérimentateurs et cliniciens se sont donné la main pour démontrer que les microbes virulents exercent cette faculté dans les cultures artificielles et dans l'économie des malades.

La virulence est donc proportionnelle à la quantité et à la qualité des produits sécrétés. Mais que sont ces produits? On a d'abord songé à les comparer aux alcaloïdes cadavériques, puis aux substances toxiques fabriquées par les cellules de l'organisme pendant le mouvement nutritif. Les recherches de M. Armand Gautier et de M. Briegey ont largement contribué à les faire assimiler aux substances connues sous le nom de *ptomaïnes* ou de *leucomaines*. Des travaux plus récents ont montré que les substances toxiques sécrétées par les microbes et qui impriment aux maladies virulentes leur faciès particulier, sont probablement multiples. Nous avons eu l'occasion de voir que certains microbes fabriquent de véritables diastases dont le rôle pathogénique, local et général, est quelquefois plus important que celui des ptomaïnes. Aussi, pour ne pas trop préjuger de la nature des matières essentiellement actives parmi celles que fabriquent les microbes pathogènes, on leur donne souvent aujourd'hui le nom vague de *toxines* ou de *toxalbumines*.

Grâce aux assertions de M. Chauveau et de Toussaint et aux recherches expérimentales de Woolridge, de M. Charrin, de MM. Salmon et Smith, de MM. Roux et Chamberland, on sait que les sécrétions microbiennes prennent une large part dans la production de l'immunité accidentelle et provoquée dans les maladies virulentes qui ne récidivent pas. D'après ces vues, dans les affections sans lésions déterminées et sans siège fixe, le microbe n'est donc qu'indirectement pathogène et virulent.

M. Bouchard s'est demandé si les toxines ne renfermeraient pas des *matières toxiques* proprement dites et des *matières vaccinales* que l'on pourrait séparer, au grand profit de l'immunité. Les expériences de M. Gamaleia ont prouvé que cette hypothèse est fondée, au moins dans certains cas.

L'action des toxines est encore plus variée que nous l'avons dit dans les lignes précédentes. Elle paraît encore, dans de rares circonstances, favoriser la pullulation des microbes dans des organismes doués de réceptivité, ou la permettre chez des animaux absolument réfractaires. Nous devons surtout cette notion nouvelle à M. Courmont et à M. Roger.

Par leurs sécrétions, les microbes peuvent donc empoisonner, préparer ou stériliser les terrains animés où ils s'implantent. Mais il faut bien noter que ces résultats sont loin d'être obtenus toujours séparément. Le plus souvent, la stérilisation est précédée et accompagnée d'une intoxication quelquefois mortelle.

En étudiant l'organisme aux prises avec les microbes virulents, on a constaté qu'il opposait aux envahisseurs une résistance plus ou moins grande, assez énergique parfois pour triompher de leurs attaques. Les travaux de M. Metchnikoff, de MM. Massart et Bordet, sur le phagocytisme et la migration des cellules lymphatiques, ont jeté une certaine clarté sur quelques points de cet important travail. On en a conclu que la pathogénie virulente n'est pas tout entière dans le microbe. Le microbe est bien la semence, le virus sans lequel il n'y a pas de maladie; mais l'organisme vivant est comme un terrain dans lequel la semence rencontre ou ne trouve pas les conditions favorables et nécessaires à sa germination. Bien plus, pour qu'il y ait maladie, il faut encore que l'économie, dans ses éléments, ses tissus ou ses systèmes, réagisse sous les sécrétions du microbe envahisseur; sinon, la contamination restera sans effet.

S. Arloing,

Correspondant de l'Académie des Sciences,
Directeur de l'Ecole vétérinaire de Lyon.

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DU HALO EN PHOTOGRAPHIE ¹

On remarque fréquemment sur les clichés photographiques un empatement des parties opaques sur les parties transparentes. Les contours de l'image des objets lumineux ou vivement éclairés ne sont pas nettement définis; ils envahissent les portions voisines et s'étendent d'autant plus que la radiation émise ou réfléchie par l'objet considéré est plus intense.

On a donné jusqu'ici de ce phénomène l'explication suivante :

Considérons une lame de verre MNFG (fig. 1) dont la surface MN est recouverte d'une matière sensible. Les rayons lumineux qui forment l'image et qui frappent la substance impressionnable subissent une extinction en même temps qu'ils déterminent la modification latente de cette substance. Mais ils ne sont généralement pas absorbés d'une façon complète. Une fraction de la lumière




Fig. 1.

du pinceau incident AB traverse la couche. Les rayons non absorbés se réfractent dans la lame de verre suivant BC; ils sont alors en partie transmis suivant CD, et en partie réfléchis sur la face postérieure FG de cette lame; ils agissent donc de nouveau en E sur la couche sensible.




Fig. 2.

Cette explication fort simple et qui vient tout d'abord à l'esprit n'est pas compatible avec un certain nombre de faits se rattachant au même ordre de phénomènes. Si l'on photographie, par exemple, une petite

surface lumineuse se détachant sur un fond noir, telle que la flamme d'une bougie située dans un

lieu obscur assez loin de l'appareil pour que l'image soit très petite, on peut constater sur le négatif que le halo principal A''N (fig. 2) est séparé de l'image A par une couronne A''A'''. Cette apparence peut être généralement constatée autour de l'image des becs de gaz dans les photographies obtenues la nuit.

D'autre part, quand on supprime le support ou que l'on utilise des pellicules sensibles, on constate que le halo, bien que réduit dans une large mesure, ne disparaît pas cependant d'une manière complète.

I

Nous nous sommes appliqués à analyser expérimentalement le phénomène, et, procédant par élimination, à en déterminer les causes autant que possible avec leur valeur relative.

Nous avons été conduits à rechercher la fraction de halo due :

- 1° Au support;
- 2° A la diffusion dans la couche sensible;
- 3° Au passage des rayons lumineux à travers l'objectif.

Pour atteindre ce but, nous avons disposé une chambre noire munie d'un objectif en face d'un petit disque blanc éclairé par une lumière très intense et se détachant sur un fond noir.

Après avoir mis au point, sur la glace dépolie, l'image du disque, nous avons exposé, pendant le même temps, une série de surfaces sensibles provenant d'une même préparation.

L'exposition d'une plaque ordinaire sur verre, sans précaution spéciale, nous a donné d'abord le halo total. L'influence du support a été ensuite éliminée en opérant soit avec des couches sensibles étendues sur des supports opaques et présentant une surface noire mate, soit encore avec des pellicules constituées uniquement par l'émulsion sèche.

On a pu constater que le halo se trouvait alors notablement réduit et qu'il n'était pas possible, dans ce cas, de trouver trace de la couronne représentée dans la figure 2.

Une fraction importante du halo est donc due aux conditions énoncées en 2° et en 3°.

Il importait ensuite de déterminer l'effet de la diffusion des rayons lumineux dans la couche sensible. Cette détermination eut lieu de la manière suivante :

Continuant à faire usage des surfaces sensibles sur support opaque, nous fixions sur ces surfaces un écran percé d'une ouverture circulaire corres-

¹ Voyez aussi sur ce sujet l'important mémoire de M. A. Cornu, de l'Institut, dont M. Gariel a rendu compte dans notre numéro du 30 mai 1890, page 304. N. D. L. R.

pendant exactement à l'image du disque lumineux et ne laissant agir la lumière sur la matière impressionnable que sur cette image même. L'influence du support était ainsi supprimée, seule la diffusion dans la couche de gélatino-bromure pouvait, dans ce cas, déterminer l'élargissement de l'image.

L'expérience a montré que l'effet de cette diffusion est extrêmement faible et peut être considéré pratiquement comme nul. Il fut facile d'ailleurs de contrôler ces résultats par une expérience qui est la contre-partie de la précédente. Cette expérience consiste à masquer exactement par un écran circulaire opaque et noir mat la portion de la couche sur laquelle l'image du disque vient se former, en employant toujours les supports opaques. La valeur de la fraction du halo attribuable au passage des rayons lumineux à travers les lentilles de l'objectif pouvait alors être appréciée. L'impression dans ce cas fut en concordance complète avec les opérations antérieures. Si, en effet, on superpose les négatifs obtenus avec les dispositifs précédents, on peut constater que l'image qui en résulte est identique à celle que l'on obtient sur une plaque ordinaire et sans précautions spéciales. On peut d'ailleurs observer directement l'effet de l'objectif. Il suffit pour cela de disposer d'un appareil photographique dans un laboratoire obscur et de mettre au point sur un écran très mince l'image d'un disque suffisamment éclairé, découpé dans le volet de ce laboratoire. Si l'on ne prend aucune précaution particulière, l'image du disque semble se détacher nette et brillante sur le fond noir et il n'est pas possible de constater l'existence du halo; mais si l'on vient à masquer exactement l'image à l'aide d'un écran de même forme que celle-ci, on remarque aussitôt l'auréole qui rayonne souvent fort loin.

L'œil, en quelque sorte ébloui par l'image très lumineuse, est incapable de percevoir la lumière faible qui règne autour de cette image; ce qui prouve une fois de plus combien la plaque photographique voit, dans certains cas, mieux que l'œil, et quel important concours elle peut apporter dans l'observation.

On peut conclure de là que le halo est dû à deux causes principales : au support et à l'objectif.

II

Influence du support. — L'expérience montre que l'apparence que nous offre la figure 2, apparence qui consiste en une auréole séparée de l'image par une couronne, n'est due qu'au support. On peut constater que cette couronne est toujours circulaire, quelle que soit l'incidence des rayons; qu'elle soit placée

au bord de la plaque sensible ou vers le centre, elle ne change point de forme.

Considérons en A (fig. 3) sur la couche sensible MN l'image d'un point lumineux. La substance sensible translucide diffuse le pinceau incident en A, et l'on peut considérer ce point comme une source lumineuse qui envoie des rayons dans toutes les directions.




Fig. 3.

Les rayons tels que AB, AE, sont en partie transmis suivant BC, EF, et en partie réfléchis suivant BD, EG. Mais on peut remarquer que lorsque les rayons qui, émanés de A, frappent la face postérieure du verre OP, de façon à former avec la normale à cette surface un angle AAR égal à l'angle limite ou plus grand que ce dernier angle, il y a réflexion totale.

Toute la lumière incidente est donc réfléchie suivant A'A'', tandis que pour les rayons tels que AE et AB la plus grande partie de cette lumière est transmise. Une très faible fraction seulement est réfléchie. On conçoit donc que de A en A' la couche MN reçoive beaucoup moins de lumière que dans le voisinage de N.

L'auréole que l'on constate autour des points lumineux dans certaines photographies est donc due à un phénomène de réflexion totale.

Il est d'ailleurs facile de calculer le diamètre de la couronne. Si l'on appelle e l'épaisseur AR du verre et l l'angle limite AA'R, on a dans le triangle RAA' :

$$AR = AR \tan l = e \tan l$$

Or AR est le quart du diamètre de la couronne A''A''' ; en appelant d ce diamètre on a :

$$d = 4 e \tan l.$$

Dans le cas du verre à vitres que nous avons utilisé pour nos expériences, nous avons calculé l'angle limite et nous avons trouvé :

$$l = 41^{\circ} 48'$$

$$\tan l = 0,894$$

par suite :

$$d = 4 e \tan l = e \times 3,576$$

Les diamètres obtenus ont été les suivants :

Épaisseur du verre e	Diamètre de la couronne en m/m	
en m/m	Calculé	Mesuré
2,3	8,22	8,1
2,6	9,29	9,2
3,1	11,08	10,9
3,4	12,15	12,0

Les résultats de l'expérience s'accordent donc avec la théorie du phénomène.

Les diamètres mesurés sont plus petits que les diamètres calculés; on aurait pu le prévoir *a priori*. Cette différence est due à ce que l'image lumineuse A n'est pas un point, mais une petite surface dont les dimensions ne sont pas négligeables.

On conçoit d'ailleurs que plus cette surface est étendue, plus le diamètre de la couronne diminue. La couronne disparaît complètement lorsque la portion lumineuse de la couche atteint une surface qui dépasse une limite donnée. Cette limite dépend elle-même de l'indice de réfraction de la matière dont est composé le support et de l'épaisseur de ce support.

La lecture d'un remarquable mémoire de M. André¹, l'éminent directeur de l'Observatoire de Lyon, nous a donné l'idée de représenter graphiquement ce phénomène. Si dans le voisinage de l'image d'un point, et en chacun des éléments de surface du plan focal, on élève une ordonnée dont la longueur soit proportionnelle à l'intensité de l'image développée, on forme un solide de révolution dont la section par un plan, passant par l'axe xy , présente la forme ABCDEF (fig. 4).




Fig. 4.

Lorsque l'image brillante d'un objet occupe une surface appréciable sur la plaque sensible, on peut

se faire une idée de l'effet du support en construisant en chacun des points de cette image le solide représenté par la figure 4.

Ces solides, représentant l'auréole due à chacun des points brillants de l'image, se superposent, empiètent les uns sur les autres et la couronne devient confuse. Elle peut même disparaître complètement lorsque le diamètre de l'image lumineuse dépasse la moitié du diamètre de la couronne que donnerait dans les mêmes conditions un point géométrique.

Il faut donc pour que cette couronne soit visible :

1° Que l'intensité lumineuse de l'image considérée soit suffisante, et que la couche sensible soit assez mince pour transmettre une partie des radiations qui la frappent.

2° Que le temps de pose soit convenablement prolongé.

3° Que la surface occupée par l'image sur le plan focal soit suffisamment réduite.

Influence de l'objectif. — En éliminant, comme il a été indiqué au début de cet article, l'influence du support, on constate expérimentalement que le halo dû à l'emploi de l'objectif va en décroissant au fur et à mesure que l'on s'éloigne des contours de l'image géométrique.

L'expérience nous a montré en outre que l'intensité et l'étendue de l'auréole dépendent essentiellement de l'état des surfaces des lentilles de l'objectif. Elle est réduite au minimum lorsque les lentilles sont parfaitement polies et très propres. Il suffit de déposer une poussière ténue à leur surface pour augmenter le halo dans de très larges limites.

Les clichés obtenus au moyen d'une simple ouverture de petit diamètre pratiquée dans une mince lame métallique fixée au lieu et place de l'objectif, mettent bien en relief cette influence du défaut de polissage des lentilles. Il est en effet impossible, dans ces conditions, de voir se manifester la moindre auréole si l'on prend la précaution d'éliminer l'influence du support de la couche sensible, et si le diamètre de l'orifice est assez grand pour que l'on puisse négliger l'effet de la diffraction.

L'explication théorique du halo produit par cette dernière cause : *état de l'objectif* reste à trouver, croyons-nous; nous nous proposons de chercher la solution de cette question.

Auguste et Louis Lumière,

Fabricants de plaques photographiques à Lyon.

¹ Comparaison des effets optiques des petits et grands instruments d'astronomie. (Association typographique, Lyon, 1889.)

LES FONCTIONS HYPER-BERNOULLIENNES ET LA FONCTION $p(u)$

La *Revue* a rendu compte il y a quelques mois ¹ du travail où nous avons exposé la théorie et quelques applications des *Fonctions hyper-Bernoulliennes* ².

Nous avons montré comment elles se rattachent à un certain nombre de fonctions connues. Mais, à ce propos, notre mémoire présente une lacune, qu'il importe de signaler.

C'est un fait notable que la fonction $p(u)$ de M. Weierstrass, base de toute la théorie des fonctions elliptiques, telle qu'elle est exposée dans l'ouvrage si remarquable du regretté Halphen ³, peut être considérée comme une fonction hyper-Bernoullienne.

Halphen a observé (*loc. cit.*) que l'expression algébrique $(n-1)A_1A_{n-1} + (n-2)A_2A_{n-2} + \dots + A_{n-1}A_1$ est susceptible d'une transformation importante. Présentée, comme nous allons le faire, à un point de vue général, cette formule intéresse la théorie de toutes les fonctions hyper-Bernoulliennes.

La formule fondamentale

$$\varphi(n)A_n = A_1A_{n-1} + A_2A_{n-2} + \dots + A_{n-1}A_1$$

donne

$$n\varphi(n)A_n = (n-1)A_1A_{n-1} + (n-2)A_2A_{n-2} + \dots + A_{n-1}A_1 + A_1A_{n-1} + 2A_2A_{n-2} + \dots + (n-1)A_{n-1}A_1$$

et, par conséquent,

$$\frac{n}{2}\varphi(n)A_n = (n-1)A_1A_{n-1} + (n-2)A_2A_{n-2} + \dots + A_{n-1}A_1.$$

Ainsi, l'expression

$$(n-1)A_1A_{n-1} + \dots + A_{n-1}A_1$$

peut toujours se remplacer, quelle que soit la *clef* $\varphi(n)$, par

$$\frac{n}{2}(A)_n.$$

¹ Voyez la *Revue* du 15 mars dernier, p. 146.

² Voyez le Volume LII des *Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers* publiés par l'Académie royale de Belgique.

³ G.-H. HALPHEN, membre de l'Institut. *Traité des fonctions elliptiques et de leurs applications*. Paris, Gauthier-Villars, 1886.

⁴ Cette remarque, si évidente qu'elle soit, est importante parce que, en posant

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_n x^n \dots$$

on a

$$f(x)f'(x) = \dots [2\alpha_0\alpha_{n-1} + 2\alpha_1\alpha_{n-2} + \dots + (n-1)\alpha_1\alpha_{n-1} + n\alpha_n\alpha_n]x^{n-1} + \dots$$

Le coefficient de x^{n-1} , dans ce développement, est donc

$$n\alpha_n\alpha_n + \frac{n}{2}(A)_n.$$

Pour l'établir, nous devons rappeler la définition des fonctions hyper-Bernoulliennes. Soient

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n, \dots$$

les coefficients d'une fonction d'une lettre x , développée en série. Si l'on pose, comme nous l'avons fait dans le Mémoire cité,

$$\varphi(n)A_n = (A)_n^1$$

il est facile de reconnaître que $p(u)$ est une fonction hyper-Bernoullienne, correspondant à une clef du second ordre.

Posons, avec Halphen (*loc. cit.*, p. 92) :

$$p(u) = \frac{1}{u^2} + C_1 + C_2 u^2 + C_3 u^4 + \dots + C_n u^{2n-2} + \dots$$

Si l'on tient compte de la relation connue

$$p''(u) = 12p(u)p'(u),$$

en égalant les termes qui correspondent aux mêmes puissances de u , dans les deux membres, on trouve

$$C_1 = 0, \text{ puis}$$

$$(A) \quad (2n-2)(2n-3)(2n-4)C_n = 24[(n-1)C_{n-1} + (n-3)C_{n-2}C_2 + (n-4)C_{n-3}C_3 + \dots + C_{n-2}C_2 - C_n]$$

D'après cette remarque, la relation (A) prend la forme ² :

$$\frac{(2n+1)(n-3)}{3}C_n = C_2C_{n-2} + C_3C_{n-3} + \dots + C_{n-2}C_2.$$

¹ Dans cette formule, $\varphi(n)$ désigne une fonction de n , que nous appelons la *Clef*; et $(A)_n$ représente, symboliquement, la suite

$$A_1A_{n-1} + A_2A_{n-2} + \dots + A_{n-1}A_1.$$

La formule en question permet donc de calculer, par voie récurrente, les coefficients A , à partir de $n=p$, connaissant $A_p, A_{p-1}, \dots, A_{p-p+1}$.

Dans certains cas, la *série adjointe* aux nombres récurrents α , étant de parité impaire, on doit poser

$$f(x) \equiv \alpha_0 x + \alpha_1 x^3 + \alpha_2 x^5 + \dots + \alpha_n x^{2n+1} + \dots$$

Dans cette hypothèse, on a

$$(1) \quad f(x)f'(x) \equiv \dots [2\alpha_n\alpha_n + 3\alpha_{n-1}\alpha_n + \dots + (2n-1)\alpha_{n-1}\alpha_1 + (2n+1)\alpha_n\alpha_n]x^{2n+1} + \dots$$

Pour exprimer le coefficient de x^{2n+1} , en fonction des quantités α_n et $(A)_n$, on observera que les relations :

$$\varphi(n)A_n = A_1A_{n-1} + \dots + A_{n-1}A_1$$

$$\frac{n}{2}\varphi(n)A_n = (n-1)A_1A_{n-1} + \dots + A_{n-1}A_1,$$

donnent

$$(n+1)\varphi(n)A_n = (2n-1)A_1A_{n-1} + \dots + 3A_{n-1}A_1,$$

d'après cela, le coefficient du terme en x^{2n+1} , dans (1), est

$$(2n+2)\alpha_n\alpha_n + (n+1)(A)_n.$$

² Pour le calcul nécessaire, très simple d'ailleurs, voyez le *Traité d'Halphen*, p. 92.

égalité qu'on peut écrire

$$\frac{(2n+1)(n-3)}{3} C_n = (C)_n, \quad (\text{II})$$

en adoptant notre notation.

Pour appliquer cette formule, il faut poser

$$(C)_n = C_1 C_{n-1} + C_2 C_{n-2} + \dots + C_{n-1} C_1,$$

en supposant

$$C_1 = 0, \quad n = 4, 5, \dots$$

La formule ne fait pas connaître les coefficients C_2, C_3 ; mais ceux-ci se calculent, comme l'on sait, directement, par les égalités :

$$C_2 = \frac{g_2}{20}, \quad C_3 = \frac{g_3}{28};$$

g_2, g_3 désignant les invariants de $p(u)$.

En résumé, la fonction $p(u)$, ou, pour mieux dire, la fonction $p(u) - \frac{1}{u^2}$ est une fonction hyper-Bernoulliennne, correspondant à une clef du second degré, dont la valeur est

$$\frac{(2n+1)(n-3)}{3}.$$

De cette observation découle, si nous ne nous trompons, un intérêt nouveau s'attachant à ces

fonctions hyper-Bernoulliennes qui nous ont conduit, entre autres conséquences dignes de fixer sur elles l'attention, à l'intégration directe de l'équation de Riccati, dans le cas le plus général.

Nous ferons une dernière remarque.

Nous avons tenu, en signalant la propriété précédente relative à la fonction $p(u)$, à reproduire la démonstration qu'en a donnée Halphen. Mais on peut observer que la formule (II) s'obtient plus rapidement de la manière suivante.

Prenons la relation (Halphen, p. 27) :

$$p''(u) \equiv 6p^2(u) - \frac{1}{2}g_2,$$

on a, immédiatement,

$$\dots (2n-2)(2n-3)C_n u^{2n-5} \dots \equiv \dots 6[2C_n + (C)_n]u^{2n-5} \dots$$

et, par suite

$$[(n-1)(2n-3)-6]C_n = 3(C)_n,$$

ou, finalement,

$$\frac{(2n+1)(n-3)}{3} C_n = (C)_n,$$

comme nous l'avons déjà vu.

G. de Longchamps,

Professeur au lycée Charlemagne.

LAVOISIER, D'APRÈS M. BERTHELOT¹

Lorsqu'il y a deux ans fut annoncé le bel ouvrage de M. Grimaux sur Lavoisier, cette nouvelle étonna d'abord le monde savant. Il semblait que, près d'un siècle s'étant écoulé depuis la mort de notre illustre compatriote, tout eût dû être dit sur sa personne et ses travaux. Dumas, en 1836, lui avait consacré, dans sa *Philosophie chimique*, des pages émues, demeurées dans toutes les mémoires. Il avait ensuite, selon ses propres paroles, « doté les chimistes de leur bréviaire », en publiant les *Œuvres* du créateur de leur science. Wurtz, dans la magistrale préface du *Dictionnaire*, avait défini le caractère et la portée de la révolution opérée par Lavoisier. Aucun hommage n'avait manqué à sa gloire, partout célébrée, même dans la patrie de Priestley, naturellement peu encline à voir dans la chimie « une science française ». L'origine de chacune de ses découvertes avait provoqué à ce sujet, dans tous les pays, de retentissantes con-

troverses, après lesquelles paraissait terminée la tâche de l'historien.

Le livre de M. Grimaux justifia l'intérêt causé par son apparition : on y trouva, rassemblés avec art, des documents inédits qui éclairaient d'un jour nouveau la grande figure de Lavoisier : on fut charmé d'apprendre sur la vie du grand homme, son caractère, ses goûts, ses amitiés, ses occupations de chaque jour et sa façon de travailler, quantité de faits intéressants. C'était un Lavoisier, sinon nouveau, au moins beaucoup mieux connu, qui se dégageait de cette consciencieuse étude. L'auteur s'était surtout appliqué à nous donner la biographie du financier et du savant, jugeant suffisamment connue, pour n'y plus guère revenir, l'histoire des découvertes qui ont immortalisé sa mémoire.

Contre toute attente, cette histoire vient de recevoir un précieux complément d'information. Les registres de laboratoire de Lavoisier, restés jusqu'alors propriété de famille, ont été récemment déposés par son héritier, M. de Chazelles, dans les archives de l'Institut, où ils ont tout de suite attiré

¹ M. BERTHELOT, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. — *La Révolution chimique : Lavoisier*; 1 vol. in-8° de la Bibliothèque scientifique internationale. Paris, Alcan, 1890.

la curiosité philosophique de M. Berthelot. On ne saurait y chercher des révélations sur des travaux de Lavoisier demeurés inconnus. L'intérêt de ces documents est ailleurs. Ils nous renseignent moins sur les découvertes du fondateur de la Chimie que sur la manière dont il les faisait, la discipline qu'il s'imposait dans la critique expérimentale des opinions scientifiques, les hypothèses que la vue immédiate des faits suscitait dans son esprit, la série des raisonnements intimes qui le conduisaient tantôt à les abandonner, tantôt à les modifier, plus souvent à les étendre.

En raison de la haute importance que ces *Registres* offrent à ce point de vue, M. Berthelot a tenu à en publier l'analyse avec quelque détail. Il y a joint de précieux commentaires qui en facilitent l'intelligence et mettent bien en lumière la méthode suivie par Lavoisier dans toutes les directions où s'engageait son esprit. L'éminent Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences est ainsi parvenu à reconstituer ce qu'en quelque sorte on pourrait appeler l'évolution psychologique de Lavoisier, la série des phases que son génie a successivement traversées, l'enchaînement logique des découvertes et l'histoire précise des idées qu'il a introduites dans le monde.

L'ouvrage que nous analysons a pour objet cette exposition méthodique. Mettant à profit les données depuis longtemps acquises, celles que l'on doit à M. Grimaux, enfin les faits qui résultent de l'examen attentif des *Registres*, l'auteur nous apporte une étude d'ensemble sur Lavoisier, principalement sur son œuvre. Il nous paraît d'autant plus intéressant d'en rendre compte que des critiques, dont nous aurons à apprécier la justesse, viennent d'être adressées d'outre-Manche au livre de M. Berthelot.

I

L'enfance et l'adolescence de Lavoisier ont été souvent racontées. Nous n'y reviendrons pas. Après quelques tentatives littéraires, il se prit de passion pour la culture scientifique générale, étudia l'astronomie avec La Caille, la botanique avec Bernard de Jussieu, la minéralogie avec Guettard, la chimie avec Rouelle. S'il entra plus tard dans la finance, ce fut pour en vivre, et non pas que par goût il s'y sentit attiré. Il s'y montra bienfaisant, étant, « comme tous les esprits élevés de son temps, sympathique aux causes populaires ». Cependant, incapable du généreux dévouement d'un d'Alembert à la philosophie et à l'humanité, il assista en quelque sorte avec indifférence, tout au moins sans y prendre part, à la révolution morale qu'accomplissaient autour de lui les plus célèbres de ses contemporains. Les sciences de la Nature absorbaient son enthousiasme. Il leur con-

sacrait six heures par jour, répétant les expériences récentes des physiciens, ses émules, et s'exerçant à les interpréter. Cette pratique de Lavoisier, malheureusement peu imitée aujourd'hui, mérite, croyons-nous, qu'on la remarque, car elle est en parfaite harmonie avec son œuvre, toute d'analyse et de discussion. Elle lui attirait la visite fréquente des gens de science. Macquer, Baumé, Darcet, Guyton de Morveau, Charles, LAGRANGE, Laplace, Meunier, Séguin, Monge, Berthollet, Fourcroy se réunissaient souvent dans son laboratoire. Ils s'y rencontraient avec quelques grands seigneurs intelligents et des savants étrangers, en passage à Paris, qui s'appelaient Priestley, Watt, Franklin, Blagden, Igenhousz. Lavoisier travaillait en leur présence, quelquefois avec leur concours. Un jour par semaine il s'isolait : en compagnie de sa femme, il se livrait du matin au soir à des recherches originales. Libre de tout préjugé d'école, il osait douter des théories qui ne satisfaisaient pas sa raison, éprise de clarté et de rigueur, et il instituait des expériences pour les juger.

C'est de là qu'est sortie toute son œuvre. M. Berthelot la résume en disant qu'il *a changé la conception de la matière*. De son temps, en effet, subsistait, quoique sous une forme épurée, le système de la vieille alchimie, encore tout empreint de la philosophie de Platon. L'une des modalités de la substance des corps, — celle que nous appelons aujourd'hui leur *état*, — était prise pour leur substance même. C'est ainsi que l'eau, identifiée à la liquidité, constituait un élément, comme l'air et le feu, principes de la gazéité et de la chaleur. Pour transformer un corps en un autre, il suffisait d'y accumuler les propriétés, considérées comme contingentes, de ce dernier : couleur, densité, etc... Mais, l'insuccès prolongé de l'alchimie avait fini par faire abandonner cet espoir relativement aux métaux ; on se sentait obligé d'admettre en chacun d'eux un radical permanent, en quelque sorte personnel. Loin d'étendre cette conclusion au carbone, au soufre, à l'arsenic, au phosphore, aux gaz, d'une façon générale à nos métalloïdes actuels, on les confondait avec les phénomènes mêmes de leurs réactions. Le soufre disparaissait en dégageant, comme au temps de Pline, le feu qu'il contenait.

Stahl, vers le commencement du XVIII^e siècle, avait essayé de comprendre ces faits dans une loi commune : il rapprochait la combustion et la calcination, voyant à la fois, dans les corps inflammables et dans les métaux, des substances unies au principe du feu ou *phlogistique*. En chauffant les métaux, on libérait le phlogistique et l'on isolait ainsi les *terres*.

A l'époque même de Lavoisier, cette théorie était

universellement acceptée. On avait depuis longtemps oublié les remarques fort justes, incomprises d'ailleurs, qu'avait faites autrefois (1630) le médecin Jean Rey sur l'augmentation de poids des métaux qui se convertissent en terres. La récente découverte de l'oxygène par Priestley et les observations, à la vérité fort confuses, de Bayen sur la calcination du mercure, ne suggérèrent à personne des doutes sur la doctrine de Stahl. On peut dire avec vérité qu'à cette époque Macquer exprimait l'opinion unanime de ses contemporains, en écrivant : « La combustion est le dégagement du principe de l'inflammabilité. »

Seul, Lavoisier a renversé cette théorie. Il lui a substitué la notion absolue de substances élémentaires, distinctes du principe du feu, et se conservant à travers la série, pour ainsi dire indéfinie, de leurs combinaisons, sans perte ni addition de poids. Le premier, il sépara de la matière tangible la chaleur et la lumière, souvent employées pour la transformer, et reconnut le caractère impondérable de ces derniers agents. Loin de concevoir cette révolution dès le début de sa carrière, c'est par une longue suite de *pourquoi* successivement résolus qu'il fut conduit à l'effectuer.

II

Il porta surtout son attention sur les conséquences à tirer de l'emploi judicieux de la balance dans l'étude des réactions chimiques. M. Berthelot relève à cet égard l'erreur commune qui consiste à attribuer à Lavoisier la découverte du principe : « Rien ne se perd, rien ne se crée. » C'était là une idée fort ancienne, conçue par Epicure et les atomistes de l'Antiquité, formulée par Lucrèce, admise ensuite par les alchimistes. Contrairement aussi à l'opinion vulgaire, ce n'est pas Lavoisier qui a fait l'application de la balance à la chimie. Elle existait dans les laboratoires depuis fort longtemps. Zosime le Panopolitain en parle dans ses écrits. Pendant tout le moyen âge les chercheurs de pierre philosophale y ont eu recours. Le mérite de Lavoisier est d'avoir su s'en servir pour établir la permanence du poids, non de la matière en général, mais des différentes sortes de corps qu'on peut engager dans les combinaisons.

Plusieurs avaient jusqu'alors échappé à la pesée, parce qu'on ignorait la forme gazeuse qu'ils sont susceptibles d'affecter. La notion de gaz elle-même commençait à peine à se constituer. Suivant la vieille doctrine alchimique, l'air atmosphérique représentait l'essence commune à tous les fluides incoercibles. Ceux qu'avaient obtenus Van Helmont, Robert Boyle, Hales et leurs successeurs jusqu'à la seconde moitié du XVIII^e siècle, avaient été tenus pour de l'air vicié, et non pour des gaz distincts de

l'air ordinaire. Black, en 1757, *s'appuyant sur des pesées rigoureuses*, soutint le premier que l'air *sylyvestre*, — notre acide carbonique, — possède une existence propre. Il en donna cette preuve qu'il peut s'unir à la chaux « en lui faisant perdre sa causticité » et « en être régénéré par l'action du feu ou des acides ». Cette observation géniale de la fixation de l'air dans les corps prépara celle de Lavoisier sur l'oxydation des métaux. Elle était si nouvelle que pendant quelque temps encore on n'imaginait pas qu'elle pût mener à une loi générale. Lorsqu'en 1767 Cavendish démontra que l'hydrogène est un gaz spécial, il le considéra comme un composé d'air atmosphérique et de matière inflammable. Également imbu de la théorie de Stahl, Priestley s'obstina jusqu'à sa mort (1804) à voir de l'air *déphlogistiqué* dans l'oxygène; dont pourtant il avait eu l'habileté de reconnaître non seulement l'existence, mais les principales réactions. Il interpréta suivant la même doctrine la constitution de l'air *alcalin*, — notre ammoniac, — et des gaz aujourd'hui appelés azote, bioxyde et protoxyde d'azote, acide chlorhydrique et acide sulfureux, corps dont la chimie lui est redevable.

Si précieuse que fût la découverte de ces derniers gaz et de quelques autres, — par exemple celle du chlore par Scheele, — elle ne tranchait pas d'une façon décisive la question, que Lavoisier se posait alors dans ses *Registres*, de savoir si les différents *airs*, naturels ou artificiellement obtenus, sont « des substances à part ou des modifications de l'air atmosphérique ». Elles indiquaient toutefois que dans les opérations de la chimie il y avait lieu de tenir compte du poids de ces gaz.

Cette idée guida Lavoisier. A partir de 1774 il reconnut que c'est l'union intime d'une partie de l'air aux métaux, au carbone, au soufre, au phosphore qui produit les terres et les acides carbonique, sulfureux, phosphorique, etc... Ses expériences à ce sujet révélèrent un univers nouveau : au premier plan les relations pondérales des corps qui se combinent, — loi qui contient tout le système de la chimie, — au second plan la nature composée de l'air, formé de deux gaz, l'un actif dans la combustion, l'autre inerte. Cette dernière conclusion, presque sacrilège, substituait au dogme scientifique de l'air-élément la notion de l'état gazeux « applicable à une multitude de corps, sinon à tous ». Bientôt la découverte, non moins subversive, de la composition de l'eau, préparée par Cavendish et réalisée par Lavoisier (1783) étendit cette révolution.

Gazéité, liquidité, solidité apparaissaient dès lors comme des états de la matière déterminés par la quantité de feu qui la pénètre. Ce feu n'ajoutant aucun poids aux substances qui se combinent ou

se décomposent, il fallait enfin proclamer l'impondérabilité de la chaleur et lui assigner une nature absolument distincte de celle des corps. Ce fut là l'une des plus grandes découvertes de Lavoisier, l'une des plus fécondes qui aient jamais été faites dans la science.

Mais, si la chaleur n'intervenait plus comme poids dans les combinaisons, on ne pouvait cependant nier qu'elle y jouât un grand rôle. Black avait montré, en physique, le travail de la chaleur *latente*. En chimie on devait se demander de même si le feu agit comme substance et par sa masse, ou, simple modalité de la matière, ne représente que le résultat des mouvements moléculaires. Bien que, dans l'impossibilité de résoudre le problème, Lavoisier ait adopté la première hypothèse, plus conforme à la physique de son temps, il chercha avec Laplace ce qui adviendrait de la seconde : les deux savants appliquèrent à la chaleur le principe de la conservation des forces vives et fondèrent la thermochimie. S'il a fallu, après eux, en modifier la conception, c'est qu'ils y avaient introduit une idée fautive en supposant que c'est l'oxygène qui apporte la chaleur à la combustion, comme s'il s'y déchargait d'une provision latente de calorique. Grâce aux travaux de M. Berthelot, on sait aujourd'hui que la chaleur, au lieu de préexister dans chacun des composants, résulte de leur travail commun.

III

Les conditions physiques et chimiques de la combustion étant déterminées, le phénomène fondamental de la respiration et la production de la chaleur chez les animaux trouvaient leur explication. Cependant Lavoisier dut lutter pour l'imposer. Le premier il osa « assimiler un être vivant à un composé chimique, en étudiant l'oxydation par la même méthode et le soumettre », — avec Laplace, — « à des mesures semblables au point de vue de l'évaluation des gaz et de la calorimétrie ». Appliqué à l'homme, « ce genre d'observation, dit Lavoisier, conduit à comparer des emplois de forces entre lesquelles il semblerait n'exister aucun rapport. On peut connaître, par exemple, à combien de livres en poids répondent les efforts d'un homme qui récite un discours, d'un musicien qui joue d'un instrument. On pourrait même évaluer ce qu'il y a de mécanique dans le travail du philosophe qui réfléchit, de l'homme de lettres qui écrit, du musicien qui compose. Ces effets, considérés comme purement moraux, ont quelque chose de physique et de matériel, qui permet, sous ce rapport, de les comparer avec ceux que fait l'homme de peine. Ce n'est donc pas sans quelque justesse que la langue française a confondu sous la dénomination commune de travail, les efforts de l'es-

prit comme ceux du corps, le travail du cabinet et celui du mercenaire ». C'est ainsi que, parti d'observations d'ordre purement matériel, le génie de Lavoisier conduisait déjà la chimie jusqu'au seuil de cette science si nouvelle qu'à peine commençait-elle à se constituer depuis vingt ans : la psychologie expérimentale.

Dans le domaine même des combinaisons il ne se contenta pas d'établir des lois générales. Ses études sur la composition de l'eau l'amènèrent à poser les premiers principes de la méthode en chimie organique. On savait depuis longtemps que la combustion de l'alcool donne de l'eau ; d'où l'on avait conclu que ce dernier liquide préexistait dans l'alcool. Lavoisier, dosant l'eau formée, en recueillit un poids supérieur à celui de l'alcool employé ; il prit soin de peser aussi l'acide carbonique pendant la combustion. Ainsi fut réalisée « la première analyse élémentaire qui ait été faite d'une substance organique ». Cette méthode éclaira l'acte chimique de la fermentation. Elle montra que la fermentation vineuse « consiste dans la séparation du sucre en deux parties, par le seul partage de l'oxygène entre ces deux bases oxydables : le carbone et l'hydrogène ». La putréfaction fut expliquée par une séparation analogue de « composés préexistants », enfin la fermentation *acétuse*, par une simple oxydation.

IV

Cet ensemble de recherches conduisait, en dernière analyse, à des substances spécifiques, rebelles à toute tentative de décomposition. Ce furent là les *éléments* de Lavoisier. La définition qu'il en donnait était donc toute empirique. Mais, précisément parce qu'elle résumait des faits acquis, elle a servi de base ferme au système des équivalents, déjà conçu par lui en 1785 : « Je puis, disait-il, considérer les matières mises en présence et les résultats obtenus comme une équation algébrique, et, en supposant successivement chacun des éléments de cette équation inconnu, j'en puis tirer une valeur et rectifier ainsi l'expérience par le calcul et le calcul par l'expérience. »

« On voit par là, remarque M. Berthelot, que la chimie était par excellence, aux yeux de Lavoisier, la science de l'analyse. » Il usa cependant de la méthode inverse, mais seulement à titre de contre-épreuve et de vérification. La puissance créatrice de la synthèse « réalisant en actes les conceptions abstraites de la science » n'a été comprise que de nos jours. C'est à elle que la chimie doit d'avoir pu « former ses cadres définitifs et développer les séries indéfinies de ses combinaisons ».

Ces critiques montrent bien qu'en écrivant un livre sur Lavoisier, M. Berthelot a entendu nous donner une *étude*, non un panégyrique à la façon des auteurs

pour lesquels leur héros devient sacré, *noster*, comme on disait autrefois. A l'occasion de chaque découverte importante, il a eu soin d'indiquer les faits que, pour édifier son système, Lavoisier emprunta à ses contemporains. Ce souci tout scientifique de l'impartialité a choqué en France quelques personnes¹ qui confondent, selon nous, l'admiration due au génie avec l'idolâtrie. En Angleterre, le reproche inverse vient d'être adressé au savant professeur du Collège de France : de l'autre côté de la Manche, les chimistes se sont émus de ses assertions ; et tout récemment l'un de leurs interprètes les plus autorisés, le Professeur Thorpe, de la Société royale de Londres, a prononcé à ce sujet à l'*Association britannique*, un long discours. Toute son argumentation se résume en ceci : beaucoup de faits sur lesquels reposent les théories de Lavoisier ont été mis au jour par divers savants de son époque, notamment Watt, Cavendish, Priestley. On doit donc considérer comme l'œuvre de ces derniers la doctrine qui découle logiquement de leurs expériences. Cette réponse étonne d'autant plus que presque dans chaque chapitre du livre de M. Berthelot nous voyons Lavoisier occupé à reviser les observations de ses contemporains et réussir à en tirer, par voie d'analyse expérimentale, des conclusions personnelles, absolument originales et nettement contraires à celles des auteurs. C'est ainsi qu'après avoir mis à contribution un travail de Priestley relatif à l'acide nitrique, il put écrire, non sans malice : « Comme les mêmes faits nous ont conduits à des conséquences diamétralement opposées, j'espère que, si l'on me reproche d'avoir emprunté des preuves des ouvrages de ce célèbre physicien, on ne me con-

tera pas du moins la propriété des conséquences. »

Malgré tout le talent de son plaidoyer et la chaleur de ses convictions, M. Thorpe n'a donc fait, à notre sens, que ressusciter, — suivant la remarque anticipée de M. Berthelot, — « la querelle ancienne entre les inventeurs sagaces des faits particuliers et les hommes de génie qui découvrent les théories générales ». Or ce qui caractérise l'œuvre de Lavoisier, c'est, en quelque sorte, d'avoir fait parler l'expérience pour interpréter tout un ensemble de phénomènes dont personne avant lui n'avait aperçu les rapports. « S'il n'a pas toujours rencontré le premier les faits, dit à ce sujet M. Berthelot, il y a mis son empreinte et leur a donné leur vraie signification. *C'est à lui assurément qu'est dû le système général des théories qui ont transformé la science.* »

Tels furent les services rendus à la civilisation par l'un des plus grands hommes de notre pays. En rendant compte du livre que M. Berthelot lui a consacré, le journal anglais *Nature* écrivait récemment : « On ne trouve aucune statue de Lavoisier dans la ville où il naquit et mourut. Paris républicain craint sans doute de manifester un sentiment de tardif repentir au sujet du crime du 8 mai 1794. » Sans doute nous regrettons de ne point voir sur l'une de nos places publiques, au voisinage de l'Institut, où elle serait particulièrement bien placée, la statue de Lavoisier. Mais ce n'est pas seulement par le marbre ou le bronze que la patrie reconnaissante perpétue le souvenir de ceux qui l'ont illustrée. Plus conforme au pur génie de Lavoisier est le beau monument que M. Berthelot vient d'élever à sa mémoire.

Louis Olivier.

REVUE ANNUELLE DE GÉOLOGIE

Il est impossible de donner en quelques lignes un résumé des observations nouvelles publiées en une année sur la géologie du monde entier ; en effet, par suite des progrès de la civilisation, ce n'est plus seulement en Europe que l'étude du sol préoccupe les savants, mais bien dans les contrées les plus éloignées et les plus diverses ; partout les gouvernements ont établi des services géologiques chargés d'explorer leur territoire, de sorte que le nombre des travaux publiés chaque année est devenu maintenant considérable. Il nous suffira pour en donner une idée, de rappeler que la simple

énonciation de leurs titres remplit plus de cent vingt pages de petit texte dans l'*Annuaire géologique*.

Nous avons dû, par conséquent, renoncer à faire connaître, même brièvement, toutes les découvertes qui ont été publiées, et nous nous bornerons à l'examen d'un petit nombre de travaux pris dans les différentes branches de la géologie.

I

Nous commencerons par appeler l'attention sur un fait d'une grande importance, tant au point de vue scientifique que par les résultats qu'il peut avoir pour l'industrie ; nous voulons parler de la

¹ Voyez à ce sujet le *Cosmos* du 12 juillet 1890, p. 408 et suiv.

découverte du terrain houiller à Shakespeare Cliff, auprès de Douvres, découverte annoncée par M. Boyd Dawkins à la Société géologique de Manchester au mois de mars dernier.

Il y a déjà fort longtemps que la question de l'existence du terrain houiller dans le sud de l'Angleterre préoccupe les savants anglais; dès 1826, Buckland et Conybeare avaient remarqué la grande ressemblance des couches exploitées dans le Somersetshire à l'Ouest, et dans le Nord de la France et la Belgique à l'Est, ce qui semblait indiquer que ces deux districts faisaient partie d'un même bassin. Mais c'est seulement vingt-neuf ans plus tard que Godwin Austen déclara nettement qu'il devait exister des couches houillères au-dessous des terrains plus récents du Sud-Est de l'Angleterre.

D'après ce savant, après le dépôt, dans de vastes marais, des accumulations de végétaux qui devaient se changer en charbon, il se produisit dans toute la région un plissement énérgique. Les parties élevées de ces ondulations ont été presque entièrement enlevées par l'action des agents atmosphériques ou par le choc des vagues sur les lignes de côtes, tandis que les portions basses de ces anciennes courbures ont été préservées par leur situation même. En effet, l'étude des deux régions houillères anglaise et franco-belge montre qu'il existe une série de plissements parallèles à la crête ou axe de l'Artois, se poursuivant depuis le Sud de l'Irlande par le Sud du pays de Galles et le Nord de la France jusqu'en Westphalie, et que c'est dans des sillons longs et étroits de même direction que les dépôts de charbon ont été rencontrés. Si l'axe de l'Artois n'a pas été recouvert par les mers triasique et jurassique, mais seulement par celle du Crétacé, tandis que le Sud de l'Angleterre présente des dépôts secondaires plus développés, ce n'est pas une raison pour que la houille ne se trouve pas dans ce dernier pays sur le prolongement des couches françaises.

Godwin-Austen n'hésitait pas à conclure à l'existence du charbon au-dessous des roches oolithiques et crétacées, et pensait qu'il n'était pas trop éloigné de la surface pour pouvoir être exploité; la vallée de la Tamise et le Weald de Sussex et de Kent lui paraissaient les points les plus favorables pour l'atteindre.

La conviction de ce savant n'était pas partagée par sir Roderick Murchison, alors à la tête du *Geological Survey*, et la question fut abandonnée pendant onze ans. C'est seulement en 1866 qu'une Commission fut nommée pour examiner les assertions de Godwin-Austen; après une étude attentive qui dura cinq ans, M. Prestwich, le rapporteur, déclara qu'il adhérerait pleinement aux vues de ce

géologue et que les couches de charbon, cachées sous des roches plus récentes, devaient égaler en valeur et en étendue ce qui était déjà connu dans le pays de Galles et le Somerset d'une part, en France et en Belgique d'autre part.

L'année qui suivit le dépôt de ce rapport, un Comité se forma pour exécuter un sondage et choisit pour cela le village de Netherfield près Battle (Sussex), comme étant le point de la région où apparaissaient les assises les plus anciennes; on espérait atteindre les couches paléozoïques à environ 1000 pieds de la surface, en se réservant de pousser le sondage jusqu'à 2000 pieds, s'il était nécessaire.

Mais on dut l'abandonner à 1905 pieds à cause de la rupture du tubage et de la chute d'un outil au fond du puits; on n'était pas encore sorti de l'Oxford-clay (Jurassique), les assises traversées ayant présenté une épaisseur beaucoup plus considérable qu'on ne le supposait d'abord; l'argile kimmeridgienne à elle seule avait 1073 pieds de puissance.

Onze ans s'écoulèrent encore sans qu'une nouvelle recherche eût été tentée; mais pendant ce temps, plusieurs sondages faits aux environs de Londres pour obtenir de l'eau avaient montré que les couches paléozoïques plus anciennes que le Carbonifère se rencontraient à peu près à 1000 pieds de la surface, les terrains secondaires étant très réduits; de plus, la forte inclinaison du Paléozoïque semblait indiquer l'existence de sillons à charbon dans le fond des synclinaux. M. Boyd Dawkins, mettant à profit les résultats de tous ces travaux, déclara que c'était dans les North Downs qu'il fallait exécuter de nouvelles recherches et choisit aux environs de Douvres le point même où avaient été commencées les fouilles du tunnel sous-marin.

Un nouveau forage fut donc entrepris en 1886 et traversa successivement le Crétacé sur une épaisseur de 544 pieds et le Jurassique jusqu'au Bathonien, avec une puissance de 660 pieds. C'est directement au-dessous, c'est-à-dire à 1204 pieds de la surface que le terrain houiller (*Coal-measures*) a été atteint; il se compose de grès, de schistes et d'argile avec une veine de charbon de bonne qualité et des empreintes de *Calamites*.

Il est à remarquer que les dépôts wealdiens (Crétacé inférieur) qui se voient à une faible distance avec une épaisseur de 1200 pieds, font absolument défaut dans le sondage.

M. Boyd Dawkins cherche quelle peut être la valeur de ce nouveau *coal-field*; il prend comme points de comparaison, d'une part, le bassin franco-belge où le terrain houiller, épais de 9400 pieds, contient 110 veines de charbon exploitables d'une

puissance totale de 230 pieds, et d'autre part les terrains du Somerset d'une puissance un peu moindre, mais présentant encore des veines de charbon assez nombreuses et assez importantes pour former par leur réunion une épaisseur de 98 pieds. Il pense que les couches du voisinage de Douvres doivent être presque aussi riches que celles de la Belgique; mais fussent-elles réduites comme celles du Somersetshire, elles n'en auraient pas moins une très grande importance commerciale.

II

Le mode de formation de la houille fait depuis longtemps l'objet des discussions des géologues et les opinions les plus diverses ont été émises à ce sujet. Pourtant dans ces dernières années, on attribuait généralement à la décomposition des végétaux sur place les couches de combustible que nous trouvons aujourd'hui dans le sol; une conséquence nécessaire de cette hypothèse était l'énorme durée qu'il fallait supposer à la période houillère. M. Fayol s'est élevé contre cette interprétation et dans une série de publications dont la dernière est le compte rendu de la réunion de la Société géologique à Commeny, il a cherché à substituer à l'ancienne manière de voir ce que l'on peut appeler la *théorie des deltas*.

Il trouve en effet la plus grande analogie entre la disposition présentée par les terrains houillers et la structure des deltas actuels; les principaux points de ressemblance sont : la composition par des matériaux charriés par les eaux, l'extrême variabilité d'étendue et de puissance des couches, de grosseur des éléments, les variations de puissance d'un même banc, la disparition rapide des couches, ou leur ramification, la bizarrerie de forme des amas de combustible, l'existence d'intercalations minérales au milieu d'une couche végétale, etc.

M. Fayol a fait une série d'expériences pour se rendre compte de la manière dont les dépôts s'effectuent dans les diverses conditions qui peuvent se présenter, et il en a conclu qu'il y a entre les dépôts artificiels en eau tranquille, les deltas lacustres et les terrains houillers du Plateau central, la plus complète ressemblance. Quant au terrain houiller du Nord de la France et de la Belgique qui présente des allures beaucoup plus tranquilles, il se serait déposé dans un delta marin; les dépôts artificiels en eau agitée présentent en effet une structure analogue.

L'hypothèse de M. Fayol semble avoir été généralement acceptée pour le terrain houiller du Plateau central de la France, mais elle a rencontré beaucoup plus d'opposition de la part de ceux qui ont étudié les bassins houillers du Nord où des

couches de combustible de très faible épaisseur se poursuivent avec une régularité parfaite sur une étendue considérable. Quoi qu'il en soit, les expériences de M. Fayol ont démontré que la présence de tiges ou de troncs d'arbres *debout* n'indiquaient pas du tout que ces tiges ou ces troncs d'arbres avaient été enfouis à l'endroit même où ils s'étaient développés, car les dépôts artificiels montrent que les débris végétaux charriés par les eaux prennent souvent la position verticale au moment où ils sont arrêtés dans leur course. Or la présence de plantes debout dans les couches de houille était un des principaux arguments que faisaient valoir les partisans de l'hypothèse de la formation sur place.

M. Fayol s'élève contre l'idée généralement adoptée que les dépôts sédimentaires se sont toujours effectués horizontalement; si cela est vrai le plus souvent pour les dépôts de haute mer, l'inverse se voit presque toujours pour les couches qui se sont déposées dans des deltas et il faut bien se garder de supposer l'existence de mouvements du sol, toutes les fois que l'on rencontre des couches inclinées.

Enfin, ce géologue a calculé que le dépôt des couches permo-carbonifères de Commeny a pu s'effectuer, d'après sa théorie, en moins de 170 siècles, tandis qu'en admettant l'hypothèse de la formation sur place, le comblement du bassin aurait demandé plus de 8000 siècles.

III

L'origine des schistes cristallins (gneiss, mica-schistes, etc.) est loin d'être éclaircie; tandis que les uns les considèrent comme provenant directement, par cristallisation, d'eaux-mères sursaturées, d'autres les regardent comme le résultat du métamorphisme de roches primitivement sédimentaires, et enfin une troisième école pense que ce sont des roches éruptives dans lesquelles une pression énergique a déterminé le feuilletage et l'orientation des éléments cristallins.

Bien que cette question ait été mise à l'ordre du jour du Congrès géologique réuni à Londres en 1888, et qu'elle ait été l'objet de nombreux et importants travaux, elle est encore loin d'être résolue; aussi doit-on accueillir avec reconnaissance toutes les études qui peuvent, comme celle de M. Bonney sur les Alpes lépontiennes, faire progresser nos connaissances sur ce sujet difficile¹. Ce savant géologue, qui s'est fait une spécialité de l'étude des schistes cristallins des Alpes, déclare :

a. qu'un groupe de schistes cristallins est toujours

¹ Q. J. G. S., t. XLVI, p. 187.

plus ancien qu'aucune roche à laquelle des fossiles permettent d'assigner un âge certain; *b.* que l'on peut souvent démontrer l'antériorité de ce groupe cristallin à toutes les roches paléozoïques; *c.* que l'infériorité de la Rauchwacke (Trias) aux vrais schistes cristallins n'est pas réelle, mais a été indiquée par suite d'erreurs stratigraphiques; *d.* que les schistes cristallins ne sont pas des couches sédimentaires métamorphiques, bien qu'ils aient été souvent regardés comme d'âge paléozoïque, mésozoïque ou même tertiaire; *e.* que dans certains cas, les schistes cristallins montrent des indices de sédimentation, et qu'on peut y voir une différence de composition due certainement à des dépôts successifs. Quant aux roches schisteuses (Jurassique), dans lesquelles on a trouvé des Bélemnites et d'autres fossiles, elles ressemblent seulement superficiellement aux schistes cristallins et ne contiennent ni grenats ni staurolites, mais seulement quelques silicates hydratés qui n'indiquent pas un métamorphisme intense.

Pour M. Bonney, jamais une roche sédimentaire paléozoïque ou mésozoïque n'a été métamorphisée en schistes cristallins, une pression même très énergique ne pouvant avoir d'autre effet que de développer quelques petits cristaux.

M. Heim ne partage pas cette opinion. D'accord avec la plupart des géologues suisses, il pense que si les schistes cristallins du Massif central des Alpes ne sont pas des roches sédimentaires modifiées, par contre il existe à Scopin, dans le Valserthal, dans l'Urserenthal, à Piora, à la Nufenen Pass, dans le Val Canaria et dans un grand nombre d'autres points, des roches schisteuses cristallines d'âge mésozoïque; ce sont : *a.* ardoises argileuses avec mica, grenat, zoisite, staurolite, rutile et Bélemnites, ces dernières étant cristallines et granuleuses; *b.* des ardoises argileuses avec les mêmes minéraux, alternant avec des couches à Bélemnites; *c.* des schistes verts à amphibole alternant également avec des schistes à Bélemnites; *d.* des phyllites micacées et des micaschistes calcaires; *e.* du marbre avec mica passant à des calcaires jurassiques avec crinoïdes.

Dans le Massif central lui-même, il y a des roches assez difficiles à distinguer des vrais schistes cristallins, et qui pourtant appartiennent certainement au Paléozoïque; ce sont les phyllites, les chloritoschistes, les felsito-schistes, les micaschistes et surtout les gneiss à sérécite. Leur âge est démontré par les faits suivants :

a. Dans quelques endroits, on trouve intercalés dans ces roches des lits de schistes graphitiques et quelquefois même anthracifères.

b. Des traces de fossiles y ont souvent été ren-

contrées (trunks de Calamites à Guttannen dans la vallée du Hasli, plantes carbonifères sur le Tödi, etc).

c. Aux limites du massif central, des zones distinctes d'ardoises carbonifères sont souvent développées dans les gneiss sérécitiques; la position de ces roches dans les plis synclinaux des gneiss granitiques anciens est démontrée par l'existence, au milieu des plis, de couches sédimentaires plus récentes et non altérées.

d. M. Heim a déjà montré que, dans le groupe de Tödi-Windgallen, le Verrocane (Permien) lui-même, lorsqu'il est pincé au milieu des schistes cristallins, prend une étroite ressemblance avec eux, et semble faire partie du massif cristallin central.

Les formations paléozoïques montrent les relations tectoniques les plus étroites avec les schistes cristallins anciens et ont été converties elles-mêmes en schistes cristallins. Le Massif central est formé : pour les deux tiers, de véritables schistes cristallins anciens, antérieurs au Cambrien, et qui constituent peut-être en partie la croûte primitive du globe, et pour le troisième tiers, de micaschistes, de sérécitoschistes, d'amphibolites et d'autres roches similaires, dérivés par métamorphisme dynamique, des argiles, grès et conglomérats paléozoïques. Il est pour lui incontestable qu'une notable partie de ce qui a été regardé comme *schistes cristallins* appartient au Paléozoïque.

Quant aux dépôts mésozoïques, qui surmontent le Primaire tantôt en concordance, tantôt en discordance, ils sont devenus par places cristallins et schisteux, mais ne font jamais partie du Massif central; si le nom de schistes cristallins leur a été quelquefois donné, c'est à un point de vue pétrographique et nullement dans un sens géologique. Leur caractère de roches sédimentaires peut toujours être reconnu, ce qui est au contraire très difficile pour les schistes cristallins paléozoïques.

Dans une étude sur les Hautes-Alpes vaudoises publiée ces jours derniers, M. Renvier ¹ confirme la manière de voir de M. Heim; il décrit, sous le nom de *terrains métamorphiques*, un puissant ensemble dont les roches constitutantes sont le pétrosilex, les grès métamorphiques, les brèches et poudingues, le granite, les gneiss, les micaschistes, les talcschistes, les schistes amphiboliques, le calcaire.

Toutes ces roches lui paraissent être d'origine évidemment sédimentaire et formées sous l'eau; quelques-unes ont subi un métamorphisme intense qui a produit leur cristallinité, tout en laissant subsister de nombreuses transitions avec les

¹ *Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse, 16^e livraison.*

schistes ordinaires. Il donne comme preuve de leur origine sédimentaire : 1° leur stratification évidente sur beaucoup de points comme au pied de la cascade de Pissechèvre près de Lanoy ; 2° la stratification ridée (*Ripplemarks*, *Wellenschläge*) observée en plusieurs endroits ; 3° enfin leur disposition en voûtes régulières, qui est particulièrement nette entre Evionnaz et la Balme, ainsi qu'entre Vernayaz et Martigny.

Les roches cristallines grenues de cette région paraissent provenir, d'après le savant géologue de Lausanne, « d'anciens grès bréchiformes com-
« posés à l'origine de fragments anguleux, proba-
« blement même cristallins, quartzeux ou feldspa-
« thiques, que la forte pression postérieure a si
« intimement unis entre eux qu'ils en ont acquis
« une grande cohésion.

« Sous l'influence de cette même pression et de
« la chaleur qui en résultait, l'eau d'imbibition de
« ces roches s'évaporait et développait la structure
« cristalline dans le ciment argileux des grès,
« comme dans les schistes eux-mêmes. »

Il est ainsi « porté à considérer, dans ces roches
« cristallines, le talc, la majeure partie du mica,
« l'amphibole aciculaire, etc., comme les produits
« d'une cristallisation par métamorphisme ; tandis
« que le quartz, le feldspath et autres éléments
« grenus ou fragmentaires, lui paraissent au con-
« traire d'origine élastique ou détritique ».

L'âge de ces terrains est assez difficile à préciser à cause de l'absence des fossiles : pourtant leur position stratigraphique au-dessous du terrain houiller, incontestable dans la plupart des cas, oblige à les classer dans le Primaire.

Si l'on tient compte en outre de leur liaison intime avec les premières couches houillères, avec lesquelles ils sont partout en concordance parfaite de stratification, et de la très grande analogie de leurs roches constituantes, il semble que la plus grande partie tout au moins des terrains métamorphiques doit être rattachée au Carbonifère inférieur et au Dévonien.

IV

L'étude géologique des régions montagneuses est beaucoup moins avancée que celle des plaines, à cause des difficultés spéciales qu'elle présente ; sans revenir sur les effets de la pression dont nous venons de parler longuement, nous citerons encore parmi les causes qui entravent les recherches des géologues dans les pays de montagnes, l'extrême rareté des fossiles déterminables et surtout les nombreux accidents qui troublent la régularité de la succession des assises. Pour qu'il fût possible d'arriver à comprendre la structure de certains massifs, il a fallu que la série stratigraphique fût

établie avec exactitude d'après les recherches exécutées dans des districts moins tourmentés ; aussi est-ce seulement dans ces dernières années que les Alpes et les Pyrénées, pour ne parler que des chaînes de montagnes qui nous touchent de plus près, ont pu être explorées avec fruit et nous ont livré quelques-uns de leurs secrets. C'est ainsi qu'il existait en différents points de la Provence des affleurements anormaux qui avaient jusqu'à présent défié la sagacité des géologues et dont la présence vient d'être expliquée d'une manière très satisfaisante, selon nous, par M. Marcel Bertrand ¹.

Le premier des points explorés par ce savant géologue est situé auprès du Beausset (Var) ; on y voit une colline de Trias qui semble émerger d'une vaste plaine de Crétacé supérieur parfaitement régulière, fait que l'on avait jusqu'alors cherché à expliquer par l'existence, dans la mer crétacée, d'un récif autour duquel seraient venus se déposer des sédiments du Secondaire supérieur. Mais il n'existe aucune trace des dépôts littoraux qui auraient dû se former dans cette hypothèse, et de plus on peut s'assurer en divers points que le Trias est *superposé* au Crétacé ; il faut donc abandonner l'idée de l'existence d'un ancien récif ainsi que la supposition, d'ailleurs fort étrange, que le Trias aurait fait une trouée à travers les couches crétacées, sans déranger leur horizontalité.

Aussi M. Bertrand a-t-il cherché une autre explication de cette apparente anomalie : pour lui le Trias du Beausset est un *lambeau de recouvrement*.

Si, en effet, la superposition directe du Trias sur le Crétacé est impossible à observer, on peut au contraire constater facilement le plissement du Crétacé, dont la coupe donne la succession suivante :

Trias

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Calcaire à Hippurites..... | } Série renversée |
| 2. Banc à <i>Ostrea acutirostris</i> | |
| 3. Couche à Turritelles..... | |
| 2. Banc à <i>Ostrea acutirostris</i> | } Série normale. |
| 1. Marnes et grès du Sénonien supérieur et calcaire à Hippurites..... | |

Il résulte donc de ces faits et d'autres que nous ne pouvons rappeler ici, que le Crétacé est replié sur lui-même, puisque les mêmes couches se rencontrent en partant du bas d'abord dans leur ordre de superposition normale, puis dans l'ordre inverse, et qu'elles sont surmontées par le Trias également renversé, ses assises les plus récentes se trouvant les plus basses.

Le Crétacé et le Trias sont affectés en ce point

¹ *Bull. Soc. Géol. France*, 3^e série, t. XV, p. 667, t. XVI, p. 79, 748, t. XVII, p. 231. — *C. R. Ac. Sc.*, t. CIV, p. 1735, t. CVI, p. 1433, 1613, t. CVII, p. 701, 878.

par l'accident connu sous le nom de *pli couché*; le plissement, après s'être fait sentir dans un plan vertical, comme on en voit partout d'innombrables exemples, est devenu tellement énergique que le sommet du pli n'étant plus soutenu, est tombé, s'est déversé sur les couches normales qui se trouvaient à son pied; on aurait donc théoriquement trois répétitions des mêmes assises: une série renversée entre deux séries normales, mais en pratique il en est rarement ainsi, les érosions ayant souvent fait disparaître une grande partie des couches plissées, et laissé seulement quelques témoins isolés de ces curieux phénomènes. De plus il arrive fréquemment que la série renversée a disparu par étiement et l'on se trouve alors en présence de deux séries normales directement superposées.

Au moment où M. Bertrand donnait cette explication de la structure du bassin du Beausset, on ne connaissait qu'un très petit nombre d'exemples de faits de ce genre (Alpes de Glaris, Bassin houiller franco-belge, Grampians), et on les considérait comme exceptionnels. Il n'en est plus de même aujourd'hui, et les plis couchés semblent se rencontrer avec une certaine fréquence dans la plupart des régions montagneuses.

C'est ainsi que M. Bertrand lui-même, continuant ses recherches dans d'autres parties de la Provence, a découvert, dans la chaîne de la Sainte-Beaume, des phénomènes analogues mais beaucoup plus grandioses. La coupe de Saint-Zacharie à la Sainte-Beaume montre la succession la plus capricieuse et l'enchevêtrement des terrains les plus variés depuis le Crétacé supérieur et même le Tertiaire jusqu'au Trias; les couches jurassiques, de l'Infralias à l'Oxfordien, reposent sur le Danien qui recouvre lui-même le calcaire à Hippurites. Coquand avait cru pouvoir expliquer cette disposition par une série de failles verticales, mais si l'on cherche à suivre ces prétendues failles, on voit qu'elles forment des lignes sinueuses d'une irrégularité frappante, suivant les ondulations du sol et s'arrondissant en grandes boucles allongées ou même en ellipses complètement fermées.

Il faut donc chercher une autre explication qui ne peut être donnée que par l'hypothèse d'un renversement complet du Jurassique sur le Crétacé, suivi d'affaissements et de dénudations qui n'ont permis aux lambeaux de recouvrement jurassiques de subsister que dans les points affaissés entre deux failles; partout ailleurs ils ont été enlevés.

Les collines du Plan d'Aups et des Nans, situées de l'autre côté de la Montagne de la Lare, montrent la reproduction presque identique de la disposition constatée à Saint-Zacharie, et d'ailleurs du côté Ouest du massif de la Lare, les lambeaux de re-

couvrement des vallées Nord et Sud se rejoignent vers la Tête de Roussargue.

Les couches jurassiques en superposition anormale sur le Crétacé forment donc une ceinture semi-circulaire autour de la Lare, le Crétacé s'enfonçant sous le Jurassique sur une longueur de plus de vingt kilomètres. Le pli anticlinal, dont les lambeaux de recouvrement sont la partie couchée, doit, comme ceux-ci, avoir une forme semi-circulaire; c'est en effet ce que démontre l'étude attentive des faits, malgré les difficultés résultant de la présence des dépôts tertiaires discordants sur les précédents ou de ce que la partie recouvrante du pli lui-même masque l'axe anticlinal. La sinuosité des plis et des failles est d'ailleurs un fait général en Provence.

Nous ne pouvons que signaler l'existence d'autres plis couchés indiqués également par M. Bertrand, au nord d'Allauch et dans la région de Draguignan; à l'Est de cette dernière ville, l'Infralias et les différents termes de la série jurassique, régulièrement stratifiés et presque horizontaux, surmontent et masquent en partie les couches de Rognac, c'est-à-dire le terme le plus élevé du système crétacé, sur une longueur de trente kilomètres et une largeur de quatre kilomètres. Entre les deux séries s'intercalent presque partout des lambeaux de terrain jurassique renversés.

Plus au Nord, en Savoie, le massif des Annes montre un îlot de Lias et de Trias indiscutable, entouré de toutes parts par l'Eocène, qui plonge par dessous; ce dernier repose normalement sur le Crétacé; puis viennent le Jurassique, le Trias et le Houiller en superposition normale. M. Maillard¹ qui vient de terminer une étude de cette région, tendrait à expliquer cette structure par l'existence d'un îlot de Lias au milieu des mers plus récentes; mais cette manière de voir ne nous paraît pas plus acceptable ici qu'au Beausset, et nous préférons de beaucoup supposer avec M. Bertrand que le massif liasique des Annes est un lambeau de recouvrement; seulement ici les dénudations ont été tellement énergiques qu'il ne reste plus de traces du pli couché qui l'a produit.

La monographie des Hautes-Alpes vaudoises par M. Renevier² donne une nouvelle preuve de la grande importance des plis couchés dans la structure des Alpes; un double pli très net se poursuit en effet à travers presque toute la région étudiée par le savant professeur de Lausanne depuis les Diablerets jusqu'à la dent de Morcles. Les magni-

¹ Bull. Carte géol. France, N° 6.

² Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse, 16^e livraison.

figues vues et coupes qui accompagnent cet ouvrage montrent la diversité des effets qui peuvent résulter des plissements et des renversements.

Bien que ces phénomènes ne soient pas particuliers aux Alpes, c'est surtout dans cette chaîne qu'ils ont été étudiés jusqu'à présent et les Pyrénées, d'une structure beaucoup plus simple d'ailleurs, n'en avaient pas encore présenté d'exemple. C'est seulement dans le courant de l'année dernière que nous avons fait connaître l'existence dans le département de l'Aude de superpositions anormales, qui ne peuvent être expliquées que par l'hypothèse de plis couchés en grande partie enlevés par l'érosion. Le pic de Bugarach est en effet formé à son sommet par des calcaires jurassiques et urgoniens reposant sur des marnes bleues sénoniennes (Crétacé supérieur).

L'examen des terrains environnants nous a convaincu que le massif de Bugarach était un lambeau de recouvrement, sommet d'un pli couché dont la base est située dans la chaîne de Saint-Antoine.

V

L'on rencontre à plusieurs niveaux de la série sédimentaire, et particulièrement dans le Gault, des rognons de phosphate de chaux dont l'origine et le mode de formation semblaient assez difficiles à expliquer. Or, les draguages du *Challenger*, qui ont amené un si grand nombre de découvertes intéressantes, ont fait connaître l'existence de nodules semblables dans les mers actuelles, et spécialement au large du cap de Bonne-Espérance et en haute mer entre l'Afrique et l'île Marion.

M. Renard, de Bruxelles¹, chargé de leur étude, donne d'abord quelques indications sur les stations où ils ont été recueillis; les deux premières sont à peu près dans les mêmes conditions: le fond est constitué par un sable vert, et la profondeur est de 98 brasses dans l'une, de 150 dans l'autre; quant à la troisième, elle a présenté un fond de vase à globigérines à 1,900 brasses.

Malgré la différence du gisement, les nodules des trois stations se ressemblent: ils ont généralement de 1 à 2 centimètres dans leur plus grand diamètre et atteignent exceptionnellement 4 centimètres. Leur surface est irrégulière et elle est recouverte d'un enduit brunâtre, légèrement luisant, de manganèse et de fer; la cassure montre la structure en agrégat, et l'on reconnaît alors que les irrégularités de la surface sont en relation avec les fragments hétérogènes d'organismes cimentés par le phosphate. La teneur en acide

phosphorique a été trouvée de 19.96 % dans un cas, de 23.54 % dans un autre; quant à la composition de la masse du nodule, elle est la même que celle du fond, mais agglutinée et durcie par le phosphate de chaux.

M. Renard recherche ensuite quel peut être le mode de formation de ces nodules, et il arrive à cette conclusion que l'origine immédiate du phosphate réside dans la décomposition par l'eau de mer des débris organiques et principalement des restes de vertébrés; ceux-ci abandonnent à l'eau du phosphate de chaux à l'état colloïdal, qui partage avec quelques autres substances pouvant prendre ce même état, la propriété de se concrétionner en rognons autour de centres d'attraction.

Les coupes minces de ces nodules, surtout de ceux de la vase à globigérines, semblent montrer que le phosphate colloïde, faiblement retenu en solution dans l'eau, recherche tout d'abord la matière organique colloïde qu'il trouve dans le sarcode des globigérines et des autres foraminifères. C'est à l'intérieur de ces organismes que le phosphate pénètre, qu'il se concrétionne; il semble en remplir les vides avant de se déposer autour d'eux et de les agglutiner.

Les rapports qui unissent les sédiments rencontrés au large du cap de Bonne-Espérance, sables verts et vase à globigérines, avec certaines couches géologiques et spécialement le Crétacé, souvent formé de sables et grès verts, de craies glauconieuses ou pures, avec nodules phosphatés, sont de la dernière évidence; aussi peut-on tirer de l'étude de M. A. Renard quelques conséquences importantes pour la connaissance des diverses couches à phosphate.

La première est que la présence de nodules phosphatés n'indique pas que les sédiments qui les contiennent se sont formés à une profondeur déterminée, puisque les draguages les ont fait reconnaître à la fois dans la zone littérale et aux confins de la zone pélagique.

Une deuxième conséquence est qu'il faut abandonner l'idée, assez souvent soutenue, que tous les nodules phosphatés sont des éléments roulés, provenant de la dénudation d'assises sous-jacentes.

VI

Après avoir, dans de précédents ouvrages, traité des enchainements du monde animal pendant les temps tertiaires et primaires, M. A. Gaudry, le savant professeur du Muséum, s'est occupé cette année des fossiles secondaires¹.

¹ Analyse par A. Rutot (*P. v. Soc. belge Géol. Hydro.*, t. III, p. 506).

¹ *Les enchainements du monde animal dans les temps géologiques; fossiles secondaires.* Paris, 1890.

Quoique d'une durée beaucoup moins longue que l'ère primaire, l'ère secondaire présente au point de vue paléontologique un intérêt particulier; tandis en effet qu'elle nous montre une bien plus grande diversité de formes que les périodes précédentes, elle offre des types beaucoup plus différents de ceux qui vivent actuellement, que les êtres tertiaires.

Les foraminifères sont abondants dans les terrains secondaires; mais l'étude de ces petits êtres, déjà très difficile pour les vivants, est rendue presque impossible pour les fossiles, par leur état de conservation souvent défectueux; aussi a-t-elle donné jusqu'à ce jour peu de résultats. On peut affirmer pourtant que rien n'indique un perfectionnement dans cet ordre depuis les temps secondaires.

Une remarque analogue peut être faite pour les deux premières classes des Coelentérés, les Spongiaires et les Hydromédusaires; quant aux Coralliaires, il semblent devenir de moins en moins calcaires, en partant des Rugueux des temps primaires, pour passer aux Astréides de l'époque oolithique, puis aux Fungides (Cyclolites) du Crétacé, aux Turbinolides du Crétacé et du Tertiaire enfin au groupe des Perforés des temps tertiaires et actuels.

Parmi les Echinodermes, les Crinoïdes, perdant la merveilleuse diversité de formes qu'ils avaient pendant l'ère primaire, se rapprochent déjà beaucoup de ceux qui vivent de nos jours. Les Stellérides ne présentent que peu d'intérêt. Quant aux Echinides, ils sont d'une abondance prodigieuse dans le Jurassique et le Crétacé; c'est l'époque de leur maximum de développement.

Les Mollusques semblent aussi à leur apogée. Parmi les Bivalves, quelques types ont à peine varié; c'est ainsi que les Huitres, les Moules, les Trigonies des terrains secondaires diffèrent fort peu de leurs congénères vivants; au contraire, les Rudistes semblent avoir complètement disparu et être spéciaux aux temps secondaires, mais ils ne sont pas aussi éloignés des bivalves actuels qu'on pourrait le croire au premier abord. M. Douvillé a montré en effet que *Matheronia* et *Toucasia* de l'Urgonien étaient très voisins des *Chama* tertiaires et actuelles, tout en se reliant par une série de formes aux différents groupes des Rudistes.

Les Gastropodes montrent un perfectionnement continu; quant aux Céphalopodes, ils prennent un immense développement, et sont représentés par des groupes entiers disparus maintenant, tels que les Ammonites et les Bélemnites. Il est remarquable de voir deux genres voisins comme *Nautilus* et *Ammonites* se comporter d'une manière si différente; tandis que le premier a persisté presque

sans modification depuis l'ère primaire jusqu'à nos jours, les Ammonites au contraire ont eu une durée beaucoup plus courte, mais se sont épanouis avec une extrême intensité.

Parmi les Articulés, les Brachiopodes sont extrêmement nombreux comme individus, mais non comme espèces; certaines familles qui ont joué un grand rôle pendant les temps primaires diminuent rapidement d'importance et disparaissent bientôt complètement; tels sont les Spiriféridés, Orthosidés, Productidés.

Les Crustacés sont très peu connus; quant aux Insectes, ils appartiennent aux ordres actuels, tandis que ceux du Primaire sont rapportés à un ordre spécial très différent; il y a pour cette classe un perfectionnement évident.

Les différents groupes des Poissons existent dans les terrains secondaires: les Cartilagineux sont très voisins des espèces actuelles, les Dipnoés montrent encore aujourd'hui le même genre *Ceratodus* qui vivait à l'époque du Carbonifère et du Trias. Quant aux osseux, ils sont, au début du Secondaire, représentés uniquement par des Ganoïdes, à écailles épaisses, osseuses, revêtues d'émail brillant, puis apparaît à l'époque oolithique le genre intermédiaire *Leptolepis*; enfin à la partie supérieure du Crétacé, la transformation est accomplie, les Téléostéens à écailles minces dominent décidément. L'ossification du squelette a marché de pair avec la modification des écailles.

Les Reptiles ont une importance considérable; il suffit de citer les Labyrinthodontes, les Thériodontes, les Ichthyosauriens, les Plésiosauriens, les Simosauriens, les Mosasauriens, les Dinosauriens, les Pterosauriens pour rappeler l'étonnant développement de ces animaux à l'époque qui nous occupe.

Il est surtout curieux de voir les modifications des membres ordinairement destinés à la marche, dans les groupes nageurs (Simosauriens, Plésiosauriens, Ichthyosauriens) ou volants (Pterosauriens); il semble que l'ancêtre des Reptiles nageurs ne doive pas être cherché parmi les Poissons, mais au contraire parmi les Reptiles marcheurs. Quant aux Pterosauriens, ils constituent jusqu'à présent un groupe isolé, qui ne peut être rattaché ni aux Oiseaux, ni aux Chauve-souris, bien qu'ayant avec eux certaines ressemblances d'adaptation.

Outre ces Reptiles si différents de ceux qui nous entourent, il existe également dans le Secondaire des Tortues, des Lacertiens et des Crocodiliens, très rapprochés des animaux qui vivent actuellement; nous ne connaissons rien sur leur origine.

Les Oiseaux recueillis jusqu'à présent sont fort peu nombreux, mais très intéressants. L'*Archæop-*

teryx lithographica, trouvé dans le calcaire lithographique de Bavière, présente des caractères qui ne peuvent être comparés qu'à ce qui se voit actuellement chez quelques Oiseaux très jeunes, notamment chez l'Autruche.

L'allongement de la queue, ses vertèbres qui diminuent progressivement, les pattes de devant avec des métacarpiens distincts et des doigts munis de griffes, la brièveté du sacrum, la petitesse du bassin, la séparation de l'ilion, du pubis et de l'ischion, l'existence de dents sont des caractères qui rapprochent l'*Archeopteryx* des Reptiles et l'éloignent des Oiseaux. C'est pourtant à cette dernière classe qu'il doit certainement être rapporté.

On a trouvé dans le Crétacé supérieur d'Amérique des Oiseaux ayant des dents, logées soit dans des alvéoles (*Ichthyornis*), soit dans une gouttière (*Hesperornis*).

Il est remarquable que ces Oiseaux se trouvent précisément accompagnés de Reptiles sans dents (*Pterosauriens*).

Les Mammifères sont très peu nombreux ; on connaît le *Microlestes* du Rhétien, le *Phascolotherium* et l'*Amphitherium* du Bathonien, puis quelques espèces du Purbeck, entre autres le *Plagiular*, qui semble descendre du *Microlestes* et se continuer dans le Tertiaire par le *Neoplagiular* ; on en cite encore quelques-uns d'Amérique.

Ils étaient tous de très petite taille, ce qui est rendu encore plus frappant par le développement prodigieux des Reptiles de la même époque ; c'est évidemment un groupe qui débute et pourtant on trouve déjà des types de dentition bien différenciés ; chez les uns, les molaires sont coupantes et perçantes ; chez d'autres, elles sont destinées à broyer ; chez d'autres enfin, à raper.

Owen pensait que tous les Mammifères secondaires étaient marsupiaux ; bien que cette opinion ait été combattue depuis, M. Gaudry la croit fondée : tous les premiers Mammifères étaient des marsupiaux, dont les uns ont donné naissance aux placentaires actuels, tandis que les autres ont gardé intacts jusqu'à nos jours leurs caractères primitifs.

Nous voyons donc que certains types ont à peine changé, ont assisté impassibles aux diverses révolutions ; ce sont les types permanents ou panchroniques.

D'autres se sont légèrement modifiés et sont ensuite revenus à leur point de départ ; ils méritent le nom de types élastiques.

La plupart ont continué leur marche sans rétro-

grader, se développant peu à peu ; à mesure qu'ils avançaient dans les temps géologiques, quelques-uns ont pris une direction parallèle ; quelques autres, éloignés d'abord, se sont peu à peu rapprochés, mais sans doute la plupart ont eu des caractères différentiels de plus en plus accentués ; on peut ainsi les classer en types parallèles, convergents et divergents.

On peut généralement distinguer trois phases dans l'histoire des divers types : une phase ascendante, la phase de leur apogée, une phase descendante. Un type est à son apogée, lorsque les êtres qui le représentent atteignent la plus grande taille, ont le plus de complications, sont devenus plus abondants, et surtout quand ils offrent en grand nombre ces variations appelées genres et espèces.

Beaucoup de groupes ont eu leur apogée pendant les temps secondaires ; ce sont : les Madréporaires apores, les Oursins, les Rudistes, les Ammonitidés, les Bélemnitidés, les Poissons semiganoïdes, les Cestraciontes et Hybodontes, les Labyrinthodontes, les Thériodontes, les Enaliosauriens, les Mosasauriens, les Téléosauriens, les Dinosauriens, les Ptéosauriens, les Odontornithes.

Il est curieux de voir que souvent un groupe disparaît en pleine force, à son apogée ; tels les Bélemnites, les Ammonites et surtout les Rudistes.

Si, en terminant cette étude, l'on cherche à se rendre compte des rapports des différents êtres, des enchaînements du monde animal, pour employer le titre même du livre que nous résumons, on voit qu'il y a eu des transitions d'espèce à espèce, de genre à genre, de famille à famille, même d'ordre à ordre ; mais il ne semble pas qu'il y ait eu de passage d'une classe à l'autre. Certes les Thériodontes, les Ichthyosaures, les Ptérodactyles ont diminué l'intervalle qui semblait exister entre les Reptiles et les Mammifères, mais ils ne l'ont pas comblé entièrement.

L'indice le plus frappant de rapprochement entre des classes aujourd'hui distinctes est fourni par les Dinosauriens, qui ont de grands rapports avec les Oiseaux ; toutefois les différences sont encore telles que l'on ne peut pas dire que les Oiseaux ont passé par l'état de Dinosauriens ; tout au plus est-on autorisé à supposer que ces deux groupes ont eu, à une époque reculée, une origine commune.

L. Carez,

Docteur en sciences.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques.

Lyon (I.). — Sur les courbes à torsion constante. — Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris, Juillet 1890.

Si l'on prend sur une courbe gauche deux points m et m' , séparés par une longueur d'arc s , et si l'on désigne par α l'angle des deux plans osculateurs en m et m' , le quotient $\alpha : s$ tend en général vers une limite, quand m' se rapproche indéfiniment de m . Cette limite a reçu des géomètres le nom de *torsion* au point m et son inverse a reçu le nom de *rayon de torsion*.

La torsion s'appelle aussi la seconde courbure, la première s'obtenant par le procédé qui vient d'être rappelé, mais où l'angle des tangentes remplace celui des plans osculateurs.

D'un point à un autre d'une courbe la torsion change en général; elle ne reste constante que pour une classe particulière de courbes, auxquelles le travail de M. Lyon est exclusivement consacré.

La constance de la torsion laisse évidemment subsister, non seulement dans la position de la courbe, ce qui est indifférent, mais aussi dans la forme, une assez grande indétermination. Ainsi, par exemple, une torsion constante nulle indique une courbe plane, qui d'ailleurs reste quelconque. La courbe à torsion constante la plus connue est l'hélice ordinaire, laquelle a du reste ses deux courbures constantes.

Dans le problème abordé par M. Lyon le point important était d'établir des formules, où l'indétermination inhérente au problème fut ramenée à l'arbitraire purement algébrique dans le choix de certaines relations entre plusieurs quantités, ces dernières figurant d'ailleurs dans les formules d'une façon connue.

C'est ce que fait l'auteur. Partant de formules connues, il représente les trois coordonnées rectangulaires d'un point courant sur une courbe à torsion

constante par des intégrales; sous le signe $\int$ figurent

des expressions différentielles rationnelles, que M. Lyon donne explicitement, de deux paramètres u et u_1 . Les diverses courbes à torsion constante diffèrent les unes des autres par la nature de la relation arbitraire, qui lie u_1 à u , ou, ce qui revient au même, de la relation qui lie u et u_1 à un même paramètre t . Les intégrales en question sont en général imaginaires, et diverses précautions analytiques spéciales sont à prendre pour obtenir des courbes réelles.

M. Lyon applique ses formules à la recherche des courbes à torsion constante unicursales (celles où les trois coordonnées sont des fonctions rationnelles d'un même paramètre) et est amené à la question suivante: quand une différentielle rationnelle s'intègre-t-elle rationnellement? Il est bien connu du reste que si l'intégrale est algébrique, elle est aussi rationnelle.

L'auteur cite rapidement, pour mémoire, une première solution de la question, solution élémentaire, mais impraticable en réalité. Il expose ensuite, avec les développements que le sujet comporte, une seconde méthode, laquelle au fond n'est autre que le procédé bien connu en algèbre sous le nom de « méthode des coefficients indéterminés ». Les calculs sont longs, mais parfaitement réalisables, car on n'a jamais affaire qu'à des équations du premier degré, faciles à traiter grâce aux déterminants.

M. Lyon applique son procédé à la construction effective des courbes à torsion constante unicursales et

réelles les plus simples. Il trouve notamment une courbe gauche du troisième degré, dont les trois coordonnées du point courant sont des fonctions rationnelles de l'arc. Cette courbe partage avec l'hélice ordinaire le privilège d'avoir ses deux courbures constantes.

Depuis ces dernières années, la Faculté des Sciences de Paris a eu fréquemment à examiner des thèses, telles que celles d'Halphen, de MM. Poincaré, Humbert, Painlevé, etc., qui étaient des travaux considérables, par l'originalité des résultats et des méthodes, par la connaissance approfondie des théories les plus délicates et les plus nouvelles de la Science. C'était plus que des thèses. Il serait donc souverainement injuste de reprocher à M. Lyon de n'en avoir pas fait autant. Il a subi à son honneur l'épreuve qui couronne l'éducation d'un mathématicien; il a su développer d'une façon intéressante et heureuse des théories classiques; il a fait à tous les points de vue une excellente thèse. Ajoutons que la lecture du mémoire est rendue particulièrement attrayante par une grande élégance dans les notations et les calculs.

LÉON AUTONNE.

Witz (Aimé), *Ingénieur des Arts et Manufactures.* — Etude théorique et expérimentale sur les machines à vapeur à détentes successives, Société Industrielle du Nord de la France, Lille, 1890.

L'étude très instructive que M. Aimé Witz vient de publier sur les machines à vapeur à détentes successives peut être résumée comme il suit :

Si les machines étaient parfaites, elles auraient une détente complète, c'est-à-dire que la pression de la vapeur, à la fin de la course, serait, à fort peu de chose près, celle du condenseur. En réalité, dans les machines monocylindriques, la détente est limitée; pour chacune d'elles, il y a une limite d'expansion au delà de laquelle le rendement diminuerait si l'on voulait augmenter cette expansion.

L'explication de ce fait est très simple. A l'introduction, la vapeur rencontre les parois du piston et du cylindre refroidies par la communication avec le condenseur. Il se fait une condensation sur ces parois, donc l'humidité augmente encore au contact de la vapeur pendant la détente, à cause de la condensation partielle qui accompagne cette détente. A l'échappement, cette eau, condensée sur la paroi, se vaporise et entraîne au condenseur une grande quantité de chaleur empruntée aux parois du cylindre et du piston. A chaque course, ces phénomènes se reproduisent. C'est ce que Hirn désigne sous le nom expressif de *refroidissement au condenseur*. Une détente au $\frac{1}{2}$ est, en définitive, un grand maximum, qu'il ne faut pas dépasser dans les machines monocylindriques.

Un des moyens qui permettent de prolonger la détente consiste dans l'emploi de plusieurs cylindres où la vapeur se détend successivement. L'effet nuisible des parois et la perte finale au condenseur sont considérablement diminués, malgré la plus grande étendue des parois, parce que, dans chaque cylindre, la chute de température est diminuée. Par des dispositions et un réchauffage convenable des réservoirs intermédiaires, les effets de la chute de pression d'un réservoir à l'autre sont insignifiants. Il arrive même que l'on constate, en superposant les diagrammes respectifs des cylindres, que la courbe de contre-pression de l'un chevauche la courbe d'admission du suivant. Dans les machines à multiples expansions, le couple moteur est plus régulier et les fuites du piston sont bien moins

considérables que dans les autres. La complication apparente des machines à détentes successives peut faire craindre *a priori* que leur rendement mécanique soit moins bon que celui des machines monocylindriques. Il n'en est rien, et il faut remarquer, en outre, que si l'on faisait marcher une machine monocylindrique avec une admission de 0,04 à 0,05, comparable aux admissions dans les machines à détentes successives, son rendement mécanique baisserait considérablement. Une Corliss, mise en expérience au Creusot, avait un rendement mécanique de 0,82 avec une admission de 0,118 et un rendement de 0,67 avec une admission de 0,044. D'après des expériences de M. Walther-Meunier, chaque cylindre en plus d'un donnant une perte de rendement mécanique égale à environ 3 0/0, une machine à triple expansion aurait un rendement inférieur de 6 0/0 à celui d'une bonne machine monocylindrique, mais elle produit une économie thermique de 20 à 25 0/0. Un seul point de cette étude comparative laisse des doutes : le graissage est incontestablement plus coûteux pour trois cylindres et leurs tiroirs que le graissage d'un cylindre et de son tiroir; mais les expériences manquant pour une comparaison des dépenses,

M. Witz cite, dans son très intéressant travail, les nombreuses expériences de Hirn, Weyher et Richemond, Løring et Emery, Walther-Meunier de Mulhouse, Schneider du Creusot, Widmann, ingénieur de la marine, Demoulin, Sulzer de Winterthur, Schröter et d'autres. Ces expériences prouvent que, par cheval-heure indiqué, une machine monocylindrique dépense environ 8 k. 60 de vapeur, une machine compound, 8 k. 20, une machine à triple expansion, 6 k.

Voelf et Edward, les premiers, firent des machines à deux cylindres accolés; ces machines, à balancier, se faisaient remarquer par une grande régularité de marche. Plus tard vint la disposition de deux cylindres en « tandem » applicable aux machines piston. Les machines compound, avec réservoir intermédiaire de 6 à 8 fois le volume du petit cylindre, ont l'avantage de rendre les pistons indépendants et de permettre de les relier à des manivelles à 90°. Dès 1860, Dupuy de Lôme appliqua à la marine les machines à deux cylindres, et dès 1863, il appliqua les machines à trois cylindres. Ce sont les Anglais qui ont le plus répandu les triples et quadruples expansions et les combinaisons qui permettent le fonctionnement des machines, soit en compound simple, soit en triple ou quadruple expansion, suivant les allures que doit prendre le navire ou elles sont installées.

En définitive, les constructeurs et les ingénieurs de la marine ont réalisé un grand progrès des machines à vapeur en pratiquant les grandes détentes dans des cylindres multiples, et les constructeurs de machines fixes auront beaucoup à gagner en profitant de leurs travaux.

AL. GOULLY.

2° Sciences physiques.

Meldola. (Raphaël) *The Photographie Image. Lecture faite à l'Institut Royal de Londres le vendredi soir, 16 mai 1890.*

Dans une courte conférence, le Professeur Meldola expose brièvement l'histoire, les débuts et les progrès de la Photographie dont nous célébrons l'année dernière le cinquantenaire.

Au point de vue historique, il relate, d'après le Dr Eder, mais seulement à titre de mention, le nom de J. H. Schultze qui fit en 1727 des expériences sur la phosphorescence et signala l'intérêt qu'il y avait dans l'altérabilité de certains composés d'argent : il aurait même obtenu ainsi des espèces de lettres et de dessins, copies temporaires du reste et non fixées; puis après des recherches analogues de Wedgwood et de Davy, le conférencier arrive aux noms des deux véritables inven-

teurs de la Photographie, Nicéphore Niepce et Daguerre (1824-1826). Il revendique ensuite pour deux Anglais, Fox Talbot et Herschell, une partie de la gloire qui échoit à nos deux compatriotes, puisque les travaux de Talbot et d'Herschell ne datent que de 1834. Il passe ensuite à l'exposé sommaire des différents procédés qui ont été successivement employés : épreuves sur plaques d'argent, apparition du collodion, premiers procédés à l'émulsion, et enfin gélatino-bromure, le dernier mot, aujourd'hui, de la science photographique.

Le professeur Meldola examine après cela la nature du phénomène de l'impression photographique et de la valeur de l'image, et discute les différentes explications qu'on en a données, entre autres celle de M. Carey Lea; il conclut en disant que la question est encore fort obscure et offre aux travaux des chimistes un magnifique champ d'observations et d'étude.

Cette conférence, intéressante par la nature même de son sujet, était forcément limitée comme étendue, vu la forme de causerie qui lui était imposée. Il y aurait un grand intérêt à rappeler les tentatives, dont plusieurs ont été couronnées de succès, faites en vue de rendre vraies les impressions photographiques, et à faire venir en valeurs proportionnelles à leur éclat respectif, les rouges, les jaunes et les verts des objets naturels; pourquoi n'est-il pas fait mention du remarquable procédé imaginé dans ce but par M. le Professeur Lippmann et présenté à l'Académie des Sciences en 1890? L'exposition successive à travers trois glaces l'une rouge, la seconde verte, la troisième bleue, est un moyen si simple et si facile à mettre en pratique qu'il eût été intéressant de l'indiquer aux amateurs et aux praticiens. Nous en entretiendrons quelque jour les lecteurs de la *Revue*.

Alphonse BÉRÉGET.

D'Arsonval (A.). — *Sur un spectrophotomètre différentiel sans polarisation.* (*Archives de Physiologie normale et pathologique*, 1890, p. 111).

Pour comparer entre eux deux faisceaux lumineux provenant soit de deux sources différentes, soit d'une même source, mais alors ayant subi des modifications différentes, par exemple ayant traversé des milieux absorbants différents, le seul procédé photométrique rigoureux consiste à décomposer d'abord ces deux faisceaux dans le même spectroscope; on obtient ainsi deux spectres distincts, et c'est sur les mêmes radiations simples, prises successivement dans les différentes régions du spectre que porte l'étude photométrique proprement dite. Pour comparer les intensités respectives de deux radiations, on affaiblit progressivement l'une d'elles dans des rapports connus, jusqu'à réaliser l'égalité d'éclat dans la région du spectre considérée. Le procédé le plus précis consiste à recourir aux phénomènes de polarisation. Les spectrophotomètres à polarisation donnent d'excellents résultats entre les mains des physiciens. L'inconvénient qu'ils présentent est d'exiger des sources lumineuses assez intenses, d'être compliquées, coûteuses, et d'un réglage un peu délicat. Leur emploi n'est donc guère susceptible de se vulgariser. Cependant les physiologistes ont souvent besoin de recourir à des mesures spectrophotométriques. La mesure de l'affaiblissement de certaines radiations simples après le passage d'un faisceau lumineux à travers une cuve d'absorption permet souvent en effet non seulement de caractériser une substance, mais encore de la doser rigoureusement, même dans un mélange avec d'autres substances absorbantes.

M. d'Arsonval s'est proposé de doter les physiologistes d'un instrument d'un maniement simple, susceptible de s'adapter à un spectroscope ordinaire et donnant par une lecture directe la différence d'éclat cherchée. Les deux faisceaux lumineux pénètrent dans cet appareil par deux lentilles achromatiques identiques, dont les axes sont parallèles, et qui fournissent, pour la même ouverture, des images de même éclat. Ils sont reçus


sur deux de ces parallépipèdes à réflexion totale qu'on emploie en optique concurremment avec les bilames, soit pour dédoubler un faisceau lumineux, soit au contraire, comme c'est le cas ici, pour ramener au contact deux faisceaux distincts. Chacun des deux faisceaux tombe alors sur une moitié de la fente du spectroscopie. Le dispositif qui permet de faire varier à volonté leur intensité est un double diaphragme mobile situé derrière les lentilles. Il est muni par un bouton à crémaillière portant une échelle graduée, et permet de couvrir l'un des objectifs et de découvrir en même temps le second de quantités égales; le mode de déplacement est tel que les centres des diaphragmes sont toujours sur l'axe des lentilles. L'échelle graduée donne immédiatement le rapport des surfaces d'ouverture des diaphragmes, et ce rapport est précisément celui des quantités de lumière qui arrivent sur les deux moitiés de la fente du spectroscopie.

M. d'Arsonval a constaté qu'on obtient couramment une précision atteignant le centième pour la mesure des pouvoirs absorbants des liquides colorés, et en particulier pour l'hémoglobine.

Edgard HAUDÉ.


Kronberg. — La méthylsaccharine, nouvelle matière sucrée. — *Die deutsche Zuckerindustrie*, XIV, 1190-1192.

La méthylsaccharine de M. Kronberg constitue, comme son nom l'indique, le dérivé méthylé de la saccharine de Fahlberg et List. Sa formule est donc




est assez semblable à celle de son homologue inférieur, la saccharine. Le toluène $\text{C}^6\text{H}_5 - \text{CH}_3$, traité par l'acide nitrique, puis réduit par l'hydrogène est transformé en paratoluidine $\text{C}^6\text{H}_4 - \text{CH}_3$; ce corps, chauffé


longtemps avec l'acide sulfurique concentré, donne




qu'on transforme par le nitrite de soude et l'acide sulfurique en dérivé diazoïque




Soumis à l'action prolongée du cyanure de cuivre et du cyanure de potassium, ce dérivé donne le sel de potassium de l'acide cyano-toluène-sulfonique




$\text{Az} = \text{Az}$ est éliminé sous forme d'azote libre. Le cyano-toluène-sulfate de potassium, cristallisé en longues aiguilles jaunes et brillantes, traité par le perchlorure de phosphore PCl_5 , donne de fines paillettes blanches



forme en l'amide correspondante



Enfin ce dernier produit, bouilli avec la lessive de soude, s'hydrate et remplace son groupe cyanogène par un carboxyle. La méthylsaccharine



se dépose alors sous forme d'une poudre blanche fondant à 246°.

Le groupe commun à la saccharine et à son dérivé méthylé et qui semble leur donner cet énorme pouvoir

sucrant, c'est le groupe $\begin{array}{c} \text{SO}_2^{(3)} \\ | \\ \text{CO}^{(4)} \end{array} > \text{AzH}$. M. Kronberg croit

qu'en produisant les divers homologues supérieurs de la saccharine, la chimie pourra ainsi réaliser la synthèse de séries de substances très sucrées dont la variété rivalisera avec celle des matières colorantes du goudron

A. HÉBERT.

Conférences faites au laboratoire de M. Friedel.

— Un vol. in-8° de 141 pages, publié par l'Association amicale des élèves et anciens élèves de la Faculté des sciences. Georges Carré, éditeur, 38, rue Saint-André-des-Arts, Paris.

L'Association, fondée en mars 1886, a pris l'initiative de la publication des Cours et Conférences de la Sorbonne. M. Friedel, comme son prédécesseur, M. Wurtz, institué à son laboratoire des conférences dans lesquelles ses élèves ou des savants de bonne volonté viennent exposer leurs découvertes ou résumer les travaux les plus récents sur des points particuliers de la chimie.

Les premières conférences ont été faites par MM. Cloué, Colson, A. Combes, Ch. Combes, Demarcay, Dubois, H. Gautier, Grimaux, Harriot, Moissan, Roques; elles n'ont pas été publiées.

Ce premier fascicule comprend celles de MM. Bouveault, Sur les composés à chaîne fermée dont le noyau contient plusieurs atomes d'azote; Maquenne, Sur les oxyquinones benzéniques; Arnaud, Sur les alcaïdoles des quinquinas; Béhal, Relation entre deux groupements fonctionnels dans la même molécule; Saint-Pierre, Furfurane, Pyrone et leurs dérivés; Fauconnier, Sur les amineux polyméthyléniques; Etard, Sur la solubilité des sels.

C. NAUD.

3° Sciences naturelles.

Delpino (F.) — Singolare fenomeno d'irritabilità nelle specie di *Lactuca*. *Malpighia* 1890.

Les nombreux travaux de M. Delpino sur les relations entre les plantes et les insectes qui fréquentent leurs fleurs sont bien connus. Ce savant vient de faire sur ce sujet une nouvelle observation qui n'est pas sans intérêt. Il admet que le latex des Euphorbiacées, Apocynées, etc., a pour effet de protéger ces plantes contre la morsure des insectes, car une lésion produite par leurs mandibules sur un organe riche en laticifères, aurait immédiatement pour effet de faire jaillir du latex qui agglutinerait et empaîterait leurs organes buccaux. La présence fréquente dans le latex de poisons et de substances narcotiques, confirmerait cette interprétation du rôle de l'appareil laticifère.

Or, M. Delpino a observé sur la Laitue vireuse (*Lactuca virosa*), que si pendant les journées chaudes de l'été, au moment de la floraison, et alors que les tissus sont très tendres, l'on touche avec un corps dur quelconque, et même très légèrement l'épiderme des bractées ou des bractéoles de l'involucre, une gouttelette de latex jaillit immédiatement au dehors. L'expérience réussit également même avec un poil très fin, et cependant l'observation au microscope ne montre aucune lésion dans les tissus. Ce serait donc l'irritabilité des cellules qui d'après l'auteur aurait entraîné une rupture dans un vaisseau laticifère, et la gouttelette de latex aurait probablement jailli par un stomate.

Ce phénomène, qui peut s'observer aussi sur la *Lactuca sativa* et le *L. sativina*, mais à un degré moindre, aurait pour résultat d'éloigner les insectes de ces plantes, et en effet l'auteur n'a jamais observé sur leurs fleurs ni sur leurs inflorescences, d'insectes à mandibules. Le frôlement des pattes des Aphidiens, des

Mouches, etc., suffirait même à provoquer l'émission du latex qui empêcherait leurs pattes et arrêterait leur marche.

C. SAUVAGEAU.

Certes (A.). — Mission scientifique du cap Horn, 1882-1883. Protozoaires. Paris, in-4° de 53 p. avec 6 pl., 1890.

Pendant son séjour au cap Horn, M. le Dr Hyades, l'habile directeur de la mission scientifique, a eu soin de recueillir des échantillons d'eau douce ou salée, ainsi que des sédiments; il recueillit aussi de la vase provenant des sondages effectués à de grandes profondeurs pendant le voyage de retour. Des herbes sèches furent également rapportées dans des boîtes plombées. Ces matériaux divers, recueillis et conservés avec les précautions indispensables pour en assurer la pureté, furent confiés à M. Certes, qui les étudia par différentes méthodes, notamment au moyen de cultures au sein de bouillons stérilisés. Le savant micrographe vit ainsi se développer divers Protozoaires dont les germes desséchés et tombés en vie latente s'étaient conservés dans la vase ou sur les herbes.

Aucun Infusoire n'apparut dans les cultures faites avec la vase des eaux douces, mais il se montra des Flagellés appartenant à des espèces connues déjà: *Phacotus lenticularis* Ehrbg, *Oikomonas mutabilis* Sav. Kent, *Euglena spirogyra* Ehrbg; ces mêmes cultures renfermaient des Bactéries banales, comme *Bacillus subtilis*, *B. amylobacter*, etc. Les cultures de foin donnèrent un Holotriche, *Colpoda Steini* Maupas et des Flagellés: *Heteromita* lens Muller, *Heteronema caudatum* Duj., divers *Cenomonas* et *Diplomastix*. L'examen des échantillons d'eau de mer donna un Flagellé, *Chlamydomonas pulvisculus* Ehrbg, et un Infusoire, *Euploetes harpa*; d'autres Infusoires, des genres *Cothurnia* et *Vaginicola*, furent également rencontrés sur des Algues et sur des Bryozoaires.

Les Rhizopodes sont fort nombreux dans les eaux douces de la Terre de feu; M. Certes en a rencontré un assez grand nombre, mais appartenant tous à des genres déjà connus; un petit nombre d'espèces étaient nouvelles. Citons, parmi ces dernières, *Nebela Martialis*, N. Vas, N. Fabrei, *Trinema Savinetti*, *Tr. constrictum*, *Centropogonis Magdalene*, qui sont toutes figurées.

Les sédiments sous-marins ont donné un très grand nombre de Radiolaires, connus déjà pour la plupart. *Hymenastrium Hyadesi*, *Spongocore Castracanei*, *Phormobrya Folini*, *Challengeroni Edwardsi* sont nouveaux.

Le travail de M. Certes constitue donc une intéressante contribution à la connaissance des Protozoaires qui vivent dans les régions australes. Il nous donne notamment un nouvel exemple de la vaste répartition géographique des Protozoaires, dont un nombre immense d'espèces semblent être répandues à la surface entière du globe.

D^r Raphaël BLANCHARD.

Testut (L.). — Recherches anthropologiques sur le squelette quaternaire de Chancelade (Dordogne). Lyon, 1889, in-8°, avec 14 planches. (Extr. du Bulletin de la Soc. d'anthropologie de Lyon, t. VIII.)

Avec son talent habituel, M. Testut nous donne dans cet excellent travail la description d'un squelette quaternaire trouvé dans la station de Reymonden, commune de Chancelade, à 7 kilomètres nord-ouest de Périgueux. Cette étude pourrait servir comme modèle d'une description complète, détaillée, exacte et suivie de conclusions précises, sobres, basées uniquement sur les faits constatés.

Les fouilles ont été faites à Reymonden par M. Hardy, qui les a résumées dans une note à l'Académie des Sciences (1). Au milieu d'une faune quaternaire on y a re-

cueilli une foule de lames en silex et de pièces ouvrées en os et en bois de renne du type de l'époque de la Madeleine. Le squelette en question se trouvait tout à fait à la base du gisement, à 1^m64 de profondeur, dans un foyer sablonneux reposant directement sur le roc au milieu duquel on remarquait une veine colorée en rouge par du peroxyde de fer. La position accroupie dans laquelle on a trouvé le squelette ne paraît pas naturelle, et rappelle celle des momies péruviennes. Outre le crâne, on a pu recueillir en bon état de conservation plusieurs os des membres et du tronc.

Il résulte de la longue étude descriptive et raisonnée à laquelle s'est livré M. Testut sur ce squelette, qu'il appartient à un sujet du sexe masculin, d'âge mur, de très petite taille (1^m50 environ), qu'il avait une tête volumineuse (capacité crânienne 1730 centimètres cubes), fortement dolichocéphale (indice céphalique 72), remarquablement haute; une face à la fois très haute et très large; des orbites également assez hautes (indice orbitaire 86,9), un nez étroit et allongé (indice nasal 42,6); un maxillaire inférieur puissant; des membres supérieurs longs par rapport à sa taille; de grandes mains; des os robustes, trapus, avec des empreintes musculaires puissantes. Comparé à nos races européennes actuelles, ce squelette présente un certain nombre de caractères dits de supériorité (grande capacité crânienne, développement du front, etc.), mais beaucoup plus de caractères d'infériorité: os massifs, longueur des membres supérieurs, incurvation de l'humérus et du cubitus au voisinage de leur jonction, aplatissement du tibia, son inclinaison considérable sur les plateaux articulaires de l'astragale, fémur recourbé en arrière, présentant une fosse hypo-trochantérienne et la ligne aponeurotique; enfin la configuration du pied, la mobilité des articulations tibio-tarsienne et medio-tarsienne, l'inclinaison en dedans du premier cunéiforme et surtout l'écartement considérable du gros orteil, le rendant capable de saisir des objets entre lui et le deuxième, à la manière d'une véritable pince. « L'homme de Chancelade » ainsi reconstitué diffère au point de vue ethnique de ses confrères du quaternaire supérieur, l'« homme de Néanderthal », l'« homme de Spy » et quelques autres moins connus. Il s'en rapproche par sa dolichocéphalie, mais il s'en éloigne par la belle courbe de son front et par le peu de développement des arcades sourcilières. On ne saurait non plus le rapprocher de la race préhistorique dite de *Cromagnon*, dont il diffère par tous les caractères sauf peut-être sa dolichocéphalie et sa grande capacité crânienne. Par contre cet homme quaternaire présente des analogies frappantes avec des Esquimaux qui ont le même crâne, la même face, la même taille, le même indice nasal, le même indice orbitaire, le même degré de torsion de l'humérus, etc. Ce fait remarquable vient à l'appui des idées de certains anthropologistes d'après lesquelles à la fin de la période quaternaire, l'homme aurait émigré de l'Europe centrale vers le nord en suivant son gibier favori, le renne, qui ne pouvait plus vivre dans le climat, devenu tempéré, de nos pays.

J. DENIKER.

Franck (François), Professeur remplaçant au Collège de France. — Etude du pouls total des extrémités. Arch. de physiologie, 1890.

M. François Franck, qui le premier avait étudié d'une façon méthodique les variations rythmiques du volume d'un organe en utilisant un appareil à immersion hermétique, a repris ces recherches avec un nouvel appareil plus perfectionné et surtout plus maniable, qu'il décrit sous le nom de *sphygmographe volumétrique*. C'est un levier, muni d'un multiplicateur, qui vient s'appuyer sur la face dorsale du pouce, par exemple, la main et le doigt reposant sur un point d'appui rigoureusement fixe. Les variations de volume du pouce, déterminées par les variations d'irrigation sanguine, sont inscrites amplifiées par le levier sur un cylindre enregistreur.

(1) Comptes rendus de l'Académie, t. CVII, 1888, p. 1025.

M. François Franck a obtenu avec cet appareil quelques résultats assez curieux, prévus pour la plupart, mais rendus tangibles par le tracé. Les pulsations du doigt sont rythmées avec le cœur; elles atteignent, dans les cas d'insuffisance aortique, une amplitude très grande. Le rythme respiratoire exerce également une influence très nette sur les variations de volume du doigt; il en est de même de l'effort. La compression veineuse augmente le volume du pouce, tandis que la compression artérielle le diminue; quand on cesse cette dernière, on voit le tracé s'élever au-dessus de la ligne sinieuse prise avant la compression. M. François Franck explique cette augmentation de volume par la diminution de tonicité des vaisseaux à la suite de la suppression de la pression intérieure normale: ils se laissent alors distendre d'une façon exagérée quand la circulation est reprise. Cette observation est intéressante au point de vue chirurgical et explique les méfiances de certains chirurgiens contre la bande d'Es-march, qui, disent-ils, si elle permet l'hémostase pendant l'opération, favorise l'hémorragie post-opératoire.

L'application du froid, une stimulation douloureuse, soit directe, soit du côté opposé, amènent une vaso-constriction du doigt et par suite une diminution de volume. Cette méthode a permis aussi de reprendre l'expérience de MM. Brown-Séquard et Tholozan sur le le spasme vaso-moteur réflexe croisé.

Dans ce court mémoire M. François Franck a voulu simplement montrer quel parti on pouvait tirer de cette méthode en l'appliquant à des recherches cliniques ou de toxicologie expérimentale.

L. O.

4° Sciences médicales.

Le Fort (L.) *Professeur à la Faculté de Médecine. — De l'exophthalmos pulsatile, à propos d'une opération de ligature des deux carotides primitives pour exophthalmos pulsatile. Rev. de chir.* Paris, 1890, t. X, p. 369 et 437.

Après avoir donné l'observation d'un malade atteint d'exophthalmos pulsatile bilatéral, guérie par la ligature successive des deux carotides et résumé les diverses observations publiées, le professeur Le Fort étudie successivement l'anatomie pathologique, l'étiologie, les symptômes, le diagnostic, la marche, la terminaison et la thérapeutique de cette affection.

Le complexe symptomatique (exophthalmie, pulsations de l'œil et de l'orbite, limite de souffle à l'auscultation, bruits intracrâniens perçus par le malade) peut reconnaître diverses origines. Le développement anormal de la veine ophthalmique à laquelle se transmettent les pulsations de la carotide, constitue la lésion principale; celle-ci a pour origine le plus souvent une rupture de l'artère carotide dans le sinus caveux, quelquefois un anévrysme de l'ophthalmique ou de la carotide interne, quelquefois une phlébite du sinus caveux.

L'exophthalmos pulsatile est spontané (plus fréquent chez la femme), ou traumatique (consécutif à des lésions traumatiques de la tête). Dans les cas spontanés le début est assez souvent brusque et la maladie se trouve constituée en quelques jours avec tous ses symptômes; dans les cas traumatiques le début est assez souvent lent et les symptômes principaux ne se montrent qu'à une époque quelquefois assez éloignée du moment où le traumatisme a eu lieu.

Aux symptômes fondamentaux s'ajoutent le plus souvent la diplopie, la perte de la vue du côté malade, l'injection de la conjonctive, le chémosis, la paralysie des muscles de l'œil, le ptosis, le développement des

veines palpébrales et périorbitaires, l'existence d'une tumeur pulsatile à l'angle interne de l'orbite.

L'anévrysme cirsoïde, les angiomes, les cancers vasculaires de l'orbite se distinguent par une série de caractères: 1° Les vaisseaux pulsatiles périorbitaires sont des artères et non des veines; 2° le maximum des pulsations est en dehors et non en dedans du globe de l'œil; 3° la tumeur pulsatile, si elle existe, est au côté externe et non au côté interne de l'orbite.

L'exophthalmos pulsatile paraît compatible avec la vie au moins pendant quelques années; mais les symptômes qui l'accompagnent, en particulier les bruits intra-crâniens, constituent pour les malades un supplice tel que la plupart réclament une intervention chirurgicale active.

La ligature de la carotide primitive est le seul traitement efficace de l'exophthalmos pulsatile. Elle n'est que rarement suivie d'accidents cérébraux. Assez souvent il y a réapparition des battements affaiblis, mais cette apparente récurrence est le plus souvent sans importance; la guérison survient souvent d'elle-même après quelques heures ou quelques mois. Si l'exophthalmie est double, ou s'il y a récurrence d'exophthalmos après ligature d'une carotide et que la compression de la carotide opposée arrête les battements, il ne faut pas hésiter à faire la ligature de la deuxième carotide.

Le mémoire se termine par un index bibliographique et par une série de tableaux résumant 110 observations de cette affection.

D^r HARTMANN.

Phisalix (C.). — Contribution à la pathologie de l'embryon humain. In Journal de l'anatomie et de la physiologie, mai-juin 1890.

M. Phisalix a eu la bonne fortune de pouvoir étudier un embryon humain de 4^{mm}, 5 de longueur. Cet embryon était pathologique mais les lésions trophiques du système nerveux accompagnées de troubles sécrétoires auxquelles il paraît avoir succombé ne semblent pas avoir altéré les rapports des différents systèmes dont l'auteur donne une description détaillée en l'appuyant d'excellentes figures qui reproduisent quelques-unes des 308 coupes en lesquelles il a débité cette pièce rare.

Un point très nouveau de cette description a trait aux modifications qui surviennent dans la circulation veineuse à l'époque du développement du foie. Avant l'apparition de cet organe, les deux veines ombilicales provenant de la division du tronc unique qui arrive du chorion longent de chaque côté la paroi du corps et vont se jeter dans le sinus de Cuvier. Plus tard le foie s'interpose entre elles et le sinus de Cuvier; elles n'ont plus de communication directe avec ce dernier, mais se jettent dans les veines vitellines à la face inférieure du foie. M. Phisalix, d'après la pièce qu'il étudie, explique d'une manière tout à fait satisfaisante le mécanisme de cette transformation. Le foie en se développant comprime les parois du corps et par conséquent les veines ombilicales qui y cheminent. De là une stase du sang au-dessous du foie et formation d'un bourrelet variqueux qu'il observe en effet sur ses coupes. En même temps la veine vitelline à ce niveau envoie un diverticulum qui rejoint bientôt le bourrelet en question. La communication entre les deux systèmes veineux au-dessous du foie est ainsi établie et le trajet du sang s'opère bientôt par cette seule voie, les branches ombilicales qui longeaient les parois du corps se trouvant finalement oblitérées. Ce point de l'évolution du système veineux n'avait pas encore été élucidé; c'est donc une importante lacune que vient de combler M. Phisalix dans son intéressant mémoire.

D^r H. BEAUREGARD.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

La Société de Biologie, la Société française de Physique, la Société chimique de Paris, la Société royale de Londres, les Sociétés de Physique et de Chimie de Londres, l'Académie des Sciences et la Société de Physique de Berlin, l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, les Sociétés savantes d'Odessa, l'Académie des Sciences de Vienne, l'Académie royale des Lincei sont en vacances.

ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 8 septembre 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. L. Lecornu : Sur une propriété des systèmes de forces qui admettent un potentiel.

2^{de} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Lecoq de Boisbaudran avait l'année dernière examiné la gadolinite préparée par M. de Marignac ; il avait conclu que les neuf dixièmes de cette gadolinite ne pouvaient pas être attribués à des substances anciennement connues. Dans de nouvelles recherches, il a procédé au fractionnement de cette matière par l'ammoniaque très diluée et obtenu une série de portions de substance de plus en plus pure, mais encore souillée, les précipités de tète par du samarium, et les queues par du didyme. Il signale en passant ce fait, qui peut donner lieu à des erreurs, que les terres rares et la gadolinite en particulier sont maintenant quelque temps en dissolution par l'acétate d'ammonium en présence d'un excès d'ammoniaque libre. — M. P. Schutzenberger a constaté que lorsqu'on dirige lentement un courant de gaz inerte, tel que l'azote sec, chargé de vapeurs de sulfure de carbone, à travers une colonne de mousse de platine maintenue à une température inférieure à celle du rouge sombre, le sulfure de carbone est entièrement absorbé ; la mousse de platine se convertit de proche en proche en une poudre noire assez divisée. Lorsqu'on a fait passer du sulfure de carbone jusqu'à refus, on trouve une poudre homogène, que l'agitation avec l'eau ne sépare pas en deux portions d'inégale densité, et qui est inattaquable par l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique purs et bouillants ; l'eau régale chaude reste à peu près inactive. On n'a donc pas affaire à un mélange de sulfure de platine et de noir de fumée, mais bien à un sulfocarbure de platine de la formule $\text{Pt}^2\text{S}_2\text{C}$. Le sulfocarbure de platine brûle à chaud dans l'oxygène sec, ce qui permettrait facilement, par un dosage d'acide sulfurique, d'évaluer la quantité de sulfure de carbone absorbée par la mousse de platine. — M. l'abbé Bourgeat adresse comme suite à sa précédente communication des indications sur le prolongement en Suisse de la tempête du 19 août ; au delà de la frontière, le tornado a continué sa marche sur la même ligne droite et avec la même vitesse ; mais en descendant les pentes du Jura il s'est élargi et a été accompagné de chutes de grêle.

3^e SCIENCES NATURELLES. — M. P. Miquel a isolé le ferment soluble qui transforme l'urée en carbonate d'ammoniaque et qui avait été signalé par M. Musculus. Il l'obtient en assez grande quantité en cultivant sur du bouillon de peptone stérilisé et additionné d'un peu de carbonate d'ammoniaque l'un des bacilles fermentés de l'urée qu'il a décrits. Il pense que c'est uniquement par cette diastase et non par un acte de nutrition que les divers microorganismes qui hydratent l'urée agissent sur cette substance. — M. L. Vialleton décrit le développement post-embryonnaire du rein (mesonephras) de l'*Ammocete*. Le rein embryonnaire, comprenant un lobe antérieur avec des glomérules isolés et un lobe postérieur avec des glomérules empilés en

colonne, s'accroît à sa partie postérieure par une série d'épaississements de l'épithélium péritonéal, qui vont continuer la colonne glomérulaire. C'est surtout cette portion post-embryonnaire qui formera le rein de la Lamproie. — M. S. Calderon décrit les modifications qu'ont subies les divers pointements d'une seule formation optique relevée par lui à Moron (province de Séville). La roche primitive s'est plus ou moins transformée ici en talc, là en *actinite* ; ailleurs elle a donné naissance à de la calcite et à du grenat. — M. Bézier donne la liste des fossiles qu'il a trouvés dans le calcaire de *Quezon* (Ille-et-Vilaine) et qui lui permettent d'affirmer que ce calcaire appartient au carbonifère. — M. Wiet a envoyé quelques détails sur l'éruption actuelle du Vésuve à M. le Ministre des affaires étrangères qui les communique à l'Académie. La lave sort par une bouche latérale, qui s'est formée l'année dernière dans un tremblement de terre ; la coulée descend lentement. M. Maiorano, d'après les indications du sismographe, pense que ce réveil de l'activité volcanique durera longtemps, mais qu'il n'aboutira nullement à une terrible éruption.

Séance du 15 septembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. G. Bigourdan : Observations de la nouvelle planète Charlois faites à l'Observatoire de Paris. — MM. G. Rayet, Picart et Courty : Observations de la comète Denning (1890 juillet 23) faites au grand équatorial de l'Observatoire de Bordeaux. — M. Tacchini adresse le relevé des phénomènes solaires observés pendant le premier semestre de 1890 ; tous les signes concordent pour indiquer que l'activité solaire va en augmentant. — M. Denza adresse les observations recueillies par l'*Association italienne pour l'étude des météores lumineux* sur les étoiles filantes des 9-11 août 1890 ; la plus grande fréquence s'est montrée le 11 au soir ; le radiant principal était entre Persée et Cassiopee. — M. Ch. V. Zenger fait remarquer que les perturbations atmosphériques du mois d'août dernier se groupent naturellement en trois époques de deux ou trois jours chacune, dont l'intervalle est précisément égal à la période solaire. — A propos de la communication récente de M. Trouvé, MM. Dumoulin Froment et Doignon rappellent qu'ils avaient déjà appliqué le gyroscope électrique à la direction des navires.

2^{de} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Lecoq de Boisbaudran a déterminé l'équivalent de la gadolinite, en transformant en sulfate un poids connu de terre ; il trouve le chiffre de 153,95, peu différent des chiffres donnés respectivement par M. de Marignac et M. Clève. — M. A. Combes avait obtenu, au moyen du chlorure de sulfuryle, une acétylacétone monochlorée, de formule $\text{CH}^3\text{-CO-CHCl-CO-CH}^3$; voulant passer à l'alcool correspondant, il a traité le chlorure par l'acétate de potassium, molécule à molécule, en solution alcoolique ; mais il a obtenu, par réaction avec l'alcool, l'éther acétique de l'acétol ; il a opéré alors dans l'acide acétique absolu, et il a obtenu, en passant par l'intermédiaire de son sel de cuivre, l'éther acétique du diacétylcarbinol. — M. Mathieu-Plessy, ayant trouvé du potassium dans les produits qu'il décrivait

dans sa note du 24 août, retire les conclusions de cette note. — M. L. Gauthier décrit diverses particularités qu'il a relevées après le passage de la trombe du 19 août dans le Jura.

3^e SCIENCES NATURELLES. — M. Serullas donne la diagnose complète de *Hsonandra percha*, l'arbre qui fournit la gutta-percha et qui est en train de disparaître par suite d'une exploitation mal entendue; l'auteur n'en a retrouvé que quelques exemplaires à Singapour, où il en existait des forêts il y a trois ans. — M. L. Ravaz a fait des expériences comparatives sur des boutures de vigne plantées telles quelles ou apprêtées de diverses manières; il a vu que les opérations telles que l'écorçage, qui facilitent l'absorption de l'eau, augmentent la proportion des reprises.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 9 septembre 1890.

M. Vidal présente une thèse faite par M. H. M. F. Sénechal dans le service du D^r Leloir (Lille), sur les troubles urinaires prémonitoires des myélites syphilitiques : rétention, incontinence, hyperesthésie de l'appareil urinaire, coliques vésicales; l'auteur cite plusieurs cas où le traitement administré à la suite de ces symptômes, avant l'apparition des lésions, a réussi à enrayer les accidents de la myélite syphilitique. — M. Dujardin-Beaumetz présente un mémoire manuscrit de M. Magnan, de Gondrecourt (Meuse), sur l'air chaud dans les poudrons. — M. A. Guérin chargé d'examiner avec M. Lannelongue la tentative faite par M. Guermontprez à l'effet de remplacer, à la suite de la résection du corps maxillaire inférieur, les apophyses génées par une pièce métallique, fait remarquer que l'opérateur a été obligé d'enlever cette pièce le dixième jour; il se refuse à voir dans le résultat obtenu la prothèse des apophyses. — M. Javal lit son rapport sur un mémoire de M. G. Martin (de Bordeaux), relatif à l'amblyopie des astigmatiques. Il rappelle ses propres observations sur ce sujet et insiste sur la nouveauté et l'intérêt pratique des conclusions de M. Martin, qui montrent la nécessité de rechercher l'astigmatisme chez tous les enfants, dont la vue laisse à désirer et de les soumettre à des mensurations kératométriques.

M. Moutard-Martin, président, fait part à l'Académie du décès de M. Duménil, correspondant national, directeur de l'Ecole de Médecine de Rouen.

Séance du 16 septembre 1890.

M. Larrey présente les *Annales de la Polyclinique de Paris*, œuvre collective de divers médecins, destinée à assurer des soins aux malades qui ne peuvent ou ne veulent entrer à l'hôpital. — M. Dujardin-Beaumetz indique les principales conclusions du rapport qu'il vient d'adresser à M. le préfet de police, au nom du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, sur les mesures prophylactiques à prendre à Paris en prévision d'une invasion de choléra : 1^o nécessité de connaître les cas de choléra dès qu'ils se produisent; 2^o création d'un corps de médecins faisant exécuter les mesures de désinfection; 3^o emploi exclusif du sulfate de cuivre comme agent de désinfection des linges, de la figure et des mains; 4^o emploi d'acide sulfureux pour désinfecter les chambres; 5^o achat de dix étuves mobiles à pression de vapeur; 6^o transport des malades en voitures chauffées, puis désinfectées; 7^o évacuation des lieux où se sera déclaré le choléra. — M. Ball offre le dixième volume de ses *Leçons sur les maladies mentales*. — Au nom de MM. Léon Le Fort et Poliaillon et au sien, M. Tillaux lit un rapport sur un mémoire de M. G. Richelot relatif à un cas de persistance du canal de Nück avec hydrocèle réductible chez une jeune fille de dix-neuf ans. Le rapporteur conclut comme M. Richelot à la persistance du canal de Nück pour expliquer l'hydrocèle et

donne sa pleine approbation à l'intervention chirurgicale, aujourd'hui possible, grâce à l'antisepsie, pour opérer la cure radicale d'une hernie simple ou d'une hydrocèle congénitale; sans proposer cette intervention, on peut aujourd'hui l'accorder au patient qui la réclame. — La discussion continue sur la dépopulation de la France. M. Javal prononce à cette occasion un discours où il insiste sur la nécessité de changer les mœurs par les lois et de modifier la répartition des impôts de façon à alléger les charges des familles nombreuses. Le législateur devrait, selon lui, s'inspirer de l'exemple de l'Angleterre où existent le droit d'aînesse et la liberté de tester, où il n'y a ni service militaire ni aucun impôt sur les objets de première nécessité. M. Javal donne ensuite le résultat suivant de l'enquête à laquelle il s'est livré avec MM. Cheysson et Bertillon sur la composition des familles en France :

2,072,000 familles n'ont pas d'enfants	
2,342,000 familles en ont.....	1
2,665,000 — — — — —	2
1,512,000 — — — — —	3
937,000 — — — — —	4
350,000 — — — — —	5
313,000 — — — — —	6
232,000 — — — — —	7 ou davantage

ASSOCIATION TECHNIQUE MARITIME

Séance du 27 juin 1890.

M. Hauser, ingénieur de la marine, lit une étude sur l'influence économique de la légèreté dans la construction des navires. En considérant un navire comme un véhicule chargé de porter un poids donné (artillerie, torpilles, etc...) avec une vitesse déterminée, et à une distance limitée par l'approvisionnement de charbon, le poids de sa protection correspondant en outre à une certaine épaisseur de cuirasse, M. Hauser recherche quelle serait avec ces données l'influence d'une variation du poids de la coque ou du poids de la machine par cheval sur les dimensions et le déplacement. Il établit une relation entre les différents poids qui entrent dans la construction, et qui sont, les uns constants, les autres proportionnels soit au déplacement, soit à la surface immergée du maître-couple, c'est-à-dire, pour des navires géométriquement semblables, proportionnels au cube et au carré du rapport de similitude. Cette relation, appliquée à des types modernes, aux croiseurs le *Davout* et le *Dupuy de Lôme*, montre qu'une augmentation de 1/10 dans le poids de la coque entraîne, toutes les autres données restant les mêmes, une augmentation correspondante de 14 % environ dans le déplacement, et qu'une augmentation de 1/10 dans le poids de la machine par cheval nécessite une augmentation de 9 à 11 % de ce même déplacement.

L'auteur emploie le même procédé de calcul pour déterminer l'économie de poids que ferait réaliser sur la coque et les machines et par suite sur le déplacement, la substitution à l'acier d'un métal léger, tel que l'aluminium, dont le poids spécifique est trois fois moindre. En supposant à ce métal une résistance moitié de celle de l'acier, autrement dit en doublant les échantillons, le rapport du poids de coque au déplacement dans le *Davout* tomberait de 30 % à 21 %, et le poids de la machine par cheval, de 85 % à 66 %. On pourrait en profiter pour diminuer les dimensions, de manière à réduire le déplacement aux 2/3 de sa valeur. L'aluminium et ses composés actuellement connus ne répondant pas encore complètement aux conditions nécessaires pour en faire des métaux industriels, il est à souhaiter que des essais soient entrepris en vue de rechercher les alliages jouissant des propriétés désirables.

L. VIVET.

NOUVELLES

NOUVELLES RECHERCHES SUR LES SUCRES

I. De toutes les questions actuelles de synthèse chimique, il n'en est pas de plus importante, par ses rapports avec la physiologie végétale et par les résultats déjà acquis, que la reproduction artificielle des matières sucrées.

Nous avons essayé, dans deux précédents articles ¹, de faire comprendre les réactions qui ont permis d'atteindre ce but tant désiré; nous n'y reviendrons pas. Qu'il nous soit permis néanmoins de signaler aux personnes qui s'intéressent à cet ordre de recherches un résumé complet de la question, que M. Em. Fischer vient de faire paraître dans les *Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft* (t. 23, p. 2114). Dans les 27 pages de ce Mémoire, remarquable par la clarté et la forme de l'exposition, elles trouveront réunis tous les résultats obtenus depuis dix ans par les auteurs qui se sont occupés de ce sujet, en même temps que les principales indications bibliographiques qui s'y rattachent.

II. Les sucres à poids moléculaire élevé. En exposant les méthodes de M. Fischer, nous avons insisté tout particulièrement sur leur caractère de grande généralité et prévu la synthèse de substances nouvelles, analogues par l'ensemble de leur propriétés aux sucres naturels déjà connus, mais renfermant un plus grand nombre d'atomes de carbone, en d'autres termes d'un poids moléculaire plus élevé.

MM. Fischer et Passmore sont entrés résolument dans cette voie, qui promet d'être fructueuse, car déjà ces auteurs annoncent la synthèse de sucres réducteurs à 7, 8 et 9 atomes de carbone, qu'ils appellent *heptoses*, *octoses* et *nonoses*, ainsi que celle des alcools correspondants, homologues supérieurs de la mannite ordinaire.

Parmi ces derniers il en est un d'une importance exceptionnelle, c'est la *perséite* ou sucre d'avocatier, pour laquelle l'auteur de cet article avait déjà établi la formule $C_7H^{16}O_7$, fondée sur des recherches analytiques qu'il serait trop long de rapporter ici ².

Pour effectuer la synthèse de la perséite, MM. Fischer et Passmore unissent la mannose dextrogyre (de l'ivoire végétal) à l'acide cyanhydrique, ce qui les conduit à l'acide *mannoheptonique* $C_7H^{14}O_8$ et à sa lactone $C_7H^{12}O_7$, corps cristallisables et faciles à obtenir purs; puis ils réduisent la lactone mannoheptonique par l'hydrogène naissant de l'amalgame de sodium. Il se forme ainsi, d'abord une *mannoheptose* $C_7H^{14}O_7$, substance cristallisée, dextrogyre, réduisant à chaud la liqueur de Fehling, en tout semblable aux glucoses, quoique non fermentescible, enfin un alcool heptonique $C_7H^{16}O_7$, qui a été comparé directement à un échantillon de la perséite naturelle qui a servi à mes propres recherches. Ces deux corps possèdent le même point de fusion, la même solubilité dans l'eau, le même pouvoir rotatoire (en présence de borax); ils donnent des dérivés acétylés qui fondent à la même température; par conséquent ils sont identiques.

Il suit de là que la perséite est à chaîne normale comme la mannite dont elle dérive synthétiquement.

La mannoheptose se prête à son tour aux mêmes transformations que la mannose : avec l'acide cyanhydrique elle donne l'acide *mannonononique* et sa lactone $C_9H^{14}O_8$ (lévogyre) qui, par réduction, se change en un nouvel homologue des glucoses, la *mannooctose* $C_8H^{16}O_8$ (lévogyre). Ce corps est sirupeux, non fermentescible

et de saveur franchement sucrée; par fixation d'hydrogène il donne la *mannocitolose* $C_8H^{18}O_8$, substance remarquable par sa faible solubilité dans l'eau.

Enfin la mannoctose a fourni aux mêmes auteurs un acide *mannonononique* $C_9H^{18}O^{10}$ (lévogyre) dont la lactone se transforme, au contact de l'amalgame de sodium, en *mannononose* $C_9H^{18}O_9$, composé extrêmement analogue à la dextrose ordinaire; fusible vers 130°, douée d'un pouvoir rotatoire dextrogyre voisin de 50°, fermentescible comme les glucoses et la glycérose, la mannononose ne peut être caractérisée que par sa combinaison monohydrazinique $C_9H^{18}O_8 \cdot Az_2H \cdot C_2H_5$ qui est fort peu soluble dans l'eau froide.

La dextrose, la galactose et l'isodulcite ont donné des dérivés isomères des précédents; nous nous dispenserons de les décrire ici.

MM. Fischer et Passmore font remarquer, en terminant leur travail, que les seuls sucres fermentescibles connus jusqu'à ce jour renferment tous un nombre d'atomes de carbone qui est un multiple exact de trois; ils les considèrent comme des produits de polymérisation directs de l'aldéhyde glycérique et pensent que les *nonoses* $C_9H^{18}O_9$ doivent se rencontrer dans la nature à côté des véritables glucoses qui sans doute ont été souvent confondues avec elles. (*Berichte der deutschen Chemischen Gesellschaft*, t. 23, p. 935 et 2226.)

III. La sorbite. Découverte par M. J. Boussingault dans les baies du sorbier des oiseaux, la sorbite a été retrouvée par MM. Vincent et Delachanal dans les fruits de la plupart des Rosacées : il résulte des recherches de ces auteurs, ainsi que de celles de Tollens, que la sorbite est un véritable isomère de la mannite, dérivant comme celle-ci de l'hexane normal du pétrole, mais jusqu'à présent cette substance était restée, au milieu de tous les autres sucres naturels, sans relation connue avec aucun d'eux.

MM. Vincent et Delachanal, d'une part, M. J. Meunier, d'autre part, viennent de constater ce fait capital que la sorbite et la dextrose ordinaire se transforment l'une et l'autre en sorbite quand on les réduit par l'amalgame de sodium, en liqueur alcaline; il en résulte que ces corps présentent entre eux les relations d'aldéhydes à alcool, et si on se rappelle que Kiliani a été amené par ses travaux sur la sorbite à considérer ce sucre comme une acétone de même constitution (dans le plan) que la lévulose, on voit que la sorbite et la dextrose sont à la sorbite ce que la lévulose et la mannose sont à la mannite de la manne. (*Comptes Rendus*, t. 111, p. 49 et 50.)

L'alcool correspondant à la dextrose, que Fischer dit encore être inconnu dans l'un de ses derniers Mémoires (*Berichte*, t. 23, p. 2131), est donc aujourd'hui déterminé. C'est un grand point d'acquis dans l'histoire des sucres.

Il reste encore à expliquer pourquoi la mannose et la dextrose donnent avec la phénylhydrazine la même osazone, et aussi pourquoi la dextrose donne une petite quantité de mannite à la réduction : il y a là un desideratum qui ne tardera pas sans doute à être élucidé complètement. D'ailleurs on peut rapprocher ce dernier fait de cet autre, observé par Fischer, que sous l'action de l'acide cyanhydrique, l'arabinose donne de l'acide gluconique lévogyre en même temps que l'acide arabinose carbonique de Kiliani (*Berichte*, t. 23, p. 2134) : c'est la preuve évidente que tous ces corps sont des isomères stéréochimiques dans lesquels le groupe arabinose primitif doit se retrouver sans altération.

L. LAQUEENNE.

¹ Revue générale des Sciences, p. 165 et 224.

² Annales de chimie et de Phys. 6^e série, t. XIX, p. 5.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LA MÉTAMÉRIE CÉPHALIQUE

SA PLACE DANS L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION DES VERTÉBRÉS ¹

Chacun aujourd'hui connaît le livre où M. Perrier nous montre des individus animaux se groupant en une file longitudinale pour constituer une colonie². Les Annélides offrent un exemple de ces colonies animales. Les individus-anneaux se succèdent dans l'individu social, que représente une Annélide, en répétant à peu près la même structure. Dans chaque anneau on trouve un fragment de tube digestif, une portion de système nerveux, une paire d'organes excréteurs, une cavité péritonéale, des muscles, tout ce qui serait nécessaire à ce segment de l'individu social pour vivre s'il redevenait indépendant. Il est toutefois certains anneaux, qui, grâce à des modifications spéciales, viennent rompre quelque peu la monotonie d'une pareille organisation; ces anneaux contiennent en effet soit quelque organe en plus, soit autre chose à la place des organes que nous venons de citer. C'est ainsi que certains segments renferment les organes reproducteurs. D'autres, les plus antérieurs, présentent la bouche, une région particulière du système nerveux qui constitue le cerveau et peuvent offrir des organes des sens. Les anneaux anté-

rieurs ainsi différenciés forment dans leur ensemble la région qu'on est convenu de nommer la tête.

Ainsi chez les Vers, chaque anneau reproduit au moins primitivement la structure de ceux qui le suivent et qui le précèdent; il n'existe entre les divers anneaux que des différences secondairement produites, secondaires par suite, et dues à des modifications que des adaptations spéciales ont entraînées. A ces anneaux, que la doctrine coloniale interprète comme les éléments d'une colonie linéaire, anneaux qui, s'ils ne se montrent pas tous semblables, du moins auraient pu l'être et l'étaient au début, qui avaient la même puissance d'évolution, qui étaient en un mot homodynames, on donne le nom de *métamères*. Les *métamères*, au sens descriptif du mot, sont des parties (*μερος*) d'animal, placées les unes au bout des autres (*μετα*). La doctrine des colonies animales nous conduit tout naturellement à attribuer une égale valeur à ces parties qui représentaient jadis des individus distincts, tous semblables. Les termes de *métamérie*, *métamérisation*, caractérisent le fait de la division d'un organisme en *métamères*, et l'état de cet organisme.

Par extension et presque par abus de langage, on a dit d'un organe considéré isolément qu'il est *métamérisé*, lorsqu'il se montre partagé en segments, dont chacun appartient à un *métamère* de l'animal; il s'agit ici d'une *métamérie partielle*, d'une *métamérie d'organes*. Si la *métamérisation* est en voie de disparition dans un organisme animal, il

¹ Cet article n'a la valeur que d'un aperçu très approximatif de la question de la Métamérie céphalique, que M. Wiedersheim considère comme le plus important problème dans le domaine de la morphologie des Vertébrés. Il est loin de prétendre à être un exposé scientifiquement rigoureux et complet d'un sujet dont le champ est immense et où les moindres faits réclament une minutieuse analyse. (Dr A. P.)

² PERRIER. *Les colonies animales*, Paris, Masson, 1881.

pourra se faire qu'elle ne persiste plus que dans un ou deux organes; cela suffira cependant pour attester l'état métamérisé primitif de l'animal tout entier.

1

Un grand nombre de groupes de la série animale offrent une constitution métamérique, nous pourrions dire coloniale, comparable à celle qui distingue les Vers. Les Vertébrés sont de ce nombre. « Si l'on considère, a dit Dohrn, les premiers stades du développement embryonnaire d'un Vertébré, par exemple d'un Poisson à squelette osseux, on a de la peine à se soustraire à l'idée que l'on se trouve en présence d'un être articulé, composé d'un grand nombre de segments. » Les Vertébrés a dit, d'autre part M. Perrier, sont des colonies: « ils sont formés de segments, d'individus placés bout à bout et qui sont arrivés à se fusionner. » La constatation de l'organisation métamérique, bien plus, coloniale, des Vertébrés, n'est pas un des moindres mobiles qui aient poussé les naturalistes à faire descendre les Vertébrés d'animaux annelés, de Vers. Malgré la répugnance qu'on pourrait avoir, et qu'éprouvent en réalité certains esprits à accepter l'idée d'une aussi misérable origine, il ne faut pas méconnaître les faits, et, si l'on ne veut pas regarder, se refuser à voir ce que d'autres montrent.

Il existe en effet chez les Vertébrés des marques évidentes de métamérisation dans toute l'étendue du tronc. Ces indices, encore apparents chez l'adulte, sont beaucoup plus frappants chez l'embryon.

En présence d'un Vertébré adulte, on ne peut s'empêcher de songer à des anneaux, lorsqu'on voit les côtes former autour du corps des cerceaux régulièrement distants; l'image des Arthropodes, des Annelés se trouve évoquée, et l'on hasarde des rapprochements. La succession régulière des vertèbres, alternant avec des disques intervertébraux, la naissance des nerfs à des intervalles égaux le long de la moelle épinière, tout cela éveille l'idée d'une disposition segmentaire, d'une métamérie.

L'examen d'un embryon de Vertébré est bien autrement suggestif. Chez un embryon de Poulet de 1 à 2 jours d'incubation, on voit se former d'avant en arrière, s'ajoutant les uns à la suite des autres, et d'autant plus nombreux que l'embryon est plus âgé, de petits tubes creux que l'on a appelés les *vertèbres primitives* (fig. 1, PV), bien que ces formations n'entrent pas directement dans la constitution des futures vertèbres; on les a nommés aussi *segments primitifs*, *somites*. L'appellation la plus significative est celle de *myotomes* que van Wyhe a proposée; elle précise leur destinée, qui est essentiellement de se différencier en organes muscu-

lares, en même temps qu'elle caractérise leur arrangement segmentaire, qui est des plus évidents¹.




Fig. 1. — Embryon de Poulet de 41 heures, vu par la face supérieure ou dorsale à un grossissement de 25 fois (d'après M. MATHIAS DUVAL). — Am, capuchon céphalique de l'amnios, recouvrant toute la première vésicule cérébrale et les vésicules optiques. — Vo, vésicules optiques. — C, cœur. — Vom, veines omphalo-mésentériques. — Ao, portion aortique du cœur. — PV, protovertèbres. — LP, lame protovertébrale. — LM, lames médullaires du sinus rhomboidal en voie d'occlusion. — PP, restes de la ligne primitive.

La moelle épinière, que l'on sait avoir la forme d'un tube dans les premiers temps du développement embryonnaire, se montre, à cette époque, d'après les observations de Kupffer, partagée en une série de dilatations successives que séparent des étranglements, formée de segments, en un mot métamérisée². Dohrn a fait chez des embryons de Sélaciens du genre *Mustelus* une constatation qui, bien qu'elle porte sur des stades plus avancés que ceux qu'a examinés Kupffer, peut néanmoins être rapprochée de l'observation de cet auteur³. Et plus tard, quand autour de l'axe squelettique que constitue la corde dorsale, se différencie la colonne vertébrale avec ses segments vertébraux successifs, on voit la corde alternativement renflée et resserrée dans les espaces intervertébraux et dans l'intérieur

¹ Toutefois le terme « myotome » ne coïncide pas exactement avec celui de « somite »; car il est moins compréhensif que ce dernier. Le myotome n'est, pour van Wyhe, qu'une portion, la plus importante il est vrai, du somite.

² KUPFFER, Primäre Metamerie des Neuralrohres der Vertebraten. (Sitz. der K. bair. Akad., Bd XV.)

³ DOHRN, Anatom. Anzeiger, 1890, Nos 2-3.

des vertèbres. La régularité d'un tel ensemble est de celles que peut seule expliquer une organisation métamérique.

II

Notre corps est donc métamérisé à la façon de celui d'un Ver; la métamérisation y est seulement plus effacée. Cet effacement est l'œuvre du temps. Chez les premiers Vertébrés, aujourd'hui disparus, tout porte à croire que les segments étaient mieux accusés, et que la disposition générale du corps était celle d'un Annelé. De là Dohrn et d'autres¹ ont été amenés à admettre l'existence de Vertébrés annelés, ancêtres des Vertébrés actuels. L'organisation de ces aïeux était bien rudimentaire. C'étaient, d'après le tableau que nous en a tracé Dohrn, des animaux annelés, cylindriques, pourvus d'une paire de branchies sur chaque segment du corps.

La branchie, organe fondamental du métamère chez le Protovertébré, dérive d'une transformation du tube segmentaire, organe essentiellement caractéristique du métamère du Ver. C'est de branchies que provinrent ensuite, par une série de transformations profondes, péniblement et lentement accomplies dans le cours d'une longue évolution, la plupart des organes qui distinguent le corps des Vertébrés actuels, tels que les extrémités locomotrices, les branchies actuellement encore représentées chez les Poissons, celles que l'on observe à l'état de rudiments dans les embryons des Vertébrés supérieurs, l'appareil copulateur (pénis et clitoris), la bouche et l'anus, etc.

Dès ce moment, les segments successifs du Vertébré annelé devenu Vertébré, cessant d'être égaux et pareils les uns aux autres, devinrent simplement équivalents; les homologues ne furent plus à première vue évidentes, il devint nécessaire d'en donner la preuve. Une branchie, qui dans tel métamère avait fourni tel organe, se différenciait dans un second métamère en une formation tout autre. La constitution primitive, caractéristique des métamères, s'effaçant de plus en plus, les métamères devinrent eux-mêmes de moins en moins évidents, de moins en moins indépendants, et leur numération de plus en plus sujette à l'erreur. C'est surtout dans la région antérieure du corps que les transformations marchèrent rapidement, que la disparition de l'organisation métamérique fit de grands progrès. Cette région du corps, plus modifiée que les autres, est la tête des Vertébrés d'aujourd'hui. Les processus multiples à l'aide desquels la tête

s'est produite, processus dans le détail desquels nous n'avons pas le loisir d'entrer, sont rassemblés dans l'expression de « céphalisation ».

C'est par ces processus que le Vertébré en évolution constitua, aux dépens des branchies de sa future région céphalique, des narines, des yeux et des oreilles, une bouche d'un nouveau genre, destinée à succéder à une première qui ne répondait plus aux besoins de l'existence, bien d'autres organes enfin, d'usages très diversifiés; c'est là qu'il épaissit en un cerveau la partie antérieure de son cordon nerveux.

Les progrès accomplis par le Vertébré furent tels que le privilégié de tous, l'homme, s'arrogea le droit d'occuper une place à part dans l'ensemble des êtres vivants, et qu'il y eut des savants pour classer les animaux en trois groupes : les Invertébrés, les Vertébrés et l'Homme.

Il ne fallut rien moins que des courageux comme Haeckel (1) pour rappeler à cet « orgueilleux parvenu » son origine plus humble, et lui dire : Vous descendez du Singe, et les Singes eux-mêmes, avec tous les Vertébrés, sont des Vers transformés. Regardez, pour nous croire, votre tête dont vous vous enorgueillez tant, et vous la verrez formée d'anneaux, comme l'est la tête d'un Ver de terre. Et si elle vous semble en différer beaucoup, nous pouvons vous montrer comment elle est parvenue à en différer. C'est aussi là à peu près le langage que tiendraient sans contredit, s'ils pouvaient être appelés en témoignage, les Protovertébrés moins favorisés, jaloux de la bonne fortune de leurs frères. À leur défaut, l'on peut invoquer les recherches de nombreux savants aussi patients qu'ingénieux, dont les observations ont accumulé les faits sur lesquels s'appuie la doctrine de la métamérie céphalique.

Retrouver dans la tête une disposition segmentaire, voir quels sont les organes qui offrent cette disposition, connaître si la métamérisation de la tête est la copie pure et simple et la continuation de celle du tronc, ou si elle revêt des caractères particuliers, tel est le but convoité et presque atteint aujourd'hui.

III

Il y a longtemps déjà que Goethe, à la vue d'un crâne de mouton, restait convaincu de la ressemblance étroite du crâne avec la colonne vertébrale, affirmait que celui-là n'était qu'une simple transformation de celle-ci, et distinguait dans le crâne quatre vertèbres. Chacune des vertèbres crâniennes est constituée par un corps et des lames; celles-ci, fortement écartées et très larges,

¹ Dohrn, Studien zur Urgeschichte des Wirbelthier Körpers (Mitth. aus der zool. Station zu Neapel, Bd. III, VI, IX, X).

Id. Der Ursprung der Wirbelthiere und das Princip des Functionswechsels, Leipzig, 1875; et : L'origine des Vertébrés et le principe de transformation des fonctions. (Revue internationale, des sciences biologiques, 1883.)

(1) HAECKEL, Anthropogénie ou évolution humaine, Paris, 1877.

représentées qu'elles sont par les os de la voûte du crâne, entourent le cerveau comme les lames des vraies vertèbres enveloppent la moelle. Goethe fondait ainsi la théorie vertébrale du crâne, qu'adopta Duméril, et dont Oken fut le plus solide défenseur (1). La théorie de Goethe devait tomber devant les données de l'anatomie comparée et de l'embryologie, qui montrèrent, entre les mains d'Huxley et de Gegenbaur : la première, que chez les Sélaciens le crâne cartilagineux est fait d'une seule pièce, la seconde que le crâne naît chez les embryons des Vertébrés supérieurs sous la forme d'une ébauche continue. En présence de pareils faits, la théorie vertébrale du crâne devint insoutenable; car si la constitution segmentaire vertébrale existe dans le crâne, elle doit présenter un caractère absolument primitif, apparaître dès le début du développement soit phylogénétique, soit ontogénétique des Vertébrés, ne faire défaut, par conséquent, ni chez les Vertébrés inférieurs, tels que les Sélaciens, ni chez les embryons de Vertébrés.

Le génie de Goethe ne l'avait cependant pas trompé; il lui avait fait entrevoir la vérité à travers des ténèbres que la science n'avait pas encore éclaircies. Goethe, s'il avait mal vu, avait du moins distingué quelque chose dans la direction où il avait cherché. Son insuccès tenait surtout au point de vue où il s'était placé. En examinant la question de plus haut, avec des méthodes d'investigation perfectionnées, en élargissant les horizons, en ne limitant plus l'observation au squelette de la tête pour le comparer à celui du tronc, en étudiant les uns après les autres, dans l'espoir d'arriver à les superposer, les organes similaires de la tête et du tronc, en recherchant comment dans la tête ces organes ont acquis des caractères différents de ceux qu'ils présentent dans le tronc, ne se contentant pas d'un essai d'interprétation du crâne seul, mais répétant la même tentative pour tous les organes de la tête, ambitionnant même en somme de fonder une théorie phylogénétique de la tête tout entière, on fit faire à la science un grand pas dans cette voie.

Tous les organes que l'on voyait métamérisés dans le tronc, on essaya de les retrouver dans la tête pourvus du même caractère, et l'on y est parvenu pour beaucoup d'entre eux.

Si pour le crâne la segmentation vertébrale nese confirma pas, telle du moins que Goethe l'avait conçue, son existence reçut de la part de

H. Müller, Mihalkovics¹, Kölliker², des preuves certaines. Ces auteurs découvrirent dans le crâne des restes de la corde dorsale, sous forme de renflements intervertébraux, comparables à ceux que l'on observe dans la colonne vertébrale; ils trouvèrent entre l'os basi-occipital et l'os sphénoïdal postérieur, et même entre les deux sphénoïdes, un disque intervertébral, rappelant de très près ceux qui dans la colonne dorsale s'interposent entre deux vertèbres. Du moment que l'on retrouvait dans le crâne les limites qui séparent les vertèbres dans le squelette axial du tronc, on prouvait du même coup l'existence dans le crâne de segments vertébraux. Le nombre exact de ces segments est demeuré d'ailleurs indéterminé.

La présence des arcs branchiaux est du reste, comme Gegenbaur l'a fait remarquer, un argument indirect en faveur de l'existence de vertèbres dans la région postérieure de la tête. Les arcs branchiaux étant en effet comparables à des côtes, comme celles-ci reposent sur des vertèbres correspondantes, il s'en suit que les arcs branchiaux doivent avoir, eux aussi, un support vertébral.

Le lecteur se rappelle sans doute qu'une des marques les plus évidentes de segmentation, que nous ayons constatées dans le corps de l'embryon du Vertébré, consiste dans la présence de tubes creux que nous avons nommés vertèbres primitives, somites, myotomes, destinés à fournir essentiellement des muscles. Balfour³ et Marshall⁴ ont retrouvé de semblables somites creux dans la tête, et les ont appelés *carités céphaliques*. Van Wyhe⁵ a confirmé le fait; en montrant que la paroi de ces somites céphaliques se différencie en muscles définitifs, il a justifié la désignation de myotomes qu'il leur a imposée. Ahlborn⁶ a fait des constatations analogues. Frioriep⁷ chez des embryons de Mammifère a décrit dans la région occipitale quatre somites, dont trois donnent des muscles et ont par conséquent la valeur de myotomes. Le nombre des somites céphaliques chez les Cyclostomes, les Sélaciens et les Amphibiens est aujourd'hui bien établi, et les différenciations de ces somites bien connues.

¹ MIHALKOVICS. Wirbelsäule und Hirnanhang (Arch. für mikr. Anat. 1874), Bd. XI.

² KÖLLIKER. Traité d'embryologie, Reinwald, Paris, 1882.

³ BALFOUR. A monography on the development of elasmobranch fishes, London 1878.

⁴ MARSHALL. The head cavities and associated nerves of Elasmobranchs. (Quart. Journal of micr. Science, volume XXI, new series.)

⁵ VAN WYHE. Ueber die Mesodermsegmente und die Entwickelung der Nerven des Selackierkopfes. Amsterdam, 1882.

⁶ AHLBORN. Ueber die Segmentation des Wirbelthierkörpers. Zeitschr. für wiss. Zool., Bd. XL.

⁷ FRIORIEP. Ueber ein Ganglion des Hypoglossum und Wirbelanlagen in der Occipitalregion. Arch. für Anat. und Phys., Anat. Abth., 1882.

(1) Voir sur la question des vertèbres craniennes : la thèse de M. Le Roux, Paris, 1838, et le curieux travail de M. Carlier : Etude sur l'organisation et la disposition générales des cinq Vertèbres céphaliques, etc. Paris, Baillière, 1883.

(Voir le schéma, fig. 2, et le tableau qui est mis en note ¹.)




Fig. 2. — Diagramme de la métamérie de la tête (d'après WIEDERSHEIM, un peu modifié). — *e*, *e*, ectoderme, invaginé en *O* pour former la fossette olfactive primitive. L'épithélium sensoriel, qui est au fond de cette fossette, est innervé par le nerf olfactif *Olf.* — *M*, invagination buccale. — I-IX, somites céphaliques. — III, nerf oculo-moteur commun. — IV, pathétique. — VI, moteur oculaire externe ou abducteur de l'œil. — XII¹-XII⁴, hypoglosse. — Tous ces nerfs fonctionnent comme branches ventrales des somites céphaliques I, II, III, VI, VII, VIII et IX. — Les somites IV et V n'ont pas de branches ventrales connues. — *Rpv*, rameau ophthalmique profond du trijumeau, formant la branche dorsale du premier somite. — *V*, le reste du trijumeau formant la branche dorsale du deuxième somite et innervant la région maxillaire. — VII, VIII, acoustico-facial, ou nerf dorsal du troisième et du quatrième somites, innervant la première fente branchiale (fente hyomandibulaire, évent) (1). — IX, glosso-pharyngien, nerf dorsal du cinquième somite, innervant la deuxième fente branchiale (2). — X¹, X², nerf vague ou pneumogastrique, constituant le nerf dorsal du sixième et du septième somites, et innervant les troisième et quatrième fentes branchiales (3, 4). — XII, XII, branches dorsales se comportant comme les branches dorsales du vague, et innervant les fentes branchiales 5 et 6, mais appartenant en réalité à l'Hypoglosse. — XII¹-XII⁴, branches ventrales de l'Hypoglosse. — *sv*¹, *sv*², branches ventrales des deux premiers nerfs spinaux. — *sd*¹, *sd*², branches dorsales de ces mêmes nerfs. — *m*, arc mandibulaire. — *h*, arc hyoïdien. — *b*¹-*b*², les cinq arcs branchiaux proprement dits. — 1-6, les fentes branchiales. — *c*¹, *c*², les deux premières côtes. — *a*, *b*, les deux premiers somites du tronc. — *rl*, rameau latéral du vague.

Ainsi nous retrouvons dans la tête une des formations les plus caractéristiques du tronc.

¹ Tableau de la distribution segmentaire des nerfs crâniens dans leurs rapports avec les métamères céphaliques (d'après VAN WYHE, modifié par WIEDERSHEIM).

MÉTAMÈRES OU SOMITES	BRANCHES VENTRALES NERVEUSES	BRANCHES DORSALES NERVEUSES
Métamère I (Muscles de l'œil : droit supérieur, droit inférieur, droit interne et petit oblique).	Oculo-moteur (III).	Rameau ophthalmique profond du trijumeau (V).
Métamère II (grand oblique de l'œil).	Pathétique (IV).	Trijumeau (V), après le départ du rameau ophthalmique profond.
Métamère III (droit externe de l'œil).	Moteur oculaire externe ou abducteur (VI).	Acoustique (VIII) et Facial (VII).
Métamère IV (muscles atrophiés de bonne heure).	Pas de branche ventrale.	
Métamère V (muscles atrophiés de bonne heure).	Pas de branche ventrale.	Glosso-pharyngien (IX).
Métamères VI et VII	Deux racines antérieures de l'Hypoglosse (XII).	Vague ou pneumogastrique (X).
Métamères VIII et IX	Deux racines postérieures de l'Hypoglosse (XII).	Racines de l'Hypoglosse (XII) en voie de disparition.

Les fentes et les arcs branchiaux prêtent à des considérations bien intéressantes au point de vue qui nous occupe.

On sait que chez les embryons des Vertébrés il se produit dans la région postérieure de la tête, sur les parties latérales, des fentes qui établissent un passage entre l'extérieur et la partie pharyngienne




Fig. 3. — Embryon de Poulet du milieu du quatrième jour de l'incubation, vu par sa face dorsale et latérale droite, grossi 15 fois (d'après M. Mathias DUVAL). La partie antérieure de l'embryon a été seule représentée. — *V*₃, vésicule cérébrale postérieure. — *V*₂, vésicule cérébrale antérieure. — *GP*, glande pinéale. — *GN*, ganglions des nerfs crâniens. — *fb*, fentes branchiales.

du tube digestif. Aussi les a-t-on nommées des fentes pharyngiennes. Entre les fentes persistent des




Fig. 4. — Tête d'un embryon de Poulet du milieu du cinquième jour (d'après M. Mathias DUVAL). — *V*₂, vésicule cérébrale antérieure. — *V*₃, vésicule cérébrale moyenne. — *GP*, glande pinéale. — *VA*, vésicule auditive. — *MS*, maxillaire supérieure. — *C*, cœur. — *XX*, saillie du cœur au-dessus de la surface de section. — *AB*¹-*AB*², arcs branchiaux.

bandes de tissu qui deviennent squelettiques, et qui de plus chez les animaux aquatiques se couvrent

de replis richement vascularisés, les *branchies*, servant à la respiration. Ces bandes de tissu portent le nom d'*arcs pharyngiens*; on leur donne encore celui d'*arcs branchiaux*, les fentes pharyngiennes étant alors appelées *fentes branchiales*. (Voy. fig. 3 et 4.)

Les fentes branchiales, dont la formation entraîne l'apparition des arcs branchiaux, se produisent par l'adossement, suivi de perforation, de deux poches venant à la rencontre l'une de l'autre, l'une formée par une dépression de la paroi extérieure du corps, c'est-à-dire de l'ectoderme, l'autre due à une semblable invagination de la paroi du tube digestif ou entoderme (fig. 5). Il existe donc autant de poches entodermiques ou de diverticules de la paroi du pharynx, qu'il y a de fentes branchiales. Et ces poches se succèdent régulièrement selon une disposition métamérique évidente (fig. 6).




Fig. 5.




Fig. 6.

Fig. 5. — Coupe verticale et transversale de la région branchiale d'un embryon de Poulet de la soixante-dix-septième heure. — 1, 2, 3, 4, fentes branchiales. Au niveau de la deuxième fente existe un libre passage de l'intérieur du pharynx *ph* à l'extérieur. La troisième fente n'est pas ouverte, mais consiste seulement en un adossement des deux poches pharyngienne et ectodermique. — *bm* 1, *bh* 2, *b* 3, *b* 4, *b* 5, les cinq arcs branchiaux. *bm* 1 est l'arc maxillaire, *bh* 2 l'arc hyoïdien; *b* 3-5, les arcs branchiaux proprement dits. — *tn*, tube nerveux. — *c*, corde dorsale. — *a*, aorte.

Fig. 6. — Schéma des poches pharyngiennes et de leur destinée chez un embryon de Salicrin (imité de de Meuron). — A. Extrémité antérieure. — P. Extrémité postérieure du pharynx. — 1-7, les poches pharyngiennes. — *th*, celles des poches pharyngiennes qui contribueront à former le thymus. — *ta*, la dernière poche, constituant la glande thyroïde accessoire ou glande supra-péricardique.

C'est dire qu'à ne considérer que le tube digestif seul, on voit celui-ci pousser vers l'extérieur, pour constituer la partie pharyngienne des fentes branchiales, un certain nombre de diverticules dont l'arrangement segmentaire est évident. C'est dire en d'autres termes qu'il existe une métamérisation de la partie antérieure du tube digestif, une métamérisation entodermique, une *entomérie* en un mot,

qui est la caractéristique la plus saillante de la métamérie branchiale ou *branchiomérie*.

Chez la plupart des Poissons actuels, les fentes branchiales sont limitées à la région postérieure de la tête, à la région cervicale, où elles forment les ouïes. Chez certains Sélaciens, qui présentent des marques incontestables d'une organisation primitive, les Notidanides, il existe un plus grand nombre de fentes et d'arcs branchiaux que partout ailleurs, et derrière le point occupé par le dernier arc branchial des Sélaciens ordinaires, on en trouve encore deux autres. Partant de là, l'on a été amené à penser que, chez des Vertébrés plus anciens encore que les Notidanides, il devait exister d'autres fentes et arcs branchiaux encore, reculant ainsi de plus en plus les limites postérieures de la région branchiale. En exagérant cette disposition, on arrive à garnir de fentes branchiales la totalité des parois latérales du tronc des Vertébrés, et l'on se trouve ramené aux conceptions de Dohrn, pour qui, nous l'avons dit, des branchies régnaient sur toute l'étendue du corps des premiers Vertébrés, réparties par paires sur chaque segment.

Chez les Vertébrés supérieurs, on sait que les fentes et arcs branchiaux ne sont plus apparents que dans les premiers temps de la vie embryonnaire. Encore toutes les fentes branchiales des Poissons actuels ne sont-elles pas représentées chez les embryons des Oiseaux ou des Mammifères, les plus antérieures seules ayant persisté. On a même montré dans ces derniers temps suivant quels processus se fait la réduction des fentes branchiales, disparaissant peu à peu d'arrière en avant¹. En effet, tandis que pour les fentes branchiales antérieures, la poche ectodermique et le diverticule entodermique, en venant au contact, et s'ouvrant l'une dans l'autre, réalisent encore une libre communication entre l'extérieur et le tube digestif, il n'en est plus de même pour les fentes branchiales postérieures dont les culs-de-sac ecto- et entodermique demeurent éloignés l'un de l'autre, si bien qu'il n'y a plus de véritable fente, mais seulement deux dépressions correspondantes de la paroi externe du corps et de l'épithélium pharyngien; par arrêt de développement, il n'y a plus à ce niveau que des sillons branchiaux.

Nous devons ajouter que les diverticules ecto-entodermiques n'entrent pas seulement dans la constitution des fentes branchiales, mais que leur épithélium en proliférant peut donner lieu à un certain nombre d'organes, parmi lesquels il con-

¹ KASTSCHENKO. Das Schlundspaltengebiet des Hühnchens (*Arch. für Anat. und Phys.*, Anat. Abth., 1887.)

LISSNER. Ein Beitrag zur Kenntniss der Kiemenspalten und ihrer Anlagen bei amnioten Wirbelthieren. (*Morphol. Jahrbuch*, Bd. XIII.)

vient de citer le thymus et la glande thyroïde (voy. fig. 6). Chez les Vertébrés supérieurs où les fentes branchiales ne fonctionnent pas comme conduits aquifères, où il n'y a pas de branchies, c'est là même l'unique destination de ces fentes, dès lors adaptées à d'autres usages. Chez les Poissons mêmes, une fente branchiale tout entière peut être ainsi transformée et l'épithélium qui la revêt employé à constituer un organe tout différent d'une branchie. Tel est le cas pour la dernière fente branchiale des Sélaciens, dont le diverticule entodermique donne naissance à un organe glandulaire, la « glande supra-péricardique » ou « glande thyroïde accessoire. » (van Bemmelen.)

On comprend que, s'il en est ainsi, on soit bien disposé à croire que des fentes branchiales postérieures à la dernière formation branchiale des Sélaciens ont pu devenir méconnaissables en se métamorphosant en organes très divers. On en vient aussi à se demander si, en avant de la région branchiale des Poissons et des embryons des Vertébrés supérieurs, c'est-à-dire non plus seulement dans la région postérieure de la tête, mais en plein domaine céphalique, il n'existe pas des formations que l'on pourrait rattacher à des branchies, dont elles seraient dérivées par une série de transformations profondes. Ainsi a pensé Dohrn, dont nous avons rappelé plus haut les idées générales, et beaucoup d'auteurs ont adopté sa manière de voir¹. L'origine branchiale de certains organes au moins peut être admise aujourd'hui. Tel est le cas pour la fossette olfactive, que Dohrn et Marshall ont considérée comme la branchie la plus antérieure de toutes, et dont la nature branchiale a été confirmée par les recherches de Beard et de Blaue.

L'ensemble des arcs branchiaux représente une métamérie des parties ventro-latérales de la région postérieure de la tête, que l'on peut placer en regard de celle des parties latéro dorsales de la tête, réalisée par la formation des somites. Doit-on la faire coïncider avec cette dernière?

En d'autres termes, les arcs branchiaux doivent-ils être considérés comme le prolongement ventral des somites? On s'accorde généralement à dire qu'il est impossible de superposer les métamères branchiaux aux somites; c'est ce qu'exprime le schéma (fig. 2) où la correspondance des deux formations fait défaut. Cependant on ne doit pas se dissimuler que c'est là peut-être résoudre prématurément la question. Car il peut exister dans les arcs branchiaux des cavités (*latm*, fig. 7), qui ne sont pas autre chose que le prolongement de celles des

somites. Leurs parois éprouvent les mêmes différenciations musculaires que celle des somites: elles fournissent des muscles aux branchies (van Wyhe, Dohrn); et même ce sont elles qui donnent




Fig. 7. — Coupe transversale de la tête d'un embryon de Sélacien (schématique, d'après BEARD, modifiée et simplifiée). — *M*, tube médullaire, encore à l'état de gouttière. — *e*, ectoderme. — *c*, corde dorsale. — *i*, intestin. — *br*, fente branchiale. — *ah*, arc branchial. — *s*, cavité du somite. — *latm*, cavité de la plaque latérale musculaire, appartenant à l'arc branchial correspondant. — *n*, nerf crânien. — *g*, son ganglion, différencié de l'épaississement ectodermique qui représente un organe des sens branchial *sb*.

certain muscles, les muscles de l'œil par exemple, dont on attribue ordinairement la production aux somites (Dohrn). Si les somites ont une cavité qui se continue dans celle des arcs branchiaux, on est bien autorisé à dire que les arcs branchiaux sont eux-mêmes un prolongement des somites. La question de la coïncidence de la métamérie branchiale avec celle des somites doit donc être réservée.

Ce que nous devons nous borner à constater, c'est l'existence d'une métamérie branchiale, qui n'est vraisemblablement que le prolongement de celle qui régnait jadis sur toute l'étendue du tronc.

La segmentation du tube nerveux n'est pas non plus limitée à la portion de ce tube située dans le tronc et qui deviendra la moelle épinière; mais elle s'étend aussi sur la partie la plus reculée de la région céphalique du canal nerveux. c'est-à-dire sur le cerveau postérieur. C'est même à cet endroit que l'on a trouvé pour la première fois la métamérisation nerveuse. Plusieurs auteurs (Dursy, Kölliker, Rabl, Béranek, Hoffmann, etc.) ont étudié à cet égard des coupes du cerveau postérieur chez les embryons des Reptiles et des Oiseaux¹. Béranek, qui s'est livré à un

¹ Récemment encore, M. Houssey (Société de Biologie 1889, no 38) s'est prononcé en faveur de l'existence des fentes branchiales au-devant de la région des branchies proprement dites.

¹ DURSUY. Der Primitivstreif des Hühnchens, 1867. KOELLIKER. Traité d'embryologie.

C. RABL. Bemerkung über die Segmentirung des Hirnes. (Zoolog. Anzeiger, 1885, n° 491).

BÉRANEK. Recueil zoologique suisse, 1884 et 1887.

examen approfondi de la question, a trouvé chez les Reptiles et les Oiseaux des dilatations de la



Fig. 8. — Embryon de Porc de 1 cm. 4 de longueur. — Coupe verticale et transversale, destinée à montrer les replis médullaires ou segments du cerveau postérieur I-V. — V, V, vésicules auditives. — n, n, tube nerveux sectionné en deux endroits différents, en particulier au niveau du cerveau postérieur.

lumière du cerveau postérieur, au nombre de cinq, qu'il a nommées *replis médullaires*. (Voy. fig. 8.) Nous avons décrit ces replis chez l'embryon de Porc¹. Chiarugi les a signalés chez l'embryon humain². Il existe donc dans le cerveau postérieur de véritables segments nerveux, auxquels on a fait le reproche de n'être que des formations secondaires : reproche qui paraît dépourvu de fondement, puisque Kupffer a vu les segments sur un tube nerveux si peu développé qu'il se présentait encore sous la forme de canal incomplet, de gouttière, et puisqu'aussi Béranecq a trouvé déjà la segmentation nerveuse chez des embryons de Poulet de la vingt-quatrième heure.

Si d'ailleurs, à ne considérer que les segments

du tube nerveux, on se prend à douter de leur valeur métamérique réelle, les doutes sont levés dès l'instant qu'on veut bien s'occuper de leurs rapports avec les nerfs qui en émanent. Nous avons vu déjà la naissance des nerfs spinaux à des intervalles égaux tout le long de la moelle épinière : disposition régulière qui a tout l'air d'une disposition métamérique. Si, comme notre figure schématisque le montre, on se représente en même temps l'axe nerveux segmenté, et qu'on répartisse les nerfs qui en partent par paires sur chaque segment, on obtiendra une idée d'ensemble de la métamérie nerveuse du tronc. L'idéal serait de retrouver cet arrangement dans la tête, pour les nerfs cérébraux.

C'est là malheureusement une tâche des plus difficiles. Il ne faudrait pas croire en effet que les douze paires de nerfs crâniens que l'on distingue en anatomie humaine correspondent à autant de segments cérébraux, et puissent être comparés

d'emblée aux nerfs spinaux, et considérés avec eux comme des nerfs segmentaires. Des phénomènes en effet se sont passés, dans le genre de ceux dont nous allons donner un exemple, qui ont eu pour résultat de déformer considérablement le schéma primitif de la métamérie nerveuse dans la tête. Ainsi, Béranecq, étudiant les replis médullaires, c'est-à-dire les segments nerveux du cerveau postérieur, et les troncs nerveux qui en partent, examinant les relations des nerfs avec les replis, dans le but de rapporter chaque nerf à un segment cérébral, a observé les faits suivants : le premier et le deuxième segments du cerveau postérieur donnent naissance au nerf trijumeau ; le troisième fournit à la fois les nerfs facial et auditif, le quatrième le nerf moteur oculaire externe, le dernier enfin le glosso-pharyngien ; le nerf vague naît par quatre racines en arrière du cerveau postérieur.

Ainsi voilà d'une part le nerf trijumeau qui, naissant à la fois de deux segments cérébraux, équivaut à deux nerfs segmentaires ; voici d'autre part les nerfs facial et auditif, qui, tirant leur origine d'un seul segment, n'ont la valeur chacun que d'un demi-nerf segmentaire ; le nerf vague enfin, avec ses quatre racines, qui naissent sans doute chacune d'un segment médullaire, représente quatre nerfs primitifs, segmentaires, fusionnés en un seul tronc nerveux définitif. Un nerf cérébral de l'anatomie descriptive peut donc dériver de la fusion de plusieurs nerfs segmentaires, ou bien au contraire du dédoublement d'un seul. A ces difficultés s'en ajoutent bien d'autres, que nous ne songeons même pas à signaler. « Il est souvent très difficile, dit Béranecq, de déterminer si telle ou telle branche correspond bien à un véritable segment céphalique, si tel nerf constitue une individualité ou n'est qu'un rameau détaché d'un autre tronc nerveux pendant le cours de l'évolution de l'espèce, si enfin les rapports que les nerfs crâniens ont avec les organes qu'ils innervent sont primitifs et non dérivés. »

Si les relations d'origine des nerfs crâniens avec les métamères cérébraux connus ne permettent pas d'établir, pour l'ensemble de ces nerfs, une série métamérique, on peut chercher si, par l'étude de leurs rapports avec les organes qu'ils sont destinés à innervir, on n'obtiendrait pas la solution du problème de leur métamérie. Si nous pouvons en effet rapporter les nerfs crâniens successifs à des organes dont la métamérisation est indiscutable, nous établissons du même coup l'arrangement métamérique de ces nerfs et conséquemment aussi celui du cerveau, d'où ils tirent leur origine. Or nous avons dans la tête du Vertébré deux séries métamériques d'organes : la série des somites, et

¹ Communication à la Société des Sciences de Nancy 1^{er} juin 1888, et *Bulletins de la Société des Sciences de Nancy*.

² CHIARUGI, Anatomie d'un embryon humain, etc. (*Arch. ital. de biologie*, t. XII, fasc. 1, II, 1889.)

celle des fentes et arcs branchiaux. Pour ce qui est de cette dernière, ses rapports avec les nerfs crâniens sont à peu près déterminés. On connaît les nerfs qui innervent les parois des fentes branchiales successives, et l'on peut ranger ces nerfs suivant l'ordre segmentaire de ces fentes elles-mêmes¹. L'étude des relations des nerfs cérébraux avec les somites a fourni des résultats bien plus concluants; car se sont les somites qui sont l'expression la plus typique de la métamérie du corps des Vertébrés. Cette étude a occupé nombre d'auteurs², et a permis de conclure à l'existence de nerfs segmentaires en rapport chacun avec un somite céphalique. Mais tandis que dans le tronc les nerfs segmentaires, munis chacun d'une branche dorsale et d'une branche ventrale en relation avec le somite correspondant, sont représentés par les nerfs rachidiens de l'anatomie descriptive, les nerfs segmentaires de la tête, c'est-à-dire ceux dont les branches dorsales et ventrales abordent un somite donné, ne répondent nullement aux nerfs crâniens de l'anatomie. Ainsi un nerf de l'anatomie humaine, le nerf moteur oculaire commun par exemple (III), n'est qu'une branche ventrale d'un nerf segmentaire; un nerf comme le trijumeau peut représenter deux branches dorsales de nerf segmentaire, l'une (R_{pv}) correspondant au premier, l'autre (V) au second somite; un nerf tel que l'hypoglosse (XII) peut posséder six branches dont deux dorsales et quatre ventrales, et par conséquent équivaloir à deux nerfs plus deux demi-nerfs segmentaires; des nerfs comme le facial et l'auditif (VII, VIII) peuvent commander à la fois deux somites; certaines branches ventrales de nerfs segmentaires enfin ne sont pas représentées par des nerfs de l'anatomie descriptive.

Il est vrai que l'anatomie descriptive des Vertébrés inférieurs permet de comprendre les nerfs cé-

rébraux autrement qu'on le fait en anatomie humaine. Elle nous montre en effet que les nerfs crâniens sont groupés en complexus, tels que le complexus du vague et celui du trijumeau. A ce dernier par exemple appartiennent les nerfs oculomoteur et pathétique (III et IV), qui, joints au trijumeau proprement dit (R_{pv}, V), représentent dans leur ensemble deux nerfs segmentaires. Il existe donc dans le cerveau un petit nombre de nerfs constitués chacun par un groupe de nerfs segmentaires, dont les branches dorsales et ventrales sont anatomiquement plus ou moins distinctes.

Nous en avons assez dit sur la métamérie nerveuse, la plus étudiée et la moins connue encore. Tous les travaux accumulés sur la question permettent de conclure à la métamérie nerveuse, et l'on ne discute pas sur le fait même, mais sur les détails de cette métamérie.

IV

Les données que nous avons acquises jusqu'ici nous autorisent à penser : 1° qu'il existe dans la tête des dispositions métamériques; 2° que la métamérie céphalique reproduit le type de celle du tronc, dont elle est le prolongement, puisque les mêmes organes que le tronc nous présente métamérisés, nous les retrouvons dans la tête avec le caractère métamérique.

Cette formule répond-elle bien à la réalité, n'y a-t-il dans la métamérie céphalique qu'une copie quelque peu effacée, et en tout cas très modifiée, de celle du tronc? Certains faits semblent parler en faveur de la négative, et montrer que, dans la tête, la métamérie présente un cachet spécial et des caractères qui ne s'observent que là, et que si la métamérie céphalique est pour une grande part la reproduction pure et simple de celle du tronc, il y a en elle quelque chose de plus.

La métamérisation du tube digestif se traduit par la formation des diverticules entodermiques desquels prennent naissance les branchies, la métamérisation entodermique branchiale, l'entomérie en un mot, dont nous avons parlé plus haut, est limitée, chez les Vertébrés actuels du moins, à la région branchiale, au territoire céphalique par conséquent. Il en résulte pour la métamérie de la tête un caractère tout particulier qu'on ne retrouve dans aucune autre partie du corps du Vertébré.

Mais ce n'est pas tout. Nous avons vu plus haut que la région branchiale n'est pas la seule qui se distingue par la présence de branchies, et qu'au moins chez des Vertébrés disparus, les formations branchiales devaient se prolonger en arrière de la

¹ Ne pouvant entrer ici dans le détail des faits, nous prions le lecteur de se reporter à la figure schématisée 2.

² GEGENBAUR. Ueber die Kopfnerven von Hexanchus und ihr Verhältniss zur Wirbeltheorie des Schädels. (*Jenaische Zeitschrift für Med. und Naturwiss.*, Bd. VI, 1871.)

BALFOUR. On the development of spinal Nerves in Elasmobranch Fishes. (*Philos. Transactions*, 1875.)

MARSHALL. On the head cavities and associated nerves in Elasmobranchs. (*Quart. Journal of micr. Sc.*, Vol. XXI, 1881.)

Id. The segmental value of the cranial nerves. (*Journal of Anat. and Phys.*, vol XVI.)

VAN WYHE. Ueber die Mesodermsegmente und die Entwicklung der Nerven des Selachierkopfes, Amsterdam, 1882.

AULBORN. Ueber den Ursprung und Antritt der Hirnnerven von Petromyzon. (*Zeitschr. für wiss. Zool.* Bd XL.)

GEGENBAUR. Die Metamerie des Kopfes und die Wirbeltheorie des Kopfskelettes. (*Morph. Jahrbuch*, Bd. XXX.)

HIS. Die Morphologische Betrachtung der Kopfnerven. (*Arch. für Anat. und Phys.*, Anat. Abth., 1887.)

DOHRN. Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. Ueber Nerven und Gefässe bei Ammocoetes und Petromyzon Planeri. (*Mith. aus der Zool. Stat. zu Neapel*, Bd. VIII, 1888) etc.

zone actuelle des branchies jusqu'à l'extrémité postérieure du corps. Nous avons été amené tout naturellement à nous demander si en avant de cette zone il n'en serait pas absolument de même, et si jadis la région prébranchiale de la tête n'aurait pas, elle aussi, présenté des branchies, qui plus tard se seraient modifiées considérablement, en s'adaptant à de nouvelles fonctions, et qu'il faudrait retrouver dans les organes affectés à ces fonctions nouvelles. Nous avons laissé entrevoir plus haut que c'était bien là ce qui semblait s'être passé, et que, suivant Dohrn, c'était naguère aux dépens de branchies que s'étaient constitués chez le Vertébré en évolution les organes des sens, la fossette olfactive en particulier. Cette manière de voir se trouve sanctionnée par les faits que Beard a décrits¹ et qui ont été retrouvés depuis par d'autres auteurs (Froriep, Kastschenko). Beard pense, s'appuyant sur des considérations anatomiques que nous laissons de côté, qu'à chaque branchie correspond chez l'embryon très jeune un organe sensoriel rudimentaire que constituent un épaississement de la paroi ectodermique et un renflement ganglionnaire d'un nerf. Seulement dans les branchies destinées chez l'embryon plus âgé à subsister comme telles sous la forme de fentes branchiales, l'organe sensoriel branchial s'atrophie et disparaît. Au contraire il prend le dessus dans les autres branchies et, se différenciant d'une certaine manière, représente l'ébauche de l'un des organes des sens de l'adulte. Suivant Beard les organes des sens branchiaux, limités actuellement à la région céphalique, y caractériseraient la métamérie branchiale.

La métamérie branchiale, telle qu'elle est réalisée ontogénétiquement, imprime donc à la métamérie de la tête un cachet qui la distingue de celle du tronc.

A part cela, nous n'aurions plus qu'à reconnaître que la tête tout entière n'est que la partie antérieure du tronc, métamérisée comme lui, quoique d'une façon beaucoup moins schématique, s'il ne nous fallait encore dans cet exposé tenir compte de certaines opinions, ayant des faits pour bases, qui viennent compliquer notre proposition.

Les recherches faites sur le développement et la constitution du crâne ont montré, il y a longtemps déjà, que la corde dorsale que l'on sait être animée comme la tige directrice du squelette axial, ne se prolonge pas dans toute l'étendue du crâne, mais s'arrête dans la région de la fosse pituitaire. On a donc pu distinguer une portion cordale et

une partie précordale du crâne, et, comme la corde était considérée comme le point de départ de toute formation vertébrale, on fut amené à penser que la portion cordale seule était composée de vertèbres, et à l'opposer sous le nom de *partie vertébrale du crâne* à la région antérieure nommée *partie prévertébrale du crâne* (Gegenbaur)¹. Cette dernière fut considérée comme secondaire et surajoutée, par suite du développement des organes olfactif et optique; elle échappe, dit Gegenbaur, à toute considération analytique. Voilà donc une distinction à faire entre la région antérieure et la région postérieure du crâne et peut-être de la tête entière. Le crâne était alors l'unique objet qui préoccupait les anatomistes curieux de résoudre la question de la signification de la tête des Vertébrés. Aujourd'hui que le champ du problème s'est agrandi, et que l'étude du crâne dans cet ordre d'idées est passée au second plan, C. Rabl a pu appliquer à tous les organes de la tête la division de Gegenbaur, et distinguer non plus seulement deux régions crâniennes, mais deux régions céphaliques². Il y a lieu, dit Rabl, de distinguer dans la tête des Vertébrés deux parties ontogénétiquement et phylogénétiquement différentes : une antérieure plus grande, non segmentée, une postérieure plus petite, segmentée. La vésicule auditive marque la limite de ces deux régions. La région antérieure, la tête antérieure, renferme quatre somites; la région postérieure, la tête postérieure, en contient cinq. Mais tandis que dans cette dernière le mode de formation des somites est calqué sur celui des somites du tronc, il se fait dans la tête antérieure d'une manière toute différente, si bien que les somites de celle-ci ne méritent pas à proprement parler leur nom et ne sont pas de véritables segments³. La tête antérieure, outre le nerf olfactif et le nerf optique, ne renferme que deux nerfs, le trijumeau et le facial. A la tête postérieure appartiennent les nerfs crâniens qui

¹ La valeur de cette distinction est toutefois mise en doute par d'autres observations qui établissent que la corde se prolonge jusqu'à l'extrémité antérieure de la tête. (HOUSSAY, loc. cit; KEIBEL, Zur Entw. der Chorda, bei Säugern [*Arch. für Anat. und Phys.*, Anat. Abth. 1889].)

² C. RABL, Theorie des Mesoderms (*Morphol. Jahrbuch*, Bd. XV, H. 2, 1889, en cours de publication.)

³ Il convient de signaler à ce propos l'intéressante remarque suivante due à Rabl. On sait que les somites sont le résultat de la segmentation du mésoderme. D'autre part chez l'Amphioxus (qui n'a pas de tête, qui est un Acraniote) les somites s'étendent jusqu'à l'extrémité antérieure du corps; le premier somite envoie seulement en avant un prolongement mésodermique non segmenté. Partant de là, Rabl compare au prolongement mésodermique du premier somite chez l'Amphioxus (qui n'a pas de tête) les somites de la tête antérieure des Vertébrés craniotes qui, nous l'avons vu, ne sont pas de vrais segments. De là à dire que la tête antérieure des Craniotes est l'homologue, et seule l'homologue, d'un rudiment céphalique de l'Amphioxus, il n'y a qu'un pas.

¹ BEARD, The system of branchial sense organs and their associated ganglia in Ichthyopsidia. (*Quart. Journ. of micr. Science*, 1883.)

naissent derrière le facial, et qui seuls se comportent comme des nerfs spinaux ¹.

La métamérie du tronc des Vertébrés ne s'étendrait pas à la tête tout entière, mais seulement à la région postérieure de celle-ci, à la tête postérieure. Il y aurait une région antérieure distincte de la précédente et du tronc, une tête antérieure, en quelque sorte surajoutée.

Déjà Dohrn s'est élevé contre la solution que C. Rabl pense pouvoir donner du problème de la tête des Vertébrés ², et il annonce un travail d'ensemble intitulé « Nouvelles bases d'une critique de la métamérie céphalique ³ ».

IV

L'ensemble des métamérisations partielles, des segmentations d'organes que nous venons d'énumérer forme la métamérie céphalique. Il s'en faut cependant que des segments appartenant à des organes différents coïncident, et puissent être rattachés exactement à un même métamère céphalique. L'état actuel de la science ne permet pas encore de présenter une formule aussi simple de la métamérisation de la tête. Au contraire il y a actuellement dans la tête plusieurs métaméries qui chevauchent les unes sur les autres, qui s'intriquent et s'embrouillent, confusion certainement appa-

rente qui tient aux remaniements multiples que le type original a subis, aux déformations nombreuses du schéma primitif, et aussi, il faut bien le dire, à l'imperfection de nos connaissances.

Quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont on veuille se la représenter, la métamérie céphalique existe : notre tête est formée, totalement ou en partie, d'anneaux, comme celle d'un Ver. Nous avons fait pressentir au début les conséquences qu'entraîne la constatation d'une semblable disposition, en essayant de montrer l'importance de cette constatation au point de vue de l'histoire phylogénétique des Vertébrés : elle fait de nous des descendants des Vers.

Oui, il faut nous résigner à l'idée d'une aussi misérable origine, et si nous étions tentés, à l'exemple de certains esprits aussi chagrins qu'orgueilleux, de nous en affliger, nous devrions aussitôt nous rappeler le mot d'Haeckel, déclarant aimer mieux être « la postérité perfectionnée d'un ancêtre simien » (nous dirions même aujourd'hui annelé) « qu'un rejeton dégénéré ». Pensée bien autrement consolante, que celle que nous pourrions avoir, en nous attribuant une haute origine, dont nous serions misérablement déçus !

Dr A. Prenant,

Chef des travaux histologiques à la Faculté de Médecine de Nancy.

LA ROTATION DE MERCURE, D'APRÈS M. SCHIAPARELLI ⁴

Mercure est une planète qui ne jouit pas d'une bonne réputation auprès des astronomes. Sa théorie laisse à désirer, et ce qu'on sait de sa constitution physique se réduit à bien peu de chose. Comme elle n'a pas de satellites, on a été longtemps réduit à une hypothèse pour évaluer sa

masse. Des géomètres, comme Lagrange et Laplace, supposèrent que les densités des planètes suivent une certaine loi, qu'elles sont réciproquement proportionnelles à leurs moyennes distances au Soleil, et, du volume de Mercure et de sa densité ainsi calculée, ils conclurent pour sa masse le nombre 1/2.025.810. Laplace ajoutait judicieusement que c'était là « une hypothèse fort précaire ». Encke, d'après les perturbations que Mercure avait fait subir à la comète à courte période (celle qui porte son nom) calcula directement sa masse et trouva un nombre inférieur à la moitié de celui de Laplace, 1/4.865.750. Tout récemment M. Backlund, reprenant les mêmes problèmes avec des données tirées de la même comète, est arrivé à 1/2.668.700. Le Verrier, dans sa théorie des planètes moyennes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, donna d'abord un nombre peu différent de celui d'Encke, pour s'arrêter à celui-ci : 1/5.310.000, adopté aujourd'hui par le Bureau des longitudes. Enfin, en soumettant les résultats antérieurs à une discussion nouvelle,

¹ Ici encore Rabl trouve un rapprochement des Vertébrés avec l'Amphioxus. Dans la région céphalique rudimentaire de cet animal existent de chaque côté deux nerfs que l'auteur homologue aux nerfs de la tête antérieure des Vertébrés, savoir au trijumeau et au facial. Tous les nerfs qui chez l'Amphioxus naissent derrière ceux-là sont des nerfs spinaux, de même que doivent être rangés parmi les nerfs spinaux les nerfs de la tête postérieure des Craniotes.

² Dohrn, Bemerkungen über den neuesten Versuch einer Lösung des Wirbelthierkopf-Problems (*Anat. Anz.*, nos 2-3, 1890.)

³ Ce travail vient de paraître in *Mitth. aus der Zool. Station zu Neapel*, 1890.

⁴ Schiaparelli. — *Sulla rotazione e Sulla costituzione fisica del pianeta Mercurio*, discorso di G. B. Schiaparelli (Reale Accademia dei Lincei Estratto dal vol V, 2° sem. Serie 4^a, Rendiconti. Adunanza solenne dell'18 dicembre, 1889; et *Sulla rotazione di Mercurio*, di G. V. Schiaparelli (Abdruck aus den *Astronomische nachrichten*, n° 2944).

un astronome anglais le professeur Harkness vient de trouver pour la masse de Mercure $1/8.504.569$. On peut voir, par ces nombres, dans quelles larges limites se meut l'évaluation de cet élément si important pour la théorie de la planète.

I

L'incertitude n'est pas moindre pour les données qui peuvent éclairer les astronomes sur la constitution physique de Mercure.

Il n'y a pas encore un siècle qu'on ne savait rien de son mouvement de rotation. L'existence et la détermination d'un tel mouvement exigent qu'on puisse observer télescopiquement des accidents plus ou moins permanents de la surface du disque, par exemple des taches brillantes ou des taches obscures. Or Mercure est d'une observation difficile ; il s'éloigne peu du Soleil, et, surtout dans nos latitudes, il s'élève à une faible hauteur au-dessus de l'horizon, même lorsqu'il atteint son maximum d'élongation occidentale ou orientale. Sa lumière, très vive, scintille fortement ; elle est d'ailleurs plongée dans des couches brumeuses et l'agitation de l'air ne permet que bien rarement d'obtenir des images nettement définies.

C'est dans les dernières années du XVIII^e siècle (1799-1801), que Schröter et Harding firent, à Lilienthal, les premières observations un peu suivies de Mercure, et ils purent en conclure un mouvement de rotation de $24^h 5^m$. Des indentations ou échancrures de la ligne de séparation de l'ombre et de la lumière, une troncature de la corne australe du croissant, une tache noire dans une bande nébuleuse du disque, par leurs apparitions et disparitions successives, servirent à ces deux astronomes à établir la réalité du mouvement de rotation et à en fixer la durée. Plus tard (1813) Bessel discuta à nouveau les observations de Schröter et de Harding, et trouva en définitive un nombre un peu plus petit, $24^h 0^m 52^s,97$ de temps moyen. Ce résultat (l'*Annuaire du Bureau des longitudes* donne $24^h,50^m$) était accepté par tous les astronomes, bien qu'il n'ait été confirmé par aucune observation postérieure. Il semblait d'autant plus probable, qu'il se rapprochait des durées de rotation des 3 autres planètes du même groupe. Vénus $23^h 51^m$, la Terre $23^h 56^m$ et Mars $24^h 37^m$.

Or voici qu'un astronome italien, qui a fait ses preuves comme observateur habile et consciencieux, le directeur de l'observatoire de Brera (Milan), M. Schiaparelli vient renverser de fond en comble tout ce qu'on croyait si bien établi par les observations de Schröter et les calculs de Bessel. D'après lui, la durée de la rotation de Mercure, au lieu d'être d'un jour moyen environ, ne serait pas

moindre de $87^h 869$, c'est-à-dire égale à la révolution sidérale de la planète. Mercure présenterait sous ce rapport une particularité qui semblait réservée jusqu'ici aux satellites, à la Lune notamment et à plusieurs des satellites de Jupiter ou de Saturne. Un tel résultat demande à être justifié par des observations décisives et exige qu'on entre dans quelques détails. C'est ce que nous allons faire en nous appuyant sur deux notes publiées par M. Schiaparelli, l'une dans les *Astronomische Nachrichten*, l'autre dans les bulletins de la *Reale Accademia dei Lincei* (déc. 1889).

Les études de l'observateur italien n'ont pas duré moins de sept années, depuis 1882 jusqu'en 1889. Mais c'est principalement en 1882 et 1883 qu'il put réunir la série la plus nombreuse et la plus suivie d'observations de la planète pendant sept révolutions synodiques successives. Il obtint ainsi 150 dessins du disque à différentes phases. Pour arriver à un tel résultat, malgré les interruptions forcées pendant les périodes des conjonctions inférieures et supérieures (trente-six jours en moyenne), M. Schiaparelli adopta un mode d'observation généralement inusité avant lui. Négligant le plus souvent les observations de pleine nuit, c'est le soir avant le coucher du Soleil, ou le matin après son lever qu'il pointait son télescope (un réfracteur de Merz de 8 pouces) sur la planète. Il évitait ainsi l'obstacle le plus ordinaire à une bonne visibilité, c'est-à-dire les agitations des couches d'air voisines de l'horizon (1). D'ailleurs, la présence des rayons solaires n'est pas à son avis un aussi grand obstacle qu'on le pourrait croire. « Sans prendre aucune disposition spéciale pour éliminer du télescope les rayons solaires, j'ai pu dit-il, dessiner plusieurs fois Mercure à quelques degrés du Soleil. Un de mes meilleurs dessins a été pris le 11 août 1882, à $20^h 27^m$ de temps moyen, Mercure n'étant distant du limbe solaire que de $3^{\circ} 2'$. Le disque de la planète se montrait alors parfaitement rond, avec une lumière à peu près uniforme, et, bien que son diamètre apparent fût réduit à $4''$ ou $5''$, la position des taches visibles put être évaluée avec une grande certitude. »

(1) « Sotto la nostra latitudine è impossibile fare osservazioni utili di Mercurio, durante la notte completa, ed anche nei crepuscoli riescono raramente, trovandosi il pianeta troppo basso per poter usare delle amplificazioni necessarie al presente scopo, le quali in nessun modo possono essere inferiori a 200. Volendo dunque ottenere una serie alquanto continuata, ho dovuto risolvermi a fare le osservazioni col Sole sull'orizzonte; le quali, quando l'aria è pura e quieta, riescono bene d'inverno a qualunque ora del giorno; in autunno e in primavera nelle mattinate. Più difficili sono dell'estate, a cagione dei molti vapori che il Sole solleva dalla nostra acquosa pianura, e più ancora in conseguenza della quasi perenne agitazione prodotta nell'atmosfera dal forte riscaldamento del suolo e degli edifici della vasta città, che circonda l'Osservatorio da ogni parte. »

II

La méthode et les procédés d'observation étant connus, voyons quels résultats obtint M. Schiaparelli et quelles conséquences il tira de leur comparaison.

Mercury observé deux jours de suite à la même heure solaire, présentait identiquement le même aspect : mêmes taches, claires ou obscures, occupant à peu près la même position sur le disque apparent. Que l'intervalle soit de deux, trois ou quatre jours solaires complets, la différence d'aspect est peu considérable, si l'on tient compte du changement de forme et de l'amplitude des phases visibles. De tous les faits relatifs à la rotation de Mercure, celui-là est le plus évident, et le plus anciennement connu. Il résulte des observations de Schröter et aussi de celles d'un astronome contemporain, M. L. de Ball, qui vit une tache le 24 juillet 1882 et, quatre jours après, la revit à la même heure et avec le même aspect. Ce fait n'admet que trois interprétations : *a*) la planète effectue sa rotation en vingt-quatre heures environ ; *b*) ou elle fait deux ou plusieurs rotations entières dans le même intervalle ; *c*) ou enfin le mouvement de rotation est assez lent pour n'être pas sensible d'un jour à l'autre. Laquelle de ces trois hypothèses doit être adoptée ?

Or, d'après M. Schiaparelli, un fait non moins évident que le premier, résultant pareillement d'observations répétées, va trancher cette question. En observant le disque de Mercure plusieurs fois dans la même journée, à des intervalles de plusieurs heures, il constata encore que ce disque conservait le même aspect. Même résultat, en observant dans deux journées consécutives, de manière que l'intervalle fût sensiblement plus grand ou plus petit que vingt-quatre heures. Un tel résultat exclut manifestement les deux premières hypothèses ; il est en contradiction complète avec la durée de rotation de Schröter, « ce que je n'oserais affirmer, dit M. Schiaparelli, si je n'avais eu maintes et maintes fois l'occasion d'en faire la preuve. La rotation de Mercure ne s'effectue pas en un jour, ni en une fraction de jour, mais elle se fait avec une grande lenteur. »

Il restait à déterminer la durée de cette rotation.

Pour y parvenir, l'astronome italien compara l'aspect présenté par le disque de Mercure et la position respective de ses taches, aux époques des diverses révolutions synodiques, correspondant à des situations identiques de la planète, de la Terre et du Soleil. Il trouva encore que l'aspect général des taches restait le même, à de faibles différences près, vers le cercle terminateur de l'ombre. « Ainsi,

par exemple, dit-il, le grand système de taches *w a b k i*, qui occupe toute la partie droite du planisphère (fig. 1) joint au présent article, avec une forme tout à fait semblable à celle du chiffre 5,




Fig. 1. — Mercure et ses taches, d'après les observations de M. Schiaparelli (1882-1887). — A, B, points de l'équateur limitant les régions de Mercure qui voient le Soleil à leur zénith dans le cours d'une révolution.

est caractéristique de l'aspect du disque dans les élongations orientales maxima, lorsque Mercure se montre presque éclairé à moitié. Pendant les deux années 1882 et 1883, j'ai pu observer avec quelque continuité six élongations orientales aux dates suivantes :

1882	4 fév.,	10 fév.	1882	3 mai, 11 mai.
	— 24 mai,	31 mai,		— 4 sept., 8 sept.
	— 19 sept.,	30 sept.		— 20 déc.

et des observations semblables ont été faites dans deux autres élongations orientales à la fin de juin 1886 et dans les premiers jours de mars 1887 ; tous ces taches furent visibles, un peu plus un peu moins immergées dans l'ombre de la planète. » M. Schiaparelli, après avoir cité d'autres faits confirmatifs des précédents, conclut en disant que leur ensemble démontre « que Mercure tourne autour du Soleil à fort peu près de la même manière que fait la Lune autour de la Terre, et Japet autour de Saturne, présentant au Soleil (non sans certaines oscillations) constamment le même hémisphère de sa surface. » D'où la conséquence que la durée de rotation de Mercure est égale à celle de sa révolution sidérale ou en nombres ronds à 88 jours moyens (87,969). Tout en admettant qu'il puisse y avoir entre les deux périodes une différence de

0,001 de leur valeur, il incline à croire que cette différence est rigoureusement nulle.

III

M. Schiaparelli n'a pu déterminer la direction précise de l'axe de rotation sur le plan de l'orbite. La difficulté des mesures exactes dans la position des taches ne lui a pas permis de résoudre ce point important du problème. On sait que, d'après Schröter, l'axe ne faisait avec le plan en question qu'un angle de 20° . La réduction des positions des taches sur les dessins obtenus à Brera laisse penser que cet axe n'est pas éloigné d'être perpendiculaire à l'orbite de Mercure. Cet angle n'est certainement ni de 23° ni de 25° comme dans le cas de la Terre et de Mars; tout au plus pourrait-il arriver au tiers, 8° à 9° . Provisoirement M. Schiaparelli admet que l'équateur de Mercure coïncide avec le plan de l'orbite. C'est en partant de cette hypothèse qu'il a construit le planisphère où il a essayé de résumer, dans ses traits essentiels, la physionomie du disque de la planète, d'après les nombreux dessins des taches observées dans le cours des sept années qu'il a consacrées à leur étude.

Sur la ligne droite qui figure l'équateur (fig. 1), deux points A et B situés de part et d'autre du centre O, dont ils sont éloignés chacun de $23^\circ 41'$, marquent les deux régions extrêmes qui voient, à chaque révolution, le Soleil à leur zénith. La planète, en effet, dans ses deux mouvements simultanés de révolution et de rotation, ne présente pas toujours le même méridien au Soleil ou au foyer de l'orbite. Cela tient, d'après M. Schiaparelli, à ce que le mouvement de rotation de Mercure est uniforme. Il en résulte, étant donnée l'excentricité notable de l'orbite, une libration en longitude de part et d'autre du rayon vecteur, dont la période est de 88 jours et dont l'amplitude totale est le double de la plus grande équation du centre, soit de $47^\circ 24'$. Cette uniformité était à prévoir; mais, pour en vérifier l'exactitude, M. Schiaparelli calcula la longitude d'une tache, assez nettement définie, (la tache marquée de la lettre *q* sur le planisphère) sur une série de 23 dessins pris à des époques où l'équation du centre était tantôt positive, tantôt négative, soit en partant de l'hypothèse que la rotation de Mercure est uniforme, soit en supposant que cette rotation suive la marche de l'anomalie vraie, ou si l'on veut que la planète, semblable à un aimant, s'oriente toujours vers le Soleil, se tenant constamment au zénith du point O, origine des longitudes. Les résultats de ce double calcul donnent pour la tache en question, dans la première hypothèse, des valeurs de la longitude suffisamment concordantes, tandis que, dans le second

cas, la moyenne des longitudes correspondant à l'équation du centre positive est totalement différente de celle répondant à l'équation du centre négative.

Le mouvement de rotation de Mercure est donc uniforme, résultat que l'on pouvait prévoir.

Telles sont, en résumé, les principales conclusions du savant astronome italien. Nous n'avons pas besoin de dire que, sur plus d'un point, elles méritent d'être confirmées. Comme il en convient lui-même, les taches du disque de Mercure sont loin d'être bien définies, et, le plus souvent, elles sont à peine perceptibles, rendant ainsi fort difficiles des mesures précises. Il va sans dire qu'il sera important de les voir confirmés par d'autres observateurs placés dans des conditions aussi favorables que celles de Brera; ils pourront d'ailleurs bénéficier de la méthode suivie par M. Schiaparelli pour étudier Mercure sans avoir à craindre les agitations des basses couches de l'atmosphère. Si, comme on doit l'espérer et comme le fait présumer la grande habileté de l'éminent astronome italien, les nouvelles observations établissent d'une façon décisive l'égalité des moyens mouvements de rotation et de révolution de Mercure, il y aura lieu d'en tirer les conséquences, à deux points de vue, l'un et l'autre fort intéressants.

Il sera, tout d'abord, curieux de chercher ce que peut être la météorologie de Mercure, dans les singulières conditions où cette planète se trouve placée par la singularité de son mouvement de rotation, combinée avec sa proximité du Soleil et la forte excentricité de son orbite. M. Schiaparelli a abordé en partie cette question dans celle de ses deux notes qu'il a adressée à la *Reale Accademia dei Lincei*. Il y insiste notamment sur ce fait que la surface de Mercure est ainsi partagée en trois parties d'inégale étendue, l'une qui a toujours le Soleil sur son horizon, l'autre qui a des jours et des nuits, la troisième qui ne voit jamais les rayons solaires. Les lecteurs de la *Revue* développeront d'ailleurs aisément eux-mêmes les conséquences de cette singulière distribution de la lumière et de la chaleur du Soleil sur la planète, conséquences qui doivent donner à la constitution physique de Mercure une physionomie si originale.

Mais il sera peut-être plus intéressant encore d'examiner si le fait de l'égalité des mouvements de rotation et de révolution peut trouver une explication plausible dans l'hypothèse cosmogonique de Laplace. Tout ce qui touche à ce grave et difficile problème des origines et de la formation du monde solaire a une importance philosophique et scientifique que l'on ne saurait méconnaître. On sait que l'existence des anneaux intérieurs de Saturne, la

faible distance et le mouvement rapide des deux satellites de Mars ont nécessité dans la théorie ébauchée par notre grand géomètre des additions et corrections sans lesquelles elle se fût trouvée en défaut (1). La nouvelle rotation de Mercure constituerait-elle un cas nouveau, incompatible avec l'hypothèse primitive ou avec l'hypothèse modifiée ?

On comprend avec quelle réserve nous nous permettons de poser la question et d'indiquer dans quel sens il nous semble qu'elle sera résolue.

Laplace a donné l'explication de l'égalité des mouvements de rotation et de révolution de la Lune. Notre satellite, en vertu de sa rotation, est légèrement aplati à ses pôles; mais l'attraction de la Terre sur la Lune encore fluide a allongé son axe dirigé suivant le rayon vecteur, d'où la tendance de cet axe, le plus grand des trois, à conserver cette direction, sauf un léger mouvement de libration, l'attraction terrestre agissant ainsi sur notre satellite de la même manière que la pesanteur agit sur un pendule pour le ramener à la verticale.

Or, ne peut-on admettre que Mercure s'est trouvé vis-à-vis du Soleil dans le cas de la Lune vis-à-vis de la Terre? D'après M. Edouard Roche, ce cas a dû se réaliser pour toutes les planètes : « Sous cette action (l'attraction du Soleil sur la planète à l'état de vapeurs), dit-il, l'atmosphère planétaire s'allonge dans le sens du rayon qui joint son centre

au Soleil. De cet allongement résulte une tendance de la nébuleuse à tourner constamment vers le Soleil les mêmes points de sa surface. Ainsi s'établit l'égalité entre les mouvements de rotation et de translation de la planète, égalité qui pour une raison analogue a lieu aujourd'hui chez la Lune, et qui a dû se rencontrer chez toutes les planètes dans la première phase de leur existence. »

Si l'on admet ces vues du savant et regretté professeur, deux raisons militent en faveur de leur application à la rotation actuelle de Mercure. En premier lieu, selon l'hypothèse cosmogonique de Laplace, Mercure est, de toutes les planètes connues la plus récemment formée. Il est donc possible qu'elle soit encore dans cette période primitive où les deux mouvements de rotation et de révolution ont conservé leur égalité. De plus, sa proximité du Soleil est telle, que l'on conçoit que l'attraction solaire prépondérante ait pu maintenir l'égalité en question même au delà de la première phase de l'existence de la planète. Ainsi se trouverait, selon nous, expliquée la rotation de Mercure telle qu'elle résulte des travaux de M. Schiaparelli. Nous hasardons cette réponse à la question posée, qui mérite évidemment une étude plus approfondie, laissant à de plus compétents et à de plus autorisés que nous la solution rigoureuse du problème.

A. Guillemin.

LA THÉORIE DES MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUES

Si l'on excepte la télégraphie et la téléphonie, le prix de l'énergie électrique intervient directement dans ses autres applications telles que l'éclairage, le transport du travail, les réactions chimiques, etc. Dans l'état actuel de la question un abaissement même modéré du prix de revient peut amener des conséquences très importantes pour ces industries. On comprend donc tout l'intérêt qui s'attache à l'étude de la production industrielle de l'énergie électrique.

Parmi les nombreux phénomènes physiques et chimiques qui sont accompagnés d'un développement d'électricité il en est peu qui aient pu être utilisés industriellement jusqu'à ce jour. Les procédés les plus importants sont les suivants :

1° Transformation de l'énergie mécanique en

énergie électrique par les machines dynamo-électriques.

2° Transformation d'une partie de l'énergie chimique des combinaisons en énergie électrique au moyen de piles hydro-électriques.

3° Transformation directe de la chaleur en énergie électrique au moyen de piles thermo-électriques.

Le premier procédé est de beaucoup le plus important et le seul que nous considérerons en détail.

Le deuxième procédé ne peut subsister en grand qu'en trouvant comme dans l'industrie du gaz un écoulement rémunérateur des sous-produits, c'est-à-dire des sels qui se forment dans les piles pendant la production du courant électrique.

Quant aux piles thermo-électriques, elles n'ont pu être amenées jusqu'à présent à un rendement suffisant pour les grandes applications. Celles-ci sont au nombre de trois :

1° L'éclairage.

2° La transmission du travail.

(1) Voy. l'Essai sur la constitution et l'origine du système solaire, par Edouard Roche, professeur à la Faculté des sciences de Montpellier, et aussi le récent ouvrage de M. Faye *Sur l'origine du monde*, théories cosmogéniques des anciens et des modernes.

3° Certaines industries chimiques.

Dans ces trois domaines l'électricité commence à lutter avantageusement avec le gaz et les machines à vapeur.

Un mètre cube de gaz brûlé dans des brûleurs ordinaires donne environ en lumière l'équivalent de huit becs carcel pendant 1 heure; le même mètre cube de gaz transformé d'abord en travail par l'intermédiaire d'un moteur à gaz, puis en énergie électrique par une dynamo peut donner jusqu'à 16 carcel en employant des lampes à incandescence et bien plus en employant des arcs électriques. L'amortissement du moteur et la surveillance rendent seuls, dans la plupart des cas, la lumière électrique plus chère.

A la base de toutes ces applications se placent les producteurs d'énergie électrique, c'est-à-dire les machines dynamo-électriques dont nous allons nous occuper spécialement.

I

Ces machines reposent sur le principe d'induction découvert par Faraday.

Lorsqu'un fil d'une longueur l se déplace dans un champ magnétique d'intensité H avec une vitesse v perpendiculairement aux lignes de force, il se trouve le siège d'une force électro-motrice, exprimée ainsi dans les unités nouvelles:

$$Hlv \cdot 10^{-8}$$

Dans toutes les bonnes machines dynamos les champs magnétiques varient entre 3000 et 7000 unités C. G. S.; il est impossible, pour des raisons mécaniques et économiques, de dépasser ce chiffre.

La vitesse v peut varier entre 500 et 6000 cm par seconde et encore cette dernière vitesse n'a été atteinte que dans les dynamos de M. Parsons accouplées à sa turbine à vapeur et faisant de 8 à 10000 tours par minute, et dans certaines machines Ferranti de grandes dimensions; dans des machines ordinaires v reste entre 1000 et 2500 tours.

Si nous admettons pour H 7000 et pour v 2500, nous trouvons que la force électro-motrice, induite par cm de longueur du conducteur est de

$$7000 \times 1 \times 2500 \cdot 10^{-8} = 0,175 \text{ volt.}$$

Or, comme dans la pratique nous nous servons couramment de tensions de 110 volts et plus, jusqu'à plusieurs milliers on voit qu'il serait matériellement impossible de produire cette force électro-motrice au moyen d'un conducteur rectiligne; il fallait trouver un moyen de multiplication.

Au lieu d'un fil rectiligne prenons une boucle

se déplaçant dans le champ magnétique. La force électro-motrice induite le long de toute la boucle en la contournant est égale à la somme algébrique des forces électro-motrices induites le long de ses éléments, ce qui revient à dire que cette force électro-motrice est égale au taux de variation des lignes de force dans la boucle: s'il en restait en effet autant qu'il en rentre, la somme algébrique des forces électro-motrices induites le long des éléments de la boucle serait 0.

Si le fil fait plusieurs spires sur lui-même et forme une bobine et non plus une boucle, les forces électro-motrices s'ajouteront tout simplement et en multipliant le nombre de spires on peut arriver au voltage que l'on voudra; la limite n'est imposée que par l'isolement.

La force électro-motrice ainsi produite sera, comme on le sait, alternativement positive et négative, la variation du flux étant périodique.

En groupant autour d'un axe mobile des bobines semblables, et en reliant entre elles celles qui sont semblablement placées par rapport aux champs magnétiques fixes, nous avons constitué une machine à courants alternatifs.

En inversant, au moyen du commutateur, les contacts du circuit induit avec le circuit extérieur au moment du changement de sens du courant induit, on peut obtenir un courant toujours de même sens dans le circuit extérieur. Mais ce courant restera fortement ondulé.

Supposons maintenant que les bobines de l'induit soient subdivisées en sections (d'un petit nombre de tours) déplacées les unes par rapport aux autres d'une façon continue tout en restant reliées entre elles de la même manière, c'est-à-dire en série les unes sur les autres, avec des contacts frottants ou balais prenant le courant juste à l'endroit où la force électro-motrice induite change de sens, de cette manière l'inversion des jonctions ne se produit que pour un petit nombre de spires à la fois et le courant ne descend jamais jusqu'à 0 dans le circuit extérieur: il ondule simplement un peu autour d'une valeur moyenne et peut pratiquement être considéré comme constant (fig. 1).

Nous sommes amenés ainsi aux véritables machines à courants continus telles qu'elles sont employées maintenant. Pacinotti le premier réalisa cette disposition à Bologne en 1864, mais il fallut que Gramme la réinventât en 1869 pour qu'elle prit la place que l'on sait dans le domaine de la pratique.

Les progrès, après avoir été très lents jusqu'en 1880 à peu près, se sont précipités à la suite d'études entreprises surtout en Angleterre. Les travaux de Hopkinson et de Kapp méritent d'être mentionnés tout particulièrement.

Les principales qualités que l'on cherche à obtenir au point de vue du fonctionnement sont : un facile entretien; peu d'usure; un bon rendement; et dans beaucoup de cas la légèreté.




Fig. 1.

Au point de vue de l'usure la partie la plus délicate est formée par le collecteur et les balais.

Toute bonne machine doit marcher sans étincelles; sans cela le collecteur et les balais seraient rapidement usés; une machine, quelles que soient ses autres qualités, ne sera pas pratique tant que cette condition ne sera pas remplie.

Le rendement des bonnes machines est très élevé; il varie entre 85 et 92 0/0, c'est-à-dire que 85 à 92 0/0 de l'énergie mécanique fournie à la poulie de la machine sont disponibles sous forme d'énergie électrique aux bornes.

Il n'existe probablement pas de transformateur d'énergie aussi parfait.

Les 8 à 15 0/0 de l'énergie totale qui sont perdus sont transformés en chaleur à l'intérieur de la machine, et c'est cette chaleur qui limite par l'échauffement qu'elle produit la puissance d'une machine donnée. Pour la conservation de l'isolant on ne peut admettre en effet une température dépassant 70° à 80°. Cet échauffement est directement proportionnel à la quantité de chaleur produite et inversement à la surface refroidissante.

La pratique a montré qu'il faut ménager une surface refroidissante de 8 à 10 centimètres carrés par watt transformé en chaleur dans les inducteurs qui sont immobiles; tandis que trois à quatre centimètres carrés suffisent pour l'induit qui, étant en mouvement, se ventile mieux.

De là on peut tirer cette conclusion curieuse, c'est que de deux machines de même puissance chauffant à la même température par une marche prolongée, c'est la plus petite qui aura le meilleur rendement puisque sa surface refroidissante étant plus petite il faut que la quantité de travail transformée en chaleur chez elle soit aussi plus faible que dans la machine plus grande; cette manière de comparer le rendement des machines a cet avan-

tage qu'elle comprend toutes les pertes d'énergie provenant du passage du courant dans le fil, des courants parasites, de l'aimantation et désaimantation successive du fer, des frottements, etc.

Une amélioration de rendement amène par conséquent la diminution des dimensions de la machine pour une puissance donnée.

Les pertes dans une machine proviennent des différentes causes suivantes :

1° Passage du courant dans le fil : cette perte est indépendante de la vitesse et est proportionnelle au volume du cuivre en centimètres multiplié par le carré de la densité du courant (nombre d'ampères par unité de section de fil.)

2° Des courants parasites qui se développent soit dans le fer, soit dans le fil même; cette perte est proportionnelle au carré de la vitesse; dans les bonnes machines elle est réduite à peu de chose par une subdivision rationnelle du fer et des fils, mais elle ne peut être évitée complètement. C'est dans ce but que l'on construit les induits soit en fils de fer isolés, soit en feuilles de tôle isolées entre elles par du papier ou autrement.

3° De l'hystérésis (1) du fer, c'est-à-dire du travail qu'il faut dépenser pour aimanter et désaimanter continuellement le fer; ce travail est proportionnel au volume du fer et au nombre des changements d'aimantation; il est donc proportionnel au nombre de tours de la machine (il croît même un peu plus vite, mais suivant une loi peu connue).

Cette perte par hystérésis dépend aussi de la qualité du fer employé et ce n'est pas un des moindres embarras du constructeur que de trouver le fer qu'il lui faut sans être obligé de recourir au fer de Suède qui est très coûteux.

4° Des frottements divers, balais contre le collecteur arbre dans ses paliers, l'induit dans l'air, etc.

De ces pertes les plus importantes surtout pour les grosses machines sont celles qui proviennent de l'hystérésis et du passage du courant dans le fil, puisqu'on ne peut les supprimer par la construction aussi soignée et aussi bonne qu'elle soit, elles sont du même ordre de grandeur, dans beaucoup de cas à peu près égales et forment ensemble à peu près les 80 0/0 de la perte totale.

II

Considérons maintenant la manière dont l'énergie mécanique se transforme en énergie électrique dans une machine dynamo-électrique.

Appelons H l'intensité du champ magnétique, δ la densité du courant, V le volume utile de cuivre (c'est-à-dire le volume de cuivre se trouvant à un

(1) Professeur Ewing, Philosophical Transactions.

moment donné dans les champs); v la vitesse avec laquelle les fils se déplacent dans les champs; l'énergie électrique EI développée dans l'induit sera :

$$P = II. V. \delta. v.$$

proportionnelle au produit de tous ses facteurs. Chacun de ces facteurs a été de la part des inventeurs l'objet de longues et patientes recherches; recherches d'autant plus compliquées que les variations de ces facteurs n'étaient pas arbitraires mais devaient être faites de manière à ne pas nuire au bon fonctionnement de la machine.

Le regretté Cabanellas a été un des premiers à appeler l'attention des physiiciens sur l'importance du champ magnétique H et préconisa l'emploi des champs magnétiques puissants.

Dans la pratique actuelle les champs les plus employés varient, comme nous l'avons déjà vu plus haut, entre 3000 et 7000. Dans quelques machines nous avons réussi à obtenir pratiquement des champs de 7500 et 8000, mais dans ces cas il devient difficile de disposer dans l'induit suffisamment de fer pour laisser passer le flux magnétique, tout en réservant la place pour l'arbre.

Il y a quatre ou cinq ans, les notions des constructeurs étaient fort peu claires; on allait presque au hasard. La notion du flux magnétique ou des lignes de force a élucidé bien des points obscurs et a permis de comprendre plus clairement et d'une façon plus facile, plus élémentaire les phénomènes de l'aimantation. Cette notion qui provient encore de Faraday, comme la plupart de nos conceptions des phénomènes électriques et électro-magnétiques, a été développée depuis par Rowland et d'autres et appliquée aux machines d'une façon magistrale par Hopkinson et Kapp.

Cette notion consiste à assimiler l'aimantation à un flux (*flux magnétique*) ou courant analogue au courant électrique, l'espace dans lequel il se produit étant formé de matériaux de conductibilité différente. La force qui produit ce flux (analogue à la force électro-motrice qui produit le courant) étant la force magnéto-motrice ou inductrice produite par les bobines enroulées autour des électro-aimants, cette force est proportionnelle au nombre d'ampère-tours de ces bobines.

Le flux produit par cette force magnéto-motrice est inversement proportionnel à la résistance magnétique du circuit magnétique (analogue à la résistance électrique d'un circuit électrique). Le champ H étant directement proportionnel au flux, la puissance de la machine, toutes choses égales d'ailleurs, sera aussi proportionnelle au flux; il s'agit donc de produire le plus grand flux possible avec une quantité donnée de matière; c'est là un

des principaux problèmes de la construction des machines dynamo-électriques.

Ce flux, comme nous venons de le voir, dépend de la force magnéto-motrice des bobines excitatrices et de la résistance magnétique du circuit. La force magnéto-motrice est simplement proportionnelle au nombre d'ampère-tours d'excitation, nous pouvons la modifier à volonté. Mais la résistance magnétique de la machine demande une étude plus sérieuse. Ce flux sortant des bobines excitatrices arrive à une des pièces polaires, traverse l'entrefer, passe par le fer de l'induit, traverse l'autre entrefer et rentre par la pièce polaire opposée dans la bobine excitatrice.

Au début, la résistance magnétique du fer est plus de mille fois plus faible que celle de l'air mais elle augmente avec l'intensité d'aimantation et finit par atteindre celle de l'air pour une aimantation *infiniment* grande.

Dans toute machine bien construite, les dimensions du fer doivent être choisies de manière à ce que la résistance totale opposée par le fer au flux magnétique soit beaucoup plus faible que la résistance de l'entrefer; en d'autres termes il faut que le fer présente partout une section suffisante au passage du flux sans étranglement. Dans le calcul il faut encore tenir compte de ce fait que toutes les lignes de force ne sont pas utiles; elles ne passent pas toutes à travers l'induit, une partie passe en dehors de celui-ci à travers l'air; il faut compter, suivant les formes des électro-aimants, que 15 à 50 0/0 des lignes de force sont ainsi perdues, et il faut augmenter en conséquence la section des électro-aimants. La figure 2 montre la disposition magnétique d'une machine bipolaire; les lignes pointillées figurent les lignes de force ou flux magnétique.




Fig. 2.




Fig. 3.

Dans la pratique on admet un flux de 8 à 15.000 unités C.G.S., par centimètre carré pour les électro-aimants et de 16 à 22.000 pour l'induit. On se résigne à augmenter la densité des lignes de

force dans l'induit parce qu'il est très difficile d'augmenter la quantité de fer tout en laissant suffisamment de place pour les fils et pour l'arbre. Au lieu de faire un seul circuit magnétique ainsi que nous l'avons supposé, on peut pour éviter de trop grosses pièces, faire aboutir plusieurs circuits magnétiques aux pièces polaires (fig. 3); il faut dans ce cas exciter chacun de ces circuits par le même nombre d'ampère-tours que le circuit unique; on voit de suite que cette disposition est défavorable et qu'il faut dépenser beaucoup plus de fils pour obtenir le même flux. Dans certains cas cependant on a été conduit à adopter deux circuits magnétiques pour des raisons de symétrie et de construction (machines à pôles conséquents) (fig. 4);




Fig. 4.

la diminution du volume du fer compense en partie dans ces machines l'augmentation du cuivre.

Dans un autre cas encore, dans les machines multipolaires (fig. 5), on a préféré plusieurs circuits




Fig. 5.

magnétiques à un seul, mais cela tient uniquement à ce que la disposition multipolaire permet pour un même nombre de tours et pour une même puissance d'atteindre des vitesses périphériques beaucoup plus considérables et d'obtenir une surface refroidissante plus grande que la disposition bipolaire, l'augmentation du poids du cuivre sur les électro-aimants se trouvant largement compensée par ces deux avantages.

Le volume utile V du cuivre dépend évidemment de la puissance de la machine; il est déterminé pour chaque système par la pratique.

La densité δ du courant est limitée par l'échauffement; elle varie de 2 à 6 ampères par millimètre

carré. La vitesse v est limitée par des considérations mécaniques, elle varie entre 6 et 25 mètres par seconde; dans quelques cas très rares, dont nous avons parlé plus haut, elle a atteint 60 mètres.

III

Une des questions qui s'est posée dès le début a été de savoir s'il valait mieux construire de grandes ou de petites machines. Il ne s'agit pas ici de commodité; car il est évident que si l'on a besoin de 1,000 chevaux, par exemple, il sera toujours plus commode pour la surveillance de les produire par une, deux ou trois grandes machines que par une centaine de petites; mais il s'agissait de savoir si, au point de vue du prix de revient, les grandes machines coûtaient plus ou moins par cheval disponible aux bornes. Les premiers travaux semblaient conclure complètement en faveur des grandes machines, mais bientôt on envisagea plus sainement les choses. Une étude plus exacte montra que si cet avantage existe, il n'est pas très considérable.

Pour nous en rendre compte, comparons, suivant la manière introduite par Deprez, une machine donnée avec une autre n fois plus grande dans toutes ses dimensions; elle pèsera n^3 fois plus. Le champ H restera le même. La vitesse v restera à peu près la même; du moins la plupart des constructeurs arrivent à ce résultat. On peut démontrer en effet que des machines semblables mais de grandeurs différentes donnent leur puissance maximum pour une même vitesse périphérique, en admettant le même échauffement après une marche prolongée.

Le volume V du cuivre sera n^3 fois plus grand. La densité du courant δ devra diminuer dans le rapport de 1 à $\sqrt{n}$ parce que la surface refroidissante n'a augmenté que dans le rapport 1 à n^2 tandis que le volume V de fil a augmenté dans le rapport de 1 à n^3 . De sorte qu'en définitive la puissance de la machine sera de

$$P = H n^3 V \delta n^{\frac{1}{2}} v = H V \delta v n^{\frac{5}{2}}.$$

La puissance augmente un peu plus lentement que le poids. La diminution de la main-d'œuvre fait un peu compensation, de sorte qu'entre de grandes limites le prix de revient des grosses machines est à peu près le même que celui des petites.

Ce raisonnement n'est du reste juste qu'à partir de certaines dimensions: au-dessous de 5 chevaux par exemple, la main-d'œuvre intervenant pour une plus grande part que la matière, le prix de revient par cheval se trouve sensiblement augmenté.

De même on n'est pas obligé de construire d'une façon semblable les grandes et les petites machines : c'est ainsi que l'emploi d'inducteurs multipolaires et d'anneaux de grand diamètre, permet d'augmenter, dans d'assez grandes proportions, la surface refroidissante et la vitesse périphérique, et il n'est guère douteux que les grandes machines bipolaires disparaîtront peu à peu pour faire place aux systèmes multipolaires, sur lesquels ils n'ont que l'avantage d'une simplicité plus apparente que réelle.

Le rendement s'améliore sensiblement avec l'augmentation de la puissance ; on peut s'en apercevoir sans entrer dans les calculs par ce fait que la surface refroidissante augmente toujours moins vite que le poids et la puissance des machines, tandis que l'échauffement final des grandes comme des petites machines ne doit pas dépasser une température qui est la même dans les deux cas.

III

Ces considérations terminées, jetons un rapide coup d'œil sur différents systèmes. Les machines dynamo-électriques doivent, pour être pratiques, remplir souvent des conditions très différentes ; elles doivent être construites d'une façon spéciale dans chaque cas.

Considérons d'abord l'éclairage ; il y a différentes manières de se servir de machines électriques pour produire et distribuer la lumière. La manière la plus répandue est de mettre toutes les lampes en dérivation sur deux conducteurs principaux communiquant avec les bornes de la machine. Dans ce système toutes les lampes doivent être du même voltage, la quantité de lumière qu'elles donnent dépend alors du courant qui les traverse, c'est-à-dire de leur résistance. Les machines pour ce cas doivent être construites de manière à fournir l'électricité à potentiel ou voltage constant ; elles atteignent ce but soit par un double enroulement des électro-aimants, soit par un régulateur placé dans l'excitateur, c'est-à-dire agissant sur le courant qui excite les électro-aimants.

La grande majorité des machines sont construites de cette manière. Ce système de distribution présente, comme on le sait, l'inconvénient de ne pouvoir desservir qu'un périmètre relativement restreint autour de l'usine.

Pour pouvoir aller plus loin, il faut avoir recours à d'autres procédés. Le système à courant constant a eu et a encore une grande vogue aux États-Unis. Dans ce système les machines fournissent un courant maintenu automatiquement constant au moyen

de régulateurs spéciaux, tandis que la force électro-motrice aux bornes de la machine varie avec le nombre de lampes employées.

Les systèmes Thomson-Houston, Brush, Heisler, Waterhouse appartiennent à ce genre ; les lampes employées prennent de 5 à 20 ampères et l'on va avec le potentiel jusqu'à 3000 volts.

Les machines employées dans ces systèmes sont loin d'avoir atteint la perfection des précédentes comme transformateurs d'énergie ; leur rendement est plus mauvais et il est difficile jusqu'à présent d'arriver à supprimer les étincelles violentes qui se produisent aux balais ; de plus comme le courant qu'elles fournissent ne dépasse pas 20 ampères, tandis qu'il serait dangereux d'aller avec la force électromotrice au delà de 3000 volts, leur puissance maxima est limitée, de sorte qu'elles ne se prêtent pas très bien à un usage général.

Le courant alternatif fournit un autre moyen d'atteindre les lampes placées à une grande distance de la station, par l'emploi de transformateurs. On envoie le courant alternatif à haut potentiel, et au lieu d'arriver, on le transforme en courant à 50 ou 100 volts. L'unique mais énorme avantage du courant alternatif réside dans le fait qu'il existe des transformateurs pour courants alternatifs commodes, à bon rendement, sans aucune partie mobile et ne nécessitant aucune surveillance, tandis que les transformateurs pour courants continus possèdent des parties mobiles et demandent à être surveillés. Le désavantage des courants alternatifs est que, jusqu'à présent du moins, ils ne se prêtent pas bien à la distribution de la force motrice et ne permettent pas l'emploi d'accumulateurs.

Quoi qu'il en soit, les plus grandes machines dynamos construites jusqu'à ce jour sont à courants alternatifs. Ferranti à Londres construit pour sa station de Deptford des machines devant fournir aux bornes jusqu'à 10000 chevaux de puissance électrique ; c'est très au delà de ce qui a été fait ou même projeté en machines à courants continus.

L'induit de ces machines atteint 16 mètres de diamètre ; la vitesse périphérique 50 mètres à la seconde.

Elles sont destinées à marcher avec la tension énorme de 10000 volts ; des précautions spéciales ont été prises pour éviter les décharges disruptives à travers l'air ; les pièces polaires des électros et toutes les parties métalliques à proximité de l'induit sont entourés d'ébonite, et, la machine une fois mise en marche, une fermeture automatique en empêche l'accès.

Cam. Rechniewski.

Ingenieur à la Compagnie
d'Eclairage électrique.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Boussinesq (J.), *Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté des Sciences. — Cours d'Analyse infinitésimale à l'usage des personnes qui étudient cette science en vue de ses applications mécaniques et physiques. — Deux volumes grand in-8, avec figures dans le texte. Gauthier-Villars et fils, Paris, 1890.*

L'ouvrage de M. Boussinesq, dont la librairie Gauthier-Villars et fils vient de publier le second et dernier volume, n'est pas entièrement nouveau; il reproduit d'une façon exacte comme cadre et comme esprit, mais avec un développement beaucoup plus considérable, un volume autographié paru il y quatre ans et dans lequel l'auteur avait réuni des leçons faites par lui à l'Institut industriel de Lille. Le but est resté le même : mettre le calcul différentiel et le calcul intégral à la portée de ceux qui veulent les appliquer sans avoir une connaissance approfondie des mathématiques spéciales ni une grande habitude du calcul ; en un mot, faire un ouvrage pratique, s'adressant aux expérimentateurs, leur permettant de comprendre et d'appliquer les principales théories relatives aux infiniment petits ou aux fonctions continues, leur exposant avec clarté et d'une façon simple, non pas toute l'analyse infinitésimale, mais la partie de cette science qui correspond aux applications.

Le problème à résoudre n'était pas facile; mais nul peut-être n'était plus qualifié que M. Boussinesq pour l'aborder : pendant toute sa carrière il a été professeur et tous ses travaux sont des applications du calcul à de grands problèmes de mécanique appliquée; il avait donc tous les éléments pour mener à bien l'œuvre entreprise.

Y a-t-il réussi? Nous l'espérons. En tout cas, la disposition matérielle adoptée par lui est avantageuse. Chaque volume est formé de deux fascicules; l'un, dit partie élémentaire, contient les théories simples, d'une utilité générale, dont peuvent se contenter les lecteurs qui ne veulent pas aborder ensuite la Mécanique moléculaire ou la Physique mathématique. L'autre, intitulé complément, renferme les parties plus difficiles, plus spéciales; elle est ainsi entièrement distincte de la première et elle peut cependant, grâce au système de numérotage des paragraphes, être lue simultanément.

L'ouvrage est très personnel; il ne ressemble à aucun de ceux qui l'ont précédé; il porte d'un bout à l'autre, dans la marche suivie, dans les procédés de démonstration, dans les exemples choisis, la marque du savant auteur; il contient d'ailleurs un assez grand nombre de parties originales qui se rapportent directement aux recherches de M. Boussinesq et lui appartiennent en propre.

Ces deux volumes nous paraissent susceptibles de rendre service aux personnes qui étudient l'Analyse en vue de ses applications mécaniques ou physiques; ils répondent bien à leur titre.

L. O.

Thurston (R. H.). — The problem of air navigation, The Forum, New-York, 1890.

Les animaux qui se meuvent dans un fluide, — poissons, oiseaux grands et petits, insectes ailés, etc., — obéissent tous à des lois générales de locomotion. Quelles sont ces lois? Peut-on déterminer les principes qui régissent l'accumulation et la transformation de l'énergie dans le corps de ces navigateurs aquatiques

ou aériens? Tel est le sujet que traite l'éminent ingénieur M. Thurston dans un récent article du *Forum*, dont voici le résumé :

Sur terre et sur mer l'homme est parvenu à se transporter plus vite que les plus rapides des quadrupèdes ou des poissons. Mais dans les airs, le corbeau à une vitesse égale à celle de nos trains (une cinquantaine de kilomètres à l'heure), tandis que le pigeon se transporte à raison de 100 à 125 kilomètres; l'hirondelle, 150, le vautour 160. L'homme, il est vrai, n'en est encore qu'au début de ses tentatives; la première des questions n'est pas même résolue : l'avenir est-il aux ailes ou aux ballons? L'histoire des ailes est une série d'accidents, de membres et de cous cassés. En cent ans, au contraire, depuis les Montgolfier, les Charles et les Robert, jusqu'aux frères Tissandier, à MM. Renard et Krebs, les ballons ont fait de grands et sérieux progrès; avant le commencement du siècle, l'art de la guerre les avait utilisés; en 1852, Giffard avait indiqué le moyen de les diriger en leur appliquant la vapeur, et leur donnant la forme d'ellipsoïdes allongés, disons de cigares. Conservant et perfectionnant cette forme, MM. Gaston et Albert Tissandier, MM. Renard et Krebs, ont adopté l'accumulateur électrique qui ne présente pas de danger d'incendie et ne renferme pas une cause permanente de diminution du poids du ballon. L'an dernier ces hardis aéronautes français ont atteint à une vitesse de 24 kilomètres à l'heure avec un moteur de 5 chevaux. Leurs essais, fort intéressants, ont fourni de précieuses données au problème de la navigation aérienne.

Les grandes vitesses ne sont possibles qu'avec des résistances fort réduites, un poids mort très léger, une machine motrice concentrant une grande puissance sous le moindre volume et le moindre poids. La force nécessaire dans ces cas peut être, d'après le vol des oiseaux, estimée à 30 chevaux par tonne, avec une vitesse de 80 kilomètres à l'heure. On construit aujourd'hui, notamment pour les torpilleurs, des machines qui pèsent moins de 25 kilos par cheval, et tout porte à croire que l'on ira plus loin dans cette voie.

Quant à l'aviation, quelques faits aussi ont été acquis; il convient de citer ceux qui concernent les ailes des oiseaux, notamment celui-ci, érigé en principe : plus est grand le poids à porter, moindre est la surface d'aile par unité de poids et moindre est le nombre de vibrations nécessaires dans l'unité de temps. Le poids du vautour est cent fois celui de l'hirondelle; la surface de ses ailes est seulement de quinze fois plus grande que celle des ailes de ce petit oiseau. L'aigle, en décrivant ses immenses spirales à mesure qu'il s'élève dans les airs, remue à peine les ailes une fois toutes les cinq minutes; tel insecte au contraire donne aux siennes jusqu'à 200 vibrations par seconde. A un homme de poids ordinaire, des ailes de 14 mètres carrés suffiraient. Mais la force musculaire nécessaire pour opérer le transport augmente comme le poids à transporter, et, sous ce rapport, l'homme a été mal partagé par la nature; il faudrait des siècles d'éducation bien dirigée pour corriger ses défauts physiques : les muscles de ses bras ne pèsent que le septième de l'ensemble; ceux des ailes de l'aigle pèsent autant que tous les autres muscles réunis. Quant à la force motrice qu'il peut déployer, un mystère plane encore sur la question. D'après Hirn et Ruhlman le rendement de l'homme considéré comme moteur thermique s'élèverait à 0,29, ce qui est bien supérieur à toutes les machines faites de main d'homme. C'est pourtant un exemple de combustion sans grande élévation de tem-

pérature, et cela renverse toutes les idées reçues en thermodynamique. Y aurait-il là un mode encore inconnu de transformation de l'énergie en travail ou bien, la combinaison chimique des aliments avec l'oxygène, donnerait-elle naissance à de l'électricité plutôt qu'à de la chaleur?

Selon la remarque de M. Thurston, le problème de la navigation aérienne et celui de l'aviation se présentent actuellement d'une manière simple. On peut calculer le travail mécanique requis pour transporter dans l'air, à une vitesse donnée, un corps d'un poids donné et d'une forme convenable. Mais, il reste à se procurer économiquement ce travail, avec aussi peu de poids et de volume que la nature l'obtient chez les volatiles. Cela est-il possible? Il serait aussi imprudent de le nier que de l'affirmer. Ce qui semble certain, c'est que la solution ne doit pas être attendue du hasard favorisant l'ignorance, comme pour certaines inventions anciennes. Le progrès, aujourd'hui, se fait par les connaissances fondamentales de l'homme de science, unies au talent de constructivité et à l'expérience qui caractérisent l'ingénieur, vraiment digne de ce nom.

V. DWELSHAUVERS-DERY.

Ronna (A). *Ingénieur civil, membre du Comité supérieur de l'Agriculture.* — **Les irrigations**, 2 vol. in-8° de 730 et 618 pages, avec 532 figures dans le texte, Firmin-Didot et Cie, éditeurs, Paris, 1890.

La bibliothèque de l'Enseignement agricole publiée sous la direction de M. A. Muntz, professeur à l'Institut national agronomique, constituera une publication fort importante; elle a déjà donné cinq ouvrages : *Prairies et Herbages* par M. Boitel, *les Plantes vénéneuses* par M. Cornévin, *les Engrais* par MM. Muntz et Ch. Girard, *les Méthodes de reproduction* par M. Baron, *le Cheval* par M. Lavalard, qui tous sont d'un haut intérêt.

Les deux volumes publiés récemment sur les Irrigations sont dignes des précédents; ils sont bien ordonnés et exposent d'une façon claire un sujet très vaste, capital pour notre agriculture fort en retard de ce côté. Le tome I est relatif aux eaux d'irrigation et aux machines, le tome II, aux canaux et aux systèmes d'irrigation; un dernier volume traitera des cultures arrosées et de l'économie des irrigations.

M. Ronna s'est proposé, comme il le dit dans sa Préface, de faire œuvre didactique et d'éviter le double écueil du manuel et de l'encyclopédie. Il y a réussi. Son livre est complet, sans être encombré de détails. Au point de vue théorique il a impitoyablement écarté les théories abstraites, les calculs de résistance, les formules d'hydraulique que donnent tous les aide-mémoire; au point de vue pratique il a su, dans la multiplicité des procédés régionaux, distinguer ceux qui méritent d'être enseignés et laisser de côté les autres. Ainsi a été constitué un ouvrage, fort différent de ceux qui, jusqu'ici, ont été publiés sur le même sujet, s'adressant bien à l'« ingénieur agricole », et qui réalise cette double condition bien rare d'être à la fois essentiellement pratique et d'un ordre scientifique élevé.

C. NAUD.

2° Sciences physiques.

Bouty (E.). — **Sur les condensateurs en mica.** *Comptes rendus*, t. CX, p. 846, 21 avril 1890, et *Journal de physique*, 2^e série, t. IX, p. 288, juin 1890.

Sur le résidu des condensateurs. *Comptes rendus*, t. CX, p. 1362, 30 juin 1890.

Malgré les nombreux travaux effectués jusqu'ici, les propriétés des diélectriques sont encore fort mal connues, aussi les condensateurs constituent-ils des appareils d'une précision incertaine. M. Bouty vient d'aborder l'étude méthodique de ces instruments; il a obtenu des résultats importants appelés à modifier entière-

ment nos idées sur certains points du mécanisme des diélectriques.

On explique ordinairement les phénomènes que présente la charge des condensateurs en admettant que les électricités portées par les armatures pénètrent peu à peu dans la lame diélectrique : la conductibilité de celle-ci ne serait d'après cela jamais complètement nulle. Lorsqu'un condensateur est en communication permanente avec les deux pôles d'une pile, les deux électricités devraient, au bout d'un temps plus ou moins long, finir par se rejoindre pour donner naissance à un courant continu : c'est ainsi que s'expliquerait l'établissement du régime permanent caractérisé par le passage d'un courant uniforme de très faible intensité à travers le condensateur. Celui-ci ne se comporterait pas autrement qu'un conducteur métallique d'une très grande résistance.

L'auteur a montré qu'il n'en est certainement pas ainsi. Il a étudié successivement les deux phases du phénomène : 1° le régime permanent; 2° la période variable qui précède l'établissement de ce régime. Ses expériences ont porté sur un condensateur Carpentier en mica (microfarad).

1. — Il a constaté que le courant résiduel constant, atteint au bout de deux heures, reste identiquement le même lorsqu'on fait varier la capacité jusqu'à la réduire au dixième de sa valeur initiale. Si ce courant ne dépend pas de la capacité, c'est-à-dire de la surface du condensateur, ou encore de la section du conducteur équivalent, il ne peut certainement pas être attribué au passage de l'électricité à travers le diélectrique. Une lame mince de mica oppose donc un obstacle absolu au passage de l'électricité à travers son épaisseur. L'auteur montre qu'on doit rejeter de même l'hypothèse d'une conductibilité électrolytique. Il faut écarter toute idée de pénétration ou d'électrolyse, et considérer le mica comme dénué de toute conductibilité mesurable. Le courant résiduel observé provient uniquement de l'imperfection dans l'isolement des différentes parties du circuit et du microfarad lui-même.

Quant à l'absorption progressive d'électricité pendant la période variable, elle peut s'expliquer très naturellement par un retard à la polarisation du diélectrique. On observe des retards analogues dans divers phénomènes physiques, par exemple : le retard à l'aimantation, le retard à l'élasticité. Un fil métallique, soumis à une torsion permanente n'atteint pas immédiatement son équilibre définitif, la torsion croît peu à peu et pendant un temps très long; de même, le fil abandonné à lui-même ne revient pas immédiatement à son équilibre primitif, il conserve une faible torsion résiduelle qui ne disparaît que très lentement. Il semble donc naturel d'émettre l'hypothèse d'une polarisation progressive, d'un accroissement graduel de la constante diélectrique, et par suite aussi d'une polarisation résiduelle dans la décharge.

II. — Pour suivre la marche de l'absorption pendant la période variable et en dégager les lois, M. Bouty a eu recours à deux méthodes : l'une d'elles utilise la période de charge, l'autre la période de décharge. La concordance des résultats fournis par ces deux méthodes est une nouvelle confirmation de ce fait, que l'électricité absorbée après la charge instantanée contribue tout entière à la formation du résidu, et que par suite le diélectrique ne livre passage à aucun courant.

M. Bouty a pu représenter par une formule simple, la charge absorbée à chaque instant, ainsi que l'absorption ou le résidu total. De plus, il a mis en lumière des résultats d'une importance pratique considérable : il a observé que les charges résiduelles au sein d'un même condensateur ne sont pas proportionnelles aux capacités nominales; que le résidu total, rigoureusement égal à la somme des résidus des subdivisions du condensateur, n'est jamais qu'une fraction assez petite de la charge; qu'enfin la charge principale du microfarad est entièrement formée en moins de $\frac{1}{1000}$ de seconde.

M. Bouty a opéré sur des durées qui ont varié entre

$\frac{1}{1000}$ de seconde et 4,000 secondes. Les mesures relatives aux petites durées constituent un problème délicat. M. Bouty l'a résolu avec une grande précision; pour effectuer les interruptions et commutations nécessaires, il a eu recours à un pendule de torsion qui les réalisait d'une manière automatique à l'aide de contacts à mercure. Le dispositif est fort ingénieux, mais sa description nous entraînerait trop loin.

En résumé, la charge principale du condensateur se trouve nettement séparée du résidu, et la formation progressive du résidu peut elle-même être suivie avec précision. Dès lors, le condensateur à mica, soumis à une étude méthodique, est appelé à devenir un appareil aussi précis que l'est devenu le thermomètre à mercure depuis les travaux du Bureau international des poids et mesures.

Edgard HARBIÉ.

Matthey (Edward). — *La liquation des alliages d'or et de platine*. *Proceedings of the Royal Society, London*, 1890.

C'est un fait bien connu que lorsqu'on refroidit certains alliages, les composants se séparent et que la masse solidifiée présente une composition différente en son centre et dans ses parties extérieures. Dans le cas de l'or, cependant, ce phénomène de liquation n'a pas été observé. Les alliages d'or, en circulation dans le commerce, sont estimés d'après un essai effectué sur une portion extérieure du lingot. On conçoit donc que la liquation aurait dans ce cas une importance considérable, une faible erreur sur la proportion de métal étranger pouvant modifier considérablement la valeur d'un lingot. Peligot avait étudié dans ce sens les alliages d'or et de cuivre et avait conclu à l'absence de la liquation. M. Roberts-Austen est arrivé à la même conclusion, après des expériences sur les alliages d'or et d'argent.

M. Matthey a recherché s'il en était de même pour le platine qui se trouve souvent en proportion notable dans les barres d'or et d'argent. Dans les alliages commerciaux on élimine l'argent par l'affinage. On sait que cette opération s'effectue en ajoutant à l'or que l'on veut purifier trois fois son poids d'argent et en traitant le produit obtenu soit par l'acide azotique, soit par l'acide sulfurique. Dans le traitement par l'acide azotique, le platine se dissout en même temps que l'argent. Mais le prix moins élevé de l'acide sulfurique le fait employer de préférence dans l'industrie, le platine reste alors mélangé à l'or et c'est ce mélange qu'on soumet à la fusion et qu'on essaye. M. Matthey a coulé un certain nombre d'alliages obtenus de cette manière dans un moule sphérique, a scié en deux la sphère de métal ainsi obtenue et opéré des essais sur des portions prises en différents points, notamment au centre et à la surface. Les expériences ont montré une liquation très nette, une diminution de la proportion de platine à la surface extérieure assez considérable pour qu'il soit nécessaire d'en tenir compte dans l'industrie. Il cite entre autres les chiffres suivants. Six lingots commerciaux ont été soumis à l'essai à la surface et on en a extrait ensuite l'or à l'état de pureté. On a obtenu ainsi :

	I	II	III	IV	V	VI
Titre par essai	0,825	0,660	0,800	0,850	0,842	0,830
Titre réel	0,812	0,630	0,780	0,845	0,830	0,821

Georges CHARPY.

3° Sciences naturelles.

Hermann Wagner, *Geographisches Jahrbuch*, herausgegeben von. XIII Band, in-16, viii-476 p. Gotha, Justus Perthes, 1889.

La réputation de *Geographisches Jahrbuch*, fondé en 1866 par E. Behm, n'est plus à faire. Cet excellent

recueil annuel a subi, à partir du onzième volume (1887), une double amélioration; le format a été agrandi, en même temps que les différentes matières traitées prenaient plus de développement, grâce à une division en deux parties (géographie proprement dite et sciences auxiliaires de la géographie), dont chacune devait remplir alternativement les volumes successifs. Le tome XII, publié en 1888, contenait une série de rapports sur les progrès de la science des projections, par M. Günthier; sur la cartographie officielle de l'Europe, par M. Heinrich, avec de précieux tableaux d'assemblage des cartes d'état-major des principaux États, par M. H. Wagner; sur les progrès de l'onomatologie géographique, par M. Egli; sur les Résultats géographiques des récents voyages et explorations dans l'Amérique septentrionale par M. Fr. Boas; dans l'Amérique latine, par M. W. Sievers; en Asie, par M. Lullies; et en Afrique, par M. H. Wichmann; sur la géographie ancienne du monde grec, par M. Hirschfeld; enfin sur le développement des méthodes et de l'enseignement de la géographie, par M. H. Wagner. Plus; une Nécrologie relative aux années 1884-87, par M. Volkenhauer; une statistique des Sociétés, Congrès et périodiques géographiques, par MM. Wichmann et Wagner, et un Tableau des coordonnées géographiques de 192 observatoires, dressé par M. Auwers. Le tout bondé de notes bibliographiques, et muni de tables alphabétiques détaillées, placées à la suite de chacun des articles.

Cette année, c'était le tour des sciences auxiliaires; les collaborateurs du onzième volume reparaissent donc dans l'ordre habituel, mais avec l'adjonction de M. K. Schering, qui fournit un rapport sur le développement et l'état actuel des recherches relatives au magnétisme terrestre (p. 171-220). Les autres articles sont consacrés, comme de coutume, aux diverses branches des sciences naturelles s'occupant, à un titre quelconque, du globe terrestre ou de la distribution des êtres organisés à sa surface; les noms des auteurs, tous avantageusement connus dans leurs spécialités respectives, sont un sûr gage de l'excellence de ces extraits. On y remarque :

Les progrès de la géophysique, par MM. Hergesell et Rudolph (p. 101-170) : travaux de l'association géodésique internationale; travaux relatifs au globe considéré dans son ensemble (forme, pesanteur, marées, etc.); travaux concernant l'écorce terrestre (mouvements du sol, volcans, tremblements de terre, érosion, lacs, glaciers, etc.). 343 publications différentes, publiées de 1886 à 1888, sont analysées dans ce rapport, le second qu'aurait fourni au *Jahrbuch* MM. Hergesell et Rudolph, successeurs du regretté Zappritz dans l'accomplissement de cette tâche délicate.

Les conquêtes de la géographie géologique de 1886 à 1888, par M. Toula (p. 222-288). Dans cet article qui est également le second de la série correspondante, autrefois rédigée par M. K. von Fritsch, plus de 700 numéros ont trouvé place.

Les progrès de l'Océanographie en 1887-88, par M. Krümmel (p. 1-26), 84 numéros. — Les progrès de la météorologie géographique, par M. Hann (p. 27-100). Ce rapport (330 numéros) est l'un des meilleurs du volume : l'on sait combien tous les écrits de l'éminent météorologiste de Vienne sont pénétrés d'une rigueur scientifique malheureusement trop rare en météorologie.

Le rapport de M. Brude sur les progrès de la géographie botanique en 1886-88 (p. 289-352) est un modèle achevé, au point de vue de l'ordre et de la lucidité de l'exposition (373 numéros), qualités qui paraissent au contraire absentes du rapport de M. Schmarda sur la Géographie zoologique (p. 353-406), sèche énumération de titres d'ouvrages et de noms de genres ou d'espèces. Dans un travail de cette nature ce sont les résultats généraux, capables d'établir un lien entre les faits individuels, qui devraient être surtout mis en évidence.

Rapport sur les études ethnologiques, par M. Gerland (p. 407-476); les travaux relatifs à l'Europe sont à peu près complètement laissés de côté par l'auteur, qui

mentionne plus de 600 ouvrages ou mémoires sur les populations des autres parties du monde.

Malgré quelques lacunes et quelques imperfections, dues surtout au peu de temps disponible entre la publication des documents originaux et la préparation des rapports, le *Geographisches Jahrbuch* de M. Wagner reste un guide bibliographique incomparable. On ne peut que souhaiter de voir apprécier de plus en plus un auxiliaire aussi précieux pour tous les travailleurs.

EMM. DE MARGERIE.

Martel (E. A.). — Les Cévennes et la région des Causses (Lozère, Aveyron, Hérault, Gard, Ardèche), grand in-8° de 406 p. avec 140 gravures, 2 cartes et 9 plans. Paris, Delagrave, 1890.

Les Causses, on le sait, sont ces grands plateaux de calcaire jurassique qui forment entre Mende, Rodez et Montpellier le talus méridional du Massif Central français et la déclivité occidentale des Cévennes. L'érosion a creusé dans cette masse, autrefois continue, des gorges profondes, analogues d'aspect aux cañons américains, et qui l'ont morcelé en une série de tables distinctes, élevées de 800 à 1200 mètres.

Un jeune avocat de Paris, M. E. A. Martel, qui consacre depuis plusieurs années ses vacances à parcourir les Causses, vient de publier, dans le beau volume que nous annonçons ici, une excellente description de cette partie de la France, naguère encore presque ignorée des touristes.

En dehors du côté pittoresque, l'ouvrage renferme de précieuses indications sur le régime des eaux souterraines dans les Causses. La surface de ces plateaux est percée de nombreux puits naturels, qui portent dans le pays le nom d'*avens*; en 1888 et 1889, M. Martel est descendu dans quatorze de ces trous, dont il donne la figure et les dimensions exactes : le plus profond, l'*aven* de Rabanel, n'a pas moins de 165 mètres. L'auteur, repoussant l'hypothèse d'un effondrement, au moins comme explication normale, compare les *avens* aux *marmites de géants* torrentielles (?); il attribue le rôle principal, dans leur formation, au travail mécanique des eaux d'infiltration, aidées probablement dans certains cas par des phénomènes chimiques préalables d'origine interne, comme l'ont admis MM. de Mojsisovics et Mouret.

Les eaux qui se sont engouffrées dans les *avens* reparaissent sous forme de sources volumineuses, à 500 mètres plus bas, au fond des vallées latérales, privées par compensation d'affluents à ciel ouvert. La manière dont elles se comportent dans l'intervalle était restée jusqu'à présent un problème, que les recherches de M. Martel viennent de résoudre en grande partie. Comme pouvait du reste le faire pressentir l'intercalation d'un étage imperméable entre l'étage calcaire du dessus, où se trouvent les *avens*, et celui du dessous, d'où sortent les rivières souterraines, il n'existe pas de communication directe et continue, au moyen de cavités spacieuses, à travers la masse interne des plateaux, beaucoup moins cavernueuse qu'on ne le pensait généralement. Les failles et les fissures qui traversent les bancs argileux permettent seules le suintement goutte à goutte des eaux accumulées à la surface de ces derniers.

M. Martel s'est enfin attaché à étudier les grottes nombreuses qui constituent pour le touriste l'un des principaux attraits de la région; il a pu en relever dix nouveaux kilomètres, souvent non sans péril. La grotte de Dargilan, celle des Beaumes-Chaudes, les galeries de Bramabiau sont destinées sans doute à devenir bientôt célèbres. Les renseignements pratiques donnés par M. Martel, notamment sur l'usage du bateau démontable d'Osgood, seront lus avec fruit par les personnes qui voudront le suivre dans cette étude encore peu avancée des cavernes.

Au point de vue de la formation des cañons du Tarn et de ses affluents, M. Martel développe une théorie qui nous paraît difficilement acceptable : ces

gorges résulteraient de la transformation de canaux souterrains en canaux drainés à l'air libre, par l'écroulement du toit, — le tracé de ces canaux souterrains étant lui-même déterminé par des cassures préexistantes. Sans nier la possibilité, en principe, du phénomène, nous ne voyons pas pourquoi les vallées d'érosion des pays calcaires auraient une autre origine que celle des régions constituées par des terrains d'une autre nature, — d'autant plus que les vallées du Tarn, de la Dourbie, de la Jonte, etc., se prolongent vers l'amont en territoire imperméable. En outre, le tracé de ce réseau fluvial paraît être en rapport avec un ensemble de circonstances à la fois beaucoup plus complexes et d'ordre beaucoup plus général que ne l'est la seule présence, quasi-universelle d'ailleurs, d'un système de joints verticaux plus ou moins perpendiculaires entre eux. Quant à l'exemple même de Bramabiau, sur lequel M. Martel a basé sa théorie, il nous montre simplement une rivière à écoulement aérien normal, localement transformée, *après coup*, en rivière souterraine, — conditions fort différentes, comme on le voit, de celles que réclamerait l'hypothèse en question.

De nombreuses figures, exécutées d'après des photographies, reproduisent les sites les plus remarquables des Causses; on admirera surtout les rochers ruiniformes si variés de Montpellier-le-Vieux et les magnifiques piliers de stalactites de la grotte de Dargilan (p. 157 et 159).

L'ouvrage de M. Martel n'intéresse pas seulement les géologues; on y trouvera, en effet, d'intéressants chapitres sur l'Aigoual et son observatoire météorologique, sur la flore et la faune des Causses, sur l'archéologie préhistorique (question de l'*hiatus*), etc., sans oublier l'histoire de la célèbre *Bête du Gévaudan* (p. 254-258).

EMM. DE MARGERIE.

Charpentier (Paul). — Les Textiles. — *Encyclopédie chimique* de M. Fremy, Paris, Vec Ch. Dunod, 1890.

Il serait oiseux d'insister ici sur l'importance des textiles. Ils sont pour le commerce une source inépuisable de trafic et pour l'industrie la matière première la plus importante et peut-être la plus nécessaire. Leur étude devait donc rentrer à bon droit dans le cadre de l'*Encyclopédie chimique* publiée par nos chimistes les plus autorisés sous la direction de M. Fremy.

Une connaissance profonde de la structure des fibres textiles, de leur composition chimique est nécessaire en effet à tous ceux — industriels, ingénieurs ou savants — qui ont à s'occuper du rouissage, du blanchiment ou bien encore de la teinture.

A ce titre, l'ouvrage de M. Charpentier devait combler une lacune en réunissant un grand nombre de connaissances dispersées dans des ouvrages spéciaux. Il devait s'adresser à la fois au savant et à l'industriel. Ce dernier, en effet, y puisera un grand nombre de documents économiques et une profusion de renseignements industriels, car l'auteur ne se contente pas de nous renseigner sur la nature des textiles, il a étendu le champ qui lui était ouvert et décrit le travail mécanique préparatoire jusqu'à la filature exclusivement.

Pour chacun des textiles principaux, M. Charpentier a divisé son étude en plusieurs chapitres. C'est ainsi que pour le coton la description comporte : 1° *Généralité historique*; 2° *Origine, espèces diverses, propriétés et usages*; 3° *Culture et production du coton*; 4° *Travail mécanique préparatoire*; 5° *Statistique; production et consommation du coton dans le monde*. — Enfin l'ouvrage se termine par une révision des textiles moins importants tels que *ramie, jute, soie, alfa, diss*, etc.; puis par la description des principaux modes de blanchiment et l'énoncé des caractères qui peuvent servir à distinguer les textiles.

Nous le répétons, les *Textiles* de M. Charpentier peuvent rendre des services signalés aux industriels en leur fournissant un grand nombre de documents sur les diverses machines employées dans le traitement préparatoire. Il eût mieux valu à notre avis ne décrire

que les machines utilisées pour aider le traitement chimique et laisser de côté toutes les autres qui ne nous paraissent pas à leur place dans un ouvrage de chimie. Pour la même raison, nous ne croyons pas que le chimiste tirera de la lecture des *Textiles* un aussi grand profit qu'on pourrait le désirer. En terminant, l'auteur nous permettra de lui adresser un reproche : en chimiste, il donne l'analyse des fibres textiles à l'état brut, sans le complément nécessaire des observations microscopiques, absolument comme on analyserait un morceau de minerai. Cette méthode de chimie exclusive s'adressant à des tissus végétaux ne peut être que la source de nombreux mécomptes; les fibres sont bien loin d'être homogènes et depuis longtemps déjà les micrographes ont découvert à l'aide de réactions microchimiques un grand nombre de faits intéressant la composition et la structure des textiles. Les résultats de Vétillard, mais surtout de M. Schlesinger et de M. Wiesner, méritaient une mention que M. Charpentier a eu tort de ne pas leur accorder.

Henri LECOMTE.

Dubois (D^r R.). — *Travaux du laboratoire de physiologie générale de la Faculté des Sciences de Lyon*, t. I, 1888-1889, 1 vol. in-8°. Lyon, Storck, 1890.

Seule des Facultés des Sciences de province, celle de Lyon possède une chaire de physiologie. Le titulaire, — notre distingué collaborateur, M. Raphaël Dubois, — vient de réunir en un volume les travaux exécutés dans son laboratoire en 1888 et 1889.

De cette collection de mémoires communiqués soit à l'Académie des Sciences de Paris, soit à la Société de Biologie, nous nous contenterons de signaler les plus importants : — Du professeur Dubois : Sur la respiration des animaux hibernants; sur la fonction photodermique et photogénique du siphon des pholas; sur l'action du chlorure d'éthylène, etc.; — de M. Couvreur : Sur la respiration des Reptiles; sur la circulation pulmonaire de la grenouille; — de M. Bataillon, Sur les métamorphoses des Anoures, etc.

L'ouvrage renferme en outre une description, accompagnée de planches, du laboratoire de Lyon et de la *station maritime de physiologie* récemment fondée par M. Dubois à Tamaris près de Toulon. Cette création mérite qu'on la remarque, car elle comble en France une lacune des plus regrettables. Grâce à la libéralité de Michel Pacha et à l'activité bien connue de M. Dubois, les physiologistes vont enfin pouvoir étudier, au bord de la mer, les animaux qui vivent dans ses profondeurs. Ce genre d'études n'avait jamais été soigneusement organisé dans notre pays. Il fallait, pour l'y implanter, le dévouement à la Science et à l'Enseignement, dont M. le professeur H. de Lacaze-Duthiers a donné un illustre exemple en fondant pour les zoologistes les magnifiques laboratoires de Banyuls et de Roscoff.

Le meilleur souhait que nous puissions adresser à la nouvelle création est d'obtenir le même succès que ces derniers.

L. O.

4° Sciences médicales.

Guyon (F.). *Professeur à la Faculté de Médecine.* — *Cystalgies symptomatiques de lésions rénales et pyonéphroses consécutives à des lésions vésicales. Influence du traitement de la vessie sur les urétéro-pyérites.* — *Ann. de gynécologie*, Paris, août 1890 t. XXXIV, p. 81.

Après avoir résumé les divers signes qui permettent de distinguer les *inflammations douloureuses de la vessie* des *simples douleurs névralgiques*, le professeur Guyon montre par des faits l'influence considérable du traitement vésical sur les lésions rénales, qui leur sont consécutives. Les urètres et les reins bénéficient largement

du traitement des lésions de l'appareil urinaire inférieur.

D^r HARTMANN.

Sajous (Charles E.). — *Annual of the universal medical sciences*, Philadelphia 1890.

Le but de l'*Annual of the universal medical sciences*, dont la troisième année vient de paraître, est de résumer, en une série de volumes, les divers travaux afférents aux sciences médicales, publiés dans le monde entier; au lieu d'imprimer simplement les analyses à la suite les unes des autres, l'éditeur a eu l'idée de les grouper en une série de chapitres, traitant chacun un ordre de sujets spéciaux (maladies nerveuses, gynécologie, anatomie, physiologie, syphilis, etc.). La rédaction de ces divers chapitres a été confiée à des savants compétents, chacun dans sa partie, si bien qu'on a là une série de petites revues générales sur chaque question; aussi la lecture de ce recueil est-elle beaucoup moins aride que celle des divers journaux bibliographiques publiés jusqu'à présent. Une impression soignée, des figures nombreuses rendent encore son abord facile. Un index général, contenu dans le dernier volume, permet de faire rapidement les recherches. C'est avec une réelle satisfaction que nous annonçons l'apparition des cinq volumes qui résument les progrès des sciences médicales pendant l'année 1889.

D^r HARTMANN.

Polin et Labit (D^{rs}). — *Etude sur les empoisonnements alimentaires*. Paris, O. Doyné, 1890.

MM. Polin et Labit ont réuni dans une intéressante étude de nombreux cas d'intoxication dus à l'ingestion de substances alimentaires avariées. Ce mémoire offre le grand avantage de réunir une foule de documents épars et qui ont permis aux auteurs de présenter une vue d'ensemble des accidents, parfois fort graves, qui suivent l'absorption de denrées avariées.

Dans la première partie, et après un exposé historique de la question, les auteurs étudient les accidents produits par les viandes fraîches et les viandes de conserve. Ils font ressortir la diversité des symptômes que l'on observe et leur grande analogie avec les manifestations provoquées par l'expérimentation sur les animaux au moyen des ptomaines. Ils examinent plus particulièrement l'analogie de certains symptômes avec ceux que présente la fièvre typhoïde et s'efforcent d'établir nettement un diagnostic différentiel dont l'utilité n'est peut-être plus bien évidente aujourd'hui, mais qui a revêtu à un moment donné une grande importance, alors que nos connaissances relativement aux ptomaines et aux produits de sécrétion des microbes étant moins avancées, d'excellents esprits se refusaient à voir, dans ces accidents, autre chose que certaines modalités spéciales des symptômes de la dothiénentérie. Cette première partie se termine par le traitement et la prophylaxie de ces accidents, chapitres auxquels MM. Polin et Labit ont ajouté quelques notions sommaires sur l'examen des viandes sur pied et des viandes abattues.

L'étude des accidents déterminés par l'ingestion du poison fait l'objet de la seconde partie; dans la troisième, les auteurs s'occupent des intoxications déterminées par les crustacés et les mollusques et enfin, dans la quatrième et dernière partie, sont exposés les accidents d'intoxication produits par d'autres substances alimentaires dont l'usage est le plus fréquent, tels que le fromage, le pain, l'eau, les pommes de terre.

L'examen attentif et la discussion des nombreux cas relatés ou observés par MM. Polin et Labit leur ont permis d'attribuer à plusieurs symptômes une valeur certaine et de signaler comme réellement pathognomoniques des signes auxquels les observateurs de cas isolés n'avaient pas jusqu'ici accordé une valeur suffisante.

Les conclusions de cet intéressant et consciencieux travail peuvent se résumer ainsi : des empoisonnements peuvent être produits par les substances alimentaires les plus diverses ; il existe des symptômes spéciaux qui permettent toujours de les reconnaître ; ces accidents ont pour origine la putridité et peuvent, dans quelques cas, prendre la forme d'une véritable infection microbienne ; parmi ces accidents, il en est qui ont pour origine une maladie spéciale de l'animal consommé (moules), tandis que d'autres ont pour origine des alcaloïdes végétaux, ou des ptomaïnes, ou des leucomaines ; enfin ces empoisonnements sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit généralement ; ils peuvent être très graves et souvent mortels.

Tout en ne partageant pas absolument en tous points les idées des auteurs de ce travail, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître, et nous le faisons avec le plus grand plaisir, qu'ils ont fait œuvre utile en condensant dans leur mémoire une foule de remarques et de théories éparses de tous côtés et en réunissant une grande quantité d'observations très détaillées dont la lecture est du plus grand intérêt.

D^r Gabriel POUCHET.

Wurtz (R.) et Bourges (H.). — Recherches bactériologiques sur l'angine pseudo-diphthérique de la scarlatine. *Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique*, Mai, 1890.

Bien que les conclusions posées par MM. Wurtz et Bourges ne soient pas à l'abri de toute critique, leur intéressant et très important travail contribuera cependant dans une large mesure à trancher cette question si controversée de la nature de l'angine scarlatineuse. Y a-t-il une ou plusieurs espèces d'angines au cours de la scarlatine ? Toutes les angines scarlatineuses sont-elles d'origine diphthérique ? Ces questions seraient sans doute depuis longtemps résolues, si la clinique permettait un diagnostic précis de la fausse membrane diphthérique. La divergence entre les opinions des auteurs, prouve bien que si dans beaucoup de cas ce diagnostic est possible, souvent aussi il est d'une difficulté extrême. Cependant l'opinion qui tend à s'accréditer est la suivante : les angines *tardives* seraient de nature diphthérique, les angines *précoces* ne seraient pas causées par la diphthérie, au moins dans la plupart des cas.

C'est d'ailleurs cette dernière manière de voir qui semble ressortir surtout des recherches de MM. Wurtz et Bourges, qui devant l'impuissance de la clinique se sont adressés à la bactériologie. Leur travail repose en substance sur onze observations, dont neuf se rapportaient à des angines *précoces* ayant les caractères de l'angine diphthérique. Sur ces neuf cas, le bacille de Loëffler recherché par les méthodes usitées en pareil cas, a toujours fait défaut. Ces angines *précoces*, en dépit de leur aspect clinique, ne sont donc pas liées à une infection diphthérique. Pour les deux autres cas, se rapportant à des angines *tardives* (dont l'une même a causé la mort), le bacille diphthérique fut mis en évidence, montrant péremptoirement l'origine étiologique de la maladie.

Dans les neuf cas, cités plus haut, d'angines *précoces*, non diphthériques, les expérimentateurs ont pu isoler divers microbes, parmi lesquels un *streptococcus* spécial qui s'est trouvé plusieurs fois associé aux *staphylococcus aureus* et *albus*.

Les caractères assignés à leur streptococcus par MM. Wurtz et Bourges paraissent être ceux du streptococcus pyogène si souvent cause d'infections secondaires ; il serait très important d'établir s'il y a une complète identité ou simplement ressemblance entre ces deux organismes. Les auteurs ont cherché à différencier leur streptococcus de celui de l'Erysipèle : remarquons à ce propos que le caractère distinctif fondé sur l'aspect de la culture n'est pas suffisamment tranché pour en faire le pivot du diagnostic. D'autre part,

on tend de plus en plus à admettre, et notre expérience personnelle est tout à fait favorable à cette manière de voir, l'identité du streptococcus pyogène et du streptococcus de l'Erysipèle ; la variété des accidents ne peut être mise sur le compte d'une différence dans la virulence du microbe ou dans la sensibilité du terrain. Ces deux organismes ne faisant qu'un seul et même être, il serait étonnant que l'un se trouvât dans le sang et que l'autre ne s'y rencontrât jamais ; l'observation prouve d'ailleurs le contraire, et malgré l'affirmation de Fehleisen, il est habituel de rencontrer le streptococcus dans le sang et les organes des animaux qui ont succombé à l'inoculation d'une culture du microbe de l'Erysipèle.

Ces légères critiques, d'ordre purement doctrinal, n'enlèvent rien à la valeur du travail de MM. Wurtz et Bourges, et si nous leur avons donné une aussi grande extension, c'est précisément en raison de l'intérêt considérable qui s'attache à leur mémoire, fruit d'un travail consciencieux et intéressant par plus d'un côté. Le fait d'établir que l'angine précoce de la scarlatine n'est pas de nature diphthérique entraîne des conséquences pratiques importantes ; car on ne sera plus tenté désormais de faire passer dans les salles de diphthérie les petits malades atteints de ces angines, mesure qui a pour conséquence de les exposer à contracter la terrible infection dont on les croit porteurs.

D^r H. DUBIEF.

Charrin et Roger. — Contribution à l'étude expérimentale du surmenage ; son influence sur l'infection. *Archives de physiologie*, 1890, n° 2.

Pour déterminer de la fatigue chez les animaux sur lesquels ils désiraient étudier l'action du surmenage, les auteurs plaçaient ces animaux dans un tambour ou cylindre tournant de 1 mètre de diamètre analogue à ceux des cages d'écureuils. Le cylindre, disposé de façon que son diamètre fût vertical, était mis en rotation et faisait douze tours à la minute. Les animaux qui y étaient enfermés étaient contraints de marcher en sens inverse du mouvement imprimé au cylindre et faisaient ainsi 2.260 mètres à l'heure. À l'aide de cet appareil MM. Charrin et Roger ont étudié l'influence que la fatigue exerce sur l'évolution des maladies microbiennes, en particulier sur le charbon bactérien et le charbon symptomatique. Les animaux employés étaient les rats blancs, qui sont peu sensibles à ces 2 virus, et résistent très bien à la fatigue. On inoculait à une série de rats une certaine quantité de culture ; on soumettait une partie de ces animaux au surmenage, dans le cylindre tournant ; les autres servaient de témoins. La fatigue imposée aux animaux inoculés soit avec le charbon bactérien, soit avec le charbon symptomatique favorisait considérablement l'infection, et toujours les animaux surmenés sont morts avant ceux qu'on laissait au repos.

Dans une autre série d'expériences MM. Charrin et Roger ont de plus constaté que chez les animaux surmenés, surtout chez les cobayes, les excoriations dues aux frottements répétés des téguments sur les parois du tambour amènent rapidement la mort par infection microbienne. Les animaux témoins, auxquels on fit des plaies semblables et qu'on laissa dans leurs cages en furent quittes pour des suppurations plus ou moins abondantes.

D^r R. WURTZ.

Rouvier (D^r J.). Professeur de clinique obstétricale et gynécologique à la Faculté de Médecine de Beyrouth. — Identité de la Dengue et de la Grippe-Influenza. *Beyrouth et Paris*. Vve J. Lechevalier, 1890.

Nous nous bornons aujourd'hui à signaler aux spécialistes cet important travail, la *Revue* devant en parler prochainement avec quelque détail.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

La Société de Biologie, la Société française de Physique, la Société chimique de Paris, la Société royale de Londres, les Sociétés de Physique et de Chimie de Londres, l'Académie des Sciences et la Société de Physique de Berlin, l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, les Sociétés savantes d'Odessa, l'Académie des Sciences de Vienne, l'Académie royale des Lincei sont en vacances.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 22 septembre 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A. Cayley : Sur l'équation modulaire pour la transformation de l'ordre 11. — M. F. Sy : Observations de la nouvelle planète Charlois (297) faites à l'observatoire d'Alger. — M. J. Janssen

fait le récit de son ascension au sommet du Mont Blanc et expose les résultats scientifiques de cette expédition (voir la *Revue des Sciences*, du 15 septembre, p. 560). Comme les observations précédentes le faisaient prévoir, les raies d'absorption de l'oxygène dans le spectre solaire sont extrêmement affaiblies à cette grande altitude. On peut donc considérer la question de l'existence de l'oxygène dans l'atmosphère solaire comme tranchée négativement. Incidemment M. Janssen fait remarquer que le travail intellectuel est très possible à ces altitudes, pourvu que l'observateur s'abstienne de tout travail physique. Il demande la création d'un Observatoire sur le Mont Blanc.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Le Chatelier avait montré le parti que l'on peut tirer des déterminations des résistances électriques pour l'étude aux températures élevées des transformations moléculaires des métaux. Il a étendu cette méthode à une nouvelle série de métaux et d'alliages. Les métaux qui ne présentent aucune transformation moléculaire avant leur fusion possèdent des résistances électriques dont la variation est une fonction linéaire de la température, par exemple le cuivre, le platine. Un grand nombre de métaux, par exemple le fer, présentent des variations moléculaires brusques, se produisant à des températures bien déterminées. La courbe des résistances électriques présente un angle en ce point. Ces études conduisent tout de suite à des résultats pratiques relativement à la trempe des métaux et des alliages. — A propos de la communication de MM. Dumoulin-Froment et Doignon, M. Trouvé rappelle que son gyroscope électrique remonte à l'année 1865. — M. D. Coladon décrit sous le nom de trombe d'eau ascendante un phénomène que l'on observe sous certaines conditions le long d'un barrage à rideaux jeté à Genève en travers du Rhône. L'eau étant arrêtée au milieu et s'écoulant par les deux extrémités du barrage, il se forme à chacune de ces extrémités un tourbillon qui emprisonne dans l'eau une colonne verticale d'air; à 50 centimètres au-dessous de la surface, cette colonne se recourbe de part et d'autre et les deux moitiés viennent se réunir horizontalement au milieu du fleuve; un manomètre à eau, mis en rapport avec cette trombe horizontale, accuse une aspiration de 30 à 40 cent.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Paul Marchal, qui a fait l'étude détaillée de l'appareil excréteur de l'Ecrevisse, décrit les diverses formes de cet appareil chez quelques Crustacés décapodes : Homard, Crevette, Bernard l'Hermite, divers Crabes, etc. — Les recherches précédentes de M. H. Jumelle lui avaient montré qu'il existe un certain balancement fonctionnel entre l'assimilation et la transpiration chlorophylliennes; si l'assimilation est empêchée, par exemple, par l'absence d'acide carbonique, l'énergie des radiations, qui auraient été utilisées pour cette assimilation, se reporte

sur la transpiration qui est augmentée. Il vient d'obtenir une nouvelle preuve de cette relation par l'emploi des anesthésiques (éther), qui, à certaines doses, arrêtent complètement l'assimilation et augmentent la transpiration.

Séance du 29 septembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — MM. G. Rayet, L. Piccart et Courty : Observations des comètes Coggia (18 juillet 1890) et Demoring (23 juillet 1890) faites à l'Observatoire de Bordeaux.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — MM. Chassagny et H. Abraham ont entrepris de déterminer la valeur des couples thermo-électriques comme appareils de mesure directe des températures; dans un premier travail, ils comparent à des couples électro-chimiques étalons des couples thermo-électriques, fer-cuivre, l'une des soudures étant maintenue dans la vapeur d'eau bouillante, l'autre dans la glace rapée; de leurs mesures très précises il résulte que ces éléments thermo-électriques sont très comparables entre eux et peuvent servir comme étalon de force électro-motrice. — M. L. Trouvelot signale l'identité de structure des éclairs qu'il a observés dans un orage à Meudon et des décharges des machines d'induction, dont l'observation lui est très familière. Cette structure des éclairs pourrait expliquer diverses particularités des orages, particulièrement de ceux que l'auteur appelle *orages secs*. — M. Ch. Pollack décrit une nouvelle lampe de sûreté pour les mines, alimentée par des accumulateurs. — M. Lecoq de Boisbaudran donne la description des spectres du gadolinium, tels qu'on les obtient en faisant éclater l'étincelle d'une bobine d'induction à long fil sur la solution chlorhydrique de la gadoline. La réaction spectrale du Gadolinium est très sensible. Le même auteur a recommencé la détermination de l'équivalent de la terbine, par le sulfate de la terre en prenant des précautions pour éviter l'erreur due à l'oxygène de suroxydation; il a trouvé un chiffre sensiblement plus bas que celui qu'il avait donné d'abord soit 122, 32. — M. Berthelot, par quelques expériences directes démontre que la terre n'absorbe et ne retient l'oxyde de carbone autrement que tout autre gaz, c'est donc par erreur qu'on avait cru observer après les explosions des mines ou d'obus une action spécifique de ce genre. La polymérisation pyrogénée de l'acétylène, dont le produit principal est la benzine, a lieu exothermiquement; au contraire, la polymérisation à froid de ce gaz par l'effluve, donne lieu à des produits plus voisins de l'acétylène et moins stables; M. Berthelot a en effet observé que ces produits, très oxydables, se décomposent d'une façon explosive quand on les chauffe.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. R. Dubois a extrait de la soie jaune une série de principes cristallisables que leurs propriétés physiques et chimiques placent très près de la carotine végétale. — M. Ch. Bouchard expose une théorie de la maladie infectieuse, de la guérison, de la vaccination et de l'immunité naturelle. L'agent infectieux tombant sur un terrain très bactéricide, il ne se passe rien; sur un terrain favorable la maladie se développe immédiatement; dans le cas moyen, le microbe végète péniblement, mais sécrète des diastases qui modifient le terrain dans le sens qui lui est favorable, particulièrement en paralysant le centre vaso-

dilatateur et en empêchant par là la diapédèse et la phagocytose; la maladie peut alors se développer. Si elle n'aboutit pas à la mort, l'organisme devient au bout de quelque temps réfractaire à l'agent infectieux; le premier effet de cette modification est la guérison, le second est l'acquisition de l'immunité. L'immunité naturelle résulte de la grande résistance que le centre vaso-dilatateur oppose aux produits solubles microbiens tendant à le paralyser; si on paralyse ce centre par une dose assez forte de poison, l'immunité disparaît. — M. R. Blanchard signale une maladie qu'il a observée sur le Lézard vert; la queue portait de grosses excroissances cutanées remplies de conidies; ces conidies cultivées sur divers milieux ont germé et produit une Mucédinée appartenant au genre *Fusarium*.
L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 23 septembre 1890

M. Chauvel, sur un mémoire de M. Guérmonprez concernant les fractures du calcanéum par écrasement. — M. Guéniot lit un mémoire de M. le Dr Rifat (de Salonique) sur le traitement de la paramétrie par le raclage de l'utérus. — M. Javal discute les réformes à introduire dans les lois fiscales, militaires et civiles

en vue de favoriser la natalité, et de remédier à la dépopulation de la France. Il propose à l'Académie de voter la conclusion suivante : *L'Académie appelle l'attention des pouvoirs publics sur les conclusions du rapport de M. Lagneau, d'après lesquelles l'arrêt d'accroissement de la population reconnaît pour cause principale la diminution volontaire de la natalité, diminution causée par la situation faite aux familles nombreuses par les lois civiles, fiscales et militaires.* — M. Lagneau s'élève contre le renvoi de la discussion devant une commission parlementaire. Il répond aux observations faites par M. Javal dans la première partie de son discours et déclare qu'il se croit d'accord avec lui sur la plupart de ses propositions.

Séance du 30 septembre 1890.

M. Terrier communique les résultats favorables d'une opération de cholécystectomie suivie de guérison. L'opération de l'ablation de la vésicule biliaire qu'il a pratiquée pour la deuxième fois ne l'a été que cinq fois en France, elle l'a été souvent à l'Étranger. — Suite de la discussion de M. Lagneau sur les moyens à employer pour remédier à la dépopulation de la France. — M. Hervieux discute un travail intitulé : De l'absolue nécessité d'édicter une loi rendant obligatoires les vaccinations et revaccinations.

COURRIER DE ROME

La majeure partie de l'activité scientifique, en Italie et plus spécialement à Rome, se concentre à l'Académie royale des Lincei. Cette compagnie prend actuellement ses vacances. Celles-ci, à vrai dire, sont plutôt nominales que réelles, la plupart des membres de cette illustre assemblée continuant de publier leurs travaux pendant l'été. Indépendamment des Mémoires qu'accueille l'Académie, bon nombre de nos compatriotes font paraître leurs recherches dans les journaux spéciaux et les bulletins des diverses Sociétés savantes de notre région. La production scientifique y est, comme on le voit, considérable. Bien que ralentie en cette saison, elle mérite néanmoins de fixer l'attention. Nous nous bornerons, dans le présent courrier, à signaler, parmi ses récents progrès, les plus importants.

1. — Sous les auspices de S. M. le Roi, et par les soins du ministère de l'Instruction publique, on a publié le premier volume de l'édition nationale des Œuvres de GALILEO GALILEI. Cette publication est dirigée par M. Favaro, professeur à l'Université de Padoue, avec le concours de MM. L. del Lungo, V. Cerruti, G. Govi, G. V. Schiaparelli, membres de l'Académie des Lincei. Dans ce premier volume sont compris les chapitres suivants : 1° *Juvenilia*; 2° *Theorematia circa centrum gravitatis*; 3° *La Bilancetta*; 4° *De Motu*. Ces travaux se rapportent à l'époque où Galilée était étudiant et commença à donner des leçons, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas au delà de 1589.

Le premier travail est une compilation des leçons dictées par quelque cathédral de l'Université de Pise en commentant les livres d'Aristote, et en particulier celui qui a pour titre *De Colo*. Cette *scrittura* n'a aucune importance scientifique, mais elle présente un très grand intérêt pour suivre le développement de la pensée de Galilée.

Les trois autres travaux montrent dans Galilée un vaillant et heureux continuateur d'Archimède. Dans les *théorèmes sur les centres de gravité*, il s'occupe de la détermination des centres de gravité des solides, tandis qu'Archimède n'avait déterminé (si du moins on en juge par ce qu'on en est parvenu de ses œuvres) que les centres de gravité des aires planes. Quelques essais seulement avaient été faits déjà par Maurolico et Commandino,

mais avec moins de sagacité que Galilée sut en montrer.

Le chapitre : *La Bilancetta* a trait à l'invention de la balance hydrostatique et à la détermination des poids spécifiques des solides. Le chapitre : *De Motu* en grande partie inédit jusqu'à ces jours-ci, (comme de même étaient inédits les travaux groupés sous le titre de *Juvenilia*) est une première rédaction des fameux dialogues : *Sur deux nouvelles sciences*, etc., qui forment le plus grand et le plus durable titre de gloire de Galilée. Enfin le chapitre : *De Motu*, contient les fondements de la science du mouvement; dans ce travail l'auteur repousse et détruit toutes les erreurs que la philosophie péripatéticienne (alors en grand honneur dans les écoles) avait répandues sur le mouvement des corps dans le vide et dans les milieux résistants comme l'air et l'eau.

2. — Dans le groupe des sciences physiques plusieurs questions intéressantes sont depuis quelque temps à l'ordre du jour. Les découvertes de M. Hertz sur l'action des rayons ultra-violet dans la production des décharges électriques, et de Hallwachs sur la dispersion plus rapide de l'électricité négative lorsque les rayons ultra-violet frappent la surface du conducteur électrisé, ont conduit M. Righi à étudier ces intéressants phénomènes, sur lesquels il a publié déjà plusieurs Mémoires. Comme l'on sait, M. Righi a découvert que, sous l'action des rayons ultra-violet, un corps conducteur ou isolant et non chargé, peut donner origine à de l'électricité positive; l'auteur a déterminé la loi fondamentale et le mécanisme de ce phénomène. On le reproduit dans de brillantes expériences, dont cette Revue a eu déjà occasion de s'occuper.

Dans un récent travail M. Righi a étudié les modifications subies par le transport ou *convection* électrique, lorsque ce transport se produit dans l'air plus ou moins raréfié; ses expériences ont été faites avec des appareils spéciaux, où l'atmosphère pouvait être rarifiée à moins d'un millionième de pression. Il reconnut de cette manière que, dans l'air raréfié, les particules matérielles ne suivent plus la trajectoire déterminée par les lois de la mécanique, et que ces particules qui transportent l'électricité négative, ne sont autre chose que les molécules mêmes du gaz raréfié. En effet, lorsque la raréfaction de l'air devient toujours plus grande,

on voit que le faisceau divergent formé par les particules négativement électrisées qui partent du corps frappé par les rayons lumineux, va toujours en s'élargissant, et qu'avec une raréfaction convenable, les particules ne suivent pas une direction unique, mais se répandent presque dans toutes les directions.

L'explication de ce phénomène est très facile, si l'on admet l'hypothèse des molécules gazeuses; ces molécules en effet, à qui la chaleur du gaz donne continuellement des mouvements de translation, avec la raréfaction deviennent toujours moins nombreuses; en raison de la diminution des chocs réciproques, elles peuvent rebondir sur le corps électrisé dans toutes les directions. Si la charge du corps électrisé est très faible et négligeable, il est possible d'établir le lieu où les molécules gazeuses, qui ne sont plus soumises au phénomène électrique, seront réfléchies par le corps électrisé et se réuniront en plus grand nombre; dans ce cas, comme dans le cas d'une charge très forte du conducteur, l'expérience a toujours confirmé les prévisions de la théorie sur les points où se réunit la majeure partie de l'électricité.

M. Righi a ensuite déterminé le coefficient de dispersion photo-électrique, c'est-à-dire le rapport qui passe entre la quantité d'électricité négative perdue dans une seconde par une petite surface du corps frappé par les rayons lumineux, et la quantité d'électricité qui se trouvait sur la même surface. Ce coefficient s'accroît beaucoup en raréfiant l'air, mais à un certain point il commence à décroître si l'on poursuit la raréfaction de l'air. L'auteur, au cours de ses expériences, a obtenu un résultat jusqu'à ce moment inexplicable. La dispersion photo-électrique dans l'air raréfié augmente au lieu de diminuer, en éloignant jusqu'à une certaine limite le corps frappé par la lumière du conducteur qui reçoit la décharge négative du premier. M. Righi a, en outre, reconnu que ce résultat anormal, qui est constant dans le cas du phénomène photo-électrique, se reproduit dans le cas de la dispersion ordinaire dans l'air raréfié avec deux électrodes disposées l'une contre l'autre; si l'une des électrodes est chargée par une pile d'électricité négative, l'autre restant en communication avec un électromètre, on voit que dans un temps constant la seconde électrode prend une charge plus grande lorsque les deux électrodes se trouvent à une certaine distance, que lorsqu'elles sont rapprochées.

D'autres phénomènes ont été découverts par M. Righi, au sujet de l'influence du magnétisme sur la convection ordinaire ou photo-électrique. Lorsqu'on approche de l'appareil un fort électro-aimant, on voit disparaître dans la convection ordinaire le phénomène anormal dont on a parlé ci-dessus; et avec une petite distance entre les électrodes, on peut obtenir de fortes déviations électriques. Dans la convection photo-électrique, le magnétisme produit une diminution de l'électricité positive, qui reste sur le corps éclairé; c'est-à-dire que la charge d'électricité positive acquise dans l'air raréfié par un conducteur non chargé, par effet des radiations, sous l'action d'un électro-aimant, devient beaucoup plus faible.

— M. Guglielmo a proposé une nouvelle méthode pour construire un baromètre exact et d'un transport facile, sans recourir à l'ébullition ou aux pompes à vide afin de chasser l'air et l'humidité qui adhèrent aux parois du tube, ce qui est une opération assez difficile, même pour les constructeurs les plus habiles. La disposition imaginée par M. Guglielmo permet de rétablir à tout moment et très facilement, un vide parfait sur la colonne de mercure; il suffit de faire usage d'un tube dont la chambre barométrique est divisée en deux compartiments par un robinet ordinaire ou par un robinet de Gimighan. On remplit de mercure le tube et, comme dans l'expérience de Torricelli, on le renverse dans la cuvette; on incline alors un peu le tube, on laisse passer dans le compartiment supérieur l'air ou la vapeur d'eau qui se trouvent dans la chambre du vide, et on ferme le robinet. Lorsqu'un peu d'air et de

vapeur se sont de nouveau détachés des parois (opération dont on réduit la durée au moyen de décharges électriques) on répète l'opération précédente en ayant soin de n'ouvrir le robinet qu'au moment où la pression de l'air à chasser est présumée égale à celle de l'air déjà enfermé dans l'espace supérieur.

La raréfaction ainsi obtenue est la plus parfaite que l'on puisse atteindre avec les moyens aujourd'hui en usage; elle suffit à donner naissance aux phénomènes de la matière radiante, et à empêcher complètement le passage des décharges électriques. Cette forme de baromètre peut être fort utile dans les voyages, parce qu'il est facile de construire le baromètre à chaque moment, avec une provision de mercure et un tube qui peut même être coupé en deux parties que l'on visse l'une à l'autre. M. Guglielmo a comparé avec beaucoup de soin un baromètre construit d'après sa méthode au baromètre Fortin, et il a trouvé de petites différences, qu'il ne peut expliquer qu'en admettant la présence d'un peu d'air dans le second baromètre. Son appareil permet de vérifier l'exactitude des indications des baromètres construits à la manière ordinaire.

3. — Dans les sciences naturelles je dois signaler les recherches que MM. Monti et Tirelli ont exécutées sur les micro-organismes du maïs gâté. La question présente un grand intérêt pour l'hygiène; depuis quelque temps plusieurs savants ont admis en effet que l'ingestion du maïs gâté produit la pélagre. MM. Monti et Tirelli se sont bornés, dans leurs recherches, à étudier les micro-organismes qui se trouvent dans le maïs pourri, et à préparer de cette manière les moyens de résoudre la question des rapports entre le maïs et la pélagre.

Dans plusieurs travaux Paladini, Lombroso, Maiocchi, Cuboni, Paltau, etc., ont démontré que dans le maïs pourri des microorganismes produisent des substances toxiques; mais il restait à établir si d'autres microorganismes capables d'élaborer d'autres substances toxiques n'existaient pas dans le maïs. MM. Monti et Tirelli ont observé du maïs dont la pourriture s'était naturellement produite; ils ont directement inoculé à des lapins de la poudre de ce maïs en suspension dans l'eau. Mais les résultats, sauf dans un cas, ont été négatifs. On pulvérisait le maïs, après lavage et stérilisation de la surface externe des grains, et dans les cultures on isolait les microorganismes en cherchant à y reconnaître les formes déjà décrites par d'autres observateurs. MM. Monti et Tirelli ont réussi à surmonter les difficultés de ce long et délicat travail, et à découvrir des formes nouvelles et nombreuses, dont ils donnent dans leur Mémoire une description détaillée.

De ces recherches on peut déjà tirer des conclusions intéressantes. Ainsi l'on voit que dans le maïs pourri ne se trouve pas une espèce unique de microorganismes, le prétendu *Bacillus maydis*, mais que plusieurs espèces sont capables de donner origine à des procès de décomposition. Les moisissures, sans avoir l'importance admise par les anciens observateurs, peuvent prendre une part active au travail de fermentation, pendant que d'autres bacilles accomplissent celui de la putréfaction. La présence, sur les grains, des microorganismes qui, d'ordinaire, se trouvent dans les eaux impures, s'explique en admettant que le maïs ait été mouillé, et il est probable que le bon effet de la dessiccation artificielle du maïs dépend de la destruction de ces microorganismes. MM. Monti et Tirelli se proposent de continuer leurs recherches relatives aux effets des microorganismes sur le maïs, et de discuter ensuite les rapports qui existent entre les poisons du maïs et la pathogénie de la pélagre.

— M. Bonuzzi a communiqué à l'Académie de médecine ses recherches expérimentales sur les effets de la suspension dans l'ataxie, et d'une nouvelle méthode pour traiter cette maladie, au moyen de la flexion forcée de la partie antérieure du corps. La question d'établir de quelle manière agit la suspension dont on connaît les effets favorables, exception faite pour M. Mitschukowski,

a jusqu'à présent peu attiré l'attention des neuropathologistes. Au cours de ses expériences, M. Bonuzzi a reconnu que la moelle épinière subit un changement notable dans ses rapports avec la colonne vertébrale ; la moelle se déplace en haut de 3-4 millimètres ; le déplacement est déterminé par un léger éloignement des vertèbres entre elles, et par un relâchement des muscles et des ligaments vertébraux. Les racines épineuses, bien que changeant de position, ne paraissent pas supporter une tension appréciable. La tension du liquide céphalo-rachidien augmente, et la colonne vertébrale éprouve un allongement apparent de $1/2$ à $2\ 1/2$ centimètres. M. Bonuzzi confirme les résultats des expériences de M. Mitschutkowski pour ce qui regarde l'allongement du corps entier, allongement qu'il limite à 2-3 centimètres, et il admet que dans la suspension : 1° la respiration devient plus active et fatigante ; 2° la circulation est plus rapide et augmente la tension du sang.

L'auteur croit que l'action thérapeutique de la suspension dépend de l'amélioration qui se produit dans la circulation endomédullaire épinière, et qui agit en diminuant l'irritation que le procès morbide apporte dans les fibres radiculaires des cordons postérieurs non encore détruits. Il y a encore l'accroissement de tension du liquide céphalo-rachidien et le tiraillement des artères vertébrales qui, à cause de la diminution du sang artériel arrivant à la moelle et de l'augmentation du sang veineux qui en découle, rendent plus facile et plus rapide la circulation de la moelle. M. Bonuzzi est d'accord avec M. Charcot sur les effets produits par l'éloignement des anneaux vertébraux, et il conclut qu'avec la suspension on pourra toujours améliorer les conditions des malades en rétablissant les fonctions des fibres nerveuses encore saines, sans obtenir jamais une guérison parfaite, parce qu'il est impossible de reproduire les fibres détruites.

Expérimentant sur des cadavres, M. Bonuzzi a observé que lorsqu'on force les genoux à toucher la tête, on obtient une forte distension de la moelle ; une aiguille fixée dans la moelle se déplaçait en bas, dans la flexion antérieure du cadavre, de 8 à 12 millimètres, et la moelle devenait plus mince et plus résistante. Cette distension est due à la courbe plus longue que la moelle est obligée de suivre à cause de l'incurvation de la colonne vertébrale, qui, avec la flexion, subit un allongement apparent plus grand que dans la suspension. En résumé, avec la flexion on obtient, d'une manière plus active, les effets produits par la suspension ; la flexion est d'une exécution plus facile et ne présente pas les inconvénients de ce dernier traitement.

M. Bonuzzi a soumis à son traitement un malade qui souffrait de douleurs fulgurantes et dont la locomotion ataxique était bien caractérisée. On exécutait la flexion en portant, comme il a été dit, les genoux de la malade, étendue sur le lit, jusqu'à sa tête, et maintenant cette position pendant une demi-minute au commencement, et trois minutes ensuite. Après trois séances, les douleurs s'apaisèrent, pour disparaître complètement après huit séances ; l'état de la malade présentait une amélioration remarquable dans la locomotion, dans la transmission des sensations, etc.

— Encore à l'Académie de médecine, M. Zeri a présenté un intéressant travail où il décrit les recherches qu'il a faites pour reconnaître si l'agent pathogène de la *malaria* peut pénétrer dans l'organisme par la voie du tube gastro-entérique. Il est ordinairement admis que la pénétration des germes a lieu par les voies respiratoires ; mais, d'autre part, une croyance populaire très répandue dans les pays où sévit le paludisme, dit que l'on peut attraper la fièvre en buvant de l'eau puisée dans les terrains marécageux. Les anciens médecins, Hippocrate en tête, ont accepté cette opinion sans la discuter, en s'appuyant sur des observations qui, aujourd'hui, se trouvent en contradiction avec les

récentes découvertes sur la nature et sur la production des fièvres palustres.

Pour résoudre cette question d'une manière décisive, M. Zeri a pensé à recourir à l'expérience directe, en faisant absorber à des individus en bonnes conditions hygiéniques de l'eau prise dans des localités où dominent les fièvres palustres. On a exécuté ces expériences à l'hôpital de S. Spirito, à Rome ; mais ni les ingestions, ni les inhalations, ni les injections d'eau palustre ne produisirent le plus léger symptôme de fièvre. Cette conclusion est réconfortante ; elle démontre que la tradition populaire se trouve en défaut, et que l'eau potable ne peut être considérée comme un véhicule de l'infection palustre.

— La Société italienne des Sciences, dite des XL, a publié le tome VII de ses *Mémoires*. De cette importante publication, nous nous bornerons, pour le moment, à signaler un long et remarquable travail de MM. Manfredi, Boccardi et Jappelli sur le ferment invertif de l'organisme animal. Il y a deux cents ans, Leuwenhoek signalait la présence de microorganismes dans la salive humaine, et il les étudiait de la manière la plus complète qu'il était possible de son temps. De nos jours la bactériologie a démontré que de nombreuses espèces de microorganismes se trouvent dans la bouche, dans l'estomac et dans l'intestin. Beaucoup de ces microbes ne restent pas inactifs dans le procès de la digestion et, en produisant des ferments spéciaux ou par suite d'un autre mécanisme plus complexe, ils arrivent à effectuer dans les substances alimentaires des changements identiques à ceux que produisent les sucs digestifs en transformant l'amidon en glucose, les albuminoïdes en peptones, etc. Plusieurs savants déjà, entre autres Miller, Duclaux, Hueppe, Vignal, etc., ont tâché de fixer le travail accompli dans le procès digestif par les cellules glandulaires et par les organismes inférieurs. Mais ces recherches sont longues et difficiles ; les trois auteurs, dont nous analysons le travail, se sont bornés à étudier un point seulement de cette vaste question : la digestion du saccharose.

Après avoir parlé de nos connaissances sur la digestion du saccharose, de ses propriétés, des méthodes mises en œuvre dans leurs recherches, des précautions observées, MM. Manfredi, Boccardi et Jappelli donnent une description détaillée de leurs observations sur les produits de l'intervention, des expériences exécutées sur les diverses muqueuses et sur le foie, et ils arrivent aux conclusions suivantes : L'existence de microorganismes nombreux, capables de produire de l'inversion et de transformer le saccharose en sucre invertif, est démontrée ; leur présence dans le suc entérique est aussi établie. L'origine et la présence du ferment invertif dans l'organisme ont été jusqu'à ces derniers temps l'objet de doutes et d'assertions contradictoires ; la cause de ces incertitudes se trouve dans l'inexactitude des méthodes d'observation dont on se servait et dans la rapidité d'altération du saccharose qui, pour cette cause, renferme toujours plus ou moins de glucose.

Ayant prouvé que l'inversion spontanée est causée uniquement par les germes invertifs de l'air, les auteurs furent obligés de recourir à plusieurs expédients dont ils donnent la description. Ils ont réussi à prouver que, dans l'estomac où manque la végétation des germes invertifs, ne se produit aucune inversion ; l'opinion contraire, admise par plusieurs savants, résulte d'erreurs de technique. Le suc entérique, qui renferme un grand nombre de germes invertifs, renferme encore une grande quantité d'inverse. Chez le lapin, cette substance est produite exclusivement par des microorganismes, et la muqueuse intestinale ne prend aucune part à sa formation. Chez le chien, sans avoir des preuves pour exclure la muqueuse de cette fonction digestive, les observations semblent assigner même provenance au ferment invertif.

Les auteurs ont dû exclure la présence du ferment invertif dans d'autres sucs et d'autres organes ; ils font, à ce propos, une mention particulière du foie

où récemment on a prétendu trouver ce ferment. Des infusions préparées avec tous les organes (à l'exception de la muqueuse gastrique) et les produits des sécrétions (salive) laissées à l'air avec du saccharose, deviennent, dans un temps variable, des milieux de culture des germes inversifs; il se forme de l'inverse,

et dans ces liquides a lieu la transformation du saccharose en sucre interverti.

De plusieurs autres travaux récemment parus, en particulier des sciences mathématiques, nous traiterons dans un prochain courrier.

Ernesto MANGINI.

CHRONIQUE

LES NOUVEAUX TORPILLEURS CHAUFFÉS AU PÉTROLE

Une maison de construction anglaise, MM. W. Doxford et fils vient de construire un torpilleur dont le trait caractéristique est d'être chauffé au pétrole. Cela n'est pas la première fois, tant s'en faut, que l'on expérimente ce genre de chauffe; mais les résultats obtenus jusqu'ici n'avaient pas été assez satisfaisants pour faire passer sur les inconvénients d'un prix de revient plus onéreux et d'un plus grand danger d'incendie. Si l'on s'en rapporte à un article, inséré dans l'*Engineering* probablement à la demande des constructeurs anglais, ceux-ci seraient arrivés au moyen d'un brûleur spécial à obtenir un fonctionnement convenable. Voici d'ailleurs les dispositions qu'ils ont adoptées.

Le fond du torpilleur est double et divisé en huit compartiments servant de réservoirs à pétrole. Le combustible liquide y est aspiré par de petites pompes Worthington qui le refoulent dans une petite caisse où il est soumis à une pression de 2^k,5 environ par centimètre carré; il se rend de là directement dans les brûleurs. La chaufferie contient outre cette caisse un appareil fournissant de l'air comprimé sous une pression d'environ 3 kilog. par centimètre carré, qui sert à pulvériser l'huile quand elle quitte les brûleurs. Chaque jet d'huile donne une flamme claire et brillante qui aurait environ 2^m de long et 23^{cm} de diamètre si elle brûlait seule. Quand les jets, qui sont au nombre de 31, sont réunis, il en résulte une masse brillante de feu d'environ 60^{cm}, de la bouche du fourneau à la plaque à tube.

Nous donnons ci-contre des coupes longitudinale et horizontale de la chaufferie, et des coupes transversales faites l'une au voisinage de la cloison séparant la chaufferie de la chambre des machines, en regardant de l'avant à l'arrière, et l'autre au voisinage de la façade de la chaudière, en regardant de l'arrière à l'avant. On remarquera dans cette dernière coupe les tuyaux d'arrivée des brûleurs à pétrole. Nous signalerons aussi dans ces diverses projections les petits moteurs des pompes de compression d'huile et d'air, ainsi que les caisses où se rendent l'air et le pétrole comprimés.


La flamme ne donne, paraît-il, ni fumée ni escarbilles; il n'y aurait donc jamais à ramoner les tubes. Chaque brûleur peut être fermé individuellement, où tous peuvent être éteints ensemble. Le tout se passe sous la surveillance d'un seul homme.

Voici, au point de vue militaire, les avantages des appareils que nous venons de décrire. D'abord à poids égal, le combustible liquide donne plus de chaleur que le charbon. On peut donc, avec l'huile, augmenter le rayon d'action pour un poids égal, ou pour le même rayon d'action diminuer le poids et augmenter la vitesse. Avec le plein des caisses (14 tonnes de pétrole) et à la vitesse de 10 nœuds, la distance franchissable est de 1800 milles.

L'arrimage du pétrole dans les fonds a deux avantages; il augmente la stabilité et l'espace habitable. Avec les tubes, les torpilles, les canons à tir rapide, pour ne rien dire des hommes d'équipage sur le pont, un torpilleur n'a jamais qu'une faible réserve de stabilité. On l'augmente en remplissant les caisses à huile du torpilleur dont nous parlons, tandis qu'on obtient l'effet inverse en remplissant de charbon les soutes d'un torpilleur ordinaire. — Nous n'insistons pas sur l'avantage évident de la plus grande habitabilité.

En manœuvrant sous vapeur, il peut être souvent

nécessaire de stopper brusquement et de rester immobile pendant un plus ou moins grand laps de temps, en restant prêt à repartir à toute vitesse à un nouveau commandement. Il en résulte pour la conduite de la



Coupes longitudinale et horizontale.



Coupes transversales.

chauffe des difficultés bien connues de tout mécanicien et de tout officier de marine. Si l'on pousse activement les feux, on ne sait comment se débarrasser de la vapeur qu'on produit. De plus au bout d'un certain temps il faut procéder à un dégrassage des grilles, pendant lequel la pression tombe; et si c'est à ce moment que se présente l'opportunité d'agir, on ne peut en profiter. Si l'autre part on laisse tomber les feux, il faut ensuite un certain temps pour les remettre en activité, ce qui augmente d'autant le retard apporté à la production de la quantité de vapeur exigée par la machine, à sa pression de régime. Ces difficultés, sans disparaître entièrement comme voudraient le croire MM. Doxford et fils, si l'on s'en rapporte à l'*Engineering*, sont du moins sensiblement atténuées par le chauffage au pétrole; celui-ci permet soit de maintenir les feux poussés en permanence sans avoir à dégrasser les grilles, soit, si on les a laissés tomber, d'économiser pour la mise en pression et pour la production de régime de la vapeur tout le temps de la mise en activité des feux, laquelle est instantanément obtenue par une manœuvre de robinet.

Les constructeurs ont d'ailleurs mis tous leurs soins à faire en sorte qu'on puisse à volonté éteindre ou allumer brusquement tous les brûleurs sans qu'il en résulte de détérioration et de fuites dans le foyer ou

dans les tubes. La chaudière évite donc dans de certaines mesures les principales causes de destruction et ne vient pas comme sur les autres torpilleurs abrégés par son usure prématurée la vie même du bateau. Notons en passant que les précautions nécessaires ont été prises pour prolonger en conséquence la longévité de la machine.

Avec le chauffage au pétrole, les chauffeurs sont inutiles. Un homme suffit pour veiller aux brûleurs et aux appareils de pompage de pétrole et d'air. L'avantage de n'avoir pas à charger les foyers par mers dures, surtout du travers, est incontestable. Il n'y a pas à manipuler le charbon et la propreté du bateau y gagne. Il n'y a pas à ramoner les tubes.

Comme conclusion, MM. Doxford et fils affirment que le système de chauffage avec combustible liquide qu'ils ont adopté est le seul applicable aux torpilleurs. Ceci tiendrait principalement à l'emploi de l'air comprimé au lieu de vapeur pour pulvériser le pétrole. Il y a, disent-ils, beaucoup de systèmes d'injections, mais ils ne sont pas applicables aux torpilleurs à cause de la perte d'eau douce qu'ils entraînent, et qui nécessiteraient la présence de puissants évaporateurs inadmissibles sur ces bateaux.

Si réellement MM. Doxford et fils ont réalisé d'une

façon vraiment pratique le problème qu'ils s'étaient posé, il est de fait que l'emploi du pétrole sur les torpilleurs serait justifié, malgré les inconvénients signalés plus haut de la dépense et du danger d'incendie, par les améliorations apportées à la fois aux aménagements, à la vitesse, et au service de la chaudière. L'avenir montrera si ces constructeurs ont atteint les résultats qu'ils exposent, car dans ce cas, leur système s'imposerait aux puissances maritimes.

Sans attendre jusque là, on ne peut que souhaiter voir la marine française reprendre les essais déjà entrepris dans ce sens tant par les chantiers de l'industrie que par les arsenaux de l'Etat, et réussir à installer ce mode de chauffage sur nos torpilleurs d'abord, puis peut-être sur tous ceux de nos bâtiments dont la petite dimension permet l'emploi de ce combustible plus coûteux, et dont la construction essentiellement métallique ne fait pas craindre les dangers d'incendie. Ce sera un pas de fait dans la voie de l'usage du pétrole sur les navires, et cela nous rapprochera du jour où les machines à vapeur proprement dites seront détrônées par les machines à explosion de vapeur de pétrole, qui, depuis quelque temps déjà à l'ordre du jour, se développent et se perfectionnent sans cesse. X.

CONGRÈS

LE PREMIER CONGRÈS DE L'ASSOCIATION PYRÉNÉENNE A NARBONNE

L'Association pyrénéenne a pour but de grouper les forces intellectuelles locales d'une importante région de la France, et de les faire contribuer par la Science au développement du Midi. Son domaine d'activité est constitué par les trois académies de Bordeaux, Toulouse et Montpellier, du côté nord des Pyrénées; il s'étend à la Catalogne, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à la rive gauche de l'Ebre. Les fondateurs de l'œuvre sont le regretté Julien Lacaze et l'auteur de cet article, auquel est échu l'honneur de la diriger. La *Revue des Pyrénées et de la France méridionale* est devenue l'organe commun de l'Association, qui publiera en outre, tous les ans, un volume spécial relatif à ses congrès. Son premier congrès s'est ouvert le 12 mai dernier à Narbonne sous la présidence de M. le professeur Armand Gautier de l'Institut, un enfant illustre du pays. M. le ministre de l'Instruction publique s'était fait représenter en envoyant un délégué spécial, M. le professeur A. Lebègue de Toulouse. Les membres du Congrès divisés en trois sections : littérature, histoire, archéologie, — sciences, — agriculture et commerce, avaient à traiter 32 questions différentes. Le programme a été rempli au complet. Les questions posées avaient toutes pour but un objet d'intérêt local ou régional. Parmi les sujets les plus importants soumis à la discussion, nous devons signaler dans la première section : les établissements d'Instruction publique dans le Midi de la France avant la Révolution; (abbé Douais). — La constatation d'une école spéciale de sculpture à Narbonne pendant les deux premiers siècles de l'Empire romain (E. Berthomieu). — La voie Domitienne aux environs de Narbonne (Thiers). — La corporation des arts-et-métiers à Narbonne (G. Gros Mayrevielle). — La justice à Poix au xiv^e siècle (F. Pasquier). — Les registres de notaires avant la Révolution et des renseignements qu'ils peuvent fournir pour l'histoire générale ou locale (L. Favatier). — Les registres de paroisses avant la Révolution et les renseignements qu'ils peuvent fournir pour l'histoire générale ou locale (L. Narbonne). — Les tours à forme carrée que l'on rencontre dans le versant sud et dans le versant nord des Pyrénées (Comte de Saint-Saud) etc., etc. — Dans la seconde section, nous pouvons signaler des mémoires sur : L'existence du

Trias aux environs de Narbonne (Jüllian). — Le préhistorique du département de l'Aude (E. Cartailhac). — L'isolement des contagieux à Narbonne (D^r Aussilloux). — La station géodésique de premier ordre des Pyrénées centrales espagnoles (Comte de Saint-Saud). — La brushite (phosphate bibasique de chaux) en quantité exploitable dans la grotte de Minerve (A. et G. Gautier), etc., etc. — Dans la troisième section les mémoires suivants ont donné lieu à d'intéressantes discussions : les eaux minérales de l'Aude (D^r Vaysse). — Les eaux de Rennes, des Bains de Campagne et d'Alet (D^r Garrigou). — L'influence des engrais et du chlorure de sodium en particulier (M. Calmettes). — Les terrains salés (G. Gautier). — Le feldspath comme engrais potassique (J. Gindre). — La fabrication des verdes et des crèmes de tartre (A. Raynal). — Les tarifs des chemins de fer en rapport avec les industries du pays; abaissement des tarifs pour faciliter le commerce de la région (Charriaut). — Des résultats pratiques entraînés par les congrès annuels des diverses sociétés savantes de la région du Midi sur le mouvement intellectuel et sur les recettes des chemins de fer. Du rôle qui s'impose à ceux-ci à l'égard des sociétés savantes qui concourent à l'augmentation de leurs recettes (D^r Garrigou). — La falsification des vins (Chrommydis). — Les vins des vignes inondées et traitées par le sulfate de chaux (R. Favatier). — Les ophtes, nouvelles sources de phosphate de chaux pour l'agriculture (G. Gautier). — Le plâtage de la vendange (Ch. Raynal). — Le chromatomètre (Andrieu). — La concentration du vin (D^r Garrigou), etc., etc., (1).

D^r F. GARRIGOU,
Directeur de l'Association pyrénéenne.

(1) Dans le cours de ses excursions pendant la session à Narbonne, le Congrès a reçu l'accueil le plus confraternel de la part des Sociétés savantes de la Catalogne espagnole.

Le prochain Congrès aura lieu à Bordeaux sous les auspices de la municipalité, pendant les vacances de Pâques de 1891.

La publication in-extenso des mémoires envoyés au Congrès est en ce moment sous presse, elle formera un volume spécial avec planches, que l'on peut se procurer en écrivant au siège de l'Association, au Directeur, rue Valade, 38, Toulouse.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

SUR LA THÉORIE DES RÉGULATEURS

Le problème de la régularisation du mouvement est l'un de ceux qui, depuis un siècle ¹, ont préoccupé le plus vivement les mécaniciens et les ingénieurs; la conservation de la machine y est intéressée; l'économie de force s'y rattache d'une façon intime; la perfection du travail produit en dépend.

De jour en jour d'ailleurs les exigences de la pratique augmentent; la complexité des questions traitées va en croissant et, les mécanismes qu'elles réclament étant plus délicats, la régularité de marche à réaliser est plus grande.

Aussi les inventeurs font-ils de toutes parts assaut d'ingéniosité; les appareils se multiplient; leur nombre est devenu immense.

En même temps les théoriciens, séduits par les problèmes intéressants que fournit la question des régulateurs, accumulent les travaux; chacun adopte un point de vue différent ou met en lumière une propriété particulière; chacun prend le côté de la question qui lui paraît le plus propre à former une théorie complète.

Cette multiplicité de dispositifs et de mémoires, au lieu d'éclairer dans tous ses détails la théorie des régulateurs, l'a rendue tout à fait obscure; il est facile d'en donner la raison: les travaux théoriques, si intéressants qu'ils aient été, les inventions de mécanismes, si ingénieuses qu'elles aient pu être, ont toujours eu le tort de laisser de côté

la relation du régulateur avec la machine; or, c'est là l'idée fondamentale qui doit dominer toutes les recherches, idée que malheureusement on a trop perdue de vue; on a étudié l'appareil à boules et l'on a cru avoir étudié l'appareil de régulation dont il n'est qu'une des parties.

La théorie du régulateur doit être établie en ne le séparant pas des liaisons qui le réunissent à la machine; toute autre manière de faire ne peut conduire qu'à des idées fausses; mais la théorie ainsi comprise présente un degré de complication supérieur au degré de celles qui l'ont précédée; il faut considérer deux mouvements simultanés, celui de la machine et celui du régulateur, au lieu du mouvement unique qui seul intervient pour l'appareil à boules, pris isolément.

Nous n'avons pas la pensée d'aborder cette étude complète dans les deux articles que nous publions à ce sujet; nous voulons seulement montrer comment l'on peut, sans entrer dans le détail d'aucun calcul ni faire la description technique d'aucun mécanisme, présenter la théorie des régulateurs de façon à éviter l'écueil que nous avons signalé et à donner une idée nette du fonctionnement de ces appareils.

1. But et définition des régulateurs. — Les régulateurs sont des appareils qui ont pour objet de maintenir dans des limites aussi rapprochées que possible les variations de la *vitesse moyenne* d'une machine, dues aux modifications que subissent la puissance ou la résistance.

On donne souvent cette définition sous une

¹ Le premier brevet de Watt est de 1769 et sa première « machine à feu » de 1774.

forme plus concise en disant que les régulateurs ont pour but de maintenir la vitesse constante malgré les perturbations de la résistance ou de la puissance.

Pour que la vitesse moyenne d'une machine puisse rester fixe, il faut qu'à cette vitesse il y ait équilibre entre le travail moteur et le travail résistant.

Or cet équilibre peut être troublé pour diverses raisons :

Puissance	Variations dans le niveau de l'eau pour les moteurs hydrauliques.	Variations généralement peu importantes.
	Variations dans la pression de la chaudière pour les moteurs à vapeur.....	
Résistance	Les outils commandés fonctionnent d'une manière intermittente...	Ce sont les perturbations les plus importantes et les seules même qu'il y ait lieu, en général, de considérer.
	On débraye des outils en marche.....	
	On embraye des outils au repos.....	

De ces différentes causes résultent des variations de vitesse dont les effets deviennent nuisibles quand elles dépassent certaines limites, et qu'il faut dès lors éviter.

On peut rétablir l'équilibre troublé entre les travaux moteurs et résistants sans changer la vitesse moyenne, en agissant sur l'un ou l'autre des deux termes : puissance ou résistance. Si, par exemple, on a débrayé des outils en marche, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter la vitesse, on la ramènera à sa valeur primitive soit en augmentant la résistance de ce dont elle a été diminuée, soit en diminuant la puissance d'une quantité convenable.

Mais entre ces deux procédés équivalents en théorie, il n'y a pas à hésiter en pratique ; le plus avantageux évidemment, au point de vue de l'économie de force dépensée, consiste à ne pas créer de résistances supplémentaires et à régler la puissance suivant le travail à effectuer ; on réserve, en général, le nom de *régulateurs* aux mécanismes qui agissent de cette manière.

On a ainsi la définition des régulateurs :

Les régulateurs sont des appareils qui règlent automatiquement la force dépensée, de façon à maintenir à peu près constante la vitesse moyenne du moteur, malgré les variations de la résistance ou de la puissance.

2. *Différence entre le rôle du régulateur et celui du volant.* — Le volant, que tout le monde connaît, agit aussi pour régulariser le mouvement ; mais son action est tout à fait distincte de celle du régulateur : il ne s'adresse pas aux mêmes causes d'irrégularité ; il n'a d'influence que sur les variations

momentanées de vitesse ; il régularise le mouvement quand celui-ci est déjà périodiquement uniforme et diminue l'écart des vitesses extrêmes qui existent pendant la durée de la période ; mais il est sans effet pour maintenir la vitesse moyenne d'une période à une autre quand la résistance varie ; il peut bien, en cas de perturbation, rendre moins brusque le passage d'un état de régime au suivant, mais il est incapable de modifier en rien la vitesse que prendra la machine dans son nouvel état d'équilibre.

On peut résumer cette différence d'action du régulateur et du volant en disant : *le volant agit sur les oscillations de la vitesse autour de sa valeur moyenne ; le régulateur, au contraire, agit sur la vitesse moyenne que font varier les perturbations survenues dans le régime.*

On verra plus loin une corrélation entre le régulateur et le volant ; ces deux appareils ont une relation intime qui ne permet pas de les établir, comme on l'a trop souvent fait, indépendamment l'un de l'autre.

3. *Dispositif le plus simple d'un régulateur. Régulateur de Watt.* — Le régulateur le plus simple et qui peut être regardé comme constituant le point de départ des appareils actuels est le régulateur de Watt¹.

Il comprend comme organe essentiel un pendule conique muni d'un manchon ou chape mobile le long de l'axe de rotation ; ce manchon suit les mouvements d'ascension ou de descente des boules et est en relation avec la valve d'admission de la vapeur.

L'appareil présente l'une ou l'autre des dispositions indiquées dans les figures 1 et 2.




Fig. 1.

Les boules reçoivent leur mouvement de rotation de la machine même ; la liaison avec la valve

¹ D'après Thurston (*Histoire de la machine à vapeur*, par R.-H. Thurston, revue et annotée par J. Hirsch), le dispositif employé par Watt pour la machine à vapeur aurait déjà été appliqué, avant lui, à des roues hydrauliques et à des moulins à vent.

est telle que cette valve se ferme quand les boules montent et s'ouvre quand elles descendent.




Fig. 2.

4. *Jeu de l'appareil de Watt.* — D'après les propriétés connues du pendule conique, quand la vitesse de rotation reste constante, les boules se tiennent à une hauteur qui est toujours la même pour une même vitesse et qui est d'autant plus grande que la vitesse de rotation est elle-même plus grande.

Le régime permanent étant établi, supposons que, par suite d'une perturbation quelconque, la résistance diminue, par exemple; cette résistance devient ainsi inférieure à la puissance, la vitesse de la machine augmente, le régulateur tourne plus vite, les boules montent et le manchon qui s'élève avec elles fait mouvoir la valve de façon à réduire l'ouverture du tuyau d'admission et à diminuer, par suite, la quantité de vapeur qui pénètre dans la machine.

Le dispositif de Watt a donc pour premier effet de s'opposer aux variations de vitesse que tend à produire une perturbation, c'est-à-dire qu'au début il agit bien dans le sens voulu; mais cela ne suffit point à prouver qu'il parvient à rétablir la vitesse ou à amener un nouvel état de régime comme on le désire. En d'autres termes, et si l'on nous permet une forme familière qui met bien l'idée en relief, cela prouve que le régulateur est animé de bonnes intentions, mais non qu'il atteint son but.

Il faut d'ailleurs bien remarquer que, d'après le principe même de l'appareil, on ne peut faire renaître l'état permanent détruit par une perturbation, qu'en changeant la vitesse du régime, car si la résistance diminue, il faut diminuer d'autant la puissance, c'est-à-dire fermer en partie la vanne; on doit par conséquent faire occuper aux boules la position donnant cette fermeture partielle et, par suite, avoir comme vitesse de régime la vitesse qui correspond à cette position. Nous reviendrons plus

loin sur ce fait qui constitue l'imperfection capitale du régulateur de Watt¹.

3. *Appareils dérivés de celui de Watt.* — Ce qui précède indique d'une façon sommaire le mode de fonctionnement de l'appareil primitif de Watt; tous les autres appareils de régulation agissent à peu près de même; on peut dire, en général, qu'un mécanisme de régulation a pour organe principal un appareil susceptible de changer de forme avec la vitesse de la machine et dont on utilise les changements de forme pour diminuer la quantité de force dépensée quand la vitesse augmente, pour l'augmenter quand la vitesse diminue.

Cet appareil de forme variable est, le plus souvent, un appareil à masses tournantes plus ou moins analogue au régulateur de Watt; il est alors désigné sous le nom générique de régulateur à force centrifuge.

Dans quelques cas, au contraire, on emploie un réservoir de capacité variable où la machine refoule soit de l'eau (régulateur à pompe et à flotteur), soit de l'air (régulateur à air de Molinié, régulateur pneumatique de Larivière).

Quant à la quantité de force dépensée, on la règle de diverses manières suivant les cas; ainsi, dans les machines à vapeur on agit tantôt directement sur la prise de vapeur, comme l'a fait Watt en étranglant le conduit d'amenée, tantôt sur la détente en la prolongeant plus ou moins², comme l'a imaginé Zachariah Allen en 1834.

Ces divers appareils, dont le nombre est devenu considérable, ont été imaginés pour remédier aux inconvénients que présente le régulateur de Watt.

6. *Inconvénients de l'appareil de Watt.* — Ces inconvénients sont de deux sortes :

1° L'appareil de Watt n'empêche pas les variations de la vitesse de régime; il ne fait que les réduire.

2° Il ne peut surmonter que de faibles résistances et n'est susceptible d'être appliqué qu'à des organes tels que le papillon de Watt exigeant peu d'efforts pour être mis en jeu.

Il faut étudier successivement ces deux points.

¹ Cette imperfection est, il faut bien le remarquer, essentielle au jeu de l'appareil et tous les régulateurs basés sur le même principe, c'est-à-dire presque tous ceux qui existent, n'y échapperont pas; elle se produit chaque fois que la position de la valve ou de la came de détente est uniquement fonction de la position des boules ou de la pièce mobile dont on utilise le déplacement sous l'action de la vitesse.

² On emploie de plus en plus aujourd'hui, pour les machines à grande vitesse dont l'usage devient chaque jour plus fréquent, des régulateurs montés directement sur l'arbre du volant et agissant sur l'excentrique du tiroir de détente : Régulateurs Hartnell, Turner, Perrine, Eric-City, Phoenix, Rice, etc.

Ce système impose au régulateur une fatigue très grande et exige un frein à huile ou à graisse d'une grande puissance qui ne fonctionne pas toujours très bien.

7. *Variations de la vitesse du régime.* — En se reportant à ce qui a été dit précédemment, § 4, on voit qu'à chaque position du manchon correspond une ouverture de vanne déterminée et une vitesse de régime également déterminée, de telle sorte qu'à toute variation de la résistance ou de la puissance correspond forcément une variation de la vitesse.

Il en résulte que l'appareil de Watt est plutôt un *modérateur* qu'un régulateur dans le sens que nous avons donné à ce mot.

Ce défaut, qui est capital lorsqu'on se propose de rendre la vitesse aussi constante que possible, provient, comme nous l'avons vu, de ce que la vitesse de régime varie avec la position du manchon; il semble donc, à première vue, qu'on peut y remédier en remplaçant le pendule conique primitif par un appareil dont la vitesse d'équilibre soit la même quelle que soit la position du manchon qu'il commande.

C'est la recherche de cet appareil à équilibre indifférent, désigné d'ordinaire sous le nom de régulateur isochrone, qui a pendant longtemps occupé les mécaniciens. Nous allons indiquer sommairement la suite des idées qui se sont succédé dans leur esprit.

8. *Régulateurs isochrones.* — Si l'on cherche à quelle condition une boule du régulateur est en




Fig. 3.

équilibre, pour une vitesse déterminée, en tous les points d'une courbe que parcourt son centre, on trouve que cette courbe doit être une parabole dont l'axe se confond avec celui du régulateur.

Théoriquement donc, on aura un régulateur isochrone pour une vitesse de régime donnée en assujettissant le centre de la boule à parcourir la parabole qui correspond à cette vitesse. Dans ces conditions, le régime étant établi, si la résistance diminue, par exemple, la vitesse croît, le manchon monte, la valve se ferme partiellement, la puissance diminue et la vitesse est alors ramenée à sa première valeur, sans que le régulateur ait besoin pour cela de retourner à sa position primitive puisqu'il est en équilibre, pour la vitesse considérée, en toutes ses positions. La valve peut ainsi garder l'inclinaison qui maintient la réduction convenable de la puissance.

On a réalisé ce dispositif dans le régulateur de Franke (fig. 3) où les boules sont réunies à des galets assujettis à parcourir des guides paraboliques, mais on a dû y renoncer en raison des frottements considérables qui se produisaient.

Farcot a alors eu l'idée tout à fait pratique de sacrifier un peu d'exactitude pour obtenir moins de complication et de résistances passives; il a remplacé la parabole théorique par son cercle osculateur dans la position moyenne que doit occuper le centre de chaque boule et a ainsi obtenu le régulateur à bras croisés (fig. 4) qui est, à très peu près, isochrone.

L'isochronisme approché s'obtient encore de bien des manières, et un grand nombre d'appareils ont été imaginés pour le réaliser; dans les uns, il est obtenu par un contrepoids (Charbonnier, Meyer,




Fig. 4.

Tchebychef), dans les autres par des ressorts (Foucault); on peut aussi substituer aux boules ordinaires des systèmes de masses réparties d'une façon convenable (Rolland, régulateur à boules conjuguées) ou employer des ailettes (Yvon-Villarceau).

9. *Inconvénients pratiques de l'isochronisme absolu.*

— Pendant une longue période de temps on fut ainsi, dans la mécanique appliquée, à la recherche de l'isochronisme absolu; c'était là une erreur. L'isochronisme parfait que l'on voulait atteindre par les appareils précédents était en réalité incompatible avec le mode de fonctionnement des régulateurs employés.

Il ne suffit pas en effet qu'un appareil de ce genre remplisse le but voulu, qu'il puisse rester en équilibre quand la vitesse de la machine est celle que l'on cherche à réaliser, ni même qu'il ne puisse rester en équilibre que pour cette vitesse; il faut encore, et c'est là son objet principal, que si l'état de régime de la machine est rompu, c'est-à-dire si la vitesse vient à varier par suite d'une perturbation, il rétablisse la constance de la vitesse au bout d'un temps relativement court et après un nombre limité d'oscillations en réglant la puissance d'après la nouvelle valeur de la résistance.

Il faut, en d'autres termes, que si on considère l'ensemble mécanique formé par la machine et le régulateur, chaque état de régime possible soit un état d'équilibre stable, c'est-à-dire un état vers lequel l'ensemble retourne de lui-même si on l'en écarte et auquel il arrive rapidement.

A ce point de vue, l'appareil primitif de Watt, tout en ne donnant pas à la vitesse de régime une constance suffisante pour les besoins actuels, était entièrement satisfaisant et remplissait bien le but cherché.

Si l'on étudie, en effet, le régulateur en lui-même, indépendamment de la machine, chaque position des boules constitue pour elles, à une vitesse déterminée, une position d'équilibre stable, en ce sens que si on les en écarte, sans changer la vitesse de rotation, elles y reviennent sous l'action des diverses résistances qui, en pratique, éteignent peu à peu leurs oscillations¹. D'un autre côté, la vitesse d'équilibre varie d'une manière continue avec la position des boules, de telle sorte qu'à une petite variation de vitesse correspond une petite variation de la position.

Dans ces conditions, si l'on suppose que, l'ensemble de la machine et du régulateur étant à un état de régime, cet état vienne à être troublé par une diminution de la résistance, par exemple, alors la vitesse augmente, la valve se ferme sous l'action des boules qui s'écartent et celles-ci s'approchent de la position qui convient à l'état nouveau. Il est bien clair qu'en raison même de la masse des boules, elles n'arrivent pas exactement à cette position et qu'elles ne peuvent théorique-

ment l'atteindre sans la dépasser; mais si le volant de la machine est assez puissant pour que l'accélération reste très faible, les boules arrivent à la position d'équilibre avec une vitesse acquise assez petite pour ne pas la dépasser sensiblement; et comme c'est une position d'équilibre stable, elles y sont ramenées rapidement et l'état de régime est vite rétabli.

Il en est de même pour le cas d'une augmentation de la résistance.

C'est ce que l'expérience confirme et l'on constate en pratique que l'état de régime est reconstitué, soit immédiatement, soit après un petit nombre d'oscillations, alors même que la variation de résistance a été considérable.

Les appareils isochrones se comportent tout différemment.

Tout d'abord, si on les considère isolément, il est bien évident que puisque les boules sont en équilibre indifférent en un point quelconque de leur course, toute position de ces boules cesse d'être pour elles une position d'équilibre stable; d'autre part, il est facile de comprendre qu'elles passent brusquement d'une extrémité à l'autre de leur course pour une petite variation de vitesse.




Fig. 5.

Dans ces conditions, sous l'influence d'une perturbation quelconque, même faible, les boules tendent à parcourir toute la course qui leur est laissée sans s'arrêter à la position d'équilibre voulue et

¹ Sans ces résistances, les boules oscilleraient indéfiniment autour de leur position d'équilibre, à la manière d'un pendule.

c'est en quelque sorte l'effet du hasard, ou plus exactement l'effet des circonstances initiales, si elles se rencontrent avec la machine dans cette position.

L'isochronisme est ainsi incompatible avec l'agencement général de l'appareil de régulation et les appareils isochrones communiquent en quelque sorte à la machine leur propre instabilité.

L'état de régime ne peut plus subsister et la moindre perturbation provoque alors des oscillations indéfinies de la vitesse. Ces oscillations, connues sous le nom d'oscillations à longues périodes¹, ont une amplitude souvent considérable et sont inadmissibles en pratique.

Il faut ainsi éviter les appareils véritablement isochrones que l'on a si longtemps recherchés et qui ne peuvent conduire qu'à des mécomptes; il faut s'approcher de l'isochronisme parfait, mais ne jamais l'atteindre.

De là, l'utilité des mécanismes que l'on peut

appeler *régulateurs à isochronisme approprié* qui, fournissant le degré d'isochronisme qu'on veut, donnent la possibilité de mettre ce degré d'isochronisme en rapport avec l'énergie du volant et les conditions de marche de la machine.

Nous avons fait connaître un dispositif qui réalise ces conditions et qui permet, en même temps, de modifier à volonté la vitesse de régime tout en conservant le degré d'isochronisme obtenu (fig. 3). Un contrepoids Q agit sur le manchon; il peut se mouvoir le long d'une tige qui tourne elle-même autour d'un axe E convenablement placé.

En faisant varier l'inclinaison de la tige, on change le degré d'isochronisme et en déplaçant le contrepoids suivant cette tige on fait varier la vitesse de régime. Ces deux éléments sont ainsi dans la main du mécanicien.

H. Léauté,

de l'Académie des Sciences.

(La fin au prochain numéro.)

LE GRISOU ET SES ACCIDENTS

Dans un précédent numéro² de la *Revue générale des sciences*, M. Charpy a résumé d'une façon très claire les recherches expérimentales des commissions françaises du grisou. Mais en présence des résultats annoncés, le lecteur doit demeurer perplexe. Comment avec des lampes parfaites, des explosifs très sûrs, peut-il encore se produire des accidents aussi terribles que ceux qui désolent d'une façon périodique le bassin houiller de Saint-Étienne? L'art de l'ingénieur est-il vraiment impuissant devant de semblables désastres? Faut-il se contenter de les enregistrer, en espérant qu'à l'avenir la chance sera plus favorable?

Les expériences des commissions du grisou, aussi bien que les recherches incessantes des inventeurs se rapportent à un ordre de faits, dont l'importance est relativement secondaire au point de vue de la sécurité des mines. Les idées les plus fausses ont cours à ce sujet dans le public, qui espère la découverte d'une panacée infaillible contre le grisou. En fait, la sécurité dans une mine dépend surtout de son aérage; elle sera toujours,

quelque découverte que l'avenir nous réserve, à la merci de l'ingénieur qui dirige son exploitation; Dès aujourd'hui la sécurité dans une mine bien tenue est déjà très grande; le seul rôle auquel puissent prétendre les inventeurs paraît se réduire à fournir des procédés un peu plus économiques, pour l'assurer.

Un exemple suffit à montrer quel est le problème des mines à grisou, et les solutions qu'il comporte, celui d'un atelier de pyrotechnie. De la nature des matières traitées résulte une cause générale de danger, et la réunion d'un grand nombre d'ouvriers dans le même local en augmente la gravité. Si les matières explosibles disparaissaient de l'atelier, aucune explosion n'y serait à craindre. A défaut, les dangers deviennent moindres par la répartition des ouvriers en petits groupes, occupant des locaux différents. Enfin l'organisation du travail en vue de diminuer sur chaque point les chances d'inflammation restreint la probabilité d'explosion.

Il en est des mélanges gazeux explosifs comme des matières explosives proprement dites. Pour supprimer les accidents du grisou, le moyen le plus efficace consisterait à supprimer les mélanges explosifs que ce gaz forme avec l'air. Cette mesure générale doit être complétée par le fractionnement des chantiers d'ouvriers, puis par des précautions spéciales contre les chances d'inflammation du grisou.

¹ Ces oscillations ont été étudiées, d'abord par M. Rolland pour le cas des machines à vapeur (Mémoire sur l'établissement des régulateurs de vitesse, *Journal de l'École Polytechnique*, XLIII^e cahier), puis par nous, pour le cas des machines hydrauliques (Mémoire sur les oscillations à longues périodes dans les machines actionnées par des moteurs hydrauliques, *Journal de l'École Polytechnique*, LV^e cahier.)

² G. Charpy, Les travaux de la Commission du grisou dans la *Revue* du 15 septembre 1890, page 531.

I

La suppression des mélanges explosifs ne peut être obtenue par la suppression du grisou lui-même ; toutes les tentatives faites pour détruire ce gaz ont échoué et il est permis de croire qu'on n'obtiendra jamais dans cette voie des résultats plus satisfaisants. Le seul procédé efficace consiste à diluer le grisou dans un excès d'air suffisant pour le rendre inoffensif.

Dès que la proportion de grisou mêlée à l'air tombe au-dessous de 5 %, la combustion ne peut plus se propager dans la masse. Il serait pourtant dangereux de se tenir trop près de cette limite supérieure ; la difficulté de réaliser d'une façon parfaite le mélange de gaz de densités très différentes exposerait à avoir, ici un excès de grisou, là un excès d'air, et l'atmosphère de la mine serait toujours explosive en certains points. Mais si l'on arrive à diluer le grisou dans cinquante fois son volume d'air, le danger peut être considéré comme complètement supprimé.

En fait, il n'y a pas de mines, si mal aérées qu'elles soient, qui ne reçoivent une quantité d'air suffisante pour que le mélange sortant renferme moins de 2 % de grisou. Seulement, et c'est là le point délicat, il ne suffit pas que cette condition soit remplie dans le puits de sortie ; il est indispensable qu'elle le soit aussi dans toute l'étendue de la mine. Il faut amener l'air en tous les points des travaux, et l'y amener en quantité proportionnelle à la quantité de grisou qui se dégage en chaque endroit. Cette quantité varie dans les différentes périodes du travail : plus faible pendant les travaux préparatoires, sous-caves, forages des trous de mine, elle augmente brusquement au moment de l'abatage. De plus, elle varie d'un jour à l'autre avec la nature du charbon, la fissuration du toit, les irrégularités de la couche. Pour ne jamais dépasser dans les chantiers la teneur de 2 %, il faut que la quantité d'air qui y pénètre ne soit pas seulement cinquante fois plus grande que le dégagement moyen du grisou, mais au moins cent fois, peut-être deux cents fois plus grande.

Ce n'est pas tout encore ; la couche de houille en exploitation est sillonnée par des galeries se recoupant en tous sens et dont le développement total représente un grand nombre de kilomètres. L'air tend à se précipiter par tous les passages qui lui sont offerts pour se rendre par la voie la plus directe du puits d'entrée au puits de sortie ; les portes, les remblais permettent à grand-peine de le diriger dans sa marche. Quelque effort que l'on fasse, on ne peut jamais faire parvenir aux chantiers qu'une partie de l'air descendu par le puits d'entrée. En raison de ces pertes, il faut envoyer dans la mine une quantité d'air bien supé-

rieure à celle qui semble théoriquement nécessaire pour éviter la formation de mélanges explosifs, et ce résultat ne peut être atteint que par l'emploi des *procédés mécaniques de ventilation*. La ventilation naturelle, autrefois très répandue, aura bientôt, on peut l'espérer, complètement disparu dans les mines françaises. Elle n'offre aucune garantie, étant toujours très irrégulière et s'arrêtant parfois complètement dans la saison chaude.

La ventilation mécanique est indispensable, mais il ne suffit pas qu'elle assure l'entrée dans la mine de la quantité d'air voulu ; il faut aussi que cet air soit réparti convenablement dans les travaux, condition qui ne peut être réalisée que si dès le début de l'exploitation elle a fait l'objet d'une préoccupation constante. Les chantiers doivent être disposés de façon à faciliter l'accès de l'air et éviter les accumulations de grisou dans les parties hautes ; le roulage doit être organisé de façon à ne pas exiger l'ouverture inutile des portes qui règlent la circulation de l'air. Enfin il est nécessaire d'étendre cette aération, non seulement aux régions de la couche actuellement en exploitation, mais encore aux anciens travaux qui n'ont pas été remblayés. Un contrôle incessant, consistant en jaugeages des courants et recherches du grisou, est indispensable pour vérifier l'état de l'aérage. C'est donc là une question extrêmement délicate qui ne saurait être menée à bien que par un personnel technique très expérimenté ; dans une compagnie de chemins de fer, il ne viendrait jamais l'idée de confier l'organisation du service de sûreté à des agents inférieurs ; il en est de même dans une mine : les ouvriers et contre-maitres abandonnés à eux-mêmes sont absolument incapables, non seulement d'organiser l'aérage intérieur, mais même de juger de son bon ou de son mauvais état. C'est aux ingénieurs de la mine et à un personnel placé directement sous leurs ordres que ce soin incombe. Le directeur doit à ses ouvriers de veiller personnellement à leur sécurité au même titre qu'il doit aux actionnaires de sa compagnie de soigner le prix de revient.

II

Dans une mine où l'aérage serait suffisant, convenablement surveillé et dirigé, tout danger d'explosion devrait disparaître. On ne peut atteindre à coup sûr la perfection nécessaire ; il faut compter, en effet, avec l'imprévu, avec les négligences des ouvriers qui laissent les galeries s'obstruer, les accidents aux machines qui peuvent occasionner une suspension de l'aérage ; enfin avec les variations irrégulières et brusques des dégagements du grisou qui peuvent tromper les prévisions de l'ingénieur.

Il pourra arriver ainsi qu'accidentellement la

quantité de grisou vienne à se trouver en excès dans une région de la mine par rapport à la quantité d'air qui lui est raisonnablement allouée. Mais ce dont on peut répondre dans une mine bien tenue, c'est que cette contamination de l'atmosphère ne sera généralement que momentanée et qu'en tout cas au bout d'un temps très court la situation sera redevenue complètement sûre, soit par l'élimination du gaz, soit par l'évacuation des chantiers.

C'est pour diminuer la gravité des accidents restant exceptionnellement possibles, même dans une mine bien aérée, qu'il faut compléter les mesures préventives d'aérage par des mesures préventives de fractionnement des chantiers. On l'assure par la division de la mine en *quartiers indépendants*, se trouvant chacun sur un branchement isolé du courant d'air. Dans des couches voisines de la surface, il est certainement préférable d'avoir un grand nombre de petits centres d'exploitation absolument indépendants les uns des autres. On ne peut y songer par les mines profondes en raison du prix de revient des puits.

Dans celles-ci la division de la mine en quartiers indépendants est faite de façon à permettre l'évacuation la plus directe possible vers le puits de sortie de l'air vicié des chantiers; l'importance de cet isolement des différents ouvrages est capitale, surtout dans les travaux de traçage qui, pénétrant dans un massif de houille encore vierge, sont les plus exposés aux dégagements brusques et abondants de grisou. Elle n'est guère moindre pour les vieux travaux remblayés qui constituent de véritables réservoirs de grisou.

Enfin, quand dans un de ces quartiers la présence du grisou est constatée en quantité dangereuse, à la teneur de 4 % par exemple, quantité qui peut être reconnue avec la lampe par les personnes les moins expérimentées, le travail normal doit cesser en principe jusqu'à l'assainissement complet du point dangereux. Cette cessation obligatoire du travail normal, toujours onéreuse pour l'exploitant, a le grand avantage d'inciter ce dernier à mieux surveiller l'aérage.

Toutes ces précautions prises dans l'organisation du travail pour éviter les accumulations de grisou et les rendre moins dangereuses sont complétées par des mesures d'un autre ordre ayant pour objet d'éviter les *causes d'inflammation* du grisou. Malheureusement ces causes sont en quelque sorte innombrables, et il est impossible de se prémunir contre toutes à la fois. Les plus importantes résultent de l'emploi des explosifs et des lampes, puis viennent ensuite l'emploi des allumettes pour faire du feu ou allumer sa pipe, les inflammations spontanées de houille, etc. A ces causes, il faudra

bientôt ajouter l'emploi de l'électricité comme force motrice dont l'usage tend à se répandre, malgré les dangers spéciaux qu'elle fera courir aux mines grisouteuses.

La statistique des accidents montre que jusqu'à ces dernières années les trois quarts des explosions ont été occasionnées par les explosifs ou les lampes et le dernier quart par des causes diverses. Le danger des explosifs peut être atténué dans une grande mesure par l'emploi des explosifs brisants à basse température d'inflammation. Employés avec un faible bourrage, ils n'ont jamais allumé jusqu'ici les mélanges du grisou aussi bien dans les expériences de laboratoire que dans les mines. Le danger des lampes est pour ainsi dire nul avec les lampes en bon état des types Mueseler, Marsant et Fumat.

Les progrès pouvant encore être réalisés dans la composition et l'emploi des explosifs ou dans les procédés d'éclairage n'augmenteront donc pas sensiblement la sécurité dans les mines, à condition bien entendu que les uns et les autres soient ce qu'ils peuvent, ce qu'ils doivent être dès maintenant.

Les tentatives de perfectionnement poursuivies soit par les inventeurs isolés, soit par les commissions du grisou, n'auront guère d'autre objet que de donner une satisfaction platonique à l'opinion publique. Ce n'est pas à dire pour cela qu'il ne reste rien à faire; il faut chercher des procédés plus simples et moins coûteux qui permettent d'obtenir à moins de frais le même degré de sécurité. Il y aurait intérêt à pouvoir se dispenser du tirage des coups de mine à l'électricité et revenir à un système analogue à celui des mèches; à remplacer dans les explosifs l'azotate d'ammoniaque par un corps moins déliquescent; à construire des lampes s'éteignant et se détériorant moins facilement, etc.

En ce qui concerne les lampes, l'éclairage électrique semble dans un avenir plus ou moins éloigné devoir donner une solution satisfaisante. Mais, en dépit de l'engouement irréflecti dont l'électricité est aujourd'hui l'objet, il ne faut pas espérer faire disparaître les dangers inhérents à tout système d'éclairage. Une ampoule de lampe électrique brisée dans un mélange explosif de grisou l'allume à tous coups comme le fait une flamme de lampe à huile. Il en sera dans les mines comme il en a été dans les théâtres. Après l'incendie de l'Opéra-Comique, un courant violent de l'opinion a exigé la disparition du gaz des théâtres, et aujourd'hui, par une réaction inverse, on en est à se demander si la sécurité a été notablement accrue; il suffit de rappeler à cet égard l'audition de l'Ode Triomphale qui eut lieu au palais de l'Industrie pendant

l'Exposition de 1889 et faillit se terminer par un désastre épouvantable. Actuellement il semble que l'introduction de l'éclairage électrique dans les mines doive constituer un progrès réel; mais l'expérience seule pourra l'établir d'une façon définitive, et on ne sera fixé à ce sujet, qu'après plusieurs années d'expériences pratiques.

III

Comment cependant avec des explosifs et des lampes approchant de la perfection se produit-il encore des accidents si fréquents? A cette question posée tout d'abord une réponse motivée peut être utile. Sans parler des causes d'inflammation du grisou dues à des causes variées, attachons-nous aux accidents produits par les lampes. La lampe Mueseler, dont la sécurité est très grande, est connue depuis cinquante ans; son emploi est depuis longtemps obligatoire dans les mines à grisou belge et pourtant les statistiques y enregistrent de nombreux accidents produits par les lampes. En étudiant le détail des statistiques, on reconnaît que la plupart sont dus à l'emploi de lampes à feu nu dans des mines ou quartiers de mine où l'on ne soupçonnait pas la présence du grisou; les autres sont dus à des lampes de sûreté ouvertes par les ouvriers pour y mieux voir ou les rallumer; crevées ou cassées par accident pendant le travail, ou encore incomplètement fermées par le lampiste. C'est-à-dire que tous ces accidents sont le résultat d'imprudences, négligences ou maladresses et que pour les faire disparaître ce n'est pas le type de lampe qu'il faut perfectionner, mais la nature humaine. Malheureusement ce problème n'est de la compétence d'aucune commission du grisou au monde.

Ce qui est arrivé avec les lampes se reproduira avec les nouveaux explosifs de sûreté; ils ne seront pas employés partout où il y aura du grisou, ils seront allumés avec des mèches ordinaires; ils ne seront pas bourrés; enfin ils seront falsifiés avec de la sciure de bois et de l'azotate de soude pour en abaisser le prix de revient.

Cette influence prépondérante des négligences humaines sur les causes d'inflammation du grisou montre pourquoi c'est bien plus sur l'aérage qu'il faut compter pour la sécurité que sur les mesures préventives relatives à ces causes d'inflammation. Chacun des ouvriers de la mine, qui sont réunis au nombre de plusieurs centaines, parfois de plus d'un millier, peut à chaque instant donner naissance à l'une de ces causes d'inflammation; la probabilité qu'il n'y aura aucune imprudence commise par une foule si grande d'hommes peu instruits est très faible. L'aérage au contraire n'est à la merci que des négligences d'un petit nombre de personnes, ingénieurs et employés spéciaux auxquels on peut demander des garanties

suffisantes comme connaissances techniques et qualités morales, que l'on peut faire contrôler les uns par les autres. Et surtout parmi les imprudences ou les fautes relatives à l'aérage, celles qui ont la plus grave influence sur la sécurité se rapportent à l'organisation générale de la mine et de son aérage; elles semblent pouvoir être toujours évitées par des hommes intelligents qui le veulent.

IV

Il n'a pas été question jusqu'ici de quelques causes de danger dans les mines qui auraient une importance exceptionnelle si l'on devait s'en rapporter au consentement universel en de semblables matières : ce sont les variations barométriques, les poussières, les dégagements instantanés et exceptionnels de grisou. Le crédit qu'on a accordé aux opinions émises à leur endroit s'explique très simplement par une tendance naturelle de l'esprit humain. Quand un directeur de mines, ayant fait ou croyant avoir fait tous ses efforts pour éviter les accidents, en voit un se produire, il est instinctivement conduit à admettre l'intervention d'une cause dont il ne peut être responsable; or les changements du baromètre, la formation des poussières pendant l'abatage du charbon et les dégagements instantanés et exceptionnels de grisou sont évidemment des phénomènes qu'aucune puissance humaine ne saurait empêcher de se produire. Mais il s'en faut que ces causes jouent dans les accidents de mine le rôle important qu'on leur attribue souvent.

Le baromètre a joué il y a une dizaine d'années d'une très grande vogue : on le rendait responsable de tous les accidents. Il avait suffi, pour obtenir des concordances satisfaisantes, d'étendre l'influence des baisses aux trois jours qui précèdent et aux trois jours qui suivent le minimum. De telle sorte que tous les jours de l'année les accidents pouvaient être rattachés à une dépendance barométrique. Aujourd'hui la mode en est passée, on n'oserait plus invoquer le baromètre pour justifier un accident.

Au baromètre ont succédé les poussières. Tous les grands accidents leur ont été attribués. Mais étant donné qu'ils ne se sont jamais produits que dans des mines grisouteuses, on a le droit de rester un peu sceptique. Les accidents authentiques, dus exclusivement aux poussières, sont très rares; ils n'occasionnent jamais d'explosions¹ proprement dites et se réduisent à de simples flambées, c'est-à-dire que la combustion est assez lente pour ne pas provoquer d'élévation notable de pression; aussi les effets mécaniques sont-ils

¹ Il n'en est pas de même, bien entendu, avec toutes les poussières; la poudre de Lycopode, par exemple, donne des mélanges qui semblent aussi combustibles que les mélanges grisouteux.

très faibles et le bruit complètement nul. L'étendue de la flamme ne dépasse guère une cinquantaine de mètres. Les expériences faites pour démontrer le danger des poussières n'ont jamais donné de flammes plus considérables, même dans des galeries artificielles de plus de cent mètres de longueur. Enfin le nombre des victimes est généralement faible.

Dans un accident de poussières récent il y a pourtant eu une trentaine d'ouvriers tués, ce qui semblerait justifier dans une certaine mesure les craintes formulées quant aux poussières. En réalité la gravité de cet accident doit être attribuée non pas tant aux poussières qu'à l'insuffisance de la ventilation qui a rendu possible l'asphyxie de tous les ouvriers d'un quartier. Dans la même mine, à trois jours d'intervalle, l'inflammation d'une cloison de planches par une lampe à feu nu a également amené la mort par asphyxie des ouvriers d'un quartier qui, heureusement, ce jour-là, ne se trouvaient réunis sur ce point qu'au nombre de trois ¹. Tout ce que cet accident permet de conclure, c'est que les poussières sont au moins aussi dangereuses que les morceaux de bois et autres matières de combustibilité analogue.

Quelque minime que soit le danger des poussières dans les mines sans grisou, il faut tâcher de l'éviter et cela est facile. On n'a jamais signalé jusqu'ici de causes d'accidents de poussières autres que le *débouillage* des coups de mine chargés à la *poudre noire*. Cette cause disparaîtra par l'emploi des explosifs à basse température d'inflammation dont la sécurité, très grande vis-à-vis du grisou, semble absolue vis-à-vis des poussières. On cherche souvent aussi à se débarrasser de ces dernières par le balayage ou l'arrosage, mais la mesure d'une efficacité douteuse ne peut s'étendre aux chantiers, c'est-à-dire aux points où elles sont le plus abondantes.

Si on a beaucoup surfait le rôle des poussières comme cause directe d'accidents des mines, on ne peut cependant oublier que leur combustion consécutive aux explosions de grisou en augmente considérablement la gravité par les torrents d'oxyde de carbone formés, qui vont porter l'asphyxie sur tout le parcours des gaz brûlés. Mais ce danger disparaît en même temps que les mélanges explosifs de grisou et seulement de cette façon, l'enlèvement complet des poussières d'une mine étant un problème insoluble.

Aujourd'hui les *dégagements instantanés* de grisou ont la faveur générale pour fournir l'explication des accidents. Depuis le célèbre dégagement du

puits de l'Agrappe (17 avril 1879), chaque fois qu'une explosion se produit en un point où l'on n'avait pas reconnu auparavant la présence du grisou, le plus souvent pour ne pas l'avoir recherché, on dit : il y a dégagement instantané. L'accident est classé sous cette rubrique dans une statistique qui sera imprimée et l'existence du dégagement instantané s'établit ainsi d'une façon définitive.

Pour juger sainement la question, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle dégagement instantané. Tout dégagement de grisou peut être dit instantané, au moins au début, au moment où il vient d'être provoqué soit par l'ouverture d'un soufflard, soit par l'abatage de la houille; la succession de ces dégagements isolés produit comme ensemble un dégagement continu, mais très irrégulier. C'est précisément en vue de ces irrégularités que la ventilation doit être combinée; il n'y a pas là un danger spécial distinct du dégagement proprement dit du grisou.

A côté de ces dégagements instantanés que l'on peut appeler *normaux*, il y a certainement des dégagements instantanés analogues comme origine, mais *exceptionnels* par leur importance et dont on doit faire une classe à part parce qu'ils peuvent, en dépit d'une ventilation normale, rendre explosive l'atmosphère dans une partie des travaux. De semblables dégagements sont assez rares; on ne s'en était jamais préoccupé en France avant l'accident de l'Agrappe et, dans les onze années, qui se sont écoulées depuis on n'en a observé aucun qui puisse, même de très loin lui être comparé. On n'a le droit de parler de dégagements instantanés et exceptionnels que dans des mines où le service de la ventilation et celui du contrôle sont organisés sur des bases telles qu'aucun envahissement progressif de la mine par le grisou ne puisse passer inaperçu. On ne saurait d'ailleurs conclure à un dégagement instantané de ce qu'après une explosion on retrouve des traces de flammes dans des galeries certainement exemptes de gaz quelque temps avant l'accident. Par le fait de l'échauffement des gaz brûlés, le volume de la flamme est environ décuple de celui du mélange explosif; de plus dès le début de la combustion les parties du mélange non encore brûlées sont projetées assez loin avant de s'enflammer et c'est généralement en dehors du point de départ de l'explosion et du centre de l'accumulation du gaz que les effets mécaniques et calorifiques sont les plus intenses.

Ces réserves faites, on ne peut nier cependant l'existence des dégagements exceptionnels. Ils sont dus à ce que le grisou est accumulé dans la houille, et les roches encaissantes sous une pression considérable jusqu'à 30 atmosphères. Grâce

(1) Comme exemple analogue on peut citer la mort des 62 ouvriers dans la mine de Mauricevood (Angleterre), asphyxiés également par suite d'une ventilation insuffisante après une inflammation de planches.

à cette pression énorme, des réserves de gaz enfermées dans des cavités isolées ou dans la masse poreuse du terrain peuvent faire une brusque irruption. Généralement, il se produit un drainage progressif de ces réserves de gaz par les fissures du terrain, de sorte que le gaz sous pression n'est pas mis en contact immédiat avec l'atmosphère, c'est là ce qui rend les grands dégagements instantanés si rares. Mais dans certaines circonstances exceptionnelles mentionnées plus haut, ce contact peut se produire. Au puits de l'Agrappe une veine de houille friable s'est pulvérisée sur une grande longueur sous l'effort de la pression interne du grisou qui y était accumulé. Parfois l'ouverture d'un soufflard dans un terrain compact et non fissuré donne issue au gaz qui était comprimé dans une poche du terrain. Ces dégagements ne sont guère à redouter que dans les travaux en trépage qui doivent toujours être l'objet d'une surveillance spéciale. Une troisième cause de dégagement exceptionnel provient de l'éboulement subit du toit sur une grande étendue. Ce genre d'accident (*Sudden outburst*) assez fréquent dans les mines anglaises, qui sont généralement exploitées sans remblais, peut être évité ou au moins rendu extrêmement rare par l'emploi de méthodes d'exploitation convenables. Contre le danger résultant de ces dégagements exceptionnels la seule mesure efficace est le retrait des ouvriers.

Des trois causes spéciales d'accidents qui viennent d'être passées en revue : variations barométriques, poussières et dégagements instantanés, la première est purement imaginaire, la seconde est insignifiante en l'absence de mélanges explosifs de grisou, la troisième seule est réellement sérieuse, mais elle ne se rencontre heureusement que d'une façon tout à fait exceptionnelle.

V

Toute la question du grisou et de ses accidents peut être résumée en disant que la cause réelle des accidents est celle qui provoque l'accumulation du grisou, et que le seul remède efficace est la suppression de ces accumulations de gaz. Dans l'immense majorité des cas, on peut et on doit par conséquent les éviter. Il semblerait peut-être imprudent, en raison de la possibilité des dégagements instantanés, d'affirmer que dans tous les cas une ventilation convenable assure une sécurité absolue. On ne peut cependant méconnaître que dans les mines françaises même très grisouteuses, où cette importante question de l'aérage a reçu l'attention qu'elle mérite, les accidents graves ont complètement disparu.

Toutes les tentatives faites pour éviter les causes d'inflammation sont certainement intéressantes,

mais d'importance secondaire ; de plus les progrès déjà accomplis sont tels qu'il ne reste plus beaucoup à gagner dans cette voie. Un grand pas a été fait par la découverte des lampes, et des explosifs de sûreté ; il est analogue comme importance à celui qui est résulté dans les chemins de fer de la découverte des freins continus. Mais malgré la perfection de ces freins on ne songerait jamais à laisser les trains de chemins de fer errer à l'aventure en s'en rapportant exclusivement aux mécaniciens pour éviter les accidents ; on ne peut obtenir de sécurité réelle que par une circulation soigneusement réglée des trains. De même dans les mines, les lampes et les explosifs, malgré leur perfection, ne peuvent assurer une sécurité quelconque que si l'aérage est soigneusement organisé. Les lampes comme les freins ne sont qu'une suprême ressource pour les cas désespérés quand on n'a pu éviter la rencontre de deux trains ou l'accumulation du grisou.

VI

Ces quelques notes n'ont d'autre but que de faire œuvre de vulgarisation ; elles ne s'adressent donc ni aux ingénieurs, ni aux directeurs de mine auxquels elles n'apprendraient rien de nouveau, mais seulement aux personnes étrangères à l'industrie des mines. Il n'y a pas besoin d'être du métier pour s'intéresser à des questions aussi graves que celles de la sécurité des ouvriers mineurs et il est important que les idées qui ont cours à ce sujet dans le public ne soient pas trop erronées, car les pouvoirs publics sont nécessairement influencés par les courants de l'opinion.

Les idées émises ici n'ont aucun caractère de nouveauté ; l'importance capitale de l'aérage est enseignée et ressassée dans tous les cours d'exploitation de mines ; elle a été proclamée avec la plus grande netteté par la première commission du grisou dans ses *Principes à consulter pour l'exploitation des mines à grisou*, qui sont la base de la réglementation actuelle des mines françaises. Cette commission composée de savants, ingénieurs du gouvernement et directeurs de mines, a pris l'avis de tous les exploitants de mines en France et n'a eu qu'à formuler les principes qui lui ont semblé découler de leur grande expérience. Presque partout les directeurs de mines, en présence des dangers croissants résultant de l'approfondissement des travaux et de l'intensité toujours plus grande de l'exploitation, ont pris l'initiative d'organiser leur aérage conformément à ces principes. Là où exceptionnellement cette initiative n'a pas été prise ou n'a été prise qu'incomplètement, les améliorations indispensables doivent être rigoureusement imposées.

H. Le Chatelier,

Ingénieur en chef des Mines.

REVUE ANNUELLE DE PHYSIOLOGIE

Je tiens à signaler, au début de cette revue, un événement scientifique qui intéresse vivement les progrès de la physiologie : c'est l'organisation récente d'un congrès international de physiologistes. L'initiative est due à la *Physiological Society* de Londres. La Société de physiologie anglaise adressait, le 19 mars 1888, une première circulaire-invitation à 109 professeurs de physiologie. A la suite de cette démarche, une réunion préparatoire eut lieu à Berne le 10 septembre 1888. La France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie furent représentées à cette réunion : on y décida que le premier congrès international de physiologie se tiendrait à Bâle l'année suivante, et on y nomma des délégués pour les différents pays. Ce furent : MM. les professeurs Bowditch (Boston), Dastre (Paris), Engelmann (Utrecht), S. Exner (Vienne), Héger (Bruxelles), Heidenhain (Breslau), Holmgren (Upsala), Kronecker (Berne), Miescher (Bâle), Morat (Lyon), Mosso (Turin) et Yeo (Londres). Ces délégués auxquels furent adjoints MM. Foster et Gaskell (Cambridge) et Hering (Prague) constituèrent un comité provisoire d'organisation, qui fut ultérieurement confirmé comme comité directeur définitif, sous la présidence du professeur Miescher de Bâle.

Le premier congrès de physiologie s'est réuni à Bâle du 10 au 12 septembre 1889, dans les locaux du *Bernoullianum* (nouvel Institut de physique et de chimie) et du *Vesalianum* (nouvel Institut d'anatomie et de physiologie). Il comptait 129 membres : Allemagne, 26; Suisse, 25 (dont 12 de Bâle); France, 19; Angleterre, 19; Italie, 10; Autriche-Hongrie, 8; Belgique, 6; États-Unis d'Amérique, 6; Russie, 4; Suède, 3; Pays-Bas, 1; Portugal, 1; Roumanie, 1.

Parmi les dispositions réglementaires de ce congrès, il en est une qui constitue une véritable innovation : il a été décidé que les réunions n'auraient pas pour but la publication de recherches ou de faits inédits (il existe pour cela suffisamment de revues spéciales — voir plus loin); et que, par conséquent, il ne serait pas publié de bulletin officiel des séances. Les communications faites aux congrès, doivent principalement servir à l'enseignement mutuel des membres, et présenter, autant que possible, un caractère démonstratif et expérimental. Ce programme a été fidèlement exécuté; et l'on peut dire que les conférences et dissertations théoriques, qui d'ordinaire constituent le fond de l'activité des congrès scientifiques, ont tenu peu de place dans les travaux des physiologistes réunis à Bâle. Par contre, on y a vu fonctionner,

dans les meilleures conditions, une grande variété d'appareils; et on y a assisté à nombre d'expériences intéressantes. Aussi a-t-il été décidé unanimement que le Congrès de physiologie se réunirait tous les trois ans. La prochaine session se tiendra dans une ville de langue française, de Belgique ou de Suisse, dont le choix est laissé au comité directeur.

Il est inutile d'insister sur les avantages que présentent ces réunions, étant données la complication de la technique et la variété des méthodes expérimentales, ainsi que le nombre considérable des centres de recherches physiologiques.

Il existe actuellement une dizaine de revues que l'on peut considérer comme principalement consacrées à la publication des recherches de physiologie; le nombre des recueils périodiques qui donnent régulièrement des travaux de physiologie, concurremment avec des mémoires se rapportant à d'autres sciences, s'élève certainement à plus du double. Si l'on y ajoute les thèses et les dissertations imprimées à part, les travaux égarés dans les innombrables journaux de médecine et autres, on arrive chaque année à un total de plus d'un millier de publications de physiologie. Comment s'y prendre pour faire un choix dans cet amas menaçant et sans cesse grandissant de publications nouvelles? Le spécialiste lui-même ne pourrait tout lire. Heureusement, les physiologistes possèdent depuis 1857, les *Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie*, fondés par Henle et Meissner et continués sous la direction de Schwalbe et Hofmann. Dans ces comptes rendus annuels des progrès de la physiologie et de l'anatomie, se trouvent analysées, ou tout au moins signalées, la plupart des publications parues chaque année dans ces deux sciences. Il en est de même dans la partie physiologique des *Jahresberichte* du Canstatt (continués sous la direction de Virchow-Hirsch), consacrés aux progrès des différentes branches de la médecine. Les *Jahresberichte über Thierchemie*, publication similaire dirigée par R. Maly, sont encore plus complets et plus détaillés, mais ne traitent que des travaux de chimie physiologique. On trouve également des résumés des nouveautés physiologiques les plus intéressantes dans plusieurs recueils de médecine, parmi lesquels il faut citer en première ligne la *Revue des Sciences médicales* de Hayem. Enfin, depuis trois ans, les physiologistes possèdent un organe central, pour ainsi dire international, le *Centralblatt für Physiologie*, qui paraît tous les quinze jours sous la direc-

tion des professeurs Sign. Exner de Vienne et Joh. Gad de Berlin, avec la collaboration de physiologistes de tous les pays.

Grâce à ces différentes publications, il est assez facile de s'orienter rapidement sur n'importe quel sujet spécial de physiologie, et de faire le relevé de ce qui a paru soit pour une année déterminée, soit pour une période plus longue. Le défaut de ces comptes-rendus annuels, c'est qu'ils paraissent nécessairement en retard d'une ou plusieurs années sur la date des travaux qu'ils analysent. Je n'ai donc pas la ressource de les utiliser pour cette revue consacrée aux progrès de la physiologie en 1889. Je ne pourrais d'ailleurs songer à signaler tous les travaux de valeur parus l'année dernière. Il y faudrait un gros volume, au lieu des quelques pages dont je dispose ici. Je dois nécessairement faire un choix, et m'excuser d'avance, si dans ce choix, je montre une certaine partialité, et m'arrête un peu plus longuement, aux sujets dont je me suis personnellement occupé dans ces dernières années.

Un autre reproche que l'on fera peut-être à cette revue, c'est de présenter peu d'idées générales, de manquer de cohésion, d'homogénéité; et de traiter successivement et sans transition, une série de sujets absolument disparates. Mais il ne faut pas oublier que la physiologie, c'est-à-dire la physique et la chimie des êtres vivants, n'est pas une science homogène, se prêtant à des aperçus généraux. Chacun de ses chapitres constitue un monde à part, une science qui possède ses méthodes, ses traditions et qui ne présente qu'un petit nombre de points de contact avec les disciplines voisines. Il est rationnel de traiter séparément de chacun de ses chapitres : sang, circulation, respiration, chaleur animale, digestion, nutrition, innervation et mouvements, génération.

I. — SANG

Les propriétés des matières albuminoïdes et principalement celles des combinaisons de la matière colorante du sang, l'hémoglobine avec les gaz oxygène, anhydride carbonique et oxyde de carbone ont fait l'objet de recherches intéressantes et délicates dont il serait difficile de donner une idée, sans entrer dans des détails par trop minutieux (travaux de Drechsel, Chittenden, Neumeister, Hoppe-Seyler, Hüfner Jolin, etc.). Danilewsky a donné une description des nombreux parasites microscopiques, qui se rencontrent pour ainsi dire normalement dans le sang de beaucoup d'animaux.

La question de la coagulation du sang continue à passionner les physiologistes. On sait que le sang, dès qu'il s'épanche en dehors des vaisseaux, ses

réservoirs naturels, se prend rapidement en une gelée cohérente, se coagule, par suite de la formation d'une substance solide, la fibrine. Cette fibrine dérive d'une matière albuminoïde préexistante, connue sous le nom de fibrinogène, et dissoute dans la partie liquide du sang ou plasma. Alex. Schmidt a montré qu'il s'agit d'un phénomène de fermentation. Le ferment qui transforme le fibrinogène dissous, en fibrine solide, ne préexiste pas dans le sang; il se forme aux dépens des globules blancs, chaque fois que ces globules viennent en contact avec un corps étranger autre que la paroi lisse qui tapisse l'intérieur des vaisseaux. Ainsi s'explique la fluidité persistante du sang qui circule dans l'organisme, et sa prise en gelée, dès qu'il sort des vaisseaux et qu'il subit le contact d'un corps étranger (le vase dans lequel on le reçoit). Cette théorie de la coagulation, accueillie avec faveur par bon nombre de physiologistes, fut vivement attaquée par d'autres. E. Freund de Vienne avait découvert que le sang, extrait des vaisseaux, reste liquide si les tubes employés dans la saignée, ainsi que les vases dans lesquels on le recueille, sont recouverts d'une couche de matière grasse : huile, vaseline, etc. Il n'y avait là rien de contraire à la théorie d'Alexandre Schmidt : il suffisait d'admettre que les globules blancs sont indifférents au contact des surfaces grasses, comme ils le sont à celui de la paroi vasculaire. Ce fait fut le point de départ d'expériences qui conduisirent E. Freund à une conception toute différente du phénomène de la coagulation du sang et du rôle qu'y jouent le contact des corps étrangers et les globules du sang. Pour lui, le passage du fibrinogène à l'état solide et sa transformation en fibrine sont provoqués par la formation, au sein du plasma sanguin, d'un précipité de phosphate de calcium. Le précipité lui-même est dû à la réaction de la chaux préexistante dans le plasma, avec les phosphates solubles des globules. Ces phosphates seraient retenus dans les globules, tant que ceux-ci n'adhèrent pas à un corps étranger. Dès que l'adhérence se produit, les phosphates sortent des globules, précipitent la chaux du plasma et entraînent la solidification du fibrinogène.

Les expériences de Freund ont été reprises par Latschenberger à Vienne et par Ph. Strauch à Dorpat (laboratoire d'Alex. Schmidt). Tous deux arrivent au même résultat : la précipitation du phosphate de calcium, qui accompagne la coagulation du sang, est un fait connu depuis longtemps et parfaitement exact : mais cette précipitation ne doit en aucune façon être considérée comme la cause de la coagulation. Une solution de fibrinogène peut être conservée liquide indéfiniment, malgré l'addition de chlorure de calcium et de phosphates alca-

lins, et malgré la formation de phosphate de calcium. Au contraire, cette solution se coagule dès qu'on y ajoute une solution de ferment coagulant, ou un peu de sérum (liquide contenant le ferment). Cette seule expérience suffirait à condamner la théorie de Freund : elle ne s'explique que dans celle d'Alex. Schmidt. Nous pouvons donc, jusqu'à preuve du contraire, continuer à considérer cette dernière comme répondant le mieux aux faits connus jusqu'à présent.

II. — CIRCULATION

Généralités. — A mon avis, l'étude des phénomènes mécaniques de la circulation du sang, loin de progresser dans ces dernières années, a plutôt fait un pas en arrière. On pouvait croire la science fixée sur les différentes phases de la pulsation cardiaque, et sur les rapports que ces phases présentent avec celles de la pulsation des artères, par les mémorables recherches de Chauveau et Marey, exécutées au moyen d'appareils enregistreurs d'une grande perfection et sur un animal qui se prête admirablement à ces recherches, à cause de la lenteur de ses pulsations, le cheval. Les résultats classiques de ces recherches qui datent d'un quart de siècle, et l'interprétation des tracés cardiographiques et sphygmographiques sont depuis plusieurs années, en Allemagne, l'objet de vives controverses, auxquelles l'année 1889 a apporté son contingent habituel. Signalements, comme confirmant en tout ou en partie l'interprétation de Chauveau et Marey, les expériences d'Edgren, de Hürthle, et celles de Hoorweg.

Au contraire, F. Martins, von Frey ont été conduits, à la suite de recherches faites sur l'homme ou le chien, à une conception toute différente des rapports qui existent entre les phases des pulsations cardiaques et vasculaires. Nul doute que l'accord se fera dans le sens de l'interprétation de Chauveau et Marey, le jour où les physiologistes dissidents renonceront à expérimenter sur des animaux de petite taille, ou sur l'homme, et se décideront à prendre le cœur du cheval comme sujet de leurs études.

En ce qui concerne les appareils enregistreurs servant à ces recherches, on peut signaler en Allemagne des progrès notables réalisés dans ces dernières années. Au lieu du manomètre à mercure employé presque exclusivement, l'usage des manomètres élastiques tend à se répandre de plus en plus. C'est ainsi que Hürthle, Gad ont présenté au congrès de Bâle des modèles perfectionnés d'enregistreurs, permettant d'inscrire les phases les plus rapides et les plus délicates des variations de la pression sanguine, et pouvant être mis en parallèle avec les sphygmoscopes de Marey.

Cœur. — Newel Martin et E. C. Applegeeth ont

fait des expériences de circulation artificielle, sur le cœur de chat, isolé et alimenté de sang de bœuf, dont ils variaient la température. Ils ont pu déterminer avec précision les limites supérieure (44° 5 à 45°) et inférieure (17° à 18°) de température compatibles avec la vie de l'organe : ils ont constaté aussi que le rythme du cœur s'accélère à mesure que la température s'élève (comme il était à prévoir) et que la plus grande fréquence cardiaque se montre en moyenne à 41° 3, un peu avant que le degré mortel de température ne soit atteint.

Les cliniciens admettent assez généralement que le premier bruit du cœur est d'origine mixte, qu'il est dû en partie à la contraction des parois musculaires des ventricules, mais surtout aux vibrations qui se produisent lors de la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. Krehl a cherché à faire la part de ces deux facteurs, en auscultant directement le cœur du chien, tout en le soumettant à des manipulations permettant d'exclure à volonté le jeu des valvules auriculo-ventriculaires. Il a constaté que le premier bruit conserve ses caractères normaux, malgré l'introduction (par l'auricule) dans le cœur, d'un instrument (écarteur des valvules) qui s'oppose à la fermeture des valvules. Ce bruit s'entend encore après l'ouverture des gros vaisseaux et l'hémorrhagie foudroyante qui en est la conséquence et qui produit l'inertie des valvules. L'auteur en conclut que le premier bruit est presque exclusivement d'origine musculaire.

Heubel a fait des expériences intéressantes sur la rigidité cadavérique, produite sur le cœur de grenouille, sous l'influence de la chaleur, du froid, par le contact de substances chimiques diverses, etc. Il a constaté que la rigidité complète n'est nullement irrévocable; si l'on a soin de nourrir le cœur, par une circulation artificielle, d'un liquide approprié (sang dilué), la rigidité se dissipe et les pulsations peuvent même reparaître. Ainsi se trouve résolue une question d'une portée générale, sur laquelle les physiologistes étaient divisés. Les uns admettaient avec Brown-Séquard, que les muscles atteints de rigidité cadavérique, peuvent recouvrer leur souplesse et revenir à la vie, si on les soumet à une circulation artificielle de sang artériel; les autres, au contraire, affirmaient, avec Kühne, que la rigidité cadavérique des muscles est un phénomène qui n'est pas susceptible de restitution *ad integrum*.

A. Waller a utilisé, à l'exemple de Marey et d'autres, la photographie des oscillations de la colonne de l'électromètre de Lippmann, comme procédé d'étude des variations électriques qui accompagnent les pulsations du cœur chez l'homme.

Hamel et Kronecker ont fait sur la grenouille, des expériences de circulation artificielle, au moyen

de sérum stérilisé ou de solution physiologique (eau légèrement salée). Ils ont constaté que le liquide injecté par l'aorte abdominale, dans l'arrière-train de l'animal, éprouve infiniment plus de résistance à traverser le réseau vasculaire, lorsqu'il est injecté sous pression continue, que lorsque la pression est intermittente, et s'exerce à des intervalles rythmiques, imitant par conséquent l'action naturelle des pulsations du cœur. Les auteurs admettent que le mouvement intermittent est plus favorable qu'une pression continue, pour conserver intacte l'élasticité des tubes artériels.

La petite circulation ou circulation pulmonaire a été l'objet de recherches expérimentales de la part de v. Openchowski, Kroll, Couvreur, Bradford et Dean. Couvreur localise les vaso-constricteurs du poumon de la grenouille dans le pneumogastrique, tandis que Bradford et Dean montrent que les vaso-constricteurs du poumon sont contenus chez les mammifères dans les racines antérieures des nerfs dorsaux (du 2^e au 7^e nerf dorsal).

Bradford trouve chez le chien les vaso-constricteurs des organes abdominaux dans les racines antérieures des 10^e, 11^e, 12^e et 13^e paires dorsales, ceux du rein dans les 12^e et 13^e paires dorsales. Les vaso-dilatateurs suivraient le même trajet (11^e, 12^e, 13^e nerfs dorsaux.) L'excitation de la plupart des nerfs centripètes provoque par voie réflexe une vaso-contraction rénale : les vaisseaux du rein se dilatent au contraire par voie réflexe, à la suite d'une irritation centripète, atteignant un nerf appartenant au rein lui-même.

On admet en général que les fibres des nerfs spinaux, au moment de pénétrer dans la moelle épinière, se classent rigoureusement suivant la direction que suit chez eux l'excitation physiologique. Les racines antérieures ne contiendraient normalement que des fibres centrifuges (fibres motrices et vaso-motrices, sécrétrices, modératrices, etc.); et les racines postérieures, que des fibres centripètes ou sensibles.. (Loi de Ch. Bell ou de Magendie.) Stricker affirme depuis 1876 que cette loi comporte une exception : les vaso-dilatateurs sortiraient de la moelle par les racines postérieures. La plupart des physiologistes qui se sont occupés de cette question, n'ont pu réussir à mettre en lumière cette action vaso-dilatatrice des racines postérieures. Gärtner (élève de Stricker) indique les causes de leur insuccès et affirme que l'excitation électrique du bout périphérique des racines postérieures, isolé des 6^e et 7^e nerfs lombaires, produit chez le chien une augmentation de température de la patte postérieure, qui peut atteindre 10° à 15°, lorsque la patte a été au préalable refroidie. La dilatation vasculaire se serait montrée dix-sept fois sur dix-neuf expériences.

Les excitations mécaniques, portées à la surface du corps, ont jusqu'à présent, été considérées comme donnant lieu par voie réflexe, tantôt à une action vaso-constrictrice, se traduisant par une augmentation de la pression artérielle générale, tantôt au contraire à un réflexe vasculaire dépressur (chute de pression). Kleen vient de nous donner la clef de ces différences. En ayant soin de limiter soigneusement l'excitation à la peau, on observerait constamment une augmentation réflexe de la pression. En agissant sur les muscles sous-jacents, on obtiendrait une chute de pression.

Signalons encore les travaux de Morat sur les vaso-moteurs de la tête, de Hürthle sur la circulation cérébrale, de François Franck sur celle de la muqueuse nasale.

Heidenhain a fait au congrès de Bâle une communication intéressante sur la formation de la lymphe. Les physiologistes considèrent généralement cette humeur comme un produit de filtration du sang, un simple liquide de transsudation, formé sous l'influence mécanique de la pression sanguine. Les expériences de Heidenhain tendent au contraire à faire considérer la lymphe comme un produit de sécrétion des parois des capillaires : les cellules de ces parois feraient parmi les substances contenues dans le sang, une véritable sélection, laissant passer les unes, pour en former la lymphe, et retenant plus ou moins les autres. Ainsi, les substances injectées dans le sang, telles que le sel marin, l'urée, le sucre se retrouvent dans la lymphe du canal thoracique, en proportion notablement plus forte que dans le sang. On peut augmenter notablement la proportion de lymphe sécrétée, sans toucher à la pression sanguine ou même avec une pression fort basse, comme c'est le cas après une infusion de peptone.

III. — RESPIRATION

Chaque mouvement respiratoire suppose le concours harmonique d'un assez grand nombre de muscles (muscles dilatant l'orifice nasal, innervés par le nerf facial; muscles dilatateurs de la glotte, innervés par le pneumogastrique; muscles dilatateurs du thorax, innervés par le phrénique et par d'autres nerfs cervicaux et dorsaux). La plupart des physiologistes admettent que les différents centres nerveux qui président aux mouvements de chacun de ces muscles inspireurs, sont eux-mêmes soumis à l'hégémonie directrice de l'un d'entre eux : le centre respiratoire principal, situé dans la moelle allongée, au niveau des noyaux d'origine des deux pneumogastriques (nœud vital de Flourens).

L'activité rythmée de ce centre serait *automatique* (dans le sens admis par J. Müller), c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas besoin, pour être mise en jeu,

d'excitations réflexes, amenées par des nerfs sensibles ou centripètes. Le centre trouverait en lui-même les conditions de son fonctionnement; et les cellules nerveuses dont il se compose, supposées complètement isolées du reste du système nerveux central et des nerfs sensibles du corps, et ne communiquant plus qu'avec des fibres centrifuges allant aux muscles de la respiration, n'en continueraient pas moins à fonctionner normalement, et à envoyer, à intervalles réguliers, les impulsions motrices qui donnent naissance aux mouvements respiratoires.

L'excitant qui entretient l'activité du centre respiratoire, agirait donc directement sur les cellules nerveuses de ce centre : il serait de nature chimique et constitué par un certain degré de *vénosité* du liquide nourricier qui baigne ces cellules, (pauvreté relative en oxygène, richesse en CO_2 du sang ou de la lymphe). La *vénosité* du sang augmentée (excès de CO_2 , déficit d'oxygène), aussitôt les centres respiratoires fortement excités provoquent des mouvements respiratoires plus énergiques (*dyspnée*). La *vénosité* vient-elle à diminuer, le sang est-il saturé d'oxygène et pauvre en CO_2 , les centres respiratoires ne sont plus excités suffisamment, ils suspendent leur action : il y a *apnée*; l'animal cesse momentanément de respirer.

Cette théorie de l'innervation respiratoire, qui paraissait établie sur des bases inébranlables, est depuis plusieurs années l'objet de vives controverses. Et d'abord, en ce qui concerne le lieu d'où émanent les impulsions qui provoquent la contraction des muscles dilateurs du thorax, Brown-Séquard, Langendorff et Wertheimer le placent, non dans la moelle allongée, mais bien dans la moelle épinière cervicale et dorsale. La suppression des mouvements respiratoires, qui se montre après la blessure de la moelle allongée, dépend pour Brown-Séquard, non de la suppression d'un centre moteur, mais au contraire de l'irritation mécanique d'un centre d'arrêt, qui empêcherait alors le fonctionnement des vrais centres respiratoires spinaux. Le centre respiratoire bulbaire, admis par la plupart des physiologistes, serait donc un centre d'inhibition. L'arrêt de la respiration, qui se produit après destruction de la moelle allongée, ou après sa séparation de la moelle épinière, ne serait pas définitif : en opérant sur de jeunes animaux, ou sur des animaux adultes refroidis; ou en entretenant pendant quelque temps la respiration artificielle, on verrait reparaitre les mouvements respiratoires du thorax.

Ces expériences ont été répétées par Heinrichs et par Markwald sur de jeunes chats et de jeunes chiens. Jamais ces expérimentateurs n'ont vu se produire de vrais mouvements respiratoires du

thorax, après la section du bulbe. Markwald n'a pas été plus heureux, en pratiquant la section du bulbe chez des marmottes en hibernation. Il a constaté en outre que chez cet animal, une hémisection de la moelle cervicale arrête définitivement la respiration dans la moitié du corps du côté opéré. Markwald en conclut que c'est bien dans la moelle allongée, qu'il faut localiser le point de départ des impulsions motrices respiratoires.

Mais, d'après Markwald, le centre respiratoire ne serait pas capable, comme on le croyait, de fonctionner normalement en dehors de toute connexion avec le reste du système nerveux. Il faut qu'il soit relié soit à l'encéphale, soit aux pneumogastriques. Si l'on coupe les pneumogastriques, après avoir sectionné le système nerveux central au devant des centres respiratoires, on n'observe plus la succession normale et rythmée des mouvements respiratoires, mais des accès de convulsions respiratoires, séparés par de longues pauses. Markwald a réalisé pour ces expériences la suppression physiologique de l'encéphale, par un procédé nouveau et élégant, qui consiste à injecter par les carotides, une petite quantité d'une masse cireuse fondue, qui se solidifie dans les vaisseaux de la base du cerveau, et y arrête toute circulation. En variant la quantité de liquide injecté, de manière à anéantir des fractions plus ou moins étendues de l'encéphale, Markwald a constaté que les parties du système nerveux central dont l'intégrité est nécessaire à la production des mouvements respiratoires (après section des pneumogastriques), sont constitués par les tubercules quadrijumeaux postérieurs (dont la destruction ne produit cependant que des troubles passagers de la respiration), et surtout par les noyaux d'origine du trijumeau et du facial.

Aducco rompt également une lance en faveur de l'existence des centres respiratoires bulbaires. Il a constaté chez le chien que l'excitation directe (électrique et chimique) de la moelle allongée, provoque constamment un effet d'inspiration, tandis que l'application locale de cocaïne (poison paralysant les centres nerveux) arrête les mouvements respiratoires. Le bulbe est donc bien un centre moteur, et non un centre d'inhibition pour les mouvements respiratoires.

Grossmann admet également que les centres spinaux, séparés de la moelle allongée, sont incapables à eux seuls d'entretenir les mouvements respiratoires du thorax. Mais il en serait de même, d'après lui, du centre bulbaire ou noyau du pneumogastrique, qui commande aux mouvements respiratoires du larynx, et du centre du facial situé plus haut, et tenant sous sa dépendance les mouvements respiratoires de l'orifice nasal. Chacun de

ces centres, isolé des deux autres, cesserait de fonctionner. Si l'on détruit un de ces centres, en laissant les deux autres en connexion mutuelle, les mouvements respiratoires continuent à se produire, mais suivant un rythme ralenti et modifié. Si la destruction porte uniquement sur le noyau du pneumogastrique ou centre bulbaire, toute respiration s'arrête, car cette destruction a pour effet d'isoler l'un de l'autre les deux centres restants, celui du facial et le centre spinal. C'est la situation topographique du centre bulbaire, intermédiaire aux deux autres, qui lui a fait, d'après Grossmann, conférer abusivement une suprématie imaginaire sur ces derniers. Isolé des deux autres, ce prétendu centre autonome est, comme eux, réduit à l'impuissance. On réalise l'isolement anatomique du centre bulbaire par deux sections transversales du système nerveux, pratiquées l'une entre le noyau du facial et celui du pneumogastrique, l'autre en arrière de ce dernier, à la région cervicale moyenne. Tous les mouvements respiratoires s'arrêtent, y compris ceux du larynx, quoique les muscles du larynx soient encore en relation avec le centre bulbaire, ou prétendu *noeud vital*.

On voit que la théorie classique de l'innervation respiratoire est en train de se transformer, au moins en ce qui concerne la distribution topographique des centres qui président aux mouvements respiratoires et leur influence mutuelle.

L'influence que la composition chimique du sang exerce sur ces centres a été également le sujet de controverses qui ne sont pas près de finir. Cette influence peut être mise en lumière de la façon suivante (Léon Fredericq) : on prend deux très grands lapins, A et B, sur lesquels on lie tous les vaisseaux artériels se rendant à la tête, sauf une carotide. Le bout central de la carotide du lapin A est relié au bout périphérique de la carotide de B, et réciproquement. Dans ces conditions, la tête du lapin A ne reçoit que du sang venant du corps de B, et la tête du lapin B ne reçoit plus que du sang venant de A. Il y a, chez les deux animaux, échange de sang carotidien ou circulation céphalique croisée. Si l'on cherche à produire de la dyspnée chez le lapin A, par l'un des moyens usuels (oblitération complète ou partielle de la trachée, respiration d'un mélange gazeux pauvre en oxygène, ou riche en CO₂), c'est B, l'autre lapin, celui dont la tête reçoit le sang de A, qui présente les symptômes de dyspnée (mouvements respiratoires exagérés, profonds; expirations actives pouvant dégénérer en convulsions etc.), tandis que A pourra, tout au moins au début, présenter plutôt une tendance à l'*apnée*, c'est-à-dire une diminution dans l'amplitude des mouvements respiratoires. On peut donc modifier à volonté le rythme et le type des mouve-

ments respiratoires, en agissant uniquement sur la composition du sang qui circule dans la tête d'un animal. En effet, le seul lien physiologique qui existe entre la tête du lapin B et le corps du lapin A, est constitué par le sang qui circule dans les canules de verre qui relient les deux animaux.

Brown-Séquard et d'Arsonval ont trouvé que l'air expiré contenait un poison volatil, à action extrêmement nuisible sur l'organisme animal. La nature de ce poison n'a pas été déterminée. Le fait lui-même a d'ailleurs été contesté par d'autres expérimentateurs, notamment par Dastre.

Marcel et Speck ont publié de nombreuses séries d'expériences concernant la valeur des échanges respiratoires de l'homme et leurs variations physiologiques, sous l'influence de l'âge, du sexe, de l'état de veille ou de sommeil, de repos ou de travail, de l'altitude du lieu, etc.

Zuntz et Lehmann ont fait pareillement, chez le cheval, l'étude des changements que subissent les phénomènes chimiques de la respiration, sous l'influence du repos ou du travail. Il ne peut être question d'entrer ici dans le détail de ces expériences.

Les travaux de Ch. Richet sur l'influence que le chloral exerce sur les combustions respiratoires chez le chien ont été analysées dans cette *Revue* (Voir n° 15, p. 493).

IV. — CHALEUR ANIMALE

La méthode calorimétrique directe, dont s'étaient servis Lavoisier, Dulong et Despretz, était presque complètement abandonnée depuis de longues années; et les physiologistes avaient généralement recours, pour évaluer la quantité de chaleur produite par un animal, à une méthode indirecte, qui consiste à déduire cette valeur de la qualité et de la quantité des matériaux combustibles oxydés dans le corps. C'est d'Arsonval qui a remis en honneur la méthode calorimétrique directe, par la construction de plusieurs types de calorimètres dont l'un, le calorimètre à air et à compensation est d'un emploi extrêmement commode. D'Arsonval a été suivi dans cette voie par plusieurs physiologistes : tout récemment encore Rubner, puis Rosenthal décrivait minutieusement des calorimètres à air, qui ne diffèrent de l'appareil imaginé par d'Arsonval, que par des détails secondaires. Ott, de son côté, a construit un calorimètre à eau, suffisamment vaste pour qu'un homme puisse s'y placer. Les recherches exécutées avec ces instruments ont fourni la confirmation précieuse de plusieurs faits déjà connus.

La plupart des physiologistes admettent que l'homme (et les mammifères) luttent contre les causes de refroidissement par différents moyens,

dont l'un consiste à augmenter la production de chaleur, c'est-à-dire à exagérer l'intensité des combustions respiratoires, qui sont principalement localisées dans les muscles. A. Lœwy a fait à cet égard, une série d'expériences sur l'homme. Il a constaté que le froid provoquait en effet, par voie réflexe, des mouvements dans plusieurs groupes de muscles (tremblement), et que ces mouvements s'accompagnaient d'une augmentation de la thermogénèse et des phénomènes de combustions respiratoires. Mais ces mouvements peuvent manquer: dans ce cas, il n'y a pas non plus augmentation de la thermogénèse. Si les muscles restent au repos, les phénomènes chimiques de la respiration conservent leur valeur normale, malgré l'action du froid.

On admet assez généralement que la mort qui survient au cours d'un refroidissement intense et progressif, est dû à l'arrêt de la respiration et à l'asphyxie qui en est la conséquence, les centres nerveux respiratoires étant particulièrement sensibles à un abaissement de leur température. Anstiaux a montré que tel n'était pas le mécanisme de la mort. Chez tous les chiens qu'il a vus mourir de froid, le cœur s'est arrêté avant la respiration: la cessation des mouvements respiratoires, loin d'être la cause de la mort, serait la conséquence de l'arrêt du cœur.

Signalons un intéressant volume de Ch. Richet sur la chaleur animale (1889).

V. — DIGESTION

Salive. — A différentes reprises on a indiqué dans la salive humaine, la présence d'une petite quantité de sulfocyanate de potassium, substance assez toxique. Florain montre que les plantes arrosées journellement avec de la salive, ne tardent pas à périr et que l'action nuisible est due au sulfocyanate. On retrouve le poison dans le tronc et dans les feuilles de la plante malade.

Estomac et intestin. — Edelmann a découvert que la portion cardiaque de l'estomac contient chez les herbivores, le porc, etc., des glandes spéciales sécrétant de la diastase.

Schwald confirme l'opinion de Heidenhain qui place dans les cellules de revêtement des glandes à pepsine, le lieu de formation de l'acide chlorhydrique.

S. Mintz, Hans Leo ont publié des procédés de dosage de l'acide chlorhydrique du suc gastrique.

Ellenberger et Hofmeister ont continué leurs recherches sur la digestion du porc.

Pawlow et E. Schumova Simanowskaja ont publié des expériences, tendant à prouver que les pneumogastriques sont les véritables nerfs sécréteurs du suc gastrique. Après la section de ces nerfs,

l'estomac sécréterait un liquide acide, sans action sur les aliments: les auteurs auraient réussi par l'excitation du bout périphérique des pneumogastriques, à provoquer la sécrétion d'un liquide contenant de la pepsine. Enfin la sécrétion du suc gastrique, qui s'établit lorsque le chien à pneumogastriques intacts avale un morceau de viande (que l'on empêche d'arriver à l'estomac en le faisant ressortir par une fistule de l'œsophage), cette sécrétion ne se montre plus lorsque les nerfs sont coupés.

Arthaud et Butte affirment que la section des pneumogastriques, pratiquée sous le diaphragme, est constamment mortelle. A l'autopsie, on trouve des lésions trophiques du foie, de l'estomac et des reins.

L'innervation des mouvements de l'estomac ou de l'intestin a fait l'objet de recherches intéressantes de la part d'Openchowski, Bastianelli, Oppenheimer, Bechterew et Mislawski, etc.

II. Quincke a constaté, chez un homme porteur d'une fistule gastrique, que la surface de l'estomac est sensible aux différences de température. Le sujet distinguait parfaitement si l'eau qu'on injectait par la fistule était froide, tiède ou chaude.

Le problème de l'autodigestion de l'estomac a été remis sur le tapis par Viola et Gaspardi. Comment se fait-il que le suc gastrique, ce dissolvant par excellence des matières albuminoïdes et des tissus animaux, n'attaque pas la paroi de l'estomac? Pavy avait admis que le suc acide était neutralisé par le sang et la lymphe alcalins, à mesure qu'il pénétrait dans l'épaisseur de la paroi de l'estomac, et était ainsi rendu inoffensif. Claude Bernard considérait l'épithélium de l'estomac et le mucus qui le recouvre, comme constituant un enduit protecteur, empêchant la pénétration du suc gastrique dans la profondeur. Il avait lui-même, par des expériences mémorables, combattu l'ancienne hypothèse, qui attribuait à la force vitale des cellules stomacales, le pouvoir de résister à l'action dissolvante du suc gastrique. La soi-disant force vitale n'avait pas empêché des tissus vivants, introduits par une fistule gastrique dans l'estomac d'un chien, d'être attaqués par le suc gastrique. L'oreille d'un lapin vivant, l'arrière-train d'une grenouille, avaient été promptement digérés. Viola et Gaspardi ont fait une expérience analogue, mais avec un résultat tout différent; ils ont introduit par une fistule gastrique à l'intérieur de l'estomac la rate du chien restée en relations normales avec ses vaisseaux nourriciers. La rate peut séjourner ainsi de 40 à 64 heures au contact du suc gastrique, sans être attaquée, à condition que la circulation sanguine ne soit pas entravée. Si on lie les vaisseaux, la rate est digérée et transformée en bouillie au bout

de 8 heures. Il me paraît probable (opinion de Sehrwald, Riegel, etc.) que la circulation agit ici, en maintenant les tissus dans un état convenable de nutrition. On sait que les cellules et les éléments histologiques en général n'absorbent pas indifféremment toutes les substances dissoutes qu'on leur offre en solution : elles font un véritable choix parmi ces substances, acceptant les unes, rejetant les autres. Il suffit d'admettre que les éléments histologiques de la surface de l'estomac et de l'intestin, s'opposent à se laisser imbibier par les ferments digestifs, tant qu'ils jouissent de leurs propriétés physiologiques, c'est-à-dire tant que leur nutrition est normale. Les ferments sont d'ailleurs des corps peu diffusibles, qui ont peu de tendance à traverser les membranes organiques. Il ne faut pas oublier que la même question se pose pour la digestion intestinale, dont le principal agent est le suc pancréatique, liquide naturellement alcalin, et qui digère très activement les matières albuminoïdes. Pourquoi le suc pancréatique n'attaque-t-il pas et ne digère-t-il pas l'intestin ? Il est clair que l'explication de Pavy qui fait protéger la muqueuse stomacale contre le suc gastrique acide par l'alcali du sang, n'est plus applicable à l'intestin.

Foie et bile. — Gorodecki a fait, sur des chiens à fistule biliaire, des expériences confirmatives de la doctrine classique, qui considère les pigments biliaires comme des produits de transformation de la matière colorante du sang, ou hémoglobine. Il a constaté que l'injection sous-cutanée ou intra-péritonéale d'hémoglobine, a pour effet d'augmenter notablement la proportion de matières colorantes de la bile.

Ponfick a constaté que l'on peut, chez les animaux, extirper en une ou plusieurs séances, jusqu'aux trois quarts de leur foie. Si l'opération est faite aseptiquement, elle est en général bien supportée. La perte de substance est bientôt comblée par une néoformation de tissu hépatique, de sorte que le foie se montre presque complètement régénéré au bout de quelques mois.

Les médecins et les physiologistes s'accordent généralement à faire jouer à la bile un certain rôle dans l'absorption intestinale de la graisse. Les expériences déjà relativement anciennes de v. Wistinghausen, sont souvent citées à l'appui de cette manière de voir. V. Wistinghausen croyait avoir constaté que la graisse liquide et l'huile filtrent plus facilement à travers des membranes poreuses, et montent plus haut dans des tubes capillaires, lorsque la surface des membranes et des tubes a été au préalable mouillée de bile. E. Gröper a récemment répété minutieusement ces expériences, mais avec un résultat absolument négatif. L'huile ne monte pas plus haut dans les tubes capillaires

mouillés de bile ; et, quant aux membranes organiques, qu'elles soient enduites de bile ou non, l'huile ne les traverse que si elles présentent des trous.

Arthaud et Butte ont pratiqué la ligature de l'artère hépatique (en dessous de la gastro-épiploïque droite) et constaté, contrairement à l'opinion généralement reçue, que cette opération est toujours mortelle, et qu'elle entraîne la suppression complète du glycogène hépatique.

Matières fécales. — On est généralement porté à considérer les excréments comme représentant en grande partie, des restes de matières alimentaires non digérées, colorées par de la bile, etc. Les recherches de Hermann contredisent cette opinion ; elles tendent à prouver que les matières fécales représentent presque exclusivement des produits de sécrétion et de desquamation de l'intestin, épaissis et solidifiés. Hermann pratique sur le chien l'expérience suivante : un bout d'intestin d'une certaine longueur est isolé au moyen de deux sections transversales, mais les connexions vasculaires et nerveuses sont respectées. Ce bout d'intestin vidé et lavé convenablement, est transformé en un anneau creux, par des points de suture, rattachant l'une à l'autre ses deux extrémités. On réunit également les deux surfaces de section du reste du tube digestif, de manière à supprimer toute solution de continuité et à rétablir le cours normal des matières alimentaires. On remet les organes en place et l'on referme la plaie abdominale. L'animal peut se remettre complètement des suites de l'opération. Au bout de quelques jours, on trouve l'anneau intestinal rempli d'une masse molle de couleur brunâtre ; si l'on attend plusieurs semaines ou y rencontre de véritables boudins gris verdâtres en tout semblables à des matières fécales. Ces matières fécales se sont donc formées indépendamment de toute participation de bile ou d'aliments.

VI. — RÉSORPTION ET ASSIMILATION DES PRODUITS DE LA DIGESTION. — NUTRITION

Il y a déjà plusieurs années que l'on a signalé ce fait en apparence paradoxal que la peptone, le produit normal de la digestion des matières albuminoïdes, constitue pour l'organisme un véritable poison. Si nous ne mourons pas après avoir mangé un bifteck ou une côtelette, c'est que la peptone qui en provient, se forme lentement et par petites quantités à la fois au cours de la digestion, et que cette peptone est au fur et à mesure retransformée en substances albuminoïdes.

Bouchard et plusieurs autres expérimentateurs ont localisé dans le foie le laboratoire qui opère cette transformation de la peptone. Neumeister,

Nadina Popoff, Julia Brink, rejettent cette manière de voir. Leurs expériences démontrent que l'épithélium intestinal joue ici le principal rôle. La transformation de la peptone et la reconstitution de l'albumine, se produirait déjà à l'intérieur de l'intestin et de l'estomac.

J. Munk a découvert que les produits de la digestion des graisses, les savons, jouissent, comme les peptones, de propriétés éminemment toxiques. Il suffit d'injecter à un lapin 0,07 gramme d'oléate ou de palmitate de sodium, par kilogramme de son poids, pour le tuer par arrêt du cœur. Si l'injection est faite dans une des branches de la veine-porte, l'animal supporte une dose de savon beaucoup plus considérable : les savons sont en effet arrêtés par le foie, lors de leur passage à travers cet organe. Comme la peptone, ils suspendent le phénomène de la coagulation du sang.

On admet généralement, avec Voit et Ranke, que la ration alimentaire normale de l'homme doit comprendre 118 grammes d'albumine, outre la graisse (56 grammes) et les matières amylacées (300 grammes). Cette ration représente 3.050 calories environ. Hirschfeld et tout récemment Kumagawa et Klemperer ont fait des séries d'expériences d'alimentation, d'où il résulte que l'homme peut vivre en n'absorbant journellement que 40 à 50 grammes d'albumine et que le gaspillage d'albumine admis par Voit, n'est pas une nécessité physiologique.

Munk a fait observer que les expérimentateurs précédemment cités n'étaient parvenus à se nourrir, et à maintenir l'équilibre d'azote de leur corps, avec ce minimum de 40 à 50 grammes d'albumine, qu'en augmentant par compensation, dans des proportions exagérées, la quantité d'aliments gras et hydrocarbonés de leur ration. Ils n'avaient évité le gaspillage d'albumine reproché à la ration alimentaire de Voit, qu'en le remplaçant par un gaspillage d'aliments non azotés. Munk a calculé que la ration alimentaire représentait par kilogramme de poids du sujet : 47,5 calories dans les expériences de Hirschfeld; 51 calories dans celles de Kumagawa; 78,5 calories dans celles de Kumagawa et Klemperer, et seulement 32 à 35 calories d'après la ration de Voit et Ranke.

Le combustible organique est donc utilisé d'une façon plus complète dans la ration de Voit. Rosenheim a constaté également, chez le chien, qu'une alimentation riche en azote permet d'utiliser plus complètement la graisse de la ration, que ne le ferait l'animal avec un minimum d'albuminoïdes.

Dastre a montré que le sucre de lait ou lactose injecté dans les vaisseaux, n'est pas assimilé, et se retrouve comme tel dans les urines. La galactose (glycose provenant de la décomposition de la lac-

tose), au contraire, est assimilée presque en entier et n'apparaît dans les urines, après injection intraveineuse, qu'à l'état de traces.

Pour voir si la lactose est décomposée par la digestion en dextrose et galactose, Bourquelot et Troiser nourrissent un diabétique (qui digère le sucre, mais ne l'assimile pas) avec du lait seul ou avec du lait et du sucre de lait. L'urine du sujet soumis à ce régime ne contenait que de la dextrose, ce qui ne résout la question qu'incomplètement. Il serait intéressant de reprendre l'expérience, en ne donnant cette fois que de la galactose au diabétique.

Quinquand a constaté qu'il y avait encore du sucre dans le sang après 43 à 46 jours d'abstinence, alors que le foie ne renfermait plus trace de glycogène. Dans ce cas, le sucre du sang doit avoir une autre origine que le glycogène hépatique.

Lustig a montré que l'extirpation du plexus cœliaque produit, non l'atrophie du pancréas et l'apparition du sucre dans les urines, comme l'ont affirmé Munk et Klebs, mais l'acétonurie. L'acétonurie elle-même donne l'explication des symptômes graves : néphrite, albuminurie, coma, qui se montrent à la suite de l'opération.

VII. — GLANDES VASCULAIRES

On réunit assez souvent dans un même groupe physiologique, sous le nom de *glandes vasculaires*, la rate, le corps thyroïde, le thymus, les capsules surrénales, etc., organes qui, probablement, ne présentent comme principal caractère commun que l'insuffisance de nos connaissances à l'égard de leurs fonctions.

Rate. — On est généralement d'accord pour admettre que la rate joue un certain rôle, tant dans la formation des globules rouges jeunes que dans la destruction des globules vieux. Les travaux de Glass, Krüger, Darjewitsch, etc. ont fourni l'année dernière des contributions intéressantes à cette manière de voir.

Horbaczewski fait jouer à la rate un rôle prépondérant dans la formation de l'acide urique. Il a constaté que des fragments de rate extraits du corps, jouissent de la propriété de former des quantités notables d'acide urique, quand on les met en contact avec du sang frais.

Corps thyroïde. — Schiff a montré, il y a déjà bon nombre d'années, que le chien ne supporte pas l'extirpation bilatérale du corps thyroïde. Les animaux opérés meurent en présentant les symptômes de la *cachexie strumipriva* (altération progressive de la nutrition, tremblements fibrillaires, convulsions, etc.). On trouve à l'autopsie des lésions du système nerveux central. Schiff avait constaté, en outre, que la cachexie ne se montre

pas, malgré l'extirpation d'un corps thyroïde, chez les animaux auxquels il avait à l'avance greffé le corps thyroïde d'un autre chien dans la cavité péritonéale. Mais les symptômes redoutables reparaissent, si l'on pratique en outre la suppression de la rate. Ces différentes affirmations de Schiff furent reconnues exactes par plusieurs expérimentateurs, tandis que d'autres, parmi lesquels il faut citer Munk et Drobnik, les combattirent vivement. Ewald, Fano et Zanda ont récemment répété les expériences de Schiff et celles de ses contradicteurs; ils sont d'accord pour donner entièrement raison à Schiff, et pour admettre avec lui une relation étroite entre le fonctionnement du corps thyroïde et l'intégrité de la nutrition du système nerveux central. Fano et Zanda ont fait quelques expériences qui semblent indiquer qu'après l'extirpation du corps thyroïde, il y a, dans l'organisme, une accumulation de substances nuisibles. Ils ont, en effet, constaté chez plusieurs animaux, une amélioration passagère des symptômes de la cachexie, à la suite de saignées copieuses suivies de transfusion de sang, emprunté à un animal normal, ou de solution physiologique.

On sait que le lapin supporte parfaitement (à l'inverse du chien) l'extirpation complète du corps thyroïde. Rogowitsch croit pouvoir établir une relation entre ce fait et le volume relatif de l'hypophyse qui, chez le lapin, est notablement plus considérable que chez le chien. L'hypophyse et le corps thyroïde pourraient, jusqu'à un certain point, se remplacer mutuellement chez le lapin, où leur volume relatif est comme 1 : 3,3, tandis que, chez le chien et le chat, l'hypophyse ne représente que le 15^e ou le 20^e du corps thyroïde. Rogowitsch a constaté chez le lapin une augmentation de volume de l'hypophyse, après extirpation du corps thyroïde.

Capsules surrénales. — Stilling constate que l'extirpation d'une capsule surrénale, pratiquée chez de jeunes lapins, entraîne l'hypertrophie de l'autre capsule ou même la néo-formation de capsules accessoires. Les résultats de ces expériences sont incompatibles avec l'opinion d'après laquelle les capsules surrénales n'auraient d'importance fonctionnelle que pendant la vie embryonnaire.

Tizzoni a également extirpé chez le lapin les capsules surrénales et a constaté que l'opération était constamment mortelle. Les animaux meurent en présentant une altération progressive de la nutrition, ainsi qu'une tendance à la pigmentation exagérée, symptômes rappelant ceux de la maladie d'Addison, comme Brown-Séquard l'avait déjà fait remarquer. A l'autopsie, l'auteur a trouvé constamment des lésions étendues du système nerveux central, notamment du plancher du quatrième

ventricule et de la substance grise de la moelle épinière, au niveau de la région cervicale inférieure.

VIII. — SYSTÈME NERVEUX ET ORGANES DES SENS.

— MOUVEMENTS

La question des nerfs trophiques, que la plupart des physiologistes résolvait négativement il y a quelques années, tend à s'imposer de nouveau à l'attention. Plusieurs cliniciens ont signalé, dans ces derniers temps, des altérations de la nutrition limitées à l'aire de distribution d'un nerf et survenant à la suite de lésions ou de maladies de ce nerf. Ruhemann décrit un cas d'anesthésie et d'atrophie unilatérale de la face, à la suite d'une névrite du trijumeau. Dans un autre cas il y avait anesthésie sans trouble trophique : les filets sensibles paraissent donc nettement séparés des filets trophiques du trijumeau, puisqu'ils peuvent être paralysés sans que les filets trophiques participent à la lésion.

Laborde a réussi à sectionner le trijumeau au devant du ganglion de Gasser, sans léser les fibres motrices : dans ce cas on observe la production de troubles trophiques, qui pour l'œil, débütent dans la profondeur; les incisives s'accroissent d'une façon démesurée.

Moeller croyait avoir trouvé récemment dans le nerf laryngé supérieur, le nerf trophique des muscles du larynx chez le cheval. Ce nerf ne contient en effet aucun filet moteur pour les muscles en question; et cependant, ces muscles dégénèrent après section du laryngé supérieur. Exner, qui s'était d'abord rallié à l'explication de Moeller, a depuis reconnu qu'il s'était trompé. Il a constaté que les muscles du larynx cessaient de fonctionner (quoique leur nerf moteur, le laryngé inférieur, fût intact) aussitôt qu'on coupait le nerf laryngé supérieur, qui ne contient cependant que des fibres sensibles. Ce n'est pas la première fois que l'on constate la suppression ou l'altération de la motilité d'un organe à la suite de la section de ses nerfs sensibles. La suppression de la sensibilité du larynx entraîne donc l'inaction de ses muscles; et cette inaction elle-même amène au bout d'un certain temps leur atrophie.

L'innervation du larynx a fait l'objet de recherches intéressantes de Gad, Heymans, Kieselbach, Grabower, v. Meyer, F. Semon et Horsley, Fränkel, etc. Exner et Paneth, Horsley et Gotch, Goltz, Munk, S. Brown, E. A. Schäfer, etc., ont continué leurs expériences d'excitation et d'extirpation de l'écorce cérébrale.

Brown-Séquard a publié des recherches intéressantes sur l'inhibition et la dynamogénie.

Gotch et Horsley ont constaté que le fonction-

nement de la moelle épinière, s'accompagne de phénomènes électriques analogues à ceux que présentent les muscles et les nerfs. Korybutt et Hodge se sont efforcés d'y découvrir pareillement des changements histologiques.

Léon Fredericq a montré que les centres moteurs et sensibles de la moelle épinière, présentent vis-à-vis de l'anémie aiguë une résistance fort inégale. Les premiers sont atteints et paralysés bien avant les seconds. Gad et Joseph ont étudié les fonctions des ganglions spinaux. E. Gley a indiqué un nouveau procédé de destruction totale de la moelle épinière au moyen d'un courant d'eau chaude.

La physiologie générale des nerfs et des muscles a continué à être cultivée avec ardeur en Allemagne. Citons, parmi les travaux français, ceux de d'Arsonval, Chauveau, Beaunis, etc. Il ne semble pas que nous nous soyons beaucoup rapprochés de la solution du problème du développement de l'énergie mécanique du muscle ou de celui de l'excitabilité des nerfs et des muscles.

D'après Tarchanoff, toute excitation d'un organe sensoriel (action de la lumière sur l'œil, du froid ou du chatouillement sur la peau, excitation douloureuse), tout mouvement volontaire, toute activité psychique s'accompagne de changements dans l'état électrique des différentes régions de la peau, notamment de celle de la main. Ces phénomènes électriques paraissent devoir être rapportés à la sécrétion des glandes sudoripares.

Je ne parlerai pas des remarquables travaux de R. Dubois sur la vision des pholades, qui ont conduit le physiologiste lyonnais à une nouvelle théorie du mécanisme des sensations lumineuses, attendu que leur auteur les a exposés ici-même. (Voir la *Revue* du 15 avril 1890, p. 198.)

F. Plateau a continué ses ingénieuses recherches sur la vision des arthropodes.

La doctrine classique de l'énergie spécifique des organes des sens, ou de la spécificité des sensations, principe introduit en physiologie par Joh. Müller, reçoit chaque jour de nouvelles applications. En vertu de ce principe, un fil nerveux sensible, quel que soit l'agent qui l'excite, donne toujours lieu dans les organes centraux, à la même espèce de sensation. Cette sensation ne saurait varier qu'en intensité, mais jamais en modalité. A chaque espèce de sensation doit donc être affectée une catégorie spéciale de nerfs ou de terminaisons nerveuses.

Blix a montré, il y a peu d'années, l'exactitude de ce principe pour les sensations qui ont leur point de départ dans une excitation de la peau. On distingue facilement dans la peau, des points uni-

quement sensibles au froid, d'autres au chaud, d'autres enfin à la pression.

Hjalmar Ohrwall constate pareillement que les différentes papilles gustatives de la langue ne sont pas équivalentes : les unes sont sensibles à l'amer, d'autres à l'acide, d'autres au sucré : beaucoup d'ailleurs sont à la fois sensibles à deux ou trois saveurs, c'est-à-dire contiennent plusieurs genres de terminaisons nerveuses.

Dans le même ordre d'idées, Holmgren a découvert que des points lumineux très peu étendus, peuvent paraître successivement rouges, verts ou bleus suivant le point de la rétine où se peint leur image.

Un fait d'une autre portée vient d'être signalé par Zwaardemaker, au moyen de son olfactomètre double, instrument qui permet de faire agir sur les deux narines des substances odorantes différentes. En faisant agir de l'acide acétique à droite et de l'ammoniaque à gauche, il a constaté qu'on ne peut en même temps percevoir deux odeurs différentes. On perçoit l'une ou l'autre, ou aucune des deux. Le fait est singulier et demande confirmation.

La physiologie des organes des sens touche à la psycho-physique. Je n'ai pas l'intention d'analyser ici les nombreux travaux de psycho-physique qui ont vu le jour l'année dernière. Je considère cette science comme représentant une branche de la psychologie, et comme sortant par conséquent du cadre des études de physiologie proprement dite.

IX. — REPRODUCTION

La plupart des travaux se rapportant à la fonction de reproduction, sont des travaux d'embryologie. Depuis nombre d'années, les recherches d'embryologie ont émigré, des laboratoires de physiologie, vers ceux d'anatomie et d'histologie ou vers ceux de zoologie. Rien de plus rationnel, puisque l'embryologie, par ses méthodes et ses résultats, est essentiellement une science morphologique basée sur l'observation, tandis que la physiologie est une science expérimentale. Après cette élimination, le domaine physiologique de la reproduction se trouve singulièrement rétréci.

Je me borne à signaler ici les travaux de Brown-Séquard, sur les effets merveilleux obtenus chez les vieillards, par des injections sous-cutanées de suc testiculaire de jeunes mammifères. La presse quotidienne a fait grand bruit autour de cette découverte qu'il serait prématuré de juger aujourd'hui.

Léon Fredericq,

Professeur de physiologie à l'Université de Liège.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques.

Marshall (Alfred), *Professeur d'économie politique à l'Université de Cambridge. — Principles of Economics*, vol. I, Macmillan et Co, Londres, 1890.

L'économie politique est née de la philosophie, mais elle a depuis longtemps déjà conquis son indépendance et mis son ambition à devenir d'abord une science positive. Puis, comme la physique, elle a cherché une union intime avec les sciences exactes, les sciences mathématiques. L'usage des symboles algébriques appliqués aux problèmes économiques l'indique nettement : science expérimentale par essence, elle tente parfois, même au prix de quelques mésaventures, de raisonner par formules et par équations.

M. Alfred Marshall est un économiste de grand savoir doublé d'un algébriste, ce qui ne gâte rien, d'autant mieux qu'il a prévu et signalé les dangers d'une application intempérante de l'algèbre à l'économie politique. Le fait serait curieux si nous ne connaissions le collaborateur assidu et distingué de M. Marshall, qui n'est autre que Mme Mary Paley Marshall, sa femme.

M. Marshall est un éclectique en économie, éclectique au point de vue de la théorie seulement, car il revendique l'honneur d'être fidèle à la pure tradition anglaise. Il serait puéril de le chicaner sur ce point, d'autant mieux que cette fidélité à la science anglaise se concilie dans M. Marshall avec la loyauté la plus exquise : la science économique française, allemande, italienne est l'objet d'appréciations nettes, compétentes et dictées par l'esprit de justice le plus scrupuleux :

« La première tentative systématique pour former une science économique sur une large base a été faite en France vers le milieu du XVIII^e siècle par un groupe d'hommes d'Etat et de philosophes, sous la direction d'un noble esprit, Quesnay, le médecin de Louis XV... » ; et plus loin « l'Ecole Française a eu un développement continu depuis ses premiers grands penseurs du XVIII^e siècle, et elle a évité beaucoup d'erreurs et de confusions, surtout à propos des gages, qui ont été communes parmi les économistes anglais de la deuxième école. Depuis l'époque de Say, elle a fait beaucoup de bonne besogne. Dans Cournot, elle a trouvé un esprit constructeur du génie le plus élevé ; tandis que Fourier, Saint-Simon, Proudhon et Louis Blanc ont fourni au socialisme nombre de ses meilleures et aussi nombre de ses plus sauvages inspirations ». C'est franc et juste.

Nous n'avons pas la prétention, dans une courte notice, de donner l'analyse complète du volume de M. Marshall : le grand problème de l'offre et de la demande est posé après une remarquable tentative de classification des biens ou richesses ; puis la théorie de l'équilibre entre l'offre et la demande, puis leur relation avec le travail et le capital, la théorie de la valeur ou de la distribution et de l'échange. Une préoccupation dominante de l'auteur permet de dégager la note originale de son livre : M. Marshall est frappé de la difficulté qu'on éprouve à classer des choses qui se modifient au point de vue de leurs caractères et de leurs usages ; il y a des nuances, des gradations indéfinies à ce point de vue, pas de lignes nettes, bien tranchées (no sharp lines) ; les tons se confondent comme dans un dessin. Aussi l'auteur proclame sa foi dans le principe de continuité, *natura non facit saltum*, c'est l'épigraphe même du livre. — Pas de division radicale entre les mobiles purement économiques et les mobiles moraux de l'activité humaine, — entre l'ac-

tivité des différents groupes sociaux, au point de vue de la sagacité, de l'énergie, de l'initiative, — pas de division radicale entre les valeurs normales d'une part, les valeurs courantes de marché, occasionnelles d'autre part — pas de division radicale entre les théories de la valeur du travail et des choses produites par ce travail. Comme conséquence naturelle, le principe de continuité s'applique à la terminologie. « Dans la vie réelle, dit l'auteur, pas de ligne nette de démarcation entre les choses qui sont et celles qui ne sont pas le capital, entre celles qui sont et celles qui ne sont pas des nécessités, entre le travail qui est et celui qui n'est pas producteur. — Tel est le point original du livre ; l'auteur a étendu de la façon la plus large cette notion de la continuité dans le développement, notion commune à toutes les écoles modernes d'économie politique.

Certains chapitres, à défaut d'analyse complète, mériteraient une étude spéciale : dans le chapitre II du livre premier, l'auteur fait à grands traits une esquisse d'histoire économique pour l'antiquité et pour les temps modernes. Les professeurs d'histoire y trouveraient des vues larges, intelligentes et nettes qui remplaceraient avantageusement les fadaïses banales, les vagues lieux communs qui déshonorent, chez nous, nombre d'ouvrages classiques parmi les plus connus. Nous ne pouvons que le signaler.

Nous avons déjà parlé du chapitre I, livre II (classification et Terminologie), auquel une note fort intéressante malgré sa longueur sur les définitions du mot *Capital* sert de conclusion. Le chapitre IV du même livre, consacré à l'histoire, à la doctrine de la population, à la statistique internationale, d'une lecture facile et attachante, montre combien l'auteur comprend et sait utiliser la statistique dont le rôle est prépondérant en économie politique. — De cruelles vérités attristent cà et là le lecteur français : « En France, le nombre des enfants par mariage est exceptionnellement bas » — et encore « malgré l'excédent de l'immigration sur l'émigration, l'accroissement de la population est très faible, etc. » — La récente loi française sur le septième enfant rappelle à l'auteur deux faits historiques curieux à signaler : En 1769, Pitt déclara qu'un homme qui avait encrien son pays d'un certain nombre d'enfants avait un droit sur l'assistance publique pour les élever. Un acte voté au milieu des préoccupations militaires de 1806 accordait l'exemption de toutes taxes à tout père de famille qui avait plus de deux enfants nés en mariage légitime ; cet acte fut abrogé aussitôt que Napoléon eut été dûment enfermé (safely lodged) à Sainte-Hélène.

Nous souhaitons à M. Marshall un traducteur digne de son œuvre : il se défend quelque part d'avoir simplifié les questions, d'avoir inventé des divisions comodes, mais factices, au détriment de la science, pour satisfaire la paresse des étudiants qui aiment un formulaire ou le goût du public, grand amateur d'affirmations dogmatiques, — nous ne saurions trop l'en féliciter. La manie du livre élémentaire, production hypocrite de l'ignorant qui excuse l'insuffisance de son œuvre par la préoccupation d'être compris de la jeunesse, a inondé nos librairies de livres ridicules ; cela s'appelle vulgariser des niaiseries. Le manuel, le livre élémentaire, en certaines matières, est la plaie de l'enseignement. Dénaturer les problèmes, les questions scientifiques sous prétexte d'être élémentaire, rappelle le poète de Boileau qui mettait l'histoire de France en madrigaux.

F. NOGUÈS.

2° Sciences physiques.

Feussner (Dr K.). — Etalonnage des instruments de mesure électrique en Allemagne. — *Bull. Société électrotechnique de Berlin*, 25 mars 1890.

La deuxième section de l'Institut physico-technique de l'empire allemand est chargée de vérifier les résistances électriques, les éléments étalons et les appareils destinés à la mesure des intensités et des différences de potentiel. Après examen, elle accorde l'estampille aux instruments qui satisfont à certaines conditions d'exactitude. Les vérifications se font au moyen d'étalons conservés par l'Institut.

M. le Dr K. Feussner a donné dernièrement, à la Société électrotechnique de Berlin, d'intéressants détails sur ces différents types de mesure, sur leur construction et leur emploi. Nous en ferons une courte énumération :

Quatre étalons principaux, en verre et mercure, ont été étudiés géométriquement avec le plus grand soin ; ils déterminent, d'une façon à peu près exacte, l'Ohm légal.

Plusieurs résistances métalliques, de valeurs très différentes, ont été construites de telle sorte qu'elles ne subissent aucun échauffement nuisible de la part des courants qui les traversent. Lors de la construction de ces résistances, l'Institut fit faire des recherches très étendues sur les propriétés électriques d'un grand nombre d'alliages et les résultats de ces travaux ont amené l'adoption, pour la constitution des rhéostats, d'un alliage à base de cuivre, de nickel et de manganèse, dont la résistance spécifique est, paraît-il, invariable et dont le coefficient thermique pourrait être négligé.

L'élément de force électromotrice adopté par l'Institut allemand est un élément Latimer-Clarke, à l'intérieur duquel plonge un thermomètre. Les forces électromotrices sont mesurées, par comparaison avec cet étalon, à l'aide d'une méthode analogue à celle de Pogendorff. Enfin les intensités sont établies par la détermination d'une différence de potentiel à la limite d'une résistance connue. L'approximation de ces déterminations serait, d'après le Dr Feussner, de $\frac{1}{200000}$ pour les résistances et de $\frac{1}{10000}$ pour les forces électromotrices et les intensités. Il reste à savoir toutefois comment l'Institut contrôle l'étalon de force électromotrice ; ce contrôle est d'une importance aussi grande et d'une difficulté bien autrement considérable que celui de la constance des étalons de résistance.

F. DE NERVILLE.

Mendeleeff. — Dissociation des substances en dissolution. *Journal de la Société chimique russe*, 1890.

M. Mendeleeff met en doute l'exactitude de l'hypothèse d'Arrhénius, sur la constitution des solutions salines et en général des solutions qui sont conductrices de l'électricité. Afin d'expliquer ce fait que, pour ces solutions, le coefficient i de la formule de Van't Hoff est différent de l'unité¹, Arrhénius a supposé que les électrolytes en dissolution sont dissociés en leurs ions. Cette hypothèse conduit à admettre que les solutions conductrices ont une constitution différente de celles qui ne le sont pas, bien que, dans la plupart des cas, les phénomènes qui accompagnent la dissolution soient identiques pour les deux sortes de solutions. M. Mendeleeff ne croit pas à cette dissociation en ions libres, et il pense que le phénomène s'explique très bien si l'on admet l'existence d'hydrates définis liquides, dissociés dans la solution.

Le moyen le plus commode pour calculer i consiste dans l'emploi du point de congélation. Or l'abaissement moléculaire d'un sel anhydre est toujours égal à l'abaissement moléculaire d'un certain hydrate de ce sel en solution étendue. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver une valeur de n telle que l'hydrate $a n H_2O$

conduise à la même valeur de i que le sel anhydre.

Puisque, dans les solutions diluées, la même valeur de i peut être obtenue soit en supposant le sel anhydre soit en supposant le sel hydraté, M. Mendeleeff conclut que, ni la détermination de la pression osmotique, ni celle du coefficient isotonique, de la tension de vapeur des solutions étendues, de l'abaissement du point de congélation ou des conductibilités électriques, ne peut servir à décider si le sel est hydraté ou non, au sein de la dissolution.

Dans un mémoire paru dans le *Philosophical Magazine* en 1889, M. Arrhénius, envisageant la même question, concluait bien comme M. Mendeleeff que les phénomènes rappelés ci-dessus ne pouvaient constituer un argument pour ou contre la théorie de la dissociation ou la théorie de l'hydratation. Mais il pensait que d'autres phénomènes, notamment toutes les propriétés additives des solutions étendues (modules de densité, modules capillaires, etc.), ne s'expliquent nettement que par l'hypothèse des ions libres, et constituaient par suite un argument en faveur de la théorie de la dissociation.

Georges CHARPY.

Jagnaux (Raoul). — Aide-mémoire du chimiste, 1 vol, 983 p. Paris, Baubry et Cie, 1890.

Le livre de M. Jagnaux contient, sous une forme très condensée, tous les renseignements dont on peut avoir besoin dans le travail du laboratoire. Outre les tables numériques, densités, solubilités, données thermo-chimiques, etc., les principales préparations et méthodes d'analyse sont rappelées brièvement. Citons surtout, comme très complets, les chapitres relatifs à la métallurgie du fer, au gaz d'éclairage, aux boissons fermentées et aux matières colorantes. Enfin le volume se termine par une série de tableaux minéralogiques, disposés pour la reconnaissance des substances minérales d'après la méthode de Dufrenoy, et un certain nombre de tables numériques de conversions de mesures.

Georges CHARPY.

3° Sciences naturelles.

Bergeron (Jules). — Étude géologique du massif ancien situé au sud du Plateau central. — *Thèse de doctorat de la Faculté des Sciences de Paris*, Masson, 1890.

L'étude du massif ancien situé au sud du Plateau central a fourni à M. Bergeron le sujet d'un important mémoire qu'il a présenté comme thèse de doctorat à la Faculté des Sciences de Paris.

La série débute dans le Rouergue et la Montagne Noire par le terrain primitif, gneiss, micaschistes etc., passant à sa partie supérieure à des schistes nettement sédimentaires, les phyllades. Le Silurien est parfaitement développé et l'on chercherait vainement dans toute autre région de la France une série aussi complète et aussi bien caractérisée ; la division inférieure ou Cambrien est connue fossilifère seulement en ce point de notre sol et grâce aux méthodiques recherches de M. Bergeron. A signaler aussi la présence entre le Silurien inférieur et le Silurien moyen d'une assise de passage, comparable à l'Arenig anglais. La stratigraphie des divers horizons du Silurien est pour la première fois bien établie dans cette région et d'une façon définitive. Le Dévonien de la Montagne Noire a déjà fait l'objet de plusieurs travaux ; l'étude de M. Bergeron fait justice des assimilations erronées auxquelles certains auteurs avaient été conduits. Moins bien caractérisé que dans l'Ardenne, le Dévonien présente cependant ici une série très complète, sauf pour la division inférieure, non fossilifère. Le Permo-Carbonifère comprend des dépôts marins à faune de Visé et des bassins houillers du Houiller supérieur, auxquels M. Bergeron a pu appliquer la théorie des deltas de M. Fayol. Le Permien ne comprend que ses divisions inférieures et moyennes.

Une partie très importante du travail est consacrée à l'étude des roches éruptives de la région, granites,

¹ Voir l'article de M. Etard sur la constitution des solutions étendues dans la *Revue* du 15 avril 1890, p. 193 à 198.

granulites, microgranulites. Un chapitre est consacré à la stratigraphie générale et à l'analyse des mouvements dont le Rouergue et le Montagne-Noire ont été le siège. Enfin, le mémoire se termine par un appendice paléontologique dans lequel sont décrites les espèces nouvelles les plus importantes.

Cet excellent travail peut être considéré comme un modèle de monographie régionale. Stratigraphie, pétrographie et paléontologie y sont traitées de main de maître et M. Bergeron n'a laissé que bien peu à glaner à ceux qui voudraient après lui reprendre l'étude de la région qu'il a étudiée.

A. BIGOT.

Boiret (H.). — Sur le traitement de la Carie.
Annales agronomiques; t. XVI, p. 289.

Les expériences de M. Boiret ont eu pour objet de rechercher l'effet comparatif du sulfate de cuivre, du sulfate de fer, de l'acide sulfurique et de quelques autres produits dans le traitement de la carie du blé.

L'auteur examine d'abord l'effet direct des divers antiseptiques cités sur les cultures du champignon de la carie et constate que le sulfate de cuivre employé en solution à 5 pour 1.000 a seul le pouvoir d'arrêter complètement le développement du champignon, pouvoir que ne possèdent pas l'acide sulfurique, le sulfate de fer, le sulfate de zinc, même à dose relativement haute.

M. Boiret étudie ensuite l'influence que ces mêmes produits exercent sur la germination du blé. Les semis étaient d'abord mis à macérer dans les solutions antiseptiques à diverses concentrations; puis la moitié était semée telle quelle, tandis que l'autre était préalablement pralinée avec de la chaux en poudre. L'effet général du chaulage a été excellent, surtout quand les solutions employées étaient relativement concentrées, ce qui se comprend du reste, la chaux préservant le grain des atteintes d'un traitement trop énergique; on remarque aussi que l'effet d'un même produit varie beaucoup selon les variétés de blé. L'auteur examine ensuite les résultats relatifs à chaque antiseptique en particulier et arrive aux conclusions suivantes:

L'acide sulfurique est sans valeur pour la pratique des sulfatages, car le blé est très sensible à son action, tandis que la carie résiste, même dans une solution à 20 pour 1.000; le sulfate de fer est peu nuisible à la faculté germinative du blé; mais il est insuffisant, même en solution à 50 pour 1.000, pour enrayer la carie.

Les produits à base de chaux n'attaquent pas les semis de blé, mais ne détruisent pas non plus la carie; le procédé de Mathieu de Bombasle est, au contraire, excellent: il consiste à arroser le grain avec une solution de sulfate de soude à 80 pour 1.000, puis à la chauler ensuite.

Enfin, le sulfate de cuivre est, selon l'auteur, le meilleur préservatif du blé contre la carie. M. Boiret démontre l'exagération des craintes qu'on émettait autrefois à propos de la toxicité des sels de cuivre; le meilleur procédé d'application de cet antiseptique serait, non pas l'aspersion qui, si parfaite qu'elle soit, ne s'étend pas à tous les grains soumis au traitement, mais bien le simple trempage de la semence ou même son immersion pendant une demi-heure dans une solution de 1/2 à 1 %.

En résumé, les seuls procédés pratiques à employer contre la carie, tout en conservant la faculté germinative du blé, seraient le traitement au sulfate de soude suivi d'un chaulage, selon la formule de Mathieu de Bombasle, ou le trempage en solution de sulfate de cuivre à 5 pour 1.000 sans chaulage.

A. HÉBERT.

4° Sciences médicales.

Cooper Curtice. — Les parasites animaux du mouton. Un vol. in-8° de 222 pages avec 36 planches. Washington, Government printing office, 1890.

Cet ouvrage, édité avec un luxe auquel nous ne sommes malheureusement guère habitués en France, a

été publié par les soins du ministère de l'agriculture des États-Unis. Les maladies du mouton occasionnent chaque année, dans cette immense contrée, des pertes énormes qui non seulement sont une cause de ruine pour les producteurs, mais retentissent en outre, à un haut degré, sur l'industriel et le consommateur. Or, celles de ces maladies dont l'influence est la plus désastreuse sont précisément de nature parasitaire. C'est ce qui explique pourquoi le gouvernement américain a encouragé, de la façon la plus sérieuse, les travaux de M. Curtice.

L'ordre dans lequel sont répartis les éléments de l'ouvrage est des plus simples. Les parasites sont étudiés un à un, les Arthropodes en premier lieu (Insectes, Acariens et Linguatules), les Vers ensuite (Cestodes, Trématodes et Nématodes). Pour chaque espèce, l'auteur donne la description succincte du parasite, puis étudie son évolution lorsqu'il y a lieu; son mode d'introduction dans l'organisme, et les troubles qu'il est susceptible de provoquer: symptômes, lésions et traitement. Le tout est exposé d'une façon assez sommaire, mais toujours claire, et les données sont en rapport avec les progrès les plus récents de la science.

Plusieurs des parasites étudiés n'avaient pas été, jusqu'à présent, signalés chez le mouton: tels les *Tricho-dectes limbatus* et *clinar*, de la Chèvre, le *Tania sim-bria*, des Cervidés, le *Strongylus ventricosus*, du Bœuf. Une espèce tout à fait nouvelle se trouve décrite avec détails: l'*Oesophagostoma columbianum*, qui vit dans le cæcum et dont les larves sont enkystées dans de petites tumeurs de cet organe. Chaque description est accompagnée de fort beaux dessins, les uns empruntés pour la plupart à des ouvrages français, les autres exécutés d'après nature par deux artistes attachés au Bureau of animal industry.

Voilà comment, dans la libre Amérique, le gouvernement sait encourager les œuvres scientifiques. On ne peut que souhaiter de voir un tel exemple suivi chez nous.

A. RAILLIET.

Perroncito, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Turin.
— *Le Micro-organisme du Typhus du Cheval.*
Giornale di medicina veterinaria pratica e di zootechnia, Turin, août 1890.

M. Perroncito a réussi à obtenir des cultures pures d'un micro-organisme recueilli dans le sang et dans la rate de chevaux morts du typhus. Ce microbe diffère du *Bacterium pneumoniae crouposa Equi* récemment décrit par l'auteur. Il offre de nombreuses analogies avec les agents de la septicémie hémorragique, de la pneumo-entérite infectieuse des porcs, du choléra des poules et surtout du typhus humain. Toutefois les cultures faites par piqure sur gélatine forment des stratifications plus épaisses, moins frangées, d'un aspect plus blanchâtre à la partie supérieure du tube et moins granuleux sur le trajet de la piqure. Sur la pomme de terre le développement du bacille équin est plus rapide que celui du bacille humain.

Pour l'obtenir en grande quantité, il suffit de recueillir dans des vases stérilisés du sang ou de la pulpe splénique d'un cheval typhique et de laisser ces vases pendant 24 heures à la température ordinaire de l'été et à l'abri des germes du dehors. D'abord peu nombreux, les micro-organismes se développent rapidement. Le lait est pour eux un excellent milieu de culture; ils ne paraissent pas en altérer sensiblement les propriétés.

Par injection de la culture pure, M. Perroncito a reproduit sur le cheval tous les symptômes caractéristiques de la maladie. Il a retrouvé ensuite le bacille dans le sang et dans la rate. Le même microbe produit chez le mouton l'apparition d'une forme typhique. Il tue rarement le cobaye, presque jamais le lapin.

L. O.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

A la date du présent numéro, les vacances de la Société Française de physique et de la Société chimique de Paris, de la Société royale, et des Sociétés de Physique et de Chimie de Londres, de l'Académie des Sciences de Bruxelles, de l'Académie des Sciences et des Sociétés de Physique et de Physiologie de Berlin, de l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg, des Sociétés savantes d'Odessa, de l'Académie des Sciences de Vienne, et de l'Académie royale de Lincei, sont terminées.

A partir du 15 novembre prochain, nous reprendrons la publication, suspendue pendant leurs vacances, des comptes rendus de ces Sociétés :

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 6 octobre 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Emile Picard : Sur la détermination des intégrales de certaines équations aux dérivées partielles du second ordre. — M. P. H. Schoute : Sur les figures planes directement semblables. — M. de Sparre : Sur le mouvement du pendule de Foucault.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. H. Faye signale les nombreux cas de foudre en boule qui ont été observés pendant le tornado de Saint-Claude; il donne lecture d'un rapport de M. Cadenat, qui décrit plusieurs de ces boules de feu, fracturant les portes, arrachant les serrures, trouant les vitres comme à l'emporte-pièce. — M. Mascart émet l'opinion qu'il serait prudent de faire des réserves sur l'existence objective du tonnerre en boule. — Dom Pedro d'Alcantara rapporte un exemple de ce phénomène dont il a été autrefois témoin.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. P. Miquel propose d'utiliser pour le dosage de l'urée la diastase que sécrètent les bacilles urophages cultivés dans du bouillon. Deux titrages alcalimétriques, l'un avant et l'autre après l'action de la diastase sur la liqueur à étudier donnent par différence le chiffre de l'urée. Ce qui fait la supériorité de cette méthode, c'est que le résultat de l'analyse n'est pas faussé par la présence de sels ammoniacaux et de matières extractives azotées. — M. Onimus a constaté que diverses essences végétales (thym, eucalyptus, citron), évaporées sur de la mousse de platine, détruisent la virulence des crachats tuberculeux avec lesquels on les met en contact. L'inhalation de ces vapeurs à des malades a fait perdre aux crachats de ces malades leur mauvaise odeur. — M. Maupas avait montré que chez l'*Hydatina senta* (Rotifères) certaines femelles pondent, malgré l'accouplement, des œufs parthénogénétiques; de nouvelles observations lui ont fait voir que ces femelles rebelles à la fécondation sont toujours des pondenses de femelles; les seules qui puissent être fécondées sont celles qui, sans l'accouplement, auraient pondu des œufs parthénogénétiques mâles. — Des expériences de culture du blé que M. Pagnoul a faites dans un sable siliceux stérile, il résulte que : 1^o l'abondance de l'acide phosphorique augmente considérablement la proportion du grain par rapport à la paille; 2^o l'azote ammoniacal peut être assimilé par les plantes lorsque la fermentation nitrrique fait défaut, mais il paraît être, sous cette forme, notablement inférieur à l'azote nitrrique, au point de vue de l'alimentation de la plante. — M. St. Meunier apporte quelques nouveaux faits à ajouter à ceux par lesquels il a établi les propriétés minéralisatrices du fluor : par l'addition du fluorure d'aluminium, il a pu dans un creuset chauffé par un simple feu de coke non renouvelé, obtenir la sillimanite, la tridymite et le feldspath labrador en partant de leurs éléments.

Séance du 13 octobre 1890.

4^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A. Petot : Sur les équations linéaires aux dérivées partielles. — M. L. Bigourdan : Observation de la comète d'Arrest (retrouvée par M. Barnard le 6 octobre 1890) faite à l'Observatoire

de Paris. — En présentant le cinquième fascicule du Bulletin du comité international de la carte du ciel, M. Mouchez annonce que les préparatifs de ce grand travail sont terminés dans la plupart des observatoires; la dernière réunion préparatoire du comité est fixée au 31 mars prochain à Paris. — M. Mouchez communique une photographie de la nébuleuse annulaire de la Lyre obtenue à Alger par MM. Trépied et Rabourdin, par une pose de six heures en deux séances; il fait remarquer qu'avec cette longue exposition, la nébulosité est plus accusée vers le centre qu'elle ne le paraît à l'observation directe. — M. Baillaud envoie une photographie de cette même nébuleuse, obtenue à Toulouse par MM. Andoyer et Montangerand après neuf heures de pose.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. F. Argyropoulos a observé qu'un fil de platine fin et assez long libre comme une corde sonore lorsqu'on le maintient à l'incandescence par un courant interrompu; on obtient des nœuds et des ventres d'autant plus nombreux que le fil est moins tendu. — M. R. Varet a formé et étudié diverses combinaisons du cyanure de mercure avec les sels de lithium, l'iodocyanure, le bromocyanure et le chlorocyanure de mercure et de lithium. — M. H. Malbot a étudié les conditions dans lesquelles l'action de l'ammoniaque sur le chlorure d'isobutyle permet d'obtenir des quantités notables de monoisobutylamine; d'une série d'expériences, dans lesquelles il a chauffé le chlorure d'isobutyle en vase clos avec des proportions croissantes d'ammoniaque aqueuse et pendant des temps variables, il résulte qu'il faut employer un grand excès d'ammoniaque et ne pas prolonger l'opération au delà d'un temps donné, pour que la monoisobutylamine qui se forme d'abord ne soit pas remplacée par progression par la diisobutylamine. — Continuant ses recherches sur l'action du sodium sur les nitriles primaires de la série grasse, suivant la méthode de E. von Meyer, M. Bouveault fait voir que le dérivé iodé provenant du mélange de deux nitriles, traité successivement par un iodure alcoolique, puis par l'acide chlorhydrique, donne un nitrile β acétonique. Les éthers correspondant à ces nitriles sont faciles à obtenir. La méthode est générale.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. E. Bourquelot a trouvé des quantités notables de tréhalose et un peu de mannite dans des champignons (*Lactarius piperatus*) traités immédiatement après la récolte. La même espèce, desséchée préalablement, contient de la mannite et point de tréhalose. M. Bourquelot a démontré que : 1^o la tréhalose existe réellement dans le champignon frais et disparaît pendant la dessiccation; 2^o cette disparition est produite par l'activité biologique des cellules du champignon; elle n'a plus lieu si l'on suspend cette activité par le chloroforme. — M. F. Guitel, dans une note antérieure, avait montré que le canal muqueux latéral manque chez divers Cycloptérides; il a étudié la façon dont se comporte chez ces poissons le nerf latéral; celui-ci est sous-cutané et fournit des filets à une ligne latérale dont les corpuscules terminaux font librement saillie à la surface de la peau. A la tête, ces organes suivent la règle générale et sont abrités dans des canaux muqueux. — M. G. Cotel a cherché à élucider par des recherches physiologiques

le rôle des enveloppes florales. Il a constaté que les diverses pièces du périanthe jouissent d'une activité considérable au point de vue de la transpiration et surtout de la respiration; l'assimilation, naturellement en rapport avec la quantité de chlorophylle contenue dans les organes, est toujours faible. Il en résulte que les phénomènes d'oxydation dominent. M. Curtel émet l'hypothèse que le périanthe servirait au moins pour une part, à la préparation des corps plus ou moins oxydés que l'on trouve en général dans les fruits. — M. A. de Lapparent avait étudié, il y a quelques années, les porphyres de l'île de Jersey; les croyant intercalés entre les schistes cambriens et un conglomérat attribué au nouveau grès rouge, il les avait assimilés aux porphyres perméens des Vosges et du Morvan, de structure identique. De nouvelles observations lui ont montré que ces éruptions de Jersey sont plus anciennes et doivent être rapportées au cambrien; on les trouve, en effet, par places, imbriquées dans les schistes de cet âge. Le conglomérat pourpre sus-jacent serait lui-même plus ancien qu'on ne le croyait.

Séance du 20 octobre 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Lelievre : sur certaines classes de surfaces. — M. H. Resal a fait l'étude du mouvement d'un vieil appareil de physique qui existe au Conservatoire des Arts-et-Métiers : cet appareil est constitué par un mobile en forme de double cône et deux guides rectilignes également inclinés sur l'horizon, formant entre eux un angle à sommet inférieur; le mobile étant placé sur ce plan incliné de manière que son équateur coïncide avec le plan vertical de la bissectrice de l'angle, il se déplace de telle sorte qu'il semble remonter le plan incliné. — MM. G. Rayet, L. Picart et Courty : observations de la comète Brooks (19 Mars 1890) faites au grand équatorial de l'observatoire de Bordeaux. — M. R. Radau a calculé l'ordre de grandeur des déviations des axes principaux du globe auquel peuvent donner lieu les phénomènes météorologiques, tels que des chutes de neige, ainsi que les oscillations de la mer. Les marées à cause de leur vitesse n'ont qu'une action négligeable mais s'il s'agit d'un phénomène local et annuel, une masse d'eau de 2000 K^m convenablement placée produirait une variation de latitude appréciable. Une série d'observations exécutées à Berlin, Potsdam et Prague par M. Albrecht en 1889 ont montré une variation périodique de la latitude d'un même lieu, avec un maximum en été et un minimum en hiver. — M. A. Gaillot, qui avait lui-même tiré une conclusion identique des observations faites à Paris de 1856 à 1861 discute les hypothèses par lesquelles on peut expliquer le phénomène. Le déplacement de l'axe de rotation à l'intérieur de la terre n'est pas démontré; une réfraction irrégulière dans les couches atmosphériques peut être admise malgré les précautions prises. De nouvelles recherches systématiques sont nécessaires. — M. Deslandres indique le dispositif dont il se sert pour faire l'étude spectroscopique des étoiles avec le grand télescope de l'Observatoire de Paris. — M. J. Feñy décrit deux protubérances solaires, exceptionnelles dans leur dimension et leur forme, qu'il a observées à l'Observatoire de Haynald, à Kalocsa (Hongrie).

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. A. Trécul rappelle qu'il a signalé à l'Académie, il y a dix ans, un phénomène électrique qu'il avait observé sur les paratonnerres de la halle aux vins, et qui ressemblait, comme les éclairs décrits par M. Touvelot, aux étincelles d'une machine d'induction. — M. H. Moissan a déterminé à nouveau l'équivalent du fluor, en décomposant par l'acide sulfurique du fluorure de sodium pur, obtenu synthétiquement; il donne le chiffre de 19,05. — M. L. Bouveault a continué l'étude de l'action des amines aromatiques et de la phénylhydrazine sur les nitriles β -acétoniques, qu'il avait commencée avec M. Hanriot. Il établit la constitution des composés ainsi obtenus. —

MM. L. Roos et E. Thomas montrent que le plâtrage fait apparaître dans les vins du sulfate neutre, et non du sulfate acide de potasse. La double décomposition n'a pas lieu seulement dans les vins entre le plâtre et le tartre, mais aussi avec divers sels de potasse à acide organique. L'addition d'acide sulfurique donne lieu au contraire à un sulfate acide. On peut distinguer cette acidification du plâtrage au moyen du procédé de dosage indiqué par les auteurs.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Bourquelot, poursuivant ses recherches sur les matières sucrées des champignons, établit que le fait signalé par lui chez le *Lactarius piperatus*, à savoir la présence de la tréhalose chez le champignon frais et la transformation de cette substance en mannite pendante pendant la dessiccation, est un fait général. Il montre de plus que le même phénomène a lieu pendant la vie normale du champignon, et que la tréhalose des exemplaires jeunes est remplacée par de la mannite chez les exemplaires avancés; sur 14 espèces, l'*Amanita mappa* fait seule exception; dans quelques cas, il apparaît de la glucose. — M. P. Marchal décrit l'appareil excitateur de la Langoustine, de la Gêbie et du Crangon. — M. P. Pelseneer montre que la conformation du rein des acéphales, étudié chez les formes où il est réellement le moins différencié (*Solenomya Nucula*) n'est pas essentiellement différente de ce qu'elle est chez les Prosobranches, mais est au contraire très semblable à ce qu'on observe chez les représentants les plus inférieurs de ce groupe. L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 7 octobre

M. Rochard, sur la dépopulation de la France, est d'avis que les mesures législatives et fiscales pour augmenter la natalité auront moins d'action que les mesures hygiéniques pour la diminution de la mortalité pouvant, du reste, augmenter la natalité en remédiant aux causes de stérilité de plus en plus nombreuses. L'Académie devrait donc demander aux pouvoirs publics : moins d'indulgence pour les coupables d'avortement; le rétablissement des tours ou bureaux secrets; l'application de la loi Roussel; la vaccination obligatoire; des mesures de désinfection après les maladies contagieuses; la répression de la prostitution; l'assainissement des villes, casernes, lycées, prisons, etc. etc. — M. Périer, présente deux cas de laparotomie suivis de guérison pour : kyste hydatique du foie et dilatation énorme de la vésicule biliaire prise pour un kyste épiploïque. — M. Desnos, rend compte de ses recherches sur l'exalgine (méthylacétanilide), médicament nul comme anti-thermique, très puissant comme analgésique, bien toléré par l'estomac, agissant aux doses de 0,25 à 0,50 jusqu'à 1,50. — M. Nocard lit son rapport sur un travail de M. Peyraud relatif à la vaccination chimique du tétanos par la strychnine, reconnue inadmissible, et à la virulence tétanique d'une terre non cultivée depuis de longues années, fait reconnu exact. — M. Delteil présente une note sur l'identité et la transmissibilité de la diphtérie humaine et animale (gallinacées).

Séance du 14 octobre.

M. Berger présente deux malades atteints, l'un d'ulcère syphilitique, l'autre d'ulcère suite de brûlure des jambes, guéris au moyen de l'autoplastie par la méthode italienne. — M. Fort communique un cas de guérison de rétrécissement cicatriciel de l'œsophage chez une jeune fille de 19 ans, par l'électrolyse linéaire. — M. Baudon lit un travail tendant à prouver que la diathèse gouteuse est plus fréquente qu'on ne le croit, chez la femme. — M. Decroix, à propos de la dépopulation de la France, demande comme président de la Société contre l'abus du tabac, que l'Académie émette le vœu qu'une loi interdise de fumer avant l'âge de 16 ans. — M. Chauvel lit des rapports : sur un travail de M. Vaslui, relatif à trois observations de trépanation

du crâne, suivies de succès, pour des accidents tardifs d'encephalite à la suite de traumatisme; sur un travail de M. Gaczeowski relatif au traitement des rétrécissements du canal lacrymal par l'incision du sphincter au dessous du point lacrymal. — M. Charpentier lit son rapport sur le prix d'hygiène de l'enfance : « de l'éducation des sens de l'ouïe et de la vue pendant la seconde enfance ». — M. Marjolin lit un rapport sur un travail de M. Duménil, traitant des logements pauvres à Paris, au point de vue de leur danger pour la santé publique, et des moyens à employer pour améliorer ces habitations malsaines. D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 11 octobre 1890.

MM. Cadéac et Meunier ont étudié sur le chien les propriétés physiologiques de l'essence de *Calamus aromaticus*; à petites doses, cette essence est excitante et altère le caractère des animaux intoxiqués; à fortes doses, elle détermine des crises épileptiformes. — M. Ch. Feré, ayant remarqué sur des épileptiques soumis à la bromuration à haute dose, que les accidents du bromisme débütent par des troubles gastro-intestinaux, a été amené à employer contre ces accidents les antiseptiques intestinaux (naphthol β , salicylate de bismuth) et il a obtenu de bons résultats. Il rapporte un nouveau fait d'inoculation vaccinale à un sujet hémiplegique, ayant donné un résultat positif du côté paralysé seulement. Le même auteur a constaté chez un épileptique pendant un accès d'agitation, les mêmes faits relatifs à la toxicité urinaire que ceux qu'il a signalés pendant l'accès épileptique vrai; c'est-à-dire que le coefficient urotorique s'élève au-dessus de la normale pendant l'accès pour descendre au-dessous de la normale après l'accès. — M. E. Gley ayant pu expérimenter sur le corps d'un supplicié, à Epinal, une minute et demi après l'exécution, a observé les faits suivants sur le cœur de ce sujet : le cœur battait lentement, comme sous l'influence de l'excitation du vague; deux piqûres de scalpel dans la région du centre de Kronecker ont déterminé dans le ventricule des trémulations définitives; les oreillettes entrèrent aussi en trémulations, mais reprirent peu après leurs battements rythmiques. Il a noté en outre des contractions rythmiques spontanées des faisceaux musculaires du diaphragme. — MM. D. Sanchez-Toledo et A. Veillon ont produit le tétanos chez des lapins en leur inoculant sous la peau des excréments de cheval et de bœuf bien portants; dans les plaies des animaux ayant succombé au tétanos ainsi provoqué, l'examen bactériologique a fait retrouver le bacille de *Nicotier*. — M. Bourquelot : Sur la présence et la disparition du tréhalose chez les champignons. (V. Académie des Sciences, Séance du 13 octobre, p. 650). — M. Schmitt a étudié l'action physiologique du chlorhydrate d'oréxine. Cette substance est faiblement toxique; à dose forte, elle tue les mammifères par méthémoglobinémie. Essayée sur l'homme sain, à petites doses, elle est restée sans effets; en augmentant la dose, on n'a obtenu que des crampes d'estomac; sur les anorexiques, elle a amélioré l'appétit dans un quart des cas. *In vitro*, elle n'a aucune action sur les

processus chimiques digestifs. Enfin, elle n'augmente pas la sécrétion gastrique d'acide chlorhydrique. — M. Charrin soumet à l'examen de la société les viscères d'une chatte qui a succombé lentement à l'infection pyocyannique; il existe une dégénérescence graisseuse généralisée. En rapprochant ce fait de quelques autres analogues, M. Charrin pense qu'il s'agit d'une réaction propre à l'espèce. — M. E. Thierry a essayé l'inoculation du liquide testiculaire de cobaye sur un béliet impuissant; le résultat a été négatif. — M. E. Retterer a étudié le développement du prépuce, de la couronne du gland et du col du pénis chez l'embryon humain; le gland se différencie du corps du pénis par la production d'une invagination épithéliale qui en s'enfonçant dans le derme et le tissu sous cutané, creuse le sillon rétroglандаire; plus tard la peau se soulève en arrière de ces sillons, et s'accroissant d'arrière en avant forme le prépuce. — M. Lataste : Expériences à l'appui d'une théorie nouvelle de la gestation extra-utérine. (Mémoire). — MM. Cadot, Gilbert et Roger ont repris l'étude de la question de la tuberculose des volailles. D'après leurs recherches qui sont encore en voie de développement, on peut admettre que 1^o le bacille de la tuberculose aviaire doit être distingué du bacille de la tuberculose humaine, au moins en tant que variété; 2^o cette tuberculose est transmissible de volaille à volaille; 3^o le lapin présente pour elle une réceptivité plus grande que le cobaye, à l'inverse de ce qui a lieu pour la tuberculose humaine.

Séance du 18 octobre 1890

A propos de la communication de MM. Sanchez-Toledo et Veillon, M. Capitan annonce qu'il a trouvé dans la salive d'un lapin sain un micro-organisme dont les cultures, inoculées à ce même lapin, l'ont fait mourir du tétanos. — M. Maurel a étudié expérimentalement l'action de la température sur les leucocytes humains. Il a vu que ces éléments, à peu près immobiles au-dessous de 25°, présentent leur maximum d'activité entre 39° et 43°; ils sont tués par une température de 46°. — MM. Cadot, Gilbert et Roger ont comparé chez la poule et le faisan les lésions que produit dans le foie de ces animaux le virus de la tuberculose aviaire; de leurs recherches résulte ce fait, qu'un même agent provoque chez ces deux espèces voisines l'une de l'autre des réactions franchement différentes. — M. L. Olivier avait montré, dans un travail antérieur, que les communications protoplasmiques intercellulaires, observées chez certaines algues et, en quelques cas, chez des végétaux vasculaires, constituent un fait général de biologie végétale; de nouvelles recherches micro-chimiques dans lesquelles la plante a été anesthésiée avant fixation, pour éviter le retrait du protoplasme, lui ont fait reconnaître que la substance vivante doit être considérée comme continue dans toute l'étendue du végétal. — M. Retterer a étudié le développement du fourreau et de la partie libre de la verge chez les mammifères quadrupèdes; chez ces animaux, l'invagination épithéliale rétroglандаire, qu'il a signalée chez l'homme, remonte tout le long du pénis, d'abord engagé dans l'épaisseur de la paroi ventrale; elle le libère des parties voisines et forme ainsi le fourreau. L. LAPICQUE.

CHRONIQUE

LA PILE-BLOC A LIQUIDE IMMOBILISÉ


M. E. Meylan a fait récemment à la Société internationale des Electriciens une très intéressante conférence sur une pile imaginée par M. Germain pour les usages domestiques et pour la télégraphie et la téléphonie. Cette pile est constituée à peu près comme les piles Leclanché, et utilise les mêmes matières; mais pour la rendre essentiellement commode et transpor-

table, l'inventeur, M. Germain, a immobilisé le liquide entre les grains extrêmement ténus d'une matière organique très légère, le *cofferdam*.

Le *cofferdam* est cette poudre de cellulose extraite de la noix de coco et qui a une légèreté spécifique si grande qu'elle ne semble pas, quand on en prend de petites quantités à la main, avoir de poids appréciable

On sait que, imprégnée d'un liquide, cette substance subit un gonflement considérable, tellement considérable que l'amiral Pallu de la Barrière l'a utilisée pour former, quand elle est comprimée entre deux p-vois solides, un revêtement hydrofuge destiné à revêtir la coque des cuirassés à la flottaison : si un boulet perce la coque, l'eau entre, atteint la cellulose dont le gonflement suffit à l'obturation de la blessure faite au navire. C'est même à cette application que la matière doit son nom de *cofferdam*.

La pile Germain ou *Pile-Bloc* est formée comme la pile Leclanché d'un zinc baigné par du sel ammoniac en dissolution et d'un charbon entouré de bioxyde de manganèse; le charbon a la forme plate, est placé entre les deux zincs, dont il est séparé par deux lits de *cofferdam* imprégné sous pression de la liqueur excitatrice, comme le montre la figure ci-jointe qui représente une coupe de l'appareil. Le tout est enfermé dans une boîte de bois dur injecté et verni,



absolument inattaquable; la boîte est hermétiquement fermée et les deux bornes servant de prises de courant aboutissent seules à son extérieur. De cette façon, grâce à l'absorption de liquides par le *cofferdam* il n'y a aucune exsudation, le liquide est bien immobilisé, et de plus le tout forme une masse tellement compacte, tellement solide que le nom de *Pile-Bloc* caractérise merveilleusement cet instrument.

La pile étant une fois construite, il restait à étudier les propriétés électriques; ce travail a été fait avec le plus grand soin par M. le Dr Willeumier dont on connaît la belle détermination de l'ohm. Ces déterminations ont établi que la pile avait une force électromotrice constante de 1 volt, 5 avec une régularité de débit qui montrent la possibilité de l'usage de la pile-bloc pour des courants relativement intenses.

Grâce aux modèles variés présentés par M. Meylan à la Société des Electriciens, nous avons pu nous convaincre de la commodité de la pile dans un grand nombre d'usages domestiques téléphoniques et surtout militaires; pour ces derniers la transportabilité de la pile et son indifférence aux chocs semblent la désigner à l'exclusion de toute autre. Alphonse BÉRET.

CORRESPONDANCE

SUR LA BIOGRAPHIE DE HIRN

Nous recevons de notre éminent collaborateur, M. Dwelshauvers-Dery, la lettre suivante, que notre impartialité nous fait un devoir de publier :

Liège, 13 octobre 1890.

MONSIEUR LE DIRECTEUR.

Dans votre numéro du 30 avril, page 252, se trouve un compte-rendu de la séance du 1^{er} mars de l'Académie de Belgique, fait par M. Folie, reproduisant en grande partie la notice que cet académicien avait lue sur mon illustre ami G. A. Hirn. Or cette notice renferme, outre des appréciations absolument fausses à mon avis, une *erreur de fait* prouvant que M. Folie n'a pas la moindre connaissance non seulement de l'homme dont il a parlé, mais même des œuvres scientifiques de cet homme. C'est étrange sans doute, mais ce qui l'est plus encore, c'est que M. Folie, dans son compte-rendu de la séance de notre Académie du 5 juillet (numéro du 30 juillet, page 439), n'a pas soufflé mot de la réponse que j'ai faite à sa notice et que l'Académie a décidé d'insérer à son *Bulletin*, sur le rapport de ses commissaires. Dans l'intérêt de la vérité, et par respect pour vos estimables lecteurs, je viens vous prier de vouloir bien reproduire in extenso la note rectificatrice que j'ai eu l'honneur d'envoyer à l'Académie de Belgique et dont ci-joint un exemplaire, tiré à part de son *Bulletin*.

Veuillez agréer, etc.

V. DWELSHAUVERS-DERY.

Voici la notice de M. Dwelshauvers Dery :

SUR UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE RELATIVE A G.-A. HIRN, récemment insérée dans le *Bulletin de l'Académie* 1, Observations présentées par M. Dwelshauvers-Dery, professeur à l'Université de Liège.

Ami intime et confident de Hirn, j'ai été péniblement impressionné en lisant, dans un des derniers numéros du *Bulletin de l'Académie*, une notice dans laquelle M. Folie apprécie son illustre confrère. Outre des affirmations erronées, provenant de ce que l'auteur ne connaissait pour ainsi dire pas l'homme dont il parle, elle renferme une erreur de fait contre laquelle c'est

un devoir sacré pour moi de protester, car elle revient à une imputation que Hirn aurait tenue pour injurieuse, celle d'avoir expérimenté dans le but de faire prévaloir une idée préconçue et non en vue de chercher la vérité.

« Hirn, dit M. Folie (1), se rangea d'abord parmi les « adversaires de la théorie de R. Mayer, et ce furent « les expériences qu'il institua dans l'intention de la ren- « verser qui le convertirent et tirent de lui l'un de ses « plus fervents adeptes. »

Voici la vérité, que M. Folie connaîtrait s'il avait lu les pages 188 à 277 du *Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse*, tome XXVI, 1834 :

Hirn, alors simple surveillant des machines de la manufacture Haussmann, au Logelbach, avait, vers 1843, institué une série d'expériences sur le frottement, dans le but modeste d'essayer les huiles de graissage. Il avait remarqué que le frottement produisait du calorifique, dont il avait même mesuré la quantité; et c'est au cours de ces expériences qu'il découvrit la loi formulée comme il suit (p. 202, *loc. cit.*) : « La quantité « absolue de calorifique développé par le frottement « médiate est directement et uniquement proportionnelle « au travail mécanique absorbé par ce frottement... » C'est la loi d'équivalence de Mayer, énoncée pour un cas particulier, et elle était inscrite dans le mémoire de Hirn que Fourneyron présenta à l'Académie des Sciences de Paris le 26 février 1848, et qui fut ensuite retiré par son auteur. Ce mémoire ne vit le jour qu'à la séance du 28 juin 1834 de la Société industrielle de Mulhouse. Dans le *Bulletin* de cette Société, tome XXVI, se trouve, à la suite du mémoire, une notice dont je fais un extrait un peu long peut-être, mais nécessaire pour établir la vérité (pp. 238 et suiv.).

« A l'époque, dit Hirn, où j'exécutais cette série « d'expériences sur la production du calorifique par le « frottement, j'ignorais complètement ce qui avait été « fait de précis sur le même sujet, d'une part, et depuis « quelques années déjà par Mayer de Heilbronn, « d'autre part, et plus récemment par Joule, en Angle- « terre, et par Regnault, en France, j'avais achevé mon « mémoire et je l'avais déposé entre les mains de « M. Dollfus, lorsqu'un article de M. L. Foucault « (*Journal des Débats* du 8 juin) m'apprit qu'en ce qui « concerne la loi calorifique posée dans le texte,

¹ Extrait des *Bull. de l'Acad. roy. de Belgique*, 3^e série, t. XX, n^o 7. pp. 132-137, 1890.

¹ *Bull. de l'Acad. roy. de Belgique*, 3^e série, t. XIX, n^o 3, p. 175. 1890.

« j'avais été devancé par d'autres physiciens, et me
 « permit ainsi de me mettre à l'abri d'une accusation bien
 « imméritée de plagiat... D'après ce court exposé, on
 « voit que j'ai été, à mon insu, devancé quant à la loi
 « calorifique en question, non seulement en date, mais
 « encore sous le point de vue de la généralisation du
 « principe : ce que je restreins timidement au cas
 « particulier du frottement médiat a été étendu d'une
 « manière absolue à tous les cas possibles par
 « MM. Mayer, Joule et Regnault... Considéré dans
 « l'ensemble et la généralité qu'a su lui donner le
 « physicien de Heilbronn, l'énoncé du principe dyna-
 « mique de Mayer constitue certainement une des plus
 « grandes découvertes de notre époque...; l'énoncé
 « de Mayer nous montre que le calorique constitue une
 « force accélératrice, une cause du mouvement de la
 « matière pondérable.... Il n'y a donc, je le pense,
 « aucune exagération à dire que les découvertes de
 « l'existence d'un ÉQUIVALENT DYNAMIQUE du calorique
 « et d'un ÉQUIVALENT CHIMIQUE de l'électricité se rangent
 « à bon droit à côté de la découverte de la gravitation
 « universelle. »

Hirn, qui parle ainsi du principe de Mayer quelques
 jours après qu'il était venu à sa connaissance, à qui
 ce principe a révélé l'existence de l'ÉLÉMENT DYNAMIQUE,
 de la force à côté de la matière, ce qui fera désormais
 l'objet de toutes ses recherches et de toutes ses médi-
 tations, Hirn va-t-il instituer des expériences dans
 l'intention de renverser ce qu'il a admiré ! Hirn, qui ne
 connaissait même pas les travaux de Mayer, s'était-il
 rangé d'abord parmi les adversaires de la nouvelle
 théorie ? Erreur de fait donc de la part de M. Folie ;
 mais cette erreur est grave, car elle porte atteinte au
 caractère si honnête de Hirn, et d'autant plus qu'il s'y
 joint des erreurs d'appréciation telles que celles-ci :
*une illuminée... des convictions non seulement spiritualistes,
 mais chrétiennes chez l'un comme chez l'autre (!)..., plu-
 sieurs travaux importants lui ont été dictés par ses con-
 victions spiritualistes et par sa conscience de croyant (!).*

Non ! M. Folie, qui n'a vu Hirn qu'un quart d'heure
 dans sa vie, qui a fort peu correspondu avec lui, ne
 l'a nullement compris ; je me sens même obligé de lui
 enlever une illusion : cette sympathie dont il se flatte
 n'était pas partagée par Hirn, j'en ai la preuve. Il n'y
 avait, d'ailleurs, rien de commun dans le caractère et
 dans la conviction de ces deux hommes.

Ayant donc eu connaissance de la loi de Mayer, Hirn
 institua, en effet, des expériences, non pour la renverser,
 mais pour la vérifier. Il avait des doutes, provenant des
 chiffres différents trouvés dans des ordres de phéno-
 mènes différents, et c'est pour les dissiper qu'il procéda
 à des essais nouveaux, dans de nouvelles directions,
 et principalement sur les machines à vapeur. Est-ce là
 devenir un converti, un fervent adepte de la théorie de
 Mayer ? J'ose affirmer qu'à la fin de sa vie Hirn ne
 croyait pas que l'on fût en possession de la véritable

valeur de l'équivalent mécanique, ni même d'une
 démonstration expérimentale de sa constance.

A la page 242 du *Bulletin de la Société industrielle*,
 déjà cité, Hirn dit : « Ce qui constitue l'importance de
 « l'énoncé de Mayer, ce qui en fait une des grandes
 « lois de la nature, c'est sa généralité. Il est donc
 « essentiel de chercher si l'équivalent mécanique varie
 « d'un cas à un autre, de déterminer l'amplitude de ces
 « variations, en admettant qu'elles existent, et de voir
 « si cette amplitude est suffisante pour nous permettre
 « de prononcer contre cette généralité même, qui fait
 « le premier caractère de l'énoncé de Mayer... » Et
 page 251 : « elle met en évidence cette généralité,
 « pourvu qu'à l'énoncé du physicien de Heilbronn on
 « ajoute cette légère modification : la constance par-
 « faite de l'équivalent mécanique du calorique est trou-
 « vée par de faibles éléments perturbateurs, dont la
 « nature reste encore à déterminer, et ne pourra l'être
 « que par de nouvelles expériences d'une exactitude
 « excessive ; autrement dit, il est probable que cet équi-
 « valent est rigoureusement stable, mais que des cir-
 « constances accessoires, quoique spéciales à chaque
 « genre de phénomène, modifient très légèrement sa
 « valeur apparente et ne serviront, une fois bien étu-
 « diées, qu'à mieux faire ressortir l'universalité de la
 « loi calorifique. »

Les expériences que Hirn institue dans la suite sont
 d'une nature toute nouvelle ; elles se font en grand sur
 une machine à vapeur de plus de cent chevaux. Comme
 Pa dit Clausius, cette détermination de l'équivalent
 mécanique est la première obtenue « à l'aide d'une
 « expérience où l'on ait converti, non la force en
 « chaleur, mais la chaleur en force, et où le corps
 « soumis à l'expérience soit revenu à son état
 « primitif ». Dans ces nouveaux essais, l'action ther-
 mique des parois des cylindres était un élément per-
 turbateur que Hirn étudia et d'où il tira sa *Théorie
 pratique*, acceptée par tous ceux qui connaissent les
 machines à vapeur telles qu'elles sont, et autrement
 que dans des formules.

Le principe expérimental de Mayer avait conduit
 Hirn à la conclusion que l'univers n'était pas formé
 d'un élément seulement, la matière en mouvement,
 qu'on ne pouvait méconnaître l'existence de l'élément
 dynamique, ni de l'élément animique. Et c'est sa soif
 de vérité qui lui a dicté ses expériences et les conclu-
 sions qu'il en a déduites dans divers mémoires. En
 fait, ses huit objections à la théorie cinétique des gaz
 sont restées debout, sans la moindre atteinte. Mais ceci
 est question d'appréciation.

Ma tâche est terminée, et mon but sera atteint, si j'ai
 pu contribuer à détruire l'impression peu favorable
 que doit laisser dans l'esprit du lecteur la manière
 inexacte dont la notice de M. Folie expose les idées et
 les travaux d'un des plus illustres associés de l'Aca-
 démie royale de Belgique.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

II. TOUSSAINT

La mort du professeur H. Toussaint a plus attristé
 que surpris ceux qui connaissaient son immense infor-
 tune. A 34 ans, le mal, frappant à la tête cet expé-
 rimentateur acharné, interrompait brutalement une
 carrière suffisamment remplie déjà, pour que l'on
 pût croire qu'elle était celle d'un homme auquel le
 temps n'a pas été marchandé. Puis, lentement, sourde-
 ment, la nature s'est mise à détruire ce cerveau qu'elle
 avait organisé d'une façon supérieure ; les ténébres sont
 descendues sur ce foyer de lumière ; un vague amour
 des vérités à découvrir a persisté d'abord ; enfin la nuit
 sombre est venue, tout s'est éteint ; seul le corps a sur-
 vécu plusieurs années à cet esprit, à cette puissance et
 d'originalité, et qui, sans dédaigner les travaux des

autres, pensait plus volontiers sa propre pensée.

Elève de l'Ecole vétérinaire de Lyon, Toussaint s'éprit
 bien vite pour la science d'un amour qui alla jusqu'à
 la passion. Il est juste de reconnaître qu'il débutait à
 un moment où renaissait la faveur des hautes études,
 et que le milieu dans lequel le sort l'avait placé était
 merveilleusement propre à développer ces sentiments.
 Avant d'être un grand corps universitaire officiel,
 l'Ecole lyonnaise existait par la force des choses. A ne
 citer que quelques noms, rappelons que Bonnet, qu'Ol-
 lier avaient illustré sa renommée chirurgicale ; que la
 syphiligraphie s'enorgueillissait de Rollet, de Diday.
 Tout à côté, sous la vigoureuse impulsion de Chauveau,
 se créait une féconde pépinière d'expérimentateurs dis-

tingués. Faut-il préciser ? Faut-il remettre en mémoire la collaboration de maîtres tels que Marey, et noter les recherches d'Arloing, de Tripiet, etc. ?

Au contact des savants, Toussaint n'imaginait rien de plus beau que d'être savant lui-même; il ambitionna leur gloire, leur notoriété, ambition noble et légitime, qu'il devait satisfaire à un âge où la plupart sont encore des élèves.

La liste de ses travaux est longue et variée; on ne peut qu'en indiquer les principaux, en signalant leur portée. Cette liste s'ouvre en 1869 par une monographie des plus consciencieuses sur l'anatomie comparée du pneumo-gastrique des animaux domestiques. Vers 1873, il publie une note sur le cheval de la station préhistorique de Solutré. — Viennent ensuite un traité de chirurgie vétérinaire; des expériences relatives à la circulation; un mémoire sur l'électricité des nerfs, en collaboration avec le professeur Morat, mémoire qui valut à ses auteurs le prix de physiologie expérimentale de l'Institut. Il convient de citer encore un ouvrage « sur l'intervention des puissances respiratoires de la rumination », ouvrage qui, complété par des développements importants, devait mériter à l'auteur le titre de docteur ès sciences.

A l'origine, muni simplement du diplôme de vétérinaire, Toussaint voulut en effet s'ouvrir l'accès aux fonctions du haut enseignement. Il savait que pour occuper une chaire, dans notre pays, un grade universitaire ou un concours heureux vaut souvent mieux que des connaissances techniques afférentes ou un bagage scientifique personnel. Ne demandant rien à la faveur, il suivit les voies droites, subit les épreuves du baccalauréat, de la licence ès sciences, du doctorat en médecine, devint professeur à l'Ecole vétérinaire, puis à l'Ecole de médecine à Toulouse. — Plus tard, lors des premières atteintes, à une période où la force d'énergie l'infortuné savant cherchait à retenir ses facultés fuyantes, le gouvernement lui décerna la croix de chevalier, récompense conquise par tant de services et qui semblait venir comme elle vient à ceux qui tombent au champ d'honneur. Mais les places et les dignités n'ont jamais détourné Toussaint du travail.

A un moment donné, quittant la physiologie, il se jeta avec enthousiasme dans la bactériologie. — Une doctrine était née, ne détruisait pas, pour qui savait la comprendre, la vieille médecine, mais l'expliquant, l'éclairant, la complétant; doctrine qui reposait sur l'application de l'idée la plus simple, la plus grandiose, la plus claire: l'idée pastoriennne; doctrine qui touchait à la chimie la plus élevée en touchant aux fermentations, à la philosophie la plus haute en s'attaquant à la génération spontanée, doctrine qui devait intéresser l'agriculture, l'hygiène, la chirurgie, l'obstétrique, et même fertiliser certaines industries, etc. Jamais peut-être pareille révolution n'avait remué la biologie; jamais pareille sémence n'avait été distribuée à ceux qui avaient faim de vérité. — Du reste, tout jeune, Toussaint avait pu voir de près l'étude des virus poursuivie avec succès en même temps que l'étude de la physiologie. N'est-ce pas du laboratoire où il avait la bonne fortune d'être assistant, qu'était sortie en 1867 cette parole fondamentale: « Les virus (virus de la morve, de la vaccine, de la clavelée, etc.) sont des corps qui ne sont ni liquides, ni gazeux, ce sont des corps solides », et l'expérience fournissait la preuve de cette affirmation. Il est vrai que la nature intime de ces corps solides, des principes de ces virus, avait échappé au chef de l'Ecole de Lyon qui les déclarait être des éléments albuminoïdes. Toutefois, il faudrait une vue singulièrement basse pour ne pas apercevoir par-dessus ce grain de sable l'immensité de l'horizon. Afin de comprendre toute la grandeur de cette découverte, il convient, comme pour d'autres, de la juger non pas avec les données que nous possédons à l'heure présente, mais en se rapportant à la somme de connaissances que l'on avait il y a vingt-quatre ans en bactériologie, c'est-à-dire à un moment où cette science était à peine née.

Toussaint mettait bientôt hors de doute l'existence du microbe du choléra des poules que Perroncito avait signalé. Ce microbe devait procurer à Pasteur le moyen de créer un vaccin expérimental, et de découvrir une méthode de l'atténuation des virus.

La tuberculose, cette question dominante, fixa également l'attention du professeur de Toulouse. Il étudia la virulence des humeurs, du liquide urinaire, de la sérosité vaccinale. Enfin, il crut avoir cultivé l'agent pathogène, cela à une époque où les idées étaient loin d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. L'avenir, il faut le reconnaître, devait montrer que la bactérie isolée n'était pas le microbe de la phthisie humaine. Toutefois, ceux qui ont si vivement et si souvent reproché à son auteur cette erreur microbienne auraient dû au moins se souvenir que Claude Bernard disait qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Il est probable en effet que Toussaint s'est trouvé en présence du germe d'une de ces affections que l'on décrit aujourd'hui sous le nom plus ou moins heureusement choisi de pseudo-tuberculose, peut-être du germe de la pseudo-tuberculose relatée par Courmont.

Le charbon de Davaine fut longtemps la pierre angulaire de la microbie, quoique la bactériologie ait au point de vue botanique une organisation spéciale, quoique ses sécrétions dans les bouillons habituels ne possèdent que fort peu de propriétés toxiques ou vaccinales. Cette maladie devait être pour Toussaint un objet d'étude de prédilection.

Charge par le Gouvernement de suivre les épizooties de la Beauce, il s'appliqua d'abord à démêler comment les germes pénétraient dans l'organisme. Il vit que cette pénétration ne se produisait pas brusquement; que ces germes subissent des étapes dans les ganglions. — En développant ce thème, il en fit sa thèse de doctorat en médecine, thèse qu'il soutint à Lyon en 1879. Simple auditeur à cette soutenance, c'est là que nous l'avons connu; c'est là que nous l'avons entendu développer ses idées sur le charbon en général. Il avait publié, ou publié depuis sur ce sujet divers mémoires: le mécanisme de la mort, action phlogogène du sang charbonneux, essai d'une théorie générale de l'infection, enfin et surtout: l'immunité pour le charbon, immunité acquise à la suite d'inoculations préventives.

L'étonnement, l'éloge et plus encore la critique, accueillirent cette dernière communication. Déjà loin de ces discussions, on peut porter un jugement plus impartial et dire que s'il ne convient pas de louer sans réserve ce travail, encore moins faut-il ne pas trop l'abaisser ou simplement le passer sous silence. — Toussaint croyait avoir démontré la théorie des produits solubles, théorie qui semble avoir hanté le cerveau de Claude Bernard au déclin de sa vie, et que le progrès incessant devait mettre en évidence quelques années plus tard. Cette croyance n'était pas exacte, car en chauffant, comme il l'indiquait, à 56°, on ne détruit pas complètement les bactéries, on diminue leur virulence. Toutefois, à côté de cette erreur, il reste un fait et une méthode.

Le fait est celui de la découverte d'un vaccin, et, dans l'espèce, on sait combien depuis lors ce fait a pris faveur. Les esprits non prévenus sentaient du reste qu'un grand mouvement agissait la médecine. Pasteur avait atténué le choléra des poules. Toussaint élargissait le débat; son expérience n'avait pas été réalisée avec l'oxygène, mais à l'aide de la chaleur, méthode ou procédé qui devait atteindre une grande précision entre les mains de Chauveau.

Est-ce suivant la formule absolument exacte, suivant celle que nous connaissons aujourd'hui, qu'opérait Toussaint en 1880? Autant vaudrait demander: la vérité s'est-elle jamais montrée entière à ceux qui ont eu le bonheur rare et sans égal de la voir se révéler à eux. Le progrès marche; il a perfectionné cette donnée après beaucoup d'autres, au point de vue théorique, comme au point de vue pratique. Par un besoin instinctif de notre esprit, nous édifions des doctrines, et parfois nos

raisonnements sont faux, quand les expériences sur lesquelles nous nous appuyons sont exactes. De nos opinions actuelles, que pensera-t-on un jour, qui sera peut-être demain? C'est là le privilège de la méthode expérimentale; elle peut conduire, alors que nous partons de prémisses erronées, à la connaissance, voire même au gouvernement de la nature : il arrive que

notre puissance dépasse notre science. Toussaint ne cherchait pas précisément la méthode de l'atténuation par la chaleur, quand il la découvrit. Néanmoins, quelles que soient les critiques et les imperfections de son œuvre, ses expériences suffiront à préserver son nom de l'oubli.


D^r CHARRIN.

NOUVELLES


UN NOUVEAU GAZ : L'ACIDE AZOTHYRIQUE

Le professeur Curtius, de Kiel, auquel on doit déjà la découverte de l'hydrazine, vient de préparer un nouveau composé gazeux de l'azote et de l'hydrogène. Voici, d'après M. Tutton¹, les premiers renseignements communiqués au congrès scientifique de Brème sur cet intéressant composé.

D'après l'analyse, ce gaz répond à la formule $Az^3 H$. Sa constitution doit être exprimée par le schéma




De fait, c'est donc le composé hydrogéné correspondant à la diazobenzène-imide de Griess, avec une chaîne fermée de trois atomes d'azote :




Ce nouveau gaz est très soluble dans l'eau. La solution possède des propriétés fortement acides; elle est capable de dissoudre plusieurs métaux tels que le zinc, le cuivre et le fer, avec dégagement d'hydrogène et formation d'azotures dans lesquels les métaux remplacent l'hydrogène mis en liberté. En égard à ces propriétés fortement acides, le nom d'azo-imide qui conviendrait à ce nouveau corps d'après les règles de la nomenclature organique ne paraît cependant pas très heureux. C'est pourquoi M. Curtius propose de lui substituer celui d'*acide azothyrique* (Stickstoff-Wasserstoffsäure).


En étudiant les propriétés de l'hydrate d'hydrazine $Az^2 H^4$, $H^2 O$, M. Curtius a constaté que ce corps décompose l'acide benzoyl-glycolique. Dans ces conditions, deux molécules d'hydrate d'hydrazine réagissent sur une molécule d'acide; il y a élimination d'eau et formation de benzoyl-hydrazine et d'une hydrazine acétique, le tout d'après l'équation :



Sous l'influence de l'acide azoteux, la benzoylhydrazine forme un dérivé nitrosé, lequel, perdant spontanément de l'eau, se change en benzoyl-azo-imide :



On décompose alors la benzoylazo-imide par ébullition avec un alcali; il se forme un benzoate alcalin et le sel du nouvel acide :



Il ne reste plus qu'à chauffer cet azoture de sodium avec l'acide sulfurique, pour mettre en liberté l'acide azothyrique. Ce gaz étant décomposé par l'acide sulfurique concentré et chaud, il faut employer pour cette opération un acide dilué.

L'acide azothyrique possède une odeur très pénétrante, provoquant de violents accès de toux. Il se dissout en grande quantité dans l'eau; cette solution n'est pas sans analogie avec celle de l'acide chlorhydrique. Distillée, elle se comporte comme cette dernière: il passe d'abord un acide concentré, puis un acide plus dilué, tous deux de composition constante. La solution aqueuse possède l'odeur du gaz libre et est franchement acide au tournesol.


Avec le gaz ammoniac, l'acide azothyrique forme des vapeurs denses d'un sel d'ammonium :



composé volatil en dessous de 100°, susceptible de cristalliser; les cristaux n'appartiennent pas au système cubique comme ceux de chlorure d'ammonium.


La solution aqueuse d'acide azothyrique, même très diluée, dégage rapidement de l'hydrogène lorsqu'on la met en contact avec du zinc, du cuivre, du fer et plusieurs autres métaux. Les sels d'argent et de mercure sont seuls insolubles dans l'eau, ce qui complète encore la ressemblance avec les chlorures. L'acide possédant en outre des propriétés faiblement réductrices, certaines solutions salines, celle du sel de cuivre par exemple, laissent déposer, après ébullition, des oxydes inférieurs. La solution du sel de baryum, $Ba Az^6$, abandonnée de grands cristaux anhydres.

La solution aqueuse d'acide azothyrique ou de ses sels solubles donne avec l'azotate d'argent un précipité qui ressemble beaucoup au chlorure d'argent. L'azoture d'argent



ne noircit cependant pas lorsqu'on l'expose à la lumière et il se distingue encore du chlorure d'argent par ses propriétés explosives caractéristiques. Le sel de mercure est de même très explosif.

Les sels métalliques peuvent enfin être transformés en éthers-sels lorsqu'on les fait réagir avec les éthers halogènes. L'azoture de phényle, préparé par cette méthode, s'est trouvé complètement identique avec la diazobenzène-imide de Griess :



ce qui était à prévoir et ce qui est bien la confirmation de la formule développée de l'acide azothyrique.

Philippe A. GUYE.

Le Gérant : OCTAVE DOIN.

¹ The Nature, Octobre 1890, p. 615.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

UN NOUVEAU TYPE DE COMPOSÉ CHIMIQUE :

LE NICKEL TÉTRACARBONYLE

Trois chimistes anglais, MM. Ludwig Mond, Carl Langer et F. Quincke, viennent d'obtenir un nouveau corps dont la composition et les propriétés sont également imprévues. Ce composé, qu'ils ont préparé par union directe de l'oxyde de carbone et du nickel, sous forme d'un liquide très volatil, est nommé par eux nickel-tétracarbonyle et répond à la formule $\text{Ni}(\text{CO})_4$. Outre l'importance qui s'attache à la découverte, chaque jour plus rare, d'un nouveau type chimique, le nickel-tétracarbonyle force l'attention par la singularité de sa formation et de ses propriétés. En raison de l'intérêt que présente ce nouveau corps, nous croyons devoir décrire, avec quelques détails, les faits qui ont conduit à sa découverte et ont permis d'établir sa composition.

I

MM. Ludwig Mond, Langer et Quincke étudiaient l'action de l'oxyde de carbone sur le nickel, à une température d'environ 400°. Il se forme dans ces conditions un composé de carbone et de nickel, et de l'acide carbonique. Pour éviter que l'excès de gaz toxique pût se répandre dans le laboratoire, un brûleur Bunsen était placé à l'extrémité du tube de dégagement. Un jour que le courant de gaz avait été continué pendant le refroidissement du nickel, les auteurs virent tout à coup la flamme du bec Bunsen devenir très lumineuse, semblant

indiquer ainsi la présence d'un composé métallique dans le gaz dégagé. L'expérience, répétée à plusieurs reprises, montra que ce fait se produisait seulement lorsque le nickel s'était refroidi au-dessous de 50°; le composé formé était donc détruit par la chaleur, et, en effet, en chauffant un point du tube de dégagement, on obtint, en ce point, un dépôt de nickel sous forme de miroir métallique.

Enfin, les trois chimistes reconnurent qu'on pouvait isoler la majeure partie du composé contenu dans le mélange gazeux qui sortait de l'appareil par un refroidissement énergique, et ils l'obtinrent alors sous forme d'un liquide incolore.

Sans insister sur les nombreuses expériences faites en vue de fixer les conditions de formation les plus favorables, donnons seulement le procédé de préparation définitivement adopté. De l'oxyde de nickel, introduit dans un tube à combustion, est réduit par l'hydrogène à une température de 400°. On laisse refroidir, et lorsque la température est d'environ 30°, on dirige dans le tube un courant d'oxyde de carbone. Le gaz passe ensuite dans un tube entouré d'un mélange réfrigérant de glace et de sel, et y dépose, à l'état liquide, la majeure partie du nickel-tétracarbonyle qu'il contient. Au bout d'un certain temps, la formation de ce composé s'arrête; mais pour en obtenir de nouvelles quantités il suffit de chauffer de nouveau le nickel

à 400° et de le laisser refroidir. La combinaison semble même se faire plus facilement après quelques opérations.

II

Le liquide obtenu est incolore ; il bout à 43° environ et se solidifie à -25°. A une température de 60°, la vapeur fait violemment explosion : il se produit alors dans la molécule du nickel-tétracarbonyle la réaction obtenue à chaud par l'action de l'oxyde de carbone sur le nickel, et cette réaction, dégagant de la chaleur, devient rapidement explosive. Cette décomposition peut être modérée, si l'on a soin de l'effectuer en faisant passer le gaz dans un tube capillaire chauffé. On peut constater alors que le mode de décomposition varie, et que le nickel qui se dépose est plus ou moins souillé de carbone, suivant la température à laquelle on opère. A 180°, il se dépose du nickel parfaitement pur, et c'est sur cette propriété qu'on s'est basé pour soumettre le composé à l'analyse, en faisant passer à plusieurs reprises la vapeur dans un tube chauffé au moyen de la vapeur d'ani-line.

Dans une première série d'expériences, effectuées sur le mélange gazeux à sa sortie du tube, on a trouvé en moyenne : 0°2649 de nickel combinés à 403° d'oxyde de carbone.

Or la formule $\text{Ni}(\text{CO})_4$ conduit aux proportions suivantes :

0°2615 de nickel combinés à 400° d'oxyde de carbone.

Une deuxième série d'expériences a été effectuée sur le composé liquide. On dosait le nickel par décomposition à chaud et le carbone par combustion au moyen de l'oxyde de cuivre. On a trouvé ainsi :

33,36 % de nickel et 66,3 % d'oxyde de carbone, les proportions calculées d'après la formule $\text{Ni}(\text{CO})_4$ étant :

34,3 % de nickel et 65,6 % d'oxyde de carbone.

Les écarts obtenus dans cette deuxième série sont probablement dus à l'oxyde de carbone qui reste dissous dans le liquide.

Enfin, la densité de vapeur, mesurée à 40° au moyen de l'appareil à déplacement d'air de Meyer est de 6,01, la densité théorique pour $\text{Ni}(\text{CO})_4$ étant 5,9.

La formule $\text{Ni}(\text{CO})_4$ semble donc nettement éta-

blie. Quant à la formule de constitution, MM. Mond, Langer et Quincke se proposent de l'établir après étude des réactions diverses du nouveau composé, principalement de son action sur les corps organiques.

III

Etant donnés les résultats rappelés ci-dessus, il était naturel de rechercher si la propriété de se combiner avec l'oxyde de carbone appartenait au seul nickel, et s'il n'était pas possible d'obtenir, avec d'autres métaux, des composés analogues au nickel-tétracarbonyle. Les expériences, effectuées sur le cobalt, le fer, le cuivre et le platine, dans tout l'intervalle de température compris entre 15° et 750°, ont constamment donné des résultats négatifs. Avec le cobalt on obtient tout d'abord une coloration de la flamme du Bunsen, mais ce phénomène est dû à la présence de nickel, qu'il est, comme on sait, très difficile de séparer complètement du cobalt. La formation du nickel-tétracarbonyle permet donc, non seulement de reconnaître dans le cobalt métallique la présence de petites quantités de nickel, mais aussi d'éliminer complètement ce dernier métal. Quant au nickel, rigoureusement exempt de cobalt, on l'obtient en décomposant par la chaleur la vapeur de nickel-tétracarbonyle. La séparation rigoureuse de ces deux métaux n'avait, pour ainsi dire, pas été obtenue jusqu'à présent. Sur ce nickel parfaitement pur, MM. Mond, Langer et Quincke ont repris la détermination de l'équivalent. La moyenne de leurs résultats est 58,58, nombre très voisin de celui généralement adopté 58,74. Cela vient contredire les résultats obtenus par MM. Krüss et Schmidt qui pensaient avoir séparé dans le nickel deux corps différents¹.

En résumé la découverte tout à fait inattendue du nickel-tétracarbonyle nous révèle un composé liquide des plus remarquables ; l'étude de ce corps a déjà conduit à reconnaître plusieurs faits très intéressants, et l'on peut espérer que les recherches plus complètes qu'effectuent en ce moment MM. Mond, Langer et Quincke introduiront dans la science bon nombre de résultats importants et nouveaux.

Georges Charpy,

Professeur à l'Ecole Monge.

¹ Voir la *Revue* du 30 janvier 1850, page 56.

LES TUBERCULES ET LE BACILLE DE LA TUBERCULOSE

Les travaux de M. Metchnikoff ont introduit en pathologie générale cette notion, aujourd'hui bien démontrée, que, parmi les moyens de défense dont dispose notre organisme pour lutter contre les infiniment petits qui l'assiègent, l'activité digestive des cellules vivantes à l'égard des microbes remplit un rôle très important¹. Cette fonction protectrice si curieuse est dévolue à des éléments cellulaires ou *phagocytes*, dont les uns, munis d'un gros noyau (macrophages) sont distribués dans tous les tissus (telles, les cellules du tissu conjonctif, les cellules épithéliales) et dont les autres, pourvus de plusieurs noyaux (microphages) sont répartis dans le système circulatoire, particulièrement dans la circulation lymphatique, d'où ils émigrent, au besoin, pour se porter dans les points où se fait l'agression microbienne.

Il y a ainsi un double système de défense fixe et de défense mobile qui réussit souvent à annihiler le microbe et à prévenir la maladie. Lorsqu'en effet la victoire reste aux phagocytes, l'examen microscopique montre ces derniers remplis de bactéries déformées, entamées, mal colorables, parfois à peine apparentes, en un mot, *digérées* et *détruites*.

La tuberculose, cette affection dont la localisation dans les poumons, la phthisie pulmonaire, détermine à elle seule un septième de la mortalité générale dans les pays civilisés, est causée par un microbe en forme de batonnet ou bacille, découvert et isolé par M. Koch (fig. 1). En se multipliant dans nos tissus, en particulier dans les poumons, il amène la formation de petites nodosités grisâtres, du volume d'un grain de mil ou d'un pois (*tubercules*) qui envahissent, en amas parfois très confluent, la totalité du parenchyme, se ramollissent, se vident dans les bronches avec l'expectoration et laissent ainsi des cavernes suppurantes remplies d'un pus visqueux, jaunâtre et fétide.

Nousque notre organisme est-il armé pour lutter contre le bacille de la tuberculose? Que font les phagocytes, ces champions toujours en éveil, en face d'un ennemi aussi redoutable, et pouvons-nous espérer qu'ils en seront victorieux?

Il est peu de maladies où le processus phagocytaire soit plus intense que dans la tuberculose; où l'ingestion du microbe par les cellules soit plus manifeste; mais il en est malheureusement peu aussi où elle soit moins efficace. Toute bataille

amène un vainqueur et un vaincu: dans ce conflit entre le parasite de la tuberculose et la cellule



Fig. 1. — A, Bacilles de la tuberculose à un fort grossissement (Oc. V, Obj. à imm. homog. $\frac{1}{10}$ Leitz). — B, les mêmes Bacilles, vus à un moindre grossissement, dans le crachat d'un malade atteint de phthisie pulmonaire. On voit aussi dans ce crachat des leucocytes déformés et des débris épithéliaux.

vivante, cette dernière succombe le plus souvent, détruite elle-même par le microbe qu'elle a englobé. Mais parfois, la cellule réussit dans son œuvre de protection: le bacille est morcelé, tué, digéré. Nous allons étudier ce processus en détail, marquant, pour ainsi dire, les points et tachant de faire assister aux diverses phases de la lutte des phagocytes contre l'agent pathogène de la tuberculose.

I

Dans son mémoire sur l'étiologie de la tuberculose, M. Koch a montré que, lorsqu'un bacille pénètre dans l'organisme, il est bientôt saisi par un leucocyte qui le transporte avec lui à travers la circulation lymphatique où il ne tarde pas à s'arrêter dans un organe et à servir de point de départ à une néoplasie tuberculeuse.

Pour étudier le mode de formation du tubercule, M. Yersin² inocula dans la veine auriculaire d'une série de lapins un peu de culture de bacille de la tuberculose. En sacrifiant un animal tous les deux jours, il a pu constater cette série de batailles que les phagocytes livrent contre le bacille de Koch. Dans le prologue de l'épopée morbide, le microscope montre, dans le foie, de petits nids de leucocytes agglomérés dans les fins vaisseaux capil-

¹ Voyez: M. E. Metchnikoff: Recherches nouvelles sur la Phagocytose, dans la *Revue* du 30 juillet 1890, page 425.

² Etude sur le développement du tubercule expérimental. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, 1888.

laïres ; au milieu de ces cellules sont quelques bacilles et certains d'entre eux sont déjà englobés. Un peu plus tard, sous l'influence de l'irritation provoquée par la présence du microbe, les cellules se multiplient et se groupent de plus en plus abondantes autour des colonies bacillaires. C'est alors qu'elles absorbent un grand nombre de microbes dans leur intérieur.

La lutte est donc engagée entre les phagocytes et les bacilles ; que va-t-il advenir ? Ce combat préliminaire tourne bien vite au succès des bacilles. Ceux-ci possèdent en effet une membrane extérieure très résistante contre laquelle viennent échouer les tentatives de digestion des cellules. Les bacilles, presque tous inclus dans les phagocytes où ils affectent quelquefois une disposition radiée, refoulent leurs noyaux et sont parfois tellement nombreux que l'on ne distingue plus la cellule où ils se sont multipliés extraordinairement (fig. 2). Le phagocyte vaincu sert alors d'aliment aux bacilles et la cellule se désagrège.




Fig. 2. — Tuberculose expérimentale. Injection intraveineuse de bacilles de Koch (lapin). Coupe du foie. — *b. t.*, amas bacillaires affectant une disposition radiée, et masquant la cellule dans laquelle ils sont situés. — *h.*, tranches des cellules hépatiques limitant les espaces capillaires où se sont arrêtés les bacilles.

Alors commence la deuxième phase de la lutte. De nouveaux leucocytes émigrés affluent, serangent en cercle autour des bacilles, les cernent. On aperçoit, en certains points, la disposition très remarquable qui suit (fig. 3) : au centre, dans un protoplasme amorphe ou granuleux résultant de la mort des premières cellules, on voit, groupés au milieu des ruines qu'ils ont amoncelées, des bacilles de Koch plus ou moins nombreux. Ça et là des granulations rondes, brillantes, très petites, probablement des spores du bacille (Grigorieff). Autour de

cette masse centrale, une couronne de leucocytes munis d'un gros noyau et engainés eux-mêmes dans une sorte de capsule fibrineuse commune. L'ensemble constitue cet élément si fréquent dans toute lésion néo-tuberculeuse : la cellule géante (fig. 3).

Pour M. Metchnikoff, la cellule géante est un véritable phagocyte doué de mouvements amiboïdes, comme le fait supposer le développement considérable de ses parties périphériques en tout semblables aux pseudopodes des rhizopodes (fig. 4).




Fig. 3. — Foie de faisan tuberculeux. Cellule géante remplie de bacilles.




Fig. 4. — Tuberculose humaine (pleurésie tuberculeuse chronique). Cellule géante munie de prolongements rameaux.

La cellule géante est, pour les bacilles de Koch, un adversaire bien plus redoutable que les macrophages ou les microphages, et nous allons voir maintenant intervenir les premiers succès de la réaction cellulaire contre les parasites de la terrible maladie.

Pour étudier les phénomènes intimes des cellules sont le siège, M. Metchnikoff¹ s'est adressé à un rongeur des environs d'Odessa, le *Spermophilus guttatus* de Temminck, animal assez résistant au bacille tuberculeux. Lorsqu'on injecte une grande quantité de culture dans le péritoine de cet animal, on constate après sa mort que, tandis que dans les cellules à un seul noyau les bacilles inclus présentent un aspect normal, ceux qui sont engloutis par la cellule géante offrent au contraire des aspects de dégradation plus prononcés. Un certain nombre de bacilles sont digérés et cet état se traduit par une déformation des microbes, par la perte de leurs propriétés spéciales de coloration aux couleurs d'aniline. Beaucoup d'entre eux paraissent entourés d'une vacuole claire ; ils sont pâles et finissent par disparaître peu à peu en laissant seulement par leur groupement « une suite de formes en saucisson » tout à fait caractéristiques, dont la configuration « générale rappelle seule le bacille originaire, « qu'on y retrouve quelquefois sous la forme d'un « trait à peine apparent ». Ces blocs se fusionnent et finissent par former une masse compacte, ambrée où toute trace de bacille a disparu.

¹ Arch. f. path. An. u. Phys., Bd CXIII, Heft 1.

Ces phénomènes si remarquables s'effectuent exclusivement dans l'intérieur des cellules géantes. On n'observe rien de semblable en dehors d'elles, ce qui prouve bien qu'ils sont l'effet de la digestion intracellulaire. En réalité, cette action n'est pas une digestion au sens propre du mot, car elle transforme les microbes en une masse résistante, inattaquable par les acides et les alcalis : elle se rapproche beaucoup plus de ces phénomènes d'enkystement souvent observés chez les infusoires pour se protéger contre une influence nocive (Metchnikoff).

Le spermophile n'est pas le seul animal chez lequel se rencontre un pareil processus de phagocytose efficace. Chez le lapin, animal cependant très réceptif, on peut observer, toutes les fois que la durée de la tuberculose a été longue, des formes analogues de dégradation bacillaire dans les cellules géantes.

A côté de la cellule géante, défenseur souvent heureux de l'organisme contre le bacille de Koch, les macrophages et les microphages (fig. 5), pour



Fig. 5. — Formes diverses de phagocytes ayant englobé des bacilles de la tuberculose. (Oc. 1, Obj. à imm. homog. $\frac{1}{10}$ Ver.)

remplir un rôle beaucoup plus effacé, n'en possèdent pas moins une influence quelquefois délétère sur le même microbe. C'est ainsi qu'on peut observer dans ces derniers éléments cellulaires des bacilles granuleux, déformés ou mal colorés. Mais leur énergie digestive est, en général, minime. C'est ce qui explique combien facilement le bacille peut se multiplier à leur intérieur et y former, ainsi qu'on en jugera par les figures ci-jointes, des faisceaux composés de nombreux individus.

II

Les phagocytes ont paru, jusqu'à présent, n'avoir d'autre rôle que celui d'auxiliaires de l'organisme, chargés de le débarrasser d'hôtes dangereux. Mais voici que ces éléments cellulaires peuvent remplir leur rôle de protecteurs à rebours et devenir très souvent aussi des moyens de dissémination du microbe de la tuberculose. Comment une même cellule peut-elle entraîner par le fait de ses réactions des résultats aussi contraires ? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer.

On sait que la surface des cavités telles que la bouche, le nez, la trachée, les bronches, etc., qui

sont en communication directe ou indirecte avec l'extérieur, est tapissée d'une couche de cellules épithéliales et l'on supposait, d'après un récent travail de M. Wyssokovitch, que les épithéliums sains formaient dans tous les cas une barrière infranchissable à l'infection microbienne. On se croirait autorisé à en déduire que la pénétration du bacille de la tuberculose dans les bronchioles pulmonaires ou dans l'intestin, par exemple, est sans danger, si leur épithélium est intact.

Mais il n'en est pas ainsi : l'expérimentation démontre que l'inhalation de produits tuberculeux amène chez les animaux sains la tuberculose de leurs poumons ; de même l'ingestion de tissus tuberculeux détermine chez eux une tuberculose intestinale, etc.. Les muqueuses sont donc perméables au bacille de la tuberculose ou susceptibles d'être attaquées par lui (Villemin, Tappeiner, Cadéac et Malet, Cornil, Dobroklonsky, Cornet). Or cette pénétration se fait par l'intermédiaire des leucocytes qui interviennent aux points où le bacille tente de s'introduire à travers le vernis épithélial.

En voici un exemple. Lorsqu'on fait ingérer à un lapin quelques gouttes de culture du bacille de Koch et qu'on sacrifie ultérieurement l'animal pour constater l'état des lésions, on voit, à l'examen microscopique des coupes de l'intestin, infiltrés entre les cellules épithéliales des villosités ou des culs-de-sac des glandes de Lieberkuhn, des leucocytes nombreux, tantôt vides, tantôt contenant un ou plusieurs bacilles (Dobroklonsky). Or ces phagocytes, on le sait déjà, sont le plus souvent impuissants à digérer les bacilles ; condamnés, d'autre part, soit à rester sur place, soit à suivre le courant lymphatique qui les entraîne le long du tissu adénoïde sous-muqueux qui entoure les troncs vasculaires de l'intestin, ils emportent avec eux, dans ce dernier cas, les microbes pathogènes et les sèment ainsi partout où ils s'arrêtent, soit dans l'intestin, soit dans les ganglions lymphatiques du mésentère, soit plus loin encore, dans les viscères abdominaux. Ainsi s'effectuent la dispersion des bacilles et la multiplicité des lésions qui en résultent.

Il est très vraisemblable, sinon certain, qu'un mécanisme pathogénique analogue préside à la formation des lésions tuberculeuses dans les alvéoles pulmonaires, les plèvres et les ganglions bronchiques. A vrai dire, il n'existe pas encore d'expériences destinées à nous éclairer sur le mode initial intime de l'infection tuberculeuse dans le poumon ; mais, de celles qui ont été faites avec d'autres microorganismes, on peut en inférer ce qui se passe pour le bacille de Koch. Tchistovitch a montré, en effet, qu'après avoir fait inspirer à des

cobayes des microbes ou de la suie finement pulvérisée, on constate dans l'intérieur des alvéoles pulmonaires, à leur surface ou dans les fentes lymphatiques des cloisons alvéolaires, des phagocytes volumineux et nombreux qui ont englobé les poussières inoculées.

Même fait existe pour la tuberculose. « La surface des alvéoles pulmonaires, dit M. Metchnikoff (*loc. cit.*) est tellement tapissée de grands macrophages provenant des systèmes lymphatique et sanguin que ces cellules ont été longtemps envisagées comme des cellules épithéliales des alvéoles. » Dans ce champ de bataille phagocytaire qui constitue l'alvéole pulmonaire, les innombrables leucocytes immigrés accaparent, digèrent les microorganismes vulgaires inhalés avec l'inspiration. Plus résistants, les bacilles de la tuberculose, quoique englobés par les phagocytes défient leur activité digestive ; le nombre des bacilles avalés peut être considérable (fig. 6) et nous en avons compté jus-




Fig. 6. — Pneumonie tuberculeuse expérimentale (cobayes).
Frottis de poudon. Macrophages et microphages remplis
de bacilles. (Oc. 1, Obj. $\frac{1}{10}$, Ver.)

qu'à vingt, vingt-deux, dans une même cellule. Ces mêmes bacilles, peuvent, du reste, se multiplier *in situ* ou bien, conduits par les pérégrinations du phagocyte devenu leur hôte imprudent, ils viennent s'arrêter dans les plèvres et y déterminer la pleurésie vulgaire — qui est presque toujours tuberculeuse, — dans les ganglions et finalement les diverses sécrues et les viscères où la tuberculose se généralise.

Il est remarquable de voir combien est grande la fréquence de la tuberculose pulmonaire comparée à celle de l'appareil respiratoire supérieur : larynx et surtout fosses nasales. La muqueuse nasale constitue en effet probablement un appareil de défense très apte à lutter contre les microbes. Quant à l'arrière-cavité des fosses nasales et à ses annexes, elle est fortement protégée par un ensemble d'organes lymphatiques, follicules clos, glande de Luschka, on pourrait même ajouter : amygdales, véritables forts d'arrêt qui détruisent sur place les microbes ingérés. Leurs leucocytes ont une activité

telle que, en contact avec la muqueuse buccale, ils peuvent éroder sur une certaine étendue plusieurs couches d'épithélium. Ces mêmes leucocytes peuvent se gorger de bacilles de la tuberculose et, s'ils ne les tuent pas, favoriser l'infection tuberculeuse, soit en transportant ces microorganismes, soit en dénudant la muqueuse (Stöhr, Stschastny).

De l'ensemble des notions que nous possédons sur les rapports des phagocytes avec le bacille de Koch, il résulte donc que la présence de ce dernier dans l'organisme suscite un appel très intense des leucocytes. Mais quoiqu'englouti par ces phagocytes, digéré même parfois par eux, le bacille leur résiste le plus souvent.

La tuberculose n'est, du reste, pas la seule maladie dans laquelle l'englobement actif des microbes par les macrophages ou les microphages peut n'avoir aucune influence microbicide. C'est ainsi que dans la septicémie des souris, provoquée par un bacille très ténu, ce dernier est particulièrement abondant dans les phagocytes du sang et des tissus ; il en est de même pour le rouget du porc. Un autre exemple est fourni par la blennorrhagie dans laquelle le gonococque, happé par d'innombrables microphages, pullule à l'intérieur de ces cellules au point qu'on peut trouver facilement cinquante microbes et même davantage dans certaines d'entre elles.

C'est qu'en effet la phagocytose est un phénomène complexe : elle doit comprendre non seulement l'ingestion du microbe, mais encore et surtout sa digestion. La première est favorisée par les propriétés attractives qu'exercent parfois les sécrétions microbiennes sur les éléments lymphatiques¹ ; la deuxième, encore inconnue dans son essence, doit cependant être analogue à la digestion de certains organismes inférieurs tels que les amibes. Dans la tuberculose, où la digestion du bacille se fait parfois non sans quelque efficacité, le processus se borne cependant le plus souvent à la première partie du phénomène, à l'ingestion pure et simple du parasite : il y a dyspepsie cellulaire. Si, dans le conflit entre la cellule et le bacille de Koch la première est ordinairement mise en échec, c'est qu'il intervient plusieurs facteurs qui font pencher la victoire en faveur du parasite : d'une part, la résistance de sa membrane extérieure, — résistance telle que ce bacille se distingue précisément par la difficulté de le colorer — et, d'autre part, sans doute, les produits qu'il sécrète (Yersin) et qui paralysent le pouvoir digestif de la cellule.

D^r H. Vincent,

du Laboratoire de Bactériologie
du Val-de-Grâce.

¹ Gabritchovsky, voyez la *Revue* du 15 juillet 1890, page 414.

SUR LA THÉORIE DES RÉGULATEURS

(Suite et Fin) ¹.

10. *Second inconvénient du régulateur de Watt, insuffisance de force.* — Le second inconvénient du régulateur de Watt est de ne pouvoir surmonter que de faibles résistances; dès que l'effort à produire devient un peu sensible, on est obligé de donner au régulateur des dimensions très grandes et qui le rendent d'un emploi gênant; si cet effort devient considérable, comme lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire mouvoir une vanne hydraulique, on est conduit à des dimensions absolument inadmissibles.

On remédie à cet inconvénient en employant le mouvement du manchon, non plus à mouvoir directement la vanne d'admission, mais à mettre en jeu un mécanisme intermédiaire empruntant sa force au moteur lui-même.

La figure 6 indique le principe du dispositif dont il s'agit ².




Fig. 6. — AB, arbre mù par la machine; CD, arbre moteur de la vanne; EF, pignon d'ouverture de la vanne, fou sur AB; GH, pignon de fermeture de la vanne, fou sur AB; IJ, manchon à griffes, actionné par le levier de régulateur, peut glisser sur AB et non tourner.

Quand la vitesse de la machine augmente, les boules s'écartent, le levier tourne, le manchon à

griffes IJ, vient engrener avec MN et l'arbre AB mù par la machine communique alors le mouvement au pignon de fermeture de la vanne GH. Au contraire si la vitesse décroît, c'est KL qui engrène et le pignon d'ouverture EF qui se met en marche.

Ces appareils sont dits : « à action indirecte » par opposition à ceux précédemment décrits dits : « à action directe. »

On conçoit que le mode de fonctionnement de ces deux sortes d'appareils soit essentiellement différent.

Pour l'action directe, l'état de la machine est déterminé par la position du manchon; pour l'action indirecte, il dépend du temps pendant lequel l'embrayage a lieu.

Les régulateurs à action directe agissent rapidement, les autres sont à action lente; enfin, tandis que dans le cas de l'action directe, c'est l'inertie des boules qui les entraîne au-delà de la position qu'elles occupent quand la puissance devient égale à la résistance, dans le cas de l'action indirecte, c'est l'inertie de la machine elle-même qui prolonge la durée de l'action et l'inertie des boules ne joue plus qu'un rôle très secondaire.

11. Fonctionnement des régulateurs à action indirecte.

— Le système mécanique formé par la machine et le régulateur, supposé à action indirecte, ne peut rester en état de régime que si la vitesse est comprise entre les limites correspondantes à l'ouverture et à la fermeture de la vanne.

Quel que soit l'appareil à boules employé, on peut évidemment rendre la différence des vitesses d'ouverture et de fermeture aussi petite que l'on veut en réduisant le parcours des boules.

Il est facile ainsi théoriquement de resserrer la vitesse de régime de la machine entre des limites très voisines.

Mais, en pratique, l'on est vite arrêté dans cette voie; si l'on rapproche trop, en effet, les vitesses correspondant à l'ouverture et à la fermeture de la vanne, l'appareil devient sensible aux plus petites perturbations, il met constamment en jeu le mécanisme de commande du vannage et il n'y a plus d'état stable pour la machine.

On est d'ailleurs exposé ici comme pour les régulateurs à action directe aux oscillations indéfinies de la vitesse et l'on a à choisir entre une régularité très grande, avec une très grande lenteur de

¹ Voir *Revue générale des sciences pures et appliquées*, n° 20 du 30 octobre 1890.

² Il est essentiel que l'organe de mise en marche de commande soit facile à déplacer et, à ce point de vue, le manchon à griffes représenté par la figure 6 peut avoir des inconvénients. Il est préférable, dans la pratique, d'employer des courroies passant sur des systèmes de poulies folle et fixes.

rétablissement de la vitesse de régime, ou une action rapide pour rétablir le régime, mais avec des écarts notables de la vitesse.

En un mot, les oscillations de la vitesse peuvent être faibles et durer longtemps, ou être fortes et s'éteindre rapidement¹.

12. *Remarques sur la théorie des appareils à force centrifuge.* — Le fonctionnement général des régulateurs à action directe ou à action indirecte étant ainsi établi dans ses traits essentiels, nous devrions faire maintenant la théorie mathématique des appareils à force centrifuge, afin d'obtenir l'expression des éléments qu'il convient de considérer; mais nous ne pouvons songer à exposer dans cette *Revue* les détails de calculs abstraits.

Nous ferons seulement remarquer, et cette observation est fort importante, que la théorie à placer ici est celle des appareils à force centrifuge considérés isolément et non celle des appareils de régulation dont les premiers ne constituent, en somme, qu'un organe. La plupart des idées erronées qui ont eu cours sur la régulation des machines proviennent de cette confusion; on a étudié l'appareil à boules et l'on a cru avoir étudié l'appareil de régulation.

Nous nous bornerons, d'ailleurs, à titre d'indication, au cas des appareils isocèles où $AC = BE$ et $CD = ED$ (fig. 1 et 2)².

Désignons par F la résultante de toutes les forces extérieures agissant sur le manchon, c'est-à-dire la résultante de la pesanteur, des pressions exercées par les contrepoids s'il en existe, de la réaction de l'axe, des efforts transmis par les tiges..... etc., abstraction faite des résistances passives correspondant au déplacement du manchon et dont le caractère propre est de changer de sens quand ce déplacement vient lui-même à changer de sens.

Soient aussi : B le poids d'une boule, l la longueur des tiges, α leur inclinaison sur la verticale, m la distance de leur centre de suspension à l'axe du

régulateur, a la longueur des contre-tiges; on a pour la vitesse d'équilibre correspondante ω :

$$(1) \quad \omega^2 = \frac{9}{l \cos \alpha \pm m \cot \alpha} \left[1 + \frac{a F}{l B} \right]$$

Dans cette formule, on néglige le poids des tiges, on suppose les boules concentrées en leur centre et on prend le signe $+$ ou le signe $-$ selon que l'on a en vue un régulateur ordinaire ou un régulateur à bras croisés.

On voit par cette expression de ω^2 que si le manchon supporte une pression constante, la loi de succession des vitesses d'équilibre quand α varie est indépendante du poids de ce manchon, de




Fig. 7. — Centre de suspension au devant de l'axe.

l'effort constant auquel il résiste et du poids des boules.




Fig. 8. — Centre de suspension sur l'axe.

Dans cette hypothèse, cette loi est représentée par les courbes des figures 7, 8 et 9 dans lesquelles

¹ Les oscillations indéfinies de la vitesse sont, en général, inadmissibles en pratique; il est un cas cependant où elles cessent d'être un inconvénient; c'est lorsque leur durée est excessivement courte. On en trouve un exemple dans le moteur électrique à vitesse constante de M. Marcel Deprez. Ce régulateur se compose d'une simple lame élastique pressée contre l'arbre de rotation; quand la vitesse devient trop grande, la force centrifuge écarte cette lame de l'axe et le courant est interrompu.

Comme la vitesse est ici de 2,000 tours par minute et que les interruptions de courant se répètent deux fois par tour, soit près de 70 fois par seconde, cet état d'oscillation n'a pas d'importance pour les machines conduites.

Ce ne sont plus des oscillations à longues périodes qui se font sentir dans toute la transmission sur toutes les machines et affectent la vitesse de régime, mais des oscillations à très courtes périodes dont l'effet ne dépasse pas le moteur lui-même (lequel, du reste, peut être construit en conséquence) et qui ne troublent plus l'état permanent.

² Voir mon précédent article n° 20 de la *Revue*, 30 oct. 1890.

on a pris pour ordonnées les valeurs de α et pour abscisses les vitesses d'équilibre correspondantes; la figure 7 correspond au régulateur isocèle ordinaire; la figure 9 au régulateur, à bras croisés où




Fig. 9. — Appareil à bras croisés.

m est négatif; enfin la figure 8 au cas intermédiaire où les tiges sont attachées à l'arbre même du régulateur, c'est-à-dire où m est nul.

Il faut remarquer d'ailleurs que dans tout appareil de régulation une condition essentielle de fonctionnement est que la vitesse aille toujours en croissant dans le même sens pour toute la course; si cette condition n'était pas satisfaite il pourrait arriver, en effet, que le régulateur, à partir d'un certain moment, fermât la valve lorsqu'il devrait l'ouvrir. Aussi dans le cas du régulateur à bras croisés (fig. 9), il n'est pas possible d'utiliser les portions de parcours du manchon au-dessous de celle qui correspond au minimum de la vitesse.

13. *Degré d'isochronisme.* — Le degré d'isochronisme Δ est marqué par la différence des vitesses d'équilibre correspondant aux positions extrêmes du manchon, ou, plus exactement par le rapport de cette différence à la vitesse moyenne; on a ainsi :

$$(2) \quad \Delta = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}\right)}$$

en désignant par ω_2 et ω_1 les vitesses pour lesquelles la valve est totalement fermée ou complètement ouverte, si le régulateur est à action directe, et les vitesses pour lesquelles les embrayages de fermeture ou d'ouverture sont mis en action, si le régulateur est à action indirecte.

Dans un même appareil, il est ainsi bien évident que le degré d'isochronisme est d'autant plus petit

que la course est moindre; si cette course était nulle, l'isochronisme parfait serait atteint.

14. *Puissance du régulateur.* — Quand, la vitesse ayant varié, le régulateur entre en action, il doit, pour se déplacer, vaincre certaines résistances et il exerce un effort sur les obstacles qui s'opposent au mouvement du manchon.

On désigne sous le nom de *puissance* de l'appareil à boules l'effort correspondant à un changement relatif de vitesse égal à l'unité.

Il est facile d'établir que la puissance Φ ainsi définie est donné par l'expression :

$$(3) \quad \Phi = 3 \left(F + \frac{l}{a} B \right).$$

Si donc, l'on augmente le poids du manchon et, par suite, F , on augmente la puissance; mais, on voit par la seule inspection de la formule (1) qu'on fait croître en même temps la vitesse d'équilibre.

On reconnaît ainsi qu'en employant un manchon très lourd comme dans le régulateur Porter ou régulateur américain (fig. 10), on accroît la puis-




Fig. 10.

sance de l'appareil à boules sans le rendre plus encombrant, mais qu'on est obligé de le faire tourner plus vite.

15. *Sensibilité du régulateur.* — L'appareil, étant dans une position d'équilibre quelconque, ne la quitte que si la variation de vitesse est suffisante pour vaincre les résistances qui s'opposent au déplacement du manchon.

Désignons par ω la vitesse de régime correspondant à l'état d'équilibre considéré; par ω' la vitesse qui détermine le mouvement d'ascension et par ω''

la force de résistance à cette ascension, par ω'' et f'' les quantités correspondantes pour la descente; on a, comme il est facile de le démontrer :

$$\frac{f' + f''}{\Phi} = \frac{\omega' - \omega''}{\omega}$$

Cette quantité ε représentée ainsi, soit par $\frac{f' + f''}{\Phi}$ soit par $\frac{\omega' - \omega''}{\omega}$, marque la sensibilité de l'appareil à boules dans les conditions où il se trouve.

Comme la puissance Φ peut être rendue aussi grande que l'on veut, il semble à première vue que la sensibilité peut également être augmentée, c'est-à-dire que ε est susceptible de devenir inférieur à toute quantité donnée.

Il n'en est rien, car parmi les résistances à vaincre figurent les frottements de l'appareil à boules lui-même et ces frottements ne s'annulent jamais; il y a là, comme pour les balances, une limite de sensibilité que l'on ne saurait dépasser; c'est la *sensibilité intrinsèque* de l'appareil lui-même σ .

Il résulte de ce que nous venons de dire que la suite des vitesses pour lesquelles le régulateur entre en action forme deux courbes (Fig. 41) à peu




Fig. 41.

près équidistantes de la courbe d'équilibre et qui peuvent en être plus ou moins rapprochées, mais qui ne se confondent jamais avec elles; on voit ainsi que pour tous les appareils de régulation il y a, non pas une vitesse unique de régime, mais bien une zone de régime ¹.

16. *Etablissement des appareils de régulation.* — Pour établir un appareil de régulation en toute

¹ Ce sont MM. Boer et Dwelshauvers-Dery qui ont le mérite d'avoir les premiers distingué les vitesses de montée et de descente. Cette distinction, capitale quand on veut expliquer d'une façon nette les phénomènes présentés par le régulateur, a été exposée par eux dans la *Théorie nouvelle des Régulateurs* qu'ils ont publié en 1878 et où ils insistent sur la nécessité de tenir compte, pour étudier l'appareil à boules, de sa liaison avec la machine

connaissance de cause, il faudrait avoir la représentation complète du mouvement simultané de la machine et de l'appareil à boules à la suite d'une perturbation ¹.

Mais dans la pratique on peut éviter cette difficulté en laissant à l'expérience le soin d'indiquer les modifications à apporter à quelques-uns des éléments de l'appareil de régulation.

L'important est de se rendre un compte exact de la grandeur relative de ces éléments et du sens dans lequel ils agissent. On peut d'ailleurs généralement prendre comme point de comparaison un appareil connu, établi dans des conditions à peu près analogues et dont le fonctionnement est satisfaisant.

Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que les difficultés auxquelles on est exposé se produisent lorsqu'on veut trop resserrer l'amplitude des variations de la vitesse; à ce point de vue, si l'on cherche à avoir le *maximum* de régularité possible, il sera bon de se réserver les moyens de régler l'appareil, c'est-à-dire de modifier au besoin les éléments du régulateur dans une certaine limite.

17. *Etablissement d'un appareil à action directe.* — Les éléments qui, pour un système mécanique donné, influent sur la marche de l'appareil, sont :

1° Le *Degré d'isochronisme* marqué par la différence des vitesses d'équilibre ω_1, ω_2 correspondant à l'ouverture et à la fermeture complète de la valve.

¹ On peut, par un tracé graphique simple, obtenir cette représentation. Voir pour les moteurs hydrauliques : H. Léauté, « Mémoire sur les oscillations à longues périodes », *Journal de l'Ecole polytechnique*, LV^e cahier.

L'étude du mouvement simultané de la machine et du régulateur n'a été entreprise, à un point de vue juste que par Wischnegradski (*Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, 31 juillet 1876). Son analyse exacte et élégante conduit à des résultats très nets et utilisables. Il aurait même très probablement résolu le problème s'il avait tenu compte du frottement qui, dans ces sortes de questions, joue un rôle capital. Malheureusement sa méthode, exclusivement analytique, s'y prêtait peu et il n'a pu faire qu'une chose, vérifier que ses conclusions restaient encore vraies d'une manière générale dans le cas du frottement. Ce qui lui a manqué, c'est une connaissance suffisante des choses de la pratique.

Les autres travaux, sauf ceux de M. Rolland et de M. Resal, ont laissé de côté le véritable point de vue et considéré simplement l'appareil à boules à l'état statique.

M. Rolland, qui connaissait le phénomène des oscillations en sa qualité de praticien, en a parlé dans son beau mémoire; mais il a été obligé de s'en tenir à des aperçus généraux et assez vagues, ses calculs où il considérait simplement l'appareil à boules indépendamment de la machine ne pouvant lui fournir sur ce sujet aucune indication précise.

Quant à M. Resal, il a donné le premier l'équation du mouvement de la machine (*Mécanique générale*, t. III, p. 219), mais cette équation suppose implicitement que les boules occupent à chaque instant la position d'équilibre correspondant à la vitesse de rotation que leur communique la machine. Cela revient à négliger le mouvement propre des boules. Dans ces conditions, il n'y a pas d'oscillations possibles, car il n'y a aucune raison pour que, la vance étant arrivée à la position de régime (celle pour laquelle le travail moteur est égal au travail résistant), les boules l'entraînent au delà.

2° *Le degré de sensibilité.*

On fixe ces éléments d'après la régularité que l'on juge nécessaire pour le travail à effectuer, mais sans perdre de vue que la recherche d'une trop grande régularité peut conduire à des oscillations indéfinies.

Si l'on s'est donné tout d'abord le système d'appareil à force centrifuge, le degré d'isochronisme détermine la portion de course à utiliser et le degré de sensibilité détermine la puissance de l'appareil.

On connaît, en effet, l'effort qu'oppose la manœuvre du mécanisme d'ouverture et de fermeture; or l'on a :

$$\Phi(\delta - \sigma) = f' + f''.$$

Dans cette relation, f' et f'' ne contiennent que les résistances extérieures à l'appareil à boules proprement dit, la sensibilité intrinsèque σ tenant compte des résistances intérieures.

Si, avec ces données, le résultat n'est pas satisfaisant et que des oscillations se produisent, on pourra, soit diminuer l'isochronisme et la sensibilité, soit ajouter un frein à huile, à air ou à eau, soit augmenter la puissance du volant.

Les freins sont surtout nécessaires dans les machines du genre Corliss où l'appareil à boules est sujet à des secousses périodiques de la part de l'appareil de détente qu'il est chargé de régler.

Ils sont formés, en principe, d'un piston percé de trous et relié au levier de manœuvre du régulateur; ce piston se meut dans un cylindre plein d'huile¹ et le passage de l'huile à travers les trous produit une résistance qui éteint les oscillations.

On remplace quelquefois l'huile par l'air (Régulateur Pichault), mais le principe est le même.

18. *Etablissement d'un appareil à action indirecte.* — Les éléments à déterminer sont :

1° *Le degré d'isochronisme;*

2° *La sensibilité;*

3° *La vitesse relative du vannage.*

Le degré d'isochronisme se fixe comme précédemment d'après la régularité que l'on veut obtenir.

Il est marqué ici par la différence des vitesses correspondant à la mise en train de l'ouverture et à la mise en train de fermeture.

La sensibilité se calcule encore comme dans le cas précédent, mais il est essentiel qu'elle soit aussi grande, que possible et, par suite, que l'appareil à boules soit très puissant par rapport aux résistances qu'il a à vaincre.

Si avec ces données, des oscillations apparaissent, il faut, soit diminuer le degré d'isochronisme, soit

rendre le mouvement du vannage moins rapide.

Contrairement à ce qui se passe pour les appareils directs, on peut déterminer l'apparition de l'état d'oscillation en augmentant la puissance du volant.

19. *Corrélation entre le volant et le régulateur.* — Comme nous l'avons dit, le régulateur a des fonctions différentes de celles du volant.

Il est essentiel que le premier ne soit pas sensible aux variations périodiques de la vitesse ou, plus exactement, qu'il n'entre pas en action sous l'influence de ces variations.

Bien que ce résultat puisse être obtenu dans une certaine mesure par l'emploi du frein à huile quand les variations dont il s'agit sont très rapides, il est préférable de calculer l'appareil à boules de façon à obtenir le résultat cherché indépendamment du frein.

Il faut alors que l'écart E des vitesses pour lesquelles le régulateur entre en action soit plus grand que l'écart maximum e toléré par le volant.

Dans les appareils à action directe le régulateur agit dès que les boules se déplacent; l'écart E n'est autre que la différence des vitesses ω' et ω'' de montée et de descente; on doit donc avoir :

$$\omega' - \omega'' > e$$

c'est, par suite, la *sensibilité* qui ne doit pas descendre au-dessous de la limite donnée par le volant.

Dans les appareils à action indirecte, le régulateur entre seulement en action quand les boules atteignent les extrémités de leur course; l'écart E est représenté par la différence $\omega_2' - \omega_1''$ des vitesses extrêmes et il faut qu'on ait :

$$\omega_2' - \omega_1'' > e.$$

C'est donc le *degré d'isochronisme augmenté de la sensibilité* qui ne doit pas être inférieur à la limite fournie par le volant.

20. *Remarques générales sur le problème de la régularisation du mouvement.* — *Conclusion.* — La théorie des régulateurs à action directe ou à action indirecte peut être faite, les règles que comporte l'établissement de ces appareils peuvent être données; sans qu'il soit nécessaire de spécifier quel système on a en vue; tous les mécanismes plus ou moins compliqués que l'on a inventés pour la régularisation des machines se valent à peu près au point de vue général et la disposition même de l'organe régulateur est presque sans influence; chaque dispositif présente des avantages par certains côtés spéciaux, mais n'est pas supérieur en total au système que le génie de Watt a inventé.

C'est là un premier point que la mécanique appli-

¹ Ce cylindre est représenté dans la figure 10, en A.

quée a été longue à acquérir.

Il en est un second non moins important et qui servira de conclusion à cette étude :

Le principe fondamental à ne jamais perdre de vue dans l'établissement d'un régulateur, c'est qu'il n'y a pas d'appareil capable de régulariser par le seul fait qu'il *tend* à s'opposer aux variations de vitesse consécutives à une perturbation ; il faut avant tout que cet appareil soit capable de rétablir la constance de la vitesse, c'est-à-dire d'engendrer un nouvel état stable de régime. Pour cela tous les

éléments du régulateur, isochronisme, sensibilité, puissance, doivent être en rapport avec la machine dont on s'occupe et la nature du travail qu'elle est destinée à effectuer. A cette condition seule, on évitera les trop nombreux mécomptes auxquels on est exposé et le régulateur, au lieu d'être une nouvelle cause de trouble comme il l'est trop souvent, donnera vraiment la régularité que l'on cherche.

H. Léauté

de l'Académie des Sciences.

LES RÉCENTS TRAVAUX SUR LES SPONGIAIRES

Le groupe des Spongiaires, dédaigné à tort depuis longtemps des zoologistes français, a été tout récemment l'objet de magnifiques publications, qui sont venues compléter les recherches classiques d'Hœckel, de O. Schmidt, de F. E. Schultze et de tant d'autres. Le dernier de ces savants a fondé une véritable école de spongologues qui a rendu les plus grands services. Un autre zoologiste distingué, Carter, a publié depuis 1848 plus de 110 notes sur les Éponges. Les plus importants de tous les mémoires récents sont les rapports relatifs aux collections du *Challenger*. Chaque groupe a été confié à un spécialiste déjà renommé : F. E. Schultze a décrit lui-même les Hexactinellidés, Polejaeff les Éponges calcaires et cornées, Sollas les Tétractinellidés, Ridley et Dendy les Monaxonidés.

Enfin, tout récemment (1889), Lendenfeld, dans un grand ouvrage, le plus complet qui ait été présenté sur la question, publié par la Société Royale de Londres, coordonnait de longues recherches entreprises par lui sur les Éponges cornées, et donnait une monographie histologique et systématique de tout le groupe.

L'embranchement entier des Spongiaires vient donc d'être repris dans son ensemble, et avec toute la précision que comportent les méthodes actuelles d'investigation. Un nombre considérable d'espèces de tous les pays ont été décrites, non seulement quant à leurs caractères extérieurs, mais aussi dans leur structure histologique, et l'on peut dire que, pris en bloc, le groupe commence à être bien connu, abstraction faite, bien entendu, de l'embryogénie.

De l'examen de ces divers mémoires, que j'ai été obligé de faire pour la détermination de la collection des Spongiaires du Muséum, se détache un certain nombre de faits.

Tout d'abord, les observations histologiques des divers auteurs sont remarquablement concordantes. Cela tient évidemment à la simplicité relative des tissus qui composent ces animaux, mais surtout à la précision à laquelle les méthodes de fixation et de coloration permettent d'arriver dans la description des éléments. A ce point de vue, le résultat général est que les éponges sont des êtres bien plus compliqués qu'on ne l'avait cru longtemps, et que les divers tissus, nerveux, musculaire, etc. décrits à diverses époques, existent bien en réalité.

On est loin de s'entendre aussi bien sur les limites des genres et des espèces, en particulier quand il s'agit des éponges cornées. Lendenfeld, par exemple, caractérise souvent les espèces d'après la dimension moyenne des fibres du squelette, et fonde seulement des variétés d'après la forme extérieure de l'éponge ; F. E. Schultze, dans les mêmes groupes, attache plus d'importance à l'arrangement des fibres, et Polejaeff prend l'espèce dans un sens encore bien plus large. Après avoir tenté un grand nombre de déterminations, on arrive forcément à se demander si les auteurs ont fondé leurs espèces sur un nombre suffisant d'échantillons, car pour un genre bien défini, il est rare qu'un individu présente à la fois tous les caractères indiqués pour une espèce quelconque. Il est curieux, d'autre part, de voir des formes bien définies exister avec des caractères constants dans les régions les plus éloignées, telles que l'Adriatique, les côtes de l'Australie et de l'Amérique du Nord. En somme, il n'est peut-être pas de groupe dans tout le règne animal où la notion d'espèce soit plus obscure et plus mal définie, malgré tous les efforts de nombreux et savants zoologistes.

Les relations des grandes subdivisions semblent mieux définies et, si les divers arbres généalogiques

proposés ne coïncident pas absolument, du moins on peut dire que de longues séries continues sont établies pour les éponges cornées et les éponges siliceuses. L'on s'accorde généralement à mettre tout à fait à part les Éponges dont le squelette est formé de spicules calcaires, et à réunir toutes les autres dans une même classe. Les éponges cornées ne doivent pas être séparées des éponges siliceuses : tout d'abord un grand nombre de formes contiennent des spicules siliceux à l'intérieur de fibres cornées. De plus, un groupe important d'éponges cornées présente des caractères anatomiques identiques à ceux des *Hexactinellidés*, belles éponges treillissées des grandes profondeurs, dont les plus connues sont les *Euplectelles*. Les résultats les plus importants obtenus dans ces dernières années ont trait à la structure histologique des éponges supérieures. On admet depuis Hœckel que les Éponges les plus compliquées peuvent être assimilées à des associations plus ou moins intimes d'êtres tous semblables entre eux et semblables à la plus simple de toutes les Éponges, à l'*Olyntus primordialis*. Celle-ci a la forme d'un sac percé d'un grand nombre de pores par où l'eau pénètre dans la cavité centrale, d'où elle s'échappe par une large ouverture ou *oscule*. On a longtemps admis que l'*Olyntus* était formé de deux couches de cellules seulement ; des cellules à collerettes pourvues d'un grand cil vibratile et des cellules irrégulières, douées de mouvements amiboïdes. La ressemblance frappante des premiers de ces éléments avec des Infusoires (Choanoflagellés) et des autres avec des Foraminifères avait amené divers auteurs à considérer l'individu spongiaire comme une colonie soit d'Infusoires (Clark, Saville Kent) soit de Foraminifères (Carter, Carpenter, etc.). Mais la découverte d'une troisième couche de cellules très minces extérieure à la précédente (feuillet de revêtement, *ectoderme*) a eu pour premier résultat de faire rejeter toutes ces théories.

On doit donc comparer les éponges les plus simples à tous les autres animaux, où les tissus du corps dérivent aussi de trois feuilletts primordiaux. L'étude attentive des éléments du feuillet moyen ou mésoderme, a même permis d'aller plus loin et de retrouver dans l'Eponge tous les éléments qui composent les divers tissus des animaux plus élevés. Ces éléments sont noyés dans une substance amorphe ou mésogée, et sont généralement assez intimement mêlés les uns aux autres, de sorte qu'il n'existe pas à proprement parler d'organes distincts ; néanmoins en certains points les cellules douées d'une même fonction arrivent à s'associer en assez grand nombre. C'est ainsi qu'il existe des bandes musculaires, parfois disposées en cercle autour des ouvertures des canaux (Schultze). Des terminaisons

nerveuses sensibles ont été décrites par *Stewart* et *Lendenfeld* dans un grand nombre de cas ; elles sont en relation avec des cellules nerveuses ganglionnaires, et même, dans quelques cas, on a trouvé de véritables anneaux nerveux continus autour de pores aquifères : chez l'éponge chevaline existent aussi des nerfs portés au sommet de crêtes musculaires. D'autre part, des éléments glandulaires très




Fig. 1. — Coupe d'Hexactinellidé (d'après F. E. Schultze).
E, Ectoderme externe. — e, Ectoderme interne. — m, Mésoderme. — C, Corbeille vibratile (Ectoderme). — o, Oscule.
— p, Pore inhalant. — s, Spicules.

volumineux se rencontrent à la surface des diverses Éponges (Merejkowsky, Polejaeff, Lendenfeld). Si l'éponge est inquiétée, ces cellules sécrètent une substance qui s'intercale entre l'épithélium et le reste du corps ; l'épithélium tombe, et l'éponge est entourée d'une enveloppe qui durcit dans l'eau et peut contribuer à la protéger. Des éléments de même nature sont aptes à sécréter, dans les éponges cornées, les fibrilles dont se compose le squelette élastique que tout le monde connaît. Ces cellules déposent un petit amas de chitine à la surface de tout corps étranger qui a pu pénétrer à l'intérieur du corps. De nombreuses espèces ont la faculté de trier, pour ainsi dire, les corpuscules d'une certaine nature et d'une certaine dimension, pour les retenir à l'intérieur de leurs filaments. D'autres éléments intéressants connus depuis longtemps sont les cellules migratrices qui cheminent lentement à travers la substance fondamentale et peuvent, pour la plupart, se transformer dans les

divers éléments que nous venons de citer. Pour terminer cette énumération, citons les cellules conjonctives propres et les éléments reproducteurs.

Un des points que les travaux récents ont le mieux mis en lumière, est la différence fondamentale qui existe entre les Eponges et l'embranchement qui en est le plus voisin, celui des Cœlentérés proprement dits (Hydres, Coralliaires.) Dans les Eponges, en effet, c'est le feuillet moyen de la larve ou mésoderme, qui, par la différenciation progressive de ses éléments, donne naissance aux cellules de fonctions variées que nous venons

d'indiquer : le feuillet externe ou ectoderme reste toujours simple et forme uniquement un mince revêtement. Chez les Cœlentérés au contraire l'ectoderme acquiert plusieurs couches de cellules, et c'est lui qui forme les tissus nerveux, musculaire, reproducteur, etc. Cette différence, jointe à d'autres bien connues, justifie pleinement l'établissement d'un embranchement spécial pour les Spongiaires.

Félix Bernard.

Aide-naturaliste
au Muséum d'Histoire naturelle.

LA THERMODYNAMIQUE

D'APRÈS MM. J. BERTRAND, R. CLAUSIUS ET G. VON ZEUNER

De même que l'histoire d'une École est écrite dans les œuvres des maîtres, de même l'état d'une science se peint dans les exposés didactiques qu'on en publie : invité à faire dans ce Journal une revue de la thermodynamique, nous nous sommes proposé de juxtaposer les idées actuelles des thermodynamistes les plus autorisés, de comparer leurs procédés, et d'étudier la manière différente dont ils ont traité, à la même époque, la théorie mécanique de la chaleur¹ : nous observerons des analogies et des contrastes, qu'il sera intéressant de relever et plus utile encore de méditer.

La spécialité des études des trois savants dont nous rapprocherons les œuvres magistrales, les a placés sur des sommets élevés d'où ils ont vu la thermodynamique sous des perspectives différentes. Rudolph Clausius était un physicien, M. Zeuner est un ingénieur et M. Bertrand plus particulièrement un mathématicien ; leurs spécialités diverses se révèlent dans leur œuvre aussi bien que l'objectif principal de leurs études. Le premier, qui est un des créateurs de la science nouvelle, a fait un exposé didactique des principes et les a appliqués à l'interprétation des phénomènes naturels, en même temps qu'il établissait nettement la part considérable qui lui revenait ; le second, bien connu par ses beaux travaux de mécanique appliquée, a cherché à simplifier le plus possible l'expo-

sition des théorèmes dont la connaissance est nécessaire aux ingénieurs ; il a calculé pour eux des tableaux de chiffres et il a établi une théorie nouvelle des machines à feu ; le troisième a entrepris une exposition critique et une discussion approfondie des méthodes, avec une ampleur et une rigueur dignes du Collège de France, où ce cours a été professé, avec toute l'élégance et la limpidité qu'on pouvait attendre d'un membre de l'Académie française, successeur de Fontenelle, de Condorcet, d'Arago et de J.-B. Dumas. On apprend bien la science avec le premier, le second montre tout le parti qu'on peut en tirer et M. Bertrand inspire de sérieuses et profondes réflexions à ceux qui pourraient croire qu'ils n'avaient plus rien à apprendre.

I

La première édition du traité de Clausius remonte à 1864 : c'était un recueil de mémoires détachés, publiés à partir de 1850, à des époques et sous des formes diverses ; l'ensemble était un peu disparate et nécessitait une refonte. Ce savant l'entreprit en 1875, date de la seconde édition, et il la compléta en 1887, dans sa troisième édition : ses préoccupations didactiques lui firent rechercher l'ordre des matières et le mode d'exposition le plus propres à rendre la science pleinement accessible sans la vulgariser, ce qui n'est pas aisé, disait-il, car des points de vue et des procédés nouveaux rendent la théorie un peu difficile. Le plan de l'ouvrage est par conséquent celui qui a paru à Clausius le plus logique et le plus clair : il y a donc lieu d'y arrêter notre attention.

¹ La Thermodynamique, par J. Bertrand Paris, Gauthier-Villars et fils, 1887.

Théorie mécanique de la chaleur, par R. Clausius. 3^e édit., traduction Folie et Ronkar, Mons, Manceaux, 1887.

Technische Thermodynamik, par G. von Zeuner. 3^e édit., Leipzig, Félix, 1887.

Il part du théorème des forces vives, et de l'hypothèse que la chaleur est un mode de mouvement des dernières particules des corps; la quantité de chaleur est la force vive de ce mouvement et l'équivalence de la chaleur et du travail se trouve établie par le fait même. Le premier principe, le principe de Mayer, est donc un cas particulier d'un théorème de mécanique et sa démonstration repose sur une donnée hypothétique; c'est une base contestable; aussi Clausius a-t-il prudemment déclaré plus loin que l'on peut aussi le regarder « comme un théorème déduit de l'expérience et de l'observation ». L'équation fondamentale $dQ = dU + dW$ suffit à l'étude des gaz parfaits, dans lesquels on peut négliger le travail interne; les propriétés des gaz parfaits conduisent à la détermination du rapport des chaleurs spécifiques à volume constant et à pression constante, et permettent l'étude des détenteurs adiabatiques et la mesure du travail extérieur développé dans les changements de volume. Vient alors l'exposé du second principe, appelé le *principe de Carnot*¹, dont Clausius a rectifié l'énoncé et dont il donne la démonstration en s'appuyant sur le célèbre postulat qui lui valut tant d'objections: la chaleur ne peut passer d'elle-même, ou sans compensation, d'un corps froid sur un corps plus chaud. Après avoir démontré ainsi que le rapport de la chaleur transformée en travail à la chaleur disponible, dans un cycle réversible, est indépendant de la nature de la substance qui opère la transformation, il montre que ce rapport est une certaine fonction $\varphi(T, t)$ des températures extrêmes: la forme de cette fonction est facile à établir pour les gaz parfaits, et elle se trouve dès lors déterminée d'une manière générale, puisqu'elle est la même pour tous les corps. Finalement, le second principe est exprimé

par l'équation $\int \frac{dQ}{T} = 0$, qui s'applique à un cycle

fermé quelconque, pourvu qu'il soit réversible; si l'on donne les valeurs extrêmes des variables qui définissent l'état initial et final du corps, on aura $dQ = TdS$, S étant la fonction que Clausius a nommée *entropie*. Tout cela est l'œuvre originale du maître; n'était la condition de réversibilité, qu'il est si difficile de définir, ce serait parfait et il n'y aurait pas lieu de chercher autre chose. Mais qui

nous dira nettement ce que sont les cycles réversibles? On n'évite pas cette grave difficulté en recourant à la considération des transformations équivalentes pour mettre le second principe sous une forme nouvelle, et ce complément n'ajoute rien à la netteté de l'exposition: Clausius eût pu le supprimer sans inconvénient, nous le croyons du moins. Par contre, nous avons cherché en vain les calculs par lesquels il a réduit le second principe aux principes généraux de la mécanique; ce travail avait paru en 1872 dans les *Annales* de Pogendorff.

Le chapitre V est consacré à la transformation des deux équations fondamentales; application en est faite aux vapeurs saturées dans le chapitre VI, à la fusion et à la vaporisation des corps solides dans le chapitre VII et à l'étude des corps homogènes dans le chapitre VIII; puis l'auteur revient à la détermination de l'énergie et de l'entropie, dont l'importance est si grande dans la théorie de la chaleur.

Les phénomènes non réversibles font l'objet du chapitre IX: on a alors $\int \frac{dQ}{T} < 0$. A cette occasion,

Clausius étudie les dilatations des gaz et des vapeurs saturées sans travail extérieur, ou bien avec production d'un travail incomplet, ou dans diverses autres circonstances et il expose les recherches expérimentales de Thomson et Joule, qu'on adjoint plus souvent à la théorie des gaz parfaits. Enfin il aborde la machine à vapeur, avec le parti pris de négliger l'influence des parois: Hirn a déclaré, avec raison, que ce procédé nous ramenait de 40 ans en arrière!

Achevons notre analyse en constatant que la théorie cinétique des gaz n'est pas mentionnée dans ce volume, alors qu'elle y occupait une place considérable dans l'édition précédente et que la théorie générale des machines thermiques est laissée dans l'ombre: la dissolution et la dissociation n'y sont pas étudiées non plus; mais ces lacunes seront comblées, car la théorie mécanique du savant allemand se compose de trois volumes dont l'impression a malheureusement été retardée par sa mort, survenue le 23 août 1888. Il est à désirer que la publication et la traduction des deux derniers volumes donne enfin satisfaction aux vœux pressants des disciples et des admirateurs de l'illustre professeur de Bonn.

II

L'ouvrage de M. Zeuner a un caractère plus technique, mais une large part y est faite néanmoins à l'exposé des principes généraux de la science. Comme Clausius, il prend pour base de son exposition les équations de la dynamique,

¹ « Clausius a fait preuve de modestie en conservant à ce théorème le nom illustre de Carnot. » Ce jugement est de M. Bertrand; il ajoute: « il serait injuste d'attacher aux conséquences de la découverte de Carnot un nom, si grand qu'il soit, autre que le sien. » Que le second principe reste donc le principe de Carnot, bien que son énoncé correct soit de Clausius, de même que le premier sera toujours appelé le principe de Mayer, quelle que soit la part qu'aient prise Joule et Colding à son énoncé.

mais il procède différemment, et, au lieu de considérer la *chaleur* interne (innere Waerme), il met en évidence le *travail* interne (innere Arbeit), de sorte que le premier principe est énoncé par l'équation $dQ = A (dV + dL) = A (X dp + Y dv)$. Or, on démontre que $\left(\frac{dY}{dp}\right) - \left(\frac{dX}{dv}\right) = 1$, d'où il résulte que l'équation en dQ n'est pas intégrable tant qu'on ne connaît pas une autre relation entre les grandeurs qu'elle renferme : mais il existe une fonction S telle que l'expression $\frac{dQ}{S}$ devient une différentielle exacte. Cette fonction S , qui est une fonction de p et de v , a des propriétés caractéristiques dans les cycles réversibles ; on a notamment $\int \frac{dQ}{S} = 0$, et l'on découvre en définitive que « S représente véritablement la température » ; S ne diffère de la fonction C de Clapeyron (fonction de Carnot) que par un facteur constant. Il ne reste plus qu'à démontrer que le facteur $\frac{1}{S}$ est le même

pour tous les corps : les premières éditions présentaient à cet égard une lacune qui a été comblée par l'auteur sur les observations de Clausius. Le sens physique du facteur d'intégrabilité est complété en même temps. Le second principe étant démontré, on l'applique à l'étude des cycles, pour laquelle M. Zeuner fait un usage excellent des représentations graphiques.

Ce n'est qu'alors que l'auteur aborde les propriétés des gaz, l'analyse des transformations polytropiques en général (isothermiques, adiabatiques et isodynamiques, suivant les cas), etc ; ce chapitre est très complet ; il est suivi d'une belle théorie de l'écoulement des gaz et des fluides, dont on blâmerait le développement excessif, si M. Zeuner n'en était le créateur.

Les machines à air chaud et à gaz tonnant font l'objet d'une troisième partie, qui sera lue avec intérêt par les théoriciens et avec profit par les praticiens ; nous saisissons l'occasion d'exprimer notre reconnaissance à M. Zeuner pour la mention qu'il a daigné faire de nos recherches sur les moteurs à gaz.

La théorie des régénérateurs est très clairement exposée.

La théorie des vapeurs et leur application aux machines est renvoyée au second volume.

Les études purement spéculatives sont écartées en principe de cet ouvrage ; mais aucune des questions théoriques susceptible d'une application technique n'a été négligée : l'analyse mathématique est largement mise à contribution, mais sans excès, et, à côté des équations qui parlent à l'esprit, les ingénieurs sont heureux de trouver des

dessins qui parlent aux yeux. Le livre de M. Zeuner répond excellemment aux désirs et aux besoins de ceux qui étudient la mécanique de la chaleur en vue des services qu'elle peut leur rendre. On se demande dès lors si, au lieu de démontrer les principes fondamentaux ; il n'eût pas été préférable de les considérer comme des *Postulats*, dont l'expérience confirme l'exactitude par la vérification de leurs conséquences ; c'est la méthode adoptée avec raison par M. Haton de la Goupillière, dans la Thermodynamique ajoutée à son remarquable *Cours de machines*.

III

M. Bertrand a écrit une *Thermodynamique* pour ceux qui savent déjà, mais qui ont besoin de mûrir leurs connaissances : ce n'est pas le livre des élèves, c'est celui des maîtres ; ce n'est pas un cours d'enseignement de la Sorbonne, c'est l'exposé critique des méthodes, réservé aux chaires du Collège de France. Voilà le premier objectif de l'illustre professeur.

Mais le savant s'est laissé guider aussi par une préoccupation d'un ordre plus élevé. On aurait tort de croire que la théorie mécanique soit arrivée à son entier développement : elle grandit toujours et se fortifie encore. Elle est si jeune, que nous nous faisons l'illusion de l'avoir tous vue naître ; maintenant que Carnot, Mayer, Colding, Joule, Clausius, Kirchoff et Hirn ne sont plus, nous nous croirons autorisés plus que jamais à la prendre en tutelle. Abandonnons la métaphore, mais poursuivons l'idée : il est certain que cette science nouvelle est encore soumise à la discussion ; son nom même, ses principes fondamentaux, ses méthodes, ses applications sont l'objet de réserves nombreuses, voire même d'attaques assez vives, qu'on ne se permettrait pas contre un système scientifique plus anciennement établi. La théorie attend encore son édition *ne varietur* : M. Bertrand a voulu en hâter l'apparition, et pour cela il a entrepris de faire le partage du certain et du douteux, d'éclaircir, de compléter et d'élaguer. « J'ai étudié avec soin, dit-il dans sa Préface, toutes les théories que j'avais à exposer, mais je n'ai cherché à rendre clair que ce qui l'était à mes yeux. Telle est la cause des lacunes qui subsistent. » Il dit encore : « La haute importance des méthodes nouvelles n'est pas contestée ; loin de là, c'est contre une admiration sans réserve qu'il importe de se mettre en garde. Il faut tolérer les nuages qui portent ombre, mais aimer la lumière et la chercher toujours. » La Thermodynamique de M. Bertrand est une œuvre de haute critique, qui contribuera considérablement aux progrès de la science et qui fera époque dans son histoire.

Le plan du livre est nouveau et témoigne des préoccupations extra-didactiques de l'auteur, car l'ordre chronologique des faits vient modifier plusieurs fois l'ordre logique des développements. Il commence par l'étude des gaz parfaits, dont les propriétés bien connues ont ouvert la voie à la théorie mécanique; les idées de Sadi Carnot sont exposées avant celles de Robert Mayer; le premier principe est rejeté en arrière, au risque de se priver de son concours dans quelques démonstrations auxquelles il serait pourtant fort utile. Mais, chemin faisant, on rectifie bien des énoncés, on explique longuement la notion des calorifiques spécifiques, on discute l'équation $dq = X dp + Y dv$, on analyse l'œuvre de Carnot et de Mayer, on met en lumière la collaboration de Clapeyron avec une sagacité, une pénétration, une finesse que nous n'apprécierons complètement qu'à une seconde et une troisième lecture et qui demandera une solide et forte étude pour être bien comprise. Le principe de l'équivalence est considéré comme un résultat d'expérience et M. Bertrand renonce, avec raison, à le démontrer en partant de l'hypothèse du mouvement moléculaire. Le second principe est établi à la façon de Clausius, dont cependant le postulat « n'est pas, il faut l'avouer, d'une entière évidence »; on arriverait au même résultat en disant que la chaleur ne pourrait produire de travail si elle ne quittait un corps plus chaud que celui qui la reçoit; cet axiôme se rapproche davantage des idées de Carnot. Le chapitre consacré aux cycles non réversibles est très court: « les démonstrations et les énoncés mêmes de leurs propriétés me paraissent jusqu'ici manquer de rigueur et de précision. » L'entropie n'est plus définie dans le cas de non réversibilité: « cette étude est restée pour moi trop difficile et trop vague. » Voilà de graves réserves et de sages déclarations dont les thermodynamistes feront leur profit.

La question des vapeurs saturées est développée dans plusieurs chapitres et elle conduit à une belle analyse des phénomènes qui se succèdent dans le cylindre des machines à vapeur et notamment de

la condensation pendant la détente; le cycle de la vapeur et les diagrammes des machines sont comparés fort judicieusement et le lecteur s'arrête avec satisfaction à la démonstration du théorème de M. Marcel Deprez sur la proportionnalité du travail du cycle à la quantité de chaleur admise. L'influence des parois est hautement reconnue.

Trois chapitres sont intitulés: quelques théorèmes, quelques problèmes, quelques applications; c'est une mosaïque de propositions que nous renonçons à signaler par le détail¹, mais qui présentent pour la plupart un grand intérêt théorique ou pratique. Elles conduisent M. Bertrand à établir des formules empiriques donnant les forces élastiques maxima de certaines vapeurs en fonction de la température: des tableaux et des courbes, qu'on est étonné de rencontrer et surtout de trouver en si grand nombre dans ce livre, témoignent d'un accord satisfaisant entre les valeurs calculées et observées; l'épreuve est moins décisive pour les tensions de dissociation calculées par la même méthode. L'influence de la pression sur la fusion de la glace et les chaleurs de mélange et de dissolution font l'objet de quatre paragraphes par lesquels se terminent les applications de la théorie.

Parmi les questions omises se trouvent la théorie de l'écoulement des fluides, la théorie cinétique des gaz, les études sur la fusion et la solidification et sur la traction des solides: ce sont des lacunes, mais des lacunes voulues, il importe de ne pas l'oublier.

Nous avons essayé de rendre compte de ce beau livre. M. Bertrand n'a que faire de nos éloges, mais, il nous permettra de dire que nul n'osera désormais écrire sur la matière sans avoir médité longuement sa *Thermodynamique*.

Aimé Witz,

Professeur
à la Faculté libre des Sciences de Lille

¹ Citons-en une comme exemple: quelles sont les conditions pour que la compression dégage une quantité de chaleur équivalente au travail dépensé pour la produire?

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques.

Eastman, *Président de la Philosophical Society de Washington: Assumption and facts in the theories of solar and stellars' proper motions.*

Après quelques considérations philosophiques, M. Eastman nous transporte au XVIII^e siècle, à l'époque où l'on voit apparaître vaguement l'idée d'un centre fixe autour duquel graviterait le système solaire tout entier, idée à laquelle conduisit l'observation de mouvements propres des étoiles.

Tycho-Brahé remarqua le premier des changements dans les latitudes de quelques fixes, mais il assura que ces changements n'ont rien de réel et qu'ils tiennent seulement à la variation de l'obliquité de l'écliptique. Cette explication ne fut pas acceptée par Halley qui, en 1718, montra que les trois étoiles Arcturus, Sirius, Aldébaran avaient subi des changements inexplicables par le seul déplacement de l'écliptique.

En 1738 Jacques Cassini leva tous les doutes en montrant notamment que tandis qu'Arcturus s'était déplacé en latitude, l'étoile voisine β Bouvier était restée immobile. « On peut donc supposer avec beaucoup de vraisemblance, dit-il ¹, que les étoiles qui sont sujettes à quelque variation, font leurs révolutions autour d'un centre ou d'un astre que nous n'apercevons pas, et qui pourrait être même quelque-une de ces étoiles que nous distinguons; car quoique nous les reconnaissons toutes pour autant de Soleils, il est très possible que de même qu'il y a des Planètes qui font leurs révolutions autour d'autres Planètes, telles que la Lune autour de la Terre, et les Satellites autour de Jupiter et de Saturne, il y ait aussi des Etoiles fixes dont le mouvement se fasse autour d'autres Astres de la même nature, ce qui s'accorderait avec la pensée de Descartes, qui a jugé que la Terre et les Planètes étaient, dans leur première origine, des Astres lumineux qui se sont encroûtés dans la suite des temps. »

Ce fut Tobie Mayer (1760) qui généralisa les recherches sur les mouvements propres et qui examina systématiquement toutes les étoiles pour lesquelles on possédait alors de bonnes observations faites à des intervalles considérables.

Dès lors on ne douta plus que toutes les étoiles eussent des mouvements propres: « Puisque, disait Bailly, Aldébaran, Sirius, Arcturus et sans doute quelques autres étoiles se meuvent, il est évident que toutes doivent se mouvoir. Les fortunes sont les mêmes, les lois principales de la nature sont générales pour les êtres de même espèce ². »

Alors apparut l'idée nettement exprimée de la translation du système solaire dans l'espace: on la rencontre pour la première fois dans les *Lettres cosmologiques* de Lambert (1761), pour qui les mouvements propres des étoiles sont dus à deux causes combinées: le déplacement effectif de ces astres et le transport du Soleil avec son cortège de planètes dans l'espace. De son côté Lalande (1776) regardait le mouvement de translation du soleil comme une conséquence de sarotation.

P. Prévost, professeur de mathématiques à l'Ecole militaire, essaya le premier, en 1781, de déterminer la direction de ce mouvement et il trouva que le Soleil se transporte vers un point ³ voisin de la constellation

d'Hercule. Mais ce déplacement du Soleil ne prit une réelle importance qu'à la suite des travaux de W. Herschel, sur ce sujet, et contenus dans trois mémoires de 1783, 1805 et 1806: dans le dernier il évalue à 1712 le déplacement annuel du système solaire vu à angle droit et à la distance de Sirius.

A mesure que l'on a connu un plus grand nombre de mouvements propres, divers astronomes ont successivement repris cette détermination à l'aide d'étoiles de plus en plus nombreuses, et le tableau suivant résume les résultats obtenus jusqu'à ce jour:

AUTEURS	DATES des travaux	Nombre d'étoiles employées	COORDONNÉES DE L'APEX DU SYSTÈME SOLAIRE			Mouvement propre annuel du Soleil à la distance des étoiles de première grandeur
			Asc. dr.	Déclin.	Époque	
Prévost...	1781	" 230	" 0	+25	"	"
W. Herschel	1783	14	260.36	+26.18	"	"
id.....	1805	6	245.53	+49.38	"	"
id.....	1806	36	"	"	"	0,15
Gauss.....	"	" 259.10	"	+30.50	"	"
Argelander.	1838	390	259.52	+32.29	1792.5	"
Lundahl....	1840	147	252.24	+14.26	1792.5	"
O. Struve...	1841	392	261.22	+37.36	1790	0,34
Galloway...	1847	78	260.1	+34.23	1790	"
Madler.....	1848	2163	261.39	+39.54	1800	"
id.....	1856	"	"	"	"	"
Airy.....	1859	113	256.54	+39.29	1800	1,27
id.....	1859	113	261.29	+24.44	1800	1,91
Dunkin.....	1863	1167	261.14	+32.35	1800	0,33
id.....	1863	1167	263.44	+25.1	1800	0,41
Stone.....	1863	91	"	"	"	0,43
id.....	1863	91	"	"	"	0,34
Gylden.....	1872	" 274.6	"	"	"	"
id.....	1877	" 260.30	"	"	1800	"
De Ball.....	1877	67	269.0	+31.54	1860	"
Bischof.....	1884	480	285.12	+31.52	1855	0,34
Ubaghs.....	1886	464	262.24	+26.36	"	"
L. Struve...	1887	2509	273.48	+27.18	1803	0,44
Moyenne.			261°	+33°		0'38

Il est donc certain que le système solaire a dans l'espace un mouvement de translation dont la direction est à peu près connue. Pour avancer davantage dans cette recherche, il serait nécessaire de connaître les distances des étoiles au Soleil; mais ici l'astronomie ne dispose encore que de bien faibles ressources.

Déjà Lambert (1760) admettait que les belles étoiles ne nous paraissent plus brillantes que les autres que parce qu'elles sont moins éloignées de nous; et dans la suite on a considéré l'éclat relatif des étoiles comme donnant la mesure de leur distance, les plus faibles étant les plus éloignées. On a d'abord été confirmé dans cette idée par la connaissance des mouvements propres et ensuite par celle des parallaxes stellaires, les étoiles les plus brillantes ayant donné, en moyenne, les plus grands mouvements propres et les plus fortes parallaxes. Alors en partant des distances connues de quelques étoiles de première grandeur, on a basé sur cette idée, sur cette hypothèse, le calcul des parallaxes des étoiles de diverses grandeurs: les résultats ainsi obtenus sont encore généralement ac-

¹ *Mém. de l'Acad.* 1738, p. 345

² Bailly, *Histoire de l'Astronomie moderne*, t. II, p. 665.

³ Ce point est appelé, en anglais, l'apex du système solaire: et cette dénomination est souvent employée aujourd'hui en français.

ceptés. Cependant, les parallaxes et les mouvements propres aujourd'hui connus sont loin de confirmer cette hypothèse.

Si, en effet, les étoiles les plus brillantes étaient les plus voisines de la Terre, les mouvements propres stellaires devraient, en moyenne, diminuer en même temps que l'éclat des étoiles; or il n'en est rien, comme le prouve le tableau suivant, emprunté à M. Eastman, relatif à 550 étoiles à mouvements propres bien déterminés et distribuées en neuf groupes :

GROUPES	NOMBRE D'ÉTOILES	GRANDEUR MOYENNE	MOUVEMENT PROPRE MOYEN
1	11	1,43	0,668
2	23	2,45	0,237
3	42	3,08	0,272
4	70	4,02	0,187
5	61	4,89	0,243
6	64	6,12	0,293
7	128	7,04	0,422
8	114	8,08	0,460
9	29	8,78	0,678

Pour le premier groupe, le résultat obtenu est peu probant parce qu'il n'y entre qu'un petit nombre d'étoiles et parce qu'en outre trois d'entre elles ont des mouvements propres considérables; en le laissant de côté, on voit que la valeur moyenne du mouvement propre est sensiblement la même pour les six premières grandeurs et qu'ensuite elle va en *augmentant* à mesure que les étoiles sont *plus faibles*, contrairement à ce qui devrait avoir lieu si les étoiles les plus faibles étaient les plus éloignées.

Sans doute, pour que ce raisonnement fût sans réplique, il faudrait le baser sur *toutes* les étoiles de chaque grandeur; toutefois la conclusion à laquelle il conduit se trouve fortement appuyée par la considération des parallaxes stellaires, aujourd'hui connues, au nombre d'environ 50. En groupant ces parallaxes par ordre de valeurs croissantes, et en y ajoutant la considération des mouvements propres des mêmes étoiles, on obtient le tableau suivant :

NOMBRE D'ÉTOILES	GRANDEURS MOYENNES	MOUVEMENT PROPRE MOYEN	PARALLAXE MOYENNE
10	2,84	0,06	0,13
9	2,36	0,33	0,16
9	3,37	1,04	0,20
9	5,39	2,33	0,20
9	5,77	4,93	0,32

On voit que, pour les étoiles dont les distances à la terre sont connues, les plus rapprochées de nous sont les plus faibles, ainsi que l'avait déjà montré la considération des mouvements propres. Il serait peut-être imprudent de généraliser ces conclusions, mais en présence de tels résultats, il devient difficile de soutenir l'hypothèse, généralement admise, que les belles étoiles ne nous paraissent plus brillantes que parce qu'elles sont plus rapprochées, ce qui revient à

supposer les étoiles uniformément distribuées dans l'espace.

G. BIGOURDAN.

Poincaré (H.), de l'Institut. — Cours de Physique mathématique. Leçons professées à la Faculté des Sciences de Paris, et rédigées par J. Blondin. — Théorie mathématique de la lumière. Cours de 1887-1888. — Électricité et optique. Les théories de Maxwell et la théorie électromagnétique de la lumière. Cours de 1888-1889. Paris, G. Carré 1890.

C'est avec un très vif intérêt et avec une réelle satisfaction que nous avons lu et travaillé les deux volumes de M. Poincaré dont nous venons d'écrire les titres, et nous ne saurions trop en recommander la lecture à tous les physiciens qui veulent être au courant des hypothèses que l'on peut admettre aujourd'hui sur les parties les plus intéressantes de la physique, l'optique et l'électricité. Nous ne pouvons songer à en donner une analyse détaillée et nous devons nous borner à quelques rapides indications qui suffiront cependant, nous l'espérons, à donner une idée de leur importance.

Dans la *théorie mathématique de la lumière*, M. Poincaré montre comment les diverses théories proposées pour expliquer les phénomènes optiques par les vibrations d'un milieu élastique, tout en différant par quelques hypothèses secondaires, peuvent être considérées comme des conséquences de deux idées générales: le principe de la conservation de l'énergie et de la forme linéaire des équations des petits mouvements. Comme il le dit, la comparaison de ces diverses théories est instructive; elle était peu commode à faire parce que les mémoires originaux où elles se trouvent, outre qu'ils sont souvent difficiles à lire, se prêtent mal à cette comparaison par suite du changement de notations, aussi bien que par suite des différences dans la forme des raisonnements. Dans le livre de M. Poincaré, au contraire, on saisit avec facilité le caractère spécial de chaque théorie et la particularité de l'hypothèse physique à laquelle elle correspond. L'auteur jette par là une vive lumière sur l'état actuel de l'optique mathématique.

Le point de départ de l'ouvrage est l'étude des petits mouvements dans un milieu élastique, étude faite en supposant que ce milieu est formé de molécules séparées les unes des autres; cette hypothèse, M. Poincaré le fait remarquer avec insistance, n'est pas nécessaire, elle n'est pas démontrée non plus par la concordance des faits expérimentaux avec les conséquences du calcul, car cette concordance pourrait subsister si l'on supposait la matière continue.

M. Poincaré étudie successivement la propagation d'une onde plane, les interférences, le principe de Huyghens (signalons particulièrement l'étude par laquelle il montre que les ondes élémentaires peuvent ne donner qu'une onde effective et non deux), la diffraction, la polarisation rotatoire, la dispersion avec les théories de Cauchy, de Briot, de M. Boussinesq, la double réfraction avec les théories de Fresnel, de Cauchy, de Neumann, de M. Sarrau de M. Boussinesq, la réflexion avec les théories de Fresnel, de Neumann et Mac Cullagh, de Cauchy et de M. Sarrau; enfin, il termine par une étude de l'aberration.

Les diverses théories proposées pour ces phénomènes se rattachent à deux groupes: dans l'un, on suppose avec Fresnel que l'élasticité de l'éther est constante; dans l'autre on admet avec Neumann que la densité de l'éther est constante. Sauf peut-être l'explication de l'aberration qui n'est d'ailleurs pas encore complète, rien ne permet de faire un choix entre ces deux hypothèses.

Quelle que soit l'utilité très réelle de cet ouvrage, nous croyons que le second volume de M. Poincaré est appelé à rendre encore de plus grands et plus nombreux services: comme son titre l'indique, dans ce livre l'auteur expose les théories de Maxwell, théories dont il est difficile de se rendre maître par l'étude de

l'ouvrage original. Dans l'introduction, M. Poincaré analyse très finement les causes de cette difficulté, causes dont les principales sont qu'on ne trouve pas dans Maxwell un ensemble théorique, logique et suivi; qu'on y rencontre une série de chapitres presque indépendants et même contradictoires sur divers points, que Maxwell enfin ne cherche pas réellement à trouver une explication des phénomènes électriques et magnétiques, mais seulement à prouver que cette explication est possible.

M. Poincaré a coordonné les idées de Maxwell, mettant en pleine lumière les hypothèses diverses et quelquefois inconciliables de celui-ci, les comparant avec les principales théories qui ont été données par quelques autres savants. Si nous ajoutons qu'il n'a point fait usage des quaternions, on verra qu'il a fait là une œuvre personnelle et qu'il aura contribué à faire connaître des idées dont la diffusion peut aider aux progrès de la science.

Nous nous bornerons à donner les titres des chapitres sur quelques-uns desquels nous regrettons de ne pouvoir insister plus longuement :

Formules de l'électrostatique : — Hypothèses de Maxwell ; — Théories des diélectriques de Poisson ; — déplacements des conducteurs sous l'action des forces électriques, Théories de Maxwell ; — Electro-kinétique ; — Magnétisme ; — Electro-magnétisme ; — Electro-dynamique ; — Induction, théorie de Maxwell ; — Equation générale du champ magnétique ; — Théorie électro magnétique, conséquences des théories de Maxwell ; — Polarisation rotatoire magnétique, théories de Maxwell, de M. Potier, de M. Rowland. Enfin un dernier chapitre dû à M. Blondin contient l'indication des vérifications expérimentales qu'on a pu faire jusqu'à présent des hypothèses de Maxwell (sauf toutefois les faits découverts par M. Hertz que M. Poincaré se réserve de traiter ultérieurement).

On a dit quelquefois qu'une idée nouvelle n'acquiert toute sa valeur que lorsqu'elle a été exposée par un Français ; sans vouloir refuser à nos compatriotes le don des pensées profondes et des études abstraites, nous croyons, en effet, que la clarté est un des caractères de notre esprit national. Il nous semble que, dans le cas actuel, les idées de Maxwell gagneront beaucoup, au point de vue de leur diffusion, à avoir été interprétées par M. Poincaré.

Nous serions heureux si cette analyse rapide et incomplète à tant d'égards pouvait augmenter le nombre des lecteurs de ces ouvrages qui, nous le répétons, sont de nature à fixer les idées des personnes qui cherchent à se rendre compte le mieux possible de la nature intime des phénomènes physiques.

P^r C. M. GABRIEL.

2° Sciences physiques.

Gérard (Eric). — *Leçons sur l'électricité, professées à l'Institut électro technique de Montefiore. (Tome II^e).*

Ce second volume traite des applications industrielles de l'électricité ; *Canalisation et distribution de l'énergie électrique ; application de l'électricité à la transmission de la puissance motrice, à la traction, à l'éclairage et à la métallurgie.* Fidèle à l'excellent plan adopté dans le premier volume, M. Eric Gérard dégage de la théorie et de l'enseignement de la pratique les règles qui doivent guider l'ingénieur électricien ; il en montre l'application sur des exemples existants et indique la voie à suivre pour les projets d'installation, traitant non seulement le côté technique mais aussi le côté économique.

Les chapitres consacrés à la transmission du travail, à la traction électrique, à l'éclairage et à l'électro-métallurgie seront lus avec intérêt non seulement par les futurs ingénieurs électriciens auxquels est destiné l'ouvrage, mais encore par toutes les personnes qui aiment à se tenir au courant des plus belles applications de l'électricité.

H. PELLAT.

Campredon (L.), *Chimiste métallurgiste.* — *L'Acier. Historique, fabrication, emploi, in-8° de 344 pages avec 50 figures dans le texte et 3 planches en couleur.* B. Tignol, éditeur, 53 bis, quai des Grands Augustins.

La métallurgie de l'acier a subi depuis quelques années des modifications profondes ; les applications dont il est susceptible se sont multipliées ; le nombre même des métaux que l'on désigne sous ce nom, s'est étendu d'une façon notable ; la question si fondamentale de l'acier s'est accrue d'importance, en même temps qu'elle se compliquait, et le volume de M. Campredon présentait ainsi une utilité industrielle incontestable.

Ce livre est très complet. Après avoir indiqué rapidement dans la première partie l'histoire du fer et de l'acier, après avoir donné dans la seconde les propriétés générales de ces métaux et dans la troisième la fabrication de la fonte et du fer, l'auteur arrive, dans une quatrième partie qui constitue à elle seule presque tout l'ouvrage, à la fabrication de l'acier et à l'examen de ses usages. Cette dernière partie est accompagnée de nombreuses figures qui éclairent le texte. Tous les procédés, si nombreux, si divers, si intéressants qui ont été successivement imaginés pour la production de l'acier sont décrits et étudiés, mais avec un développement différent ; l'auteur passe avec rapidité sur les anciens pour s'appesantir longuement sur les nouveaux, sur ceux qui sont à peu près les seuls employés aujourd'hui, c'est-à-dire sur la fusion au creuset pour les aciers fins, sur les procédés Bessemer et Martin pour les produits courants.

L'ouvrage de M. Campredon constitue le tome I de la Bibliothèque de métallurgie pratique ; il sera apprécié certainement des industriels.

J. POULET.

Vogt (Georges). — *Composition des porcelaines kaoliniques.* *Bulletin de la Société chimique, 3 octobre 1890.*

On sait que la porcelaine chinoise n'a pu, jusqu'ici, être reproduite exactement en Europe. M. Vogt a pensé qu'il ne suffisait pas, pour obtenir des produits identiques à ceux des orientaux, de se servir d'une pâte ayant la même composition centésimale, et il a soumis les roches employées en chimie, à une sorte d'analyse immédiate, permettant d'en isoler les éléments minéralogiques. Il a pu constater ainsi, que ces roches contiennent une forte proportion de mica, à un état de division très grand, et ne se présentant pas sous forme de lamelles. Le mica, dans ces conditions, possède une plasticité presque égale à celle du kaolin, et résiste, sans se déformer, à des températures voisines de 1500°. M. Vogt a pu découvrir, en France, une roche à Montidas (Creuse) et un kaolin à Saint-Yrieix, qui contiennent environ 20 0/0 de mica. Il espère, au moyen de ces produits naturels, qui ont donné des essais de laboratoire très satisfaisants, pouvoir reproduire industriellement la porcelaine de Chine.

Georges CHARPY.

Boidin. — *Note sur la filtration des moûts de malt vert et de maïs à travers le filtre Chamberland.* — *Bulletin de la Société chimique, 5 octobre 1890.*

M. Boidin, chimiste à la distillerie centrale de Seclin, a remarqué que lorsqu'on fait passer un mout de maïs à travers une bougie Chamberland, une portion de la dextrose contenue dans le liquide est retenue à la surface du filtre. En filtrant des solutions de malt vert, il a constaté également une diminution notable dans la proportion des matières albuminoïdes et minérales. Le phénomène ne se produit pas au contraire, pour la diastase ; ce qui conduit M. Boidin à émettre l'hypothèse que la diastase, qui n'a jamais été isolée et sur laquelle on n'a que des données vagues, pourrait ne pas être coagulable, et même ne pas être une matière albuminoïde.

Georges CHARPY.

3° Sciences naturelles.

Luvini (G.). — Application de l'électricité à l'agriculture. — *Revue Internationale de l'Electricité et de ses applications.* — 1890 ; page 48.

Il est peu de sujets qui aient donné lieu à des résultats aussi disparates et à des contradictions aussi constantes que l'influence de l'électricité sur la végétation. Dans son article, M. Luvini ne s'occupe que des expériences qui ont été faites sur une assez grande échelle ; il passe donc sous silence les travaux de Bertholon, du docteur Forster et de M. Grandeur qui affirment l'influence de l'électricité sur les plantes, et ceux d'Ingenhousz, de M. Solly et de M. Naudin qui conduisent à des conclusions contraires¹. Mais l'auteur insiste surtout sur les tentatives récentes de M. Spechnew, qui ont été exécutées en grand et pendant plusieurs années dans la Russie méridionale et qui ont conduit aux conclusions suivantes :

1° Les semences soumises à l'action d'un courant d'induction acquièrent la propriété de se développer plus promptement et plus vigoureusement.

2° L'influence d'un courant continu se manifeste par une accélération considérable du développement, par une récolte plus abondante et par la production de légumes de dimensions énormes.

Le courant continu était produit par de grandes plaques de zinc et de cuivre enfoncées verticalement dans le sol et reliées extérieurement par un fil métallique, l'ensemble constituant un couple zinc-cuivre-cuivre.

3° La décharge lente de l'électricité statique facilitait aux plantes l'assimilation de l'azote de l'air. L'électricité était fournie par des couronnes à pointes de cuivre doré formant collecteurs, isolées et reliées par des fils métalliques.

De plus, on observe que parmi les plantes ainsi électrisées, fort peu sont atteintes de maladies parasitaires.

M. Luvini regrette fort justement que M. Spechnew n'ait pas donné plus de renseignements techniques sur ses expériences. Plusieurs savants exécutant en ce moment des travaux analogues, il convient, croyons-nous, d'en attendre les résultats avant de recommander l'emploi de l'électricité en agriculture.

A. HÉBERT.

Lesage. — Influence du bord de la mer sur la structure des feuilles. *Thèse de la Faculté des Sciences de Paris pour le Doctorat ès sciences.* Paris, 1890.

Les botanistes ont observé depuis longtemps, que certaines espèces de plantes de l'intérieur des terres, possèdent des tiges et des feuilles plus épaisses, quand elles se développent au bord de la mer. M. Lesage s'est proposé d'étudier ces modifications de plus près, par l'observation au microscope, et de rechercher dans quelle mesure le sel marin peut provoquer la carnosité des feuilles.

Dans la première partie de son travail, l'auteur compare les feuilles de plantes recueillies au bord de la mer, à celles des mêmes espèces recueillies à l'intérieur des terres, et autant que possible dans les mêmes conditions d'âge et d'éclairement. Mais pour tenir compte de l'influence de la nature du sol et des autres conditions extérieures, peut-être eût-il été bon de comparer des plantes ayant poussé dans deux champs d'expérience, l'un institué au bord de la mer, l'autre à l'intérieur des terres. M. Lesage eût ainsi évité quelques restrictions fâcheuses, par exemple au sujet du *Nasturtium officinale* (page 39) qui a été étudié dans deux stations plus ou moins comparables² et des résultats fournis par l'*Armeria maritima* (p. 53) qui peuvent être attribués, entre autre causes, à l'action de la lumière.

L'auteur décrit au début (p. 14) la manière dont il a étudié les feuilles, et, pour montrer l'excellence de son procédé, il dit avec quelle facilité il a pu suivre les canaux sécrétaires du *Crithonum maritimum* ; cependant, quand il rapporte spécialement ses observations sur cette même plante (p. 53), il ajoute : « L'examen de plusieurs coupes conduit à croire que la variété maritime semble avoir relativement plus de canaux que la variété terrestre. » Comme précision, cela laisse à désirer.

D'après l'auteur, l'épaisseur des feuilles, pour certaines espèces, comme *Beta maritima*, *Crithonum maritimum*, *Cakile maritima*, *Lotus corniculatus*, etc. est nettement plus grande sur les échantillons récoltés au bord de la mer, comme l'avaient déjà constaté, mais non mesuré les botanistes descripteurs. Mais parmi les espèces classées par M. Lesage comme ayant leurs feuilles plus épaisses au bord de la mer (p. 70) il en est quelques-unes dont il donne l'épaisseur d'après des mesures faites au microscope, et qui paraissent peu probantes. Ainsi le Petit houx ou *Ruscus aculeatus* (p. 26) montre une différence d'épaisseur de $\frac{2}{75}$ de mm., la Ciguë ou *Conium maculatum* (p. 49) de $\frac{1}{25}$ de mm. ; sur une autre espèce, si variable que certains botanistes y ont reconnu plusieurs espèces, le *Polygonum aviculare* (p. 27), elle est de $\frac{1}{100}$ de mm. D'assez faibles variations pourraient cependant tenir à d'autres causes qu'à la station maritime ou terrestre, d'autant plus que l'auteur ne dit pas, si ces nombres sont établis sur des moyennes ou proviennent d'un échantillon quelconque. Enfin le *Plantago major* (p. 63) que Moquin Tandon et Willkomm ont cité comme ayant des feuilles plus charnues au bord de la mer, a présenté une relation inverse à M. Lesage ! Chez certaines espèces, la différence est nulle, et il en est même quelques-unes dont la variété terrestre est plus épaisse. Mais il est plus nouveau et plus intéressant de savoir que l'augmentation d'épaisseur se produit principalement dans le tissu en palissade, par l'augmentation en nombre de ses assises, ou l'accroissement en volume de ses éléments, ou l'une et l'autre cause à la fois. C'est là un résultat sur lequel M. Lesage insiste avec raison.

Quant à la quantité de chlorophylle, elle paraît moins abondante dans les variétés maritimes, par suite de la réduction soit du nombre des grains de chlorophylle, soit de leur volume. Cependant, comme leurs cellules sont plus nombreuses et de plus grande taille que celles des variétés terrestres, une même quantité de matière verte pourrait avoir une apparence moindre dans les premières. D'ailleurs, l'auteur a donné un assez grand nombre de dessins schématiques, pour représenter le nombre des grains de chlorophylle dans les cellules ; mais comme la situation de ces grains varie dans une même cellule avec l'éclairement qu'elle reçoit, il paraît assez difficile de donner par ce procédé une notion exacte de leur nombre. Les observations de M. Lesage à ce sujet sont d'ailleurs peu concluantes ; ainsi, dans le *Diplotaxis tenuifolia* (p. 39) « les grains de chlorophylle des feuilles de Rennes tendent à être plus gros » ; dans l'*Anthyllis vulneraria* (p. 42) « les échantillons de la Sarthe semblent avoir plus de chlorophylle et des grains plus développés », et dans le *Lycium barbarum* (p. 58) « la chlorophylle semble diminuer dans les feuilles du Vivier et les grains tendent à être plus petits que ceux des feuilles du jardin de Rennes. » L'auteur a voulu augmenter la tendance à la précision de son travail, par l'étude d'une plante submergée, le *Ruppia maritima* (p. 23) : il y arrive par le simple témoignage de son correspondant de Paimpol, qui lui affirme que, dans la partie la moins salée d'un marécage, la plante « est d'un vert plus franc », et que dans la partie la plus salée, elle « présente une teinte d'un vert un peu plus brun, se rapprochant de celle des *Fucus* les plus communs. » Et M. Lesage ajoute immédiatement en forme de conclusion : « Dans ce cas, la chlorophylle serait plus abondante dans la variété terrestre ; c'est ce qu'il faut retenir ». Avec de semblables procédés d'étude, l'auteur s'éloigne singu-

¹ Voir aussi à ce sujet le mémoire de M. Berthelot. — *Annales de Physique et de Chimie*, 6^e Série, tome XIX ; avril 1890.

lièrement des travailleurs que l'on a si dédaigneusement appelés « botanistes en chambre »; il fait plus que de la botanique en plein air; il fait de la botanique « fin de siècle. »

M. Lesage s'est enfin proposé de reproduire par des cultures les particularités signalées précédemment; il a expérimenté sur le Pois, *Pisum sativum*, le *Linum grandiflorum* et le *Lepidium sativum* sans dire pourquoi il avait choisi ces plantes dont les noms ne figurent pas, même comme genres, dans la liste des espèces qu'il a étudiées au point de vue anatomique¹. Il semble cependant plus rationnel d'expérimenter sur des plantes que l'on sait susceptibles de s'adapter aux conditions d'existence que l'on veut leur imposer. Les différents sols artificiels, et les différents liquides d'arrosage étaient plus ou moins salés. Les deux premières espèces ont mal résisté à l'action d'un sol trop salé, ou d'un arrosage à l'eau de mer pure ou insuffisamment diluée, ce qui est peu étonnant. Cependant les exemplaires qui ont survécu ont montré une augmentation d'épaisseur par l'action du sel, mais il est regrettable que l'auteur ne cite pas de chiffres à l'appui pour édifier le lecteur sur le degré de certitude de cette affirmation, car les autres résultats sont peu concluants : ainsi (p. 87) « il semble y avoir tendance au dédoublement de l'assise qui est unique dans les cas précédents »! et (p. 88) « la chlorophylle tend très faiblement à diminuer »!!

Le *Lepidium sativum* a mieux résisté aux différents degrés de salure; ses feuilles deviennent plus épaissies dans un sol salé, surtout si le sel est apporté sous forme d'arrosage, et montrent les modifications signalées plus haut chez les autres plantes.

Dans cette deuxième partie de son travail, M. Lesage emploie, pour désigner les pots dans lesquels il a fait ses expériences, une notation spéciale, bizarre, et qui en rend la lecture très pénible².

L. O.

Gréchant, Aide-naturaliste au Muséum. — Recherches physiologiques sur l'acide cyanhydrique. *Archiv. de physiologie*, G. Masson, Paris, 1890.

M. Gréchant, qui poursuit depuis longtemps d'habiles recherches sur l'acide cyanhydrique, a repris l'expérience de Claude Bernard, qui consiste à injecter successivement de l'amgdaline et de l'émulsine dans le système circulatoire. Dans l'économie ces deux corps se combinent en formant de l'acide cyanhydrique qui amène rapidement la mort. Les expériences citées montrent que l'amgdaline s'élimine en moins de deux heures, puisqu'après ce laps de temps l'injection d'émulsine reste sans effet.

L'acide cyanhydrique est un poison tellement violent qu'il est difficile d'en préciser la dose toxique. M. Gréchant emploie une solution au dix millième qu'il injecte

dans la veine jugulaire. Dans ces conditions dix centimètres cubes de la solution, soit un millième de centimètre cube par kilogramme suffisent pour amener la mort.

Les poissons mis dans des solutions variant de $\frac{1}{8000}$ à $\frac{1}{5000}$ présentent des résistances très variables suivant les espèces, soit que l'absorption diffère, soit que le degré de résistance de l'organisme varie d'une espèce à l'autre. En outre, si la dose d'acide était faible, on peut, l'animal semblant inanimé, le faire revenir à la vie lorsqu'on le place dans un courant d'eau pure. Pour M. Gréchant l'acide cyanhydrique agirait en produisant des phénomènes d'inhibition.

L. O.

4^e Sciences médicales.

Bouilly, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine. — Des résultats éloignés de l'ablation des annexes de l'utérus. — *Annales de gynécologie*, Paris, août 1890, t. XXXIV, p. 119.

De l'étude d'une série de 45 malades opérées par lui de 1887 à 1890, M. Bouilly conclut :

1^o Les résultats éloignés de l'ablation des annexes sont excellents quand l'indication est formellement fournie par la présence et la nature de lésions tubaires ou ovariennes. Dans les salpingites et ovarites suppurées, dans les ovariites et périovariites douloureuses, les résultats sont parfaits.

2^o Les succès éloignés paraissent moins favorables après l'ablation de certaines salpingites catarrhales ou interstitielles, compliquées de paramétrite, dans lesquelles l'extirpation totale est difficile et incertaine.

3^o Le traitement des accidents nerveux par l'opération chirurgicale ne doit s'adresser qu'aux cas dans lesquels l'exploration des organes les démontre nettement altérés.

4^o L'ablation des annexes malades ne semble exercer aucune influence fâcheuse et, dans bon nombre de cas, l'opération rend des infirmes à l'existence et à la santé.

D^r HARTMANN.

Fazio (D^r E.), professeur à l'université de Naples. — Les microbes des eaux minérales (recherches expérimentales. *Archives générales d'hydrologie*, août 1890.)

M. le professeur Fazio s'est livré à l'étude des eaux de Castellamare di Stabia, et a pratiqué sur ces eaux diverses recherches bactériologiques qui ne manquent pas d'intérêt. Il a étudié avec soin les divers microbes qu'il a pu isoler des sources en question; mais aucune de ces espèces ne semble avoir un rapport direct soit avec l'hygiène ou la pathologie, soit avec la composition chimique des eaux. Pour ce dernier point d'ailleurs, qui eût été intéressant, il ne semble pas que l'auteur s'en soit préoccupé. On nous permettra cependant de formuler quelques critiques sur la méthode employée qui fait que malgré la sincérité et le soin qu'a apportés M. Fazio à son travail, celui-ci reste incomplet. La méthode usitée au laboratoire de M. Koch et de M. Cantani pour le dénombrement et l'isolement des microbes de l'eau est la plus mauvaise de toutes et il est hors de doute que si M. Fazio avait employé les méthodes de M. Miquel, qui est certainement le savant le plus compétent en ces matières, il eût pu déceler un bien plus grand nombre de microbes dans les eaux minérales qu'il a étudiées. La méthode de M. Miquel n'a que deux inconvénients : elle est française et nécessite plus d'adresse.

D^r H. DUBIEF.

¹ Le choix du *Linum grandiflorum* est d'autant plus bizarre, que, d'après Grenier et Godron (*Flore de France*, t. I, p. 285), cette espèce n'est point française, et n'aurait été signalée en France que par erreur!

² On en jugera par ce simple extrait (p. 86) : « PISUM SATIVUM. Au 25 avril tout avait germé dans les pots, excepté le « groupe terreau et sel où l'apparition s'est faite : en « T + 11 S au 26 avril, le 30 avril en T + 25 S, le 2 mai en « T + 55 S, en T + 250 S, et le 10 mai en T + 125 S ». Un certain nombre de ces plantes ayant péri peu de temps après avoir germé, l'auteur ajoute : « Au 19 juillet, je n'avais plus « que D + S 5; D + S 2,5; D + S 1,66; D + S 1; D $\frac{9}{10}$ + M $\frac{1}{10}$; « D $\frac{13}{15}$ + M $\frac{2}{15}$; D $\frac{23}{25}$ + S $\frac{2}{25}$; T + 55 S; T + 25 S; T + 11 S « et tout le groupe terreau et tangué », et ainsi de suite. Ces chiffres désignent des proportions de sel, ou d'eau de mer, ou d'eau de Vilaine ou de terreau ou de tangué!

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 27 octobre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. R. Liouville** : Sur les développements en série des intégrales de certaines équations différentielles. — **M. O. Callandreaux** : Sur la réduction à la forme canonique des équations différentielles pour la variation des arbitraires dans la théorie des mouvements de rotation. — **M. Perrotin** a entrepris sur la planète Vénus une série d'observations continuées pendant quatre mois et demi, dans le but de vérifier les récentes découvertes de **M. Schiaparelli** sur la rotation de cette planète. Il conclut à une rotation lente, dont la durée est voisine de celle de la révolution sidérale; l'axe est à peu près perpendiculaire au plan de l'orbite. — **M. Tondini** donne les longitudes des principaux observatoires du monde par rapport au méridien de *Jerusalem-Nyanza* proposé par l'Italie pour fixer l'heure universelle.

2^{es} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. Ch. Fabry** démontre théoriquement que les franges fournies par un appareil quelconque d'interférence, lorsque la source éclairante est limitée, présentent une série de maxima et de minima dévisibilité. — **MM. Chassagny et Abraham** ont continué leurs recherches sur les éléments thermo-électriques par l'étude des couples formés de plusieurs métaux. — **M. Ad. Minet** analyse les conditions dans lesquelles se produit l'aluminium par l'électrolyse du fluorure de ce métal fondu. — **M. A. Berg** prépare les amyamines, en faisant agir une molécule de chlorure d'amyle sur une molécule d'ammoniaque en solution aqueuse saturée, en présence de l'alcool; il obtient ainsi pour 6 parties de monoamyamine, 9 parties de diamylamine et 1 ou 1 1/2 de triamyamine.

3^{es} SCIENCES NATURELLES. — **MM. Quénu et Lejars** étudient les vaisseaux des nerfs au moyen d'un procédé spécial d'injection. Ils ont reconnu que les récurrents, le pneumogastrique et le sympathique dans leur partie cervicale reçoivent leurs artères exclusivement des thyroïdiennes; les veines de ces nerfs sont richement développées et aboutissent à des veines musculaires. — **M. A. Dutartre** a déterminé chez la grenouille verte (*Rana esculenta*) les conditions des changements de couleur du tégument, c'est-à-dire de l'expansion ou de la contraction des chromoblastes. La lumière possède une action directe indépendante de l'impression rétinienne. Les mouvements des chromoblastes sont sous la dépendance du sympathique. — **M. Ch. Contejean**, par une série d'expériences sur la Sauterelle, démontre que l'autotomie des pattes sauteuses est un réflexe direct, conformément à l'opinion de **M. Frédéricq**, et non une défense instinctive. Il arrive à la même conclusion relativement à l'autotomie de la queue du Lézard. Il décrit dans les deux cas le détail du mécanisme de rupture. — **M. Prillieux** a étudié dans le Loir-et-Cher la maladie des betteraves connue sous le nom de *pourriture du cœur*. Il l'attribue à un champignon du genre *Phylosticta*; le mycélium de couleur noire, décrit comme l'auteur du mal sous le nom de *Sporidesmium putrefaciens*, ne serait qu'un Saprophyte intervenant en second lieu. — **M. A.-F. Nogues** adresse le relevé de dix-huit tremblements de terre observés au Chili du 10 juin 1889 au 9 août 1890, avec la relation détaillée du plus violent, celui du 23 mai 1890. — **M. J. Thoulet** a étudié in vitro la façon dont divers sédiments (kaolin, globigérines) se déposent dans l'eau douce et dans l'eau de mer. —

M. Badoureaux analyse théoriquement le phénomène de la sédimentation.

Séance du 3 novembre 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. A. Mannheim** étudie géométriquement le mouvement du double cône sur lequel **M. Resal** a fait une communication. — **M. Appell** : Sur les fonctions périodiques de deux variables. — **M. V. Jamet** : Sur un cas particulier de l'équation de Lamé. — En inscrivant les indications de deux manomètres à écrasement, situés aux deux extrémités d'une éprouvette, **M. Vieille** démontre que la combustion d'un explosif, inégalement réparti dans un vase clos suffisamment long, détermine la formation d'une onde qui frappe tour à tour les deux extrémités : la vitesse de propagation est très voisine de la vitesse de propagation du son dans les produits de la décomposition à la température de déflagration; la pression maxima peut atteindre le triple de la pression normale.

2^{es} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. R. Boulouch** étudie théoriquement le photomètre de Bunsen; il indique les formules permettant de calculer rigoureusement les intensités des luminaires; il a vérifié ses équations par une série d'expériences. — **M. Ch. V. Zenger** fait tourner une sphère de verre creuse, argentée à l'intérieur, en la plaçant entre les déchargeurs d'une machine Wimshurst; il en conclut que la rotation de la terre sur son axe est produite par l'action électrodynamique du Soleil. — Dans les bains révélateurs alcalins employés en photographie, le borax tantôt accélère, tantôt ralentit le développement; **M. Mercier** explique ces faits en montrant que le borax agit comme acide avec le pyrogallol, par exemple, et comme alcali avec l'hydroquinone ou l'iconogène. — **MM. H. Gautier et G. Charpy** avaient montré, dans une précédente communication, que les diverses couleurs que prend l'iode dans les divers dissolvants correspondent à des états moléculaires différents. Ils ont pu démontrer que l'affinité chimique varie parallèlement; si l'on fait agir diverses solutions d'iode sur l'amalgame de plomb, les solutions violettes (sulfure de carbone, benzène) donnent surtout de l'iode de mercure, les solutions brunes (alcool), de l'iode de plomb. — **MM. A. Haller et A. Held** : Sur les éthers γ -cyanacétoacétiques et les éthers imidés chlorés correspondants. — **MM. H. et A. Malbot** ont constaté que par l'action de l'iode de isopropyle sur l'ammoniaque aqueuse concentrée, en proportion équimoléculaire, on ne peut s'élever dans la progression au delà de la diisopropylamine.

3^{es} SCIENCES NATURELLES. — **M. Marey** indique le procédé dont il se sert pour la photochronographie des mouvements lents; c'est un procédé général applicable à tous les cas. Une bande de pellicule sensible est entraînée par un rouage à mouvement continu et est arrêtée un instant au moment de l'impression par le jeu d'un ressort. — **M. Verneuil** rapporte trois observations dans lesquelles, à la suite de fracture ou de luxation compliquée, la plaie ayant été souillée par de la terre, il se développa de la septémie d'abord, du tétanos ensuite. De ce fait que la guérison de la septémie dans ces cas n'empêcha pas le tétanos d'éclater, **M. Verneuil** conclut que les deux affections sont indépendantes et que leur rapprochement fréquent provient de la coexistence dans les mêmes terres du bacille de Nicolaïer et du vibron de Pasteur. — **M. Le Moult** a découvert dans les larves du Hanneçon un champignon parasite qui fait mourir ces larves et se communique de l'une à l'autre; l'auteur se propose de cultiver ce

parasite en vue de la destruction des Hannetons. — **M. R. Dubois** a vu des pièces de bronze se couvrir rapidement d'une patine verte lorsqu'on les mettait au contact d'une solution de sulfate de cuivre contenant des moisissures; la même solution stérilisée n'a plus aucune action. — **M. A. Viré** signale dans la vallée de Lunain (Seine-et-Marne) des polissoirs néolithiques en grès de Fontainebleau. — **M. A. de Lapparent** croit que les *rideaux* des collines du nord de la France, qui ne constituent nullement un phénomène propre aux régions de la craie sont produites par le labourage. — **M. Stanislas Meunier**, qui avait essayé inutilement de produire des dendrites de manganèse par l'action du carbonate de chaux sur le sulfate de manganèse en solution, a reconnu que les dendrites naturelles contiennent une notable proportion de fer. Il en a alors reproduit artificiellement en mettant du calcaire au contact d'un mélange de sulfate de manganèse et de sulfate de fer. — **M. Daubrée** lit une notice sur les travaux de **M. Pierre de Tchihatchef** correspondant de la section de Géographie et de Navigation.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 21 octobre

M. de Valcourt lit un travail comparatif des mesures sanitaires prises aux Etats-Unis et en France dans le but de combattre les maladies contagieuses, demandant à l'Académie d'attirer l'attention du gouvernement sur l'urgence qu'il y aurait à promulguer des lois d'hygiène avec sanction pénale sévère. — **M. Dujardin-Baumetz**, sur les causes de dépopulation de la France, pense que le tabac agit par intoxication au même titre que l'alcool. — **M. Lagneau** appuie les mesures hygiéniques proposées par **M. Rochard** en vue de diminuer la mortalité et d'augmenter la natalité.

Séance du 28 octobre

M. Le Fort pense que, bien que l'accroissement de la population en France soit plus faible que celui des autres pays, la situation est loin d'être aussi grave qu'on semblerait le croire. La mortalité ne peut être incriminée puisqu'elle va toujours en décroissant; au point de vue de la natalité, la France occupe un rang inférieur, mais cependant sa population augmente toujours et cela en rapport avec les périodes de crises ou de prospérité. Néanmoins, il y a un grand intérêt à voir augmenter le taux de la natalité : les moyens à employer seront longs à trouver et après beaucoup d'essais; il faudrait modifier les mœurs, surtout de la classe ouvrière, transformer le Code civil en ce qui concerne les successions, permettre la recherche de la paternité, etc., etc. La France peut, sans crainte, se mettre à l'œuvre, et y consacrer tout le temps nécessaire.

Séance du 4 novembre 1890.

M. Pamard (d'Avignon) a constaté dans le département de Vaucluse en 1889 une mortalité énorme des enfants de 0 à 2 ans (21,86 ‰ de la mortalité totale) qui a rendu le chiffre des décès supérieur à celui des naissances. Il pense que pour remédier à cet état il faudrait développer les pratiques de l'hygiène de l'enfance, puis étendre la loi Roussel et l'appliquer dans un sens pratique alors que maintenant elle sert surtout à la création de fonctionnaires inutiles. — **M. Terrier** fait une communication sur le cas d'un homme chez lequel il a combattu avec succès des accidents de congestion et d'hypertrophie du foie avec ictere très intense et accès fébriles, en établissant une fistule biliaire après incision exploratrice.

D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 23 octobre 1890.

M. Féré démontre de la façon suivante que l'éternuement produit par des impressions lumineuses est un réflexe indirect : si l'on empêche l'écoulement des larmes dans le nez, en luxant les points lacrymaux au moyen d'une petite serre-fine, le réflexe n'a plus lieu. — **M. Gellé** croit que ce réflexe est le premier degré du coryza que produisent fréquemment les impressions lumineuses vives et prolongées. — **M. Gréhan** présente un dynamographe qui peut s'appliquer au gastrocnémien de la grenouille comme au biceps de l'homme. On enregistre la flexion d'une lame d'acier sur laquelle la puissance s'exerce par un bras de levier arbitraire; la résistance est mesurée dans chaque cas par des poids marqués appliqués au même point et produisant la même flexion. — **M. Pouchet** a recueilli au cours d'une campagne à bord de l'*Hirondelle* un organisme pélagique unicellulaire, le *Pyrocystis noctiluca* qui avait été signalé lors de l'exploration du *Challenger* et jamais retrouvé depuis; il a pu en faire l'étude complète. — **M. Mathias-Duval** a continué sur le rat et les souris ses recherches sur la formation du placenta chez les rongeurs; ses nouvelles observations confirment la formule qu'il avait donnée à propos du lapin: Une hémorragie utérine captée par des tissus fœtaux. — **M. Gellé** a trouvé, dans un cas d'hémiplégie faciale, l'accommodation auriculaire supprimée des deux côtés, tandis que l'audition était restée aussi bonne du côté lésé que du côté sain; il en conclut que la lésion centrale avait atteint le centre du réflexe accommodateur. — **M. Hédon** a repris l'étude du diabète consécutif à l'ablation du pancréas chez le chien. Grâce à une nouvelle technique, la survie des opérés étant assurée, il a obtenu constamment un diabète intense, mortel au bout de 20 à 30 jours. En provoquant la dégénérescence du pancréas, par l'injection de paraffine dans le canal de Wirsung sans l'extirper, on n'obtient pas de glycosurie. Le diabète pancréatique n'est donc pas le fait d'une cachexie attribuable aux troubles de la digestion. — **M. Roger** a constaté que le sérum des lapins vaccinés contre le streptocoque de l'erysipèle ne tue pas ce microbe, mais l'atténue. — **MM. Gilbert et Hanot** ont étudié expérimentalement sur le cobaye la cirrhose tuberculeuse du foie, lésion qui se présente chez l'homme, mais est peu connue. C'est une cirrhose périlobulaire, avec des tubercules disséminés; on ne trouve pas de bacilles dans le tissu de sclérose. — **M. Kunckel d'Herculais** a reconnu que les premières phases du développement des *Mylabres* ont lieu dans les coques ovigères des Acridiens.

Séance du 8 novembre.

M. Hénocque a observé l'âge auquel apparaissent les fonctions génésiques chez le cobaye mâle; le coit peut avoir lieu à deux mois; à quatre mois, l'activité génitale est complète. — **MM. Courmont et Dor**, en injectant à de jeunes lapins, par la voie intraveineuse, des cultures tuberculeuses atténuées par le vieillissement, ont produit des tumeurs blanches de diverses articulations, à l'exclusion de toute autre localisation. — **M. Netter** a, de son côté, constaté des localisations exclusivement articulaires avec de vieilles cultures de streptocoques. — **MM. Mathieu et Raymond** indiquent un procédé qui permet d'évaluer chez l'homme la quantité de suc gastrique sécrété pour une digestion, et de calculer l'acidité totale de cette sécrétion; la considération de cette acidité totale est des plus importantes pour la clinique. — **M. Pilliet** décrit la riche gaine lymphatique qui entoure l'intestin des Plagiostomes. — **M. Laquerrière** a pu, pendant dix-huit mois consécutifs, pratiquer la vaccination péripneumonique du bétail, avec la sérosité d'un poulmon infecté conservé dans une chambre réfrigérante : jusqu'au dernier jour, on n'a constaté aucune diminution

dans la virulence. — MM. Lenoir et Charrin rapportent un cas de cyanose congénitale; à l'autopsie, on a trouvé une large communication interventriculaire: l'artère pulmonaire faisait absolument défaut. — M. Luys a fait des expériences particulières de transfert sur les hystériques, au moyen d'aimants en couronne; il croit que ces aimants peuvent emmagasiner certaines maladies et les transmettre à un sujet hypnotisé. — M. Verdin présente un tambour inscripteur de Marcy, auquel il a ajouté une vis. — M. Téliohan a pu suivre en détail la formation des spores chez les Myxosporidies. — M. Beauregard critique la classification que M. Brower a donnée des larves Triangulines des Insectes vésicants. Il repousse également l'assimilation que cet auteur veut établir entre les métamorphoses de ces Insectes et celles des autres Coléoptères; on compte sept mues et non pas quatre, et il faut bien admettre l'hypermétamorphose de Fabre avec des phases régressives. — M. Mathias Duval, continuant ses recherches sur le développement du placenta des rongeurs, fait voir que les tissus fœtaux prennent à cette formation une part plus grande qu'on ne l'admettait; ce sont eux qui poussent des bourgeons autour des vaisseaux utérins. — M. Retterer décrit la façon dont s'accomplit le cheminement du pénis des mammifères dans l'épaisseur de la lame abdominale.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

La première séance depuis les vacances aura lieu le 21 novembre. Il en sera rendu compte dans le prochain numéro de la *Revue*.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

La première séance depuis les vacances a eu lieu hier soir. Il en sera rendu compte dans le prochain numéro.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

La première séance depuis les vacances aura lieu à la fin du mois. Il en sera rendu compte prochainement.


SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

La première séance depuis les vacances aura lieu prochainement. Il en sera rendu compte dans un des numéros suivants de la *Revue*.


SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Pendant les vacances, la Société de Chimie de Londres a reçu les communications suivantes :

MM. Sullivan et Tompson. *Invertase : Contribution à l'histoire d'un ferment non organisé*. — MM. Ludwig Mond, Langer et Quinke. *Action de l'oxyde de carbone sur le nickel*. (Voyez ci-dessus, p. 657). — M. Bassett. *Réaction de l'iode sur l'eau et le chlorate de potasse*. L'auteur trouve que l'iode ne déplace pas directement le chlore comme on le croit ordinairement d'après Millon. Le dégagement de chlore observé serait dû à la réaction secondaire



La réaction complète est représentée par ces deux formules :




MM. Pappel et Richmond. *La composition du lait de buffle*. — MM. Collie et Schryver : *Action de la chaleur*

sur les chlorures et les hydrates d'ammoniums quaternaires. Les auteurs se proposaient de chercher une méthode générale de préparation des amines tertiaires. M. Collie avait déjà montré que les phosphines tertiaires pouvaient s'obtenir en chauffant des composés de phosphoniums quaternaires. Leurs résultats étendus à des ammoniums quaternaires contenant les radicaux méthyle, éthyle, allyle, benzyle et phényle, montrent une analogie marquée entre les composés de l'azote et ceux du phosphore. — M. Stanley Kipping : *Action de l'anhydride phosphorique sur les acides gras*. Extension des recherches antérieures du même auteur aux acides palmitique et laurique; la décomposition a lieu suivant l'équation



on a pu obtenir ainsi le dipalmitylcarbinol ($\text{C}^{15}\text{H}^{31}$)² CH-OH, la laurone ($\text{C}^{14}\text{H}^{29}$)²CO, la palmitone ($\text{C}^{16}\text{H}^{31}$)²CO et le dilaurylcarbinol ($\text{C}^{14}\text{H}^{29}$)² CH-OH. — MM. Stanley Kipping et Makensie. α -Diméthyl- α -diacétylpentane. — M. W. H. Perkin : *Berberine*. L'auteur conclut de ses expériences : 1^o que la berberine $\text{C}^{20}\text{H}^{17}$ Az O⁴ doit sa couleur et son pouvoir tinctorial à la présence d'un groupe quinonique; 2^o que la berberine est un dérivé isoquinolique; 3^o que la berberine est voisine de l'hydrastine, la narcotine et la papavérine. Enfin il propose pour cet alcaloïde la formule suivante :



MM. Armstrong et P. Wynne : *Etudes sur la constitution des dérivés trisubstitués de la naphthaline*. Comme continuation de leurs recherches antérieures, les auteurs présentent des notes sur les sujets suivants : La constitution des acides α naphthylamine δ disulfoniques. La constitution de l'acide δ naphthylamine-disulfonique. Les acides disulfoniques dérivés des acides isomères β naphthylamine-sulfoniques. Acides β chloronaphthaline-disulfoniques. Influence comparative exercée par les radicaux Cl, OH, Az H² dans les dérivés de la naphthaline sur la formation des acides disulfonés. Action de la potasse sur l'acide naphthaline 1, 3 disulfonique.

— M. Pullinger : *Action du zinc sur l'acide sulfurique dilué*. En opérant avec du zinc chimiquement pur, l'auteur est arrivé à conclure que l'acide sulfurique étendu pur est à la température ordinaire complètement dépourvu d'action sur le zinc, que la surface de celui-ci soit lisse ou rugueuse. — MM. Rhymer, Marshall et Perkin. *Acide acetyltriméthylène carboxylique*.

La première séance depuis les vacances aura lieu prochainement. Il en sera rendu compte dans un des numéros suivants de la *Revue*.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Depuis les vacances, l'Académie a reçu les communications suivantes :

M. Van Der Menbrugge fait une deuxième communication sur la propriété caractéristique de la surface commune à deux liquides soumis à leur affinité naturelle, c'est-à-dire sur la force qu'il a appelée *force d'extension*, parce qu'elle exerce un effet directement opposé à celui de la tension; il a poursuivi l'étude des nombreux phénomènes où cette force intervient; il donne actuellement la théorie complète de l'étalement d'un liquide sur un autre. Pour les observateurs qui se sont occupés spécialement de cette question, la surface commune à deux liquides est considérée comme soumise à une force contractile, c'est-à-dire comme ayant toujours une tendance à diminuer, sauf quand cette force est nulle. De cette façon, pour qu'un liquide 2 s'étale sur un liquide 1, il suffit, d'après la théorie admise généralement aujourd'hui, que la tension F₂ du liquide sur lequel on dépose une goutte du liquide 2 soit supérieure

à la somme de la tension F_2 de ce dernier et de la tension F de la surface commune aux deux substances. Mais cette condition devient à la fois plus simple et tout à fait rigoureuse dès qu'on substitue à F sa valeur $F_1 + F_2 - 2F_{12}$, F_{12} étant l'action réciproque des deux liquides; on a ainsi

$$F_1 > F_2 + F_1 + F_2 - 2F_{12} \text{ ou } F_{12} > F_2;$$

si le liquide 1 doit s'étaler sur le liquide 2, il faut avoir de même $F_{12} > F_1$. Ainsi la condition nécessaire et suffisante pour qu'un liquide s'étale sur un autre consiste en ce que l'action mutuelle des deux substances l'emporte sur la tension du liquide destiné à s'étaler. Cette condition avait déjà été donnée en 1869 par Dupré de Rennes, mais avec une erreur de signe ($F_{12} < F_1$) et sans aucune preuve expérimentale. M. Van Der Membrughe fait remarquer que, du moment où les deux liquides agissent chimiquement l'un sur l'autre, on a de toute nécessité et simultanément

$$F_{12} > F_1 \text{ et } F_{12} > F_2;$$

car il ne pourrait se produire un corps nouveau, si l'affinité ne dépassait pas la force de cohésion de chaque liquide, représentée précisément par sa tension superficielle. De là cette conclusion fort inattendue que si deux liquides agissent chimiquement l'un sur l'autre, on peut indifféremment opérer l'expansion de l'un des liquides sur l'autre, à moins que la couche du corps nouveau n'y mette obstacle. Tous les faits conformes à cette conclusion sont absolument inexplicables dans l'ancienne théorie. M. Van Der Membrughe démontre sa proposition à l'aide de trois séries d'expériences faites avec différentes huiles grasses d'une part, de l'autre avec une solution de soude caustique à 0,25 % une solution de potasse à 0,25 %, et enfin une solution (à 2,5 %) d'ammoniaque de laboratoire. Grâce à la grande affinité de ces trois corps basiques pour les huiles grasses et plus ou moins acides, l'étalement s'est toujours opéré, et parfois jusqu'à 60 reprises consécutives, soit de l'huile sur la solution basique, soit de cette solution sur l'huile. L'auteur se propose de revenir encore sur ce sujet. — Une communication très intéressante a été faite par M. Schöntjes, de l'Université de Gand, sur les déformations produites à l'extérieur d'un hémisphère creux en métal mince par le choc d'un corps dur de forme sphérique, triangulaire, quadrangulaire, etc. Ces déformations inattendues, et très régulières, méritent d'être examinées en détail dans la figure insérée au Bulletin de la séance (n° 8). Il y a lieu de les rapprocher des déformations que M. Daubrée a constatées dans ses expériences sur une enveloppe flexible soumise à un accroissement de pression intérieure.

Séance du 11 octobre 1890.

À cette séance, outre l'envoi d'un mémoire de M. J. Guillaume, astronome privé à Péronnas, près Bourg-en-Bresse, sur ses observations de Mars, M. Terby, a donné lecture d'une note dont voici le résumé: 1° le 9, avant minuit, un observateur ayant en vue le $\frac{1}{2}$ du ciel pouvait compter de 3 à 5 étoiles filantes en 15 minutes, mais ce nombre s'est accru après minuit, puisqu'un observateur, ayant en vue seulement $\frac{1}{6}$ du ciel, pouvait en compter de 5 à 6 dans le même intervalle; 2° le 10, il était possible à un observateur, regardant le $\frac{1}{2}$ du ciel, d'en compter, après minuit, 11 en 15 minutes, c'est-à-dire de 12 h. 30 à 12 h. 45, intervalle pendant lequel semble s'être produit un véritable maximum; on voit aussi qu'en dehors de ce maximum, les étoiles filantes apparaissent, le 10, assez approximativement, à raison de une par deux minutes, pour un seul observateur. — Le P. Denza a constaté une apparition plus remarquable en Italie, mais il fixe le maximum à la nuit du 11 qui, pour nous, est demeurée couverte.

F. FOLIE,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Depuis les vacances, voici le résumé des principaux travaux et mémoires présentés à l'Académie par ses membres.

M. Thiesen: Contribution à la Dioptrique (Mémoire présenté par M. de Helmholtz). Il n'y avait jusqu'à présent qu'une théorie seulement pour le cas où le dioptré possédait un axe, et où les rayons incidents ne formaient que de petits angles avec cet axe. La théorie de Gauss, par exemple, néglige complètement le dioptré et le chemin que les rayons y parcourent. Le rayon est déterminé quant à sa position par trois variables; si l'on introduit en outre le temps que le rayon met à parcourir le chemin entre les deux surfaces limitant le dioptré, on peut calculer une fonction de quatre variables caractéristiques pour le dioptré. La base de la théorie de M. Thiesen est le principe de Fermat, que la variation du temps que le rayon met à parcourir le chemin entre deux points du dioptré est égale à zéro. Si l'on désigne par conséquent par ds un élément du chemin, par n le chemin parcouru pendant l'unité du temps, on a: $0 = \int n ds$. Si le dioptré a un axe, on peut développer la fonction caractéristique d'après les puissances de l'angle que le rayon forme avec cet axe. En première approximation on obtient ainsi les formules de Gauss en ne considérant que la première puissance de cet angle. La deuxième approximation donne une théorie des fautes des images fournies par les objectifs astronomiques ou photographiques, théorie qui manquait jusqu'à présent. — M. Kronecker: Sur les systèmes orthogonaux (Suite). — M. de Helmholtz: Sur l'énergie des vents et des vagues. L'illustre physicien a déjà démontré qu'une surface d'eau se trouve en équilibre instable dès qu'un vent y passe et avait reconnu dans l'instabilité de cet équilibre la cause des vagues. Des couches d'air de densités différentes qui glissent l'une sur l'autre se trouvent dans des conditions semblables et l'instabilité de leur équilibre cause les vagues de vent. Dans ce travail, l'auteur examine la distribution de l'énergie entre l'air et l'eau pour des vagues stationnaires, en réduisant le problème à un problème des minima. Ces formules qu'il est impossible de reproduire dans un compte rendu mènent à des conclusions sur l'augmentation et la diminution de l'énergie aussi bien que sur l'équilibre stable et instable des masses en mouvement. — M. Kundt présente un travail de MM. du Bois et Rubens sur la réfraction et la dispersion de la lumière dans les métaux. Les auteurs ont préparé des prismes métalliques d'après les indications de M. Kundt. Leurs observations ont porté sur des prismes en fer, en nickel et en cobalt. La loi de Snellius est valable pour des angles d'incidence qui ne dépassent pas la valeur de 10°. Pour des angles plus grands, ils ont constaté des écarts. Les indices de réfraction déterminés d'après la méthode des plus petites déviations pour différentes raies du spectre sont:

	I_{α}	D	F	G
Fer	3.12	2.72	2.43	2.05
Cobalt	3.22	2.76	2.39	2.10
Nickel	2.04	1.85	1.71	1.54

Les valeurs pour le fer et le cobalt sont presque identiques tandis que celles pour le nickel s'écartent notablement des autres. — M. Kundt présente en outre un travail de M. Arons qui s'occupe des phénomènes présentés par des miroirs en platine polarisés électriquement. Si l'on place sur un tel miroir joint à l'un des pôles d'une batterie électrique une plaque plane parallèle en verre et qu'on plonge le tout dans de l'acide sulfurique dilué contenant la seconde électrode, on observe un déplacement des raies d'interférence immédiatement après avoir fermé le circuit et dans la même direction indifféremment si le miroir est polarisé par l'oxygène ou par l'hydrogène. Si l'on remplace la

plaque plane-parallèle par une lentille, les anneaux d'interférence se rétrécissent dès qu'on ferme le circuit. Il s'agit probablement d'une élévation de la plaque de la lentille par la couche double qui se forme par le dépôt des ions après fermeture du courant. — **M. Kronecker**: Sur la théorie des fonctions elliptiques. — **Le Pome**: Sur les systèmes orthogonaux (*Suite*). — **M. d'Arzel** présente un travail de **M. Jesse** contenant les recherches de ce dernier sur les nuages lumineux. La hauteur de ces nuages est, d'après les mesures récentes, de 83 kilomètres au-dessus de la surface de la terre. En 1885 on a trouvé 75 kilomètres, la hauteur est donc restée à peu près la même. La clarté des nuages est au maximum vers le matin. Les nuages se meuvent avec une vitesse notable dans le sens horizontal. Pour l'un d'eux on trouva une vitesse de : 308 mètres par seconde dans la direction sud-sud-ouest. Un autre se mouvait avec une vitesse de 121 mètres. Dans la direction ouest-sud-ouest. Leur vitesse est donc plus grande que celle des tempêtes les plus formidables.

Dr HANS JAHN.

La première séance depuis les vacances aura lieu prochainement. Il en sera rendu compte dans un des prochains numéros de la *Revue*.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 24 octobre 1890.

M. Brodhun, dont le photomètre ingénieux a été déjà décrit dans un de mes comptes-rendus antérieurs, s'est occupé en collaboration avec **M. Lummer**, des moyens pour affaiblir méthodiquement l'intensité d'une source lumineuse. Le problème dont la solution a été essayée par l'interposition de lentilles, de plaques noircies ou de réseaux, offre certaines difficultés, surtout pour la mesure exacte de l'affaiblissement. Les auteurs ont recouru aux observations de Talbot. Si l'on fait tourner devant une source lumineuse une plaque opaque, munie d'un secteur, l'œil observe, si la vitesse de rotation est suffisamment grande, une illumination affaiblie mais constante. L'affaiblissement de l'intensité lumineuse est proportionnelle à la grandeur du secteur. L'appareil des auteurs consiste en un système de deux plaques circulaires et opaques, mises en rotation par un petit moteur électrique de Siemens et munies chacune d'un secteur de 90°. En plaçant convenablement les deux plaques, on peut donner au système des secteurs telle grandeur que l'on désire, susceptible de mesure exacte entre 0° et 180°. Leurs recherches photométriques ont prouvé que la vitesse de rotation est sans influence sur l'affaiblissement de la lumière au moins entre les limites de 27 à 100 révolutions par seconde. Quant à la proportionnalité exacte entre l'affaiblissement de la lumière et la grandeur du secteur, les expériences ne sont pas encore terminées.

Dr HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIOLOGIE DE BERLIN

La première séance depuis les vacances a eu lieu le 31 octobre. Il en sera rendu compte dans le prochain numéro de la *Revue*.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE SAINT-PETERSBOURG

Pendant les vacances, divers travaux ont été présentés à l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg pour être publiés dans les « Mémoires » et les « Bulletins » ou le « Repertorium fur Meteorologie » de cette compagnie. En voici l'analyse :

MÉTÉOROLOGIE. — **M. G. Wild**, membre de l'Académie, *Sur l'ombrograph et l'atmograph*. Description de ces deux instruments inventés par l'auteur et destinés à enregis-

trer automatiquement la quantité d'eau et de neige tombées, de même que leur évaporation; ces appareils ont fonctionné pendant quatorze ans à l'Observatoire physique de Saint-Petersbourg et à Pavlovsk, mais n'ont pas encore été décrits jusqu'à présent. — **M. Schenrock**, *Sur le mouvement des orages en Russie*. Etude de 197 cas d'orage observés pendant l'année 1888; détermination de la vitesse moyenne de leur propagation; de la vitesse moyenne journalière et annuelle de la propagation par rapport à leur direction et à leur distribution géographique; indication des foyers de leur naissance, etc. — **M. Friedrichs**, *Untersuchung über die Leistungsfähigkeit des Richard'schen Hydrographen mit Hornlamelle* (Recherches sur la valeur des hydrographes à lamelle de corne de Richard). A priori, les appareils hygrométriques des frères Richard (à Paris) devraient présenter des variations dans leurs indications parce que leur élément hygroscopique (la lamelle de corne) est une substance organique et présente forcément des variations individuelles. Les expériences de **M. Friedrichs** montrent cependant qu'il n'en est rien. Deux appareils mis en observations et comparés avec d'autres hygromètres ont donné des résultats presque identiques; seulement leurs indications sont en général en retard (souvent de quelques heures) sur les modifications réelles de l'état hygroscopique de l'air. C'est à cause de ce retard que les variations brusques et courtes ne sont presque pas notées par l'instrument de Richard. Le cheveu employé par **M. Wild** dans son hydrographe est plus sensible que la corne. D'ailleurs, les frères Richard semblent avoir remplacé dans les instruments qu'ils construisent actuellement la corne par le cheveu. — **M. B. Kersnovsky**, *Ueber die Vorausbestimmung des nächtlichen Temperaturminimums*, etc. (Pronostics des minima de la température nocturne d'après les observations faites à Astrakhan, à Eltzevograd et à Varsovie). C'est la continuation des travaux de l'auteur sur les pronostics analogues pour les minima de température observés à Saint-Petersbourg. Les résultats de ces recherches sont entièrement conformes aux conclusions suivantes formulées déjà par **M. Kersnovsky**, avec quelques réserves, dans son premier travail: les minima de la température nocturne, déduits des observations sur le thermomètre humide, sont plus exactes que ceux donnés par l'observation du point de rosée. Le minimum nocturne est invariablement plus bas que la température indiquée à 9 heures du soir par le thermomètre humide; la différence entre le minimum vrai et l'indication thermométrique peut varier suivant les conditions locales et les saisons, de 0 à 3 degrés du thermomètre centigrade. — **M. H. Abels**, directeur de l'Observatoire d'Ekatérinbourg, *Beitrag zur Frage ob in filar-magnetometern Seiden-oder Metall-Fäden zu benützen sind* (Faut-il employer les fils de soie ou les fils de fer dans les magnétomètres à deux fils)? D'accord avec **M. Marchand**, de Lyon, **M. Abels** démontre la supériorité incontestable, au point de vue de l'exactitude des indications, des fils de métal sur les fils de soie.

CHIMIE. — **M. Beketof**, *Sur les propriétés physico-chimiques du Cæsium et de ses oxydes*. — Le poids spécifique de l'hydrate pur de cæsium est de 4,17; son volume moléculaire serait donc de 37, supérieur aux hydrates de tous les autres métaux alcalins. La chaleur dégagée par la dissolution de l'hydrate est de 15,000 calories, celle de sa saturation par l'acide chlorhydrique, de 15,800 calories. Ces chiffres confirment la règle établie par l'auteur, d'après laquelle la chaleur de l'hydratation augmente avec l'augmentation du poids atomique, tandis que la chaleur de l'oxydation diminue dans les mêmes conditions. Quant à la chaleur de la saturation elle reste invariable, presque la même pour tous les métaux alcalins. Le métal cæsium, extrait de l'hydrate solide par l'action de l'aluminium a été également soumis aux déterminations thermo-chimiques. La chaleur dégagée par son action sur l'eau n'a pu être déterminée qu'approximativement. Les chiffres des diffé-

rentes expériences varient de 50 à 52,000 calories (pour l'atome); la moyenne de ces observations 51,000 calories paraît être le chiffre le plus rapproché de la vérité.

BIOLOGIE. — M. A. Faminztin : *Symbiose des algues et des animaux.* — Plusieurs infusoires, de même que quelques éponges, contiennent des cellules vertes que certains auteurs (Giezza Entz, Brandt) tiennent pour des algues symbiosées avec l'animal, tandis que d'autres (Ray Lancaster) les considèrent comme des produits endogènes analogues, quant à leur structure, aux grains de chlorophylle. Les savants qui soutiennent la théorie de la symbiose disent que ces algues sont capables de vivre et de se multiplier en dehors de l'organisme de leur hôte; Entz va même plus loin et croit que les algues arrivent dans le corps de l'infusoire accidentellement et continue d'y vivre et de s'y multiplier d'une certaine façon, quitte à se transformer en algues véritables, en dehors de l'organisme de leur hôte. Les études de M. Faminztin sur quelques infusoires (*Vorticella nebulifera*, *Stentor polymorphus*, *Paramacium Bursaria*) et sur une spongieuse l'amènent aux conclusions suivantes : 1) Les corpuscules arrondis verts de ces animaux sont des cellules typiques, munies de noyau, de chromatophore, de pyrénoïde et d'une enveloppe hyaline et gélatineuse; leur structure ne diffère donc en rien de celle des algues unicellulaires. 2) Ces cellules se multiplient par division dans l'intérieur de l'animal; après la mort de ce dernier elles continuent à vivre mais un temps relativement court, après lequel elles meurent, du moins dans les conditions dans lesquelles on les a observées jusqu'à présent. Cependant on peut présumer, d'après quelques indices, qu'on pourra les voir vivre un temps indéfini. Ces cellules vertes correspondent aux cellules jaunes intracapsulaires des radiolaires et non pas aux cellules jaunes extracapsulaires de ces animaux.

PHYSIOLOGIE. — M. le Dr Theoktistof : *Expériences électrométriques dans le domaine de la physiologie.* Jusqu'à présent les physiologistes se sont peu préoccupés de connaître l'intensité des courants électriques qu'ils emploient cependant journellement comme moyen principal de l'excitation des muscles et des nerfs. Sauf quelques mesures inexactes sur la résistance des muscles et des nerfs on ne possède pas en physiologie ces notions électrométriques qui sont aujourd'hui la monnaie courante dans d'autres branches des sciences touchant à l'électricité. Pour le moment l'auteur ne donne que la première partie de son travail contenant la description des méthodes qu'il a suivies et des appareils qu'il a inventés pour déterminer les mesures exactes des courants électriques dans les conditions particulières de l'expérimentation physiologique.

ZOOLOGIE. — M. Herzenstein. *Notes ichthyologiques prises dans le Musée de l'Académie des Sciences.* Description des espèces nouvelles ou peu connues des poissons de l'Océan Pacifique du Nord. — M. Bichner : *Les Mammifères rapportés par l'expédition de Kan-sou faite en 1884-87.* Description des collections recueillies par MM. Potanin et Berezovski dans la province chinoise de Kan-sou. Ces collections sont intéressantes en ce qu'elles nous montrent sous un jour nouveau la répartition des mammifères de l'Asie centrale. — M. Pleske. *Ornithographia Rossica*; c'est le 4^e fascicule du grand ouvrage entrepris par l'auteur; il contient la description de 10 espèces du genre *Acrocephalus*.

ANTHROPOLOGIE. — M. A. Tarenetski. *Beiträge zur Craniologie der Ainos (Contributions à la craniologie des Ainos de l'île Sakhalin).* Ce travail est le résultat de l'étude de 44 crânes Ainos, appartenant aux musées de l'Académie et de l'École de médecine de Saint-Petersbourg. La description craniologique est précédée d'un aperçu général sur l'origine, la répartition géographique et le type physique de cette peuplade intéressante. D'après les données craniologiques de l'auteur, il faut considérer les Ainos comme une race à part, distincte de la race mongole. Les crânes Ainos sont très rares dans les collections et le nombre de ceux qui ont été

décrits jusqu'à présent par différents anthropologistes ne dépasse guère une trentaine.

Séance du 11/23 septembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Brédikhin dépose un mémoire en français intitulé « sur les phénomènes extraordinaires présentés par la grande comète de 1882, » dans lequel il fait une synthèse des observations partielles faites sur ces phénomènes par divers astronomes, et surtout des dernières recherches de M. Schiaparelli. L'aspect bizarre que présente la comète est dû, suivant M. Brédikhin, à une explosion formidable qui a eu lieu presque aussitôt après le passage de ce corps céleste au périhélie. Cette explosion avait séparé une partie de la comète (probablement sous forme d'une foule de météores) et c'est cette partie détachée qui est devenue le foyer de la formation énergique de nouveaux appendices. Ces appendices, d'après la théorie du savant académicien, sont des queues de formes diverses; elles se sont combinées avec la queue de la comète principale et lui ont donné cette forme compliquée et bizarre qui a été si bien observée, mesurée et décrite par M. Schiaparelli. — M. Struve envoie une note « sur deux lois nouvelles dans la mécanique céleste », contenant ses recherches sur les satellites de Saturne faites avec réfracteur de 30 poudres de l'Observatoire de Pulkova. Voici les conclusions de ces recherches : 1) Les conjonctions de Mimas et de Thétis ont lieu pour n'importe quelle époque aux environs du point qui se trouve au milieu entre les nœuds ascendants de leurs orbites par rapport à l'équateur de Saturne. Elles peuvent s'éloigner de ce point jusqu'à 48° approximativement; cette libration s'opère en 68 ans. 2) Les conjonctions de l'Encelade et de Diane coïncident pour toutes les époques avec le perisaturnion de l'Encelade ou, du moins, doivent osciller autour de ce point. — M. Brédikhin fait part à l'Académie de l'achèvement de la première partie du catalogue des étoiles. Ce catalogue est basé sur les observations de M. Romberg faites à l'aide d'un cercle méridien de 1874 à 1880. Le catalogue complet comprendra 5000 étoiles et va paraître à la fin de l'année.

2^e SCIENCES PHYSIQUES. — M. Sreznevski : *Les rapports entre l'humidité absolue et la température de l'air.* En se basant sur les rapports qui existent entre l'humidité absolue et la température de l'air, dans les conditions normales et au moment des cyclones et des tempêtes, l'auteur croit pouvoir affirmer que l'élévation excessive non seulement de la température, mais encore de l'humidité absolue ont une influence prépondérante sur la production des tempêtes. Ces conclusions sont en parfait accord avec celles de Berg, formulées d'après les études de quelques cas isolés des phénomènes accompagnant les tempêtes. — M. Nassakin : *Les tempêtes dans la mer Baltique.* L'auteur détermine, d'après les naufrages constatés dans chaque port de la Baltique, la force minima du vent que l'on peut considérer comme dangereuse. Ayant ainsi défini la conception de la tempête, il calcule la fréquence de ce phénomène pour les différentes parties de la Baltique et pour les différentes saisons. — M. Müller : *Observations sur l'intensité horizontale du magnétisme terrestre à l'Observatoire d'Ekaterinbourg de 1841 à 1885.* Cette note contient les résultats des recherches faites depuis 1841 par le sous-directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg, sur le magnétisme terrestre. Malgré quelques lacunes et les imperfections des premières observations, M. Müller a pu calculer la marche journalière et annuelle des variations dans l'intensité horizontale du magnétisme terrestre, de même que déterminer les variations séculaires. On trouve dans l'appendice les recherches sur des phénomènes que présente la colline formée en grande partie de minerais de fer sur laquelle se trouve l'Observatoire.

3^e SCIENCES NATURELLES. — M. Herzenstein présente le 2^e fascicule de son travail *Ichthyologische Bemerkungen* comprenant la description de quatre espèces

nouvelles et de deux espèces peu connues de poissons, venant pour la plupart des collections du Musée académique.

O. BACKLUND,
Membre de l'Académie.

SOCIÉTÉS SAVANTES D'ODESSA

SCIENCES NATURELLES. — *Société des naturalistes de la nouvelle Russie*, 4 oct. 1890. Dans ces derniers temps, M. le P^r Kowalewsky, membre de l'Académie, porta son attention sur une glande qui se rencontre chez certains mollusques de la classe des Gastropodes et qui est décrite par les auteurs allemands sous le nom *Blutdrüse*. L'auteur introduisait dans le corps des mollusques « Doris » et « Pleurobranchus » diverses matières colorantes (carmin, tournesol, sépia, lait, etc.), et remarquait que toutes ces substances s'assimilaient promptement par la glande susdite dont les cellules les englobaient et les digéraient. Les spermatozoïdes présentent une remarquable exception à cette règle car ils résistent très longtemps à l'action dissolvante des cellules de la glande, dont le noyau même se divise plusieurs fois. La glande est toujours entourée par des globules sanguins en nombre très considérable, d'où l'auteur conclut qu'ils se forment probablement dans cette glande, qui communique immédiatement avec le système vasculaire sanguin. L'auteur pense que cette glande correspond par son rôle physiologique (formation de globules sanguins et fonction phagocytaire) à la rate des Vertébrés.

D^r Pierre HAUSSNER.


ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 9 octobre 1890.


1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — L'Académie est invitée à se faire représenter au Congrès de Rome provoqué par l'Académie de Bologne pour le choix d'un méridien universel et l'unification de l'heure. — M. Adalbert Breuner : *Remarques géométriques sur la construction des sections coniques*. — M. August Adler : *Sur les instruments indispensables pour résoudre les problèmes du second degré*. L'auteur montre dans ce mémoire par un procédé nouveau qu'il n'est pas possible de résoudre tous les problèmes du second degré à l'aide du compas seul ; dès 1797, L. Mascheroni avait établi ce fait dans un ouvrage publié à Pavie sous le titre : *La geometria del compasso*. Il est nécessaire de joindre au compas ou une règle formée par deux lignes parallèles, ou une équerre à angle droit ou à angle aigu. On peut par des remarques analogues voir quels sont les problèmes du troisième et du quatrième degrés que l'on peut résoudre avec les mêmes instruments. — M. L. Gegenbauer : *Sur les congruences à plusieurs inconnues*.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Klemencic : *Quelques remarques sur les résistances*. — M. Franz Drobzyński : *Sur les effets photographiques des onduations électromagnétiques*. Dès le mois de mai l'auteur a fait des expériences permettant de conclure à l'existence d'un effet photographique des radiations électro-magnétiques, mais le 9 juillet il est parvenu à voir directement ces effets. Les onduations sont produites par la méthode de M. Hertz : elles agissent sur des plaques photographiques sèches au gélatino-bromure d'argent. La plaque est dirigée dans l'axe des vibrations, le temps d'exposition est de trois heures, le développement et la fixation se font comme à l'ordinaire. L'effet se manifeste par la production de raies alternativement brillantes et obscures. — M. A. Grünwald, de Prague, adresse la suite de son mémoire : *Sur le spectre de l'hydrogène et la structure de l'hydrogène*. L'auteur profitant des observations faites par M. Hasselberg confirme de nouveau la relation établie par Balmer ; il tire de là diverses

conclusions sur la constitution de l'hydrogène ; ces conclusions sont d'accord avec la façon dont se comporte ce corps dans ses combinaisons. — M. S. Stransky : *Sur la céraline*. — M. J. Oser : *Analyse élémentaire par la méthode électro-thermique*. — M. Carl Haaf : *Sur la guanamine*. L'auteur confirme les résultats obtenus par Nencki et décrit de nouveaux homologues de la guanamine, entre autres la propio et l'enantio-guanamine. — M. Storch : *Sur la constitution de la thio-urée*. En oxydant ce corps par différents agents comme l'iode, le permanganate ou le chlorate de potasse, l'eau oxygénée en solution acide étendue, on a transformé la thio-urée en un composé disulfuré par perte d'un atome d'hydrogène. Ce corps qui a pour formule



est instable à l'état libre, mais on peut le caractériser par la formation de sels cristallisés et peu solubles tels que le nitrate et le bioxalate. Ces réactions peuvent s'expliquer en admettant pour la thio-urée la formule de constitution suivante :



3^o SCIENCES NATURELLES. — M. Zolles : *Nouvelle méthode pour doser les acides libres dans le suc gastrique*. — M. Geiza Bukowski adresse le compte rendu de la suite de son voyage géologique en Asie Mineure. Entre sa dernière communication et le 25 juillet il a parcouru la région comprise entre 28°50', et 30°30', de longitude ouest de Greenwich ; ses observations lui permettront de publier une carte géologique détaillée de cette contrée. — Le secrétaire de l'Académie donne des indications sur les travaux de l'expédition entreprise pour l'étude des grandes profondeurs de la mer sur le bâtiment de la marine de guerre *Pola* commandé par le capitaine Mortho. Le prince de Monaco et le baron de Guerne ont assisté aux premiers essais des appareils destinés à sonder les grandes profondeurs. Suivant le programme de l'Académie le bâtiment a d'abord exploré les environs de Corfou, delà il a poussé jusqu'à Zante ; puis autour de l'île de Cerigo, il a croisé jusqu'à quinze milles au large et finalement s'est dirigé vers les côtes d'Afrique. Le trajet a été de 2016 milles marins ; 48 stations principales ont servi communément avec 24 stations de second ordre à l'étude de la profondeur, de la nature des eaux et de la faune maritime. Les membres de la commission ont obtenu les résultats suivants : 1^o Rapport sur les travaux océanographiques et physiques par M. Luskoh. La plus grande profondeur relevée a été de 3900 mètres au voisinage de Cerigo. Les températures ont été relevées avec soin, et l'on a mesuré la densité des différentes couches de la mer dans 300 stations ; on a aussi étudié la transparence de l'eau à l'aide des projecteurs ou de plaques photographiques immergées. La hauteur des vagues n'a jamais atteint qu'une seule fois 4^m,5 et leur période n'a pas dépassé 7 secondes ; des appareils anémométriques, pluviométriques et hygrométriques ont régulièrement fonctionné, et toutes les observations ont été enregistrées automatiquement. Pour les sondages on a employé avec succès l'appareil de M. Jules Leblanc de Paris. 2^o Rapport sur les travaux chimiques par M. Conrad Natterer. Pendant le voyage même ce chimiste a pu déterminer la nature et la composition des substances dissoutes pour s'assurer que le temps n'apporte aucune altération à la constitution de l'eau de mer. A partir de la surface de l'eau la teneur en oxygène croît d'abord à cause de l'abaissement de température, puis s'abaisse d'une façon très lente ; ainsi à 3000 mètres elle redevient la même qu'à la surface. Dans aucun cas on n'a trouvé de l'acide carbonique libre ; la surface présente des variations très notables aux différents points étudiés. Relativement aux subs-

¹ Voir p. 285 de cette Revue.

tances organiques en dissolution, la teneur décroît lorsque la profondeur augmente. Les variations dans la richesse en ammoniacale sont peu sensibles, cependant les couches voisines du fond en contiennent davantage. 3° Rapport sur les travaux zoologiques par MM. Maren Keller et Grobben : Le peu de durée du voyage et la difficulté de la pêche, jointe à une assez grande pauvreté de la faune n'ont permis d'obtenir que peu de résultats; signalons cependant parmi les poissons les plus intéressants: Bathypterois longifilis, Hoplostethus mediterraneus, Macrurus, Spinax niger.

Séance du 16 octobre 1890.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. E. Kobald : Sur les équations différentielles de Mac-Cullagh relatives aux cristaux bi-axes et sur une généralisation de ces équations.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. H. Weidel : Recherches sur les acides non azotés provenant de l'acide pyridicarbo- nique, l'auteur montre que, sous l'influence de l'amalgame de sodium, l'acide pyridimono-carbonique donne de l'ammoniaque et de l'acide oxydicarbonique. La réaction peut se représenter par la formule :



3° SCIENCES NATURELLES. — M. Alfred Nalepa : Sur de nouvelles phytotodées. — M. Dukzynsky. Communication sur le phylloxéra.

Séance du 23 octobre 1890.

1° SCIENCES PHYSIQUES. — M. Gustave Gager : Sur la vitesse des molécules. — M. Richard Harkup. Description d'un nouveau modèle de cartouche se chargeant par le fond. — M. Brauner. Dosage volumétrique du tellure.

2° SCIENCES NATURELLES. — M. Constantin Ettinghausen : Sur les espèces Banksia fossiles et leur rapport avec les espèces vivantes. Les feuilles de Banksia fossiles ont souvent été confondues avec celles de l'espèce Myrica. Comme on trouve des fruits de Myrica dans les terrains de formation tertiaire, on rattache les feuilles de Banksia à cette période; l'auteur remarque qu'à côté des Myrica on rencontre des fruits et des graines de Banksia dans les mêmes couches, et que ceci prouve nettement le caractère distinct de cette espèce et sa formation dans la flore tertiaire. Si l'on compare les feuilles des plantes vivantes de cette espèce à celles des fossiles, on constate que les fossiles sont très effilées tandis que les vivantes sont au contraire assez épaisses à leur extrémité, on peut toutefois, dans certaines circonstances, obtenir des échantillons tout à fait semblables.

Emil WEYR,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

La première séance depuis les vacances aura lieu le 7 décembre. Il en sera rendu compte dans un prochain numéro de la Revue.

CHRONIQUE

L'ASSISTANCE MÉDICALE PAR LES DISPENSAIRES DANS LES CAMPAGNES

Le 5 octobre dernier, la petite ville de Saint-Romain-de-Colbosc (près du Havre) fêta l'inauguration d'un hospice-hôpital et d'un dispensaire. M. le Dr Napias, inspecteur général de l'assistance et de l'hygiène publiques, avait été délégué par le ministre de l'intérieur pour présider cette cérémonie à laquelle assistaient, entre autres notabilités, MM. Félix Faure et Jules Siegfried, députés, et M. le Dr Gibert, du Havre.

Ce qui rend particulièrement intéressants ces établissements hospitaliers, c'est qu'ils réalisent dès à présent une partie importante du programme tracé par M. Constans relativement à l'assistance médicale dans les campagnes : la fondation, dans chaque chef-lieu de canton, d'un hôpital et d'un dispensaire pour les malades indigents.

Pour beaucoup de raisons, dont la principale est le prix élevé de la journée de présence, qui varie en France de 2 à 3 francs, l'hôpital ne peut rendre, en fait d'assistance publique, que des services restreints. Le dispensaire, au contraire, offrant au malade, avec la consultation du médecin, une application immédiate du traitement, s'adresse à une clientèle infiniment plus nombreuse. La plupart des maladies chroniques ou aiguës, entre autres certaines paralysies et ankyloses, et les affections transmissibles des yeux, de la peau et du cuir chevelu peuvent y être traitées avec succès, grâce aux bains médicamenteux, aux douches, à l'électricité, aux massages, aux sudations, inhalations, etc.

Le premier dispensaire fut créé au Havre en 1875 par le Dr Gibert qui, depuis cette époque, n'a cessé de se dévouer au service de cet établissement. Il y traite, chaque année, environ 1500 enfants. — Son exemple fut suivi dans diverses grandes villes de France et aussi à l'étranger; les résultats furent si concluants que M. Fallières n'hésitait pas, en 1887, à conseiller aux municipalités de créer des dispensaires sur le modèle de celui du Dr Gibert, en promettant de leur

attribuer des subventions sur les fonds provenant du pari mutuel.

M. Ch. Benoist, maire de Saint-Romain, qui projetait alors de construire un hospice-hôpital au moyen de diverses donations faites par des personnes charitables, sollicita de M. Monod, directeur de l'Assistance publique, et obtint, avec l'appui du Dr Gibert, et de MM. Jules Siegfried et Félix Faure, députés du Havre, un secours de 13,500 francs pour la création d'un dispensaire. Ces établissements furent commencés au printemps de 1890 et viennent d'être terminés.

L'hospice-hôpital de Saint-Romain est formé d'un corps de logis principal élevé de deux étages sur sous-sol, comprenant cabinet de consultation, réfectoire, logement du personnel, lingerie, cuisines, et de deux ailes à un seul étage, affectées à des salles de malades. Ces salles sont ogivales, suivant le système Tollet, pavées en mosaïque de marbre, parfaitement aérées et éclairées; elles sont chauffées par des poêles à vapeur.

Le dispensaire, situé à peu de distance, comprend : salle d'attente, cabinet de médecin, salle de pansements, salles de bains et de douches (avec murs et plafonds revêtus de lames de verre), cabine de repos, et enfin une annexe pour le générateur à vapeur et les réservoirs.

L'hospice-hôpital a coûté, mobilier compris, 25,000 fr., le dispensaire 13,500 francs.

Avec ces ressources restreintes, M. Ch. Benoist, aidé du Conseil d'administration, a fait élever des établissements qui répondent, à tous les points de vue, aux besoins de la population rurale auxquels ils sont destinés, et qui sont absolument conformes aux données de la science moderne. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu M. le Dr Napias : « Je dirai au ministre, a-t-il déclaré, que vous avez, les premiers, su créer le type d'établissement convenable pour assurer des secours aux malades pauvres. Je lui dirai que le modèle est trouvé et qu'il faut venir le chercher à Saint-Romain. »

L. O.

NOTICE NÉCROLOGIQUE

ÉMILE MATHIEU

La mort vient de ravir à la Science et à l'Enseignement un savant de réputation, un maître d'élite. Le 19 octobre dernier, M. Émile Mathieu, professeur à la Faculté des sciences de Nancy, succombait en cette ville aux suites d'une courte, mais terrible maladie. A l'âge de 55 ans, après une vie toute d'honneur et de travail, il tombe sur la brèche, plongeant dans le deuil ses élèves qui le vénéraient, ses collègues qui lui avaient voué une profonde et inaltérable affection.

Né à Metz, le 13 mai 1835, dans la noble cité qui vit naître Poncelet et tant d'illustrations françaises, E. Mathieu entra de bonne heure à l'École polytechnique. Quelques mois après sa sortie de l'école, il renonça à la carrière militaire, pour se consacrer aux recherches mathématiques. Dès 1856 paraît son premier mémoire. En mars 1859, il est reçu docteur avec une thèse d'algèbre supérieure « très remarquable et louée sans restriction par la Faculté des sciences de Paris ¹. » Cependant en 1867, malgré d'importantes et déjà nombreuses publications, il n'est encore pourvu d'aucun poste officiel. Ce jeune homme « réellement doué des qualités du géomètre » et « dont les travaux montrent autant de pénétration que de connaissance profonde de la science », ce jeune homme, dit M. J. Bertrand, « malgré l'estime qu'il a su inspirer à tous, reste en dehors de toutes les fonctions dont ses remarquables travaux sembleraient devoir lui rendre l'accès facile. » C'est de la fin de l'année 1867 que datent les débuts d'E. Mathieu dans l'enseignement public : le cours complémentaire de Physique mathématique, institué alors à la Sorbonne, lui est confié. Il a publié les matières de ce cours en 1872 dans un ouvrage sur lequel M. Serret a appelé l'attention de l'Académie ². Mais c'est seulement le 31 décembre 1871 qu'il devient titulaire d'une chaire : un décret le nomme professeur de mathématiques pures à la Faculté des sciences de Besançon, où il enseignait depuis deux ans comme chargé de cours. Quatre ans plus tard, il était transféré en la même qualité à Nancy, qu'il ne devait plus quitter.

Les premiers travaux d'E. Mathieu se rapportent aux mathématiques pures ; mais peu à peu ses goûts l'entraînent vers la mécanique céleste et surtout vers la physique mathématique. On ne peut songer à détailler ici ses nombreuses publications ³, si estimées en France et à l'étranger. Il suffira de dire qu'elles ne

comprennent pas moins d'une quarantaine de mémoires sur la Physique mathématique et la Mécanique moléculaire, sur la Mécanique céleste, sur la Mécanique analytique, sur l'Algèbre supérieure, la théorie des nombres et le calcul intégral. E. Mathieu a publié en outre une *Dynamique analytique*, qui peut être regardée comme le prodrome d'un traité de *Mécanique céleste*. Enfin, il allait terminer son grand *Traité de Physique mathématique*, en neuf ou dix volumes, qui malheureusement demeurerait inachevé : sept volumes en ont paru ; il travaillait au huitième depuis six mois, lorsqu'en août dernier la maladie vint soudainement le torturer.

E. Mathieu était un modèle de droiture et de sincérité. Sa conscience scrupuleuse, son caractère loyal et sûr étaient bien connus. Rigide observateur de tous les devoirs, travailleur infatigable, il avait fait deux parts de son temps, l'une à son cours, l'autre à ses recherches personnelles. Sur son lit de douleur, c'est la reprise de ce cours qui l'inquiétait, c'est l'achèvement de son *Traité de Physique* qui le tourmentait. D'une bonté souveraine, d'un dévouement à tout épreuve, cet homme excellent vivait entouré de l'estime et de l'affection de collègues qui étaient tous ses amis. Sensible à la moindre prévenance, touché de la plus petite marque de sympathie, il semblait avoir besoin de cette affection qu'on voulait lui prodiguer. On l'aimait avec l'indépendance absolue de ses idées ; on aimait cette franchise sans apprêt et tout ingénue avec laquelle il manifestait parfois son sentiment.

La croix de la Légion d'honneur, qui lui fut décernée il y a à peine un an, était une satisfaction bien due à l'opinion unanime. Mais d'autres distinctions attendaient le savant laborieux dont l'œuvre et le renom grandissaient d'année en année. L'Académie elle-même s'en préoccupait. « Ses beaux travaux, a dit M. Hermite, lui auraient valu sans doute et sans tarder le titre de Correspondant de l'Académie. »

Hélas ! ce labeur incessant, cette contention perpétuelle de l'esprit, une vie semée d'amertumes, devaient miner rapidement une santé déjà frêle. Aujourd'hui la pauvre mère octogénaire pleure son fils bien-aimé, et ce sont des éloges funèbres, de douloureux regrets qui sont décernés à l'homme d'élite qui a tant honoré son pays !

G. FLOQUET.

NOUVELLES

PRODUCTION D'UN CHAMP ELECTRIQUE PAR UN PHENOMENE OPTIQUE

De nombreuses expériences ont établi aujourd'hui une relation intime entre les phénomènes électriques et les phénomènes lumineux ; le plus souvent on est parvenu à mettre en évidence une action de l'électricité sur les propriétés de la lumière, mais plus rarement le phénomène inverse, l'influence d'un mouvement lumineux sur l'état du champ électrique.

¹ J. BERTRAND. Rapport sur les progrès de l'analyse mathématique, 1867.

² Comptes-rendus, 18 octobre 1872.

³ Voir la Notice sur les travaux scientifiques de M. Em. Mathieu. Nancy, 1882.

Parmi les découvertes sur ce sujet, une des plus instructives et des plus connues est celle de la polarisation rotatoire magnétique faite par Faraday en 1845 : le plan de polarisation d'un rayon de lumière polarisé rectilignement qui traverse un corps transparent, dévié par lui-même de pouvoir rotatoire, tourne sous l'influence d'un champ magnétique ; la rotation est la plus grande possible quand le rayon traverse le corps parallèlement aux lignes de force du champ. Jusqu'à présent on ignorait que ce phénomène admit pour ainsi dire une réciproque et que l'on put ici intervertir la cause et l'effet ; si cette idée naturelle s'était présentée à l'esprit de quelques physiciens, les tentatives essayées jusqu'à

¹ Théorie de la lumière.

présent n'avaient conduit qu'à des résultats négatifs¹. M. Samuel Sheldon nous apprend dans l'*American journal of science* (septembre 1890) qu'il vient d'exécuter une expérience concluante : il est parvenu à produire un courant électrique dans un circuit métallique par la rotation du plan de polarisation de la lumière.

Une bobine, formée de fils de cuivre, longue de 175 millimètres, large de 23, renferme un tube de verre plein de sulfure de carbone; avec deux prismes de Nicol à l'extinction et cette bobine on peut tout d'abord répéter l'expérience de Faraday; on constate que, dans ces conditions, un courant d'intensité égale à un ampère parcourant la bobine, produit une rotation du plan de polarisation égale à 78 minutes. Sans entrer dans aucun détail théorique, on peut concevoir que, si le phénomène réciproque existe, il faudra, selon toute vraisemblance, pour produire dans la bobine un courant d'un ampère, obtenir une rotation du plan de polarisation de la lumière telle que 75 minutes soient parcourues dans un temps comparable à la durée d'une vibration lumineuse. Une semblable vitesse est énorme; on ne connaît certes aucun moyen par où on la puisse produire; il importe en outre de remarquer que, si quelque mécanisme encore inconnu permettait d'atteindre cette rapidité (par la rotation du Nicol polariseur par exemple), le phénomène optique ne resterait plus simple et se compliquerait au contraire singulièrement : la lumière ne traversant pas instantanément le prisme, on n'obtiendrait plus à chaque instant un rayon de lumière polarisé dans un plan animé d'un mouvement de rotation, et les résultats deviendraient difficiles à interpréter. M. Sheldon a eu recours à des vitesses beaucoup plus modestes, 200 rotations par seconde au maximum. On doit, dans ces conditions, s'attendre à trouver un courant extrêmement faible, si faible que la différence de potentiel qui pourra s'établir entre les deux extrémités du fil enroulé sur la bobine sera, d'après les prévisions calculées comme nous avons dit plus haut, de l'ordre du milliardième de volt seulement. Malgré cette petitesse de l'effet, on peut, grâce à l'extraordinaire sensibilité du téléphone, arriver à déceler d'aussi faibles forces électromotrices. L'expérience ainsi conduite a confirmé les prévisions du physicien américain, il a même pu aller plus loin et établir un nouveau fait intéressant : dans l'expérience de Faraday la rotation du plan de polarisation est proportionnelle à l'intensité du champ et change de sens avec lui; dès lors il est probable que dans l'expérience inverse, la rotation continue doit engendrer un courant continu, tandis qu'une oscillation du plan de polarisation doit donner naissance à des courants alternatifs; les résultats obtenus sont parfaitement d'accord avec cette déduction.

La découverte de M. Sheldon est des plus intéressantes; malheureusement la petitesse des effets observés laisse encore place à quelques doutes. Les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont d'ailleurs purement qualitatifs; il serait important d'arriver à mesurer les quantités qui interviennent dans les phénomènes observés. L'ingénieuse méthode analytique imaginée par M. Lippmann permet, par l'application du principe de la conservation de l'électricité, de prévoir *a priori* quelques-unes des lois qui doivent régir les faits nouveaux découverts par M. Sheldon; la comparaison avec l'expérience présenterait un grand intérêt. Malgré l'extrême difficulté de semblables recherches, il est permis d'espérer que, tenté par l'attrait du sujet, quelque physicien parviendra un jour à résoudre les divers problèmes qui se posent naturellement à la suite de ces belles expériences; sans doute, il s'estimerait bien payé de ses peines celui qui parvien-

draît à éclaircir cette question qui intéresse et passionne fort justement tous les esprits : établir nettement les relations entre l'électricité et la lumière.

Lucien POINCARÉ.

LE FLUOR LIBRE DANS LA NATURE

MM. H. Becquerel et H. Moissan viennent de découvrir la présence du fluor libre dans la Nature¹. Ils y ont été conduits par l'étude de la fluorine de Quincieu (Rhône). On sait depuis longtemps que certaines variétés de cette espèce minérale dégagent, quand on les broie, une odeur pénétrante qui se rapproche de celle de l'ozone. Les auteurs remarquèrent qu'elle rappelle aussi celle du fluor. L'action de cet halogène sur la vapeur d'eau produisant de l'ozone, il était intéressant d'établir le dégagement de ce dernier gaz pendant la pulvérisation du minéral, et d'en déterminer l'origine. D'où les observations suivantes :

Pendant le broyage au contact de l'air humide, la fluorine de Quincieu met en liberté des bulles gazeuses, visibles au microscope; ces bulles réagissent sur le papier ozonométrique et bleussent autour d'elles l'empois d'amidon additionné d'iode de potassium. Cette réaction ne saurait être attribuée au chlore, car cette fluorine ne fournit pas pendant le broyage de dégagement de ce métalloïde. Si l'on y ajoute du chlorure de sodium, et que l'on broie le mélange on obtient un dégagement de chlore très net.

D'autre part la fluorine portée au rouge décrépite et ne fournit plus trace d'ozone. Mais portée à 250°, température qui détruit la molécule d'ozone, « elle produit encore par son broyage une réaction intense sur le papier ozonométrique. Ce fait, disent MM. Becquerel et Moissan, semble bien démontrer que l'ozone n'est pas inclus dans le minéral, mais qu'il est produit par une réaction secondaire. » Plusieurs expériences prouvent que cette réaction est due au fluor : concassée et chauffée en tube à essai, la fluorine de Quincieu dépoli le verre. L'eau distillée où ses fragments ont baigné le dépoli aussi. Le même minéral, séché à froid, puis légèrement chauffé avec du silicium cristallisé, met en liberté un gaz qui, « au contact d'une goutte d'eau, produit un léger dépôt de silice ».

Le fluor que décèlent ces réactions, est-il occlus à l'état métalloïdique dans la fluorine de Quincieu, ou y existe-t-il sous la forme d'un perfluorure qui le dégagerait en se dissociant? La question est encore réservée. Quoi que nous apprennent à cet égard les recherches en cours d'exécution de MM. Becquerel et Moissan, le résultat qu'ils ont déjà acquis offre en lui-même un grand intérêt; il semble ouvrir de nouveaux horizons à la géologie chimique.

L. O.

Dans un récent article² nous faisons remarquer, d'après M. Berthelot, que la permanence du poids de la matière était admise par les alchimistes. M. P. Osmond nous signale à cette occasion les vers suivants de Ronsard :

De Tempé la vallée un jour sera montagne,
Et la cime d'Athos une vaste campagne :
Neptune quelquefois de blé sera couvert :
La matière demeure et la forme se perd.

Faut-il y voir une allusion à une théorie chimique ou aux idées géologiques de Palissy?

¹ Après la publication du mémoire de M. Sheldon, notre collaborateur, M. G. Minchin a inséré dans l'*Electrician* de Londres (10 octobre) une note où il relate des expériences analogues qu'il avait entreprises il y a quelque temps, sans obtenir d'ailleurs un résultat positif.

² Académie des Sciences de Paris, 10 novembre 1890.

² Voyez la *Revue* du 30 septembre 1890, n° 18, p. 572 et suiv.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

LA CHIRURGIE DES REINS ET DES URETÈRES

Au commencement de ce siècle, un Français, Comhaire, démontrait par des expériences sur des animaux la possibilité d'extirper l'un des reins sans que mort s'ensuive. La conclusion tirée de ces expériences ne fut mise à profit par les chirurgiens, qu'en 1869, époque où Simon (de Heidelberg), après des expérimentations nouvelles, pratiqua la première néphrectomie. Par bonheur cette tentative hardie fut couronnée de succès; autrement c'en était peut-être fait pour quelques années de cette opération qui depuis lors a été répétée plusieurs centaines de fois. Je le crois d'autant plus que la seconde opérée de Simon succomba à l'infection purulente, cette calamité dont l'antisepsie nous a débarrassés, après qu'elle eut entravé pendant plusieurs siècles l'essor de la chirurgie.

Si un aussi long temps s'est écoulé entre les expériences de Comhaire et la première extirpation de rein, c'est à la pyohémie qu'il faut l'attribuer, à l'effroi qu'elle inspirait, à la timidité qu'elle entretenait chez les chirurgiens en les obligeant à s'inspirer sans cesse dans leurs interventions de la prudence la plus scrupuleuse.

Par un hasard heureux la néphrectomie est née en même temps que l'antisepsie. Les premières applications de la méthode de pansement créée par Lister datent de 1869; de sorte que, si une série de revers avait frappé de discrédit la nouvelle opération dès ses débuts, on peut être certain qu'elle s'en serait relevée rapidement, grâce à l'aide que lui aurait bientôt fournie la merveilleuse innovation à laquelle la chirurgie doit les

rapides progrès de ces dernières années. Malgré les encouragements que leur donnait la méthode listérienne, il est à noter que, jusqu'en 1875, les chirurgiens se sont montrés peu empressés à suivre l'exemple de Simon; de 1875 à 1880 le nombre des interventions augmente sensiblement; mais c'est surtout depuis 1880 que l'incision des reins malades (néphrotomie) et leur extirpation (néphrectomie) deviennent des opérations courantes, en même temps que la néphrolithotomie, qui est une néphrotomie ayant pour but l'extraction des calculs enclavés dans le bassin ou dans le parenchyme rénal.

La néphrectomie n'a fait son apparition en France qu'en 1880. A M. le professeur Léon Le Fort revient le mérite de cette première tentative; malheureusement elle ne fut pas suivie de succès. Le malade que j'ai opéré en avril 1881, et qui a guéri, jouit depuis cette époque d'une santé parfaite. C'était le second cas de la série française aujourd'hui longue et relativement brillante.

Une autre opération a pris dans la chirurgie une place importante depuis que Hahn (de Berlin) l'a imaginée. C'est celle qu'on a désignée tout d'abord sous le nom de néphrorraphie et que j'ai proposé d'appeler néphropexie, parce qu'elle consiste à fixer le rein devenu mobile dans la région qu'il doit occuper normalement et que diverses circonstances peuvent lui faire abandonner.

J'aurai donc, dans le résumé extrêmement succinct de la chirurgie rénale qui va suivre, à présenter au lecteur quatre sortes d'opérations d'une

application courante. Ce sont : la néphrorraphie, la néphrotomie, la néphrolithotomie et la néphrectomie.

J'ajouterai quelques mots sur la chirurgie des uretères, infiniment plus restreinte que celle des reins, mais à laquelle l'avenir réserve sans doute un sérieux développement.

I

Néphrorraphie. — Chez un très grand nombre de femmes, les reins quittent la fosse lombaire que limitent, en haut, la face inférieure du diaphragme, en arrière, les insertions postérieures de ce muscle et le muscle carré lombaire étendu de la douzième côte à la crête iliaque. Ils descendent plus ou moins vers la fosse iliaque et vers la cavité abdominale, en se coiffant de plus en plus du péritoine qui, dans l'état normal, ne fait que passer sur leur face antérieure. C'est surtout le rein droit qui est sujet à cette migration.

Dans certaines circonstances, la mobilité anormale, le déplacement est dû simplement au relâchement des tissus qui entourent le rein, à la résorption de la graisse qui constitue sa capsule graisseuse ; ou bien c'est l'intestin qui, dans sa tendance à tomber vers les parties déclives de la cavité abdominale, entraîne l'organe sécréteur de l'urine. On a même fait jouer récemment à l'entéroptose un rôle extrêmement important.

Un rein mobile, flottant, ne devient pas fatalement douloureux. Il peut rester intact et n'être le siège d'aucun symptôme spécial autre que sa mobilité ; mais assez souvent il s'y développe une sensibilité névralgiforme accompagnée, ou non, de tuméfaction. Cette tuméfaction peut même être assez grande pour qu'on se demande si l'organe n'a pas subi une dégénérescence quelconque, kystique ou cancéreuse. Il devient alors difficile de savoir si elle n'a pas précédé la mobilité. C'est en effet ce qui a lieu dans un certain nombre de cas.

Toute augmentation de volume du rein fait qu'il a de la tendance à quitter la région où il ne trouve plus la place nécessaire pour se développer ; mais cette tendance est fréquemment entravée par les adhérences que l'organe contracte de bonne heure avec les parties voisines. Le déplacement devient par là un signe diagnostique de valeur, car il s'observe surtout dans les cas où les adhérences ne s'établissent pas, par exemple lorsque le rein est atteint de congestion simple, de dégénérescence kystique, d'hydronéphrose (distension du bassinnet par l'urine accumulée), ou même de dégénérescence maligne avec conservation intégrale de la capsule fibreuse et sans phénomènes inflammatoires concomitants.

En revanche il est rare en cas d'affections fran-

chement inflammatoires (pyélites et pyélonéphrites) et de cancer à marche rapide accompagné de pressions phlegmasiques.

Cette distinction dans les causes réelles de l'ectopie est féconde en déductions pratiques ; on en tire des indications importantes relativement à l'opportunité respective d'une opération simple comme la fixation du rein, ou d'une opération infiniment plus sérieuse comme l'incision ou l'extirpation de l'organe. Ce qu'il faut proclamer bien haut, c'est que l'on voit des reins atteints de tuméfaction congestive très accusée revenir à leur volume normal par le seul fait de leur fixation ; le diagnostic de la simple tuméfaction congestive doit donc être poursuivi par tous les moyens possibles, sous peine d'une erreur grave qui conduirait à enlever un rein capable de fonctionner après avoir été remis dans sa position normale.

C'est seulement lorsqu'on a acquis la conviction que la tuméfaction est l'indice d'une grave dégénérescence qu'il faut se décider à attaquer l'organe malade d'une façon plus radicale. La difficulté de bien l'atteindre par la région lombaire et en agissant en dehors du péritoine doit faire parfois donner la préférence à la voie transpéritonéale, soit qu'on veuille simplement fixer à la paroi abdominale le rein creusé d'une cavité purulente ou kystique, soit qu'on trouve préférable de l'extirper.

Je ne dirai rien de la néphrectomie, puisqu'elle sera rapidement décrite plus tard ; la fixation du rein, la néphropexie, doit être seule en cause pour le moment. L'idée qui a guidé les premiers opérateurs était qu'il suffisait d'agir sur l'envolope graisseuse du rein. L'idée plus moderne dont les insuccès de la première manière de procéder ont démontré la justesse, est qu'il faut passer les fils suspenseurs en plein tissu rénal. A cette condition seulement le rein, remonté dans la fosse lombaire, n'a pas trop de tendance à redescendre dans la fosse iliaque.

Une incision verticale au niveau du bord externe de la masse musculaire sacro-lombaire conduit la main vers l'organe déplacé. La recherche en est difficile lorsque le pédicule formé par les vaisseaux et par les deux feuillets du péritoine est étroit, ce qui d'ailleurs est l'exception. Il faut bien le savoir pour éviter de se décider à tort pour la néphrectomie ; celle-ci est cependant la seule opération possible dans certains cas ; et il est de toute nécessité d'ouvrir la cavité péritonéale pour atteindre l'organe flottant.

Une fois la face postérieure du rein mise à nu, il faut le traverser d'une face à l'autre avec plusieurs fils échelonnés au voisinage de son bord convexe et plutôt dans sa moitié inférieure. On fixe ensuite ces fils soit aux lèvres musculaires de l'incision,

soit au périoste de la douzième côte; quelques sutures portant exclusivement sur la capsule graisseuse soutiennent les premières et complètent avantageusement l'opération.

Telle est en gros la néphropexie, bénigne ordinairement et efficace souvent, mais non toujours; elle est indiquée dans le cas où l'insuffisance d'une ceinture spéciale a été démontrée par des essais prolongés. Elle est inutile quand le rein mobile ne cause pas d'accidents sérieux, locaux ou généraux; elle pourrait être dangereuse sur des sujets d'une mauvaise santé ou ayant dépassé une cinquantaine d'années. En tout cas, il faudrait que l'intervention fût imposée par des considérations pressantes.

II

Néphrotomie et néphrolithotomie. — Ces deux opérations ont tant de rapports entre elles qu'on peut les décrire ensemble. La première est l'incision simple du rein; les conditions dans lesquelles on la pratique sont extrêmement variables.

On incise le rein lorsqu'il est distendu par du pus ou par un liquide de nature non purulente. La formation d'une collection purulente est causée par une pyélonéphrite simple ou calculeuse, ou par la tuberculose rénale. Les collections de liquide non purulent sont des hydronéphroses et des kystes simples ou hydatiques. L'hydronéphrose ou distension du bassinet par l'urine accumulée à la suite de l'oblitération de l'uretère, est beaucoup plus fréquente que les grands kystes simples ou hydatiques; j'ai pourtant observé et traité deux de ces derniers.

Certaines circonstances peuvent justifier ou nécessiter la néphrectomie dans ces deux catégories de cas, mais ordinairement la néphrotomie suffit. Si le plus souvent elle peut être pratiquée au moyen d'une incision postéro-latérale qui n'atteint pas le péritoine, on est quelquefois obligé d'inciser par devant, après avoir ouvert la cavité séreuse. C'est lorsque le rein, atteint d'hydronéphrose ou envahi par un kyste, s'est beaucoup déplacé; or j'ai déjà dit que ce fait n'était pas rare, à cause du peu de tendance que montrent les tumeurs à contenu séreux à contracter des adhérences avec les parties voisines.

En pareille circonstance, on traite la poche comme on le fait d'un kyste hydatique du foie; après l'avoir vidée complètement ou partiellement par une ponction, on l'ouvre largement et on la fixe par des sutures aux bords de la plaie abdominale. Les drains qu'on y place conduisent ainsi directement à l'extérieur les liquides qui s'en échappent, et les sutures protègent le péritoine contre toute contamination.

Comme les poches à contenu purulent ou non

purulent ne peuvent se cicatriser qu'à la suite d'un bourgeonnement intérieur de leur paroi, la guérison demande toujours plusieurs semaines et il arrive plus souvent qu'on ne voudrait que le trajet du drain reste fistuleux. Une nouvelle intervention s'impose, lorsqu'en dépit des moyens plus doux (injections modificatrices, curage) employés préalablement, la fistule persiste. L'excision de la paroi de cette dernière dans toute sa longueur, suivie de la suture du parenchyme rénal, doit être essayée, si les conditions de la fistule et l'état du rein ne s'y opposent pas; malheureusement il y a beaucoup de cas où l'extirpation du rein est la seule ressource offrant des chances de succès, et il n'est pas rare que des adhérences étendues la rendent extrêmement difficile et périlleuse.

La *néphrolithotomie* se fait dans des conditions très différentes, suivant que la présence d'un ou de plusieurs calculs dans un rein y a provoqué la suppuration sous forme de collection bien délimitée (pyonéphrose) ou seulement une pyélonéphrite scléreuse, sans augmentation de volume très notable de l'organe.

Dans le premier cas, l'opération consiste essentiellement dans une néphrotomie à laquelle s'ajoute l'extraction des calculs, après dilacération du tissu rénal, ouverture des foyers séparés par des cloisons quelquefois complètes et régularisation, poussée aussi loin que possible, de la cavité.

Il peut se faire qu'on soit amené à enlever par fragments tout le parenchyme rénal altéré et à ne laisser que la coque formée par la capsule fibreuse épaissie. Cette sorte d'opération à laquelle l'oblitération fréquente des artères rénales ou leur rétrécissement très marqué enlève son principal danger immédiat, qui serait l'hémorragie, est désignée sous le nom de *néphrectomie sous-capsulaire*.

Ce complément de l'incision ne trouve pas seulement son application dans le cours d'une néphrolithotomie sur un rein atteint de pyonéphrose; il a tout aussi bien sa raison d'être, lorsque la formation de la pyonéphrose ne se rattache pas à la lithiase, et l'indication reste absolument la même. Elle réside dans la désorganisation profonde du tissu rénal qui le rend impropre à remplir ses fonctions, et dans son induration sclérotique qui s'oppose à la cicatrisation du foyer. De là des fistules très difficiles à guérir.

La néphrolithotomie proprement dite est tout autre chose. Le rein possède à peu près ses dimensions normales et le diagnostic ne peut être déduit que de l'analyse de symptômes purement rationnels, tels que des coliques néphrétiques dans le passé, des hématuries, des douleurs occupant la région lombaire profonde, remontant en arrière sur le thorax, descendant vers le testicule en sui-

vant le trajet de l'uretère. De là des erreurs faciles et des opérations sans résultat qui ont amené les chirurgiens à préconiser et à pratiquer l'exploration directe du rein, sa palpation par la main introduite soit dans une large plaie de la région lombaire ou du flanc, soit dans la cavité péritonéale. Le premier mode d'exploration présente l'inconvénient de ne pouvoir être appliqué que d'un côté tandis que l'exploration intrapéritonéale permet de passer la main en avant des deux reins. En revanche il est plus sûr, parce que, grâce à lui, on peut saisir entièrement le rein entre le pouce placé sur la face antérieure et les autres doigts proménés sur la face postérieure; de plus, si la présence d'un calcul est reconnue, il n'y a plus, pour compléter l'opération, qu'à fendre le rein et à en faire l'extraction.

En théorie rien n'est plus simple; dans la réalité des difficultés de diverses sortes peuvent rendre cette extraction extrêmement pénible. Aussi, lorsque le rein est très désorganisé par des calculs multiples, mieux vaut extirper séance tenante contenant et contenu. Si par contre la désorganisation n'est pas très avancée et que les calculs ne soient ni trop volumineux, ni trop enclavés dans les calices dilatés, on peut procéder à l'opération très méthodiquement et obtenir de beaux succès. J'ai réglé ainsi qu'il sera dit plus loin tous les temps de cette opération, avant que la publication d'aucune expérience sur des animaux eût pu me guider dans la conception générale du procédé ni dans la détermination des détails.

Jusqu'alors on incisait le rein dans le point où l'on avait constaté par l'exploration extérieure l'existence d'un calcul; peu importait que l'incision fût faite sur une des faces de l'organe ou sur son bord convexe, en long ou en travers. Une fois l'incision pratiquée, on saisissait le calcul avec des pinces quelconques; puis on laissait la plaie rénale béante et la réunion se faisait par bourgeonnement après une période de plusieurs semaines pendant laquelle il s'échappait de l'urine à l'extérieur.

Ordinairement c'était le bassinnet que l'on incisait. Deux fois on avait tenté avec succès la réunion immédiate de la plaie du réservoir rénal, avant le jour où je reportai systématiquement l'incision sur le parenchyme rénal lui-même et où je recommandai la suture de ce parenchyme, afin d'en obtenir la réunion immédiate.

Ma première tentative date du mois de février 1888; elle ne réussit qu'en partie. L'urine coula par la plaie pendant une quinzaine de jours. Ma seconde, qui eut lieu le 23 février 1889, fut couronnée d'un plein succès. Pas une goutte d'urine ne passa entre les points de suture; et la guérison

de toute la plaie, sauf quelques points superficiels, fut obtenue en seize jours. Au vingtième jour l'opéré se levait; la ligne des sutures superficielles était entièrement cicatrisée.

Ces deux faits m'ont permis de régler ainsi le manuel opératoire:

Une fois le rein mis à nu et attiré peu à peu entre les lèvres de la plaie, introduire dans son épaisseur une aiguille à acupuncture aussi souvent qu'il sera nécessaire pour reconnaître la présence du ou des calculs. Ces piqûres, faites avec un instrument aseptique, n'ont aucun inconvénient.

Le calcul étant reconnu, inciser le bord convexe du rein dans le sens de la longueur et dans la zone correspondant au siège du calcul; inciser profondément, jusqu'aux calices et au bassinnet, et sur une étendue assez grande pour que le broiement des branches du calcul et l'extraction de ce dernier, entier ou fragmenté, se fassent sans trop de peine.

Quoique, pour cette extraction, des pinces utérines ordinaires puissent suffire, j'ai fait construire plusieurs modèles de curettes qui m'ont été utiles dans le premier des deux cas auxquels j'ai fait allusion plus haut.

Il reste à réunir la plaie rénale. Il faudra passer le nombre de fils nécessaire d'un côté à l'autre, en ayant soin de pénétrer dans le parenchyme au moins à un centimètre du bord de chacune des lèvres et de ne laisser entre les points que quatre à cinq millimètres d'écartement. Des fils de catgut ou de soie pas trop fins, du numéro 3 pour les premiers, d'un numéro un peu plus faible pour les seconds, sont également recommandables, s'ils sont bien aseptiques. Dès qu'on les serre, l'hémorragie s'arrête et le rein prend une teinte violacée due à la gêne momentanée de la circulation, ce qui ne doit pas préoccuper l'opérateur.

Le drainage de la plaie superficielle est indispensable pour le cas où la suture rénale manquerait partiellement. L'urine trouverait ainsi devant elle une voie tout ouverte vers l'extérieur et la guérison serait simplement un peu retardée.

Telle est la néphrolithotomie vraie, celle qui porte sur un rein non supprimé, celle que Hévin déclarait tout à fait impraticable pour mille raisons excellentes au XVIII^e siècle, que les audaces du nôtre ont réduites à néant, grâce à l'antisepsie qui a tout simplifié.

III

Néphrectomie. — La néphrectomie est indiquée dans tous les cas où l'une des opérations décrites précédemment ne peut être pratiquée avec profit. Cela ne veut pas dire qu'elle soit exécutable en toute circonstance. Elle aussi se heurte à des diffi-

cultés telles que, parfois, mieux vaut se décider à l'avance pour l'abstention. Un certain nombre d'essais malheureux ont fixé les limites de sa puissance, mais rien ne prouve que le progrès ne les reculera pas peu à peu. Pour le moment elle est déjà applicable à beaucoup de cas, par exemple : après les plaies ouvertes ou les déchirures sous-cutanées du rein, lorsque l'hémorragie compromet les jours du malade ; dans la lithiase, lorsque la dégénérescence du rein est extrême ; dans les affections suppuratives simples ou tuberculeuses, lorsque la désorganisation est très accusée et que les adhérences ne sont pas trop étendues ou trop fermes ; dans le cas de fistule, lorsque l'excision de cette dernière n'est pas praticable, ou n'a pas procuré la guérison ; dans les affections malignes au début, avant que le néoplasme n'ait franchi les limites de la capsule fibreuse et contracté des adhérences avec le colon, le foie, la rate, l'aorte et la veine cave inférieure ; très rarement dans le cas d'hydronéphrose ou de kystes, excepté lorsque ceux-ci sont conglomérés et qu'on peut reconnaître que la lésion n'est pas bilatérale ; enfin assez souvent lorsque le rein, atteint primitivement ou secondairement d'une dégénérescence quelconque, s'est déplacé et pointe beaucoup vers la cavité abdominale.

Il existe deux méthodes de néphrectomie : l'une est extrapéritonéale, l'autre transpéritonéale ; l'une qui permet d'atteindre le rein en se tenant en dehors de la cavité séreuse, l'autre qui prend celle-ci comme chemin pour arriver sur l'organe à enlever. Certains chirurgiens, laparotomistes quand même et très enclins à accuser de timidité ceux qui croient qu'il n'est pas toujours nécessaire d'ouvrir le ventre pour faire de bonne chirurgie, ont préconisé la néphrectomie transpéritonéale avec un absolutisme irréductible. Ils ne sont pas plus dans le vrai que les chirurgiens qui accorderaient une préférence exclusive à la néphrectomie extrapéritonéale ; mais il n'en existe pas. D'une manière générale, il est préférable d'agir en dehors du péritoine, mais on ne doit pas hésiter à affronter les risques, très réduits aujourd'hui, de l'ouverture du péritoine, si cette manière de procéder offre dans l'espèce des avantages, au point de vue de la facilité de l'extirpation du rein et de la ligature du pédicule. Il ne peut y avoir de désaccord entre les chirurgiens que pour les cas où la supériorité de l'une ou de l'autre méthode ne saute pas aux yeux. J'accorde volontiers que l'avenir pourra modifier, en ce qui concerne les faits compris dans cette zone intermédiaire, les conclusions fournies par les statistiques, conclusions favorables à la méthode extrapéritonéale ; j'accorde que la laparotomie perd chaque jour de sa gravité et que le fait d'avoir

ouvert la cavité péritonéale n'est plus susceptible, à lui seul, d'aggraver beaucoup le pronostic de l'opération. Les vraies causes de mort résident ailleurs, ainsi qu'on le verra plus loin.

Il serait trop long de décrire ici la néphrectomie dans tous ses détails. Je dirai seulement en quoi consiste l'opération envisagée dans ses grandes lignes.

Voici d'abord pour la néphrectomie extrapéritonéale : longue incision de la région lombaire et du flanc, portant successivement sur les teguments, sur les muscles superficiels et profonds, jusqu'à l'atmosphère graisseuse du rein. Mise à nu du rein par sa face postérieure, après dilacération de cette graisse ; énucléation totale de l'organe au moyen de la main. Ligature du pédicule en deux tronçons au moyen de fils aseptiques ; détachement du rein. Drainage et suture de la plaie. La guérison peut être obtenue sans suppuration en quelques jours.

Le néphrectomie transpéritonéale comporte les temps suivants : incision de la paroi abdominale sur la ligne médiane ou en dehors du muscle grand droit, refoulement de la masse intestinale et du colon en dedans. Section du péritoine postérieur, énucléation du rein, ligature du pédicule. On peut suturer ensuite le péritoine postérieur en le laissant appliqué sur le pédicule et le muscle carré des lombes, ou l'attirer en avant et le suturer en collerette à la paroi abdominale antérieure. Le foyer opératoire se trouve ainsi en communication directe avec l'extérieur, par devant, au moyen d'un drain qui y est plongé.

IV

Résultats des opérations sur les reins. — Ces résultats doivent être envisagés au point de vue de la gravité et de l'efficacité ultérieure.

La *néphropexie*, véritablement bénigne, est parfois suivie de reproduction du déplacement rénal. Sous ce rapport, son efficacité n'est pas absolue. Elle ne l'est pas non plus, il faut bien le reconnaître, relativement à la cessation des phénomènes locaux ou généraux considérés comme conséquence de l'ectopie rénale. C'est cependant une bonne opération qu'il ne faut pas prodiguer, mais qui réalise bien le but recherché chez bon nombre de malades.

La *néphrotomie*, grave chez des sujets fébricitants, en proie à la septicémie, l'est beaucoup moins chez ceux dont la température ne s'élève pas au-dessus de 38°5. C'est dire que, toutes les fois que le rein a suppuré, le pronostic est très sérieux. Voilà la raison pour laquelle la *néphrolithotomie vraie*, faite sur un rein non suppuré, s'est montrée si bénigne, comparativement à l'extraction des calculs con-

tenus dans une ou plusieurs poches purulentes. Chez ces malades privilégiés, on obtient des guérisons faciles, rapides et complètes, sauf lorsque les deux reins sont envahis par la lithiasé. Malheureusement le diagnostic des calculs susceptibles d'être trouvés et enlevés offre encore de très grandes difficultés et l'on ne peut jamais être tout à fait certain, lorsqu'on entreprend une opération de ce genre, de la mener à bien.

La gravité de la *néphrectomie* est plus grande que celle de la *néphrotomie*, mais pas d'une façon très notable. Je laisse de côté, bien entendu, l'incision des reins non suppurés. Comme je l'ai déjà fait prévoir, la mortalité de la *néphrectomie* transpéritonéale est supérieure, d'après toutes les statistiques publiées jusqu'à ce jour, à celle de la *néphrectomie* extrapéritonéale. La proportion des morts, pour l'une ou l'autre méthode, est encore considérable. De ce côté, il est ardemment souhaitable que l'avenir nous donne un grand progrès. Malheureusement les causes de la mort ne sont pas ordinairement de celles qui sont imputables au chirurgien, telles que la septicémie d'origine opératoire, l'infection purulente, la péritonite. Elles se rattachent plutôt aux désordres généraux ou locaux créés par la maladie elle-même, aux lésions simultanées ou d'ordre réflexe de l'autre rein. De là le choc opératoire à la suite d'opérations trop prolongées, ou chez les sujets atteints de septicémie préalable; de là le défaut d'élimination des produits excrémentitiels que l'urine doit emporter au dehors et qui restent dans le sang, dans les tissus, lorsque l'autre rein n'est pas en état de suppléer celui qu'on enlève.

Aussi les chirurgiens ont-ils vite compris l'avantage qu'il y avait à poursuivre par tous les moyens le diagnostic de l'état anatomique et fonctionnel de l'appareil sécrétoire de l'urine. C'est dans le but d'y parvenir que l'on pratique l'exploration des reins par deux méthodes rivales, l'une extrapéritonéale, l'autre transpéritonéale, que je ne puis que signaler en passant.

Si périlleuse qu'elles soient, les opérations décrites plus haut doivent être saluées comme un grand progrès. Pour les juger équitablement, il faut bien se dire que les malades qu'elles sauvent étaient pour la plupart des victimes prédestinées à une mort certaine. Elles ont donc incontestablement diminué, et dans des proportions considérables, la létalité des affections rénales, et comme elles sont toutes susceptibles de perfectionnement, nous avons le droit de compter sur des résultats encore meilleurs dans l'avenir.

V

Chirurgie des uretères. — La chirurgie des uretères est encore dans l'enfance. La principale raison en

est que ces canaux sont peu accessibles et que, par suite de leurs faibles dimensions, ils offrent peu de prise à l'action des instruments. Si leurs maladies sont assez bien connues aujourd'hui, on est bien moins fixé relativement aux procédés opératoires qui pourraient leur être opposés, lorsque la thérapeutique non opératoire a dit son dernier mot.

Le traitement des plaies des uretères est encore purement théorique. La suture s'impose à la pensée, mais elle serait autrement difficile à la suite d'un traumatisme que sur un animal en expérimentation.

On cite quelques rares cas d'extraction de calculs arrêtés dans la partie supérieure de ces conduits ou dans leur partie terminale. Tout récemment, appelé auprès d'une dame atteinte d'anurie calculeuse absolue, j'ai fait remonter de l'uretère dans le rein un fort gravier qui bouchait l'uretère droit et je l'ai fait sortir hors du rein incisé au préalable. Certaines fistules ont pu être fermées directement, parce qu'elles siégeaient sur la portion terminale et s'ouvraient dans le vagin; les autres, celles qui intéressent un autre point quelconque des uretères, ne peuvent être tarées que par l'extirpation du rein correspondant.

On s'est ingénié à trouver un moyen pratique de faire le cathétérisme de ces conduits, de manière à recueillir séparément l'urine provenant de chacun des reins et à en étudier les caractères. Dans la même pensée on a imaginé des instruments propres à comprimer ou à pincer temporairement l'un des uretères pendant son passage dans la paroi vésicale; l'urine recueillie à partir du moment où l'oblitération est établie, ne peut provenir que du rein du côté opposé. En agissant alternativement sur les deux conduits, on doit être renseigné sur l'état de chacun des deux reins. Malheureusement on ne peut jamais être certain que l'on placera convenablement l'instrument compresseur, et, si l'on préfère le cathétérisme, personne, même parmi les plus exercés, ne peut se flatter de réussir toujours à le pratiquer. Ces deux méthodes de diagnostic, qu'il ne faut cependant pas repousser systématiquement, ne méritent donc pas une grande confiance.

J'ai fait une fois une opération très spéciale et nouvelle chez une femme dont les deux uretères étaient comprimés par des masses cancéreuses intra-abdominales. Après avoir largement incisé le flanc gauche, je décollai le péritoine de la fosse iliaque interne et je mis à nu l'uretère depuis le rein jusqu'au point où il plonge dans le petit bassin. L'ayant sectionné dans ce point entre deux pinces, je ramenai le bout supérieur, long de 9 centimètres environ, vers la plaie des téguments et je fixai son extrémité sectionnée dans l'angle supé-

rieur de cette plaie. Un tube de caoutchouc, introduit dans le conduit, recueillit à partir de ce moment toute l'urine sécrétée par le rein gauche et la transporta dans un vase placé à côté de l'opérée. La sécrétion urinaire, complètement supprimée pendant plusieurs jours avant l'opération, se rétablit dans des proportions parfaitement suffisantes; le rein gauche, seul mis en communication avec l'extérieur suppléait son congénère.

Malheureusement la cachexie cancéreuse s'accrut à partir de l'intervention, et la malade succomba au bout de treize jours. L'autopsie montra que le bout d'uretère transplanté avait contracté de solides adhérences avec la fosse iliaque et avec l'extrémité inférieure du rein. Les parties profondes de la plaie étaient parfaitement guéries. La mort avait été causée uniquement par l'affaiblissement graduel de la malade.

Je n'ai pas eu l'occasion de répéter cette opération restée jusqu'ici unique. Elle pourrait trouver

une application utile dans les cas de compression et d'affaissement des deux uretères par une tumeur inopérable, telle qu'un néoplasme ayant envahi le petit bassin ou des fibromes utérins trop enclavés pour être enlevés par une des méthodes connues. Les conditions dans lesquelles ma première tentative a été faite étaient si mauvaises que la mort de l'opérée au bout de peu de jours ne devait pas beaucoup me surprendre. J'ai appelé cette opération : greffe de l'uretère sur la paroi abdominale, création d'un méat urétéral artificiel.

Si le tableau extrêmement succinct que je viens de faire de la chirurgie des uretères met en relief la pénurie de son présent, il ouvre sur son avenir une perspective de faits nouveaux qui viendront peu à peu prendre place dans les cadres tracés, mais restés presque vides jusqu'à ce jour.

D^r A. Le Dentu

Professeur de clinique chirurgicale
à la Faculté de Médecine.

LA CAUSE PROBABLE DES PHÉNOMÈNES ACTINO-ÉLECTRIQUES

Au cours des recherches qui l'ont rendu rapidement célèbre, M. Hertz découvrit par hasard, en 1887, que certaines décharges électriques sont favorisées par le voisinage d'une série d'étincelles éclatant entre les pôles d'une bobine de Ruhmkorff. Opérant par élimination, il ne tarda pas à reconnaître que la lumière seule de l'étincelle primaire est la cause de ce singulier phénomène; il avait ouvert une voie nouvelle, dans laquelle une cohorte de physiciens le suivit bientôt. C'est, sans conteste, à M. Hertz que revient l'honneur de la première publication à ce sujet. Cependant, un jeune physicien, plus timide, craignant sans doute de s'être illusionné et cherchant des causes d'erreurs dans son expérimentation, avait aperçues mêmes phénomènes. Dès le 25 juin 1885, M. Nodon déposait sur le bureau de l'Académie des Sciences un pli cacheté dans lequel quelques phénomènes actino-électriques se trouvaient nettement établis. Rappelons en quelques mots en quoi ils consistent. Lorsqu'un disque de métal bien isolé et réuni à un électromètre est exposé à la lumière, on observe parfois qu'il prend un potentiel positif, ou du moins que, s'il était chargé négativement, la charge diminue; l'effet est d'autant plus marqué que la lumière est plus riche en rayons de courte période, c'est-à-dire en radiations ultraviolettes. L'expérience réussit particulièrement bien avec un arc électrique jaillissant entre des pointes d'aluminium ou de zinc; l'action est complètement nulle lorsque

la lumière a traversé une lame de verre ou de mica; le quartz est sans influence.

Rien ne pouvait faire prévoir ces phénomènes; le hasard seul les avait révélés, et ils étaient sans relation aucune avec tout ce que l'on savait. Un travail récent de MM. Lénard et Wolf¹, s'il ne donne pas la réponse au dernier *pourquoi*, vient, du moins, de reculer d'un rang les limites de l'inconnu : la lumière ultraviolette pulvérise certains corps, et l'électricité est enlevée par les particules arrachées de la surface. Les auteurs sont partis de cette idée, et sont parvenus à en démontrer l'exactitude.

Dans des expériences préliminaires, MM. Lénard et Wolf, ayant exposé une mince feuille d'or à l'influence de la lumière ultraviolette, virent que les parties frappées étaient devenues légèrement rugueuses. Une plaque mi-partie argentée et cuivrée fut soumise à l'action de la lumière, après que le cuivre eut été couvert par du quartz et l'argent protégé par du mica. Après cinquante heures d'exposition, le cuivre s'était légèrement avancé aux dépens de l'argent. Mais ces expériences n'étaient pas encore décisives; il fallait démontrer directement l'existence de la poudre métallique.

Les recherches de M. Aitken et de M. von Helm-

¹ MM. LÉNARD et WOLF : Zerstauben der Körper durch das ultraviolette Licht, in *Annales de Wiedemann*, XXXVII, p. 443.

holtz ont fourni un moyen très sensible de décèler les plus fines poussières. Lorsqu'un jet de vapeur pénètre dans un espace d'air filtré, il peut se sursaturer beaucoup sans se condenser; mais vient-on à introduire des poussières sur son passage, aussitôt il blanchit et se réduit en gouttelettes.

S'emparant de ce fait, MM. Lénard et Wolf ont institué l'expérience suivante :

Une caisse, fermée à l'avant par un écran de zinc muni d'une lentille de quartz A, contenait la plaque de métal à étudier B, et le tube conducteur de la vapeur C. La plaque était réunie à une source d'électricité et à un électromètre. Des fenêtres convenablement placées permettaient d'é-




Diagramme des expériences sur la pulvérisation par la lumière ultraviolette. — A, lentille de quartz; — B, plaque de métal à étudier; — C, tube adducteur de la vapeur; — P, Plaque de verre; — D, arc électrique.

clairer la vapeur et de l'observer. La lumière était fournie par un arc D.

Dès les premières expériences, on remarqua que

le quartz abandonnait un peu de matière pulvérisante, ce qui conduisit à protéger le jet par une plaque de verre P, dont les premières couches absorbent toute la lumière ultraviolette.

Plusieurs métaux, le cuivre en particulier, montrèrent une pulvérisation bien nette sous l'influence de la lumière ultraviolette, même lorsqu'ils étaient à l'état neutre; d'autres, tels que le zinc ou le plomb, n'étaient attaqués que sous l'influence d'un potentiel négatif. En employant des plaques de faibles dimensions, il devint possible de suivre les poussières dans leur marche; elles quittaient normalement la surface éclairée, pour retourner aux parties obscures de la même plaque. La rapidité de décharge de la plaque et l'abondance des poussières vont toujours ensemble. La fuchsine, le violet de méthyle sont sensibles aux deux phénomènes, tandis que l'eau est absolument inerte.

Ces phénomènes ne sont peut-être pas sans analogie avec le fait que la poussière s'échappant d'un fil de platine chauffé à blanc est chargée négativement (Nahrwold). Les auteurs pensent aussi que la queue des comètes peut être attribuée à l'action répulsive de la lumière ultraviolette du soleil sur la matière cosmique. Arrêtons-nous avant les lointaines hypothèses.

D'où vient cette singulière action mécanique de la lumière ultraviolette? Pourquoi est-elle unipolaire? Dépend-elle du pouvoir absorbant ou de la cohésion des corps? Voilà, entre beaucoup d'autres, quelques-unes des questions qu'il faudrait résoudre pour comprendre parfaitement le phénomène; nous en sommes encore bien loin.

Ch. Ed. Guillaume,
Docteur en sciences.

LA GÉOLOGIE DE L'ANDALOUSIE

ET LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 25 DÉCEMBRE 1884

D'APRÈS LE RÉCENT RAPPORT DE LA MISSION FRANÇAISE

On se rappelle qu'au commencement de l'année 1883, notre Académie des Sciences, à la suite des secousses sismiques qui venaient de ravager les provinces de Grenade et de Malaga, envoya une mission chargée d'examiner sur place les effets du phénomène et d'étudier du même coup la structure géologique des régions ébranlées.

Cette mission était composée de M. Fouqué, directeur, et de MM. Michel-Lévy, Marcel Bertrand, Ch. Barrois, J. Bergeron, A. Oiffret, W. Kilian et

R. Bréon; les résultats de ses travaux, après avoir fait l'objet de nombreuses communications préliminaires à l'Académie, viennent d'être consignés, sous une forme définitive, dans un volumineux rapport¹ comprenant quatre groupes de docu-

¹ Fouqué, etc. *Mission d'Andalousie. Etudes relatives au tremblement de terre du 25 Décembre 1884 et à la constitution géologique du sol ébranlé par les secousses*, in-4°, 712 p. 42 pl. (Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Sciences, XXX, n° 2, 1889.)

ments distincts : 1° l'exposé et la discussion des faits relatifs au tremblement de terre, par M. Fouqué ; 2° des études expérimentales sur la vitesse de propagation des secousses dans des milieux différents, par MM. Fouqué et Michel-Lévy ; 3° une série de mémoires descriptifs sur la géologie des diverses parties de l'Andalousie, par MM. Barrois et Offret, Michel-Lévy et Bergeron, Bertrand et Kilian ; enfin, 4° des monographies paléontologiques, servant de complément aux descriptions précédentes et ayant pour auteurs MM. Bergeron et Kilian. Nous passerons en revue rapidement cet ensemble de travaux dans l'ordre indiqué.

I

De la discussion des phénomènes qui ont signalé le tremblement de terre du 25 Décembre 1884 dans les provinces de Grenade et de Malaga¹, M. Fouqué croit pouvoir conclure que la vitesse moyenne de propagation des secousses a été de 1600 mètres par seconde. Il obtient 11 kilomètres pour la profondeur du centre d'ébranlement, déduite du nombre de secondes compris entre l'arrivée du bruit et l'arrivée de la secousse (méthode de Falb) ; toutefois, le savant académicien ne se dissimule pas l'insuffisance des données sur lesquelles sont basés ces chiffres, que l'on ne saurait nullement, en conséquence, regarder comme définitifs ; les méthodes adoptées sont d'ailleurs sujettes elles-mêmes à de graves objections, ainsi que le reconnaît expressément M. Fouqué.

Ce qui ressort le plus clairement des faits constatés, c'est la relation existant entre la distribution des phénomènes sismiques et la constitution géologique des régions ébranlées : l'épicentre coïncide avec une crête montagneuse disposée en baïonnette, dont les deux versants ne présentent pas une structure homologue et sur laquelle vient s'embrancher au S. E. la Sierra Tejeda ; le milieu de l'épicentre, le nœud, pour ainsi dire, du tremblement de terre, siège précisément en ce lieu, vers lequel semble venir converger un faisceau de cassures profondes.

Le rôle de la constitution du terrain dans le mode de propagation de l'ébranlement, indépendamment de celui qu'il a pu remplir relativement à sa cause, se dégage encore plus nettement des travaux géologiques des membres de la Mission : les grands massifs montagneux situés en dehors de l'épicentre, la Sierra Nevada et la Sierra de Ronda, ont arrêté presque brusquement les mouvements ondulatoires ou les ont déviés ; comme le fait remarquer M. Bertrand, ces amas montagneux ont surtout agi par leur masse, au moins autant

comme accidents topographiques que comme agents géologiques. Dans les terrains stratifiés, les mouvements se sont beaucoup mieux propagés dans le sens de la direction des couches que transversalement ; les failles ont également agi comme obstacles, en affaiblissant ou en déviant les secousses.

Quant à la cause même du phénomène, pour le cas particulier de l'Andalousie, le plus sage est d'avouer, avec M. Fouqué, notre complète ignorance.

II

Après Pfaff, Mallet, Abbot et Milne, MM. Fouqué et Michel-Lévy ont repris l'étude expérimentale de la vitesse de propagation des secousses dans des sols de nature différente². Quelques-unes de ces nouvelles expériences diffèrent de celles qui les ont précédées en ce qu'elles ont eu lieu en profondeur, dans des galeries de mines, au lieu de porter exclusivement sur le cheminement des vibrations à travers les parties superficielles du sol.

Les savants français se sont livrés à deux séries d'essais, 1° avec emploi des marteaux-pilons et sans étincelle, et 2° avec emploi d'explosifs et d'étincelle ; les expériences, sur les conditions desquelles le texte et plusieurs figures donnent tous les renseignements désirables, ont été faites à Meudon, au Creusot, à Montvicq près Commeny et aux mines de Saligny (Allier). L'enregistrement automatique, au moyen d'une plaque sensible entraînée dans un mouvement régulier, des déplacements d'un faisceau lumineux, réfléchi par le bain de mercure³, a permis d'arriver à une grande précision dans les résultats. Il semble en ressortir que la propagation des vibrations ne se fait pas de la même manière à la surface du sol ou en profondeur : dans le premier cas, il y a, pour un ébranlement unique, une série de maxima successifs, et le phénomène se prolonge longtemps ; dans le second cas, au contraire, il n'y a qu'un maximum observable, et les vibrations s'éteignent rapidement.

Comme on pouvait s'y attendre, les différentes formations géologiques ont donné des vitesses très variables ; voici les nombres trouvés par MM. Fouqué et Lévy :

Dans le granite.....	2450m à 3141m
Dans les grès houillers compacts.....	2000m à 2526m
Dans les grès permians moins agglutinés....	1190
Dans le marbre cambrien.....	632
Dans le sable de Fontainebleau.....	environ 300

Ces chiffres se rapprochent beaucoup de ceux

¹ Pages 57-77.

² Voir pl. XV la photographie de l'ingénieux appareil, basé sur ce principe, dont la construction est due à la maison Bréguet.

³ P. 9-55. Une carte (pl. I) résume graphiquement les principaux faits observés.

qui ont été fournis par Abbot, et s'éloignent au contraire considérablement de ceux qui sont dus aux autres observateurs. Les résultats auxquels

III

Lorsqu'il s'est agi de procéder à l'exploration géologique du pays, les membres de la Mission




Fig. 1. — Carte schématique montrant la structure de la chaîne bétique.
(Fig. 10, p. 117. *Mission d'Andalousie*. Imprimerie Nationale.)

conduit l'analyse du phénomène donnent en partie l'explication de ces différences, car ils en montrent la complexité et font voir qu'un choc unique engendre des vibrations d'inégale intensité qui se propagent dans le sol avec des vitesses différentes.

se sont séparés en trois groupes, chargés chacun de l'étude d'un territoire différent : MM. Ch. Barrois et Alb. Offret ont parcouru le Sud de l'Andalousie, de la Sierra Tejeda à la Sierra Nevada. MM. Michel-Lévy et Bergeron ont visité la cé-

lèbre Serrania de Ronda; enfin MM. Bertrand et W. Kilian se sont attachés à l'examen des terrains secondaires et tertiaires du versant septentrional de la chaîne bétique, dans les provinces de Grenade et de Malaga. Leurs rapports constituent autant de mémoires distincts, dont nous allons reproduire les conclusions principales.

Les massifs du Sud de l'Andalousie, étudiés par MM. Barrois et Offret ¹, sont formés par un fond de micaschistes primitifs avec amphibolites et de schistes cambriens, surmontés de calcaires dolomitiques rapportés par M. Barrois au Trias à cause des empreintes de bivalves, rappelant les *Megalodon*, qu'il

120°, la faille de Motril passant par la région de Zafaraya, déterminée comme épicerentre du dernier tremblement de terre, tandis que les deux autres, prolongées vers la mer, iraient respectivement aboutir au massif éruptif du cap de Gata et à l'îlot volcanique d'Alboran. Les multiples discordances de stratification et les oscillations du sol qui se répètent dans la région, depuis l'époque secondaire, montrent que cet édifice bétique est dans un état d'équilibre instable. Lorsque de nouveaux mouvements se font sentir, ils se traduisent naturellement de préférence le long des cassures précitées.

Au point de vue pétrographique, les roches sédimentaires et cristallophylliennes du Sud de l'An-




Fig. 2. Coupe de Ronda à la Méditerranée. — 1. Gneiss et dolomies. — 2. Micaschistes. — 3. Schistes Cambriens. — 4. Permien moyen. — 5. Terrain jurassique. — 6. Crétacé (Marnes néocomiennes). — 7. Terrain nummulitique. — 8. Miocène moyen (Helvétien). — 9. Dykes de Serpentine. — F. Failles. (Fig. 4., p. 192. *Mission d'Andalousie*. Imprimerie Nationale.)

y a rencontrées au barranco Arroba ². Cet ensemble est fortement plissé et découpé en une série de tronçons, correspondant à autant de sierras distinctes, par un système de failles transversales, à peu près parallèles entre elles (fig. 1); les couches ne se raccordent pas de part et d'autre de ces cassures, souvent jalonnées par des vallées et par des petits bassins tertiaires alignés en traînées discontinues; dans l'intervalle, elles subissent parfois de fortes déviations, comme entre Malaga et la Sierra Tejada.

Malgré leur importance considérable, ces accidents transversaux ne sont pas suffisants pour interrompre la continuité géographique de la chaîne qui sépare le bassin du Guadalquivir du bassin de la Méditerranée. Les trois fractures principales, dont la production serait postérieure à l'époque triasique, sont celles de Malaga, de Motril et de Guadix; elles sont orientées toutes les trois à

dalousie sont aussi intéressantes que variées (micaschistes, schistes, quartzites, amphibolites, etc.); les granulites gneissiques de la Sierra Nevada et des monts de Velez-Malaga, analogues aux gneiss rouges de Saxe — dont la nature réelle a été l'objet de si nombreuses controverses — n'ont nulle part été observées par MM. Barrois et Offret à l'état de filons transverses, susceptibles de démontrer leur origine éruptive ¹.

Dans la Serrania de Ronda ², au-dessus des gneiss et des schistes cristallins, formant une série très puissante et affleurant sur le versant méridional, (fig. 2) les terrains stratifiés sont représentés par des termes variés, allant du Permien au Pliocène; des calcaires jurassiques et des marnes néocomiennes fortement plissés constituent la masse principale du versant Nord; le Nummulitique, discordant sur les étages antérieurs, pénètre dans les cols les plus

¹ Mémoire sur la constitution géologique du Sud de l'Andalousie, de la Sierra Tejada à la Sierra Nevada (p. 79-169).

² Page 85.

¹ P. 124.

² Etude géologique de la Serrania de Ronda, par MM. Michel-Lévy et Bergeron (p. 171-375).

élevés et se retrouve en lambeaux épars jusqu'au bord même de la Méditerranée. Quant au Miocène marin de Ronda, quoique porté jusqu'à une altitude de 1200 mètres, il se montre seulement affecté de failles et n'a subi nulle part de refoulement comparable à celui dont les couches éocènes portent l'empreinte. Enfin le Pliocène, cantonné le long de la mer, ne dépasse pas aux environs de Malaga, la cote 105 mètres.

Comme particularités remarquables, il y a lieu de signaler le développement, parfois énorme, de lentilles dolomitiques au sein de la formation des gneiss, comme dans la coupe classique du Simphon. Les coupes de la Serrania de Ronda, notamment aux abords de los Llanos de Juanar, montrent

contraire, la norite, qui traverse en filons minces tous les schistes anciens, dont elle empâte des fragments anguleux, est elle-même percée par des filons de quartz et de pegmatite graphique paraissant se rattacher à la venue granulitique, bien antérieure au dépôt des formations secondaires.

Les autres roches éruptives observées sont des diorites, également antérieures aux granulites, et un groupe de roches à structure ophtitique (spilites, porphyrites et diabases) constituant tantôt des coulées minces et tantôt des mamelons arrondis au milieu de la trainée triasique qui s'étend de Gobantès à Antequera¹.

Au point de vue géologique, la région dont Gre-



Fig. 3. — Schéma indiquant la disposition des différentes assises tertiaires des deux côtés de la chaîne bétique. X. Terrains primaires et secondaires avec lambeaux nummulitiques plissés. — 1. Nummulitique. — 2. Helvétien. — 3. Tortonien (blockformation) et Sarmatique. — 4. Gypse (miocène supérieur). — 5. Calcaire lacustre (miocène supérieur). — 6. Pliocène marin. (Fig. 32, p. 507. *Mission d'Andalousie*. Imprimerie Nationale.)

avec évidence tous les passages entre les amphibolites et les pyroxénites, d'une part, et les cipolins métamorphiques, d'autre part; MM. Michel-Lévy et Bergeron ont trouvé, dans ces conditions de gisement, une intéressante association de minéraux, analogue à celle de Pargas (pargasite, humite, clino-humite, anorthite, etc.).

Depuis les travaux de M. Macpherson, on sait que la Serrania de Ronda est certainement l'une des régions du globe où les roches anciennes riches en périodot arrivent à jouer le rôle le plus considérable; MM. Michel-Lévy et Bergeron montrent que ces roches constituent dans leur ensemble une grande venue de norites, souvent riches en anorthite; la lherzolite n'en est qu'un cas particulier, et la serpentine représente un produit de décomposition de la norite. Aucun fait ne permet d'appuyer l'idée plusieurs fois émise que la serpentine de la Serrania de Ronda constituerait des enclaves stratiformes dans les terrains cristallophylliens; aucun fait, non plus, ne corrobore l'idée opposée que cette roche éruptive serait d'un âge relativement très jeune et aurait influencé et percé les terrains jurassique et crétacé du voisinage: au

nade occupe le centre (fig. 4) comprend trois éléments: 1° ausud, une chaîne schisteuse et cristalline ancienne, la *chaîne bétique* de M. Suess; 2° au nord, des chaînes calcaires plus récentes, les *chaînes sub-bétiques*; 3° entre les deux, une aire d'affaissement, de forme irrégulière, le *bassin tertiaire de Grenade*. L'important travail de MM. Bertrand et Kilian² est consacré spécialement aux deux derniers; après avoir esquissé à grands traits la constitution physique de cette partie de l'Andalousie, pittoresque entre toutes, les auteurs décrivent un à un les termes successifs de la série stratigraphique locale, en insistant sur les analogies que les couches observées offrent avec celles des contrées voisines³; une seconde partie, consacrée plus spécialement à l'examen des problèmes tectoniques, renferme la description, chaînon par chaînon, du territoire parcouru. Dans un dernier

¹. Une bibliographie raisonnée très complète est jointe au mémoire de MM. Michel-Lévy et Bergeron (p. 348-375); elle comprend l'analyse détaillée de tous les travaux publiés sur la géologie de la Serrania de Ronda, de 1841 à 1887.

². *Etudes sur les terrains secondaires et tertiaires dans les provinces de Grenade et de Malaga*, p. 337-379.

³. Voir en particulier, p. 459-468 et 514-519.

La note de M. Kilian sur le *gisement tithonique de Fuente de los Frailes près de Cabra* (province de Cordoue) ¹ intéresse directement la stratigraphie comparée de l'ensemble des contrées méditerranéennes. D'après M. Kilian, le Tithonique de l'Andalousie présente deux divisions ayant chacune une faune différente : les affinités de la division inférieure sont jurassiques tandis que celles de la division supérieure sont crétacées — exactement comme dans les Alpes françaises, le Véronais, etc.; la faune de la seconde se rapprochant beaucoup de celle des couches de Berrias, M. Kilian propose d'adjoindre ces dernières au Tithonique, dont les deux divisions contiennent d'ailleurs un trop grand nombre d'espèces communes pour pouvoir être érigées au rang d'étages distincts.

IV

La paléontologie est largement représentée dans le rapport de la Mission : M. Bergeron décrit les *fossiles pliocènes des environs de Malaga et de San Pedro de Alcantara*, en indiquant avec soin l'extension stratigraphique et géographique de toutes les espèces citées, parmi lesquelles un grand nombre sont nouvelles ². L'intérêt de cette faune réside dans le mélange d'espèces fossiles, franchement pliocènes, et d'espèces vivantes dont un certain nombre habitent aujourd'hui les parties profondes de la Méditerranée ou bien appartiennent à la faune de l'Océan Atlantique ; pour expliquer ce mélange, également réalisé au sein des dépôts observés en Sicile, à Tarente et dans le Levant, M. Bergeron est amené à penser que le courant qui vient actuellement de l'Atlantique dans la Méditerranée était beaucoup plus puissant à l'époque pliocène; il insiste à ce propos sur les modifications qu'a dû subir depuis cette époque le détroit de Gibraltar, et, d'une manière plus générale, l'ensemble du bassin méditerranéen. Enfin, dans ses *études paléontologiques sur les terrains secondaires et tertiaires de l'Andalousie* ³,

M. W. Kilian passe en revue, dans l'ordre stratigraphique, 238 espèces appartenant aux périodes triasique, jurassique et crétacée, et 109 formes miocènes ou pliocènes; une part notable de ces fossiles ont dû recevoir des noms nouveaux.

En terminant le compte rendu de cet important ouvrage, dont la valeur est d'autant plus remarquable que ses matériaux ont dû être recueillis en fort peu de temps, nous nous permettrons d'exprimer un regret : c'est de ne pas y trouver, comme couronnement des travaux de la Mission, un résumé général, dans lequel l'ensemble des observations aurait pu être discuté et coordonné, au grand avantage du lecteur. Cette remarque nous est suggérée par la divergence des vues théoriques exprimées sur un point capital — le rôle des accidents transversaux dans la structure de la chaîne bétique et lors des derniers tremblements de terre. Nous avons vu que, pour MM. Barrois et Offret, le rôle de ces accidents, dans la région cristalline, est considérable; pour MM. Bertrand et Kilian, au contraire, ce rôle est nul dans la région subbétique, qui lui succède au nord (p. 538), et cette conclusion, basée sur l'étude de terrains fossilifères faciles à suivre, ne paraît guère contestable. Or, comment admettre que, dans une même zone plissée, les chaînons intérieurs puissent être affectés de décrochements nombreux sans que les chaînons extérieurs perdent le moins du monde leur continuité?

Il y a là, nous semble-t-il, une difficulté grave; de nouvelles recherches sont encore nécessaires pour qu'il soit possible de la résoudre. Du moins les études de la Mission française, appuyées sur les travaux antérieurs des géologues espagnols et étrangers, fourniront-elles une base solide aux levés de détail, qui ne pourront d'ailleurs être entrepris avec fruit que lorsque l'Andalousie possédera de bonnes cartes topographiques.

Emm. de Margerie.

REVUE ANNUELLE D'ANALYSE

Je n'ai nullement l'intention, dans les pages qui suivent, de faire une revue des travaux mathématiques de quelque importance publiés depuis quelques années; une telle tâche est impossible à remplir ici, à cause de la diversité des

sujets et du caractère trop abstrait de quelques-uns d'entre eux. Je dois me borner à des vues générales, sans entrer dans le détail de questions plus particulières, quoique d'un très grand intérêt.

I

D'une manière générale toute la science mathématique repose sur l'idée de fonction, c'est-à-dire de dépendance entre deux ou plusieurs grandeurs, dont l'étude constitue le principal objet de

¹ P. 581-599.

² P. 250-347, pl. XXI-XXIII.

³ P. 601-639. Quatorze planches, dont l'exécution ne laisse rien à désirer, représentent les espèces les plus intéressantes et notamment des céphalopodes tithoniques dans un très bel état de conservation, provenant de Cabra.

l'Analyse. Mais cette idée de fonction est bien vague par elle-même; c'est peu à peu seulement que les analystes se sont rendu compte de son étendue, et nos idées à ce sujet sont certes aujourd'hui bien différentes de celles de Lagrange, à l'époque où ce grand géomètre écrivait son traité sur le Calcul des fonctions. On sait, par exemple, aujourd'hui qu'une fonction continue n'a pas nécessairement une dérivée, qu'il existe des fonctions continues ayant dans tout intervalle une infinité de maxima et minima. Il est donc nécessaire, si l'on veut sortir des généralités, d'étudier des classes de fonctions que distinguent quelques caractères spéciaux.

D'un intérêt tout particulier, sont les fonctions qu'on appelle maintenant fonctions analytiques, dont la théorie a été créée par Cauchy, et qui ont fait, depuis vingt ans, l'objet d'innombrables travaux. Leur étude revient à celle des fonctions u de deux variables x et y satisfaisant à l'équation :

$$(1) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Les fonctions satisfaisant à cette équation peuvent s'associer deux à deux, de telle sorte que u et v désignant deux fonctions associées, $u + iv$ soit une fonction *analytique* de la variable complexe $z = x + iy$, c'est-à-dire une fonction de z ayant en chaque point une dérivée unique. L'équation (1) à laquelle on est ainsi conduit, en se plaçant à un point de vue purement abstrait, se rencontre dans plusieurs questions de physique mathématique. Dans la théorie de la chaleur, l'équation précédente régit les variations de la température u des points d'un plan, quand l'équilibre calorifique est établi. Dans le mouvement permanent des fluides sur un plan, quand il existe un potentiel u de vitesse, elle est vérifiée par ce potentiel de vitesse; les lignes $v = \text{constante}$, orthogonales aux lignes d'égal potentiel, sont les lignes de courant. On peut voir de nombreux exemples de tels mouvements dans les admirables leçons de Kirchhoff sur la physique mathématique. Nous rencontrons encore l'équation (1) dans le mouvement permanent de l'électricité sur une plaque conductrice; u désigne la tension électrique, et, ici, comme plus haut pour la chaleur, l'équation exprime que l'électricité ne s'accumule pas dans un élément pris arbitrairement sur la plaque. Prenons deux exemples simples; soit :

$$u + iv = \log \frac{z - a}{z - b} \quad \text{et} \quad z = x + iy$$

les lignes des courants sont des cercles passant par les points a et b ; le courant entre sur la plaque par

un des points et sort par l'autre. Si au contraire nous posons :

$$u + iv = i \log \frac{z - a}{z - b}$$

les lignes de courant sont des cercles par rapport auxquels les points a et b sont conjugués; on peut concevoir la réalisation expérimentale d'un tel état, en joignant sur la plaque les points a et b par une courbe qui serait le siège d'une force électromotrice constante. Nous verrons tout à l'heure une curieuse application de cette remarque.

Parmi tous les problèmes relatifs à l'équation (1), où à l'équation analogue avec trois termes, il en est un particulièrement célèbre connu sous le nom de principe de Dirichlet. Une intégrale de cette équation, continue ainsi que ses dérivées à l'intérieur d'un contour, est complètement déterminée quand on donne sa valeur le long de ce contour; ce sera la valeur sur une surface fermée, s'il s'agit de l'équation à trois termes. La démonstration, pourtant si féconde, que Riemann donne du principe de Dirichlet est sujette à de graves objections, et de nombreuses recherches ont été faites pour arriver à une démonstration rigoureuse. Il convient de mentionner surtout M. Neumann et M. Schwarz. Les beaux travaux de M. Schwarz sur cette question se trouvaient épars dans de nombreux recueils; les géomètres seront heureux maintenant de les trouver rassemblés dans les deux volumes¹ où l'éminent professeur de Göttingen vient de réunir ses œuvres. Je tiens à citer particulièrement la méthode à laquelle M. Schwarz donne le nom de procédé alterné; elle a pour objet de démontrer que, si l'on sait résoudre le problème de Dirichlet, pour deux contours ayant une partie commune, on saura le résoudre pour le contour limitant extérieurement l'ensemble des deux aires. Elle me paraît d'un grand intérêt, et avec des modifications convenables, elle peut être employée dans l'étude d'un grand nombre d'autres équations aux dérivées partielles. Le problème de Dirichlet se pose dans plusieurs questions de physique; contentons-nous de rappeler qu'on y est amené quand on veut avoir la température des points d'un corps, l'équilibre calorifique étant établi et la température étant donnée à la surface.

Nous avons jusqu'ici considéré le plan où se meut le point (x, y) comme un plan simple. Une notion plus générale joue, dans l'analyse moderne, un rôle essentiel, je veux parler du plan multiple, c'est-à-dire du plan recouvert de feuillets infiniment rapprochés soudés les uns aux autres le long de

¹ *Gesammelte Mathematische Abhandlungen* von H. A. SCHWARZ Berlin, 1890.

certaines lignes; on donne à l'ensemble de ces feuillets le nom de surface de Riemann. On remplace quelquefois aujourd'hui cette notion par une autre, identique au fond, mais peut-être plus facile à saisir. Considérons dans l'espace une surface fermée, c'est-à-dire n'étant limitée par aucune ligne et contenant un certain nombre p de trous; la surface du tore offre un exemple correspondant à $p = 1$, et une surface convexe que l'on munirait de p anses nous donne une représentation générale d'une telle surface. On peut, sur celle-ci, tracer $2p$ circuits qui ne soient pas susceptibles de se réduire les uns aux autres ou à un point par une déformation continue. On prendra, par exemple, un circuit autour de chaque trou, et un à travers chaque trou; on aura ainsi dans le tore un parallèle et un méridien. Ceci posé, l'équation (1) considérée plus haut correspondait au plan simple; à la surface actuelle on peut faire correspondre une équation analogue. Cette belle extension a été faite par M. Beltrami; l'interprétation hydrodynamique ou électrique est manifestement la même que dans le cas du plan. Dans un ouvrage récent¹, M. Félix Klein a insisté sur cette interprétation et démontré, en quelque sorte physiquement, les principales propriétés des intégrales abéliennes. Supposons, en effet, que notre surface soit conductrice et que les $2p$ circuits fermés indépendants, dont il a été question tout à l'heure, soient le siège d'une force électromotrice constante. Un régime de courants s'établira sur la surface, et le potentiel correspondant sera partout fini, avec une infinité de déterminations, car il augmente d'une quantité proportionnelle à la force électromotrice à chaque passage à travers une coupure. Il y aura $2p$ potentiels de cette nature linéairement indépendants; on peut les associer deux à deux en unissant à chaque potentiel les lignes de courant correspondantes. Si u et v désignent deux fonctions associées, les p combinaisons $u + iv$ correspondent aux intégrales de première espèce, attachées à la surface de Riemann dont nous sommes parti. Ce genre de considération n'est pas sans doute entièrement satisfaisant au point de vue de la rigueur; il n'en présente pas moins un grand intérêt, comme donnant une forme concrète à des spéculations abstraites sur les fonctions algébriques, et montrant le lien étroit qui unit quelquefois des ordres d'idées en apparence bien différents.

Revenons maintenant à la théorie proprement dite des fonctions analytiques d'une variable complexe. Elle a été, dans ces dernières années, une des branches les plus cultivées de l'Analyse mathé-

matique. L'emploi de théorèmes généraux, permettant souvent d'éviter de longs calculs et de donner des démonstrations en quelque sorte synthétiques satisfait pleinement l'esprit et explique bien l'attrait que ces recherches ont exercé sur beaucoup de géomètres de notre temps. N'oublions pas d'ailleurs que les travaux de Liouville et de M. Hermite sur les fonctions doublement périodiques avaient, il y a plus de quarante ans, donné un mémorable exemple de la fécondité des principes de Cauchy. La publication en 1876 d'un mémoire de M. Weierstrass sur les fonctions uniformes fut un événement pour les analystes. La découverte capitale de l'illustre auteur consiste à avoir étendu aux fonctions transcendentes la décomposition en facteurs trouvée pour les polynômes dès les débuts de l'algèbre. Je ne puis m'étendre sur toutes les recherches provoquées par ce travail; rappelons au moins les beaux mémoires de MM. Mittag-Leffler, Appell et Goursat. Le développement des théories générales permet d'approfondir l'étude de fonctions spéciales; parmi celles-ci, il n'en est pas qui excitèrent plus dans ces dernières années l'intérêt des géomètres que ces fonctions désignées sous le nom de *fonctions fuchsienues* par M. Poincaré à qui on en doit la découverte. Ce fut une généralisation bien remarquable des fonctions modulaires étudiées par M. Hermite dans la théorie des fonctions elliptiques, et possédant un nombre infini de points singuliers distribués le long d'un cercle. À l'aide des fonctions fuchsienues, on peut représenter les coordonnées d'un point arbitraire d'une courbe algébrique quelconque par des fonctions uniformes d'un paramètre; ce résultat si profond montre assez l'intérêt des nouvelles fonctions.

J'ai dit plus haut la perfection à laquelle était arrivée la théorie générale des fonctions analytiques d'une variable. Il s'en faut qu'il en soit de même quand on passe aux fonctions de plusieurs variables; ici les difficultés restent considérables. Un des résultats les plus saillants obtenus dans ces derniers temps est l'extension aux intégrales doubles du théorème fondamental de Cauchy relatif aux intégrales simples prises le long d'un contour fermé; elle a été faite par M. Poincaré. L'avenir montrera sans doute l'importance de cette extension. J'ai de mon côté cherché à approfondir la théorie des fonctions algébriques de deux variables; cette étude fait bien voir les différences profondes qui existent entre ce cas et celui d'une seule variable et combien l'analogie, qui si souvent est un guide excellent, peut devenir trompeuse. Au surplus, il apparaît bien a priori que la théorie d'une fonction analytique de deux variables complexes est de toute autre nature que celle d'une

¹ Über Riemann's Theorie der algebraischen Functionen und ihrer Integrale, eine Ergänzung der gewöhnlichen Darstellungen. Leipzig, 1882.

fonction d'une variable, Bornons-nous à la partie réelle de la fonction; nous aurons dans le second cas une fonction de deux variables réelles uniquement assujettie à vérifier l'équation (I) précédemment écrite; dans le premier cas, il s'agira d'une fonction de quatre variables réelles devant satisfaire à quatre équations aux dérivées partielles faciles à former. Il est clair que, dans ces conditions, le développement des deux théories ne peut être parallèle, et c'est ainsi, pour ne citer qu'un simple mais bien mémorable exemple, que les quatre paires de périodes d'une fonction analytique uniforme quadruplement périodique ne peuvent être arbitraires.

II

Il n'est pas de question plus intéressante pour les applications que l'étude des équations différentielles; c'est véritablement l'objet du calcul intégral. Le développement de la théorie des fonctions analytiques a eu là une très heureuse influence. Les théorèmes généraux relatifs à l'existence des intégrales et aux conditions qui les définissent sont maintenant devenus classiques. En ce qui concerne les équations différentielles à une seule variable, c'est surtout dans la théorie des équations linéaires qu'ont été réalisés de très grands progrès. On ferait une bibliothèque avec les mémoires publiés depuis vingt ans sur ce genre d'équations, dont diverses classes ont été intégrées à l'aide de transcendentes simples, et un résultat très général a été obtenu par M. Poincaré qui a montré qu'avec des transcendentes analogues aux fonctions fuchsienues on pouvait intégrer une classe extrêmement étendue d'équations linéaires à coefficients algébriques. Plusieurs questions d'algèbre et de géométrie d'un grand intérêt sont aussi intimement liées à la théorie des équations linéaires, en particulier l'étude des groupes d'ordre fini qui a fait l'objet d'un des plus beaux mémoires de M. Jordan.

Les progrès ont été moindres dans la théorie des équations non linéaires. L'ignorance où l'on se trouve généralement de la façon dont les constantes arbitraires figurent dans l'intégrale générale rend très difficile l'étude de celle-ci. Un cas semble particulièrement simple; c'est celui où cette intégrale est une fonction uniforme de la variable. Sauf pour les équations du premier ordre, on ne peut malheureusement reconnaître s'il en est ainsi; des conditions nécessaires, de nature algébrique, sont faciles à trouver, mais il faudrait, en général, adjoindre à celles-ci des conditions de nature transcendante qu'il paraît bien difficile de former. Les cas où les premières conditions sont suffisantes n'en sont que plus intéressants; on en trouve un exemple remarquable dans

le beau mémoire de Mme Kowaleski; relatif au mouvement d'un corps solide pesant autour d'un point fixe, que l'Académie des Sciences a couronné il y a deux ans. Mme Kowaleski cherche dans quels cas les neuf cosinus qui fixent la position des axes principaux de l'ellipsoïde d'inertie du corps relatif au point fixe sont, quelles que soient les données initiales, des fonctions uniformes du temps. Le cas, traité par Lagrange, du mouvement d'un corps pesant de révolution suspendu par un point de son axe, offre un exemple d'une telle circonstance; les transcendentes de la théorie des fonctions elliptiques permettent alors de résoudre le problème. Mme Kowaleski a montré qu'il existe un autre cas et un seul: c'est celui où, désignant par A , B , C , les axes principaux de l'ellipsoïde d'inertie, on a $A = B = 2C$ et où le centre de gravité du corps se trouve dans l'équateur de l'ellipsoïde. Ici c'est à l'aide des transcendentes de la théorie des fonctions abéliennes que s'effectue l'intégration complète.

L'étude des équations aux dérivées partielles est la plus difficile de l'Analyse; la géométrie infinitésimale et la physique mathématique sont grandement intéressées à ses progrès. Les équations du premier ordre ont fait l'objet d'immenses travaux, et cette théorie est une des plus parfaites du calcul intégral; cette perfection toutefois est, peut-être, plus dans la forme que dans le fond, car les théorèmes si beaux et quelquefois si profonds de la théorie ont généralement pour objet de ramener un problème non résolu à un autre qui ne l'est pas davantage. Ces transformations n'en ont pas moins un très grand intérêt, et, en particulier, les dernières recherches de M. Lie sur ce sujet, sorte de synthèse des méthodes antérieures, méritent de devenir classiques. Pour le cas du second ordre, la réduction de l'intégration de l'équation à l'intégration d'un système d'équations différentielles ordinaires n'a pas jusqu'ici été effectuée, et ne le sera sans doute pas de longtemps. Dans cet ordre d'idées, une intéressante addition aux mémoires célèbres de Monge et d'Ampère a été faite en 1870 par M. Darboux. On peut se placer, dans la théorie des équations aux dérivées partielles, à un tout autre point de vue et chercher, non l'intégrale générale, mais une intégrale déterminée par certaines conditions aux limites. Ce second problème intéresse particulièrement la physique mathématique; il est distinct du premier, et, le plus souvent même, la connaissance de l'intégrale générale avec des fonctions arbitraires n'est d'aucun secours pour sa solution. Les conditions aux limites peuvent être extrêmement variées. Ainsi, pour les équations du second ordre à deux variables, une intégrale supposée continue sera,

comme je l'ai montré, déterminée dans des cas très nombreux par la valeur qu'elle prend le long d'un contour fermé; dans d'autres cas, on devra se donner le long d'une courbe la valeur de l'intégrale et d'une de ses dérivées du premier ordre, et les quelques pages consacrées incidemment à ce sujet par Riemann, quand l'équation est linéaire, ne sont pas une des moins belles productions de l'illustre analyste. Prenons un exemple plus spécial dans la théorie analytique de la chaleur de Fourier; ce grand ouvrage, plus admiré que lu, pourra maintenant être aisément étudié grâce à M. Darboux qui vient d'en publier une nouvelle édition, et l'a enrichie de notes précieuses commentant la pensée de l'auteur dans les endroits difficiles ou obscurs. Le problème du refroidissement d'un solide rayonnant revient, d'après Fourier, à déterminer une fonction $V(x, y, z, t)$ satisfaisant à l'équation

$$\frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \right);$$

pour tous les points du corps V doit se réduire, pour $t=0$, à une fonction donnée de x, y, z ; de plus à la surface du corps on doit avoir, pour toute valeur du temps: $\frac{dV}{dn} + hV = 0$, h étant une constante dépendant du pouvoir émissif. Quoique le problème soit posé depuis longtemps et que la voie ouverte par Fourier pour sa solution semble bien féconde, on peut dire que le problème n'est pas encore résolu d'une manière rigoureuse. M. Poincaré, reprenant récemment la question, a montré combien la convergence des séries employées était probable; mais de nouvelles recherches sont encore nécessaires. Il en est d'ailleurs de même, il faut bien l'avouer, pour plusieurs développements usités en physique mathématique; on se prend parfois à douter que la solution dite *simple* soit, au moins au point de vue mathématique, le véritable élément pour la solution complète de plus d'un problème. Quoi qu'il en soit, c'est dans la recherche des intégrales avec des conditions aux limites que doivent surtout porter, je crois, les efforts des géomètres qui s'occupent des équations aux dérivées partielles.

Toutes les parties des mathématiques sont étroitement liées les unes aux autres, et des notions d'abord restreintes à un domaine spécial sont susceptibles de prendre une extension inattendue. Telle est la notion de *groupe*. Depuis Galois la théorie des groupes de substitutions joue en algèbre un rôle capital; une théorie analytique, présentant avec celle-ci une grande analogie, vient d'être développée par M. Sophus Lie dans deux

volumes¹ qui compteront parmi les travaux mathématiques les plus importants de notre temps. M. Lie étudie les *groupes de transformations*; soient

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n, a_1, a_2, \dots, a_r) \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

n relations, dépendant de r arbitraires a , établissant une transformation entre les variables x et x' . Ces relations définissent un groupe, si deux transformations de cette forme effectuées successivement donnent une transformation rentrant dans le même type. M. Lie a fait la découverte capitale que la recherche de tous ces groupes, pour un nombre donné de variables et de paramètres, se ramène à l'intégration d'équations différentielles ordinaires. Indiquons quelques résultats particuliers bien curieux. Quand il n'y a qu'une seule variable ($n=1$) le groupe peut, par un choix convenable de cette variable, être ramené au groupe linéaire et contient donc au plus trois paramètres. Dans le cas de deux variables, le groupe ne pourra pas contenir plus de huit paramètres, s'il n'existe pas de famille de courbes, $\varphi(x, y) = \text{const.}$, que ce groupe transforme en elle-même. La théorie de M. Lie est d'une grande importance pour le calcul intégral; elle ne se borne pas d'ailleurs aux transformations de points, mais s'occupe aussi des transformations de contact si intéressantes dans l'analyse des équations aux dérivées partielles. L'émminent géomètre norvégien a aussi abordé l'étude des groupes continus d'ordre infini et exposé les principes généraux de la recherche des invariants des équations différentielles. L'étude détaillée de ces invariants a été faite, il y a quelques années, par Halphen pour les équations linéaires; tout récemment, M. Appell s'est occupé des invariants des équations du premier ordre et du premier degré, et M. R. Liouville de ceux d'une classe d'équations du second ordre.

III

La théorie des groupes m'amène à parler des hypothèses sur lesquelles repose la géométrie. Celles-ci ont fait dans notre siècle l'objet de profondes recherches; ce ne serait pas ici le lieu d'en faire l'historique complet. Je veux cependant m'arrêter un moment sur ce sujet d'un si grand intérêt philosophique. Le mémoire de Riemann (*Über die Hypothesen welche der Geometrie zu grunde liegen*, Œuvres complètes) est fondamental. Le grand géomètre cherche à fixer la notion d'une multiplicité ou d'un espace à n dimensions; d'après lui, son vrai caractère consiste en cette propriété que la détermination de position dans cet espace peut

¹ *Theorie der Transformationsgruppen*, von Sophus Lie. Leipzig, 1888 et 1890.

tre ramenée à n déterminations de grandeurs, c'est-à-dire que la position d'un point se trouve représentée au moyen de n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$. Nous devons alors étudier les mesures dont est susceptible un tel espace. Il est d'abord nécessaire d'établir une expression mathématique pour la longueur d'une ligne. D'Alembert dit quelque part que la définition et les propriétés de la ligne droite sont l'écueil et, pour ainsi dire, le scandale des éléments de la géométrie; au point de vue où se place Riemann, il n'y a plus de scandale et nous voyons nettement ce qu'il y a d'arbitraire dans la définition de la longueur. Partageant la ligne en éléments, on ramène le problème à établir pour chaque point une expression générale pour l'élément linéaire ds , qui contiendra alors les quantités $x_1, x_2, \dots, x_n$ et les accroissements $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$. Cette expression sera une fonction homogène des quantités dx et du premier degré, dans laquelle les constantes seront des fonctions continues des x . Riemann se borne à examiner le cas le plus simple où ds est la racine carrée d'une forme quadratique en dx toujours positive, dans laquelle les coefficients sont des fonctions continues des x . Rien n'empêcherait de faire des hypothèses plus générales, de supposer par exemple que ds est la racine quatrième d'une forme biquadratique; l'étude de ces cas n'exigerait pas de principes nouveaux, mais ne nous apprendrait rien de plus sur la théorie de l'espace. Partons donc de ds^2 représenté par une forme quadratique; celle-ci étant donnée, les lignes géodésiques de l'espace seront immédiatement définies par leurs équations différentielles. Remarquons maintenant que la forme quadratique renferme $\frac{n(n+1)}{2}$ coefficients,

fonctions arbitraires des x ; en changeant les variables, on peut donner à n de ces coefficients telles valeurs que l'on veut; les $\frac{n(n-1)}{2}$ autres sont alors déterminés. Il y a donc en chaque point de notre espace $\frac{n(n-1)}{2}$ fonctions invariantes qui sont caractéristiques de cet espace. Prenons alors trois points très rapprochés, et joignons deux d'entre eux B et C par une géodésique L, puis considérons l'ensemble des géodésiques joignant le premier point A à tous les points de L; l'ensemble de ces lignes formera une surface à deux dimensions. Cette surface a au point A une certaine courbure (au sens de Gauss); ce sera la courbure de l'espace en A dans la direction de l'élément de surface que nous avons construit. Si l'on connaît la courbure de l'espace correspondant à $\frac{n(n-1)}{2}$ directions arbitraires d'éléments de

surface, on la connaîtra dans toute autre direction. Cette courbure sera, en général, variable avec la direction de surface que l'on envisage. Un cas remarquable est celui dans lequel la courbure est en chaque point la même dans toute direction, et ne varie pas d'un point à l'autre; on dit alors que l'espace est à courbure constante. Un caractère fondamental des espaces à courbure constante est qu'on peut dans ces espaces déplacer une figure sans altérer ses longueurs et procéder, dans les démonstrations, par superposition des figures. Mais il y a ici une distinction importante à faire: la courbure peut être positive ou négative. A l'hypothèse que l'espace a une courbure constante négative s'attache un intérêt historique considérable. Car c'est à cette hypothèse qu'on fut conduit d'abord pour le cas de deux dimensions, non pas en suivant la voie de Riemann, mais d'une manière plus élémentaire. Lobatschewsky chercha le premier (en exceptant les travaux inédits de Gauss) à édifier une géométrie sans faire usage du célèbre axiome d'Euclide. Laisant de côté cet axiome, Legendre avait montré que la somme des angles d'un triangle ne peut dépasser deux droits; mais sa démonstration, il ne faut pas l'oublier, suppose que l'espace est infini. Partant de la même idée, Lobatschewsky réussit à construire une géométrie, qui n'est autre que celle de l'espace à courbure constante négative, dans laquelle la somme des angles d'un triangle est moindre que deux angles droits. M. Beltrami donna plus tard de cette géométrie, souvent appelée non euclidienne, une représentation remarquable en montrant que la géométrie plane du géomètre russe est identique à la géométrie sur les surfaces à courbure constante négative. Dans l'hypothèse où la courbure constante est positive, cas auquel Riemann s'est attaché de préférence, des circonstances toutes différentes se présentent. Ici l'espace n'est plus infini, c'est-à-dire que les distances sur une géodésique sont finies, et la somme des angles d'un triangle dépasse deux droits. Entre la géométrie de Lobatschewsky et celle de Riemann se trouve notre géométrie ordinaire ou euclidienne, qui correspond aux espaces dans lesquels la courbure constante est nulle.

Nous avons dit plus haut que, dans les espaces à courbure constante, on pouvait déplacer une figure sans altérer ses longueurs. C'est en étudiant ces déplacements, qui pour l'espace à trois dimensions dépendent de six paramètres, qu'on peut envisager à un nouveau point de vue les hypothèses fondamentales de la géométrie. M. Helmholtz a appelé autrefois l'attention sur cette question qui se rattache aux théories de M. Lie. Ces déplacements forment en effet nécessairement un

groupe au sens du savant norvégien. M. Poincaré, dans quelques pages remarquables, vient d'approfondir la question pour le cas du plan. Il suppose d'abord qu'il existe un groupe de mouvements à trois paramètres et fait en outre l'hypothèse qu'une figure reste immobile quand deux de ses points restent immobiles. Dans ces conditions, on obtient les géométries des espaces à courbure constante positive ou négative, dont nous avons parlé plus haut, avec la géométrie euclidienne comme cas intermédiaire, et en outre une autre géométrie non encore signalée. M. Poincaré donne de ces géométries une interprétation élégante en les rapportant aux diverses surfaces du second degré. La dernière, qui se rapporte à l'hyperboloïde à une nappe, étonne au premier abord. En fait, si l'on revient à l'élément linéaire de Riemann, il me semble qu'elle correspond simplement au ds^2 des espaces à courbure constante, mais avec une forme quadratique qui n'a pas un signe invariable. C'est ainsi qu'il arrive dans ce cas que la distance de deux points peut être nulle, sans que ces deux points coïncident. L'étude d'une géométrie au point de vue qui nous occupe maintenant est donc l'étude d'un groupe de mouvement; comme conséquence de l'existence initiale d'un tel groupe, on ne doit alors prendre pour le carré de l'élément linéaire que des formes quadratiques invariantes pour les transformations d'un groupe convenable. Cette étude mériterait d'être faite d'une manière complète pour le cas de trois dimensions.

IV

Entre les considérations précédentes et la géométrie infinitésimale des surfaces, la transition est immédiate. L'expression du carré de l'élément linéaire y joue un rôle essentiel, et les vues de Riemann que nous venons d'indiquer ne sont qu'une extension des idées de Gauss relatives à la courbure des surfaces. M. Darboux vient de publier les leçons qu'il a consacrées à cette théorie. C'est un véritable monument élevé à la théorie des surfaces et à l'analyse des équations aux dérivées partielles. La première partie du troisième volume vient de paraître¹. Les chapitres relatifs aux surfaces applicables seront particulièrement remarquables. On dit, comme on sait, depuis Gauss, que deux surfaces sont *applicables* l'une sur l'autre, quand on peut établir entre les points des deux surfaces une correspondance telle que deux arcs correspondants quelconques aient même longueur. M. Darboux, après Liouville et M. Bonnet, reprend le problème de reconnaître si deux surfaces données sont applicables

l'une sur l'autre. En général, quand l'application est possible, elle est déterminée, c'est-à-dire ne dépend pas de paramètres arbitraires. Il n'y a d'exception que pour les surfaces à courbure constante et les surfaces applicables sur les surfaces de révolution. Signalons encore ce beau problème posé et résolu par M. Darboux : une surface étant donnée ainsi qu'une courbe tracée sur elle, peut-on déformer la surface de manière que la courbe vienne coïncider avec une courbe donnée dans l'espace? Le problème est toujours déterminé, quand la courbure en chaque point de la seconde courbe n'est pas égale à la courbure géodésique (sur la surface) de la première au point correspondant, résultat remarquable qui se rattache aux parties les plus élevées de la théorie des équations aux dérivées partielles du second ordre.

Parmi les surfaces jouissant de quelques propriétés spéciales relatives à la courbure, les surfaces à courbures constante et les surfaces minima ont fait l'objet de travaux extrêmement nombreux. On ne sait pas encore trouver aujourd'hui toutes les surfaces à courbure constante, mais les recherches de MM. Lie, Bianchi et Darboux ont appris à en trouver un très grand nombre. L'intégration de l'équation des surfaces minima, c'est-à-dire des surfaces pour lesquelles les rayons de courbure sont en chaque point égaux et de signes contraires, a été effectuée il y a longtemps. Assez récemment, les travaux de Weierstrass, Lie et Schwarz ont donné une nouvelle impulsion à l'étude de ces surfaces. Toutefois le problème initial de cette théorie est loin d'être complètement résolu. Prenant dans l'espace une courbe fermée, Lagrange s'est demandé quelle est la surface passant par cette courbe et sur laquelle l'aire limitée par cette courbe est minima : il a montré que cette surface devait avoir en chaque point ses rayons de courbure égaux et de signes contraires. La recherche effective des surfaces minima passant par un contour fermé donné n'a encore été faite que dans des cas particuliers qui ont été magistralement exposés par M. Darboux dans le premier volume de l'ouvrage cité plus haut. La solution expérimentale du problème est facile. Il suffit, comme l'a fait Plateau, de plonger le contour dans un liquide glycérique; quand on sort ce cadre du liquide, une lame mince reste adhérente : c'est une surface minima.

Je termine ici cette rapide revue; si incomplète qu'elle soit, elle suffira, j'espère, à montrer quelle est l'activité de la pensée mathématique. Je voudrais aussi avoir réussi à montrer, sous la variété des sujets, l'unité de cet ensemble que l'on appelle les sciences mathématiques.

Em. Picard,

de l'Académie des Sciences.

¹ G. Darboux. *Leçons sur la théorie générale des surfaces*. Troisième partie, premier fascicule, 1890.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Andrade (J.). — Sur le mouvement d'un corps soumis à l'attraction newtonienne de deux corps fixes, et sur l'extension d'une propriété des mouvements képlériens. *Thèse de doctorat de la Faculté des Sciences de Paris, Gauthier-Villars, Paris, 1890.*

Le problème du mouvement d'un point attiré par deux centres fixes en raison inverse du carré de la distance fut, pour la première fois, ramené aux quadratures par Euler, dans le cas du mouvement plan. Lagrange donna ensuite la solution générale qui fut rattachée par Jacobi à d'autres méthodes d'intégration. Les quadratures elliptiques qui figurent dans les intégrales fournirent à Legendre un exemple important pour l'application de sa théorie des intégrales elliptiques. Depuis, plusieurs thèses ont été consacrées à ce même problème, celles de Serret, de Desboves et, en Allemagne, celle de Königsberger intitulée : *De motu puncti versus duo fixa centra attracti* (Berolini 1860), qui contient la réduction des intégrales elliptiques aux fonctions thêta.

Dans ces différents travaux, le problème est surtout envisagé au point de vue de l'intégration. Mais pourrait-il en être autrement ? La fixité des deux centres, qui permet de trouver toutes les intégrales du problème, ne lui enlève-t-elle pas toute chance d'une application, même lointaine, au système du monde ? Telle semblerait être l'opinion de Lagrange, dans un passage de la mécanique analytique cité dans la thèse dont nous allons nous occuper. On peut observer toutefois que Lagrange a varié d'opinion à cet égard, car à la fin d'un mémoire de Turin, il dit qu'il ne serait pas impossible que ce problème pût donner quelque indication profitable à la théorie du système du monde. Quoi qu'il en soit, l'étude récente de M. Andrade nous paraît, dans certaines de ses parties, un effort pour comparer ce problème au véritable problème des trois corps.

M. Andrade reprend le problème d'inversion déjà résolu par M. Königsberger en se servant des notations nouvelles introduites par M. Weierstrass telles qu'elles sont exposées dans le *Traité des fonctions elliptiques* d'Halphen. Il exprime les coordonnées du mobile et le temps en fonction d'un paramètre auxiliaire, en introduisant des fonctions elliptiques avec deux modules généralement inégaux.

Comme application de ses formules, M. Andrade se propose de déterminer des cas dans lesquels la trajectoire relative, dans le plan du mobile et des deux centres fixes, est fermée et de plus algébrique ; il étudie complètement les cas, les plus simples de tous, où les deux intégrales elliptiques ont le même module, en montrant que, si une certaine constante dépendant des conditions initiales est commensurable, la trajectoire relative est fermée et algébrique. Puis il remarque que la question de trouver toutes les trajectoires relatives algébriques est identique au problème de la transformation des intégrales elliptiques. Il est regrettable que l'auteur se soit borné à cette remarque fort intéressante et ne soit entré dans le détail d'aucun cas particulier. Pour terminer les applications des formules de l'inversion, M. Andrade indique des conditions initiales dans lesquelles le mobile peut être regardé comme satellite de l'un des centres fixes ; lorsque le mouvement se fait dans un plan fixe contenant les deux centres attractifs, il déduit de ses formules les conséquences curieuses que voici :

Quand le rapport de deux certaines intégrales définies est incommensurable, le rayon vecteur qui va du satellite à la masse fixe voisine, ne tourne pas toujours dans le même sens, et le satellite finit par passer aussi près qu'on le veut de cette masse fixe, de telle manière qu'un choc se produira nécessairement si l'on restitue aux masses leurs dimensions. Ces circonstances si différentes de celles que nous offrent les mouvements des planètes font soupçonner l'importance, pour la stabilité du système du monde, de la liberté complète de ses différentes parties. C'est dans ces considérations, trop peu développées à notre sens, que se trouve pour nous le principal intérêt du travail de M. Andrade.

À côté de ces résultats déduits des formules de l'inversion, l'auteur développe quelques remarques qui reposent uniquement sur les formules de quadrature. Il indique les conditions initiales pour lesquelles le mobile reste sur un ellipsoïde ou un hyperboloïde de révolution ayant pour foyers les deux centres fixes, conditions qui se déduisent facilement d'un théorème de M. Bonnet. Il montre que le signe de la constante des forces vives permet, comme pour un seul centre fixe, de reconnaître si le mobile reste dans une région limitée de l'espace, ou s'éloigne à l'infini. Si l'on essaie d'étendre ce résultat au cas de n centres fixes en ligne droite, on y arrive, comme le montre M. Andrade, lorsque la constante des forces vives est négative, mais non lorsqu'elle est positive. Dans ce dernier cas on peut assigner une limite inférieure et permanente à l'oscillation du mobile projetée sur l'axe des n centres fixes.

P. APPELL.

2^o Sciences physiques.

Preston (Thomas) *Professeur de mathématiques et de physique mathématique à « University College » Dublin.* — *The Theory of Light.* Macmillan & Co, Londres, 1890.

L'ouvrage de M. Preston est un livre d'enseignement dans lequel il s'est efforcé de condenser en 460 pages tout ce qu'un étudiant doit savoir sur les phénomènes lumineux pour être en état d'aborder avec fruit la lecture des mémoires originaux et d'entreprendre des recherches personnelles. Toutes les questions sont abordées, comme on pourra en juger par le résumé de la table des matières, mais pour toutes l'auteur a su éviter le plus grand écueil : il a su se borner. Voulant faire connaître non pas l'histoire de la science et de la lente formation des idées, mais son état actuel, avec les difficultés que laissent subsister ou même soulèvent les travaux les plus récents et les vues nouvelles qu'ils découvrent, il a eu souvent le courage de passer sous silence ou de signaler en quelques lignes tous les travaux de perfectionnement et de mesures, qui, nécessaires au progrès de la science par leurs résultats, n'ont que peu ou point étendu l'horizon. Naturellement, il est plus particulièrement au courant des travaux de langue anglaise, qui sont nombreux depuis quelques années et importants, et c'est peut-être ce qui peut le rendre plus utile au lecteur français ; il est d'ailleurs assez sobre de notes bibliographiques, ne mêlant que celles qui sont essentielles ; pour l'étudiant anglais curieux de détails, un renvoi suffit à l'excellent rapport de M. Glazebrook à l'Association Britannique sur le progrès de l'Optique (1885). Deux noms reviennent sans cesse : Newton, Fresnel. De Newton l'auteur a fort à propos fait l'assez nombreuses citations textuelles ; il me semble qu'il aurait pu faire utilement de même quelques citations de Fresnel et d'Huygens. Les théories

sont toujours présentées sous leur forme la plus simple ou la plus saisissante, non sans caractériser d'un mot généralement juste celles dont l'exposé est laissé de côté; peut-être l'importance des travaux de Green, de Stokes, de Lord Rayleigh, de sir W. Thomson, pour ne citer que les Anglais, n'est elle pas assez mise en évidence. Ainsi après avoir décrit les expériences de Morley et Michelson (1887) desquelles il résulte que près du sol l'éther accompagne, ou à fort peu près, la Terre dans son mouvement autour du soleil, je ne trouve pas l'indication que c'est précisément l'hypothèse émise par Stokes en 1845 pour expliquer que l'aberration astronomique est indépendante de la nature de la substance qui remplit la lunette d'observation.

I. Introduction. Histoire ancienne. Découverte de la vitesse de la lumière et développement de la théorie de l'Emission. Introduction à la théorie des Ondulations. — II. Propagation des ondes et composition des vibrations. — III. Propagation rectiligne. — IV. Réflexion. — V. Réfraction (géométriques). — VI. Détermination des indices. — VII. Franges d'interférences. — VIII. Interférences des lames isotropes. Lames minces. Anneaux de Newton. Lames épaisses. — IX. Diffraction; théorie élémentaire. Réseaux. Méthodes graphiques de solution. — X. Polarisation. — XI. Double réfraction dans les cristaux uniaxes. — XII. Double réfraction; théorie de Fresnel. — XIII. Réflexion et Réfraction de la lumière polarisée (les deux théories). — XIV. Réflexion métallique. — XV. Couleurs des lames minces cristallines. Lumière polarisée: rectiligne, parallèle, convergente. Lumière polarisée, circulaire et elliptique. Dispersion des axes. — XVI. Etude de la lumière polarisée. — XVII. Polarisation rotatoire. Applications. — XVIII. Absorption et dispersion. Transformation des radiations. Théories de la dispersion. — XIX. Vitesse de la lumière. Mouvement relatif de la matière et de l'éther. — XX. Arc en ciel. — XXI. Radiations électro-magnétiques.

A signaler au chapitre IX l'exposé détaillé de la disposition de l'appareil de Rowland pour la photographie du spectre, les méthodes graphiques en diffraction; au chapitre XIX, la discussion de Lord Rayleigh sur la signification des mesures de vitesse de la lumière; tout le chapitre XXI.

L'étude de cet ouvrage ne peut manquer de donner à l'élève en même temps qu'une saine notion des faits une vive curiosité pour l'au delà, ce qui devrait être le caractère de tout bon livre d'enseignement.

Marcel BRILLOUIN.

Symons (G.-J.). — Le brontomètre. Nature (de Londres), N° 1083, vol. XLII. Londres, 1890.

On énonce souvent comme une règle générale que la pression barométrique baisse au moment d'un orage ou d'une grande pluie; cependant dès 1784 Rosenthal avait remarqué qu'à l'approche d'un orage le mercure monte, parfois dans le baromètre, et même que cette ascension suit exactement la marche du phénomène, la hauteur maxima étant atteinte quand la distance du nuage orageux au zénith de l'observateur est la plus petite possible. Ce fait a fréquemment été observé depuis, mais est toujours très discuté par les météorologistes; M. G. J. Symons avait, il y a quelques années, cherché à l'interpréter dans un mémoire présenté à la Société Royale de Londres, mais il a très justement pensé qu'avant de développer la théorie, il convenait de s'assurer de l'existence réelle d'un phénomène encore contesté, et de procéder à des mesures rigoureuses et certaines. Avec le concours habile de MM. Richard frères de Paris, il a fait construire un appareil que l'on peut véritablement appeler un brontomètre (бронто метр); cet appareil est un instrument enregistreur très perfectionné; grâce à un système particulièrement simple, l'on peut accélérer à volonté le mouvement des tambours sur lesquels s'inscrivent les observations; il est en effet fort inutile d'avoir, en temps ordinaire, une inscription sur une trop grande échelle de la marche d'un

phénomène normal; il importe au contraire, de connaître en détail les variations les plus rapides au moment où se produisent les perturbations que l'on veut étudier soigneusement. L'appareil comprend: un pluviomètre, un baromètre anéroïde très sensible, un anémomètre à ailettes d'aluminium et des plumes en communication avec des organes semblables à des touches de piano; en appuyant sur ces touches, l'observateur peut instantanément noter l'apparition d'un éclair, le commencement et la fin d'un coup de tonnerre, la durée de la pluie ou de la grêle. Un tel appareil installé dans un certain nombre d'observatoires permettrait de recueillir bon nombre de précieux documents et de trancher définitivement la question controversée de la marche du baromètre au moment des orages.

LUCIEN POINCARÉ.

Nickel (Emil). — Les réactions colorées des composés du carbone. 1 vol. 130 pages, 2^e édition. Hermann Peter, Berlin, 1890.

Le docteur Nickel s'est proposé de réunir et de grouper rationnellement toutes les réactions colorées applicables aux composés organiques et d'en discuter la valeur. L'ouvrage est divisé en deux parties. La première comprend l'étude des réactions colorées relatives à la série aromatique et d'une manière générale aux composés à noyau. Ces réactions sont divisées par l'auteur en cinq groupes: 1^o réactions produites au moyen de l'acide azoteux et de ses dérivés sans formation de composés azotiques; 2^o réactions produites par l'acide azotique; 3^o réactions donnant naissance à des composés azotiques; 4^o réactions donnant naissance à des dérivés du triphénylméthane et corps analogues; 5^o réactions produites par les sels de fer et les chromates.

La deuxième partie réunit les réactions colorées ne portant pas sur un noyau et celles qui présentent un caractère inconnu. Elle comprend trois chapitres relatifs au groupe du cyanogène, aux réactions qui produisent de la murexide et des composés analogues, enfin aux réactions dans lesquelles se produisent des corps colorés inorganiques (réactif de Nessler, chloroiodure de zinc, etc.).

Ce petit livre renferme un très grand nombre de faits intéressants et peut rendre de grands services non seulement aux chimistes, mais encore aux physiologistes et aux botanistes.

Georges CHARPY.

3^o Sciences naturelles.

Baillon (H.). — Les Herborisations parisiennes. un vol. (445 fig.), dessins de Faguet, O. Doin, éditeur. Paris, 1890.

Ce petit livre de M. Baillon n'est pas seulement une Flore permettant la détermination spécifique des plantes qui croissent aux environs de Paris; c'est aussi, par l'indication détaillée des stations et des localités où elles doivent être cherchées, un guide du botaniste herborisant.

La première partie, de près de 100 pages, ornée de jolis dessins sera, par les descriptions qu'elle renferme, très utile au débutant. L'auteur lui donne le conseil de commencer ses herborisations dès le premier printemps, alors que les plantes sont encore peu nombreuses, et, par une série de chapitres intitulés, *Les Renonculacées du printemps*, *Les premières Légumineuses*, *les Crucifères vernalles*, *Les arbres à floraison précoce*, etc., il le met à même de faire son éducation botanique, et de pouvoir déterminer plus tard à l'aide de la deuxième partie du livre, les nombreuses espèces de la Flore parisienne.

Dans cette deuxième partie, l'auteur a cherché à rompre la monotonie fréquente des Flores en n'employant les clefs dichotomiques que pour les genres renfermant de nombreuses espèces, et en les remplaçant pour beaucoup de genres par une courte et intéressante dissertation; il a su joindre ainsi, sans préjudice de la clarté, l'agréable à l'utile.

Il est seulement regrettable que M. Bailion se soit contenté d'énumérer les Cryptogames vasculaires de la flore parisienne, sans les décrire. Ce ne sont cependant pas les plantes les plus faciles à déterminer. Il est à désirer que l'auteur comble cette lacune dans la prochaine édition de son livre.

C. SAUVAGEAU.

Dupuy (D^r E.). — De la transmission héréditaire des lésions acquises, *Bulletin scientifique de la France et de la Belgique*, t. XXII, 4^e série, page 443, 1890.

L'auteur décrit, dans ce court mémoire, quelques faits de grande importance pour les théories de l'hérédité, qui divisent actuellement les transformistes, Lamarkistes ou anti-Lamarkistes, Darwiniens ou néo-Darwiniens, partisans ou adversaires des systèmes de Weissmann, de Romanes et de Ray-Lankester.

Il relate d'abord l'observation, faite il y a trente ans par M. Brown-Séquard, d'une lignée de cobayes épileptiques, issue d'une femelle devenue épileptique à la suite d'une lésion de la moelle. Puis il répète, en les étendant, les expériences de ce savant qui consistaient à léser ou à enlever les cordons ou les ganglions sympathiques cervicaux chez des cochons d'Inde qu'on laissait ensuite s'accoupler. M. Dupuy a suivi leurs descendants jusqu'à la septième génération et constate chez chacun d'eux les phénomènes symptomatiques, d'ailleurs bien connus, qui, chez le couple primitif, s'étaient montrés consécutifs à l'opération. L'aptosie de ces descendants n'a cependant révélé aucune anomalie d'organisation.

Semblable résultat a été obtenu en produisant, chez le couple générateur, l'exophtalmos unilatéral par piqure des corps restiformes du côté opposé. Ces corps semblent normaux chez les descendants, bien que ceux-ci soient atteints d'exophtalmos.

Ces faits et quelques autres du même genre que rapporte M. Dupuy sont en désaccord avec la théorie de Weissmann, qui nie l'hérédité des lésions acquises. M. Weissmann avait essayé d'interpréter la première observation de M. Brown-Séquard, en attribuant à l'épilepsie une cause microbienne se transmettant de la mère au fœtus. Mais il paraît difficile d'invoquer une telle explication dans le cas de lésions parfaitement déterminées des centres nerveux, dont on commence à bien connaître les effets physiologiques.

Chez l'homme, M. Dupuy cite seulement le cas, d'ailleurs extrêmement rare, de garçons sans prépuce nés de parents Israélites. Il est difficile d'établir sur ces faits, — si suggestifs qu'ils paraissent, — une conclusion de quelque portée : pour juger les problèmes en litige de l'hérédité, l'observation pure et simple ne suffit pas : c'est seulement à la suite de nombreuses expériences, poursuivies pendant très longtemps sur une grande variété d'animaux et de plantes, que la lumière pourra se faire sur ce sujet. L. O.

Wertheimer. — Contribution à l'étude de la respiration périodique et du phénomène de Cheyne-Stokes. *Arch. de physiologie*, 1890, p. 31.

Les médecins tout d'abord, puis les physiologistes ont signalé l'existence, dans des cas spéciaux, d'un rythme respiratoire tout particulier, caractérisé par des pauses d'une certaine durée, suivies d'une série de respirations plus ou moins dyspnéiques. Ce type est connu sous le nom de type de Cheyne-Stokes; les théories n'ont pas manqué pour expliquer ces alternances, mais toutes ou presque toutes cherchaient dans le bulbe la cause primordiale.

M. Wertheimer, qui depuis longtemps combat contre l'idée d'accorder un pouvoir respiratoire exclusif au bulbe et revendique pour les centres spinaux une action effective sur les mouvements respiratoires et principalement sur le muscle diaphragmatique, rapporte deux observations prises sur des chiens à moelle sectionnée au-dessous du bulbe et dans lesquelles les tracés indiquent une respiration périodique. Il en conclut que :

si, dans les conditions normales, une cause quelconque tend à produire la respiration intermittente, elle porte son action non pas sur un point circonscrit du système nerveux central, mais sur toute l'étendue de l'axe gris qui gouverne le mécanisme respiratoire. Pour lui, le phénomène de Cheyne-Stokes serait attribuable soit à une diminution d'excitabilité des centres respiratoires en général par suite de troubles nutritifs ou autres de ces centres — et il se rapproche ainsi de l'opinion de Langendorff et même de Filchne et de Murriss, — ou bien encore par une diminution d'excitabilité de ces mêmes centres, mais due à une toute autre cause : il s'agirait d'une inhibition incomplète de ces centres, inhibition provenant d'une irritation plus ou moins directe. C'est là une interprétation de la théorie de M. Brown-Séquard sur le nœud vital de Flourens. Le mémoire de M. Wertheimer constitue une contribution intéressante à l'histoire de la respiration périodique, mais n'éclaircit pas complètement cette question si obscure. L. O.

4^e Sciences médicales.

Lombroso (C.). — L'Anthropologie criminelle et ses récents progrès. In-12, 177 pages, Paris. F. Alcan, 1890.

M. Lombroso a résumé en ces quelques pages les plus récents travaux sur les criminels, ceux du moins qui relèvent de la doctrine qu'il a exposée dans ses nombreux ouvrages; c'est une doctrine qui est fort attaquée aujourd'hui, et l'existence même d'un type criminel est mise en doute par des hommes de critique très sûre et d'écoles fort différentes (Magan, Joly, etc.). La manière dont M. Tarde conçoit le type criminel ruine absolument la conception du criminel-né, telle qu'elle existe dans l'école italienne et en particulier chez M. Lombroso; M. Tarde est porté en effet à faire des caractères distinctifs que l'on observe chez les criminels non-aliénés, des caractères acquis, des caractères professionnels en quelque sorte et il semble bien qu'il y ait dans cette opinion une bonne part de vérité. D'un autre côté il est fort difficile de se faire une idée très nette du criminel-né, tel que le conçoit M. Lombroso et son école; tantôt il semble bien qu'on ait affaire à des aliénés que leurs crimes ne séparent des autres aliénés que d'une manière toute extérieure et superficielle, tantôt au contraire on n'a plus devant soi que des gens brutaux ou rusés, qui à tout prendre ne présentent rien d'anormal et ressemblent fort au commun des hommes. Le gros argument contre la doctrine de M. Lombroso, c'est le manque d'unité de son type criminel. Les caractères anatomiques et psychologiques du criminel *moyen* s'écartent très notablement, il est vrai, de ceux de l'honnête homme normal, mais il y a des criminels et en fort grand nombre qui ressemblent à s'y méprendre à d'honnêtes gens, et il ne faut pas oublier qu'il y a parmi les criminels et même parmi les criminels condamnés une proportion considérable d'aliénés. On compare en réalité un type moyen obtenu par une comparaison entre des sujets normaux, à un type moyen obtenu par une comparaison entre des sujets normaux et des aliénés; le type que l'on a ainsi déterminé est un type artificiel, et qui ne démontre pas qu'il existe une classe spéciale d'hommes, les criminels, distincte à la fois de la classe des hommes normaux et de celle des aliénés. Il ne faut pas oublier au reste que la notion même du crime est une notion essentiellement sociale et légale, une notion dont le contenu varie dans une très large mesure d'une époque à l'autre et que l'on peut difficilement concevoir un type mental commun aux hérétiques du xiv^e siècle et aux « cambrioleurs » d'aujourd'hui. M. Lombroso fait de la criminalité un phénomène d'atavisme et, pour le prouver, il s'appuie d'une part sur les analogies, fort contestables à mon avis, qu'il croit trouver entre les criminels et les sauvages, et d'autre part sur les instincts criminels des

enfants; il nous semble que M. Maguan a raison contre lui et que les enfants chez lesquels on rencontre la férocité et la fausseté à ce degré éminent sont rares, et que ce sont presque toujours des malades, des dégénérés ou des nerveux.

M. Lombroso passe en revue dans son livre les diverses anomalies morphologiques que l'on a constatées chez les criminels : anomalies des circonvolutions cérébrales, anomalies du crâne, du squelette etc. Il semble que ce sont celles même que l'on observe chez les aliénés, et en particulier chez les faibles d'esprit, les débiles; l'atrophie par exemple des circonvolutions frontales et du lobe occipital, l'opercule occipital, que l'on retrouve fréquemment chez les microcéphales.

D'après M. Lombroso lui-même, c'est chez les criminels convaincus des crimes les plus graves, que l'on observe le plus souvent l'excessive brachycéphalie et la microcéphalie. La description qu'il donne, d'après Marro, des auteurs de viol démontre que dans un très grand nombre de cas, ce sont des débiles, parfois mêmes de véritables imbeciles. « Les incendiaires sont presque tous aliénés », ils descendent de parents aliénés (p. 39). Il semble donc que l'on n'ait pas besoin de faire une classe à part des criminels, puisque lorsqu'on retrouve chez eux des anomalies, ce sont celles même que l'on constate chez les fous. Mme Tarnowsky a démontré que la capacité crânienne des prostituées est inférieure à celle des femmes honnêtes et des voleuses; on n'en sera pas surpris, si l'on réfléchit à la très large proportion de faibles d'esprit qui existe parmi les filles publiques, et si l'on prête attention à ce fait que c'est très fréquemment cette faiblesse d'esprit même qui est la cause de leur vie irrégulière. Chez les femmes criminelles les anomalies sont du reste plus rares que chez les hommes, et il semble qu'il faille faire en ce qui les concerne une part beaucoup plus large aux causes sociales.

Parmi les anomalies crâniennes les plus fréquentes, M. Lombroso signale la fossette occipitale moyenne; c'est très nettement à ses yeux un caractère atavique. On sait que l'école italienne a une tendance à considérer le criminel comme un sauvage attardé en pleine civilisation et qu'elle recherche avec soin toutes les particularités anatomiques qui peuvent justifier un rapprochement entre les sauvages actuels et les délinquants; il nous semble que l'analogie est très superficielle et toute extérieure; l'état mental des sauvages présente une remarquable uniformité et rien n'autorise à identifier avec lui les états d'esprit très complexes et variés que présentent les divers criminels.

En ce qui concerne les anomalies physiologiques des criminels, M. Lombroso reconnaît qu'elles sont attribuables pour une bonne part à la vie de prison et à l'alcoolisme. Ottolenghi a cependant constaté chez les criminels en même temps que de fréquentes anomalies du nez, une diminution notable du goût et de l'odorat. Leur manière de marcher est souvent celle des épileptiques; il semble du reste qu'il y ait parmi les criminels une très forte proportion d'épileptiques. M. Lombroso assimile entièrement les délinquants passionnels aux épileptiques, et considère comme identiques les phénomènes physiologiques qui accompagnent les décharges émotionnelles et ceux qui accompagnent les décharges convulsives. Je crois qu'il faudrait faire ici quelques réserves, et retenir seulement ce fait que les vertiges épileptiques, ignorés même de celui qui les éprouve, sont un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit d'ordinaire.

M. Lombroso n'admet pas qu'il y ait à proprement parler des criminels d'occasion; pour lui tous les criminels étaient dès leur enfance en quelque mesure prédestinés au crime; les circonstances ne peuvent de toutes pièces créer un criminel, pas plus qu'un aliéné. Il est amené ainsi à faire rentrer dans la classe des criminels-nés même les délinquants politiques, les agitateurs populaires; il y a ici confusion, nous semble-t-il, entre la notion psychologique et la notion sociale

et légale du crime. « Les efforts vers le progrès, dit M. Lombroso, se manifestant par des moyens trop brusques et trop violents, ne sont point physiologiques, et s'ils constituent parfois une nécessité pour une minorité opprimée, ils sont, au point de vue juridique, un fait antisocial et par conséquent un crime (p. 134). » Il nous paraît difficile d'assimiler au point de vue psychologique l'état d'esprit des combattants de juin par exemple et celui des voleurs à la tire ou des radeurs de barrières.

L. MARILLIER.

Palmberg (A.), Médecin hygiéniste d'Helsingfors. — Traité d'hygiène publique. Trad. française de M. Hamon, un vol. in-8° avec 325 fig. O. Boïn, Paris, 1891.

L'esprit dans lequel ce livre est conçu lui donne un cachet tout spécial, qui le distingue complètement des autres traités didactiques écrits sur ce sujet tant en France qu'à l'étranger. Pour M. Palmberg, « l'hygiène publique est une science peut-être plus empirique que les autres »; aussi ne s'arrête-t-il pas à exposer les théories émises à la suite des expériences ou des recherches de laboratoire; on ne trouvera pas dans son livre des chapitres entiers consacrés à l'étude des microorganismes, à leur résistance dans telle ou telle culture; à leur évolution dans le sol, dans l'eau, etc., ou encore à l'exposition des conditions théoriques auxquelles doivent répondre, d'après les recherches expérimentales, l'air que nous respirons ou l'eau que nous buvons. C'est à l'expérience faite en grand, dans la vie publique, que l'auteur demande ses conclusions.

Successivement il énumère toutes les dispositions sanitaires prises dans chacun des six pays qu'il a choisis comme types d'étude et de comparaison: L'Angleterre, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Suède, la Finlande. S'appuyant sur une statistique serrée, il montre l'influence exercée par les diverses mesures sanitaires sur la mortalité générale, spécialement sur celle que produit la fièvre typhoïde.

L'étude sur l'Angleterre et principalement sur Londres occupe le premier rang; cette place est justifiée par l'excellence même de l'organisation des services relatifs à la santé publique dans ce pays. Alors qu'en France nous attendons encore une loi sanitaire générale mettant entre les mains du Gouvernement central une arme suffisante pour veiller avec utilité sur la santé publique, l'Angleterre est dotée d'une législation complète qui, dans le pays même de *l'habac corpus*, permet de sacrifier la liberté individuelle à l'intérêt général bien entendu.

M. Brouardel, dans la préface qu'il a écrite pour le livre de M. Palmberg, cherche à excuser les lacunes législatives signalées dans l'étude de notre pays, en invoquant la résistance du public français à ces mesures sanitaires. L'amour de la liberté individuelle n'est certes pas moins fort chez le citoyen anglais que chez le citoyen français; quant à la centralisation que tous les hygiénistes réclament, elle ne saurait, ce semble, trouver un terrain plus favorable qu'en France, le pays où elle atteint, pour tous les rouages administratifs, une véritable intensité morbide.

Nous avions déjà en France une remarquable étude sur le sujet traité par M. Palmberg dans le grand ouvrage de M. le Dr Martin sur *l'administration sanitaire civile en France et à l'étranger*; il est regrettable que cet important travail ne soit pas indiqué dans l'index bibliographique qui accompagne le traité de M. Palmberg. Les deux livres ne font d'ailleurs pas double emploi. Le traité d'hygiène publique de M. Palmberg ne contient pas seulement les dispositions sanitaires; il renferme encore de nombreuses descriptions, avec figures, des appareils employés dans les constructions privées ou publiques de chaque pays: ventilateurs, water-closet, appareils de chasse, de chauffage, etc. Cette partie de l'ouvrage intéressera surtout les ingénieurs et les architectes, collaborateurs des médecins dans toutes les questions d'hygiène.

L. O.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 novembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. H. Padé : Sur la représentation approchée d'une fonction par des fractions rationnelles.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. Frey et A. Verneuil ont perfectionné leur méthode de synthèse des rubis et ont pu l'appliquer beaucoup plus en grand. Ils ont obtenu des rubis qui peuvent se tailler pour la bijouterie, et être employés dans l'horlogerie comme trons de pivots. — MM. H. Becquerel et H. Moissan ont constaté la présence du fluor libre dans la fluorine de Quincié (Rhône). (Voir le n^o 21 de cette Revue, p. 688.) — M. L. Amat, reprenant la question de l'analyse des acides hypophosphoreux, phosphoreux et hypophosphorique par les oxydants, fait voir que la méthode est générale, que l'acide hypophosphorique peut comme les autres être analysé au moyen du bichlorure de mercure et que le permanganate de potasse peut être employé volumétriquement pour l'analyse des acides phosphoreux et hypophosphoreux. — M. R. Varet a préparé et étudié les combinaisons du cyanure de mercure avec les sels halogènes de cadmium : l'iodocyanure, le bromocyanure, et le chlorocyanure de mercure et de cadmium. — M. E. Guenez a appliqué à la préparation du fluorure de benzoyle le procédé général de préparation des composés organiques fluorés, consistant à faire réagir le fluorure d'argent sur les dérivés iodés ou chlorés. — MM. A. Haller et A. Held ont obtenu des quantités notables d'acide citrique par le procédé de synthèse, déjà communiqué par eux, au moyen de l'acide acétone-dicarbonique, ils étudient le détail des réactions successives. — M. A. Michel-Lévy : Sur les moyens : 1^o de reconnaître les sections parallèles à g' des feldspaths dans les plaques minces des roches ; 2^o d'en utiliser les propriétés optiques.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. C. Phisalix a étudié avec le virus charbonneux le rôle du ganglion lymphatique dans la défense de l'organisme. De ses expériences, il résulte que le microbe est arrêté dans le ganglion qu'il ne peut franchir que difficilement, et qu'il continue à vivre dans ce ganglion ou peu à peu se modifie sa forme et ses propriétés virulentes. — MM. Courmont et Dor en injectant à de jeunes lapins, par la voie intra-veineuse, des cultures tuberculeuses atténuées par le vieillissement, ont produit des tumeurs blanches de diverses articulations, à l'exclusion de toute autre localisation. — M. G. Pruvot a étudié les premières phases du développement d'un Solénogastre, le *Dondersia banyulensis* (Néoménies). Ce développement ressemble par quelques-uns de ses caractères, à celui des Mollusques, par d'autres, à celui des Brachiopodes ou des Polygordiens. — M. Thélohan a étudié la formation des spores chez les Myxosporidies. — M. J. Kunstler signale quelques différences qui distinguent le Saumon de Norvège du Saumon d'Europe : les plus saillantes sont les différences d'habitudes relativement à la montée ; on peut se demander s'il s'agit de deux espèces distinctes, ou des effets d'adaptation à des circonstances particulières. — M. Kunckel d'Herculais a découvert que les premières phases du développement des Mylabres ont lieu dans les coques ovigères des Acridiens.

Séance du 17 novembre 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. G. Kobb : Sur un théorème de M. Picard. — M. A. Laussedat indique

une méthode qui permet de construire le plan d'un terrain, à partir de deux rues perspectives faisant un angle quelconque avec l'horizon, pourvu que dans ce terrain existe une ligne horizontale, telle que le contour d'une nappe d'eau ; cette méthode est destinée à permettre la levée des plans à l'aide de la photographie. — Dom Lamey explique la variation annuelle de la latitude, constatée dans divers Observatoires, par les variations que produisent dans la réfraction les *marées atmosphériques*. — M. J. Fenyi décrit une protubérance solaire qui s'est élevée avec une rapidité extraordinaire. — M. J. Oppert communique une série d'observations lunaires et planétaires chaldéennes, remontant aux années -- 523 et -- 522, trouvées sur une tablette cunéiforme du Musée britannique ; l'une des éclipses de lune mentionnées dans cet annuaire est citée par Ptolémée ; les indications de la tablette coïncident avec les calculs d'Oppolzer. Quant aux observations planétaires, le P. Epping les ayant calculées d'après les éléments de Le Verrier, est arrivé à des résultats concordants.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — MM. Chassagny et Abraham avaient montré que les forces électromotrices des couples thermoelectriques dont les soudures sont maintenues à 0° et 100° peuvent être déterminées au dix-millième de leur valeur. La précision relative restant la même pour un intervalle quelconque de température, ces appareils peuvent servir à évaluer cet intervalle avec une grande exactitude. Les auteurs ont cherché la relation qui relie les forces électromotrices du couple fer-cuivre à l'échelle des températures du thermomètre à hydrogène ; ils sont arrivés à une formule empirique, qui, sans être exacte, donne le cinquantième de degré dans tout l'intervalle 0° 100°. — M. P. Vieille a continué ses recherches sur les pressions développées par la combustion des explosifs en vase clos. Il étudie, sur les graphiques obtenus suivant la méthode décrite dans une note précédente (V. n^o 21 de cette revue, p. 679), la périodicité des pressions ondulatoires produites dans le cas d'un récipient allongé et d'un chargement dissymétrique. — M. A. Leduc a donné une formule permettant de calculer la résistance électrique d'un fil de bismuth placé dans un champ magnétique ; il achève l'étude de cette formule par l'étude de l'influence de la température sur deux des coefficients qu'elle comporte. — M. Berthelot a découvert un texte remontant à l'époque de Charlemagne, où le bronze est mentionné ; avec sa composition cette pièce confirme la théorie de l'auteur sur l'origine du mot *bronze*, qui vient du nom de la ville de *Brundisium*. — M. Maquenne : Sur les acides β pyrazol-dicarbonique. — Par l'action de l'acide sulfurique sur le camphre monochloré, M. P. Cazeneuve a obtenu, en outre du corps neutre sulfocojungé, en fonction diphenolique, qu'il a signalé, un isomère de ce dernier, qui est acide-phénol ; il le désigne sous le nom d'acide *amethylcampha phénolsulfurique*. — M. Ph. A. Guye a étudié la série des composés que l'on obtient en substituant les groupements les plus divers au groupe CH_3Cl du chlorure d'amyle, dans le but de vérifier la loi qu'il a établie entre la constitution moléculaire des corps et leur action sur la lumière polarisée l. Dans le chlorure d'amyle, le groupe CH_3Cl est le plus lourd des groupes disposés en tétraèdre autour de l'atome central de carbone asymétrique ; le pouvoir rotatoire du composé reste de même sens quel que soit le groupe que l'on substitue à celui-là pourvu qu'il soit au moins

1 Voir le n^o 7 de cette Revue, C. R. de l'Acad. des Sc., p. 218.

aussi lourd. La vérification a porté sur quarante dérivés. — M. Chabrière, en saponifiant par la chaux le fluorure d'éthylène, composé nouveau préparé par lui, a obtenu, comme produits de la réaction, du fluorure de chaux et du glycol. Il pense que ce type de réaction est général dans la saponification par la chaux des composés organiques halogénés, et peut servir à la préparation des alcools polyatomiques. L'action de l'anhydride borique sur les chlorhydrines donnerait des résultats analoges.

3^e SCIENCES NATURELLES. — M. Chabrière a constaté que le fluorure de méthylène empêche la végétation de la bactérie pyrogène de l'urine et même tue ce microbe après 24 heures de contact : ce gaz antiseptique n'étant pas irritant pourrait être utilisé en clinique. — MM. Th. Schloesing fils et Em. Laurent ont entrepris des expériences pour démontrer directement la fixation de l'azote atmosphérique par les légumineuses munies de nodosités microbiennes. Après avoir fait vivre les plantes pendant trois mois sur un sol de grès calciné et dans un atmosphère artificielle de composition connue, ils ont constaté la disparition dans cette atmosphère d'une quantité d'azote un peu plus faible que la quantité gagnée par les plantes. — M. Em. Laurent a cultivé le micro-organisme des nodosités radiculaires des légumineuses dans des bouillons de légumineuses ou simplement dans de l'eau pure sucrée et minéralisée : ce micro-organisme prend la forme de longs filaments ramifiés, analogues aux *Pasteuria*. — M. L. Vaillant a observé chez deux exemplaires jeunes du *Chelmo rostratus* (Téléostéen) une disposition du préopercule qui disparaît avec l'âge. — M. F. Guitel a remarqué que les *Lepadogaster bimaculatus* (Téléostéens) qu'il a examinés en grand nombre à Roscoff se groupent en deux formes bien distinctes. Tous les individus de l'un des lots ainsi formés étant mâles et les autres femelles, on doit admettre qu'il s'agit des caractères sexuels. — M. E. Canu a étudié le dimorphisme sexuel d'un Copépode parasite des Synascidies, l'*Enterocola fulgens*, en suivant le développement de cette espèce. Les stades nauplien et cyclopoïde sont identiques pour les deux sexes, puis la femelle subit une régression, et passe au parasitisme complet, tandis que le mâle se rapproche des formes semi-parasites nageuses comme les *Notodelphys*. — M. Ch. Decagay : Sur les forces méloculaires antagonistes qui se produisent dans le noyau cellulaire et sur la formation de la membrane nucléaire. — M. H. Lasne proteste contre l'opinion de M. de Lapparent, qui attribue aux effets de la culture la production des rixiaux en Picardie ; il a constaté en divers points l'indépendance de l'orientation des labours et de celle des rixiaux ; quelquefois il a observé directement une déviation des couches de la craie de part et d'autre d'une diachase. — M. Berthelot a observé que les bruits subjectifs produits par les sels de quinine sont continus et comprennent toute l'étendue des sons perceptibles : il s'agit donc là d'une excitation d'ensemble des centres acoustiques.

M. H. Léauté lit une notice sur Ed. Phillips. (Voir plus loin, p. 718.) L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 11 novembre 1890.

M. Brouardel pense que pour remédier à la dépopulation de la France, il faut surtout se placer sur le terrain de l'hygiène. La variole, la fièvre typhoïde déterminent chaque année en France la mort de 37.000 individus dans la force de l'âge. Or, dans les pays où la vaccination et la revaccination sont obligatoires, il n'y a presque plus de variole ; de même aujourd'hui dans notre armée elle tend à disparaître. D'autre part, dans des villes où autrefois la fièvre typhoïde était épidémique, Vienne (Autriche), Rennes, Amiens, etc., les améliorations apportées dans l'alimentation d'eau l'ont complètement fait disparaître. Il propose donc à l'Académie d'adopter les conclusions suivantes : « La loi

sanitaire en préparation doit rendre les vaccinations et revaccinations obligatoires ; elle doit armer l'autorité de pouvoirs suffisants pour que les municipalités, à leur défaut le préfet ou le Gouvernement puissent assurer la salubrité publique des agglomérations contre les dangers qui résultent de l'usage d'une eau polluée. » — M. Vallin appuie l'opinion de M. Brouardel et demande à ce qu'il soit spécifié que l'eau de source doit toujours être préférée à l'eau filtrée qui est un pis-aller. — M. Abadie fait une communication sur un nouveau traitement de l'ophtalmie sympathique qui consiste, dès que l'on voit l'œil sain devenir malade à la suite de la blessure de l'autre œil, à cautériser au galvanocautère les lèvres de la plaie de l'œil blessé et à injecter une goutte de sublimé à $\frac{1}{1000}$. Deux ou trois injections à quelques jours d'intervalle amènent la guérison.

Séance du 18 novembre 1890.

M. Hardy regarde comme multiples les causes qui entravent l'accroissement de la population en France : la race, la civilisation plus avancée, la richesse du pays, la restriction volontaire, l'émigration des campagnes dans les villes, la diminution des idées morales et religieuses. Quant aux remèdes, il ne les voit pas dans les mesures législatives proposées, mais dans le développement de l'hygiène et de l'assistance publique. — M. Javal pense au contraire qu'il appartient aux législateurs de modifier par des lois l'état social actuel qui a entraîné les restrictions volontaires, cause principale du mal.

D^r E. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 15 novembre 1890

M. Anotta indique que l'eau saturée d'acide borique dissout environ quatre fois plus de naphthol que l'eau simple ; l'eau boriquée naphtholée ainsi obtenue possède un grand pouvoir antiseptique. — MM. Mathieu et Rémond exposent une méthode simple pour doser les divers éléments de l'acidité du suc gastrique ; elle est fondée sur le principe du coefficient de partage des acides entre l'eau et l'éther, après avoir déterminé ce coefficient dans chaque cas particulier, le mélange des divers acides cyaniques étant très variable, on peut évaluer séparément l'acidité organique et l'acidité minérale ; une partie de cette dernière est due à des phosphates acides ; l'acide chlorhydrique libre est évalué par différence, après évaporation au bain-marie. — M. Laborde a repris la question de savoir s'il existe un centre respiratoire unique. Les résultats expérimentaux auxquels l'a conduit une série de recherches systématiques sont les suivants : l'excitation mécanique du centre bulbaire provoque suivant son intensité, 1^o l'accélération des mouvements respiratoires ; 2^o une syncope respiratoire ; 3^o l'arrêt définitif de la fonction respiratoire ; la destruction instantanée du centre au moyen d'un emporte-pièce supprime irrémédiablement la fonction respiratoire ; la destruction, au moyen d'un emporte-pièce de dimensions beaucoup plus grandes que le centre qui, par suite, n'excite pas le centre en le détruisant, supprime de même la fonction. — M. Henneguy, poursuivant l'étude de la faune des marais salants, décrit un genre nouveau d'infusoires hétérotriches, voisin du *Bursaria* ; il lui donne le nom de *Fabria*. Il signale un péridinien, qui présente la particularité de s'associer en colonies ; ces colonies, d'aspect analogue à des zooglies, se dissocient à la moindre excitation et se reforment ensuite. — MM. J. Hericourt et Ch. Richet ont injecté à des lapins de vieilles cultures tuberculeuses, stérilisées par la chaleur ; ils ont constaté que ces lapins ont ainsi acquis un certain degré d'immunité, et qu'après l'inoculation d'une culture virulente, ils présentent une survie plus longue que les témoins. Ils ont obtenu des résultats analoges

par la transfusion du sang d'un chien qui avait reçu du virus tuberculeux. Le virus employé dans ces expériences est celui de la tuberculose aviaire. — Les recherches de MM. Vaillard et Vincent sur le poison soluble sécrété par le bacille tétanique démontrent l'analogie de ce composé avec le poison diphtérique étudié par MM. Roux et Versin; la chaleur et la lumière, au contact de l'air, le détruisent, l'alcool le précipite; un précipité tel que du phosphate de chaux produit au sein du liquide l'entraîne avec lui; les expériences faites avec ces précipités montrent que ce corps est convulsivant à des doses infinitésimales; c'est probablement une diastase. — M. E. Hache a trouvé dans plusieurs épithéliomas des corpuscules qu'il rapporte à des coccidies.

Séance du 22 novembre 1890.

M. Laborde a propos des recherches de MM. Ch. Richet et Héricourt sur l'immunité conférée à un animal par le sang d'une autre espèce, fait savoir que M. Rondeau avait eu le premier l'idée de cette méthode; il avait essayé de vacciner des moutons contre le charbon en leur injectant le sang d'un chien qui avait reçu des inoculations charbonneuses. — MM. Courmont et Dor font ouvrir un pli cacheté déposé par eux à la Société et concernant la vaccination de la tuberculose (aviaire); des lapins ayant reçu des injections de cultures filtrées sur porcelaine ont été soumis ensuite à des inoculations virulentes; deux sur quatre sont encore vivants après un an, tous les témoins sont morts. — M. Roger, ayant sectionné le nerf auriculaire d'un côté, chez un lapin, puis injecté une même quantité de virus érysipélateux dans chaque oreille, constate que l'oreille du côté de la section présente des lésions beaucoup plus graves que l'autre. Cette expérience montre que la sensibilité joue un rôle utile dans la défense de l'organisme contre les microbes. — M. Contejean envoie une note sur l'action des nerfs sur la section gastrique étudiée chez la grenouille. — M. Féré a étudié par la méthode graphique la contraction des muscles de la face chez les hystériques hémiplégiques; il a constaté, du côté correspondant au côté paralysé un retard dans la contraction volontaire, une accélération dans le réflexe. — M. Laborde présente un lapin atteint de maladie pyocyannique chronique, après une vaccination incomplète; ce lapin, en outre de la paralysie, qui est de règle dans ce cas, est atteint d'une lésion cervicale qui se traduit par l'entraînement de la tête à gauche, et le nystagmus; il y a en outre hémianesthésie gauche. — M. Retterer, ayant eu l'occasion d'examiner chez des embryons de cétacés les organes génitaux mâles, a pu constater chez ces mammifères le même processus évolutif qu'il a signalé pour les autres relativement à la formation du gland. Reprenant l'ensemble des communications qu'il a faites sur ce sujet, il fait voir que l'étude du développement empêche d'admettre la formule classique suivant laquelle le gland serait l'épanouissement du corps spongieux de l'urèthre. En réalité, les corps caverneux aussi bien que les corps spongieux forment la partie axiale de cet organe; la portion périphérique est constituée par une coque érectile dont les travées affectent la même disposition que les travées fibreuses de la pulpe des doigts et qui est l'homologue du tissu cellulaire sous-cutané; non érectile, de la base de la verge.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 21 novembre 1890.

M. Abraham fait en son nom et au nom de M. Chasagny une communication sur des *Recherches de thermo-électricité*. Ces deux expérimentateurs ont tout d'abord étudié les conditions dans lesquelles il convient de se placer pour obtenir les mesures les plus précises des forces électromotrices, thermoélectriques; au lieu de fermer, comme on le fait d'ordinaire, l'élément sur un

galvanomètre, ils opposent à la force électro-motrice à mesurer une force électromotrice égale obtenue par une double dérivation prise sur le circuit d'un élément de pile; cette pile est un élément Gouy de grandes dimensions maintenu à température constante et fermé sur une résistance de 10.000 ohms, quatre ou cinq heures avant les expériences. Les boîtes de résistance sont soigneusement étalonnées par un procédé particulièrement simple; de grandes précautions sont prises pour assurer le parfait isolement des fils, notamment au voisinage des soudures, dont l'une est maintenue dans la vapeur d'eau bouillante et l'autre dans la glace rapée. Pour connaître le degré de précision des mesures, les auteurs ont cherché avec quelle approximation les nombres qu'ils observaient vérifiaient la loi des métaux intermédiaires; ils ont constaté qu'ils pouvaient répondre du dix-millième. Ces premiers résultats obtenus, on a ensuite étudié la variation de la force électromotrice avec la température à laquelle on porte l'une des soudures tandis que l'autre est maintenue dans la glace; contrairement à certaines théories, une formule parabolique ne peut représenter les résultats qui au contraire concordent très bien avec les nombres calculés par la formule $E = \frac{at + bt^2 - ct^3}{t + 273}$. On peut ainsi éva-

luer aisément les températures au cinquantième de degré près. Ces couples peuvent remplacer avantageusement les thermomètres à mercure dans certaines études, par exemple dans des recherches sur le phénomène de Peltier ou sur la propagation de la chaleur que les auteurs se proposent d'entreprendre. — M. Pellin répète devant la Société une expérience de M. Argyropoulos où se manifestent les vibrations d'un fil de platine maintenu incandescent par un courant électrique sous l'influence des interruptions successives de ce courant.

Lucien POINCARÉ.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 20 novembre 1890

SCIENCES PHYSIQUES. — Le professeur J.-V. Jones fait une communication sur la détermination de la résistance spécifique du mercure en grandeur absolue. La méthode qu'il a employée est une modification de celle de Lorenz: on sait que cette méthode consiste à faire tourner un disque métallique dans le plan d'une cellule étalon coaxiale. Des fils qui touchent le centre et la circonférence du disque sont en communication avec les deux extrémités de la résistance à mesurer, et le même courant passe à travers la résistance et la cellule étalon. Mais au lieu de placer le mercure dans un tube, comme Lorenz, M. Jones se sert d'une auge allongée, et tandis que Lorenz mesurait la distance entre deux électrodes, dans la méthode de M. Jones, une des électrodes est fixe et l'on mesure le déplacement de l'autre entre deux positions d'équilibre de l'aiguille du galvanomètre qui correspondent à deux vitesses de rotation du disque. On détermine la section de la colonne de mercure par une nouvelle application de la méthode différentielle, en observant la colonne mercurielle à deux hauteurs différentes dans l'auge. L'auge dont s'est servi M. Jones était creusée dans la paraffine et renfermée dans une forte armature de fer. Elle avait environ 43,5 pouces de longueur, 1,5 pouces de large et 3 pouces de profondeur. Les autres modifications sont: 1° l'emploi d'un conducteur étalon, fait d'une seule couche de fils dont l'induction mutuelle a été calculée; 2° l'emploi d'une brosse d'une forme spéciale destinée à assurer de bons contacts électriques à la périphérie du disque en rotation. La moyenne de cinq séries complètes d'expériences a donné comme valeur de la résistance spécifique du mercure à 0°: 94.067 ± 10. Ce résultat peut aussi s'exprimer en disant que l'ohm est égal à la résistance de mercure de 0°001 carré de section de 106,307 cm. de long. — Les professeurs Liveing et Dewar font une

communication sur les propriétés spectroscopiques de la poussière. L'appareil dont ils se sont servis consiste essentiellement en un tube de Plücher terminé par une boule creuse à une de ses extrémités. Deux des cloches sont scellées dans cette boule d'où part un tube de verre muni d'un robinet, qui communique avec un récipient plein de gaz. L'autre extrémité du tube communique avec une pompe à air. La poussière employée était celle que produisaient les diverses électrodes scellées dans la boule; à la suite d'une décharge par rupture d'un courant, elle est entraînée dans le tube par un courant plus ou moins rapide d'air ou de tout autre gaz. On a fait passer successivement dans l'appareil de l'air, de l'hydrogène, de l'acide carbonique, de l'oxygène, et sous des pressions diverses de 0^m02 à 0^m040, le résultat a toujours été le même. Lorsqu'on faisait passer un courant électrique dans le tube par les électrodes, on n'apercevait aucune raie qui pût être attribuée à la présence de la poussière. Il semble donc que la poussière, si fine qu'elle soit, en suspension dans un gaz, ne se comporte pas comme un gaz, ne devienne pas lumineuse, et ne présente pas un spectre caractéristique sous l'influence d'une décharge électrique, mais qu'elle soit chassée avec une extraordinaire rapidité hors de la direction de la décharge. — Le professeur J. Joly fait une première communication sur les chaleurs spécifiques des gaz à volume constant. Il étudie dans ce travail l'air, l'acide carbonique et l'hydrogène. Il s'est servi pour ses expériences du calorimètre à vapeur qu'il a inventé; il a employé une méthode différentielle où l'on compare au point de vue thermique, un récipient vide et un récipient qui contient un gaz à haute pression. Les deux récipients ont approximativement la même capacité calorifique, le résultat doit être théoriquement le même, que si le gaz n'était pas contenu dans un récipient. Les expériences ont été faites sous des pressions allant de 7 à 23 atmosphères. M. Joly a constaté que les chaleurs spécifiques de l'air, de l'acide carbonique, et de l'hydrogène ne soit pas constantes, mais varient avec la densité. La chaleur spécifique de l'air s'accroît avec la densité; elle a une valeur moyenne de 0,1721 à la densité absolue de 0,0205 qui correspond à la pression de 19,51 atmosphères. Elles excèdent de 0,1715 la pression de l'atmosphère. Pour l'acide carbonique la chaleur spécifique croît plus rapidement avec la densité, comme le montre la formule $C_v = \rho \times 0,2061 + 0,165\pi$. Pour l'hydrogène la chaleur spécifique diminue avec l'accroissement de la densité. — Le Dr J. Hopkinson fait une communication sur le magnétisme et la recalcence. Il avait montré antérieurement¹, que la recalcence et la perte de l'aimantabilité se produisent dans le fer et l'acier environ à la même température. Il établit maintenant par une longue série d'expériences que la libération et l'absorption de chaleur, auxquelles a été donné le nom de recalcence, et les changements d'état magnétique se produisent à la même température. Il montre aussi que pour l'acier qui contient 0,3 % de carbone, les deux températures de libération de chaleur coïncident avec des changements dans l'état magnétique.

Richard A. GREGORY.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 14 novembre 1890

M. Pelham-Dale : Sur certaines relations existant entre les indices de réfraction et les éléments chimiques. La première partie du mémoire corrobore les résultats annoncés par l'auteur dans une communication précédente : la réfraction $(n-1)$ divisée par la densité (d) d'une vapeur est égale à une constante multipliée par certains nombres entiers. Cette loi a été vérifiée pour divers métaux. On constate que le rapport du poids moléculaire M à la réfraction $(n-1)$ est à un haut degré d'approximation une constante ou un multiple simple

de cette constante. L'auteur a examiné ce que devient la relation quand un même élément passe par les trois états, solide, liquide ou gazeux : les nombres obtenus ne sont pas identiques, quelques uns doivent être doublés. Une relation semble exister entre la limite supérieure de la réfraction et le spectre de ligne des éléments. Par exemple la limite supérieure de la réfraction correspond pour le sélénium à une longueur d'onde 5,295,7, et précisément il existe des lignes remarquables de cette longueur d'onde dans son spectre. L'auteur a remarqué que le sélénium polarise et réfléchit presque toute la lumière qui tombe sur lui sous un angle un peu grand; sans doute, cette propriété pourrait être utilisée dans les polariscopes. Dans le cas de la dispersion anormale, on remarque que l'espace obscur du spectre (par exemple pour la fuchsine) coïncide avec la limite de réfraction. — M. Gladstone estime qu'il y aurait un intérêt à comparer les résultats obtenus par M. Dale à ceux obtenus par d'autres phy-

siciens, au lieu de l'expression $\frac{n-1}{d}$ on considère souvent $\frac{n^2-1}{n^2+2}$ qui présente un sens particulier dans les

théories électriques en admettant que n^2 est égal à la constante diélectrique. Que deviennent les résultats comparés à cette formule? M. Gladstone signale en outre les difficultés particulières qui proviennent de l'emploi des métaux; MM. Du Bois et Reubens ont récemment montré que la réfraction n'obéit pas dans ce cas à la loi du Sinus. — M. J. Perry : Table des harmoniques sphériques. L'auteur définit un harmonique sphérique comme une fonction homogène de x, y, z satisfaisant à l'équation

$$\frac{d^2 V}{dx^2} + \frac{d^2 V}{dy^2} + \frac{d^2 V}{dz^2} = 0.$$

Il établit les propriétés fondamentales de ces fonctions, et insiste sur leur importance dans divers problèmes de chaleur, d'électricité ou d'hydrodynamique. Si l'on considère les harmoniques zonales (c'est-à-dire fonction de $x^2 + y^2$)¹ et de z) on remarque que ces harmoni-

ques sont symétriques par rapport à l'axe des z et peuvent être exprimés en fonction de l'angle θ que fait avec l'axe des x la droite qui joint l'origine au point x, y, z , multiplié par r^i , r étant le rayon vecteur et i le degré de la fonction homogène. Ces fonctions de θ sont appelées surfaces harmoniques zonales, et sont désignées par $P_0, P_1, P_2, \dots, P_i$ selon le degré de la fonction. Ce sont les valeurs de ces quantités que l'auteur a calculées et inscrites dans les tables qu'il présente à la Société, elles sont calculées depuis P_0 à P_i de degré en degré de 0° à 90° . M. Perry montre par quelques exemples l'utilité de ces tables.


SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 6 novembre 1890.


M. W. H. Perkin : La rotation magnétique des solutions salines. M. Perkin publie les résultats qu'il a déjà obtenus dans la comparaison du pouvoir rotatoire magnétique des sels à l'état solide et à l'état dissous. Bien que cet important travail soit loin d'être terminé, il ressort très nettement des résultats obtenus que le pouvoir rotatoire magnétique augmente beaucoup par la dissolution. — MM. E. Hori et F. Morley : Note sur la propylparatoluidine normale et l'isopropylparatoluidine. — M. Arthur Richardson : Action de la lumière sur l'éther en présence de l'oxygène et de l'eau : M. Richardson conteste les conclusions de MM. Dunstan et Dymond qui disent n'avoir pas obtenu d'eau oxygénée en employant de l'éther pur. L'auteur a employé de l'éther très soigneusement purifié, et en l'exposant à la lumière au contact de l'oxygène humide il a toujours vu se former de l'eau oxygénée même à 0° . — MM. Klingemann et

¹ Phil. Transaction, 1889, p. 443.

Laycock : Action de l'ammoniaque et de la méthylamine sur le dibenzoylstilbène. Les auteurs se sont proposés de vérifier si l'analogie existant entre le dibenzoylcinnamène et le dibenzoylstilbène se conserve dans les dérivés obtenus avec l'ammoniaque et les amines. Ils ont obtenu ainsi plusieurs composés analogues à ceux que poursuit le dibenzoylcinnamène. — **M. Wadsworth** : Condensation de l'acétone phénanthraquinone. L'action d'un mélange d'acide sulfurique concentré et d'alcool absolu donne un composé répondant à la formule



MM. Ruhemann et Dufton : Contribution à l'étude de l'acide mucique. L'action du pentachlorure de phosphore sur l'acide mucique donne le corps :



M. Easterfield : Les halogènes et le carbone asymétrique. Le seul composé asymétrique où un halogène est uni au carbone est l'iodure d'amyle secondaire de Le Bel. L'auteur n'a pu réussir à obtenir des dérivés analogues optiquement actifs.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 7 novembre 1890.

M. Hans Jahn communique quelques expériences thermo-chimiques qu'il a faites sur la chaleur de neutralisation des deux acides tartriques, avec des bases douées d'activité optique. Il s'agissait de savoir si la tendance qu'ont les acides tartriques de se combiner avec les bases d'activité opposée, tendance constatée par Pasteur, Bremer et d'autres auteurs, se manifesterait aussi par une différence des chaleurs de neutralisation. Les expériences faites avec les deux tartrates de la morphine donnèrent de légères différences. L'auteur décomposa, au sein du calorimètre à glace de Bunsen, les deux tartrates dissous par la lessive de soude employée en excès, de sorte que la morphine fut complètement dissoute. La chaleur de décomposition était pour :

Le tartrate droit.....	32.76	} Cal.
Le tartrate gauche.....	33.55	

La morphine étant lévogyre on pouvait en conclure que la chaleur de neutralisation pour l'acide dextrogyre serait un peu plus grande. Cependant les expériences faites avec la nicotine, qui permettaient la détermination directe des chaleurs de neutralisation, grâce à la solubilité de la nicotine dans l'eau, démontrèrent que la chaleur de neutralisation pour les deux acides tartriques est la même :

Acide dextrogyre.....	5.19	} Cal.
Acide lévogyre.....	5.10	

— **M. Kalischer** expose ses expériences sur l'influence d'une bobine d'induction sur un téléphone. Si l'on rapproche un téléphone d'une bobine d'induction chargée par deux accumulateurs dont le courant est interrompu par un petit marteau de Neef, on entend des sons dans chaque position du téléphone. Pour le téléphone de Siemens, dont l'aimant a la forme d'un diapason, on observe des maxima, si les deux axes du téléphone et de la bobine sont perpendiculaires l'un sur l'autre, et si les deux branches de l'aimant sont l'une à côté de l'autre; des minima, si les deux branches sont l'une au-dessus de l'autre. Ces observations se font si le téléphone et la bobine ont leur axe au même niveau, si l'on élève l'axe du téléphone il faut rapprocher les deux branches de l'aimant de la bobine pour obtenir le minimum. Les mêmes maxima et minima se manifestent si le téléphone est ouvert. Dans ce cas, c'est l'aimant qui résonne car, si l'on éloigne les petites bobines du téléphone, le phénomène n'est pas altéré. Le téléphone résonne même à une distance de deux à trois mètres de la bobine. Un morceau de fer non aimanté ne donne pas de son. Le phénomène se complique beaucoup à cause de la résonnance des

membranes en fer, si elles possèdent du magnétisme rémanent. Les minima s'observent si l'axe de la membrane est parallèle à celui de la bobine; on a des maxima, au contraire, si les deux axes sont perpendiculaires l'un sur l'autre. Des plaques qui sont dépourvues de magnétisme ne résonnent pas; mais il suffit de les toucher avec un aimant durant quelques secondes seulement pour les faire résonner. Le résonnement des plaques du téléphone cause les sons faibles qu'on entend dans ce dernier s'il se trouve dans la position des minima. — **M. de Helmholtz** expose les traits principaux de sa théorie des vagues. (Voir la Revue du 15 novembre 1890, p. 682)

Séance du 21 novembre 1890

M. Rubens démontre une nouvelle méthode pour la mesure de la longueur des ondes électriques. Les résonateurs de M. Hertz étant liés à leurs propres ondulations ne donnent pas de résultats exacts, puisque dans chaque conducteur différentes ondulations sont excitées; la méthode de M. Rubens est basée sur l'emploi du bolomètre qui mesure directement l'énergie des ondulations excitées dans deux fils de cuivre parallèles. Il est évident que dans les nœuds des ondes on observe des déviations minima, tandis que dans les ventres le bolomètre accusera des maxima de l'énergie. On peut mesurer la longueur des ondes de deux manières différentes : ou bien en joignant les extrémités des deux fils parallèles au bolomètre et en promenant le long de ceux-là un petit pont ou bien en laissant le pont fixé à l'une des extrémités des deux fils et en promenant le long de ceux-ci deux fils joints au bolomètre. La première méthode qui correspond à celle indiquée par M. Lecher donne des vibrations assez compliquées, tandis que d'après la seconde on obtient une onde très régulière. Les écarts des différentes valeurs obtenues pour la longueur de l'onde ne dépassent pas 0,3 %. — **M. Kalischer** a observé que des sons faibles, par exemple les bruits légers de cliquetis que donne un faisceau de fil en fer se trouvant au centre d'une bobine d'induction se propagent rectilignement comme les rayons de la lumière; on ne les entend que quand l'oreille se trouve dans la direction de la génératrice du cône ayant la bobine pour sommet. A l'occasion de ces expériences, M. Kalischer a fait l'observation qu'on entend le bruit mieux avec l'oreille gauche qu'avec l'oreille droite. M. Dubois-Reymond y joint la remarque qu'en général la partie gauche du corps est plus sensible pour la perception des sensations que la partie droite.

Dr HANS JAHN.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE SAINT-PETERSBOURG

Séance du 9 octobre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. Tchebycheff**, lit son mémoire, sur les sommes produites par les valeurs des monômes les plus simples, multipliées par la fonction qui reste positive. C'est la solution de la question sur les nombres maxima des sommes, qui se présentent quand on veut déterminer les nombres limites des intégrales à l'aide de soustractions intégrales.

2^o SCIENCES NATURELLES. — **MM. Ovsiannikof et Strauch** présentent le travail de **M. Tioumiantzef** intitulé *Matériaux pour servir à l'étude de la fonction rythmique du cœur*. Dans ce mémoire, fait au laboratoire du professeur Doghiel à l'Université de Kazan, l'auteur démontre par de nombreuses expériences, que les différentes parties du cœur de la grenouille sont pour ainsi dire autonomes; chacune de ces parties est pourvue d'un appareil moteur et d'un appareil modérateur; chacune aussi peut se contracter périodiquement. — **M. Strauch** dépose sur le bureau son mémoire sur la collection des tortues dans le Musée zoologique de l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg. C'est une liste de 852 exemplaires de tortues qui se trouvent dans les collections du musée académique. Ces exemplaires re-

présentent 126 espèces différentes, soit plus de la moitié des espèces de chéloniens actuellement connus en général. Parmi ces espèces, deux sont complètement nouvelles, et plusieurs autres présentent des particularités qui les font distinguer des espèces déjà décrites et auxquelles ils appartiennent comme variétés. A la suite de la liste, M. Strauch propose une nouvelle classification des Chéloniens différente de celle qu'il a élaborée en 1862, mais différente aussi de celle de Boulenger (de Londres) adoptée dans les catalogues du British Museum. M. Strauch trouve cette dernière par trop artificielle et compliquée; en outre, étant basée uniquement sur les caractères ostéologiques elle ne peut être adoptée que quand on possède les squelettes des animaux. Suivant lui les caractères ostéologiques ne sont nullement plus constants que ceux tirés de l'extérieur de l'animal; néanmoins il y a corrélation entre ces deux ordres de caractères et il est possible de les accorder. En tenant compte des deux catégories de caractères M. Strauch arrive à diminuer les coupures dans la classification: il divise les Chéloniens en deux sous-ordres, comprenant 5 familles et 32 genres; tandis que la classification de M. Boulenger, outre les deux sous-ordres, comporte encore trois sections appelées « super-familles », 11 familles et 48 genres. Un tableau dichotomique résume les caractères des genres, familles, etc. donnés en détails dans le texte. — MM. Schmidt et Karpinski présentent la communication préliminaire de M. Mikvitz sur le genre *Obolus* (Eichwald). Ce brachiopode est un des fossiles les plus caractéristiques des terrains cambriens et siluriens inférieurs de la Russie. Tout un étage du cambrien russe porte même le nom de grès à *Obolus*. Cependant les caractères du genre ont été jusqu'à présent fort mal établis, surtout à cause de l'état défectueux des échantillons. Le travail de M. Mikvitz comble cette lacune: grâce à une riche collection qu'il a mis plusieurs années à constituer, il est arrivé à faire une étude monographique complète du genre *Obolus*; en attendant la publication du travail in-extenso, il donne dans sa note préliminaire la diagnose du genre accompagnée de figures.

O. BACKLUND, Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Une phrase de la communication de M. Adler, faite à la séance du 9 octobre, a été, dans notre précédent numéro, altérée par une coquille. Il faut lire: M. A. Adler montre que le compas n'est pas nécessaire pour résoudre tout problème du second degré, et qu'il suffit d'opérer soit avec une règle formée par deux lignes parallèles, soit avec une équerre à angle droit ou à angle aigu.

Séance du 6 novembre 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Auguste Adler: Sur la théorie des constructions de Mascheroni. Dans son ouvrage: *La Geometria del compasso* Pavia, 1797, Mascheroni montre que toutes les constructions géométriques qu'il d'ordinaire se font à l'aide de la règle et du compas (par exemple toutes celles qui se rattachent à un problème du second degré), peuvent être exécutées à l'aide du compas seul. Mais ces constructions n'ont entre elles qu'une liaison artificielle et sont spéciales à chaque cas particulier; l'auteur, dans le mémoire actuel, cherche à les réunir dans une théorie générale; il montre comment l'application de la transformation par rayons vecteurs réciproques conduit à résoudre toutes ces questions d'une manière uniforme par l'emploi du compas seulement. — M. W. Wirtinger: Sur les fonctions qui satisfont à certaines équations fonctionnelles. — A. Winckler: Sur le multiplicateur des équations différentielles du premier ordre.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Von Lang montre que certaines relations entre la pression des vapeurs et d'autres grandeurs physiques, auxquelles est arrivé J. J. Thomson à l'aide des équations générales de la dynamique, se peuvent déduire des lois de la thermodynamique. — M. Gangl v. Ehrenwerth: Sur la métallurgie du fer. — M. Rudolph Wegscheider: Sur l'éther éthylique de l'acide hémipique. L'auteur montre que sous l'influence de l'acide chlorhydrique une dissolution alcoolique d'acide hémipique donne de l'éther éthylique de cet acide, bouillant à 72°.

Emile WEYR, Membre de l'Académie.

CHRONIQUE

L'ÉLOGE ACADÉMIQUE D'ED. PHILLIPS

Chaque classe de l'Institut a sa physionomie propre et ses traditions. En quelque sorte fondamental et obligatoire à l'Académie française, le discours est au contraire banni de l'Académie des Sciences. La réception d'un membre nouveau fournit toujours à la première l'occasion d'une joute oratoire. Il en est tout autrement à l'Académie des Sciences. On y prend séance sans solennité littéraire. Cependant depuis quelques années s'y introduit l'usage que le nouvel élu y prononce l'éloge de son prédécesseur.

C'est à ce titre que notre éminent collaborateur M. H. Léauté vient d'entretenir ses confrères de la vie et des travaux d'Ed. Phillips¹. Cette étude, d'une remarquable élégance de style, a fait sensation. L'orateur ne s'est pas contenté d'exposer la série des découvertes du savant; il a de plus magistralement défini le caractère de la science que Phillips avait si brillamment cultivée, l'esprit de ses méthodes et la portée de ses résultats; l'exorde de son discours constitue à ce point de vue une véritable déclaration de principes où la profondeur des aperçus et la finesse des idées le disputent à la pureté de la forme:

« La mécanique appliquée, a-t-il dit, est intermédiaire entre la mécanique rationnelle et la mécanique pratique. La première, ne considérant que des êtres fictifs, à propriétés pré-

cises et simples, admet l'entière rigueur des considérations mathématiques. La seconde s'occupant des corps naturels, à propriétés souvent mal définies, peu connues et toujours complexes, s'entend tout conception théorique et ne relève que de l'expérience. Entre elles, participant de l'une et de l'autre, utilisant à la fois les enseignements des deux, appliquant les ressources de l'analyse en même temps que les résultats expérimentaux, se place la mécanique appliquée.

« Son développement est de date récente et, pour en trouver l'origine, il suffit de remonter à moins d'un siècle. Elle apparaît avec la physique mathématique, et ces deux sciences, nées au même moment, se constituent simultanément; leur marche pendant plus de cinquante ans est parallèle et les Mémoires de Prony, de Navier, de Poisson, de Corioli et de Clapeyron sont contemporains des Mémoires de Laplace, de Fourier, d'Ampère, de Poisson et de Cauchy.

« Ce n'est point là l'effet du hasard; une raison supérieure préside à ce parallélisme; la mécanique appliquée et la physique mathématique ont plus d'un point commun. Abordant les questions dans le même esprit, usant des mêmes procédés, chacune d'elles met en œuvre les méthodes des mathématiques pures après avoir fait des hypothèses simplificatives qui en permettent l'application, et chacune d'elles, en raison même de ces hypothèses, doit recourir à l'expérience pour vérifier les résultats obtenus.

« La mécanique appliquée trouve d'ailleurs souvent dans la physique mathématique un point de départ et un appui; elles se rencontrent dans de nombreuses questions et ne se séparent guère nettement que par le but poursuivi. La physique mathématique a pour objectif dernier la recherche de la constitution intime des corps et des lois qui la régissent:

¹ Séance du 17 novembre 1890.

la mécanique appliquée, au contraire, laisse systématiquement de côté cette constitution et donne simplement aux praticiens des règles rationnelles pour l'édification de leurs constructions ou l'agencement de leurs machines.

« Cette différence de but explique la différence d'éclat des deux sciences. La physique mathématique s'attaque à des questions d'un caractère élevé; la mécanique appliquée traite des sujets plus modestes, aussi ardu peut-être, mais qui n'ont pas le prestige des grands problèmes de la philosophie naturelle.

« C'est une science difficile, toute de science, capable de fournir, en des mains habiles, de précieux résultats, mais exigeant de ceux qui s'y consacrent des qualités toutes spéciales.

« Il ne leur suffit pas, en effet, de posséder toutes les connaissances théoriques nécessaires pour établir les équations, les transformer, les discuter ou les résoudre; il ne leur suffit pas d'être en mesure de diriger les expériences pour obtenir des coefficients, apprécier des grandeurs relatives de termes ou vérifier des conclusions; il leur faut encore distinguer au préalable dans chaque phénomène le point important et la voie à suivre; ne jamais perdre de vue, au milieu de la complication des calculs, le but à atteindre; se rendre compte du champ d'exactitude des formules obtenues; démêler ce qui est négligeable et ce qui ne l'est pas; raisonner juste enfin tout en cessant de calculer avec rigueur. »

Phillips réunissait ces rares qualités. Le défaut d'espace nous empêche de reproduire *in extenso* l'étude que M. Léauté lui a consacrée. Dans l'impossibilité d'indiquer même ses principales découvertes, nous nous contenterons de rappeler ses beaux travaux sur les ressorts, la coulisse de Stephenson, les ponts métalliques, la chronométrie.

Dans le calcul des ponts pour chemins de fer on n'avait point pris garde, au début, que la charge agit non seulement par son poids et sa position, mais aussi par l'inertie due à sa vitesse. Phillips résolut le problème non en pur algébriste, mais en praticien; utilisant l'analyse sans s'y asservir, il indiqua, dans cette œuvre « éclatante », une solution qui, bien qu'approchée, satisfaisait à tous les besoins des applications.

« Cette solution, disait de Saint-Venant, se distingue par la hardiesse des expédients, et le savant géomètre n'admettait pas qu'elle fût justifiée. La critique a sa raison d'être. Il n'est ni évident, ni même vrai que l'inconnue puisse se représenter ainsi et Phillips, sans en être effrayé, s'en aperçut bien. Quand il voulut écrire la condition initiale de l'immobilité de la poutre, il ne le put pas; toutes les constantes étaient déterminées avant d'en arriver là; il dut se contenter de prouver, ce qui lui suffisait d'ailleurs, que les mouvements vibratoires résultant d'ébranlements initiaux étaient, dans les limites des applications, sans influence sensible.

« Cette objection ne diminue pas la valeur de ce beau Mémoire; elle ne touche même en rien au degré d'exactitude pratique de ses conclusions. Au point de vue mathématique, de Saint-Venant avait raison; au point de vue de la mécanique appliquée Phillips était dans son droit: il n'étudiait pas la question théorique des vibrations dues à une masse mobile, mais bien le problème du passage d'un train sur un pont. La différence de but explique et fait disparaître la contradiction. »

Ce remarquable Travail constitue encore aujourd'hui le dernier mot du problème.

Mais ce sont surtout les recherches de Phillips sur la chronométrie qui ont rendu son nom célèbre :

« Une question fondamentale se présentait en effet. Réaliser dans les appareils portatifs qui servent à mesurer le temps une précision comparable à celle des horloges fixes. Or, pour ces dernières, l'exactitude obtenue tient à l'emploi du pendule et à l'isochronisme des petites oscillations. Pour les montres, où le spiral imaginé par Huyghens remplace le pendule, il fallait trouver un moyen d'assurer l'isochronisme.

« On savait déjà par des expériences de Pierre Le Roy que dans tout ressort plié en hélice il existe une certaine longueur correspondant à des durées égales pour les grandes et petites oscillations; on connaissait un Mémoire fort intéressant de Ferdinand Berthoud, remontant à près d'un siècle, dans lequel il était arrivé à formuler quelques règles généralement admises; on avait essayé enfin, à de nombreuses reprises, de résoudre la question en donnant aux extrémités du spiral une forme notablement différente de la forme hélicoïdale, mais on ne possédait pas de procédé certain pour atteindre le but cherché.

« L'extrême complication de forme du ressort spiral semblait d'ailleurs rendre son étude fort difficile; Phillips cependant l'aborde par la théorie de l'élasticité. Il part de ce principe que si l'on construit le spiral de telle sorte que le moment de son action soit, à tout instant, proportionnel à l'angle d'écart du balancier, les oscillations sont certainement isochrones, puis il démontre que ce résultat peut être produit de deux façons, soit en annulant les pressions latérales exercées sur l'axe du balancier, soit en plaçant le centre de gravité du spiral sur cet axe et l'y maintenant pendant la durée du mouvement. Le premier procédé n'exige des courbes terminales qu'une condition très simple relative à leur centre de gravité et il se trouve qu'alors le second est vérifié. Ainsi ces deux manières d'assurer l'isochronisme, si différentes en apparence, rentrent l'une dans l'autre et se réalisent en même temps, d'une infinité de manières, par la forme des courbes terminales.

« La théorie de Phillips fut immédiatement appliquée de tous côtés et l'horlogerie adopta ses tracés sans lui valoir la portée des praticiens dans un manuel élémentaire. Rarement succès scientifique fut plus rapide et plus éclatant. Tous les concours de chronomètres mirent en évidence l'incontestable supériorité des courbes indiquées et l'on peut dire que de cette découverte datent les progrès les plus décisifs de l'horlogerie de précision. »

C'est un art auquel Phillips n'a cessé de se consacrer. Il a successivement étudié le réglage des chronomètres, l'influence du balancier sur l'isochronisme, la compensation des températures, etc. Tous ces travaux sont marqués au coin de la plus scrupuleuse conscience :

« Il ne les publiait d'ordinaire qu'après avoir, pendant une longue période, réuni des expériences pour en vérifier les résultats; jamais satisfait de lui-même et toujours disposé à l'être des autres, incapable d'appeler l'attention sur ses travaux, mais prêt en toute occasion à mettre en lumière ceux de ses élèves, il a été le type parfait du savant sincère, bienveillant et modeste; il laisse, avec une œuvre considérable, dont certaines parties sont de premier ordre, le souvenir d'un esprit éminent, d'un professeur remarquable et d'un homme de bien. »

Quoique Phillips soit mort avant la fondation de cette *Revue*, et que sa biographie ait été faite ailleurs, il nous a paru de circonstance de rappeler ses principaux titres à la reconnaissance publique en raison de la haute importance de son œuvre et de la faveur marquée avec laquelle l'Académie vient d'accueillir l'hommage rendu par M. Léauté à sa mémoire.

Louis OLIVIER.

NOUVELLES

LES EXPÉRIENCES DE M. ROBERT KOCH SUR LA GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE

Peut-être nos lecteurs s'étonneront-ils que nous ne consacrons pas un article étendu à la question du jour: la découverte, annoncée par M. Koch, d'un remède contre la tuberculose. C'est que jusqu'alors l'auteur a gardé secret son procédé. Ce silence a été interprété d'une façon fâcheuse: certains accusent le savant de ne pouvoir satisfaire les espérances qu'il a fait naître,

d'autres de vouloir exploiter comme un industriel des produits d'efficacité douteuse. En aucune façon nous ne voulons nous associer à ces reproches. Ils ne nous paraissent bien fondés que dans le cas où M. Koch persisterait quelque temps encore à ne point divulguer sa méthode. S'il la faisait connaître avant de l'avoir suffisamment éprouvée, elle risquerait sans

doute d'être compromise par l'impéritie d'une multitude d'expérimentateurs improvisés. Il en a exposé les premiers résultats pratiques, afin, dit-il, de mettre un terme aux commentaires et fausses nouvelles dont ses recherches sont depuis plusieurs mois l'objet dans toute la presse. Mais ces *indiscrétions*, dont il se plaint, n'est-ce pas lui-même qui les a suscitées en déclarant officiellement au Congrès de Berlin qu'il avait trouvé le moyen d'enrayer la tuberculose chez les Animaux et allait essayer de la guérir chez l'Homme.

Quoi qu'on pense d'ailleurs de cette attitude, peu conforme aux mœurs scientifiques, il serait puéril de s'y arrêter en présence de la grande question qui est en cause. De toutes les maladies la plus meurtrière, — celle qui à Paris cause le cinquième des décès, — va-t-elle être vaincue? M. Koch a par sa science trop de droits à l'estime publique pour qu'on ne doive accorder crédit à ses affirmations. Immédiatement après avoir lu son mémoire, M. Pasteur lui a télégraphié ses chaleureuses félicitations¹, reconnaissant assurément avec une joie profonde, dans la grande découverte de Robert Koch, la fille légitime de son œuvre.

La gloire de notre illustre compatriote grandit avec la science que son génie a fondée. « D'autres, a dit excellemment le Professeur Grancher, ont pu et pourront suivre la trace de Pasteur, et, dans le chemin qu'il a frayé, faire d'importantes et retentissantes rencontres; ils seront, bon gré mal gré, qu'ils portent un nom français ou allemand, espagnol ou italien, russe ou anglais, ses élèves et ses disciples². »

Dès que les expériences célèbres de M. Villemin eurent établi le caractère transmissible de la tuberculose, il fut indiqué que l'étude de cette affection relevait des méthodes pastoriennes. Physiologistes et médecins s'y livrèrent avec ardeur. M. Koch isola le premier l'agent bactérien de la maladie et en démontra la spécificité pathogénique. L'ennemi connu, il n'y avait plus de doute qu'on arriverait à le combattre. Le progrès des recherches sur l'immunité ne cessa d'encourager cet espoir. Les fines observations de M. Metchnikoff nous révélèrent l'action destructive qu'exercent, en certaines circonstances, sur beaucoup de microbes envahisseurs, quantité de cellules, — fixes ou libres, — de l'économie. Bientôt la possibilité de la vaccination chimique, prévue par M. Chauveau, fut établie par les expériences de MM. Charrin, Salmon et Smith, Chamberland et Roux, Chantemesse et Widal, Roux et Yersin; l'influence profonde de l'état des humeurs sur les microbes et leurs produits, mise en lumière par plusieurs expérimentateurs, notamment MM. Bouchard et Charrin. Ces découvertes conduisaient à des vues nouvelles, dont M. le professeur Bouchard a tenté la synthèse dans une longue étude publiée ici-même³.

Ces perfectionnements successifs de la théorie générale guidèrent les recherches sur la tuberculose. On pouvait, copiant un procédé original de M. Pasteur, essayer d'atténuer le bacille de Koch par un artifice de culture afin d'en faire un vaccin — soit préventif soit curatif, — ou bien utiliser dans ce but quelques-

unes des matières qu'il excrète dans les milieux où il vit. Dans cet ordre d'idées ont paru en France depuis quelques années d'importants travaux. Parmi les plus récents mérite d'être particulièrement signalée la communication faite le 18 août dernier à l'Académie des Sciences par MM. Grancher et H. Martin. Ces savants injectaient des cultures atténuées de bacille de Koch à des lapins et retardaient ainsi chez eux l'évolution de la tuberculose.

MM. le P^r Ch. Richet et le D^r Héricourt avaient déjà obtenu chez cette espèce un résultat analogue par transfusion intrapérionéale de sang de chien. Dans un travail présenté le 15 de ce mois à la Société de Biologie, ils ont constaté que l'injection de cultures anciennes de bacille tuberculeux portées à 100° — par conséquent n'agissant plus que chimiquement — produisent le même effet, peut-être même une immunité plus durable. Bien que faites avec le bacille de la tuberculose aviaire, leurs expériences offrent un grand intérêt.

La Science doit acte de ces faits aux savants qui, les ayant découverts, les ont sans réticence révélés au public. C'est dans ce seul but que nous les avons rappelés, et non pas pour les opposer aux résultats, plus avancés, plus concluants qu'annonce M. Koch.

On ignore la composition du remède qu'emploie le célèbre bactériologiste; on sait seulement que c'est un liquide limpide, brunâtre, difficile à conserver. Sur la façon dont il agit nous sommes mieux renseignés. Absorbé par la voie digestive, il n'exerce aucune action sur l'organisme; c'est l'injection sous-cutanée qui est active; on la fait aux omoplates. Le médicament, ainsi administré, produit des effets surprenants. Chez l'homme sain, son action est peu appréciable. Tout au contraire, — fournissant un procédé nouveau et très délicat de diagnostic, — le médicament détermine chez les tuberculeux une vive réaction. La réaction est surtout locale lorsque la tuberculose elle-même est étroitement circonscrite, comme il arrive dans le *lupus* (tuberculose ulcéreuse cutanée) de la face; elle est généralisée quand la maladie est plus étendue, par exemple, chez les phthisiques.

Quant à son efficacité, elle semble attestée par la guérison du *lupus*. Le fait paraît décisif. On peut cependant se demander si le remède s'applique aussi heureusement à la phthisie. M. Koch avance en effet que son médicament agit directement non sur le bacille, mais sur le processus tuberculeux; le tissu malade qui cerne, en quelque sorte, le microbe, se tuméfie peu de temps après l'injection, rougit, manifeste des troubles nutritifs et finit par se mortifier⁴. Qu'advient-il dans le cas de la tuberculose généralisée? La maladie avancée sera-t-elle rebelle au traitement? Ce serait déjà beaucoup, ce serait un immense bienfait pour l'humanité, de pouvoir l'enrayer au début, à cette époque de son développement où l'auscultation commence à la révéler.

Cet admirable résultat semble sur le point d'être obtenu; c'est justice d'en proclamer la grandeur. Certains journaux nous ont paru laisser percer comme une sorte de dépit au sujet d'une découverte qui n'est pas française. Nous ne saurions partager ce sentiment. La France peut applaudir à toutes les découvertes de l'Etranger; elle à Pasteur.

LOUIS OLIVIER.

¹ Voici le texte de la dépêche envoyée par M. Pasteur et ses distingués collaborateurs au savant bactériologiste de Berlin : « M. Pasteur et les chefs de service de l'Institut Pasteur adressent leurs félicitations à Robert Koch pour sa grande découverte. » — M. Koch a répondu en annonçant l'envoi de son médicament à l'Institut Pasteur.

² Leçons d'ouverture de la clinique des enfants, 1887.

³ D^r Ch. BOUCHARD, *Essai d'une théorie de l'Infection*, dans la Revue du 15 août 1890, page 465.

⁴ Remarquons à ce propos que, si cette observation est exacte, elle semble renfermer la découverte d'un principe nouveau en biologie. Dans l'état actuel de la science, il est, croyons-nous, très difficile de l'expliquer.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES

PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

L'HYDRODYNAMIQUE MODERNE

ET L'HYPOTHÈSE DES ACTIONS A DISTANCE

Cauchy, en 1815, et Poisson, en 1831, ont ouvert à l'Hydrodynamique deux voies nouvelles : Cauchy, en montrant dans son mémoire *sur la Théorie des Ondes*¹, le parti que l'on peut tirer en Hydrodynamique, de ces grandeurs qu'il a introduites dans la science sous le nom de *rotations moyennes* et qu'on appelle aujourd'hui plus généralement des *rotations moléculaires* ou *tourbillons* (*Wirbel* en Allemagne, *Vortices* en Angleterre); Poisson, en posant et résolvant, dans le cas de la sphère, le beau problème du mouvement d'un corps solide dans un fluide.

Green, en 1833, l'a résolu pour l'ellipsoïde, dans le cas d'une simple translation.

Mais ces questions étaient sans doute trop en avance sur leur époque; car elles sont restées sans suite pendant plus d'un quart de siècle.

I

1. Les admirables propriétés des tourbillons n'ont été découvertes qu'en 1858 par Helmholtz, bien qu'elles n'expriment pas autre chose que les intégrales intermédiaires des équations de l'Hydrodynamique de Lagrange, découvertes par Cauchy dans le mémoire précité, et qu'à ce point de vue, on en puisse dire ce que Jacobi a dit d'un célèbre théorème de Poisson, à savoir : que pendant quarante

ans, ces propriétés sont restées à la fois découvertes et cachées.

Quant au problème du mouvement d'un corps solide dans un fluide, il a été repris en 1852 par Dirichlet, en 1856 par Clebsch qui l'a résolu pour l'ellipsoïde dans le cas général, puis par Kirchhoff et d'autres géomètres.

Il peut être envisagé à deux points de vue différents. On peut supposer qu'on imprime à un corps plongé dans un fluide un mouvement donné et chercher quel sera le mouvement correspondant du fluide. Si celui-ci est incompressible, la question ne comporte que des conditions d'ordre cinématique. Il ne devient mécanique que si l'on veut ensuite se rendre compte de la pression ou résistance que le corps éprouve de la part du fluide, ce qui est facile.

On peut, au contraire, supposer le corps lancé dans le milieu et abandonné ensuite à lui-même, et chercher le mouvement qui en résultera pour l'ensemble du système matériel formé par le corps et le fluide. Le problème devient alors dynamique.

2. Les méthodes suivies pour la mise en équation du problème s'étendent aisément au cas de deux ou plusieurs corps mobiles dans un même milieu, ce qui a naturellement attiré l'attention des géomètres sur la différence entre les mouvements que prend chaque corps, dans des circonstances données, suivant qu'il est lancé seul dans le milieu, ou que d'autres corps y sont lancés dans son voisinage.

¹ Ce Mémoire, qui a remporté le prix d'Analyse mathématique de l'Académie des Sciences en 1815, n'a été publié au Recueil des savants étrangers qu'en 1827.

Cette différence, à supposer que le phénomène se passe dans un milieu non perceptible à nos sens, ne pourrait s'expliquer qu'en admettant l'hypothèse d'une *action à distance* entre les corps. C'est ainsi qu'est née cette hypothèse.

Sans doute, ni Newton ni ses successeurs n'ont entendu attribuer à la matière la vertu d'attirer, à distance, une autre matière. On sous-entend qu'il peut bien ou qu'il doit exister un milieu produisant ou transmettant l'action ; mais on dit que tout se passe comme si, le milieu n'existant pas, la vertu attractive appartenait réellement à la matière. Mais *tout* ne peut certainement pas se passer ainsi. Tout au plus *certain* phénomènes le pourraient-ils d'une façon plus ou moins approchée. De ce nombre sont les phénomènes célestes. Pour eux, l'expérience le prouve, l'approximation obtenue en substituant l'attraction newtonienne à l'action du milieu est tellement grande que cette manière de procéder suffira peut-être toujours à les expliquer tous.

Mais il n'en est pas de même pour les phénomènes terrestres.

Là, l'hypothèse des actions à distance a reçu une première atteinte par le fait que la capacité d'un condensateur électrique dépend du diélectrique dont il est formé. On panse la blessure en admettant que le coefficient d'attraction dépend de ce diélectrique ; mais ce moyen empirique ne la supprime pas. L'atteinte subsiste et prouve que, comme toutes les hypothèses, celle des actions à distance ne chemine avec la vérité que tant que celle-ci reste superficielle, mais s'en écarte dès qu'elle s'enfonce dans l'une des innombrables profondeurs où nous ne pouvons pas la suivre, faute d'une connaissance suffisante de la matière pondérable et du milieu qui remplit l'espace.

C'est donc un exercice d'un haut intérêt que celui qui a pour objet d'essayer de se rendre compte, sur le seul milieu bien défini que nous connaissons, — celui formé par un fluide parfait et incompressible, — comment la présence du milieu universel qu'on ne connaît pas encore, mais dont tout fait présumer l'existence, pourrait produire, par simple communication de mouvement, ce que nous appelons des actions à distance. Et c'est là sans doute une des raisons pour lesquelles tant de grands géomètres se sont occupés d'Hydrodynamique dans le dernier demi-siècle.

3. Si l'on voulait seulement, et cela même peut ne pas être sans utilité, se faire une idée plus ou moins grossière de la façon dont les transmissions d'actions pourraient se faire par un milieu, il serait aisé d'en imaginer beaucoup.

Supposons, par exemple, qu'entre Paris et Marseille on ait construit une suite ininterrompue de roues d'engrenages se commandant les unes les

autres. Dès qu'on imprimera un petit mouvement à la première roue, celle de Paris, il se produira presque instantanément un mouvement correspondant dans la dernière.

On a donc là un moyen de transmettre, par communication matérielle, des signaux convenus ou dépêches aussi rapidement que par fil télégraphique.

Pourquoi, dans le fil, n'existerait-il pas un fluide dont, sous de certaines influences, les diverses particules, *tourbillonneraient* sur elles-mêmes, se transmettant leurs mouvements comme le feraient de petites roues d'engrenage ?

On peut concevoir d'autres images qui, bien entendu, pas plus que la précédente, ne pourraient prétendre, de près ou de loin, à figurer la vérité.

W. Thomson a imaginé les atomes tourbillons (*Vortex-atoms*, *Ph. Mag.*, 1867). C'est, jusqu'à preuve expérimentale, un rêve, mais le rêve d'un homme de génie.

On voit, en tous cas, par ce qui précède, combien l'étude des tourbillons s'impose et comment les deux voies, en apparence si différentes, ouvertes par Cauchy et Poisson et reprises avec éclat par Helmholtz et Dirichlet, peuvent se rapprocher et se confondre.

C'est ce qui ressort très nettement d'un mémoire capital de W. Thomson : *On vortex motion*, où il a repris et développé les travaux d'Helmholtz, après leur avoir donné ce cachet personnel et nouveau que son génie imprime à toutes choses.

4. Avec lui un grand nombre de géomètres ou de physiciens anglais ou américains sont entrés dans la voie des recherches hydrodynamiques et pendant qu'ailleurs, Clebsch, Kirchhoff, C. Newmann, en Allemagne, Bjerkness en Norvège, Boltzmann à Vienne, Beltrami en Italie, etc., poursuivaient des recherches d'ordre plus ou moins général, les maîtres anglais, notamment le professeur Greenhill, lord Rayleigh, Hicks, Hoppe, Lamb, Basset, Hill, Darwin etc., remplissaient les recueils, des applications les plus variées et les plus propres à bien illustrer les théories générales.

Du reste, l'Hydrodynamique a toujours été en honneur en Angleterre. Dès sa fondation, l'Association britannique s'est fait présenter, par le professeur Challis, un rapport sur l'état de cette science. Un peu plus tard, en 1846, un rapport analogue lui a été présenté par Stokes.

Le troisième rapport sur cette matière date de 1881. Il est dû au professeur Hicks et contient l'histoire très circonstanciée des progrès d'ordre général accomplis depuis la rédaction du précédent rapport, c'est-à-dire depuis 1846.

Il est complété par un autre rapport relatif à l'histoire des travaux d'ordre particulier accomplis

pendant la même période; ce second rapport a été présenté à la session de 1882.

Pour compléter ces indications générales, je dois mentionner un travail historique très bien fait, publié en France, par M. Brillouin, dans un recueil d'un haut intérêt, quoiqu'en raison de son origine récente, il n'aie pas encore toute la notoriété qu'il mérite et qu'il acquerra : les *Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse*. Le travail de M. Brillouin se trouve dans le volume de 1885.

II. — HYDROCINÉMATIQUE

5. Les progrès accomplis en Hydrodynamique sont, les uns, — et ce ne sont pas les moins importants, — d'ordre purement cinématique, et les autres d'ordre mécanique.

La Cinématique des fluides, ou plus généralement la Cinématique des matières continues, a été, comme tant de branches de la science, fondée, de toutes pièces, par Cauchy.

Cauchy a montré que, par le seul fait de la continuité supposée à un fluide, de la continuité et de l'uniformité supposées aux vitesses de ses différents points, découlent, dans la répartition de ses vitesses autour de chaque point, des propriétés générales et rigoureuses de même nature que celles qu'enseigne la théorie de la courbure des surfaces.

Elles se classent en deux espèces : celles qui se rapportent à la *déformation* de chaque particule infiniment petite de fluide, et celles qui se rapportent à son mouvement absolu.

Si l'on considère, à un instant donné, tous les éléments linéaires fluides de longueurs infiniment petites, issues d'un point d'un fluide en mouvement, leurs vitesses de dilatations ainsi que les vitesses avec lesquelles varient les angles qu'ils font entre eux, s'expriment rigoureusement à l'aide d'une certaine fonction du second degré des cosinus de leurs directions, cette fonction du second degré jouant exactement le même rôle que l'indicatrice dans la théorie de la courbure des surfaces.

Il existe, à chaque instant et en chaque point d'un fluide en mouvement, trois directions rectangulaires et, en général, seulement trois, qui possèdent cette propriété : que les vitesses avec lesquelles varient les angles des éléments fluides placés suivant ces directions sont rigoureusement nulles ou, si l'on veut, que pendant un temps infiniment petit dt , le trièdre trirectangle que forment ces éléments reste trirectangle (aux infiniment petits près de l'ordre de dt^2).

Si, à présent, on envisage les rotations angulaires des éléments linéaires issus d'un point, il résulte de ce qui vient d'être dit que les trois arêtes et, par suite, les trois faces de ce petit trièdre trirectangle fluide, ont, à l'instant consi-

déré, rigoureusement la même vitesse angulaire, comme si ce trièdre était solide.

De plus, il se trouve que deux éléments linéaires symétriques par rapport à l'une des faces de ce trièdre ont, *relativement au trièdre*, des vitesses égales et opposées ou, en moyenne, nulles.

Voilà pourquoi Cauchy a appelé la rotation du trièdre : *rotation moyenne* du fluide au point et à l'instant considérés ¹.

On peut aussi donner de la rotation moyenne une définition mécanique : ce serait la rotation que prendrait une sphère fluide de rayon infiniment petit décrite autour du point considéré comme centre, si elle venait à être brusquement solidifiée.

C'est cette rotation qu'Helmholtz a appelée un tourbillon (*Wirbel*) ou une rotation moléculaire.

Ainsi, un mouvement non tourbillonnaire est celui où ces rotations sont nulles ².

6. Un mouvement peut être tourbillonnaire dans une partie d'un fluide et non tourbillonnaire dans une autre, parce que le mouvement d'un fluide est continu si les composantes des vitesses sont des fonctions continues, alors même que leurs dérivées partielles premières et, par suite, les composantes des rotations moléculaires, présenteraient des discontinuités.

Les vitesses elles-mêmes peuvent en présenter, ainsi qu'on le dira plus loin.

7. Ces préliminaires posés, si l'on veut avoir une idée exacte des progrès accomplis sur ce point fondamental de l'Hydrocinématique, il faut remonter à Lagrange.

Lagrange, dans la Mécanique analytique, a longuement insisté sur un théorème qui, aujourd'hui, s'énoncerait ainsi : Si, en un point d'un fluide en mouvement, la rotation moyenne est nulle à un certain instant, elle est nulle toujours; ou, sous une forme moins rigoureuse, mais peut-être plus compréhensive : *une particule fluide qui ne tourne pas à un certain instant, ne tournera jamais*.

On sous-entend dans cet énoncé : 1° que les forces agissantes sont conservatives ou dérivent d'une fonction de forces; 2° qu'il existe une rela-

¹ Si l'on désigne par ξ, η, ζ , les composantes de cette rotation; par u, v, w , les composantes de la vitesse au même point, par x, y, z , les coordonnées de ce point à l'instant considéré, Cauchy a montré qu'on a simplement :

$$\left. \begin{aligned} 2\xi &= \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} \\ 2\eta &= \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \\ 2\zeta &= \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

² C'est-à-dire un mouvement tel que les composantes rectangulaires u, v, w , de la vitesse soient les dérivées partielles d'une même fonction de x, y, z, t , appelée fonction ou potentiel des vitesses.

tion entre la pression et la densité du fluide, conditions dynamiques généralement remplies, la première exactement, la seconde plus ou moins approximativement et qui, ensemble, se traduisent par cette condition cinématique que les accélérations dérivent d'une *fonction d'accélérations*.

8. La démonstration que Lagrange a donnée de ce théorème permettait de croire qu'il peut être sujet à d'innombrables exceptions. C'est encore à Cauchy que revient l'honneur de l'avoir établi d'une façon définitive.

Ce théorème est capital en ce que, parmi les éléments *purement cinématiques* d'un fluide en mouvement, il en fait découvrir un : à savoir la rotation moléculaire, qui est *indestructible* par les forces de la nature, par les forces conservatives qui agissent sur le fluide, aussi bien que par les pressions de celui-ci. Si la rotation n'existe pas, elle ne naîtra pas, et, si elle est née, elle subsistera. Elle ne peut naître ou s'éteindre que par des chocs brusques, par des forces impulsives.

Un être qui possède de telles propriétés ne saurait être sans importance dans la nature.

Du temps de Lagrange, on ne connaissait que la masse qui les possédait : depuis, Sadi Carnot et Robert Mayer ont découvert que l'énergie les possédait aussi. Mais qu'un être purement géométrique, purement cinématique les possède à son tour, cela est nouveau et inattendu. Est-ce le présage lointain de cette ère souvent prédite où les notions de force et de masse disparaîtront et où la Cinématique prendra la place de la Mécanique ? En tous cas, on voit combien ce théorème de Lagrange est suggestif, et combien il était utile que Cauchy vint en établir la certitude absolue.

Plus tard, en 1846, une autre démonstration en a été donnée par Stokes.

9. Mais ce n'est qu'en 1838 qu'il est sorti de l'ombre et presque de l'oubli, par le mémoire d'Helmholtz : *Über integrale der Hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen*.

Concevons qu'à un instant donné, au sein d'un fluide animé d'un mouvement tourbillonnaire, on mène par chaque point du fluide une ligne tangente en tous ses points à la rotation moléculaire en ce point¹.

Nous appellerons ces lignes des *lignes tourbillonnaires* (*Wirbellinien*).

Si, par tous les points d'une courbe C on mène des lignes tourbillonnaires, on obtient une *surface tourbillonnaire* dont la courbe C est la directrice.

Si la directrice est une courbe fermée de dimen-

sions infiniment petites, on obtient une surface tubulaire. Le fluide qu'elle renferme sera appelé un *tube* ou un *fillet tourbillonnaire*.

Cela dit, Helmholtz a montré :

1° Que tout tube tourbillonnaire se compose perpétuellement des mêmes particules fluides ;

2° Que l'intensité d'un tube tourbillonnaire, c'est-à-dire le produit de la section transversale en l'un de ses points par la rotation en ce point est constante dans toute l'étendue du tube.

De cette dernière propriété il résulte que les lignes tourbillonnaires ne peuvent pas s'arrêter à l'intérieur du fluide ; qu'elles sont fermées ou se prolongent jusqu'à la surface ou jusqu'aux parois qui le limitent ;

3° Que l'intensité d'un tube tourbillonnaire, déjà constante, à un instant donné, comme nous venons de le dire, dans toute la longueur du tube, reste aussi, pour ce tube, invariable avec le temps,

De ces propositions, la seconde est, en quelque sorte, de définition¹ ; les autres sont établies comme le théorème de Lagrange, en admettant l'existence d'une fonction d'accélération.

10. On peut se demander si l'existence de cette fonction, qui est suffisante pour que les théorèmes 1° et 3° soient vrais, est aussi nécessaire.

Il est aisé d'établir, à cet égard, les propositions suivantes :

Convenons, pour un instant, d'appeler accélération rotatoire une ligne formée ; avec les composantes de l'accélération d'un point d'un fluide, comme la rotation moléculaire l'est, en vertu des équations (1), avec les composantes de sa vitesse. Alors on a ces deux propositions :

a) Pour qu'un élément d'une ligne tourbillonnaire contienne toujours, pendant son mouvement, la même matière fluide, il faut et il suffit que la rotation moléculaire de cet élément coïncide en direction avec son accélération rotatoire ;

b). Pour que son intensité ne varie pas avec le temps, il faut et il suffit que ces deux lignes soient perpendiculaires ;

c) Donc pour que les deux propriétés existent l'une et l'autre, il faut et il suffit que l'accélération rotatoire soit nulle, c'est-à-dire que les composantes de l'accélération soient les dérivées partielles d'une même fonction.

11. Ainsi, si cette dernière condition est remplie, ce que nous supposerons désormais, des lignes tourbillonnaires en nombre fini ou non, c'est-à-dire isolées ou continues placées dans un milieu fluide non tourbillonnaire, y conservent indé-

¹ Ces lignes sont définies par les équations différentielles :

$$\frac{dx}{\xi} = \frac{dy}{\eta} = \frac{dz}{\zeta}.$$

¹ Elle résulte de l'identité :

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} = 0.$$

finiment leur individualité et leurs intensités.

Elles nagent dans le fluide comme ferait un corps déformable.

Elles influent naturellement sur leurs mouvements réciproques et sur le mouvement du surplus du fluide.

Helmholtz a encore montré que si le fluide occupe l'espace illimité, chaque élément tourbillonnaire A produit en un point B placé à distance finie de lui, une vitesse égale en grandeur, direction et sens à l'action qu'un élément de courant électrique de même intensité que l'élément tourbillonnaire A exercerait sur un pôle magnétique placé en B.

Ces propriétés facilitent considérablement l'étude des lignes tourbillonnaires, surtout de celles qui sont isolées.

Cependant la difficulté de les constituer de façon que les composantes de l'accélération soient réellement, comme on le suppose, des dérivées partielles, reste entière et, sauf pour les tourbillons isolés où elle est plus abordable, pourvu toutefois qu'on se contente d'une première approximation, elle est très grande.

M. Helmholtz a étudié des cas de tourbillons rectilignes et parallèles répondant à des mouvements plans d'un fluide incompressible.

Un seul tourbillon de cette nature reste sensiblement fixe.

S'il y en a deux, ils tournent uniformément autour de leur centre de gravité qui reste fixe, le centre de gravité étant obtenu en leur attribuant des masses égales à leurs intensités.

Si celles-ci sont égales et contraires, les deux tourbillons prennent une translation commune.

Kirchhoff a montré qu'on peut aussi résoudre le problème relatif à trois tourbillons.

Le professeur Greenhill, par une application des plus ingénieuses de la méthode des images, a résolu des problèmes relatifs à des tourbillons rectilignes dans des milieux non plus illimités en tous sens, à savoir : 1° dans un milieu limité par deux parois formant un angle qui soit une partie aliquote de la circonférence; 2° dans un milieu contenu entre parois rectangulaires.

Dans le premier cas, la formule de Cotes fournit une solution finie extrêmement élégante.

Dans le second, la solution est fournie par les fonctions de Jacobi.

Comme tourbillons rectilignes en nombre illimité, Kirchhoff a étudié le cas d'un cylindre tourbillonnaire elliptique. Sa surface libre tourne uniformément autour de son axe pendant que les points intérieurs décrivent des ellipses homothétiques à la section droite de cette surface, en obéissant à la loi des aires. Cette définition plus

simple que celle de Kirchhoff est due à M. Brillouin.

12. Helmholtz a également étudié le cas d'un tourbillon circulaire unique dans un fluide qui se meut symétriquement autour de l'axe de la circonférence du tourbillon.

Un tel tourbillon ne modifie pas sensiblement son rayon, mais se meut avec une très grande vitesse parallèlement à l'axe.

On peut voir, presque sans calcul, en s'aidant des règles qui précèdent, que deux tourbillons circulaires de mêmes sens se meuvent dans le même sens, parallèlement à leur axe commun, celui d'arrière marchant plus vite et son rayon diminuant, celui d'avant marchant moins vite et son rayon croissant, de telle sorte qu'ils se dépassent alternativement en passant l'un dans l'autre.

Mais ces résultats ne constituent qu'une première approximation, et l'étude détaillée de ces tourbillons en forme de tore, soit au point de vue de leurs mouvements, soit au point de vue de leur stabilité, est extrêmement difficile et a donné lieu à d'importantes recherches dues notamment à W. Thomson, à J. J. Thomson et à Hicks.

13. Le mouvement tourbillonnaire le plus simple qu'on puisse imaginer est celui d'un liquide tournant uniformément autour d'un axe, ou, si l'on veut, en équilibre relatif par rapport à des axes animés d'un tel mouvement de rotation.

On serait ainsi amené, comme cas particulier de l'étude de ces mouvements, au problème des ellipsoïdes ou autres figures d'équilibre au sujet desquelles on doit de si beaux résultats à M. Poincaré.

On peut aussi généraliser la partie du problème relative aux surfaces ellipsoïdales en cherchant un mouvement ayant une surface libre de cette forme, cette surface tournant autour d'un axe pendant que les points intérieurs se meuvent relativement à elle. Il existe un mémoire très intéressant de Clebsch sur ce sujet.

III. — MOUVEMENT DE CORPS OU DE TOURBILLONS DANS UN FLUIDE NON TOURBILLONNAIRE.

14. Le problème du mouvement d'un ou plusieurs corps accompagnés ou non de *vortices* ou tourbillons n'offre plus aujourd'hui de difficulté, au point de vue de la mise en équation; on peut y appliquer les méthodes générales de Lagrange et d'Hamilton; on peut aussi, surtout quand il s'agit d'un seul corps, employer les principes les plus élémentaires de la Dynamique des corps solides.

Mais l'intégration des équations obtenues est très difficile.

Les difficultés sont très différentes suivant qu'on se borne au point de vue cinématique dont j'ai parlé plus haut, ou qu'on veuille traiter le pro-

blème dynamique ; mais elles sont grandes dans les deux cas.

Le problème cinématique résolu, comme je l'ai dit ci-dessus, d'abord par Poisson en 1831 pour la sphère, puis par Green en 1833 pour l'ellipsoïde supposé animé seulement d'un mouvement de translation, l'a été par Clebsch, pour l'ellipsoïde libre et par Kirchhoff pour un corps de révolution.

Le cas de deux sphères conduit à un problème pareil à celui de l'équilibre électrique de deux sphères résolu par Poisson, dans un de ses plus beaux mémoires. Il a été étudié par Kirchhoff, Hicks, C. Newmann, Bjerkness, etc. Celui de deux cylindres circulaires l'a été par Hicks et Greenhill.

C. Newmann a abordé le problème de la sphère dans le cas où le milieu, au lieu d'être indéfini, en tous sens, est limité d'un côté par un plan.

Il serait difficile, sans entrer dans des calculs qui ne seraient pas ici à leur place, de donner une idée des méthodes employées dans ce problème.

Il est très différent suivant que les corps plongés sont pleins ou, au contraire, évidés comme un anneau ou un cylindre creux.

Dans le premier cas, l'espace occupé par le fluide est dit *simplement connexe*, c'est-à-dire tel que n'importe quelle paroi analogue à un *mur de refends plein*, le sépare en deux parties non communicantes.

Dans le second, il est *multiquement connexe*.

Ainsi, l'espace ou volume limité par un tore est doublement connexe, parce qu'on peut y supposer une paroi pleine suivant une section méridienne, sans que cela empêche de se rendre en tous les points de l'espace.

L'espace extérieur à un tore est de même doublement connexe. Celui limité par deux tores est triplement connexe, parce qu'on peut concevoir deux parois sans supprimer les communications entre toutes les parties de l'espace.

Quand le fluide occupe un espace simplement connexe, il possède cette propriété remarquable que ses vitesses, à chaque instant, ne dépendent que de celles des corps qui y sont plongés à ce même instant, et non des mouvements antérieurs.

Cette propriété n'existe plus s'il occupe un espace à connexion multiple, et on conçoit que cela change la question du tout au tout.

La différence provient de ce que, dans un espace simplement connexe, le potentiel des vitesses est, comme les vitesses elles-mêmes, une fonction uniforme, c'est-à-dire ayant toujours la même valeur en chaque point, de quelque manière qu'on arrive en ce point. Dans le second, quoique les vitesses soient toujours supposées uniformes comme elles doivent l'être par nature, la fonction dont elles dérivent ne l'est plus nécessairement.

Elle peut avoir deux ou plusieurs séries de valeurs en chaque point, suivant les chemins suivis pour y arriver.

La question du tore a été étudiée par W. Thomson qui, le premier, a bien mis en évidence la différence dont je viens de parler, par Kirchhoff, Boltzmann, Bjerkness, etc.

15. Les principaux résultats simples auxquels ont conduit ces recherches au point de vue des actions à distance, sont les suivants :

1° Deux sphères pulsantes exercent une action l'une sur l'autre, analogue à celle de deux sphères électrisées, sauf que les effets sont renversés : il y a attraction pour des pulsations concordantes, et répulsion pour des pulsations discordantes ;

2° Deux sphères dont les centres reçoivent des mouvements de va-et-vient exercent l'une sur l'autre des actions analogues à celles de deux petits aimants qui seraient dirigés suivant les lignes de leurs mouvements. Il y a également renversement du sens des actions relativement à ce qui se passe dans la nature.

3° Deux sphères animées de mouvements rectilignes et uniformes exercent des actions analogues ;

4° Deux cylindres allongés marchant avec des vitesses très différentes dans le même sens s'attirent également.

Kirchhoff a montré très simplement que deux anneaux de très petites sections mus dans un fluide incompressible exercent l'un sur l'autre exactement la même action que celle que donnerait la merveilleuse formule d'Ampère, s'ils étaient parcourus par des courants électriques.

Ce rapprochement avec les découvertes d'Ampère est bien remarquable.

Les actions entre sphères pulsantes ou oscillantes ont été vérifiées expérimentalement par M. Bjerkness. Ses appareils ont fonctionné à l'Exposition d'Electricité de 1881, ainsi qu'à l'Exposition universelle de 1889.

En ce qui touche celles des corps allongés, comme des cylindres, elles se vérifient très bien sur les bateaux et sont bien connues des marins.

Dans le cas d'un seul corps plongé dans un fluide, les résultats les plus simples obtenus sont les suivants :

1° Il existe toujours trois directions rectangulaires telles qu'un corps lancé sans rotation dans l'une d'elles, continuera à se mouvoir, dans le fluide, d'un simple mouvement de translation ;

2° Il y a des cas où le mouvement d'un corps lancé dans un fluide est hélicoïdal ou périodiquement hélicoïdal.

3° On peut étudier très complètement le mouvement d'une sphère pesante ou non, dans un fluide incompressible et avoir la valeur exacte de la ré-

sistance qu'elle éprouve. Elle se meut avec une accélération verticale $j = g \frac{1 + \varepsilon}{1 + \frac{4}{3}\varepsilon}$, ε étant la densité de la sphère rapportée à celle du fluide.

La résistance totale qu'elle éprouve est égale au poids du volume d'eau qu'elle déplace multiplié par le nombre $\frac{3}{2 + \varepsilon}$.

La répartition de cette pression sur les différents points de la sphère est aussi donnée par une formule simple.

4° Pour l'ellipsoïde, le problème se résout également. Les vitesses dérivent du potentiel d'une couche de matière comprise entre deux surfaces ellipsoïdales.

Il serait difficile, dans un article comme celui-ci, de préciser les méthodes suivies et d'indiquer un grand nombre d'autres résultats très intéressants, mais se prêtant moins bien à des énoncés en langage ordinaire.

IV. — ÉQUATIONS GÉNÉRALES DE L'HYDRODYNAMIQUE

16. En dehors des deux grandes questions dont je viens surtout de parler, d'autres études ont été faites, notamment sur les équations générales de l'Hydrodynamique, les mouvements discontinus, les mouvements infiniment petits, etc.

Les deux formes classiques des équations différentielles de l'Hydrodynamique sont connues sous les noms d'Euler et de Lagrange, quoique Euler les eût données les unes et les autres en 1755 et 1757 et que, d'autre part, les unes et les autres aussi aient été données plus tard par Lagrange dans la mécanique analytique.

Dans celles dites d'Euler on prend comme inconnues les composantes u, v, w , de la vitesse d'un point et la pression p du fluide en ce point, considérées comme fonctions du temps t et des coordonnées x, y, z du point auquel elles se rapportent.

Ces fonctions inconnues sont définies par un système de quatre équations à dérivées partielles du premier ordre et certaines conditions initiales et à la surface. (On admet qu'il est donné une relation entre la pression et la densité du fluide, si celui-ci n'est pas incompressible.)

Si l'on veut ensuite, ce qui, dans la pratique, n'est pas toujours nécessaire, avoir, en termes finis, les équations du mouvement, c'est-à-dire celles qui donnent la position de chaque point en fonction du temps et de sa position initiale, il faut encore intégrer un système de trois équations différentielles ordinaires¹.

Cette intégration est beaucoup facilitée par les théorèmes d'Helmholtz sur les tourbillons.

Dans les équations de Lagrange on prend directement pour inconnues, avec la pression, les coordonnées x, y, z de chaque point du fluide, considérées, aussi bien que la pression, comme fonctions du temps et de la position initiale du point. On a alors, entre les quatre fonctions inconnues x, y, z, p , quatre équations à dérivées partielles, dont l'une, celle dite de continuité, du premier ordre, les trois autres du second.

Déjà Cauchy, dans le mémoire plusieurs fois cité sur la théorie des ondes, a, d'un trait de plume, indiqué, dans le cas supposé où les composantes des accélérations sont des dérivées partielles, trois intégrales intermédiaires ou du premier ordre, des équations de Lagrange en éliminant la pression. C'est à l'aide de ces intégrales que le grand géomètre a établi le théorème de Lagrange dont il a été parlé plus haut. Étudiées d'un peu plus près, on voit qu'elles contiennent les théorèmes d'Helmholtz sur les tourbillons. Ces théorèmes et les intégrales de Cauchy ne peuvent exprimer et n'expriment, en effet, qu'une seule et même chose. Mais cette chose, personne avant Helmholtz ne l'avait aperçue.

En 1868, Weber a fait un pas de plus que Cauchy : il a nettement remplacé les trois équations du second ordre de Lagrange par trois équations du premier ordre, sans éliminer la pression, mais en la remplaçant par une autre fonction inconnue, de sorte que l'on a, entre les coordonnées inconnues, x, y, z , et la nouvelle fonction inconnue tenant lieu de la pression, quatre équations à dérivées partielles, toutes du premier ordre comme dans les équations d'Euler. Et si l'on peut les intégrer, on a non seulement les vitesses, comme dans les équations d'Euler, mais aussi la position du fluide à chaque instant.

Si l'on élimine la pression ou la nouvelle fonction inconnue qui en tient lieu, on retrouve les équations de Cauchy.

17. Quand on veut résoudre ce problème d'Hydrocinématique : trouver les équations différentielles du mouvement tourbillonnaire le plus général possible, dans lequel les accélérations dérivent d'une fonction, il faut précisément éliminer la pression et, avec elles, se trouve éliminée la fonction des forces, laquelle, dans le problème ainsi posé, reste arbitraire. Or, soit qu'on fasse cette élimination à l'aide des équations d'Euler, ou à l'aide des équations de Lagrange, Cauchy ou Weber, on a toujours une équation de plus que le nombre des inconnues.

On a quatre équations, dont l'une est celle de continuité, tandis qu'on n'a plus que trois in-

¹ Ces équations sont les suivantes :

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{dy}{dt} = v, \quad \frac{dz}{dt} = w.$$

nues (composantes de vitesse ou coordonnées d'un point fluide) puisque la pression est éliminée.

Ces quatre équations sont compatibles; mais un problème possible, où l'on a plus d'équations que d'inconnues, n'est pas réduit à ses termes les plus simples. Son degré de difficulté n'est précisé que quand on l'a réduit à un nombre d'équations égal à celui des inconnues.

Je ne connais qu'une forme d'équations de l'Hydrodynamique fournissant directement ce résultat dans la question qui nous occupe: ce sont celles que Clebsch a données dans un mémoire inséré au journal de Crelle en 1859, qui est la suite d'un autre travail non moins important, de 1857.

Ces mémoires de Clebsch qui se rapportent à des équations de même forme que celles de l'Hydrodynamique, mais à un nombre quelconque de variables, présentent d'ailleurs d'autres résultats dignes d'attention. Ils montrent notamment comment le principe de la moindre action peut s'appliquer aux fluides.

V. — MOUVEMENTS DISCONTINUS

18. Le mouvement d'un fluide peut se faire sans qu'il s'y produise des *failles*, même si les composantes des vitesses présentent des changements brusques, de part et d'autre de certaines surfaces tracées à l'intérieur du fluide et qu'on nomme des *surfaces de discontinuité*. Au point de vue cinématique, il suffit, pour cela, que les composantes des vitesses, *normales* aux surfaces de discontinuité soient continues, parce qu'alors les deux parties du fluide qui sont de part et d'autre de l'une de ces surfaces glissent l'une sur l'autre le long de cette surface, mais ne se séparent pas.

Au point de vue dynamique, la pression doit également varier avec continuité.

Helmholtz a donné le premier exemple d'un mouvement discontinu plan ou à deux dimensions.

Kirchhoff a précisé le procédé d'Helmholtz et a, plus tard, très ingénieusement rattaché le problème à résoudre à celui de la représentation conforme sur un plan; il a appliqué sa méthode à plusieurs exemples qui sont analogues, en principe, à l'écoulement par un orifice ou au mouvement

d'une veine fluide qui vient rencontrer un obstacle.

Les conditions paraissent cependant assez éloignées de celles de la nature.

On trouve un exemple de mouvements discontinus non plans, dans l'étude d'une veine fluide dont les trajectoires sont normales à des ellipsoïdes homofocaux. Elle a été étudiée par Kirchhoff et surtout par Beltrami.

Tout récemment, M. Weingarten a traité le problème dans un cas très étendu de mouvements non plans et a rattaché la question à la théorie aujourd'hui si bien connue des surfaces minima. Il a montré qu'on obtient un mouvement permanent possible d'un fluide limité partiellement par des parois et partiellement par une surface libre, comme cela a lieu dans les écoulements par orifices, en cherchant une surface minima contenant une ligne asymptotique sphérique ou une telle surface circonscriptible à une sphère suivant une certaine ligne de contact.

Tous ces exemples ont un intérêt plutôt théorique.

M. Christoffel a publié, en 1877, dans les *Annales* de Brioschi, un mémoire sur les surfaces de discontinuité qui paraît susceptible d'applications plus réelles, ainsi qu'il ressort des notes du regretté capitaine Hugoniot (*Comptes rendus*, tomes CII et CIII) où il appliquait des considérations de même nature à l'expansion des gaz.

MOUVEMENTS INFINIMENT PETITS; FLUIDES VISQUEUX

19. Il resterait à parler des mouvements infiniment petits et des fluides naturels ou visqueux. Mais ce sujet, qui m'eût permis de citer une partie des beaux travaux de mon confrère, M. Boussinesq, et du maître regretté, M. de Saint-Venant, ainsi que deux récentes et très intéressantes notes de M. Haton de la Goupillière sur le remplissage et la vidange d'un réservoir de gaz comprimé, auquel se rattachent la théorie du son, même à la rigueur celle de la lumière, en tous cas celle des ondes liquides avec la théorie des marées, est tellement vaste qu'il ne saurait trouver place dans cet article déjà trop long.

Maurice Lévy,

de l'Académie des Sciences.

LES MALADIES MICROBIENNES DES PLANTES

En dépit de la popularité que les Bactéries ou microbes se sont acquise comme agents des maladies de l'homme et des animaux, les faits de pathologie végétale attribués à leur intervention sont encore bien clairs. Je ne crois pas encourir un démenti en avançant que plus d'un botaniste de profession en soupçonne à peine l'existence.

Ce n'est pas que l'étude des maladies des plantes soit négligée. Ce n'est pas que les doctrines parasitaires, substituées à l'action de causes occultes ou d'influences banales, ne soient venues régénérer cette branche de la science, comme elles ont transformé la pathologie humaine. Mais, en pathologie végétale, l'action des microbes est certainement

reléguée au second plan par l'importance du parasitisme des Champignons proprement dits. L'étude des Champignons nuisibles aux cultures s'est imposée par l'évidence des dégâts, par la simplicité et la sûreté des méthodes de recherche.

Ne dirait-on pas que microbes et Champignons se sont partagé le monde vivant, les premiers étant les ennemis attitrés du règne animal, les seconds, ceux du règne végétal? Les médecins savent cependant qu'ils ont à compter avec certains *Mucor* et *Aspergillus*, sans parler de Cryptogames d'une nature plus équivoque. El réciproquement, les maladies microbiennes des plantes, que nous allons passer en revue, sont loin d'être une quantité négligeable. D'après une récente observation de Cuboni et Garbini ¹, le Diplocoque découvert par Pasteur dans la *Flacherie* des Vers à soie produirait des taches noires sur les feuilles du Mûrier. La maladie de la plante et celle de l'animal, causées par un agent commun, seraient transmissibles de l'un à l'autre. La possibilité de semblables migrations ouvre des horizons tout nouveaux à l'étiologie des maladies des animaux et peut-être des maladies humaines. Il est temps de familiariser les agronomes avec l'étude des microbes pathogènes. Et puis ce monde microscopique, si redoutable pour la vie humaine, mérite d'être envisagé sous toutes les formes de son activité. Tous les biologistes ont donc intérêt à suivre les microbes dans un milieu vivant si différent de celui dans lequel ils en observent d'habitude l'évolution.

Personne n'ignore le rôle des microbes dans la décomposition des plantes mortes. Si les organes vivants n'hébergent pas continuellement les infiniment petits, dont les germes, partout et toujours, sont prêts à pulluler dans les milieux propices, cela tient aux conditions mêmes de l'activité des cellules. La nature chimique du protoplasma se trouve sans cesse compliquée et modifiée par le fait de la nutrition. L'action d'un parasite semble même provoquer dans les tissus vivants une perturbation, dont le premier effet est de les rendre plus impropres à servir de support aux nouveaux venus.

Mais si nous considérons des organes plongés dans une sorte de léthargie, comme le sont les bulbes, les tubercules ou les graines, les conditions de la lutte seront complètement changées. Dans ces conditions, les tissus délicats sont encore protégés par des obstacles physiques, qui, malgré leur efficacité, sont parfois franchis par certaines Bactéries. De là résulte une première catégorie de maladies microbiennes, caractérisée par la pourriture d'organes de vie latente.

I

M. Prillieux ¹ a montré depuis longtemps que l'altération des grains de Blé connue sous le nom de *Blé rose* est produite par un *Micrococcus*.

M. Macé ² suppose qu'il s'agit de *M. prodigiosus*. La pénétration s'effectue près de l'extrémité du sillon, au point où les enveloppes offrent la moindre épaisseur. Les grains d'amidon sont d'abord rongés par les microbes; mais les autres éléments disparaissent peu à peu. Voilà donc un cas de pourriture saisissant un organe encore vivant, mais incapable à ce moment de réagir contre une attaque bactérienne.

M. Savastano ³ a observé une autre Bactérie dès le début de la *Tavelure des Orangers* et, par des inoculations de ce microbe, il a pu provoquer des lésions identiques sur les fruits sains. La maladie commence par l'apparition de petites taches brunes sur le péricarpe. Ces taches grandissent et noircissent progressivement. Elles peuvent devenir confluentes et donner à tout le fruit une couleur noire. Les oranges douces, les citrons, les limons et les mandarines sont bien plus prédisposés que les oranges amères et les pamplemousses. Une saison humide favorise la maladie; la sécheresse en entrave les progrès.

La *Pourriture des grains de raisin*, décrite par le même auteur ⁴, se produit sous des influences analogues.

C'est à un Bacille qu'il faut rapporter la *Morve des Oignons*, bien étudiée par M. Sorauer ⁵. Les écailles internes du bulbe deviennent translucides et cèdent facilement à la pression du doigt; elles exhalent une odeur dans laquelle on discerne l'acide butyrique. Les Bactéries s'observent dès le début dans des cellules épidermiques qui semblent entièrement closes. Pour que le microbe puisse pénétrer dans les tuniques de l'Oignon, il faut qu'un excès d'humidité ait ralenti la vitalité de la plante attaquée et augmenté du même coup la puissance de l'envahisseur. Le microbe de l'Oignon se multiplie fort bien dans le sol, aux dépens de débris divers et puise dans cette végétation libre une énergie nouvelle. De même, au contact des plantes morveuses, qui peuvent d'ailleurs être d'espèce différente (la Pomme de terre est sujette à la

¹ Voyez Acad. des Lincei du 6 juillet 1890, dans la *Revue* du 15 juillet 1891, page 422.

REVUE GÉNÉRALE, 1890.

¹ ED. PRILLIEUX. Corrosion des grains de Blé colorés en rose par des Bactéries. (*Société nat. d'agriculture*, 11 décembre 1878. — *Société botanique de France*, 1879, pp. 31, 187, 216. — *Annales des sciences naturelles*; Bot. 6^e série; t. VIII.)

² MACÉ. *Traité de bactériologie*, 1889.

³ SAVASTANO. La vajolatura degli agrumi. (*Bol. della soc. di Naturalisti in Napoli*, 1887.)

⁴ SAVASTANO. Il batterio del marciume dell'uva. (*Malpighia*; I, 1886.)

⁵ SORAUER. Die Rotzkrankheit (*Bacteriosis*) der Pflanzen. (*Allgemeine Brauer und Hopfenzeitung*, 1881.)

même maladie), les tunique les plus saines finissent à la longue par céder au nombre incalculable des Bacilles capables de les détruire.

II

Plus habituellement, les Bactéries pathogènes sont introduites dans les tissus végétaux par des parasites plus volumineux, qui ont préparé le terrain en décomposant certains organes. Ainsi la *Gangrène sèche* des Pommes de terre, provoquée par le *Phytophthora infestans*, dégénère en une *Pourriture*, plus destructive encore, quand les Bactéries envahissent les tissus déjà altérés par cette redoutable Péronosporée¹. Avec de tels introducteurs, les Bactéries ne bornent plus leurs ravages aux parties sommeillantes, mais s'attaquent à des organes pleins d'activité.

D'après M. Ludwig², l'écoulement muqueux des troncs de Chêne, ainsi que la maladie analogue des Saules, des Peupliers, etc., a pour agent une Bactériacée, le *Leuconostoc Lagerheimii*; mais ce microbe, au lieu d'attaquer les arbres sains, commence par envahir les tissus déjà soumis à la fermentation alcoolique par l'action de levûres telles que le *Saccharomyces Ludwigii* et la forme bourgeonnante de l'*Endomyces Magnusii*.

M. R. Hartig a décrit³ une maladie des plantules de Sapins et de Pins, qui cause depuis quelques années de grands ravages dans les pépinières de Grossostheim, près d'Aschaffenburg. L'agent de cette maladie est, avant tout, un Champignon qui paraît se rattacher aux Pyrénomycètes, bien que ses organes reproducteurs soient imparfaitement connus. Mais bientôt des Bactéries envahissent les tissus altérés par cette Cryptogame et détruisent à la fois les filaments qui leur ont frayé la voie et tous les éléments non lignifiés de la plante hôtalière.

Il ne faudrait pas trop généraliser ni considérer comme pathogènes des microbes qui ne font que détruire les tissus tués au préalable par des parasites. M. Andrade Corvo⁴ est certainement tombé dans une telle exagération et n'a pas obtenu grand crédit, quand il nous a présenté le Phylloxéra comme un être inoffensif par lui-même, ayant le seul défaut d'inoculer des Bactéries aux racines de la Vigne. Ces Bactéries, que l'on retrouve aussi

bien dans les organes souterrains désorganisés par les Champignons, du *Pourridié*, sont de simples saprophytes, et leur présence secondaire ne saurait donner le change sur la puissance destructive des parasites qui leur ont préparé le terrain.

Si les Bactéries viennent souvent compléter l'œuvre des agents pathogènes de grande taille, réciproquement des Champignons s'installent en saprophytes sur les organes altérés par le parasitisme des microbes, et compliquent la question d'étiologie. Les taches des *Citrus* sont envahies par des moisissures telles que *Capnodium Citri* et par le *Pleospora Hesperidum*. Ces Champignons avaient été considérés, le premier par MM. Caruel et Mori, le second par Cattane, comme les causes de la Tavelure des Orangers, avant que Savastano n'eût établi que leur apparition est un épiphénomène d'une maladie bactérienne.

Pour les mêmes motifs, M. Sorauer indique la présence de l'*Hypomyces Solani* comme pathogénomique de la Morve des Pommes de terre, celle du *Botrytis cana* comme un signe certain de la présence du microbe de la Morve des Oignons. Ces exemples montrent quelle réserve il faut apporter dans la détermination des agents des maladies des plantes. Ainsi nous devons avouer notre ignorance sur la nature de la *Pourriture des Tomates mûres*, bien que M. Arthur¹ ait trouvé les fruits malades envahis par des Bactéries, des levûres et des Champignons.

III

Certaines Bactéries parviennent, par une attaque insidieuse, à tuer les organes actifs et à les décomposer sans provoquer aucune lutte. Elles réalisent ce problème, dont le seul énoncé semble paradoxal, de vivre en saprophytes aux dépens de tissus vivants.

Le *Bacillus Hyacinthi*, dont les allures ont été si bien mises en lumière par M. J. H. Wakker² semble, à première vue, être un parasite s'attaquant aux organes les plus actifs de la plante, puisqu'il commence par faire noircir et pourrir l'extrémité des jeunes feuilles de Jacinthe. Cependant l'agent infectant envahit d'abord les vaisseaux et, loin de livrer une lutte corps à corps aux éléments vivants, il détourne à son profit les matériaux destinés à les régénérer. Fort de ces munitions, le Bacille pénètre dans les méats, détruit la substance intercellulaire et fait un blocus en règle des cellules isolées au sein de la masse mucilagineuse des zoogloées. Ces

¹ SORAUER. *Loc. cit.*

² LUDWIG. Ueber Alkoholgährung und Schleimfluss lebender Bäume und deren Urheber. (*Berichte der deutschen botan. Gesellsch.* 1885.) Weitere Mittheil. über Alkoholgährung... (*Centralblatt für Bakter.*, t. VI, 1889.)

³ HARTIG. Mittheilung einiger Untersuchungen pflanzenpathologischer Natur. (*Sitzungsber. des botan. Vereins in München*, 11 nov. 1889.)

⁴ DE ANDRADE CORVO. Sur le rôle des Bacilles dans les ravages attribués au Phylloxera. (*Comptes rendus de l'Acad. des Sciences*, t. CI, 1885.)

¹ ARTHUR. *Report of the Botanist of the New-York agricultural experiment Station*, 1884.

² WAKKER. Contributions à la pathologie végétale. (*Archives néerlandaises*, t. XXIII, 1888.) — (Les premières observations de Wakker ont été publiées en hollandais en 1884, 1885, et 1886.)

cellules montrent encore leur structure interne; mais leurs parois sont très amincies, et elles subissent plus directement l'influence du microbe, à mesure que leur vitalité s'amoindrit, sans réparation possible. Elles offrent enfin une proie facile à l'agresseur. Alors seulement les cellules sont détruites et leurs restes liquéfiés viennent augmenter les cavités qui ont pris naissance au niveau des vaisseaux et qui sont désormais gorgées d'un mucilage jaune, d'aspect granuleux, représentant les zoogléas. Le mucilage s'écoule à la moindre pression et justifie le nom de *Jaune* donné à cette affection.

Laisse-t-on fixées au bulbe les feuilles malades? Le bulbe lui-même est altéré au bout d'un temps variable. Si les Bactéries parviennent jusqu'au plateau, la pourriture du bulbe et la mort de la plante s'ensuivent. Si la marche est plus lente, les fleurs se montreront au printemps suivant; mais cette manifestation de la vie ne fera qu'accélérer l'épuisement final.

M. A. Heinz ¹ a décrit une maladie bactérienne des Jacinthes, qu'il considère comme distincte du Jaune; mais il n'a pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de cette opinion, ainsi que M. Klein ² l'a déjà fait remarquer.

Une grave maladie des Céréales, qui n'est pas sans analogie avec le Jaune des Jacinthes, nous a été révélée par les travaux de M. T. J. Burrill ³. Une Bactérie, mesurant 0^m,8 — 1^m,6 sur 0^m,63, forme des masses mucilagineuses noires dans les chaumes du Seigle. Les exemplaires attaqués restent petits et grêles et meurent après avoir pris une coloration jaune parsemée de taches sombres. Depuis 1881, l'attention s'est portée sur ce nouveau fléau qui ravage presque entièrement les champs où il s'implante.

Dernièrement M. Iwanowsky ⁴ décrivait, sous le nom de *Pourriture du Tabac*, une maladie qui sévit en Bessarabie. Les organes lésés (ce sont habituellement des tiges) présentent des taches ramollies, d'abord éparées, bientôt confluentes. En l'absence de tout parasite de grande taille, l'auteur attribue l'origine de cette dégénérescence à une Bactérie.

Selon Burrill, la Gangrène sèche ou *Brûlure des Poiriers*, très préjudiciable aux vergers américains serait due à un organisme mesurant 1^m—1^m,25 sur 0^m,5 — 0^m,75, et nommé par lui *Micrococcus amyli-*

vorus. L'action nuisible de ces corpuscules ressort non seulement de leur constance dans les lésions dont il s'agit, mais aussi d'expériences d'infection de tige à tige réalisées avec succès par Burrill et répétées à plusieurs reprises par J. C. Arthur ¹. Ce dernier auteur arrive à admettre l'identité de cette maladie avec la Brûlure des Pommiers et des Coignassiers. Le *Micrococcus amyliovor* étendrait même ses ravages aux genres voisins *Crataegus* et *Amelanchier*.

Sans discuter la propriété de la dénomination de *Micrococcus*, appliquée à des bâtonnets deux fois aussi longs que larges, je rappellerai une objection plus sérieuse élevée par M. R. Hartig contre l'opinion de MM. Burrill et Arthur. La maladie des Poiriers a de grandes analogies avec le *Chancre* des Pommiers, des Hêtres, de divers arbres forestiers, si fréquemment observé en Europe. L'agent de cette dernière maladie, le *Nectria ditissima*, bien que se rapportant à un groupe de Champignons élevés, possède des corps reproducteurs très fins, ou spermaties, qui, observés isolément, en imposeraient aisément pour des Bactéries. Cette confusion a été commise à diverses reprises. Dernièrement encore, observant des Chancres du Frêne, M. Mer ² signalait des poches à Bactéries à côté des filaments du Champignon auquel il rapportait avec raison la maladie. Or, dans les Chancres du Frêne suffisamment jeunes et préparés avec soin, on découvre sans peine des spermogonies, cavités irrégulières, plongées dans les tissus attaqués et tapissées de filaments délicats auxquels adhèrent encore les fines spermaties. Plus tard, ces bâtonnets détachés simulent des amas de microbes, dont les dimensions répondent sensiblement à la diagnose du *Micrococcus amyliovor*.

Il est à remarquer que les essais de culture entrepris par M. Arthur ont particulièrement bien réussi dans des milieux légèrement acides, sur lesquels le prétendu *Micrococcus* se trouvait, comme l'auteur en fait la remarque, à l'abri de la concurrence des autres Bactéries.

Malgré l'intérêt incontestable qui se rattache aux expériences des auteurs américains, il est peut-être prudent de faire quelques réserves, non pas sur la nature infectieuse (elle est hors de cause), mais sur la nature bactérienne de la Brûlure des arbres à pépins.

IV

Il nous reste à envisager les maladies qui s'accompagnent d'une réaction locale de la part de la

¹ HEINZ. Sur Kenntniss der Rotzkrankheiten der Pflanzen. (Centralblatt für Bakteriologie, t. V, 1889.)

² KLEIN. Analyse du Mémoire de Heinz. (Botan. Centralblatt, t. XL.)

³ THOMAS J. BURRILL. A bacterial disease of corn. (University of Illinois Agricultural experiment station; août 1889.)

⁴ IWANOWSKY. Ueber die Krankheiten des Tabakspflanzen. (Botan. Centralblatt t. XLI, d'après un Mémoire en langue russe publié dans Arbeiten des Petersb. Naturforscher Gesellsch. t. XIX.)

¹ ARTHUR. Loc. cit., 1884 et 1887.

² MER. Influence de l'exposition sur l'accroissement de l'écorce des Sapins. (Journal de Botanique, t. III, 1889; p. 119, note.)

plante envahie. Deux types bien distincts rentrent dans cette catégorie. Dans la *Tuberculose de l'Olivier*, les Bactéries détruisent d'emblée les éléments qu'elles abordent; mais, sous leur influence irritante, les cellules voisines se multiplient d'une façon désordonnée et ne tardent pas à dégénérer pour devenir à leur tour la proie des microbes. Ainsi se forment des tumeurs ou tubercules, qui se ramollissent progressivement, à partir du centre occupé par la masse mucilagineuse du parasite. L'action du microbe est trop destructive pour permettre aux tumeurs d'atteindre une taille considérable; mais, comme toute lésion de l'arbuste offre une porte d'entrée au parasite, les tubercules viennent souvent compliquer les nodosités ligneuses si fréquentes sur les rameaux des Oliviers, comme chez d'autres arbres de la même famille, et susceptibles de se développer en l'absence de tout microbe. Un examen superficiel pourrait faire croire que ces hyperplasies sont aussi l'œuvre des Bactéries. Mais les patientes observations et les habiles expériences de M. Savastano¹, poursuivies depuis bien des années, ont précisé de la façon la plus nette la part qui revient au Bacille de la Tuberculose de l'Olivier dans la genèse de ces maladies. Tout au plus arrive-t-il parfois que la présence des tubercules entraîne indirectement, comme les causes les plus banales, ou par une action irritante qui n'a rien de spécifique, l'apparition de nodosités ligneuses dans leur voisinage.

Peut-être faut-il placer ici la *Mosaïque du tabac*, maladie contagieuse, caractérisée par des épaississements locaux et des courbures variées et irrégulières des feuilles envahies. M. A. Mayer², qui a étudié, en Hollande, la formation de ces tumeurs, les attribue à une Bactérie; mais l'histoire de cette maladie réclame de nouvelles recherches. Les tumeurs du second type ont été observées sur le Pin d'Alep. Leur genèse diffère essentiellement de celle des tubercules de l'Olivier. Pas plus que les Microbes du jaune des Jacinthes, les Bacilles du Pin d'Alep ne traversent les parois des éléments vivants. Aussi leur faut-il un introducteur pour franchir la barrière opposée par le périoderme des rameaux. Cet introducteur paraît être un insecte capable de plonger un suçoir jusqu'au niveau de la moelle et d'inoculer du même coup le microbe dont il a infecté ses stylets en visitant des lésions semblables. En effet, si l'on a soin d'inspecter des tumeurs au premier stade, alors qu'elles font une saillie de

moins d'un demi-millimètre, on constate que la lésion débute au-dessous des coussinets foliaires, au point où la gaine ligneuse est interrompue par le départ des faisceaux destinés à ces organes. L'introducteur sait trouver le défaut de la cuirasse. Un canal étroit, entouré d'un liège protecteur, débouche au centre d'un petit cratère superficiel et aboutit, dans la profondeur, à un amas de cellules mortes et subérisées. Tout près de cette formation cicatricielle, dont l'origine ne saurait, en aucun cas, être attribuée au microbe, on aperçoit les premières colonies bactériennes, s'insinuant entre les méats. Mais, à l'inverse du microbe des Jacinthes, les Bacilles du Pin d'Alep sont en actives relations d'échanges nutritifs avec les cellules délicates qui les entourent. Seulement les conséquences de ces relations sont bien différentes de tout ce que nous avons vu résulter, dans les maladies précédentes, de l'action des microbes. Loin de ralentir la vitalité des cellules, le Bacille du Pin d'Alep la surexcite. Les cellules reviennent à l'état embryonnaire, se divisent avec un luxe qu'on ne rencontre pas normalement dans les éléments adultes; bientôt la prodigieuse quantité de noyaux cellulaires volumineux et parfaitement sains des tissus hyperplasiés permet de distinguer, à l'aide d'un faible objectif, la voie suivie par l'invasion bactérienne.

Le Bacille a donc une action directe sur les éléments vivants. Cette action directe n'est pas destructive comme celle des microbes précédents; elle constitue une symbiose locale. La Bactérie joue le même rôle que les larves d'insectes dans la production des galles des plantes ou cécidies. Cette analogie a valu aux excroissances liées à la combinaison des deux êtres le nom de *Bactériocécidie*³.

Les Bactéries progressent peu vers la moelle. De ce côté, leur action est limitée par l'organisation plus avancée des tissus et par l'inextensibilité de la région ligneuse. Du côté externe, les tissus sont plus irritables, et la progression indéfinie des Bacilles au milieu d'eux donne lieu à une formation de galles volumineuses. Si l'écorce est seule envahie, on a des loupes molles, parfois grosses comme le pouce. Le phénomène se complique, quand l'activité du cambium est déviée par l'influence parasitaire. Des gaines ligneuses contournées, interrompues par les fusées bactériennes, parcourent comme des noyaux rameaux les tissus tendres de la tumeur, qui parvient au volume du poing, présentant une surface lobulée, mamelonnée d'une façon irrégulière. Avant que la galle ait atteint ces proportions, un conflit a éclaté entre

¹ L. SAVASTANO. Les maladies de l'Olivier. (*Comptes rendus de l'Académie des Sciences*; 6 et 20 décembre 1886.) — *Tuberculosi, iperplasie e tumori dell' Olivo*, Napoli, 1887. — Il bacillo della tuberculosi dell' Olivo. Nota suppletiva. (*Rendiconti della r. acc. dei lincei*; 4 ag. 1889.)

² A. MAYER. Ueber die Mosaikkrankheit des Tabaks. (*Landwirthsch. Versuchszt.*, t. XXXII, 1886.)

³ P. VUILLEMIN. Sur une Bactériocécidie ou tumeur bacillaire du Pin d'Alep. (*Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, 26 nov. 1888.)

les éléments qui, dominés par l'influence étrangère, semblent méconnaître toutes les lois de leur évolution spécifique, et ceux qui, éloignés de l'agent irritant, sont incapables de suivre l'expansion des premiers. Comprimés et affamés, les tissus frappés d'hyperplasie finissent par mourir et sont en partie détruits par les Bactéries, qui, remarquons-le bien, agissent alors en saprophytes, en partie subérisés et transformés en gaines isolantes, qui limitent localement les progrès du mal, sans l'empêcher de s'étendre encore sur d'autres points.

Ce mode de défense de l'organisme par séquestration de l'agent nuisible rappelle les phénomènes d'enkystement des Helminthes et d'autres parasites volumineux des animaux. On remarquera pourtant que c'est là un processus plus particulièrement conforme aux conditions de la vie des plantes. Le végétal accumule dans ses tissus les produits de désassimilation que l'animal rejette. De même il emprisonne les microbes qu'il ne peut faire disparaître, soit par une élimination, soit par une attaque directe, la structure de ses cellules et la nature des membranes étant incompatibles avec la fonction active des phagocytes.

La dépense énorme à laquelle le Pin d'Alep doit subvenir pour la formation de la galle provoque la mort des branches attaquées. Quand les tumeurs sont nombreuses, l'arbre lui-même périt. Dans certaines forêts des environs de Nice, l'extension de la maladie fait craindre un dépeuplement complet.

Malgré ces conséquences fatales liées indirectement à la pénétration du Bacille du Pin d'Alep, il faut retenir qu'au début et par son action directe, le microbe se comporte en symbiote. Supposons que l'équilibre momentanément réalisé entre les deux vies associées se maintienne, que le bénéfice

localement attribué au Pin se répartisse sur une plante entière, et nous passerons du parasitisme le plus redoutable à un consortium aussi harmonieux que celui de l'Algue et du Champignon dans un Lichen.

Ce dernier cas se trouve réalisé dans les tubercules des Légumineuses. On sait depuis longtemps que les nodosités observées sur les racines, chez divers représentants de cette famille, résultent de la pénétration d'organismes étrangers. Mais ces organismes provoquent des transformations si insolites dans le protoplasma des tubercules, que, pendant longtemps, on n'a pas pu distinguer nettement ce qui appartient à la Légumineuse et ce qui constitue l'élément surajouté. Les recherches récentes de MM. Prazmowski¹ et Frank² ont donné quelque poids à l'opinion que les associés des Légumineuses sont des *Micrococcus* intracellulaires³, et que ces microbes modifient les portions de cytoplasme placées à leur contact, au point de former avec elles, dans chaque cellule, un tout, dont l'aspect cryptogamique justifie le nom de *mycoplasma*.

Les microbes des Légumineuses ne sont donc pas ordinairement des êtres pathogènes. Il est même démontré que, dans certaines conditions, ils deviennent des auxiliaires indispensables de leur hôte, en lui fournissant une alimentation azotée sans laquelle celui-ci périrait. Mais le parasitisme et la symbiose ont des liens si étroits que, dans d'autres conditions ou pour d'autres espèces, pour les Haricots par exemple, d'après Frank, le *Micrococcus* se nourrit aux dépens de son hôte, sans compensation équivalente, et devient ainsi l'agent d'une maladie microbienne.

D^r Paul Vuillemin,

Chef des Travaux d'Histoire naturelle
à la Faculté de Médecine de Nancy.

LES RÉCENTS TRAVAUX SUR L'AMIDON ET LES DIASTASES

L'origine et les transformations de l'amidon dans les plantes semblent en quelque sorte mystérieuses. C'est, pourrait-on dire, le problème même de la vie qui se pose devant nous. Nous savons que l'acide carbonique de l'air et probablement l'eau fournissent les éléments nécessaires à la formation de l'amidon dans les feuilles¹; nous voyons naître cet amidon dans les grains à chlorophylle et pourtant nous ne connaissons rien du mécanisme de cette production. L'amidon disparaît peu à peu de la feuille; nous le retrouvons plus tard dans la graine, et nous ne saisissons pas tous les degrés successifs de cette migration.

L'hypothèse de M. Baeyer sur l'assimilation a trouvé un appui solide dans la découverte du for-

¹ A. PRAZMOWSKI. Dans Wesen und die biologische Bedeutung der Wurzelknöllchen der Erbse. (*Bulletin der K. K. Akad. der Wiss. in Krakau* juin 1889.)

² B. FRANK. Ueber die Pilzsymbiose der Leguminosen. (*Berichte der deutschen botan. Gesellschaft*, t. VII; 1889.)

³ Cependant il plane encore quelque incertitude sur la position systématique de ces organismes. M. Em. Laurent (Comptes rendus de l'Acad. des Sciences; 17 novembre 1890) vient de montrer leur analogie avec les *Pasteuria*, genre à certains égards intermédiaire aux Bactéries et aux Champignons. Ce compromis entre les deux opinions antérieures qui voyaient, la première des Champignons, la deuxième des Bactéries, dans les hôtes des nodosités des Légumineuses est peut-être la solution la plus voisine de la vérité. Au point de vue pratique rien ne nous empêche de maintenir ces petits êtres dans la catégorie des microbes.

¹ Voyez à ce sujet l'article de M. Maquenne sur la *Synthèse des Sucres* dans la *Revue* du 30 mars 1890, page 165.

mose par M. Löw, mais elle n'est pas encore passée à l'état de vérité démontrée.

La migration de l'amidon nous offre un terrain bien plus solide au point de vue expérimental; nous examinerons donc le processus de cette transformation, puis nous indiquerons, d'après les travaux récents, les idées que l'on peut se faire actuellement de l'action des diastases sur l'amidon.

I

On admettait depuis longtemps déjà, que l'amidon naissant dans les feuilles se transformait en sucre pour arriver aux autres organes et aux réserves de la graine ou du tubercule; mais aucune démonstration expérimentale de ce fait n'était donnée; on ne connaissait ni la cause de cette solubilisation de l'amidon, ni la marche suivie par le sucre. Les travaux très intéressants de M. Schimper¹ sont venus combler cette lacune.

L'immersion des feuilles dans le chloral iodé les rend tout à fait transparentes et les grains d'amidon les plus petits, fortement gonflés et colorés en bleu, deviennent parfaitement visibles.

On a opéré sur l'*Impatiens parviflora* pour montrer que le produit de la dissolution de l'amidon est du glucose, les feuilles contenant à la fois du sucre et de l'amidon; un certain nombre d'entre elles ont été coupées suivant la nervure médiane, une moitié restant adhérente à la plante, l'autre en étant détachée; les moitiés détachées ont été disposées dans une chambre humide, et placées à l'obscurité aussi bien que la plante elle-même; l'amidon disparut progressivement dans les deux moitiés des feuilles; au bout de 72 heures il n'en restait plus trace; mais dans les moitiés détachées la quantité de sucre avait augmenté à mesure que la dose d'amidon diminuait; au contraire dans les moitiés restées adhérentes à la tige, on ne trouvait plus à la fin de l'expérience que des traces de sucre et seulement vers le point d'insertion de la feuille sur la tige.

Cela démontre bien que le produit de la dissolution de l'amidon est du glucose, et que celui-ci dans la plante vivante se transporte peu à peu de l'extrémité des feuilles à la tige.

L'examen minutieux des feuilles a permis à M. Schimper de reconnaître la voie par laquelle s'effectue le transport de l'amidon solubilisé: dans l'*Impatiens* cette migration s'opère par une série de cellules allongées, pauvres en chlorophylle, que M. Schimper appelle gaine conductrice; cette gaine sépare les faisceaux libéro-ligneux du mésophylle. Elle ne possède qu'à un très faible degré le pouvoir de précipiter le glucose à l'état d'amidon.

Lorsque le sucre contenu dans cette série de cellules a disparu, il est remplacé par de l'amidon appelé des cellules mésophylliennes avoisinantes et solubilisé.

Pour d'autres plantes, l'écoulement du sucre n'est pas aussi aisé, le sucre étant reprécipité à l'état d'amidon dans l'intérieur de chaque cellule de la gaine conductrice et obligé par là de subir une nouvelle solubilisation. Il n'est pas certain d'ailleurs que le passage à travers la cloison cellulaire ait lieu à l'état de glucose; il semble en effet que ces membranes retiennent énergiquement le sucre, puisqu'en contact avec l'eau la feuille ne lui cède pas de matière sucrée; quelle que soit cette forme transitoire, le fait certain c'est que dans les cellules de la plante de l'amidon est transformé en glucose. Quel est l'agent de cette transformation? M. Schimper répond à cette question: *les feuilles de l'Impatiens renferment un ferment diastasique*. En opérant avec des décoctions de feuilles entières ou de nervures seules, on a pu changer en sucre et dextrines un empois d'amidon; d'ailleurs les autres plantes conduisent à la même constatation.

La présence de ferments diastases dans les végétaux est du reste assez fréquente; ainsi il en existe dans les pommes de terre, et leur action peut être mise en évidence dans les circonstances suivantes. On attribue généralement à la gelée cette altération des tubercules devenus sucrés; il n'en est rien, car il suffit de soumettre les tubercules à une basse température sans congélation pour qu'il s'y développe du sucre. Deux phénomènes se passent en même temps dans les cellules à amidon: l'un est la transformation de l'amidon en glucose, l'autre la combustion du glucose par le protoplasma; à une basse température le ferment diastasique continue son action, tandis que la vie du protoplasma ralentie ne consomme plus le glucose mis à sa disposition.

Dans les pommes de terre jeunes, récoltées au mois de juin par exemple, on rencontre également du glucose, de l'amidon et même du sucre de cannes, qui semble devoir être considéré, dans ce cas, comme un intermédiaire entre l'amidon et le glucose.

Dans le grain d'orge, ou en général de céréales, même avant toute germination l'on rencontre une diastase dans l'endosperme; ce ferment est retenu dans le gluten qui, une fois dissous, peut agir comme diastase.

Le point à retenir, c'est que, à côté de l'amidon et du sucre, on trouve dans les végétaux des ferments non figurés, et que l'action de ces diastases rend possible la migration de l'amidon, et par suite aussi, la nutrition et la reproduction de la plante. Nous devons naturellement exiger davan-

¹ Bot. Zeit., 1885, n° 47, 48, 49.

taige et nous demander comment agit la diastase, quels sont les produits intermédiaires, et les circonstances les plus favorables à son influence. L'étude de la plante vivante présente d'énormes difficultés pour un examen de ce genre; en tous cas, elle doit être précédée de la connaissance approfondie des réactions effectuées dans le laboratoire.

II

Nous considérerons dans ce qui suit l'action diastatique de l'extrait de malt, dont les usages industriels ont provoqué une étude plus complète.

On a admis pendant longtemps, et sans autres explications, que l'action du malt transformait l'amidon en glucose et en dextrine, en considérant la dextrine comme une espèce chimique définie. On attribuait également l'action saccharifiante à une seule diastase.

Cependant des anomalies curieuses, notamment dans les usages industriels, tendaient à faire repousser une interprétation aussi simple des phénomènes. L'expérience avait montré que si l'on faisait agir l'extrait de malt à basse température, le rendement en sucre était assez faible, et de plus une fraction considérable des dextrines formées ne pouvait plus être saccharifiée en élevant la température, et en ajoutant du malt neuf.

En opérant sur 50-55° on obtenait le meilleur rendement en sucre : au-dessus de cette température, le produit en sucre s'abaissait de nouveau, mais une partie des dextrines pouvaient être attaquées de nouveau par le malt à la température optima de 50°. Enfin vers 80° l'action dissolvante s'arrêtait complètement.

Ces particularités rendaient probable la production de plusieurs dextrines, ou la présence de plusieurs diastases dans l'extrait de malt.

D'autres travaux permirent de reconnaître l'existence de plusieurs dextrines dans les produits de saccharification, et l'on put distinguer par leurs réactions :

L'Érythrogranulose, colorée en violet par l'iode	
la Maltodextrine, non colorée par l'iode, qui réduit la liq. de Fehling.	
la Leuco-dextrine, — sans action sur la liq. de Fehling.	

Cuisinier, puis Dubrunfant émirent l'idée que le malt devait contenir deux diastases, l'une plus sensible que l'autre à l'action de la chaleur.

Cette hypothèse a été reprise récemment par M. Wijsman¹, et complètement justifiée par d'ingénieuses expériences. Il appelle *maltase* et *dextrinase* ces deux ferments diastatiques, et il résume

le processus de la saccharification dans le tableau suivant :

Amidon transformé par	
Maltase donne Maltose et érythrogranulose qui transformée par dextrinase donne leucodextrine	Dextrinase donne Maltodextrine qui transformée par maltase donne maltose

L'action des deux diastases donne donc en somme du maltose et les trois dextrines érythrogranulose, maltodextrine et leucodextrine; cette dernière ne peut plus être attaquée par l'extrait de malt. J'indiquerai les élégants procédés de démonstration de M. Wijsman.

M. Wijsman s'appuie d'abord sur ce fait que le maltose ne se colore pas par l'eau iodée, que l'érythrogranulose se colore en violet, et l'amidon en bleu. Il fait des plaques de gélatine auxquelles il incorpore un peu d'amidon solubilisé par un traitement à l'acide chlorhydrique dilué, mais incapable de se diffuser. Au centre d'une telle plaque, il dépose une goutte d'extrait de malt, précipité par l'alcool, puis redissous dans l'eau. Après deux ou trois jours, il traite la plaque par l'eau iodée et constate l'aspect suivant :

Au centre un cercle incolore, puis, bordant ce cercle, un anneau violacé; le reste de la plaque bleu.

Cet aspect est dû à une différence entre les vitesses de diffusion des deux diastases, l'anneau violet, qui indique l'érythrogranulose, répondant à l'action d'une seule diastase, la maltase. En effet si l'on prélève avec une tige de verre une parcelle de cette couche à érythrogranulose et qu'on la dépose au centre d'une plaque de gélatine amidonnée neuve, on obtient seulement un cercle violet.

D'ailleurs on peut faire varier presque à volonté les dimensions respectives du cercle incolore et de l'anneau violet, en chauffant plus ou moins l'extrait de malt, preuve nouvelle de l'existence des deux diastases. La maltase, qui l'emporte d'abord comme quantité, subit l'action destructive de la chaleur au-dessus de 55°, de sorte que l'on peut diminuer la dose de maltose, et même la supprimer presque complètement. Vers 65°, l'extrait ne renferme pour ainsi dire que de la dextrinase. Les mélanges où la dextrinase prédomine ne donnent par l'iode qu'un cercle incolore sans anneau violet.

La même théorie permet d'expliquer les différences d'action du malt. En effet à basse température, si l'on obtient des dextrines non susceptibles d'une nouvelle saccharification, c'est que la maltase prédomine et qu'il se produit de la leucodextrine irréductible. A une température plus élevée, la dextrinase l'emporte : il se fait de la

¹ *Travaux chimiques des Pays-Bas*, IX, n° 4.

maltodextrine qu'une addition de malt préparé à basse température, c'est-à-dire de maltase, peut transformer en sucre. Les expériences de Wijsman ont confirmé ce point que le meilleur rendement en maltose s'obtient en opérant vers 50-55°.

Pour démontrer directement la formation du maltose, M. Wijsman a employé un réactif des plus singuliers, les *bactéries phosphorescentes*. M. Beijerinck a montré qu'une espèce de Bactérie, appelée par lui *Photobacterium phosphorescens Beijerinck*, devient lumineuse dès qu'elle trouve une matière assimilable pour elle; or le maltose peut jouer ce rôle d'aliment; l'amidon et les dextrines en sont incapables. Dès lors, on fait sur une plaque de gélatine amidonnée une culture pure de *Photobacterium*; on laisse leur éclat s'éteindre par inanition, ce qui demande peu de temps, puis on dépose au centre de la plaque une goutte d'extrait de malt.

Bientôt on aperçoit un champ de diffusion coïncidant avec la réaction à l'iode, et l'on a un anneau lumineux au deux côtés de l'extrême champ de diffusion, c'est là que la maltase transforme l'amidon en erythrogranulose; donc il se produit aussi du maltose.

Si l'extrait du malt a été appauvri en maltase par la chaleur, la dextrinase se diffuse plus vite et l'on aperçoit un contour obscur, puisque l'action de la dextrinase sur l'amidon donne une dextrine sans maltose (malto-dextrine). Au centre on a de la lumière parce que la maltodextrine a été transformée en maltose par le deuxième ferment, la maltase.

M. Wijsman a pu découvrir la maltase dans le grain d'orge non germé: au contraire, des réactions microchimiques, entre autre celles de M. Lintner (coloration en bleu de la teinture de gaïac, par l'eau oxygénée en présence d'une diastase), lui ont permis de reconnaître que la dextrinase prend naissance pendant la germination, et se localise surtout dans les enveloppes extérieures du grain. Si donc on emploie de l'orge perlée (débarassée de ses téguments externes), l'extrait du malt ainsi fabriqué contiendra surtout de la maltase et par ce moyen il a été possible d'isoler l'erythrogranulose et de vérifier ses propriétés.

Ces curieuses expériences de M. Wijsman semblent prouver absolument l'existence simultanée de leurs diastases et donnent au moins en gros la marche vraie de la saccharification.

En dehors de la température, d'autres actions peuvent modifier le résultat de la saccharification, surtout au point de vue du rendement en sucre.

Payen a montré autrefois que le maltose produit fait obstacle à la formation ultérieure de sucre, et que si l'on provoquait sa destruction par la fermentation, une nouvelle dose de dextrines se

transformait en sucre. M. Lindet¹ a donné une nouvelle démonstration du même fait; il a utilisé les combinaisons de sucre et de phénylhydrazine, les osazones découvertes par M. Fischer. En prenant un moult saccharifié à refus, et en précipitant de ce moult le maltose par le réactif indiqué, il a pu transformer de nouveau en sucre plus de la moitié des dextrines existant d'abord dans la matière; une nouvelle précipitation de maltose entraînait du reste une nouvelle production de sucre. Cette expérience semble indiquer que la saccharification est constituée par une sorte d'équilibre entre les divers produits; jusqu'ici on n'a pas encore signalé la transformation inverse du sucre ou dextrines en amidon; mais ce phénomène a lieu certainement dans les végétaux, où le phénomène se rapproche alors des équilibres chimiques tels que nous sommes habitués à les envisager.

Enfin récemment M. Effront² a constaté l'action de l'acide fluorhydrique dans la saccharification industrielle; une dose de $\frac{1}{10,000}$ d'acide, jointe à

l'emploi d'une température de 30° pour la transformation par le malt, a permis d'obtenir un rendement de 90 0/0 de sucre et seulement 4 0/0 de dextrines pour l'amidon du maïs. De plus l'acide fluorhydrique conserve à la diastase ses propriétés dissolvantes, et cela pendant un temps assez long; ces observations de M. Effront mises à profit et brevetées par la société de maltose à Bruxelles, constituent certainement un grand progrès sur les procédés employés jusqu'ici en distillerie, et elles en améliorent le rendement dans de larges proportions.

Les autres ferments diastastiques dont la présence a été constatée dans les végétaux semblent devoir pour la plupart se ramener aux constituants de l'extrait de malt.

Ainsi M. Reyckler³, reprenant d'anciennes expériences de Kirchoff et Bouchardat a constaté que le gluten dissous dans les acides étendus (acide acétique au dix-millième) est capable de transformer l'empois d'amidon en sucre et dextrine; il a reconnu dans cette solution de gluten la présence d'une diastase par la réaction de Lintner; le pouvoir saccharifiant de ce ferment était environ les $\frac{3}{4}$ de celui de l'extrait de malt, et l'on obtenait le rendement optimum entre 40 et 50°. M. Reyckler attribuait la présence de ce ferment à l'action des acides étendus sur le gluten et considérait comme possible une telle réaction pendant la germination.

¹ Bull. Société chimique, 1889, p. 425.

² Moniteur de Quesneville, 1890, p. 449.

³ Bull. Soc. Chim., 1889, p. 286.

Ces conclusions ne sont pas acceptées par MM. Lintner et Eckardt¹; ces savants ont reconnu la présence dans le grain de céréales d'un ferment signalé également par M. Wissman comme étant la maltose. Ils ont d'abord comparé cette diastase à l'extrait de malt, puis au ferment de Reyhler, et ils trouvent que le gluten-diastase de Reyhler est identique, comme action, au ferment du grain de céréales non germé. Ce ferment serait simplement retenu mécaniquement par le gluten, et mis en liberté lorsque le gluten est dissous par les acides. Les mêmes chimistes ont constaté que la diastase de l'orge non germée est moins énergique que celle du malt, mais commence plus tôt : ainsi à 4° son action équivaut comme production de sucre à celle du malt à 15°. Ce caractère, joint aux observations microchimiques de M. Wijsman, ne permet guère de douter que ce ferment soit la maltose, l'un des constituants de l'extrait de malt; l'origine de ce corps reste bien obscure, car la présence des bactéries à l'intérieur de la graine, n'ayant pas été constatée jusqu'ici, il

est difficile d'attribuer aux micro-organismes la production de cette diastase.

En résumé, nous arrivons aux résultats suivants: d'une part l'intervention d'une diastase dans la migration de l'amidon établie d'une manière certaine; d'autre part, le mode d'action de la diastase et la composition de l'extrait de malt élucidée par quelques côtés. Bien des points restent obscurs, sans doute. Tant que l'amidon ne nous aura pas livré le secret de sa constitution, tant que les diastases demeureront pour nous des substances de composition et d'origine ignorées, nous n'arriverons pas à connaître la naissance et la métamorphose de l'amidon, et le problème de la vie végétale restera un mystère pour nous. Mais nous devons nous souvenir, en France du moins, que les ferments organisés ont trouvé un Pasteur, la synthèse organique un Berthelot.

P. Petit,

Docteur ès Sciences,
Chargé de Cours
à la Faculté des Sciences de Nancy.

UNE NOUVELLE THÉORIE SUR LE VOL A VOILE DES OISEAUX

C'est un fait bien connu que certains oiseaux peuvent planer des heures entières, les ailes étendues et immobiles, en s'élevant même considérablement dans les airs. Il en résulte que les meilleurs voiliers sont les oiseaux à grande surface d'ailes, vautours, pélicans, etc. Arrivés à une certaine hauteur par quelques battements d'ailes, ils s'élèvent graduellement, les ailes étendues, en décrivant des courbes en forme de spirale autour d'un axe oblique dans la direction du vent.

Les descriptions qu'on a données de ce phénomène concordent en général; il n'en est pas de même des hypothèses proposées pour l'expliquer.

M. Mouillard² et après lui M. Mültenhoff³ pensent que le vent peut donner à l'oiseau se laissant glisser dans sa direction une vitesse presque égale à lui-même, vitesse que l'oiseau utiliserait pour monter quand il a le vent contraire.

Lord Rayleigh⁴ pense qu'un oiseau ne peut poursuivre son vol horizontal sans battement d'ailes. L'oiseau utiliserait la différence de vitesse de deux couches d'air superposées pour regagner sa vitesse initiale.

M. Hubert Airy⁵ pense qu'il y a toujours dans

l'atmosphère des tourbillons que certains oiseaux auraient appris à utiliser sans se servir de leurs muscles du vol.

M. Marey⁶ regarde le vol des voiliers et la forme de leurs orbes comme le résultat de vents variables. Dans son livre² ce savant semble adopter une théorie proposée par M. Basté et se rapprochant de celle de M. Mouillard.

Il est facile de montrer que toutes les théories précédentes manquent de solidité.

Pour celle de M. Mouillard, il est évident qu'un oiseau ne s'avance pas dans la direction d'un vent sans avoir une plus grande vitesse.

Les explications de MM. Rayleigh et Airy ne me satisfont pas davantage. Rien dans les mouvements de l'oiseau n'indique qu'il adapte et change la direction du plan des ailes pour se servir des variations du vent.

Voici l'explication que je propose :

Supposons un oiseau volant avec une certaine vitesse initiale perpendiculaire à la direction d'un vent *ef*. Il ira de *a* en *c* au lieu de *a* en *b* dans l'unité de temps. En *c* l'oiseau doit avoir une plus grande vitesse absolue que celle qu'il aurait en *b*.

D'autre part, malgré la résistance du vent la vitesse en *c* peut être supérieure à la vitesse initiale en *a*. Si, parvenu en *c*, l'oiseau peut tourner au vent sans perdre de sa vitesse — et beaucoup d'oiseaux

¹ *Journ. für prakt. Chems.* 1890, p. 91.

² *L'empire de l'air*, Paris, 1881, p. 43.

³ KARL MÜLTENHOFF. Die Grösse der Flugflächen. *Plug. archiv.*, B. 35, p. 428.

⁴ *Nature*, vol. XXVII, p. 531.

⁵ *Nature*, XXVII, p. 590.

¹ *Comptes-rendus*, CIX, n° 15 (7 octobre 1889), p. 551.

² MAREY. *Le Vol des Oiseaux*. G. Masson, Paris, 1890.

ont cette faculté — il pourra marcher dans la nouvelle direction un certain temps avant que sa vitesse soit revenue à ce qu'elle était en a . Soit d ce point; si l'oiseau tourne en ce point, il sera prêt à




Fig. 1. — ef , Direction du vent. Les hachures portées sur ab et ac indiquent l'axe de longueur de la surface des ailes.

recommencer le même jeu qu'en a . Si tout le cours ad doit être horizontal, cela suppose des changements d'inclinaison du plan des ailes sur l'horizon. Entre a et c le plan des ailes sera tourné en avant. Après avoir tourné en c , l'angle du plan des ailes avec l'horizon doit être diminué pour être augmenté de nouveau sur la ligne cd à mesure que la vitesse décroît.

Si le plan d'ailes reste le même, alors l'oiseau descendra suivant ac et montera suivant cd . La montée et la descente seront variables en grandeur suivant les circonstances.

Le cours de l'oiseau n'est pas alors une ligne spirale, mais une série de 8 ou bien des crochets.

Il reste à expliquer le vol en spirale ascendante. Supposons un oiseau qui, avec une vitesse initiale, décrit des courbes circulaires. Pour cela, on sait que l'oiseau abaisse la pointe de l'aile tournée vers le centre des cercles et élève la pointe de l'aile extérieure. Le plan d'ailes décrit la surface d'un cône tronqué. L'oiseau monte ou descend spiralement selon que la vitesse augmente ou diminue.

Supposons maintenant un mouvement de la couche d'air dans une certaine direction. Du point a au point b l'oiseau reçoit du vent un surcroît de vitesse (fig. 2) et ainsi jusqu'à ce que son cours lui soit perpendiculaire (en c); puis la vitesse diminue jusqu'à un minimum en f . A partir de là commence un nouveau cercle identique au précédent, si la vitesse en f égale celle en a .

Le chemin décrit par l'oiseau s'effectuera dans divers plans suivant les circonstances. En a et f la vitesse est minima; en c vitesse absolue et vitesse relative sont toutes deux plus grandes qu'en a et f .

Entre c et e la vitesse relative croît toujours jusqu'à atteindre son maximum près de e , puis diminue peu à peu de e en f et revient approximativement à la vitesse initiale. Dans tout le chemin cef la vitesse relative est plus grande qu'en a ou f . Or c'est de la vitesse relative que dépend l'effet soule-

nant du courant d'air sur la surface des voiles. L'angle d'inclinaison restant le même, cet effet croît avec la vitesse relative et inversement. Donc l'oiseau s'abaisse peu à peu de a en b ; cet abaissement continue jusqu'à ce que la vitesse relative soit redevenue ce qu'elle était en a ; ensuite l'oiseau monte jusqu'en f ; car jusqu'à ce point la vitesse relative est plus grande qu'en a . Le point f doit être au-dessus du niveau de a .

Nous supposons que la vitesse relative en a suffit précisément pour soutenir l'oiseau à cette hauteur. Si elle est plus grande, l'oiseau monte d'abord.

La projection verticale (fig. 2) est due à l'influence du vent sur la forme des

cercles, en supposant le plan d'ailes invariable.


Le rayon du cercle s'agrandit pour la même inclinaison du plan d'ailes vers l'axe du cercle, à mesure que la vitesse absolue augmente (à cause de la force centrifuge); plus la vitesse relative est grande, plus le chemin se courbe, par suite de la pression augmentée sur la surface des voiles. Dans la direction du vent, l'oiseau n'est pas accéléré, il l'est s'il a le vent obliquement en arrière. Ce gain de vitesse compense la perte due à la résistance de l'air et l'oiseau conserve sa vitesse moyenne. Il est probable que le voilier, avec une vitesse initiale nécessaire et une orientation convenable de sa surface de voiles, peut continuer à décrire des courbes, la force du vent restant la même.

L'explication de M. Peal¹ se rapproche le plus de la vérité. Il compare l'oiseau à un cerf-volant; mais le point d'attache de la corde au sol, au lieu d'être fixe, doit marcher dans la direction du vent, bien que plus lentement. C'est la différence de la vitesse du mouvement du point d'attache et du mouvement de l'air qui constitue la force nécessaire à la sustentation et à l'élévation de l'oiseau.

Magnus Blix,

Professeur à l'Université de Lund.

¹ Nature, XXIII, p. 10.



BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^o Sciences mathématiques.

Rivereau (P.). — Sur les invariants de certaines classes d'équations différentielles homogènes par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées. Thèse pour le doctorat de la Faculté des Sciences de Paris, Gauthier-Villars, 1890.

La notion d'invariants qui a d'abord été introduite dans l'étude des formes algébriques par MM. Hermite, Cayley, Sylvester, a pénétré depuis dans toutes les branches des sciences mathématiques. Cette notion, étendue par Laguerre aux équations linéaires, a été appliquée par Halphen à la réduction de ces équations aux formes intégrables. En se plaçant à un point de vue tout à fait général, M. Sophus Lie et M. Goursat ont montré *a priori* que les équations différentielles d'une même classe possèdent une infinité d'invariants. Depuis, d'autres auteurs parmi lesquels nous citerons MM. Forsyth, R. Liouville, Painlevé et Elliot ont étudié d'une manière détaillée des équations différentielles d'un type déterminé, en indiquant le moyen de former leurs invariants, ainsi que les relations qui doivent lier ces invariants pour que les équations soient réductibles à certaines formes intégrables.

C'est à cet ordre d'idées que se rattache le travail de M. Rivereau.

L'auteur commence par indiquer des théorèmes généraux sur les invariants des équations différentielles, algébriques par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées : il donne, pour une classe étendue de ces équations, l'expression des invariants à l'aide d'un certain nombre d'invariants fondamentaux ; puis il exprime, en fonction de ces derniers, les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une de ces équations soit réductible à une autre de même forme à coefficients constants.

La partie principale de la thèse est consacrée à la formation des invariants de deux classes d'équations différentielles, qui sont : 1^o les équations du troisième ordre, homogènes et du second degré par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées ; 2^o les équations du second ordre, homogènes et du troisième degré par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées. La méthode suivie consiste à réduire ces équations à une forme canonique, dont les coefficients sont des invariants fondamentaux à l'aide desquels on peut exprimer tous les autres invariants. A titre d'application, l'auteur indique la condition que doivent remplir les invariants fondamentaux :

a) Pour que l'équation admette un facteur intégrant fonction de la seule variable indépendante ;

b) Pour que l'intégrale générale de l'équation puisse être mise sous certaines formes contenant linéairement les constantes arbitraires avec des puissances quelconques de la fonction inconnue ;

c) Pour que l'intégrale générale puisse se déduire de celle d'une équation linéaire, en établissant une relation algébrique entre les constantes arbitraires.

Enfin l'auteur termine son travail par l'étude de quelques équations différentielles dont l'intégrale contient algébriquement les constantes arbitraires.

Les résultats obtenus par M. P. Rivereau sont très dignes d'intérêt et seront utiles à tous ceux qui voudront étudier la théorie des invariants des équations différentielles homogènes. Il serait à souhaiter que d'autres études du même genre fussent entreprises, afin d'étendre, autant que possible, le nombre des cas dans lesquels on peut reconnaître si

l'intégrale générale d'une équation différentielle donnée peut être amenée à contenir algébriquement les constantes arbitraires.

P. APPELL.

Thurston (R. H.). *Director of the Sibley College at Ithaca (New-York).* — A handbook of Engine and Boiler trials and of the indicator and Prony brake for Engineers and technical schools, New-York, chez John Wiley and Sons, 1890.

L'œuvre du célèbre professeur américain Thurston, déjà très considérable, vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage qui prend une grande importance en ce moment où la physiologie des machines à vapeur fait l'objet des préoccupations de tous les ingénieurs dignes de ce nom, et où, sur tous les points civilisés du globe, s'érigent de nombreux laboratoires de recherches mécaniques. Après son magistral traité de la résistance et de la connaissance des matériaux, ses traités de la construction des chaudières, de leurs explosions, du frottement dans les machines, son histoire si complète de la machine à vapeur et sa description des types modernes à grande vitesse, sa philosophie de la détente étendue, etc., etc., voici venir un *Manuel des essais de chaudière et de machine*. On y trouve la description et la discussion des instruments qui y sont employés, des méthodes recommandables pour assurer des résultats exacts, et en même temps pour les interpréter sagement. L'indicateur et le frein y sont traités de main de maître ; on sent que ce livre est écrit par un praticien habité au maniement des instruments de mesure autant que par un savant qui a appris des longtemps à lire dans la nature. Les formules y sont généralement données en mesures anglaises, mais la plupart du temps accompagnées de la traduction en mesures métriques. Ce n'est pas un des moindres mérites de cet ouvrage que de réclamer et de proposer un *type général*, adopté par tous, tant pour procéder aux essais que pour en classer les données et les résultats dans des tableaux modèles. On calculerait difficilement le temps qui serait épargné aux lecteurs et aux chercheurs si l'on formulait le rapport sur tous les essais d'après une méthode précise, invariable, avec les mêmes notations et dans le même ordre. L'ingénieur anglais bien connu, M. Donkin, cherche déjà depuis longtemps à faire prévaloir cette idée ; nous souhaitons qu'il réussisse, ce à quoi ne manquera pas de contribuer l'argumentation claire et décisive de M. Thurston.

V. DWELSHAUVERS-DERY.

Annales de l'Observatoire de Nice, publiées sous les auspices du Bureau des Longitudes, par M. Perrotin, directeur. T. III, texte et atlas. Gauthier-Villars et fils, Paris, 1890.

Le volume débute par une notice du regretté Thollon sur la magnifique carte du spectre solaire exécutée au moyen du grand spectroscopie inventé par l'auteur. Cette carte de la région comprise entre A et b inclusivement est un modèle de clarté et d'exécution et semble mériter, ce que se proposait Thollon, d'être considérée comme une image de l'état du Soleil à notre époque, pouvant servir à enregistrer tout changement un peu notable.

Ce spectre qui a 10^m23 d'étendue comprend 33 dessins et renferme 3.200 raies tant solaires que telluriques. Dans la hauteur il est divisé en 4 bandes horizontales qui correspondent au soleil à 80° du zénith air sec, à 60° air saturé, à 60° air sec et enfin au Soleil tel qu'il s'observerait hors de l'atmosphère terrestre.

Ce spectre, étant la copie fidèle des observations de l'auteur, n'est pas absolument d'accord avec les observations anciennes, notamment celles d'Angström en ce qui touche les longueurs d'onde. Les raies sont rapportées à 252 raies considérées comme fondamentales et qui ont servi à enregistrer toutes les autres.

Le triage des raies telluriques a été opéré en comparant un dessin du spectre solaire à midi avec le même spectre un peu avant le coucher ou un peu après le lever du soleil. Thollon distingue en outre une 3^e classe de raies mixtes telluro-solaires qui se manifeste par des changements d'intensité; telle serait en particulier D₁. Il y a là, comme le signale l'auteur, une difficulté sérieuse. Pour en triompher, il mesurerait la largeur de chaque raie et notait son intensité par une échelle comprise de 1 à 10.

Parmi les observations relatives aux raies telluriques Thollon signale l'apparition, notée une seule fois, de raies déjà enregistrées par Angström. Il y a là matière à bien des réflexions sur la variation de composition de l'atmosphère.

Il faut encore noter les discordances considérables avec le dessin d'Angström dans la portion B-C. Peut-être trouverait-on quelque explication à ces divergences en comparant les spectres aux moments d'activité maxima et minima du soleil.

Un seul point laisse à désirer dans cet admirable dessin : l'absence presque complète de comparaison entre les raies métalliques et les raies solaires. Il y a là une lacune bien regrettable.

Le même volume contient : la continuation du travail de M. Perrotin sur la théorie de Vesta où il donne l'expression développée des perturbations dues à l'action de Jupiter; des observations méridiennes faites au cercle de Brunner par MM. Simonin et Colonnas, à la lunette par MM. Fabry et Jabely; la description détaillée de l'instrument étant réservée pour le tome IV, il n'en est donné qu'une description sommaire; des observations par M. Charlois de comètes et de planètes continuent celles du même auteur parues déjà dans le tome II; des calculs d'orbites du même auteur terminent ce volume qui fait le plus grand honneur à l'Observatoire de Nice, et aux éditeurs MM. Gauthier-Villars et fils.

E. DEMARÇAY.

2^e Sciences physiques ¹.

Melander (G). — De la dilatation des gaz à des pressions inférieures à la pression atmosphérique. *Helsingfors* 1890.

M. Melander s'est proposé de chercher ce que devient le coefficient de dilatation des gaz sous des pressions de plus en plus faibles; après avoir passé en revue les diverses recherches relatives à la dilatation des gaz, l'auteur examine plus particulièrement le travail de Regnault, qui seul s'est occupé du cas des pressions inférieures à celle de l'atmosphère; Regnault était arrivé à ce résultat que le coefficient diminue continuellement avec la pression et il pensait que pour une raréfaction suffisante, il tendrait vers une limite, la même pour tous les gaz. Mais les coefficients déterminés dans ces conditions par Regnault étaient ceux à volume constant, dont la valeur dépend de la loi de compression; d'autre part il n'avait poussé la raréfaction que jusqu'à 110^{mm} de pression. M. Melander a pensé avec juste raison qu'il y avait lieu de reprendre la suite de ces recherches.

L'appareil de M. Melander est disposé pour opérer à volume constant ou à pression constante; mais la disposition expérimentale et la méthode de calcul sont telles que, dans les deux cas, on arrive à un coefficient indépendant de la loi de compression et répondant à la dilatation sous pression constante.

Dans le cas où on opère à volume variable, le gaz provenant de la dilatation est reçu dans une capacité maintenue à la même température que le reste de la masse (soit à la température de l'ébullition de l'eau, les deux phases de l'expérience ayant lieu comme d'habitude à zéro et à 100°). On évite ainsi le reproche fait à la méthode suivie par Regnault, ainsi que M. Mendeleef avait déjà tenté de le faire.

Le gaz dilaté sous pression constante ou variable est mis en communication avec l'une des branches d'une sorte de manomètre différentiel, le *Comparteur*, dont l'autre branche est mise en rapport avec le *Compresseur*; le compresseur, qui est rempli aussi du gaz à étudier, a pour but de produire continuellement dans la branche du comparteur avec laquelle il communique, une pression égale à celle qui est produite dans l'autre branche par la masse de gaz dont on fait varier la température. On arrive à ce résultat en faisant varier convenablement le volume de la masse de gaz renfermée dans le compresseur. En réalité il n'est point nécessaire que le niveau du mercure soit rigoureusement le même dans les deux branches du comparteur, il suffit que la différence des pressions de part et d'autre soit très petite et qu'on puisse la mesurer rigoureusement; cette mesure a été faite par la méthode qui consiste à viser l'extrémité d'une pointe opaque fixe, extrêmement voisine de la surface du ménisque et son image dans celui-ci, ainsi que l'a fait M. P. Chappuis dans son grand travail sur les thermomètres à gaz.

L'équilibre au comparteur ayant été établi dans les deux phases de l'expérience, c'est-à-dire avant et après le chauffage du gaz (soit à zéro et à 100°), le jaugeage des différentes capacités de l'appareil et la connaissance de leur température pendant chaque phase permet d'écrire la relation de laquelle on tire la valeur du coefficient de dilatation.

M. Melander a surtout opéré à volume constant et dans ce cas sa méthode revient à comparer l'augmentation de la pression produite par le chauffage à l'augmentation de la pression produite par diminution de volume, et en conclure quel aurait été le volume du gaz échauffé si celui-ci s'était dilaté sans variation de pression. Le résultat auquel on arrive, en effet, est indépendant de la loi de compression, ainsi que je l'ai déjà dit au début.

On peut reprocher à cette expérimentation un trop grand nombre de termes correctifs dont quelques-uns pourraient être ou supprimés ou réduits à une moindre importance; il y a en effet à tenir compte de 14 capacités et de leurs températures aux deux phases de l'expérience; mais la méthode et les dispositions expérimentales n'en sont pas moins très ingénieuses et M. Melander arrivera certainement à y apporter les quelques améliorations qu'on pourrait désirer.

J'arrive maintenant aux résultats: M. Melander trouve que pour les deux gaz qu'il a étudiés (air et acide carbonique) le coefficient de dilatation diminue d'abord avec la pression; mais que, contrairement à l'opinion de Regnault, cette diminution n'a lieu que jusqu'à un certain degré de raréfaction, à partir duquel il prend des valeurs croissantes. Ce minimum ¹ de la valeur du coefficient aurait lieu pour l'air vers une pression de 170^{mm} de mercure, et pour l'acide carbonique vers 55^{mm}. Sans avoir aucunement l'intention d'infirmer ce résultat, je pense qu'il ne peut être accepté qu'avec réserve, étant donnée la difficulté extrême de mesurer avec exactitude les faibles pressions; qu'on se rappelle les divergences dues à la même difficulté auxquelles ont conduit les recherches faites sur l'élasticité des gaz raréfiés; il suffit d'une erreur systématique très faible dans cette mesure pour

¹ L'ouvrage de M. Eric Gérard : *Leçons sur l'Électricité*, t. II, analyse page 676, n° 21 de la Revue, a été édité par MM. Gauthier-Villars et fils. Paris, 1890.

¹ La valeur de ce minimum serait, d'après l'un des tableaux de M. Melander, égale à 0,003660 et sous une pression de 6^{mm}6 le coefficient aurait augmenté jusqu'à devenir égal à 0,003762. Pour l'acide carbonique, le minimum est moins prononcé dans les limites de pression inscrites au tableau.

fausser de plus en plus la valeur du coefficient au fur et à mesure que la pression diminue, et pour donner lieu à une variation continue qui peut ne pas exister en réalité; cette cause d'erreur n'est du reste probablement pas la seule; qui peut répondre par exemple que les mesures observées soient rigoureusement applicables à une portion quelconque du gaz idéalement isolée du reste de la masse et soustraite à l'action des parois? Il y a donc lieu de varier et de multiplier les expériences avant de se prononcer définitivement, et personne n'est à même de le faire mieux que M. Mehlender. Dans tous les cas son mémoire est un travail sérieux et intéressant; la méthode ingénieuse qu'il a suivie peut rendre des services et les dispositions expérimentales en seront étudiées avec fruit par les physiciens qui s'occupent de ce genre de recherches.

E. H. AMAGAT.

Lefèvre (J.). — Dictionnaire d'Électricité et de Magnétisme. — 1^{re} et 2^e fasc. J.-B. Baillière, Paris, 1890.

La science électrique progresse si rapidement qu'il n'est pas inutile de remettre au point une fois par an les ouvrages qui s'y rapportent; aussi, lors même qu'il existe déjà plusieurs dictionnaires d'électricité, applaudirons-nous à l'apparition de tout ouvrage de ce genre qui, au moins aussi bien fait que ses devanciers, serait plus complet et plus moderne. Mais l'ouvrage de M. Lefèvre n'a pas cette excuse; il encombrera les catalogues, sinon les bibliothèques, d'un numéro de plus, tout en restant très au-dessous des bons ouvrages de même espèce. Nous ne chercherons pas à l'analyser et nous nous contenterons de quelques citations. Prenons par exemple l'article : *Conductibilité électrique*; nous y lisons : « *Propriété que possèdent les corps conducteurs de transmettre l'électricité... La conductibilité dépend de la nature du corps, de sa longueur et de sa section. La conductibilité est l'inverse de la résistance... Elle augmente avec la température....* » — Puis, à l'article suivant : « *Conduction*. Synonyme de conductibilité. »

Si peu que l'on demande à un dictionnaire, au moins peut-on exiger une rigueur absolue dans la définition des mots. Comme le dit l'auteur, la conductibilité est une *propriété*; au contraire, la conduction est un *phénomène*. Sans trop en vouloir à l'auteur de faire dépendre la *conductibilité* des dimensions du corps, nous eussions désiré voir en cet endroit le joli néologisme *conductance*, car, logiquement, ce mot est le seul qui désigne l'inverse de la résistance. Le sens indiqué pour la variation de la conductibilité avec la température est, pour la plupart des bons conducteurs, une grosse erreur. Nous ne multiplierons pas les citations sur ce point, et nous ne surprendrons personne en disant que, pour l'auteur, l'éry et le cheval-vapeur sont des quantités de même espèce.

Mais, ce qui frappe bien davantage à la lecture de cet ouvrage, c'est le manque absolu de proportion. Quatre lignes seulement consacrées aux diélectriques, autant à la dilatation électrique, trois au dromoscope, le très ingénieux appareil du Commandant Fournier, tandis que l'auteur décrit en onze lignes ce qu'il nomme *duel électrique*; nous ne résistons pas à l'envie de reproduire cet article : « Application de l'électricité aux jeux de théâtre. Deux adversaires croisent le fer; ils sont en rapport avec une pile Trouvé; chaque combattant porte une cuirasse qui forme avec l'épée les deux pôles de la pile. Lorsque les deux épées se rencontrent, il jaillit du fer de chaque adversaire une myriade d'étincelles d'un pittoresque effet, et, quand l'une des lames touche la cuirasse de l'adversaire, une puissante lumière projette des rayons éclatants pendant toute la durée du contact. » Cette description est accompagnée d'une gravure.

Nous retrouvons le même abus dans les trois colonnes consacrées aux bijoux électriques, abus qu'une fort jolie figure de Danseuse, parée desdits bijoux, ne parvient pas à faire pardonner. L'article qui suit nous paraît bien superflu, le voici : « *Canne lumineuse*. Canne dont

la pomme, semblable aux bijoux lumineux, renferme une petite lampe à incandescence qu'on peut actionner à l'aide d'une pile placée, ainsi que son commutateur, dans la canne elle-même. » Ne pouvons-nous pas, d'après cela, nous attendre à trouver en son endroit le parapluie lumineux ?

Ce qui précède était déjà composé lorsque le deuxième fascicule de l'ouvrage nous est parvenu; sans vouloir atténuer ce que nous avons dit du premier, nous tenons à constater que le second lui est sensiblement supérieur; les défauts saillants du premier s'y retrouvent sans doute, mais considérablement atténués; bien que nous n'en soyons pas juge, il nous paraît que, sous le rapport de certains détails pratiques et élémentaires, l'ouvrage de M. Lefèvre peut servir de guide.

Mais d'où vient le défaut le plus saillant de ce dictionnaire, la disproportion que l'on constate à chaque page? Elle est due surtout, croyons-nous, au désir d'employer des clichés existants. Tous les catalogues des constructeurs y ont passé; le procédé est légitime assurément, mais à la condition de n'être pas envahissant, et M. Lefèvre l'a poussé à l'excès. L'ouvrage, de 1,100 pages, promet de contenir environ 1,000 figures. Sous ce rapport, il sera sans doute très complet.

Une dernière recommandation, qui, espérons-le, pourra être de quelque utilité à l'auteur, si ces lignes lui parviennent à temps : l'orthographe des mots étrangers aurait fréquemment besoin d'être vérifiée.

Ch. Ed. GUILLAUME.

Willm (Ed.) et Hanriot (M.). — Traité de Chimie minérale et organique comprenant la chimie et ses applications. 4 vol. in-8° de chacun 750 pages avec nombreuses figures dans le texte. Paris, Masson, 1888-1890.

Le plan de ce livre avait été conçu par Wurtz peu de temps avant sa mort. Il se proposait d'écrire un ouvrage d'enseignement supérieur ayant « pour cadre général le programme de la licence » mais renfermant en outre l'exposé des principales applications de la Chimie. Deux de ses élèves, depuis longtemps passés maîtres, ont mis ce projet à exécution : leur livre comprend deux parties, auxquelles leur collaboration a assuré l'unité : la chimie minérale (tomes I et II) et la chimie organique (tomes III et IV).

L'ordre d'exposition qu'ils ont adopté est à peu près celui des traités classiques. Il n'y avait pas lieu de le modifier. Mais, là est surtout l'intérêt de leur ouvrage, MM. Willm et Hanriot ne se sont pas contentés d'exposer avec détails les doctrines : ils ont accordé aussi une large place à la description des faits eux-mêmes, aux moyens pratiques de les observer, aux procédés employés pour extraire les différents corps, les préparer ou les utiliser dans un but industriel. Leur éditeur a bien défini cette partie de leur œuvre en écrivant dans son *Avertissement* : « Les auteurs se sont attachés à montrer tout le parti que l'on pouvait tirer de la science pure au point de vue de ses applications; aussi les principes sur lesquels reposent nos grandes industries ont-ils été suffisamment développés, non dans le but de faire un traité de chimie industrielle, mais de façon à donner au lecteur une idée générale de tout ce qui se rattache à la chimie. »

Le tome I débute par quelques notions, trop sommaires à notre gré, de chimie générale. Vient ensuite l'étude des métalloïdes et de leurs combinaisons. La description de chacun de ces corps a été faite d'une manière très complète : au chapitre de l'eau, par exemple, ont été indiqués avec détails les qualités de l'eau potable, les méthodes pour découvrir et doser les sels dissous, l'hydrotimétrie, les procédés de purification de l'eau, la composition qualitative et quantitative des principales sources minérales, les modes connus ou soupçonnés de minéralisation, enfin la marche générale à suivre dans l'analyse de ces eaux. Pour les corps que l'industrie prépare, tels que l'acide sulfurique, les principales phases de la fabrication ont été décrites avec beaucoup de soin. De belles figures, exécutées à

grande échelle, représentent les appareils. — Les métaux, et les sels, qui font l'objet du tome II, ont été traités dans le même esprit.

La *Chimie organique* offre plus de nouveauté. Cependant M. Hanriot a pensé avec raison qu'il était beaucoup moins intéressant de décrire tous les composés connus, que d'exposer clairement la constitution des plus importants, de ceux que l'on peut considérer comme les générateurs de tous les autres. Les deux volumes qui lui sont dus font bien connaître l'ensemble de la chimie organique, ses méthodes, ses théories, ses applications. On y trouve d'abord les procédés de l'analyse organique, immédiate et élémentaire, décrits en détail, la détermination de la molécule, la théorie des formules de constitution, dont le sens est clairement défini, puis la classification des corps organiques les lois d'homologie, les séries. L'étude des fonctions, dominant toute la chimie organique, a été surtout développée. Puis ont été décrits à la suite les uns des autres les groupes de corps dérivant des diverses chaînes d'hydrocarbures saturés, enfin les isologues de ces corps. Le même ordre a présidé à la disposition de la série aromatique et de la série pyridique.

L. O.

3^e Sciences naturelles.

Flot (Léon). — Recherches sur la structure comparée de la tige des arbres. *Thèse de Doctorat de la Faculté des Sciences de Paris*. G. Masson, 1890.

Lorsqu'une graine germe, les différentes parties de la plante ont un mode de nutrition différent de celui des parties de même nature morphologique qui se développent sur la plante adulte. M. Flot a cherché à savoir si leur structure était aussi différente. La tige est le seul organe qu'il ait étudié.

En réalité, des modifications existent dans la disposition et l'importance des éléments, et M. Flot les a mises en évidence dans de nombreux schémas représentant comparativement, pour un assez grand nombre d'espèces, des coupes transversales, pratiquées d'une part dans la région tigellaire âgée d'un an, et, d'autre part, dans une branche verticale de même âge, mais prise sur la plante adulte. L'auteur emploie le terme de *région tigellaire* et non pas de *tigelle*, parce qu'il a reconnu que la structure propre à la tigelle se continue, dans certaines espèces, suivant la longueur de plusieurs entre-nœuds au-dessus des cotylédons. Des photographies très bien réussies, jointes à son travail, montrent tout le parti que l'on pourra tirer de ce mode de représentation, lorsqu'il sera entré dans la pratique courante des laboratoires.

Nous rappelons ici seulement l'un des résultats acquis par l'auteur et qui nous a paru d'une certaine importance, bien que M. Flot n'en ait pas fait ressortir l'intérêt dans les conclusions de son travail. On admet généralement que dans le cylindre central de la tige d'un arbre, il existe d'abord une structure primaire caractérisée par la présence de faisceaux libéro-ligneux séparés l'un de l'autre par du tissu conjonctif et disposés en cercle. A celle-ci fait suite une structure secondaire due à une assise de méristème qui se développe entre les faisceaux aux dépens du tissu conjonctif, et engendre du bois secondaire et du liber secondaire, pour former un anneau libéro-ligneux. Or, d'après M. Flot, ce schéma classique n'appartient qu'à la région tigellaire. Dans une branche, il n'y aurait, à proprement parler, pas de structure primaire; on trouverait dans la partie la plus jeune de la branche une zone annulaire semblable à un méristème et siège d'un cloisonnement très actif, aux dépens de laquelle les faisceaux libéro-ligneux se développeraient. Ce fait montre une fois de plus combien il est nécessaire, dans les descriptions anatomiques, d'indiquer à quelle place et dans quelles conditions les observations ont été faites.

C. SAUVAGEAU.

Saint-Rémy (Dr G.). — Contribution à l'étude du cerveau chez les Arthropodes trachéates. *Thèse de Doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris*. Arch. de zoologie exp. et gén., 2^e série t. V bis, suppl., Hémivald, Paris, 1890.

M. Saint-Rémy a choisi un sujet très limité. Laissant de côté dans le système nerveux des Trachéates tout ce qui n'est pas le cerveau proprement dit, chaîne ventrale, nerfs périphériques, système stomato-gastrique, organes des sens, il l'a réduit encore en écartant résolument toutes les questions relatives à la structure histologique et aux rapports des centres nerveux avec les parties voisines. Il y a là peut-être excès de spécialisation et le travail eût certainement gagné en intérêt à n'être pas renfermé dans des limites aussi étroites.

Ces réserves faites, il faut reconnaître que M. Saint-Rémy a tiré le meilleur parti possible du sujet et a fourni par l'étude d'une vingtaine de types embrassant les formes les plus caractérisées des Myriapodes, Aranéides, Phalangides et Scorpionides les bases solides d'une comparaison qui manquait entre le système nerveux de ces animaux et celui des Insectes et des Crustacés supérieurs. Il a montré par une étude approfondie, parfois d'une minutie extrême, qu'au lieu de la simplicité attribuée jusqu'ici au cerveau des Myriapodes et des Arachnides, il faut admettre une complexité parfois aussi grande que chez les types les plus élevés des Insectes et des Crustacés et que les mêmes parties s'y retrouvent avec la même signification morphologique.

C'est chez les Myriapodes, comme on pouvait le prévoir *a priori*, que le cerveau se rapproche le plus de celui des Insectes. Comme chez ces derniers, la partie sus-œsophagienne du système nerveux comprend trois ganglions déterminant trois zonites pré-buccaux :

Le premier porte les yeux et a pour masse ganglionnaire le *protocerebron*, formé de deux lobes optiques et deux lobes frontaux, siège particulier des fonctions psychiques.

Le deuxième porte les antennes et a pour ganglion le *deutocerebron*, formé des deux lobes antennaires présentant chacun une petite région olfactive peu différenciée.

Le troisième, qui chez les Crustacés porte les antennes externes, est ici, comme chez les Insectes, dépourvu d'appendices. Il a pour organe central le *tritocerebron* formé des deux lobes œsophagiens des Crustacés, plus le ganglion stomato-gastrique soudé ici intimement avec le cerveau. Le libre reçoit ses nerfs du tritocerebron, mais n'a pas valeur d'appendice.

Les Arachnides s'éloignent davantage du type fondamental, mais présentent une unité de plan remarquable. Partout le cerveau ne se laisse décomposer qu'en deux parties :

1^o un protocerebron du type ordinaire et ne présentant rien de particulier.

2^o un ganglion *rostro-mandibulaire*, très hétérogène, formé par la fusion de deux centres primitivement distincts, inférieurement le ganglion des chélicères, d'origine sous-œsophagienne et qui n'est venu que secondairement se souder à la masse sus-œsophagienne, et supérieurement une masse qu'on ne peut distinguer nettement de la précédente, mais qu'il faut regarder comme un rudiment de tritocerebron, car elle émet le nerf rostral qui chez tous les autres types provient de cette partie du cerveau. Le deutocerebron fait entièrement défaut et avec lui ont disparu le deuxième zonite et ses appendices, les antennes, que rien ne représente plus chez les Arachnides.

Enfin, l'auteur a pu étudier au même point de vue le cerveau du *Peripatus* qu'il a trouvé formé également de la soudure de deux parties d'origine différente, un ganglion *mandibulaire*, d'origine sous-œsophagienne, et un ganglion *céphalique* qui ne se laisse que difficilement, et même un peu hypothétiquement, résoudre en les trois parties habituelles du cerveau des Arthropodes.

Quatorze planches renfermant plus de 150 figures de sections réelles sur des cerveaux soigneusement isolés au préalable et que 10 figures d'ensemble dans le texte permettent de coordonner aisément, témoignent du labeur considérable et de la conscience avec laquelle M. Saint-Rémy a épuisé son sujet. G. Puvion.

Richet (Ch.), *Professeur à la Faculté des Sciences de Paris. — Cours de Physiologie. Programme sommaire, 1 vol. in-12, Bureaux des Revues, Paris, 1891.*

En publiant ce programme, plus détaillé que le titre l'indique, M. Ch. Richet a voulu donner à ses élèves une sorte de memento de son cours. Mais ce n'est pas seulement aux étudiants que ce petit livre rendra service. Ceux qui depuis longtemps déjà ont quitté les bancs des écoles, trouveront aussi plaisir et profit à le consulter. L'auteur y a condensé en effet, en les classant avec méthode, tous les faits principaux de la physiologie humaine, les procédés employés pour les découvrir, les lois qui s'en dégagent et les hypothèses qu'ils suscitent. Dans chaque chapitre il a eu soin d'indiquer d'une façon sommaire, mais très nette, l'ordre historique des découvertes, le sens des progrès réalisés et les lacunes de la science actuelle. A l'intérêt de ces documents s'ajoute celui d'une bibliographie bien comprise. Un auteur médiocrement érudit eût été tenté de la faire abondante. M. Richet s'est surtout efforcé de la choisir : pour chaque question il l'a réduite aux pages qui s'y rapportent d'une manière spéciale dans trois ou quatre livres ou articles de nos grands dictionnaires. Les étudiants qui s'y référeront acquerront ainsi une connaissance très solide de toute la physiologie contemporaine.

Bien qu'écrit dans le style laconique d'un programme, le livre de M. Richet systématise les faits et les idées avec une telle clarté qu'on peut le lire comme un ouvrage didactique, à moins d'être absolument ignorant en la matière. Cette qualité le recommande aussi à ceux qui tiennent à ne point oublier. L. O.

4° Sciences médicales.

Harley (Georges). — *Traité des maladies du foie traduit de l'anglais et augmenté d'un Mémoire sur l'intervention chirurgicale dans les maladies des voies biliaires, par Paul ROBERT, Paris, Georges Carré, 1890.*

Œuvre personnelle, ce traité est le compte-rendu des monographies classiques qui doivent contenir une étude complète de chacune des affections hépatiques. Certaines questions sont à peine esquissées, d'autres, au contraire, sont décrites avec les plus grands détails, telle par exemple, celle, si importante, de l'ictère, qui occupe toute la seconde partie de l'ouvrage; son étiologie, sa pathogénie, ses rapports avec les divers états morbides, dans lesquels on l'observe, sont très complètement étudiés. De nombreuses observations personnelles, des recherches de laboratoire suivies rendent cette partie de l'ouvrage particulièrement intéressante.

Le mémoire dû à M. Rodet, qui a trait à l'intervention chirurgicale dans les maladies des voies biliaires, présente des qualités inverses. A une époque où ces interventions chirurgicales n'ont encore été faites qu'en petit nombre, il faut pour se faire une opinion, rassembler tous les cas publiés. A ce point de vue nous devons adresser des remerciements à l'auteur, car il a réuni sous une forme assez concise la presque totalité des observations publiées jusqu'en 1887, si bien que l'on peut se faire une idée assez nette de la cholécystotomie et de la cholécystectomie par la seule lecture de son travail. D^r HENRI HARTMANN.

Fournier (Alfred). — *Professeur à la Faculté de Médecine. — Syphilis et Mariage, Paris, G. Masson, 1890.*

Dans le cours de cette année, M. A. Fournier a publié la deuxième édition de son livre *Syphilis et Mariage*; dix nouvelles années d'observations n'ont fait que con-

firmer en tous points les doctrines émises dans la première édition par le savant professeur de la Faculté de Paris. A un moment où l'on s'occupe activement de rechercher les causes du faible accroissement de la population en France et les moyens d'y remédier, il est utile d'étudier quel est, en l'espèce, le rôle de la syphilis. *Syphilis et Mariage* fournit à ce propos des documents abondants, dont on jugera la valeur quand on saura qu'un père syphilitique n'engendre qu'un enfant viable sur quatre, soit une mortalité de 25 0/0, que cette mortalité s'élève à 71 0/0 lorsque les deux conjoints sont contaminés. Mais, d'autre part, le syphilitique dont la maladie est éteinte, n'est plus dangereux : il peut engendrer des enfants parfaitement sains; il était donc d'une extrême importance de définir les conditions auxquelles devait répondre un syphilitique pour que sa syphilis pût être considérée comme éteinte, pour qu'il fût admissible au mariage. Ces conditions, le professeur Fournier les a formulées magistralement sous forme de lois portant sur l'âge de la syphilis (au moins 4 ans), les caractères de son évolution, le traitement à suivre, etc.; elles forment un véritable code dont doit profondément se pénétrer tout médecin soucieux du rôle élevé qu'il est appelé à remplir, et c'est ainsi que *Syphilis et Mariage* n'est pas seulement une œuvre médicale d'une grande utilité, mais encore une œuvre de sociologie des plus élevées. D^r ED. DE LAVARENNE.

Tripiér (R.). *Professeur à la Faculté de Médecine de Lyon. — Note sur un fait contribuant à établir l'existence de l'endocardite tuberculeuse. Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique, 1^{re} série, t. II, 1890.*

La tuberculose des vaisseaux (veines pulmonaires, veine cave inférieure, canal thoracique, etc.) a été signalée par plusieurs auteurs (Pockick, Hanau, Weigert, J. Arnold, Mütze, Weichselbaum); la localisation du bacille de la tuberculose sur l'endocarde est, au contraire, exceptionnelle, et l'on n'en connaît que quelques cas signalés par Rindfleisch et par Cornil et Babes. A ce titre, l'examen histologique d'une endocardite aiguë tuberculeuse faite par M. Tripiér présente un très grand intérêt.

A l'autopsie d'un jeune sujet atteint de tuberculose miliaire généralisée, l'auteur a trouvé, au niveau de la face inférieure de la valvule mitrale, un nodule tuberculeux que le microscope lui a montré parsemé de cellules géantes. La face supérieure de la valvule était le siège d'une endocardite aiguë végétante; la structure des végétations était la même que celle du nodule. Il n'a pas été possible de découvrir la présence de bacilles de Koch sur deux coupes colorées dans ce but. Si l'examen eût porté sur un plus grand nombre de coupes, il eût été peut-être positif. Mais, dans l'espèce, la constatation des cellules géantes a la valeur de celle du bacille.

Discutant la pathogénie de cette lésion, M. Tripiér admet que les bacilles versés dans la circulation se sont arrêtés entre les piliers valvulaires et y ont donné lieu à la formation d'un coagulum albumino-fibrineux qui s'est organisé et infiltré de nombreuses cellules embryonnaires.

Ce cas suscite au savant professeur de Lyon quelques idées d'ordre plus général. S'appuyant sur la fréquence des lésions cardiaques chez les tuberculeux, il regarde comme étant de nature tuberculeuse certaines endocardites anciennes, avec ou sans lésions récentes, qui se présentent chez ces malades. Il pense néanmoins que ces faits ne vont pas à l'encontre de la théorie de l'antagonisme entre les maladies du cœur et la phthisie pulmonaire. Selon lui, lorsque la tuberculose est primitivement localisée à la fois dans le poulmon et dans le cœur, l'une des deux affections : cardiaque ou pulmonaire, finit toujours par prendre le pas sur l'autre et par s'opposer à son développement.

D^r H. VINCENT.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 24 novembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A. La Maestra : Généralisation d'un théorème d'Abel. — M. Sylvester : Sur le rapport de la circonférence au diamètre. — M. G. Bigourdan. Observations de la comète Zona (15 novembre 1890) faites à l'Observatoire de Paris, (équatorial de la tour de l'Ouest). — M^{lle} D. Klumpke : Observation de la nouvelle comète Zona (Palerme, 15 novembre 1890) faite à l'Observatoire de Paris (équatorial de la tour de l'Est).

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. E. Branly en étudiant la conductibilité d'une couche mince de limaille métallique, a constaté, que la résistance d'une telle couche, variable dans chaque cas particulier, mais toujours assez grande, diminue considérablement sous l'influence des phénomènes électriques suivants : décharge électrique éclatant à une distance plus ou moins grande, passage d'un courant induit, passage d'un courant de pile très énergique. — Dans une précédente communication, M. Ch. Fabry avait établi la théorie de la visibilité des franges d'interférence lorsque la source éclairante est limitée, et montré que la netteté des franges est périodique; il applique cette théorie à deux cas simples, le cas d'une ouverture rectangulaire et celui d'une fente linéaire mal réglée; la théorie se vérifie avec tous les appareils producteurs de franges d'interférence. — En décomposant le cyanogène par la chaleur au contact d'un fragment de charbon de cornue saupoudré de cryolithe, MM. P. et L. Schützenberger ont obtenu une variété nouvelle de carbone; elle est disposée en fins filaments élastiques; oxydée suivant la méthode générale que M. Berthelot a instituée pour l'étude des types du carbone, elle a fourni des produits d'oxydation qui doivent la faire ranger à côté du graphite électrique. — M. J. Garnier fait ouvrir un pli cacheté déposé par lui en mai 1887; ce pli renferme un procédé pour obtenir un bleu analogue au bleu de colbat, au moyen du chromate de potasse, du spath fluor, et de la silice. — M. D. Gernez a appliqué sa méthode de la mesure du pouvoir rotatoire à la détermination de combinaisons formées par les solutions aqueuses d'acide malique avec le molybdate double de potasse et de soude et le molybdate acide de soude. — M. Doumet-Adanson décrit un tornado qu'il a observé à Fourchambault (Nièvre), le 1^{er} octobre dernier. Le phénomène était violent, mais très localisé; les dégâts sont compris dans un espace de 400 m. sur 200, ils ne s'étendent pas à moins de 10 m. au-dessus du sol; la rotation avait lieu dans le sens des aiguilles d'une montre.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. A. Sabatier a suivi les diverses phases de la spermatogénèse chez les Locustides, dont le spermatozoïde se signale par l'existence d'une coiffe céphalique non chromophile; celle-ci provient de vésicules nucléaires qui, se formant dans le noyau en grand nombre, se fusionnent entre elles de façon à se réduire à trois; celles-ci font hernie hors du noyau et constituent la coiffe; dans cette émigration, elles ont perdu leur affinité pour les matières colorantes. — M. H. Prouho a retrouvé la *Cyclotellu annelidicola* de MM. Van Beneden et Hesse; ses observations le conduisent non seulement à rapporter cette espèce aux Bryozoaires, mais encore à la faire rentrer dans le genre *Loxosoma*. — M. Willot signale les eaux ammoniacales du gaz d'éclairage comme très efficaces pour la destruction de l'*Elleudera Schachtii*,

nématode parasite de la Betterave; ses expériences ne lui permettent pas de croire que les œufs de ce parasite puissent traverser sans périr le tube digestif du mouton et par suite contaminer les fumiers. — Des essais de M. A. Girard, il résulte que la pomme de terre cultivée en France suivant ses indications se trouve, au point de vue de la fabrication de l'alcool, dans des conditions économiques au moins aussi avantageuses que celles où elle se trouve en Allemagne. — M. Daubrée a fait des expériences dans le but de déterminer si l'on peut attribuer à des gaz la formation des cheminées diamantifères du Cap. Celles-ci se présentent au milieu de roches dures, sous forme de forages cylindriques verticaux, disposés en ligne et comblés par des débris divers; leur diamètre varie de 20 à 450 mètres, par conséquent est faible relativement à leur profondeur considérable. Or, en utilisant les épreuves manométriques à explosifs, modifiées par M. Vieille de façon à admettre un échantillon de roche à la place du manomètre à écrasement, M. Daubrée a obtenu par l'action d'explosifs plus ou moins brisants, des sillons et des tunnels qui reproduisent en petit les cheminées du Cap; pour que, par leur passage rapide, les gaz de l'explosion déterminent des érosions de cette forme dans les diverses roches essayées, calcaire siliceux, schistes, granites, il faut que la voie leur soit indiquée par une ligne perforation ou une fente préexistante; il est probable que les cheminées du Cap se sont produites le long d'une faille. M. Daubrée propose pour ces phénomènes le nom de *diatrèmes*. — M. A. Lacroix : Sur une roche éruptive de l'Ariège et sur la transformation des feldspaths en wernérite.

Séance du 1^{er} décembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. A. Mannheim dans une note précédente avait étudié le déplacement d'un double cône sur deux directrices rectilignes. Il étudie aujourd'hui le cas du déplacement sur deux directrices en hélice, et fait voir qu'on arrive au même résultat, à savoir que le déplacement du corps peut être obtenu en liant ce corps à un cylindre dont la section droite est une spirale logarithmique. — MM. Trepied, Rambaud et Renaux : Observations de la nouvelle comète Zona faites à l'Observatoire d'Alger.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. U. Lala a repris expérimentalement la question, peu étudiée jusqu'ici de la compressibilité des mélanges gazeux. Ses premières expériences portent sur l'air sec et l'acide carbonique sec mélangés en proportions diverses, les pressions variant de 1 mètre à 16 mètres de mercure. A mesure que la proportion d'acide carbonique augmente, la compressibilité du mélange d'abord intermédiaire entre celle de l'air carbonique et celle de l'acide carbonique croît pour se rapprocher de celle de l'acide carbonique la dépasse, puis décroît en tendant de nouveau, nécessairement, vers celle de l'acide carbonique pur. — M. R. Salvador Bloch indique la méthode qu'il emploie pour étudier la réflexion et la réfraction par les corps à dispersion anormale; elle consiste essentiellement dans l'emploi de pellicules colorées dont on fait varier l'épaisseur. — Pour différencier les taches d'arsenic des taches d'antimoine fournies par l'appareil de Marsh, M. G. Denigès propose d'utiliser les caractères micro-chimiques de l'arsenomonolybdate d'ammoniaque. — MM. A. Michel Lévy et A. Lacroix ont déterminé les indices de réfraction principaux de l'anorthite. — M. H. Faye attire l'attention sur la trombe de Fourchambault, qu'il d'après la relation succincte de M. Doumet Adanson consti-

tueraient une variété rare de ces phénomènes. — **M. Alf. Angot** communique quelques observations faites à la Tour Eiffel sur la vitesse du vent et les mouvements verticaux de l'atmosphère enregistrés au moyen d'appareils nouveaux.

3° SCIENCES NATURELLES. — **M. A. Mallèvre** a étudié la façon dont l'acide acétique s'oxyde dans l'organisme des mammifères. Les variations du quotient respiratoire $\frac{CO_2}{O}$ qui succèdent à l'injection d'acétate de soude

dans les veines de l'animal en expérience, montre que la très grande partie de cet acide est rapidement oxydé et qu'une fraction seulement de la partie brûlée épargne des quantités isodynames d'aliments ternaires. **M. René Drouin** dose l'alcalinité du sang, au moyen de la phthaléine du phénol, sur une très petite quantité de sang, grâce à un procédé qu'il n'indique pas. Appliqué à la série animale, ce procédé montre que d'une façon générale, l'alcalinité du sang croît comme l'activité des échanges respiratoires. — **M. Et. Jourdan** a observé, dans la trompe des Glycères (Annélides) immédiatement au-dessous de la cuticule, une couche fibreuse avec noyaux, comparable à la névroglie mais qui doit suivre l'auteur être rapporté à l'épithélium. — **M. H. Viallanes** décrit la structure microscopique des centres nerveux du Limule. — **M. R. Moniez** a trouvé une nouvelle espèce de *Nematobothrium* parasité des thons ; cette espèce est polymorphe, certaines formes vivant libres ou semi-libres dans les cavités digestives, les autres enkystées à deux dans les branchies. De l'ensemble des caractères, l'auteur conclut que ce genre doit être rapporté aux Trématodes. — On connaissait aux Echinodermes deux systèmes nerveux, l'un ambulacraire ou superficiel partant de la face orale, l'autre proche du premier, mais interne ou profond. **M. Cuénot** a reconnu chez les Astéries l'existence d'un troisième système, bien développé à la face aborale, où il tapisse les faisceaux musculaires péritonéaux; ce système *entérocoelien* existe aussi chez les Ourisins et les Ophiures. On doit le considérer comme l'analogue du système nerveux des Crinoïdes. — **M. J. Demoor** a observé les mouvements de locomotion chez les arthropodes et décrit les divers types de marche qu'il a pu reconnaître. — **M. E. Bastit** a étudié comparativement l'influence de la lumière et de la pesanteur sur la direction de la tige des mousses. De ses expériences faites soit dans l'air soit dans l'eau il résulte que la tige des Mousses (*Polytrichum*) est douée d'un faible géotropisme négatif, et d'un héliotropisme positif beaucoup plus puissant, de sorte qu'en résultant, la tige se dirige toujours vers la lumière. — **M. L.-J. Léger**, a reconnu chez les Fumariacées l'existence d'un système de laticifères bien développé, contenant un latex limpide rouge. — **M. G. de Saporta** décrit de nouvelles flores fossiles observées en Portugal, et marquant le passage entre les systèmes jurassique et infacratéacé. — **M. J. Seunes** signale la présence de Rudistes dans la couche à *Orbitolines* des Basses-Pyrénées, qu'il avait attribuée au Cénozanien ; la découverte de ces fossiles confirme cette attribution. **L. LAPICQUE.**

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 23 novembre 1890.

M. Périer est élu membre titulaire dans la section de chirurgie.

Séance du 2 décembre 1890.

MM. Terrillon et Chaput présentent l'observation d'une malade sur laquelle ils ont pratiqué l'anastomose de l'S iliaque et de l'intestin grêle pour un anus contre nature ombilical consécutif à une hernie étranglée et gangrenée. Succès opératoire, selles normales chaque jour. — **M. Henrot** (de Reims) communique le cas d'un enfant nouveau-né allaité par sa mère qui présentait pendant 15 mois, à la vulve et à la partie supérieure de la cuisse droite, une éruption herpétiforme correspon-

dant à la date des époques menstruelles chez la mère. Toxémie cataméniale héréditaire. — **M. Hallopeau** fait une communication sur un cas de cocaïnisme aigu survenu après injection de huit milligrammes. Les accidents observés, surtout chez les sujets nerveux, consistent en une céphalalgie persistante, profond malaise, insomnie, engourdissement des membres, défaillance, vertiges, prostration mêlée à de l'excitation cérébrale avec loquacité et agitation; ils peuvent parfois se prolonger même pendant plusieurs mois. — **M. L. Collin**, à propos de la dépopulation de la France, réclame l'assainissement des villes, l'alimentation en eau pure, la revaccination obligatoire. Celle-ci a déjà affranchi l'armée des varioles. Les cas de typhoïde observés dans l'armée sont dus à la mauvaise alimentation d'eau, à l'insalubrité des villes où sont les casernes.

D^r Ed. de LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 6 novembre 1890

M. Féré, enregistrant les mouvements de la langue chez les bégues, a constaté une faiblesse et une lenteur extraordinaire dans ces mouvements. Il a pu, dans un cas, obtenir une amélioration considérable au moyen d'une gymnastique nullement phonétique consistant à rouler une bille d'ivoire dans la bouche. — **M. Schmitt**, ayant constaté que le camphre jouit de propriétés vasotoniques, a recherché si parmi les combinaisons des divers camphres avec le chloral, il ne s'en trouverait pas une atténuant l'action dépressive que ce médicament exerce sur la circulation; le menthol-chloral paraît répondre à ce desideratum. — **M. Laborde** présente le cerveau du lapin pyocyanique qu'il avait montré quinze jours auparavant avec des troubles moteurs d'origine cérébrale. Il y a sur un des pédoncules cérébraux une petite hémorragie entourée de foyers congestifs. — **M. Fabre-Domergue** a reconnu que la prétendue bouche des *Trachelius* (Infusoires) est une dépression en fossette de la cuticule. — **M. Pouchet** a retrouvé dans des textes anciens la mention de deux échouages de cétaqués qui avaient été oubliés jusqu'ici sur les catalogues spéciaux. — **M. Jumelle** a étudié les échanges respiratoires des lichens; s'il est vrai qu'en été ils ne dégagent point d'oxygène, en hiver au contraire, ils en dégagent et par conséquent assimilent du carbone. C'est de leur état hygrométrique que dépend cette assimilation; elle est d'autant plus active qu'ils sont plus humides.

Séance du 29 novembre 1890

M. J. Chatin a constaté que l'épithélium des crêtes acoustiques du Vanneau se vascularise. — **M. A. Nicolas** a trouvé un muscle présternal chez deux jumeaux morts peu de temps après leur naissance; la même anomalie existait chez la mère, comme on a pu s'en assurer par l'excitation électrique de la région thoracique; le muscle présternal contracté se sentait très bien à travers la peau. — **MM. Railliet et Lucet** décrivent des Coccidies qu'ils ont trouvées dans les villosités intestinales du chien et du putois; elles ne semblent avoir aucune influence pathologique; ils ont trouvé des Coccidies analogues dans les fèces de deux malades atteints de diarrhée chronique. — **M. Phisalix** a trouvé, vivant en parasite dans les pousins du Dauphin, une nouvelle espèce de filaire, à laquelle il donne le nom de *Filaria semi-inclusa* en raison de la particularité suivante; la moitié antérieure du parasite est pelotonnée dans un kyste qui fait le centre d'un tubercule, l'autre moitié flotte dans la bronche. — **MM. A. Mathieu et Rémond** communiquent les expériences de contrôle auxquelles ils ont soumis la méthode du coefficient de partage entre l'eau et l'éther, appliquée à l'analyse du suc gastrique ils ont étudié chez un sujet normal les variations de l'acidité avec les diverses phases de la digestion. — **M. L. Lapicque** précise les conditions dans lesquelles il faut faire réagir

les sulfocyanates alcalins sur le fer pour doser ce métal par son procédé colorimétrique. — M. Chardin présente divers échantillons de pain contenant du sang; la fermentation panaria a détruit le goût du sang.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 5 décembre 1890.

M. Leduc étudie la résistance électrique du bismuth dans un champ magnétique. Il y a quelques années déjà, l'auteur a montré que la résistance d'un barreau de bismuth augmente quand on vient à le soumettre à l'action d'un champ magnétique, l'unité de résistance subit alors une augmentation $\propto$ liée à la valeur M du champ par une formule hyperbolique; les coefficients de cette formule varient avec la température. M. Leduc s'est proposé de déterminer cette variation, il a, à cet effet, préparé du bismuth aussi pur que possible, et a chauffé les échantillons obtenus dans une petite étuve à double enveloppe au moyen de courants de liquides ou de vapeurs produisant des températures variant entre 10° et 160° . L'influence du magnétisme va en diminuant quand la température augmente, et si l'on représente les résultats par une courbe, on constate que cette influence paraît devoir s'annuler pour une température très voisine du point de fusion du bismuth. — M. le Commandant Renard fait une conférence sur l'électrolyse industrielle de l'eau; après avoir retracé l'histoire de la question, il insiste sur la façon très défectueuse au point de vue économique dont on construit encore aujourd'hui les voltamètres ordinaires; l'emploi de fils de platine comme électrodes est fort dispendieux; la forme de ces électrodes rend la résistance de l'auge électrolytique considérable, les éprouvettes dont on les recouvre accroissent encore cette résistance. M. Renard a cherché à supprimer ces inconvénients. Très avantageusement on remplace le platine par de la simple tôle, à condition toutefois de substituer à la solution ordinairement utilisée d'acide sulfurique, une solution alcaline; la soude à la chaux fournit d'excellents résultats, la conductibilité est aussi grande qu'avec l'acide, l'attaque des électrodes absolument nulle, d'ailleurs la soude demeure intacte, seule l'eau distillée doit être renouvelée au fur et à mesure de sa décomposition. Pour diminuer la résistance, on prendra des électrodes de très grandes surfaces et on les séparera par une cloison poreuse se laissant aisément traverser par le courant, mais s'opposant à la réunion des gaz produits. Une simple toile d'amiante suffit, comme le démontrent plusieurs expériences répétées devant la Société, à empêcher la réunion des gaz, tandis que le courant traverse facilement cette toile imprégnée dans tous ses filaments du liquide conducteur. M. Renard a fait construire un voltamètre formé de deux cylindres de tôle concentriques, haut de $2^m,50$ environ, séparés par un sac de toile d'amiante; avec une force électro-motrice de 2 volts 7, on obtient avec ce cylindre le rendement maximum; les gaz qui se dégagent se rendent dans des gazomètres séparés, une disposition très simple permet d'éviter la dangereuse réunion des gaz dans l'intérieur du voltamètre, au cas où l'un des tubes de dégagement viendrait à s'obstruer. Les gaz obtenus sont parfaitement purs: l'hydrogène a une densité sensiblement plus faible que l'hydrogène impur préparé par les autres procédés industriels, c'est là un avantage fort appréciable pour les aéronautes; l'oxygène produit dans une solution alcaline, est débarrassé d'ozone, les médecins pourraient ainsi l'utiliser sans inconvénient. M. Renard termine sa conférence par la description d'un projet théorique d'usine à gaz oxygène et hydrogène, les calculs qu'il a effectués prouvent que les frais de première installation seraient très minimes et que la production d'un mètre cube de gaz ($\frac{1}{2}$ de O , $\frac{2}{2}$ de H) reviendrait seulement à la somme de 0 fr. 16.

LUCIEN POINCARÉ.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance des 14 et 28 novembre 1890.

M. Maquenne décrit un procédé de formation des acides pyrazolcarboniques par union des aldéhydes de l'acide nitrotartarique et de l'ammoniaque. Ces acides se dédoublent par la chaleur en acide carbonique et pyrazols β substitués. — M. Bidet montre que l'altérabilité d'un grand nombre de composés aromatiques est due à la présence de corps thiophéniques. Il indique que l'aniline, la méthylaniline, la naphthylamine, etc., débarrassées de thiophène n'ont plus leurs réactions colorées habituelles. — M. Zune fait une communication sur l'analyse des beurres. — M. Béhal a retiré de l'éther benzoïque dans le dédoublement de la cocaïne par la potasse alcoolique. — M. Nolting présente une note sur les transpositions moléculaires des composés hydrazoïques et indique les conditions où il faut se placer pour obtenir des corps du groupe de la benzidine. — M. Calderon, en étudiant des taches noires sur des bijoux en or mat, y a reconnu la présence de Penicillium qu'il a pu isoler et caractériser. — MM. Béhal et Choay décrivent deux nouveaux isomères de la chloralimide. — MM. Mourgues et Chapoteaut ont retiré des graines de Persil un corps différent de l'Apiol. — M. Ph. A. Gaye indique de nouveaux exemples confirmant sa loi de variation des pouvoirs rotatoires. — M. Friedel appliquant l'hypothèse du tétraèdre à la formule de Kékulé, montre que la formule de la benzène ainsi développée permet d'expliquer toutes les isoméries des composés benzéniques et rend compte de l'absence de pouvoir rotatoire dans cette série.

Séance industrielle du 3 décembre 1890.

MM. Massignon et Watel indiquent un nouveau procédé de fabrication deschromates fondé sur l'oxydation lente à l'air du chromite de calcium. — M. Ferdinand Jean propose un procédé d'analyse des cires qui permet d'y retrouver la paraffine, l'acide stéarique et la stéarine. Il montre ensuite les difficultés de la recherche des acides minéraux libres dans le vin, et leur importance au point de vue de la fabrication. — M. Lindet indique l'origine du furfural dans les alcools commerciaux. Il fait ensuite l'étude comparée des alcools de betterave et de pomme de terre.

D^r HANRIOT.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 27 novembre 1890.

1^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Francis Galton fait une communication sur les sillons du pouce et des doigts, sur leur arrangement en classes naturelles distinctes, sur la permanence des crêtes papillaires distinctes qui les déterminent, et sur la ressemblance entre ces classes et les genres ordinaires. Il a pris l'empreinte de la pulpe des doigts et du pouce d'un grand nombre de personnes. Il a constaté que les dessins formés par les crêtes papillaires sur le pouce et les doigts peuvent se ramener à dix classes principales. L'origine de ces dessins doit être attribuée à l'angle, dont l'extrémité oblige les crêtes papillaires voisines à se recourber en arc et à laisser un intervalle entre elles et les crêtes papillaires horizontales qui se trouvent au-dessous. Cet intervalle est rempli par les enroulements divers qui constituent les dessins en question. En comparant des empreintes prises à 30 ans de distance, on a pu s'assurer de la constance des mêmes dispositions chez les mêmes personnes. Les variations des dessins, à partir de formes typiques centrales, concordent avec la loi théorique de l'erreur probable. On peut conclure de là que la sélection naturelle n'agit pas seule pour créer des genres ou les maintenir dans leur pureté. — M. V.-H. Veley a étudié les conditions des échanges chimiques entre l'acide nitrique et certains métaux. 1) Le cuivre, le mercure et le bismuth ne se dissolvent pas dans l'acide nitrique, employé d'ordinaire pour la préparation du bioxyde

d'azote (à la concentration de 30 0/0 environ), pourvu qu'il ne contienne pas d'acide azoté. 2) Si ces métaux se dissolvent, la quantité de métal dissout varie proportionnellement à la quantité d'acide azoté, pourvu que l'acide nitrique soit en grand excès. 3) Lorsque ces métaux se dissolvent, il est probable qu'il se forme d'abord un nitrite métallique en même temps que le bioxyde d'azote; l'acide nitreux est mis en liberté par l'acide nitrique en excès et se décompose au fur et à mesure. 4) L'acide nitreux est toujours le premier produit de réduction. — MM. C.-J. Burch et V.-H. Veley ont étudié les variations de la face électromotrices des piles faites de certains métaux, de platine et d'acide nitrique. 1) Lorsqu'on met dans de l'acide nitrique purifié à différents degrés de concentration du cuivre, de l'argent, du bismuth et du mercure et un couple fait avec du platine, la face électromotrice de la pile s'accroît rapidement jusqu'à ce qu'elle ait atteint une valeur constante, et dans la plupart des cas, une valeur maxima 2). La face électromotrice maxima est atteinte de suite, si on a ajouté de l'acide nitreux à l'acide nitrique. 3) Plus la température est élevée, plus l'acide est impur et concentré, plus est rapide la dissolution du métal, et par conséquent, la production d'acide nitreux, ce qui détermine une augmentation proportionnelle de la rapidité d'accroissement de la force électromotrice. 4) Si on ajoute au liquide des substances qui, comme l'urée, tendent à détruire l'acide nitreux à mesure qu'il se forme, l'accroissement de la force électromotrice devient très lent.

2° SCIENCES NATURELLES. — M. Walter Heape, présente une note préliminaire sur la transplantation et le développement des ovules des mammifères dans un autre utérus; il prouve qu'un ovule fécondé d'une certaine variété de lapin peut se développer complètement dans l'utérus d'une autre variété de lapin. On a pris deux ovules sur une lapine angora qui avait été fécondée trente-deux heures auparavant par un lapin de même espèce. Ils ont été déposés à l'extrémité supérieure de la trompe de Fallope d'une lapine-lièvre belge qui avait été fécondée trois heures auparavant par un mâle de même espèce. Jusqu'à l'expérience on l'avait soigneusement isolée des mâles et on peut garantir qu'elle était vierge. La lapine-lièvre belge mit bas six petits; quatre d'entre eux ressemblaient à son mâle et à elle-même, tandis que les deux autres étaient de vrais angoras, caractérisés par leur long poil soyeux et leur albinisme. Les lapins-lièvres belge ne ressemblaient en rien à leurs frères nourriciers, mais possédaient toutes les particularités propres à leur race. — M. Frank E. Beddard présente une note sur l'homologie entre les conduits génitaux et les néphridies chez les Oligochètes. Il a étudié le développement de l'*Acanthodrilus multiparus* (Nouvelle-Zélande). Ses recherches lui ont démontré que les orifices génitaux et une partie au moins des conduits sont des différenciations des néphridies. Ce mode de développement est conforme à l'opinion de Balfour qui dit que chez les Oligochètes la néphridie se divise en deux parties, l'une génitale et l'autre excrétoire.

Richard A. GREGORY.

SOCIÉTÉ ROYALE D'ÉDIMBOURG

Séance du 1^{er} décembre 1890.

M. le Président Sir Douglas MacLagan prononce un discours et déclare ouverte la première séance de la session. — Le professeur Crum Brown lit une notice nécrologique sur le professeur Kolbe. — Le docteur John Gibson présente les résultats qu'il a obtenus dans l'examen analytique de nodules de manganèse; ces rares éléments avaient été dragués par le *Challenger* dans l'Atlantique. Il a constaté la présence dans ces nodules de divers éléments, zinc, tellure, molybdène, vanadium, thallium que l'on n'avait pas encore observés. — M. J. Y. Buchanan lit un mémoire sur la présence du soufre dans la vase et les nodules de la mer, et sur son mode de production. A toute

profondeur, le sable et la vase de la mer forment la base de l'alimentation d'une nombreuse et importante faune; en recherchant leur nourriture, les animaux absorbent et rejettent d'une façon continue de grandes quantités de cette vase. On trouve la confirmation de ce fait dans la structure coprolitique de la vase la plus fine; cette structure est rendue manifeste par une soigneuse levigation. La trituration des silicates avec de l'eau distillée seule produit, on l'a démontré, une décomposition de ces silicates; quand l'appareil de trituration est situé dans l'intérieur d'un animal, où les sécrétions organiques aussi bien que l'eau de mer humectent les substances triturées, il paraît bien possible que les réactions puissent donner naissance à une réduction des sulfates dans l'eau. Comme les silicates qui sont broyés et partiellement décomposés contiennent du fer et du manganèse, il se produit des sulfures de fer et de manganèse qui sont rejetés par les animaux et constituent une vase plus ou moins bleuâtre. Si cette vase repose à la surface du fond de la mer, elle se trouve exposée à l'action de l'eau de mer qui contient toujours de l'oxygène en dissolution, les sulfures sont oxydés et c'est ainsi que se forme cette couche rouge brune à la surface si fréquemment observée. Si les sulfures sont en contact avec des oxydes supérieurs préexistants tels que l'oxyde $Fe^{2+} O_3$, il se forme un oxyde et le soufre est mis en liberté. De ces diverses considérations M. Buchanan tire la conclusion qu'il est possible de trouver du soufre libre dans toutes les vases marines; dans les vases bleuâtres, le soufre est en partie préexistant, en partie formé par la dessiccation à l'air; dans les couches rougeâtres et dans les nodules de manganèse, il est entièrement préexistant. L'examen de 25 échantillons de vases et de nodules pris dans toutes les régions, confirme cette manière de voir; on obtient dans tous du soufre par dissolution dans le chloroforme. M. Buchanan a fait un grand nombre d'expériences sur la réaction produite par les sulfures de fer ou de manganèse sur les sels et les oxydes ferrugineux. Il trouve que MnS précipité agit sur les dissolutions de sels de fer exactement comme le ferait un sulfure alcalin: il les réduit complètement et les précipite à l'état de $Fe S$. L'action de MnS sur les dissolutions fournit d'intéressantes indications sur la nature probable des particules rouges que l'on observe si fréquemment dans les dépôts manganésifères. M. Buchanan conclut que ces oxydes hydratés de fer et de manganèse qui sont si abondants dans le sol de l'Océan, proviennent des silicates et d'autres combinaisons par la réduction des sulfures et l'oxydation subséquente par l'oxygène de l'air dissous dans l'eau de mer; de nouvelles réductions et de nouvelles oxydations pouvant ensuite se produire. — Le docteur John Murray communique une description anatomique de M. Z. E. Beddard de deux nouveaux genres d'Oligochètes aquatiques. — M. John Sitken décrit une forme portative de son compte-poussière destiné aux observations météorologiques. L'instrument a des dimensions très réduites, et sa construction est très simplifiée.

W. PEDDIE,

Docteur de l'Université d'Édimbourg.

ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE

Séance du 8 novembre 1890.

La séance a surtout été consacrée à la discussion des candidatures aux places vacantes. Une seule communication y a été faite après la lecture des rapports. Avant de la résumer, il ne sera pas inutile d'appeler dès à présent, au sujet de ces derniers, l'attention sur les termes excessivement élogieux dont M. Stas s'est servi en rendant compte des travaux de M. Peterman sur l'assimilation de l'azote atmosphérique par les végétaux. Nous aurons l'occasion d'analyser ultérieurement ce rapport qui n'a pas encore été présenté officiellement. — La communication qui a suivi a été faite par le directeur de l'Observatoire royal. Il venait d'achever

les calculs des termes périodiques du second ordre de l'aberration systématique pour la polaire, lorsqu'il a reçu les diagrammes par lesquels M. Helmert, secrétaire de l'Association géodésique internationale, a représenté les variations périodiques de latitude constatées à la fois par les Observatoires de Berlin, de Potsdam et de Prague. L'idée lui est venue, en constatant le caractère presque absolument annuel de la période, de comparer la courbe des variations produites sur l'étoile polaire par l'aberration systématique aux courbes de M. Helmert. La ressemblance est frappante. Le directeur de l'Observatoire s'est abstenu toutefois d'en tirer d'autre conclusion que celle-ci, c'est qu'il hésitera à croire *réelles* les variations de latitude constatées, aussi longtemps qu'il ne sera pas fixé sur plusieurs points encore obscurs des formules des réductions stellaires.

F. F.

Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 13 novembre 1890.

SCIENCES PHYSIQUES. — M. Klein présente un travail de M. Rinne ; sur le changement des zéolithes par la chaleur. En général les molécules des cristaux se rangent sous l'influence de la chaleur d'une manière plus symétrique ; arrangement que les minerais cherchaient à obtenir avant d'être chauffés par la formation de jumeaux. Ainsi les cristaux de Besmin, d'Epistilbit, de Skolecit, paraissent rhombiques avant d'être chauffés tandis qu'après ils le sont réellement. La forme extérieure des cristaux ne change pas, mais l'examen optique des lames minces fait reconnaître qu'ils ont changé de système ; ce sont donc de véritables pseudomorphoses des minerais anhydres d'après les minerais hydratés puisque la chaleur ne fait que prendre aux cristaux leur eau d'hydratation. Ce n'est que le natrolithe qui se présente sous une forme moins symétrique (monocline) après avoir été chauffé, qu'avant l'action de la chaleur ou il est rhombique. La stabilité des spécimens après la déshydratation est différente. Tels cristaux comme ceux du Besmin, de l'Epistilbit, du Natrolithe et d'autres restent assez stables et même durs, tandis que tels autres comme ceux de l'Harmatome, du Philippit et du Chabasit se réduisent en poudre.

D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE BERLIN

Séance du 3 décembre 1890.

M. Kopsel, des ateliers de Siemens et Halske, présente deux appareils d'un intérêt purement technique. L'un est destiné à l'examen des différentes sortes de fer, l'autre est un petit électromètre pour la mesure approximative des hautes tensions. Le premier est basé sur la méthode de Weber pour la mesure de courants en unité absolue ; deux bobines placées vis-à-vis l'une de l'autre ont leurs spires en nombre égal et arrangées de telle sorte que les pôles opposés se regardent. Entre ces deux bobines se trouve une petite bobine mobile munie de deux ressorts de torsion en laiton et d'une aiguille mobile sur un cadran gradué. Si un courant d'intensité connue parcourt les deux bobines au centre desquelles on a placé ces lames de fer à examiner, on peut mesurer les coefficients d'induction magnétique de ces dernières, par les déviations que la bobine mobile subit sous leur influence. Il paraît que l'appareil qui est facile à manier, offre certains avantages pour l'examen du fer dont on veut se servir en électrotechnique. On reconnaît surtout très facilement si le magnétisme rémanent est appréciable, par la différence des valeurs pour les coefficients d'induction obtenues sur la courbe ascendante et descendante. Si le fer est bon, ces valeurs ne doivent pas être sensiblement différentes. Pour la fonte M. Kopsel a trouvé :

K = 4.40 (courbe descendante)

K = 10.51 (courbe descendante)

le magnétisme rémanent est donc très fort. Cet électromètre permet de mesurer directement l'énergie d'un courant alternant jusqu'à une tension de 2,000 volts. Il est impossible d'en donner une idée claire sans dessin. Il se compose essentiellement de deux demi-cercles, entre lesquels se meuvent deux autres demi-cercles isolés comme l'aiguille, dont le mouvement se transmet sur un index en ivoire mobile sur un cadran gradué. L'instrument est gradué empiriquement à l'aide d'une petite machine de Gramme.

D^r HANS JAHN.

SOCIÉTÉ DE PHYSIOLOGIE DE BERLIN

Séance du 31 octobre 1890.

D'après les recherches de Lichtheim, faites sur des animaux curarisés, on aurait pu oblitérer la circulation pulmonaire jusqu'aux trois quarts sans que la pression dans la grande circulation se modifiât. En se mettant dans de meilleures conditions expérimentales M. Landgraf est arrivé à des résultats contraires. D'après la méthode de Zad on peut mettre à nu le cœur du lapin sans ouvrir les plèvres ; M. Landgraf est parvenu encore sans ouvrir les plèvres ou déplacer le cœur, à jeter une ligature sur l'artère pulmonaire gauche, à la comprimer et à la relâcher à différentes reprises. L'effet presque immédiat de la compression est un abaissement d'à peu près la moitié de la pression sanguine dans la carotide ; le ventricule droit se distend, l'oreillette gauche pâlit, tandis que la fréquence du pouls reste la même. Après section préalable des nerfs pneumogastriques, sympathiques et dépresseurs, le même abaissement de pression se présente. — MM. Goldscheider et Gad. Sur la sommation des excitations cutanées. Une pression limitée et rapide de la surface cutanée détermine d'abord une sensation de pression, suivie d'une sensation de douleur. Ce phénomène signalé en 1881 par Goldscheider fut étudié par les auteurs à l'aide d'excitations électriques, dont l'intensité, le nombre et la fréquence furent modifiées. Ils concluent de leurs recherches que l'excitation mécanique n'est probablement pas une excitation simple, que la sensation cutanée se transmettrait au cerveau par une voie directe et par une voie indirecte. Cette dernière aurait pour relai la substance grise de la corne grise postérieure. La sensation secondaire de douleur qui survient après une excitation mécanique serait due à une sommation des excitations dans la corne postérieure, d'où celles-ci avec un certain retard seraient transmises au cerveau.

Séance du 14 novembre 1890.

M. J. Wolf : Sur la cause et la signification des formes des os. — M. H. Muntz fait l'exposé et la critique des expériences sur le nerf laryngé supérieur du cheval.

Séance du 28 novembre 1890.

M. Martini : Sur une relation entre la vitesse de l'onde sanguine dans les artères et les différentes phases de la respiration. On admet généralement que la vitesse de l'onde sanguine est la même dans une série de pouls, cela n'est pas le cas et elle varie au moins avec la pression sanguine. A l'aide d'un dispositif expérimental bien contrôlé, M. Martini a étudié cette vitesse et il formule les conclusions suivantes : la vitesse de l'onde sanguine est moins grande lorsque le thorax est tenu à l'état inspiratoire qu'à l'état expiratoire ; dans le premier cas elle est en moyenne 6 mètres, dans le second cas au delà de 8 mètres. La vitesse de l'onde sanguine, durant qu'on respire paisiblement, est presque aussi grande que celle à l'état d'expiration continue. Les principales variations de la vitesse de l'onde sanguine seraient ainsi déterminées par la respiration. — M. Müllendorff démontre le petit zootrope de Anschütz et une série de photographies instantanées, spécialement du vol de l'oiseau.

D^r J. F. HEYMANS.

ACADEMIE DES SCIENCES
DE SAINT-PETERSBOURG

Séance du 4 novembre 1890

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Lindemann, secrétaire général de l'observatoire de Poulkova : *sur l'erreur individuelle observée par M. Tserasky pendant la comparaison de la lumière des étoiles.* Dans une note publiée dans les *Annals de l'Observatoire de Moscou*, M. Tserasky communiquait ce fait, que durant ses observations photométriques sur deux étoiles, notoirement d'égale grandeur, il voyait toujours l'étoile située à droite moins lumineuse que celle située à gauche. La différence était d'une demi-grandeur stellaire environ. Les observations photométriques se font ordinairement à Poulkova de telle façon que l'erreur individuelle en question ne peut pas se produire. Cependant, il était intéressant de constater si la même erreur pouvait s'observer chez un autre observateur. Aussi M. Lindemann, en se mettant dans les conditions analogues à celles où se trouvait M. Tserasky, a-t-il pu constater le même phénomène : l'étoile droite paraissait moins claire que la gauche; seulement la différence de luminosité n'était que d'un dixième de grandeur stellaire environ. Il faut donc en conclure que l'erreur en question est commune à tous les observateurs et doit être prise en considération par tous ceux qui s'occupent des observations photométriques. Quant à l'explication du phénomène, il faut la chercher dans la prédisposition qu'a tout observateur de fixer plutôt l'étoile à droite; l'image de l'étoile gauche tombe dans ce cas sur la rétine en dehors de l'axe visuel et paraît par conséquent plus lumineuse.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Khrouchtchhoff présente une note *sur les amphiboles artificielles.*

Séance du 18 novembre 1890.

SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Nurène, astronome à l'observatoire de Pulkova : *Sur les causes d'erreur dépendantes de la température dans les lectures des indications du collimateur du cercle méridien à Pulkova.* Une série de déterminations faites dans les conditions qu'ont suivies jusqu'à présent les différents observateurs (Backlund, Struwe, Schwaz) donne des résultats identiques à ceux qu'ils ont trouvés. Mais ces mêmes déterminations, mises en œuvre d'après une méthode différente, donnent un résultat quatre ou cinq fois supérieur au premier. Aucune des hypothèses actuelles n'explique cette contradiction d'une façon satisfaisante. En examinant les tourillons des collimateurs, on y trouve de grandes inégalités qui influent sur le coefficient thermométrique; cependant cette cause ne peut expliquer les déviations systématiques tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Reste à supposer que les fils du collimateur ne sont pas suffisamment bien fixés pour exclure l'influence du coefficient thermométrique. Sans donner une solution définitive de la question, cette note la serre déjà de très près, autant qu'il en faut pour la pratique. Les corrections peuvent être ainsi atteintes par le repolissage des tourillons, par la fixation plus soignée des fils et par la meilleure égalisation des températures extérieure et intérieure pendant les observations. — M. Bielopolski : *Sur la rotation de la planète Jupiter.* Cassini a été le premier à signaler l'analogie de la rotation de Jupiter et du soleil en démontrant que la vitesse à l'équateur est plus grande que sur le reste de la surface de ces deux corps célestes. L'on sait que sur le soleil les vitesses angulaires sont fonctions des latitudes héliographiques; mais pour Jupiter les données de ce genre ont manqué jusqu'à présent. Faisant usage des observations et des dessins de Cassini, de Herschel, de Schröter, de Medler, de Lozé, de Schmidt, de Knobel, de Breddikhin de Trouvellan et de sciences propres, M. Bielopolski a pu déterminer plus de 100 vitesses angulaires pour lesquelles on connaît

les latitudes « jovigraphiques » correspondantes. Parmi ces vitesses il y en a deux qui prédominent : la vitesse de 9 heures 31 minutes et celle de 9 heures 33,5 minutes (en chiffres ronds). La première se trouve presque exclusivement dans la zone de 0° à 5° (dans les deux hémisphères); la seconde, suit tout le reste de la surface de la planète, sauf la zone entre 5° et 10° où les deux vitesses semblent être aussi fréquentes l'une que l'autre. On doit donc en conclure que sauf une zone étroite de 10° de deux côtés de l'équateur la surface de Jupiter se meut avec la même vitesse, égale partout, de 9 heures 33,5 minutes. Les dessins de Jupiter faits l'année passée par Killar à l'aide d'un réfracteur de l'observatoire de Lick confirment ces conclusions. Quant à l'explication du fait il faut la chercher dans la chaleur que la planète reçoit du soleil, plutôt que dans les phénomènes intenses comme on l'avait pensé jusqu'à présent. Sur la terre la direction des vents alizés est peu déviée des cercles parallèles dans la zone équatoriale au-dessus de l'océan; les nuages épais qui se forment surtout dans les couches inférieures de l'atmosphère donneraient ainsi à un observateur placé sur Jupiter l'illusion de la rotation plus lente à l'équateur qu'ailleurs. En supposant la formation de nuages semblables dans les couches des vents anti-alizés, on aurait un tableau en tout points analogue à celui que l'on observe dans la rotation de Jupiter.

O. BACKLUND,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 13 novembre 1890.

1^o SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Fr. Mertens : *Sur une proposition d'algèbre supérieure.* Le mémoire renferme une démonstration simple d'une proposition d'Abel sur l'équation binôme $x^p - A = 0$. Si p est un nombre premier, l'équation est réductible quand A est une puissance $p^{\text{ième}}$. — M. Edouard Mahler : *Remarques sur le calendrier égyptien.* L'auteur envoie une lettre de M. Brüghe de Berlin qui lui communique un fragment d'inscription remontant à l'époque d'Osorkon I^{er}; cette inscription renferme les dates d'avènement d'une série de rois appartenant à la XXII^e dynastie. On peut conclure des renseignements qu'elle renferme, qu'en dehors de l'année civile de 365 jours il y avait un calendrier correspondant à une durée de 3 ans, 3 mois et 17 jours (1202 jours); ce document dont l'authenticité paraît indiscutable est une des plus précieuses acquisitions de l'Égyptologie; il apporte à l'histoire de l'astronomie un résultat entièrement nouveau.

2^o SCIENCES NATURELLES. — M. A. Adamkiewicz : *Sur certaines maladies cérébrales et leur traitement suivant les symptômes.* — M. Froschauer : *Sur les substances cristalloïdes qui procurent à l'individu l'immunité contre les maladies infectieuses.* — M. Richard V. Wettstein : *Sur la flore fossile dans les dépôts interglaciaires.* Dès l'année 1888 l'auteur a établi dans un mémoire intitulé : *Rhododendron L. Pontium fossile dans les Alpes du Nord*, que les restes de plantes que l'on rencontre dans les dépôts interglaciaires sont identiques au *Rhododendron Pontium* actuel. A cause de l'importance qu'a cette constatation pour l'histoire des plantes et particulièrement de celle de l'Europe centrale, il a repris des recherches sur ce sujet. Ce n'est pas seulement le *Rhododendron pontium* que l'on rencontre dans la flore fossile, mais plus d'une trentaine de plantes ont pu être recueillies qui sont identiques à celles qui existent encore aujourd'hui ainsi *Pinus* (2 espèces), *Picea* (1 espèce), *Taraxacum* (1 espèce), *Salix* (4 espèces), *Carpinus* (1 espèce), *Corylus* (1 espèce), *Fagus* (1 espèce), *Fragaria* (1 espèce), etc. Le plus grand nombre de ces plantes se rencontre encore dans les Alpes; quelques-unes, il est vrai, ont émigré vers des climats plus doux.

Emile WEYR,
Membre de l'Académie.

ACADÉMIE ROYALE DES LINCEI

Plusieurs membres ont déposé, avant la reprise officielle des séances de l'Académie, les communications suivantes :

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Brioschi traite du développement en série des fonctions sigma hyperelliptiques. Les travaux de M. Weierstrass avaient fait connaître les développements en série des quatre fonctions sigma elliptiques, lorsqu'en 1885 parut dans le « Journal de Mathématiques » de Berlin un Mémoire de M. Willtheiss (tome 99) : *Ueber die partiellen differentialgleichungen etc.*, dans lequel on donnait les équations différentielles du second ordre, auxquelles satisfont les fonctions θ à plusieurs arguments. M. Brioschi, à l'occasion de ce travail, a étudié le développement en série des fonctions θ à deux arguments, et publié sur ce sujet quelques notes à l'Académie. Dans la dernière, tout en touchant à la formule récurrente entre trois termes consécutifs de la série, on fait mention de la propriété invariante de ces termes, propriété que M. Klein, presque en même temps que M. Brioschi, énonçait dans ses deux Mémoires sur les fonctions sigma hyperelliptiques. Ensuite d'autres travaux de M. Willtheiss parurent dans les volumes 31, 33 des *Mathematische Annalen*. M. Brioschi se reporte aux équations différentielles du volume 33, et les transforme en substituant aux dérivées des coefficients celles des racines ; il arrive de cette manière à établir les formules générales pour le développement d'une fonction quelconque sigma à plusieurs arguments. — M. Veronese s'est occupé, dans ses études sur les fondements de la géométrie à n dimensions, du continu rectiligne, qui serait ce continu abstrait dont les propriétés fondamentales sont données par les propriétés de la droite indépendamment de sa détermination au moyen d'une couple de points. Déjà M. Stolz avait relevé l'importance de l'axiome V d'Archimède, dans l'œuvre : *De sphaera et cylindro*, suivant lequel, deux segments rectilignes A et B étant donnés, il y a toujours un nombre n entier et fini, tel que $A \times n > B$. M. Stolz a cru que du principe du continu on pouvait déduire cette propriété. M. Veronese, au contraire, veut démontrer que la définition du continu donnée par M. Stolz implique déjà l'axiome d'Archimède ; il met en évidence la place que cet axiome occupe entre les principes du continu rectiligne, et il établit quelques propriétés importantes qui sont généralement admises comme axiomes, sans en admettre de nouvelles. — M. Padova a donné une extension du problème de Barré de Saint-Venant, problème qui consiste, comme on sait, dans la détermination des déplacements infinitésimaux qui, dans un solide élastique isotrope de forme prismatique, sont produits par des tensions faisant équilibre à des forces appliquées à une des bases, tandis que l'autre reste fixe. Un problème analogue peut être proposé pour des corps constitués par des fibres curvilignes ; au lieu des fibres rectilignes des prismes, on cherche si et dans quels cas les fibres agissent les unes sur les autres seulement dans le sens de la longueur. M. Padova arrive aux équations différentielles dont il s'agit de trouver une solution, à l'aide des formules qu'il a données dans un autre travail sur la théorie de Maxwell dans les espaces courbes. M. Padova donne la solution de ce problème, et considère le cas où les fibres sont circulaires et les forces, appliquées à la base, sont assujetties à certaines restrictions ; il présente encore, comme application de ses formules, une solution directe du problème de Saint-Venant pour les prismes et les cylindres obliques, et il observe que de cette solution on peut déduire comme cas spécial, la solution donnée par Clebsch du problème de Saint-Venant. — M. Volterra : Sur les variables complexes dans les iperspaces. — M. Reina : Sur quelques formules relatives à la théorie des surfaces. — M. Loria : Sur l'application des fonctions jacobienues à l'étude des lignes gauches de quatrième or-

dre et de la première espèce. — M. del Re : Sur quelques groupes complets qui se trouvent dans le groupe Cremona à un nombre quelconque de variables. — M. Nagy : Sur la représentation graphique des quantités logiques. — M. Di Legge s'est occupé des erreurs personnelles dans les observations du diamètre horizontal du Soleil, exécutées à l'Observatoire du Capitole de 1874 à 1888. — M. Giacomelli présente une série de mesures micrométriques d'étoiles doubles, faites au même Observatoire avec l'équatorial de Merz.

2^{es} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Bruchietti, s'est occupé de l'importante question des courants terrestres dans les mesures de ces courants. On sait que ces mesures peuvent se ranger en deux catégories, c'est-à-dire celles exécutées sur des lignes de grande longueur, comme des lignes télégraphiques, et celles faites sur des lignes courtes établies exprès. Les premières de ces mesures, sans être parfaites, ont l'avantage de donner pour la force électro-motrice des valeurs assez considérables, parce que celle-ci s'accroît proportionnellement à la distance entre les deux stations. Plus préférables seraient les lignes établies exprès ; mais comme elles ne dépassent généralement pas un kilomètre de longueur, la force électro-motrice de la terre n'arrive qu'à un ou deux millièmes de volt, et il est très difficile de distinguer les courants du magnétisme terrestre, de ceux dus à la différence du potentiel entre les lames métalliques plantées dans le terrain. M. Battelli avait cru pouvoir exclure cette cause d'erreur, se servant de grandes lames en bois couvertes d'une feuille d'étain, dont la différence de potentiel aurait été si petite et constante qu'on pouvait la négliger. M. Bruchietti a reconnu que cela n'était pas vrai ; il a exécuté des expériences, dans un jardin et dans le laboratoire, sur des lames en feuille d'étain plantées dans la terre, et il a vu que, en multipliant les observations, la force électro-motrice des lames, au lieu d'être constante, présente des variations d'un jour à l'autre, et même dans un seul jour. Des électrodes en feuille d'étain ne peuvent donc servir à la mesure des courants terrestres que sur des lignes qui ont au moins une centaine de kilomètres de longueur. — M. Montemartini a déterminé la vitesse d'altération des solutions aqueuses d'acide nitreux, lorsqu'elles se changent en solutions d'acide nitrique. Pour cette recherche, que M. Montemartini croit avoir été exécuté pour la première fois, on mettait du nitrite d'argent dans l'eau distillée, et on y ajoutait une solution titrée d'acide chlorhydrique en quantité suffisante pour précipiter l'argent. On filtrait le liquide, et l'on obtenait ainsi une solution d'acide nitreux, que l'on mettait dans des flacons, et dont l'acidité était déterminée à divers instants à l'aide d'une solution titrée de permanganate de potasse. M. Montemartini établit, d'après les résultats obtenus, que la décomposition de l'acide nitreux dans ces conditions donne une réaction du premier ordre, qui peut se représenter par l'équation : $3\text{HNO}_2 = 2\text{NO} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$; ce qui conduit à admettre que la décomposition de l'acide nitreux en solution aqueuse est une véritable dissociation, et que comme telle elle dépend de la tension de l'oxyde d'azote qui se trouve au-dessus du liquide. Tandis que les solutions aqueuses d'acide nitreux sont très instables, des solutions faites avec des sels du même acide se conservent sans altération pendant longtemps. — M. Guglielmo a donné la description d'un électromètre à cadran, dont la sensibilité est beaucoup augmentée, en superposant plusieurs plaques argentées, et en faisant usage d'une aiguille composée, c'est-à-dire formée par des lames minces en aluminium, suspendues à un même axe, et placées chacune dans l'espace que l'on a ménagé entre les plaques de l'électromètre. Dans une autre note, M. Guglielmo décrit une disposition qui permet, lorsqu'on n'a pas à sa disposition un spectroscopie à plusieurs prismes, d'obtenir une grande dispersion en faisant passer, à l'aide de deux miroirs, les rayons lumineux plusieurs fois par le même prisme. — L'iode de triéthylsulfure ($\text{C}_2\text{H}_5\text{S}_2$) se résulte de

l'addition du sulfure d'éthyle (C_2H_5)₂S et de l'iodeure d'éthyle C_2H_5I . MM. Nasini et Costa ont étudié le pouvoir de réfraction de solutions alcooliques d'égale concentration d'iodeure de triéthylsulfure et d'un mélange équimoléculaire de ces deux composants. Ils ont trouvé que le pouvoir de réfraction du composé est extraordinairement plus élevé que la somme des pouvoirs de réfraction des composants. C'est un fait de grande importance, parce que la réfraction est en général une propriété de caractère additionnel, et dans ce cas très simple d'un composé que jusqu'ici on considérait comme une combinaison moléculaire, on pouvait s'attendre que la règle de l'addition se serait vérifiée avec toute exactitude. On a encore reconnu que dans la formation de l'iodeure de triéthylsoline il se produit une condensation considérable. — Dans une autre note, MM. Costa et Nasini exposent les résultats de leurs recherches sur le pouvoir de réfraction de l'iodeure, du chlorure et de l'hydrate de triéthylsoline : de l'iodeure en solution aqueuse, alcoolique et acétique, et des deux autres en solution aqueuse. Dans l'iodeure, la réfraction atomique est très élevée; elle est moindre dans le chlorure, et plus faible encore dans l'hydrate, où elle se montre égale à celle du soufre dans le sulfure d'éthyle. Les auteurs croient que dans les composés contenant du soufre, l'oxygène, lorsqu'il y est, produit toujours une réduction dans le pouvoir de réfraction.

3^e SCIENCES NATURELLES. — M. Grandis a entrepris d'étudier l'action de la glycérine sur l'albumine; question importante pour la chimie biologique qui cherche à déterminer de quelle manière la molécule complexe de l'albumine peut se décomposer dans les nombreux produits que l'on retrouve dans les excréments. Il est démontré par les recherches de Grünhagen que la glycérine empêche la coagulation du sang; d'autre part il arrive que la glycérine et l'albumine se trouvent continuellement en contact, non seulement dans les tissus, mais encore dans l'intestin, où les graisses sont saponifiées et mettent en liberté de la glycérine. M. Berthelot avait trouvé déjà que la glycérine en contact avec l'albumine, se change en sucre, mais il ne s'était pas occupé des transformations de l'albumine; dans ses recherches M. Grandis a étudié cette seconde partie de la réaction. Il donne la description des transformations subies par l'albumine, qui se changent en hémalbumose; ce qui correspondrait à un premier état d'hydratation, phénomène difficile à expliquer, parce que la glycérine n'agit jamais par hydratation. Mais si l'on pense que cette dernière substance vient en même temps transformée en sucre, et que pour cette transformation la glycérine doit auparavant se convertir en acroleïne, il est possible d'attribuer à cette déshydratation initiale, la modification de l'albumine. M. Grandis a obtenu, en préparant une solution d'albumine modifiée dans l'alcool, un dépôt de paillettes brillantes, de forme rhomboïdale, dont les plus grandes sont légèrement recourbées; elles rappellent, par leur aspect, les tablettes de la cholestérine.

Dans un autre travail, M. Grandis s'occupe de la nature des cristaux qu'il a trouvés dans le nucléole des cellules du foie. En exécutant des recherches sur des chiens, il a reconnu que ces cristaux se rencontrent dans les animaux adultes, qu'ils manquent dans les jeunes, et qu'ils augmentent avec l'âge. Isolant et analysant ces cristaux, M. Grandis a été conduit à admettre qu'ils sont formés par une substance azotée à fonction basique, qui appartient à cette catégorie de substances découvertes par Selmi dans les cadavres, par Gautier dans les produits de l'activité vitale des cellules, et que Bieger a vu se former en quantités considérables par l'action des microorganismes sur les substances organiques. En étudiant l'action physiologique de la nouvelle substance, on a reconnu qu'elle manifeste une action paralysante sur les centres nerveux, laissant intacts les nerfs et les muscles. M. Grandis croit donc qu'il s'agit d'une nouvelle base isomère de la neuridine, qui se trouve normalement cristalli-

lisée dans le nucléole des cellules hépatiques des vieux chiens, et à laquelle il donne le nom de *gerontine* (de *geronteios* : qui appartient à la vieillesse). Il n'est pas improbable que la base cristallise se combinant avec l'acide phosphorique, parce que les phosphates sont plus abondants dans les foies où se trouvent les cristaux. — Dans un travail, analysé dans cette *Revue*¹, M. Magini annonçait avoir vu dans les grandes cellules nerveuses des lobes électriques de la torpille adulte, préparées dans des liquides fixateurs, un déplacement particulier du nucléole et du carioplasme; ce qui faisait penser à une relation entre ce déplacement et l'activité dynamogène de la cellule. Or, M. Coggi a reconnu que si l'on examine au microscope des préparations fraîches du lobe électrique de la torpille, qui certainement a dû réagir pendant la vivisection avec des décharges, on n'aperçoit aucun déplacement du carioplasme. Mais lorsqu'on met une goutte d'alcool en contact de la préparation, on observe une contraction du carioplasme, qui prend la forme d'un croissant et entraîne le nucléole. Cette contraction se manifeste toujours dans une direction opposée à celle par où l'alcool, ou un autre liquide fixateur, commence à toucher le carioplasme. On peut observer encore ce phénomène, moins prononcé cependant, dans le plasma cellulaire.

Séance du 7 décembre 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Cesaro : Sur les problèmes des probabilités quand le nombre des cas est infini. — M. Peano : Valeur approximative de l'aire d'un ellipsoïde. — M. Di Legge : Sur la grandeur apparente du diamètre du Soleil et sur ses variations.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Tacchini présente le résumé de ses observations solaires, exécutées depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de septembre de cette année. De ces observations on déduit que l'époque du minimum des taches correspond au commencement de 1890, tandis qu'à présent l'activité du soleil va en décroissant. Les résultats sont obtenus par 167 jours d'observation, qui comprennent les observations spectroscopiques; ce dernier phénomène a très peu varié du commencement de l'année jusqu'à présent, ce qui concorde avec le retard du minimum des protubérances par rapport aux taches. On voit donc que onze années sont passées depuis le minimum précédent, ce qui représente la valeur moyenne de la période des taches. — MM. Paterno et Peratoner ont exécuté de nouvelles expériences cryoscopiques. Ils ont trouvé que les solutions d'iode dans l'iodeure de potasse, et d'aniline dans l'acide chlorhydrique dilué, présentent le même point de congélation que les solutions (de KI et de HCl) employées comme dissolvants. Ces expériences confirment encore une fois directement les lois de Raoult et de van't Hoff sur le point de congélation des solutions, parce que l'abaissement du point de congélation qui dépend seulement du nombre des molécules qui se trouvent dissoutes dans l'unité de volume, est au contraire indépendante de la nature de ces molécules. — Dans une autre note MM. Paterno et Peratoner annoncent que, ayant déterminé le point de congélation des solutions aqueuses d'acide fluorhydrique, ils en ont déduit des nombres qui conduisent à la formule double H^2F_2 . Il paraît qu'en solution très diluée, la molécule double tend à se diviser en molécules simples. Les expériences confirment les résultats obtenus par M. Mallet sur la densité des vapeurs d'acide fluorhydrique à la température ambiante. — M. Nasini a soumis à une vérification expérimentale, se rapportant aux expériences déjà exécutées par lui avec M. Bernheimer, quelques formules récemment proposées par le professeur Ketteler de Bonn, pour représenter le pouvoir de dispersion et celui de réfraction spécifique des substances. M. Nasini croit que l'on peut adopter la formule de Ketteler pour

¹ Voir page 286 de cette *Revue* (Acad. des Lincei, séance du 4 mai 1890).

la dispersion, parce qu'elle présente sur les autres formules, dont on a fait usage jusqu'ici, l'avantage d'être indépendante de la densité, et de rester suffisamment constante avec les variations de température. Pour l'expression du pouvoir de réfraction spécifique et pour les autres expressions qui en dérivent, M. Nasini croit que l'application à la chimie optique en est impossible, parce que les erreurs inévitables de l'expérience, et en particulier celles qui sont causées par l'impureté des substances, rendent tout à fait illusoire l'usage des formules qui exigent l'exactitude absolue jusqu'au cinquième, chiffre décimal dans les indices de réfraction. M. Nasini est d'avis que les formules de M. Ketteler, malgré leur exactitude à l'égard physique, ne peuvent valoir que pour un échantillon donné de la substance que l'on examine; et pour cette raison il serait très dan-

gereux d'appliquer ces formules à la chimie optique.

3^e SCIENCES NATURELLES. — M. BORDONI-UFFREDUZZI présente à l'examen de l'Académie un Mémoire où il a réuni les résultats de ses recherches sur ces Protées, considérés comme agents d'intoxication et d'infection. Il a étudié en particulier la biologie et l'action du *Proteus hominis capsulatus*, microorganisme que, le premier, il a trouvé trois fois dans les maladies de l'homme. M. BORDONI-UFFREDUZZI démontre que, différant en cela des autres Protées déjà connus qui agissent comme facteurs d'intoxications, ce *Proteus hominis capsulatus* est une cause d'infection pour plusieurs espèces animales. Les caractères de l'infection sont différents pour les diverses espèces, et l'auteur s'occupe de ces différences dont il donne la description.

Ernesto MANCINI.

NOUVELLES

LA VACCINATION CONTRE LE TETANOS ET LA DIPHTERIE

Les expériences dont la lymphé de M. Koch est depuis près de quinze jours l'objet dans les hôpitaux de Paris, excitent vivement la curiosité du monde médical et du public. Bien que les résultats de ces essais se soient jusqu'à présent montrés peu favorables à l'emploi du remède secret de M. Koch, ils semblent encore trop incomplets pour pouvoir être convenablement appréciés. Nous préférons, pour ce motif, en ajourner la discussion.

Aujourd'hui nous devons attirer l'attention des lecteurs d'une façon toute spéciale sur les recherches récentes de MM. Behring et Kitasato relatives à la production de l'immunité contre la diphtérie et le tétanos¹. Ces savants sont parvenus à guérir les animaux inoculés avec le virus de ces maladies et à rendre réfractaires à ces infections les animaux sains. Indépendamment de ce résultat, gros de promesses pour la médecine humaine, les expériences de MM. Behring et Kitasato ont établi des faits d'un intérêt considérable, dont la portée doctrinale dépasse le sujet particulier de leurs investigations : ils ont reconnu que les humeurs de l'animal vacciné, au lieu d'être *bactéricides*, au sens rigoureux du mot, réagissent contre l'infection en *neutralisant* les substances toxiques excrétées par les microbes. « L'immunité des lapins rendus réfractaires au tétanos, repose, disent-ils, sur la propriété qu'a acquise leur sérum de rendre inoffensives les substances toxiques que produisent les bacilles du tétanos. » Les auteurs résument ainsi leurs observations à ce sujet :

1^o Le sang d'un lapin réfractaire au tétanos a la propriété de détruire les toxines du tétanos ;

2^o Cette propriété peut se démontrer dans le sang extravasculaire et dans le sérum qui en provient débarrassé de toute cellule ;

3^o Cette propriété est si durable qu'elle persiste même dans le sang d'autres animaux, de sorte qu'on

est en état d'obtenir une action thérapeutique par la transfusion du sang ou plutôt du sérum.

4^o Cette propriété destructive des toxines du tétanos n'appartient pas au sang d'animaux qui ne sont pas réfractaires au tétanos ; quand on a incorporé le poison tétanique à des animaux non réfractaires, on peut le retrouver après la mort dans le sang et les autres humeurs.

De ces faits et de ceux que l'on connaissait déjà il semble résulter que l'organisme animal dispose de deux moyens de défense contre les infections microbiennes : la *phagocytose* qui, lorsqu'elle s'exerce, s'attaque aux microbes eux-mêmes, et l'état *neutralisant* des humeurs, qui, — naturel à l'économie ou acquis par vaccination, — tend à détruire les excréments toxiques des parasites.

LOUIS OLIVIER.

La Société Chimique de Paris va reprendre la série de ses conférences hivernales. Cette série sera inaugurée le 20 décembre 1890 par M. Sarrau, membre de l'Académie des Sciences, qui traitera de la *Continuité des états gazeux et liquide*. Sa conférence aura lieu à 8 heures et demie précises dans la grande salle de la Société d'Encouragement, 44, rue de Rennes.

A la dernière séance de l'Académie des Sciences (8 Décembre), la Section de Minéralogie a présenté pour succéder à M. Hébert :

En 1 ^{re} ligne :	M. MALLARD.
En 2 ^e ligne, <i>ex æquo</i> et par ordre alphabétique :	M. HAUTEFEUILLE. M. MICHEL-LÉVY.
En 3 ^e ligne, <i>ex æquo</i> et par ordre alphabétique :	M. BARROIS. M. MARCEL BERTRAND. M. DE LAPARENT.
En 4 ^e ligne, <i>ex æquo</i> et par ordre alphabétique :	M. JANNETAZ. M. STANISLAS MEUNIER.

L'élection aura lieu aujourd'hui.

¹ Le mémoire de MM. Behring et Kitasato a paru dans la *Deutsche Medicinische Wochenschrift* du 4 décembre dernier.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

ÉLOGE HISTORIQUE DE LOUIS POINSOT¹

J'ai beaucoup connu, beaucoup admiré et beaucoup aimé Poinso. On l'accusait de négligence et de paresse. C'était un faux jugement. Par respect pour lui-même, il respectait tous les devoirs : c'est pour cela qu'il en acceptait le moins possible. Le très petit nombre de ses productions, toutes excellentes, ne peut nullement servir de mesure à l'application de son esprit. Rien ne force à écrire, disait-il, moins encore à faire imprimer. On peut, par passe-temps, échanger avec ses amis d'inutiles paroles; un écrit s'adresse aux honnêtes gens de l'avenir : ils ont le temps d'attendre.

Poinso écrivait peu et ne lisait guère; il aimait la méditation. Quand un visiteur inconnu frappait à sa porte, le valet de chambre lui demandait son nom et sans prétexter que Monsieur fut sorti, revenait bientôt déclarer qu'il ne pouvait pas recevoir.

Poinso avait d'excellents amis, presque tous disparus avant lui. Jamais je ne lui ai connu de famille : Quand il mourut, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, ce ne fut pas sans peine qu'on découvrit ses douze héritiers. Un seul l'avait vu, il y avait de cela une vingtaine d'années. Poinso m'a raconté souvent les détails de sa vie, toujours simple et digne. Il a rappelé devant moi plus d'un souvenir de jeunesse; je ne sais rien de son enfance. Les dictionnaires biographiques le font naître en 1777, les uns à Paris, les autres à Beauvais, quelques-uns à Clermont-en-Beauvaisis. Ceux-là sont les mieux informés. L'église dans laquelle

il a reçu le baptême a été brûlée en 1793, et avec elle les registres de la paroisse.

Le père de Poinso, d'après la tradition du pays, était marchand; il vendait de l'épicerie. Il avait acquis assez d'aisance pour quitter sa boutique et envoyer son fils à Paris au collège Louis-le-Grand. Lui-même se retira à Beauvais. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1794 (vendémiaire, an III), le jeune collégien, après avoir passé les vacances à Beauvais, retournait à Paris pour faire sa rhétorique. On s'arrêta pour déjeuner. Un vieux numéro du *Moniteur* avait été oublié sur la table de l'auberge; Poinso y apprit la création d'une Ecole centrale des travaux publics; c'est ainsi qu'on avait d'abord désigné l'Ecole Polytechnique. Fourcroy, toujours ardent contre les vaincus, accusait ses amis de la veille d'avoir conspiré pour anéantir les sciences et les arts, « avec la coupable espérance « de priver la France d'ingénieurs et d'artilleurs « instruits, de généraux éclairés, de marins habiles, de la faire manquer d'armes, de poudre et « de vaisseaux, de laisser les places et les ports « sans moyen de défense, et de donner ainsi à nos « ennemis des avantages certains et des victoires « faciles. »

La nouvelle école, en déjouant ce complot, mériterait la reconnaissance et l'admiration des générations futures.

Les jeunes citoyens, pour y être admis, devaient donner des preuves d'intelligence en subissant un examen sur les éléments des mathématiques.

Tel était, en 1794, le programme complet des connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole

¹ Cette étude a été lue hier, 29 décembre, à la réunion publique annuelle de l'Académie des Sciences, par M. J. Bertrand, secrétaire perpétuel.

Polytechnique. M. le Ministre de la guerre, après un siècle écoulé, rendrait un grand service aux études en reprenant aujourd'hui, sans en changer l'esprit, ce programme qui ne peut vieillir.

Les candidats, pourrait-on dire, devront donner des preuves d'intelligence en subissant un examen sur les mathématiques spéciales et sur les éléments de la physique et de la chimie. Aucun détail ne serait ajouté. Les réclamations seraient vives. Comment se préparer, s'écriraient les candidats, sans savoir la voie qu'il faut suivre, et la limite qu'on doit y atteindre ? Devons-nous approfondir les méthodes de la géométrie moderne ? Pouvons-nous, en étudiant la théorie des gaz, nous contenter de la loi de Mariotte ? L'histoire de la science est-elle exigée ?

On leur répondrait : Rien n'est exigé.

Nous pouvons donc, continueraient-ils, avoir, sans rien apprendre, l'espoir d'être reçus.

Cet espoir serait certainement déçu. On ne sait jamais bien sans beaucoup savoir.

La méthode a donné, il y a cent ans, d'excellents résultats. Les élèves de la première promotion se montrèrent studieux à l'entrée, savants à la sortie et pour toujours curieux de l'étude.

Leurs examinateurs, il faut l'avouer, avaient un avantage qu'on ne retrouvera plus. Les maîtres alors instruisaient ; on prépare aujourd'hui. Tromper l'examineur et lui faire illusion, c'est là le but avoué. On réussit souvent et le maître en est fier.

Poinsot, en rentrant au collège, était décidé à subir l'examen. Les mathématiques n'avaient alors pour lui aucun attrait ; il en ignorait les méthodes et le but ; mais on exigeait des preuves d'intelligence : il se savait prêt à en donner.

Le jeune collégien se procura les ouvrages de Bezout, les trouva de lecture facile et leur a toujours gardé reconnaissance. Un premier obstacle l'attendait. La liberté n'avait pas encore franchi les murs du collège ; il devait, pour se faire inscrire comme candidat, obtenir l'autorisation du proviseur. En apprenant une telle ambition chez un rhétoricien, M. Champagne haussa les épaules. « Tu veux, lui dit-il, concourir en mathématiques ? Je te le défends ; tu compromettrais le collège. Ce sera pour l'année prochaine, si l'école dure encore ». — « Je suis prêt, dit Poinsot en exagérant un peu ; interrogez-moi. » M. Champagne ne se souciait pas de l'interroger et Poinsot le savait bien. « C'est bon, c'est bon, dit-il, tu te feras refuser et ce sera bien fait. »

Poinsot fut en effet refusé dès la première épreuve, mais tous les concurrents le furent comme lui. La science n'étant rien sans le civisme, on avait voulu, avant tout, examiner les candidats *au moral*. Un

patriote, recommandable par ses vertus, les déclara tous inadmissibles : « La manifestation de patriotisme, disait-il, a été nulle. Les candidats sont ignorants et indifférents. Indifférents ! quand les enfants mêmes balbutient des hymnes à la Liberté. » Le citoyen examinateur au moral était un sot ; les candidats s'en étaient aperçus et s'étaient moqués de lui ; ils jurèrent haine éternelle aux tyrans, et, malgré son rapport, on les déclara digne de servir la patrie.

Poinsot, grâce aux livres de Bezout, répondit sur l'arithmétique et sur la géométrie. L'examineur aborda l'algèbre ; embarrassé pour résoudre l'équation qu'on lui dictait : « Citoyen, dit Poinsot, je ne sais pas l'algèbre, mais je vous promets de l'apprendre. » Le *petit homme*, Poinsot le nommait ainsi quand il racontait cette histoire, remplaça la question d'algèbre par un problème de géométrie : Poinsot le résolut et se retira fort inquiet.

Un mois après, pendant une récréation, Poinsot, fidèle à sa promesse, apprenait l'algèbre ; un grand bruit s'élève dans la cour : on s'élance ; on envahit la salle d'étude en agitant le *Moniteur*, et saisissant Poinsot, qui n'y comprend rien, les deux plus grands l'enlèvent sur leurs épaules et lui font parcourir en triomphe les corridors du vieux collège. Le *petit homme*, perpiscace et hardi, avait inscrit le nom de Poinsot à la fin de la liste ; et ce nom illustre doit briller au premier rang dans la suite très honorable des candidats admis les derniers à l'Ecole Polytechnique.

Monge et Lagrange faisaient de trop savantes leçons. La République y avait pourvu. Un élève d'élite dans chaque salle devait, sous le nom de *brigadier*, servir de répétiteur à ses camarades. Le brigadier de Poinsot, c'était Biot, voulait malheureusement reprendre les choses de trop loin, « et quand il arrivait au fait, disait Poinsot, depuis longtemps je ne l'écoutais plus. » Chacun d'eux, cinquante ans après, prétendait que son camarade n'avait pas changé. « Poinsot, disait Biot, est membre du Bureau des Longitudes et ne sait pas le nom des étoiles. » — « Jamais, disait Poinsot, je n'ai lu un mémoire de Biot, on n'a pas de temps pour tout. » Sur aucun point ils n'étaient d'accord. Lorsque Biot voulait témoigner de l'intérêt à un jeune savant, il le pressait d'apporter un nouveau travail et l'encourageait quelquefois en disant : « C'est en faisant du mauvais qu'on arrive à faire du médiocre. » — « Gardez-vous, disait Poinsot, de jamais rien montrer que les honnêtes gens puissent juger médiocre. »

En quittant l'Ecole Polytechnique après trois années d'étude, Poinsot fut admis à celle des Ponts et Chaussées : il y obtint le prix de mécanique. Un projet de scie à recéper les pieux au fond d'une

rière le montra capable des applications que cependant il n'aimait pas. Il renonça à la carrière d'ingénieur et devint professeur dans un lycée de Paris.

Les premiers efforts du jeune maître se tournèrent vers la résolution des équations; celles du premier et du second degré sont faciles; celles du troisième et du quatrième degré n'arrêtent plus personne. Les équations du cinquième degré ont résisté à tous les efforts. Quelle en est la raison? La question est vague, mais de grande conséquence. Les méditations de Poinsot l'ont éclairée pour lui d'une vive lumière. Un jour, en traversant le Pont-Neuf, roulant dans sa tête les tentatives restées infructueuses, il en aperçut le principe et le lien, et pénétra en même temps la cause nécessaire de l'insuccès. Les journées qui suivirent furent les plus heureuses de sa vie. Son idée du Pont-Neuf le possédait sans partage, mais Lagrange l'avait eue avant lui. Lorsque Poinsot l'apprit, la déception fut grande: il garda son travail dans sa tête où il ne fut pas perdu. Lorsque Lagrange, en 1808, dans la seconde édition du *Traité de la résolution des équations numériques*, esquissa le principe de la résolution algébrique, les mystères de cette théorie subtile et profonde ne pouvaient pour Poinsot faire aucun embarras. Le compte rendu qu'il en fit dans le *Magasin encyclopédique* déchire tous les voiles et Lagrange lui-même s'en montra surpris.

Liouville, trente ans après, discutant l'histoire de cette savante et difficile théorie, après avoir reproduit, sans l'annoncer au lecteur, une page entière de Poinsot, a pu ajouter en s'inclinant avec bonne grâce devant son illustre confrère: « Pour m'épargner la rédaction que j'aurais beaucoup moins bien faite, je viens de copier un passage de la préface de M. Poinsot publiée en 1808 dans le *Magasin encyclopédique*. M. Poinsot avait spécialement en vue les équations binômes, mais le raisonnement est général. Aussi, c'est le cas de dire que les démonstrations des théorèmes se trouvent d'avance dans l'article de M. Poinsot ».

En donnant d'avance la démonstration d'un théorème découvert vingt ans plus tard par le grand géomètre Abel, Poinsot ne devait rien au hasard. En analysant les idées de Lagrange, il n'avait pas à exposer les siennes, mais il les mettait à profit. L'honneur d'avoir atteint sans guide une cime élevée de la science était pour Poinsot, en même temps que l'occasion d'une cruelle déception une glorieuse bonne fortune; il jugeait de bon goût de la taire. « Les honnêtes gens m'auraient cru, disait-il, mais ils sont si rares ! »

La réputation de Poinsot commença avec la publication, en 1803, de ses *Éléments de Statique*. Le

livre, malgré son titre élémentaire et modeste, était fait pour instruire les plus habiles. Tout y était nouveau ou présenté d'une manière nouvelle. Poullet de Lisle publiait aussitôt dans le *Magasin encyclopédique* une analyse détaillée du nouvel ouvrage. Le jugement qui la termine fait honneur à sa perspicacité: « On ne tardera pas, dit-il, à le distinguer de la foule, peut-être aussi à le faire sortir du rang où la modestie de son titre le place. »

Le mémoire sur la composition des moments et des aires dans la mécanique, présenté dans la même année à l'Académie et réuni aux éditions suivantes de la statique, faisait mieux encore ressortir les avantages de la doctrine nouvelle en montrant avec une entière évidence ce qui, dans un système libre, reste permanent quoi qu'il arrive, et la raison profonde des théorèmes algébriquement découverts et déjà célèbres dans la science.

Le mémoire sur l'équilibre et le mouvement des systèmes suivit de près. L'Académie des sciences en renvoya l'examen à Lagrange. Tout devait, dans cette œuvre nouvelle, intéresser l'auteur de la mécanique analytique, non lui plaire. On voulait innover dans son domaine; Poinsot avait écrit au début de son mémoire: « MM. Lagrange et Laplace ont les premiers... »

Les travaux de Laplace dominaient alors toutes les parties de la science; mais, à parler franchement, sur les principes généraux de l'équilibre et du mouvement des systèmes, il n'avait rien proposé d'original. Lagrange fut froissé. Pourquoi, dit-il à Poinsot, avez-vous associé le nom de Laplace au mien? Vous m'avez choqué! Telle est la franchise des géomètres. Un rapprochement injuste avait choqué Lagrange, il le disait, sans ignorer qu'un esprit malveillant pourrait expliquer sa mauvaise humeur par un sentiment d'envie. Poinsot n'apporta pas moins de respect pour la vérité. « Je n'avais pas, répondit-il à Lagrange, cité d'autre nom que le vôtre. J'ai montré à un ami la première rédaction du mémoire. — Tu veux présenter à l'Académie, m'a-t-il dit un mémoire de mécanique sans citer Laplace! Tu n'auras pas de rapport! — La première ligne est écrite de sa main. C'est lui qui y a introduit le nom de votre illustre confrère. » Lagrange sourit. La première difficulté était aplanie.

L'ami de Poinsot, — il se nommait Du Chayla, — connaissait le monde académique d'alors: il n'y avait pas grand mérite.

Laplace régnait sans partage. Lagrange, pour les bons juges, était au moins son égal; mais il avait pour maxime, comme plus tard Poinsot, de ne se mêler de rien; il écartait les importuns,

mais ne protégeait personne. Les maladroits seuls le flattaient. Il était habile au contraire de louer Laplace très haut. On saisissait toutes les occasions, souvent même on les faisait naître. L'astronome Delambre, en analysant un chef-d'œuvre de Gauss, ne propose qu'une remarque : Gauss y fait usage d'une formule de Laplace : c'est là le souvenir que doit conserver le lecteur d'un livre de quatre cents pages. Delambre se trompe, la formule est d'Euler, mais c'est l'intention qu'il faut voir.

L'escarmouche, pour Poinso, n'avait fait que retarder le combat. Le mémoire s'imprimait dans le journal de l'Ecole Polytechnique. Lagrange en avait reçu les épreuves, il les rendit couvertes de notes brèves et sévères, qui condamnaient le nouveau principe. Poinso ne pliait sous aucun joug ; il releva le gant, rendant mot pour mot, opposant phrase à phrase ; et, sans autre limite que la politesse due, il renvoya l'épreuve en maintenant l'exactitude grammaticale et mathématique de toutes les assertions condamnées. Le lendemain, un peu ému sans doute, il se présenta chez Lagrange, pour développer sa thèse et défendre sa cause.

Les objections et les réponses furent lues et relues ; je n'oserais pas affirmer qu'on se mit d'accord ; Poinso ne le croyait pas en sortant ; il a pu l'espérer depuis. Quelques mois après, Lagrange le fit appeler : « On va créer, lui dit-il, des inspecteurs généraux pour l'Université. J'ai écrit à M. de Fontanes que vous deviez en être ; s'il résiste, j'irai trouver l'Empereur qui ne me refusera pas. »

C'est ainsi que Poinso, à l'âge de vingt-neuf ans, devint inspecteur général de l'Université.

Lorsque ces hautes fonctions l'appelèrent pour la première fois au lycée Louis-le-Grand : « Je t'avais bien dit, s'écria M. Champagne, que tu nous ferais honneur ! »

Poinso n'osa pas rectifier ses souvenirs ; il avait dit : « Tu compromettas le collège ! »

Le premier rapport de Poinso est un chef-d'œuvre. Sans se soucier de plaire au grand maître, il dit ce qu'il a vu et cherche à l'expliquer.

« Par les dispositions du règlement général, disait-il, il semble qu'on a regardé l'étude des mathématiques comme accessoire, tandis que tout, autour de nous, exige qu'elle soit considérée comme fondamentale, aussi bien que l'étude des langues anciennes. La géométrie est la base de toutes les sciences, comme la grammaire et les humanités la base de toute littérature. Cela est reconnu de tout le monde, mais ce qui n'est pas moins démontré pour nous, c'est que les deux études s'éclairaient encore et se fortifient mutuellement. Ceux qui ne voient dans les mathématiques que leur utilité

d'application ordinaire, en ont une idée bien imparfaite ; ce serait, en vérité, acquérir bien peu de chose à grands frais ; car, excepté les savants et quelques artistes, je ne vois guère personne qui ait besoin de la géométrie ou de l'algèbre une fois dans sa vie. Ce ne sont donc ni les théories, ni les procédés, ni les calculs en eux-mêmes, qui sont véritablement utiles, c'est leur admirable enchaînement, c'est l'exercice qu'ils donnent à l'esprit, c'est la bonne et fine logique qu'ils y introduisent pour toujours.

« Les mathématiques jouissent de ce privilège inappréciable, et sans lequel il serait le plus souvent superflu de les étudier, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les savoir actuellement pour en ressentir les avantages ; mais il suffit de les avoir bien sues ; toutes les opérations, toutes les théories qu'elles nous enseignent, peuvent sortir de la mémoire ; mais la justesse et la force qu'elles impriment à nos raisonnements restent ; l'esprit des mathématiques demeure comme un flambeau qui nous sert de guide au milieu de nos lectures et de nos recherches ; c'est lui qui, dissipant la foule oiseuse des idées étrangères, nous découvre si promptement l'erreur et la vérité ; c'est par là que les esprits attentifs dans les discussions les plus irrégulières reviennent sans cesse à l'objet principal qu'ils ne perdent jamais de vue ; c'est ainsi qu'il abrège le temps et l'ennui, recueillent sans peine le fruit des bons ouvrages et traversent ces vains et nombreux volumes où se perdent les esprits vulgaires. Si les mathématiques ont trouvé beaucoup de détracteurs, c'est que leur lumière importune détruit tous les vains systèmes où se complaisent les esprits faux. C'est que si les mathématiques cessaient d'être la vérité même, une foule d'ouvrages ridicules deviendraient très sérieux, plusieurs même commenceraient d'être sublimes ; mais il était bien naturel que les esprits supérieurs et les meilleurs écrivains ne parlèrent des sciences exactes qu'avec une sorte d'admiration ; les grands hommes, dans quelque genre que ce soit, ne raient jamais les grandes choses : ils tâchent de s'y élever. »

Je ne conseillerais pas ces principes aux professeurs de mathématiques transcendantes dans une université de premier ordre. Mais si nos lycées voulaient bien les adopter, et les examinateurs de nos écoles s'en pénétrer, ils rendraient un bien grand service.

Poinso avait acquis beaucoup de loisirs ; il en profita pour suivre ses propres idées. La découverte de quatre polyèdres réguliers nettement exposée, quoique sans figures, le plaça à un rang élevé dans l'estime des amis de la géométrie. On enseignait, sur la foi de Legendre, qu'il ne peut

exister que cinq polyèdres réguliers : la découverte de Poinso, malgré le démenti, plus apparent que réel, qu'elle donnait à ses assertions, lui inspira une grande estime pour le jeune inventeur.

Comment peut-on démentir une proposition démontrée ? En changeant les définitions, Legendre, sans le dire, supposait les polyèdres convexes. Poinso supprime cette restriction.

L'idée des polyèdres étoilés fut tenue pour entièrement nouvelle. Une plus exacte recherche aurait pu cependant montrer aux géomètres leur origine très ancienne dans la science. Kepler, avant Poinso, les avait aperçus et signalés. « Les polyèdres étoilés, dit M. Chasles, dans son *Aperçu historique*, étaient tombés dans l'oubli et n'ont réveillé aucun souvenir, lorsque M. Poinso les a remis sur la scène. » Poinso attachait une grande importance à une découverte admirée, dont un travail de Cauchy avait accru le retentissement : il lut Kepler, lui qui ne lisait rien, et sans contester sur l'imperfection des détails, il se déclara convaincu. Une vérité désagréable, proposée simplement, sans hostilité comme sans complaisance, n'a jamais altéré, même pour un instant, l'affectueuse estime, qu'après comme avant la publication de son livre, il a témoigné en toute circonstance à l'auteur de son *Aperçu historique*.

Lorsque l'Académie perdit Lagrange en 1813 Ampère, Cauchy et Poinso briguerent l'honneur de lui succéder : Poinso fut élu. Le choix fut approuvé, et devait l'être. L'Académie ne pouvait deviner que dix ans plus tard, Ampère, par la création de l'électro-dynamique, révélerait le plus grand génie scientifique du siècle et que Cauchy, chaque jour plus fécond, pendant quarante années encore, prendrait place, en grandissant sans cesse, parmi les plus grands géomètres dont s'honore l'esprit humain. Si dans cette élection nous voulons signaler le trait le plus étrange, bornons-nous à rappeler qu'en classant les candidats par ordre de mérite, la section de géométrie, présidée par Laplace, n'accorda le premier rang ni à Cauchy, ni à Ampère, ni à Poinso, mais à un concurrent dont j'oublie le nom.

Poinso en entrant à l'Académie des Sciences, réunissait, depuis quatre ans déjà, aux fonctions d'inspecteur général de l'Université, celle de professeur à l'École Polytechnique. Son enseignement fut court. Par sa perfection même, il était pour lui une fatigue. La veille de chaque leçon la porte de Poinso était fermée. Persuadé que ses auditeurs cesseraient promptement tout commerce avec le calcul intégral, il voulait qu'ils en conservassent un bon souvenir : il redoutait, quoique habile à bien dire, les hasards de l'improvisation. La tâche lui plaisait, mais il fallait professer à huit

heures du matin : « la matinée, disait-il est faite pour la solitude, comme la soirée pour le monde ; il ne faut pas imposer à un cheval fin la tâche d'un timonier. » Il demanda l'adoption d'une heure moins *incongrue*, ne l'obtint pas, et donna sa démission. Cauchy lui succéda. Le contraste était complet ; chacun des deux grands maîtres avait ses admirateurs. Poinso ne nous enseignait rien, disaient les partisans du nouvel enseignement. Les raffinements de rigueur de Cauchy, disait Poinso lui-même, qui ne cachait jamais son opinion, les dégoûteront de la Science. Tous avaient tort. Poinso, il est vrai, disait peu de chose dans chaque leçon, mais il le disait si bien ! Cauchy n'était compris que des élèves d'élite, et n'intéressait que les meilleurs d'entre eux, mais ceux-là gardaient son empreinte.

L'inspection générale fut enlevée à Poinso lors de l'avènement de Charles X : il n'affichait pour le trône et pour l'autel ni hostilité ni dédain ; il regardait la royauté comme un mal nécessaire et la religion comme un bien pour les croyants, dont il n'était pas. Cela ne suffisait pas.

Le représentant des études mathématiques au conseil royal, c'était Poisson, n'était sur aucune théorie mathématique en communauté d'idées avec Poinso ; mais celui de philosophie croyait voir en lui un adversaire, dont les rapports devaient lui déplaire, le piquer et souvent l'irriter.

Quant à cette dernière étude qu'on vient d'introduire dans les lycées, il faut convenir, disait Poinso, dans un rapport officiel, qu'elle est vague et sans objet précis dans l'état actuel de la société. Aussi, la plupart des professeurs ne savent-ils pas très bien sur quoi doivent rouler leurs leçons. Ceux qui renouvellent uniment l'ancienne philosophie, font véritablement peine à entendre. Ce cours n'est plus supportable ; malheureusement ce n'est point une année perdue, c'est une année nuisible à leurs études précédentes et à celles qui doivent suivre.

Poinso, pendant ses années d'inspection, avait entendu des leçons de philosophie ; quelques unes lui avaient laissé d'amusants souvenirs. Le professeur, un jour, avait agité devant lui cette grave question :

Une chose peut-elle à la fois être et ne pas être, de telle sorte qu'on puisse, à une même question répondre oui et non avec confiance égale ?

La réponse négative semble évidente, et c'est pour elle que l'école concluait, mais il ne faut pas multiplier inutilement les axiomes : il fallait produire des arguments en règle et répondre aux objections. Supposez, disait le maître, un homme couché devant un brasier ardent, on peut assurément affirmer qu'il a chaud.

Supposez-le couvert de glace, il a froid certainement, et par conséquent n'a pas chaud.

S'il arrive que la poitrine soit exposée au feu, tandis que par le dos il s'appuie sur un bloc de glace, ne pourra-t-on pas dire en même temps qu'il a froid et chaud? L'objection est grave, il faut y répondre. On discutait ces niaiseries en latin, et les élèves prenaient des notes.

Plus tard, dans un rapport sur l'Académie de Besançon, Poinsoit écrivait : « M. l'abbé Astier professe une vieille philosophie de séminaire qui n'est guère au niveau des connaissances actuelles. » Il n'en fallait pas plus pour expliquer la disgrâce. Poisson, qu'il en accusait, se borna, sans doute à ne pas le défendre. Poinsoit pouvait, sans se restreindre en rien, laisser passer l'orage : sa fortune patrimoniale le rendait indifférent à de telles mésaventures ; en lui rendant le loisir, ses ennemis avaient favorisé ses goûts. Poinsoit, dans sa jeunesse, aimait le monde, et ne se plaignait pas d'y avoir rencontré de mécomptes. Les matinées étaient consacrées au travail et à la méditation. Poinsoit s'éprouvait lui-même, relisait ses manuscrits, les recopiait, différait d'années en années leur production et finissait souvent par les condamner à l'oubli.

Un calepin élégant, relié en maroquin vert, sortait rarement d'un tiroir que j'ai vu s'ouvrir quelquefois. Poinsoit a bien voulu me le lire à haute voix, en accentuant chaque mot, chaque syllabe même, avec autant de perfection que s'il avait parlé, devant une réunion telle que celle-ci. J'ai regretté souvent de n'avoir pas demandé à ses héritiers cette relique, qu'au moment de sa mort nous n'étions, je crois, que deux à connaître. M. Chabrier, vieil ami de Poinsoit et son collègue au Sénat, a été plus hardi ; le petit chef-d'œuvre lui a été remis, j'en ai perdu la trace.

J'oserai, non sans hésiter beaucoup, reproduire ici quelques phrases dont ma mémoire, en les conservant, a sans aucun doute altéré la perfection, laborieusement atteinte, — l'auteur ne s'en cachait pas, — et ce mot perfection, dans sa bouche habituée à bien dire, ne supposait aucun orgueil. L'ouvrage parfait, c'est la définition, plaît à son ouvrier qui dès lors n'y trouve plus rien à faire :

Rien chez les hommes n'est aussi rare qu'une amitié parfaite et désintéressée. On n'en cite qu'un exemple : celui de la fable.

Les portraits des géomètres A, B, C, D, ont été tracés d'après nature. Lorsque Poinsoit voulut bien me les lire, je crois avoir, en devinant sans hésiter les quatre noms, fait un pas dans son estime.

A. Va d'un air simple à la vérité qu'il aime : la vérité lui sourit, et quitte volontiers sa retraite pour se laisser produire au grand jour par un homme aussi modeste.

B. Ne l'a jamais vu que par surprise. Elle se cache à cet homme vain qui n'en parle que d'une manière obscure. Mais vous le voyez qui cherche à tourner cette obscurité en profondeur, et son embarras en un air noble de contrainte et de peine, comme un homme qui craint d'en trop dire et de divulguer un commerce secret qu'il n'a jamais eu avec elle.

C. Il faut bien, se dit-il, qu'elle soit en quelque lieu. Or, il va laborieusement dans tous ceux où elle n'est point, et comme il n'en reste plus qu'un seul qu'il n'a pas visité, il dit qu'elle y est, qu'il en est bien sûr, et il s'essuie le front.

D. D'un tempérament chaud, la désire avec ardeur, la voit, la poursuit en satire, l'atteint et la viole.

L'œuvre capitale de Poinsoit, dans son âge mûr, a été ses travaux sur la dynamique des corps solides. Euler et d'Alembert, à peu près dans le même temps, et par des méthodes très différentes, ont les premiers résolu cette importante et difficile question. Poinsoit ne cachait pas qu'il les admirait peu et désirait quelque chose de plus simple. L'illustre Lagrange avait repris ce fameux problème pour l'approfondir et le développer à sa manière, je veux dire, écrivait Poinsoit, par une suite de formules et de transformations analytiques qui présentaient beaucoup d'ordre et de symétrie, mais il faut convenir que dans toutes les solutions, on ne voit guère que des calculs, sans aucune image nette de la rotation des corps. On peut bien, par des calculs plus ou moins longs et compliqués, parvenir à déterminer le lieu où se trouve le corps, au bout d'un temps donné, mais on ne voit pas du tout comment il y arrive ; on le perd entièrement de vue, tandis qu'on voudrait l'observer et le suivre, pour ainsi dire des yeux pendant tout le cours de la rotation : or, c'est cette idée claire du mouvement de rotation que j'ai tâché de découvrir, afin de mettre sous les yeux ce que personne ne s'était représenté.

Des contradicteurs très convaincus, insensibles à la perfection de ce chef-d'œuvre, affectèrent de tourner en illusion ce progrès tant admiré par d'autres.

La solution, qu'il éclaire d'une si vive lumière, était depuis longtemps, dit-on, acquise à la science : la difficulté était vaincue. Euler avait formé les équations, on les avait intégrées : que peut-on désirer de plus ? Poinsoit avait enfoncé une porte ouverte. Ils ne peuvent pas comprendre, disait Poinsoit de ces savants critiques, et, sans aucune amertume, il les dédaignait de grand cœur.

Toujours attentif aux phénomènes, non aux formules, il aborda, dans la théorie de la précession des équinoxes, un des problèmes les plus difficiles de la mécanique céleste, en conduisant son étude jusqu'aux calculs numériques, sans s'écarter jamais de la simplicité qu'il aimait et de la rigueur sans laquelle on n'est pas géomètre.

Poinsoit avait l'amour, non la curiosité de la science ; il savait qu'un savant ignore beaucoup de

choses; l'indifférence pour lui en accroissait le nombre. Lui seul, peut-être, a pu dire aux savants les plus illustres de son époque : Je vous ignore — et marcher auprès d'eux en restant leur égal. Les plus grandes découvertes le laissaient indifférent. Ni l'œuvre de Fresnel, ni la pile de Volta, ni les actions électrodynamiques, ni la théorie mathématique de la chaleur, n'ont, même pour un jour, occupé son esprit. Dans les mathématiques pures, les fonctions doublement périodiques et les intégrales complexes lui sont restées inconnues. La théorie mathématique de l'élasticité n'était pas pour lui assez pure. Ni Navier, ni Cauchy, ni Lamé, pour lequel il avait une si haute estime, n'ont réussi à lui faire discuter leurs principes : Ils parlent de pressions obliques — disait-il avec répugnance. — Une pression est toujours normale; cela n'est pas pur. — Un géomètre qui manque à la précision et à la rigueur, ressemblait, suivant lui, à un chevalier félon qui manque à l'honneur.

Poinsot, en 1840, succéda à Poisson, au Conseil royal de l'instruction publique. Chacun des conseillers, dans l'ordre des études qu'il représentait, exerçait une influence décisive sur la nomination et l'avancement des professeurs. Ses collègues, presque tous, et ses prédécesseurs, présidaient chaque année les concours d'agrégation, choisissaient les questions demandées aux candidats de l'Ecole normale; leurs soins s'étendaient même au choix des sujets proposés au concours général des lycées. Poissot, en acceptant cette haute situation, déclina formellement ce travail sans cesse renaissant. Le Conseil contenait de bons juges; Villemain, et Cousin, en admirant la parole élégante et profonde de leur nouveau collègue, se plaignaient seulement qu'elle fût beaucoup trop rare. Poinsot, peu de temps après sa nomination, voulut visiter la Faculté des Sciences de Paris : c'était un mercredi; un jeune élève de l'Ecole Polytechnique avait profité de son jour de sortie pour subir l'examen de *Licence*. Le doyen de la Faculté, c'était Thénard, présenta le nouveau licencié, en exagérant un peu ses mérites, à son collègue du Conseil royal. Les professeurs réunis et les jeunes étudiants, qui venaient d'assister à l'examen, attendaient avec curiosité la petite allocution ainsi imposée à l'improviste à Poinsot, célèbre par l'élégance de sa parole et la finesse de son esprit. « Jeune homme, dit Poinsot, avez-vous entendu parler d'un nommé Lindor ? » Le candidat à la licence ès sciences physiques ne s'attendait pas à être interrogé sur le *Barbier de Séville*; il garda le silence : « Ce Lindor, continua Poinsot, n'était que bachelier; cela ne l'a pas empêché de réussir. Je vous souhaite de faire comme lui. » Thénard, toujours sérieux et digne dans son rôle

de doyen, paraissait consterné. Poinsot devint pair de France, comme l'étaient presque tous les collègues du Conseil. L'Empire plus tard le nomma sénateur. Il acceptait les honneurs, saisissait volontiers l'occasion de prouver à tous ce qu'il aurait pu faire et se plaisait ensuite à ne rien faire.

La déférence due à la haute situation de Poinsot m'a rendu témoin d'une scène où la politique n'avait aucun rôle.

Un jour, causant avec lui, ou plutôt l'écoutant causer, sur les souvenirs de sa vie scientifique, nous relisions ensemble un chapitre du système du monde de Laplace, première occasion, par l'insuffisance des preuves alléguées, de ses recherches sur la précession des équinoxes. Son valet de chambre entre et lui remet une carte de visite. Poinsot la prend du bout des doigts, lit dédaigneusement, à la suite d'un nom inconnu, la qualité de chef de division dans l'administration municipale. « Dites à ce monsieur, répond Poinsot, que je ne le connais pas. » Le monsieur insiste : C'est de la part du préfet de la Seine qu'il voudrait parler à M. le sénateur. — Poinsot le fait entrer et l'écoute. « Vous êtes, lui dit-il, propriétaire d'une maison située à Paris, rue du Temple ? — C'est vrai, répond Poinsot, et depuis cinquante ans. — C'est de cette maison que je voudrais avoir l'honneur de vous parler, continue le délégué du Préfet. Le prix des loyers est resté le même qu'en 1810 ?

« — Qu'est-ce que cela vous fait, répond Poinsot.

« — Je dois apprendre à M. le sénateur qu'il pourrait doubler le prix de ses locations, la boutique même resterait à très bon marché.

« — Pourquoi, demanda de nouveau Poinsot la ville de Paris prend-elle intérêt à mes affaires ?

« — Les impositions sont en raison du prix des locations et votre générosité diminue les revenus de la ville.

« — Je comprends, dit Poinsot. Je nuis aux intérêts du fisc. »

Il réfléchit un instant et ajouta : « L'important dans les choses du monde, c'est qu'elles aillent. Mes locataires sont d'honnêtes gens qui me payent régulièrement. J'ai l'habitude de recevoir leur argent : cela va bien ainsi. Je ne vois pas de raison pour changer. » Et par un geste très digne et très poli, il invita le délégué du fisc à ne pas insister.

Les meilleurs amis de Poinsot étaient morts, il n'en voulait pas de nouveaux. Lorsqu'à cinq heures du soir j'allais prendre de ses nouvelles, j'entendais tirer les verrous, personne dans la journée n'avait franchi la porte. Je le trouvais feuilletant un des volumes de sa très petite bibliothèque. Souvent Molière, quelquefois Voltaire, rarement Montesquieu et plus souvent qu'aucun autre, un exemplaire de l'un de ses *Mémoires*. Un grave acci-

dent cependant annonçait une fin prochaine : ni l'Académie, ni le Sénat ne l'avaient vu depuis plus d'un mois; il se détachait de tout et contemplait sans trouble les approches évidentes de la mort. Un jour, il m'accueillit par ces mots : « Un petit mulet, Monsieur ! » c'était la fin d'une scène des *Fourberies de Scapin* qui le faisait rire au moment où j'étais entré. Puis, changeant de ton, il me dit : « J'ai reçu hier une longue visite : Mgr l'archevêque de Paris m'a fait l'honneur de venir lui-même prendre de mes nouvelles. Vous devinez ce qui

l'amenait. C'est un homme d'esprit; il a compris que je ne voulais pas comprendre, et nous avons parlé d'autre chose. »

Huit jours après, Poinso, en s'endormant dans le calme d'une bonne conscience, pouvait répéter ces paroles écrites depuis quarante ans déjà :

Ma vie a été irréprochable et pure comme mes écrits.

J. Bertrand,
de l'Académie française,
Secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences.

NOTICE ACADÉMIQUE SUR ERNEST COSSON¹

L'excellent et savant confrère dont je veux rappeler le souvenir nous a été enlevé pendant l'épidémie qui sévissait si cruellement à Paris à la fin de l'année 1889. Ernest Cosson est mort le 31 décembre, après une courte maladie. L'Académie des Sciences, par déférence pour la prudente sollicitude de sa famille, n'a pu lui adresser les paroles de souvenirs et de regret qu'une pieuse coutume réserve à tous nos morts.

Nos archives cependant doivent conserver la trace des sentiments qu'il inspirait à tous. Il appartient à son plus ancien ami, depuis un demi-siècle témoin de ses efforts et heureux de ses succès, de faire disparaître dans la collection de nos notices nécrologiques une lacune qui plus tard resterait inexplicable.

Né dans une famille riche et dans une position qui eut porté bien d'autres jeunes gens à cultiver en simples amateurs leurs études de prédilection, Ernest Cosson se montra dès l'enfance un travailleur sérieux. Son père, lui voyant peu de goût pour la carrière du commerce qu'il avait suivie lui-même, ne voulut point le contraindre à y entrer, mais exigea qu'il choisît une profession. Son penchant très marqué pour les sciences naturelles le fit se décider pour la médecine : Ernest, après d'excellentes études, prit avec éclat le grade de docteur : l'étude de l'homme malade l'intéressa toujours, comme peuvent l'attester ceux qui l'ont vu en 1870 à la tête d'une ambulance importante fondée à ses frais, et qu'il dirigea jusqu'à la complète guérison de ses malades, avec la plus tendre et la plus constante sollicitude. A cette époque, cependant, il avait renoncé depuis longtemps à l'exercice de la médecine, incompatible avec les continuel voyages auxquels l'entraînait sa passion pour la science.

Les excursions autour de Paris avait fourni la matière de ses premières publications. Il avait vingt ans à peine lorsque, en collaboration avec son ami Ernest Germain de Saint-Pierre, il publia ses observations sur quelques plantes critiques des environs de Paris. Le commerce intime des deux amis se continua pendant plusieurs années au grand profit de la science. La rédaction d'un ouvrage considérable, la *Flore des environs de Paris*, devint bientôt le but de leurs efforts; le long et consciencieux labeur de cette œuvre de longue haleine me rappelle plus d'un souvenir. Je prenais part souvent aux promenades; ce fut toute ma collaboration.

Le titre choisi par les deux amis était : *Flore des environs de Paris*, pour faire suite au traité de Botanique, de M. Adrien de Jussieu.

Le livre était annoncé, lorsqu'Adrien de Jussieu pria les deux auteurs de venir le voir.

« Jeunes gens, leur dit-il, vous êtes d'âge à recevoir une petite leçon. Apprenez qu'on ne doit jamais inscrire un nom sur la couverture d'un livre sans en avoir reçu l'autorisation. Votre éditeur, qui ne l'ignore pas, m'a envoyé l'épreuve du titre. Je l'ai corrigée. » Puis après un moment de silence, il présente aux deux amis, un peu déconcentrés, la feuille sur laquelle il avait effacé les mots, *pour faire suite*, en y substituant : *faisant suite*. Je serais bien surpris si cet autographe d'un maître vénéré ne se retrouvait après cinquante ans dans les archives de nos confrères.

Les publications d'Ernest Cosson se succédèrent rapidement, sans précipitation cependant, grâce à l'assiduité et à la puissance de travail de l'auteur. Beaucoup traitaient des sujets entièrement neufs, et Cosson avait l'art de mêler aux plus minces opuscules des vues générales et des problèmes nouveaux dont il savait montrer l'importance. Nous devons citer particulièrement la liste des

¹ Cette étude a été lue hier, 29 décembre, à la réunion publique annuelle de l'Académie des Sciences, par M. J. Bertrand, secrétaire perpétuel.

plantes observées aux environs de Thurelles sur les déblais récents du chemin de fer de Moret à Montargis, et l'étude des plantes étrangères recueillies au Port Juvénal près de Montpellier.

Ce travail relatif à une localité déjà étudiée avec attention a donné lieu cependant à des remarques très intéressantes pour la géographie botanique et à de savantes réflexions sur la modification d'une flore locale en lutte avec des causes permanentes d'accroissement. Les vues d'Ernest Cosson sur la manière dont s'est formé et s'entretient cet étrange jardin d'acclimation naturel, révèlent un observateur attentif et sagace, habile à exposer nettement les conclusions de ses patientes recherches.

Le Port Juvénal reçoit chaque année des quantités considérables de laines en suint provenant de pays très divers et contenant d'abondantes impuretés apportées de leur lieu de provenance. Ce sont principalement des graines que leurs aspérités ou leurs poils font adhérer aux toisons. On les en débarrasse en partie, par un premier épilage, puis on les fait passer par une suite d'opérations de nature à détruire toute faculté germinatrice : elles sont soumises à une lessive bouillante, puis lavées à grand eau et étendues sur des galets qui empêchent tout contact avec la terre qui les salirait.

Malgré ces conditions défavorables, la colonie de plantes étrangères s'entretient et se développe par les arrivages de chaque année.

De Candolle, le premier, a appelé l'attention sur cette singulière et intéressante réunion ; plusieurs botanistes depuis y ont trouvé un fructueux sujet d'études.

Ernest Cosson a résumé et accru ces travaux. « L'étude de la flore juvénalienne, dit-il, est venue confirmer le résultat des études antérieures et nous démontrer que les introductions accidentelles, sauf celles qui se font dans les terrains meubles, tels que les moissons ou les prairies artificielles, ne peuvent modifier que bien peu la végétation générale du pays où elles se produisent. »

La flore des États barbaresques a été l'objet des recherches persévérantes d'Ernest Cosson. La commission scientifique de l'Algérie, chargée en 1840 de l'exploration de cette contrée, avait dû restreindre ses recherches dans les limites de l'occupation.

Le savant représentant de la botanique, M. Durrieu de Maisonneuve, avait réuni des documents importants sur la région méditerranéenne ; mais, malgré tout son courage, il n'avait pu aborder que quelques points de l'étude des hauts plateaux. Ernest Cosson, sur le rapport favorable des professeurs du Muséum, fut appelé par le ministère de la

guerre à prendre part à la rédaction de la *Flore d'Algérie*. Il s'y consacra tout entier, en profitant des progrès successifs de la pacification du pays, pour en explorer les diverses parties d'après un plan méthodique ; il était préparé par des voyages en France, en Espagne, en Portugal, en Italie, et par l'étude approfondie des Flores de la Grèce, de l'Asie-Mineure et de l'Égypte. Dix voyages exécutés de 1852 à 1861, sous le patronage du ministère de la guerre, mais toujours à ses frais, ont permis à Ernest Cosson de réunir les immenses matériaux de son œuvre. Sans sortir de son rôle scientifique, il n'a rien négligé pour réunir des renseignements positifs, qui, la plupart, intéressent le botaniste, mais ne l'intéressent pas seul ; tels sont ceux qui concernent la climatologie. Résigné aux soins pénibles qu'exige le transport des instruments dans les pays de montagnes, il a déterminé les altitudes de toutes les nations et celle, par conséquent, des végétaux caractéristiques de chaque région et, sans se contenter du baromètre anéroïde, il transportait avec des précautions infinies, un excellent baromètre de Fortin. La température moyenne de l'année était déduite avec une exactitude suffisante de la température des sources, et par une méthode qui mérite plus de confiance encore, de la température constante observée à une profondeur suffisante au-dessous du sol.

Sans s'écarter de ses études scientifiques, pour étudier complètement la langue arabe, Ernest Cosson avait su lier des relations avec les tribus nomades, qui, par nécessité, portent leur attention sur les productions du sol, et donnent à chaque plante un nom qui ne varie pas plus que les notions sur les propriétés réelles ou supposées qu'on lui attribue. Il est parvenu ainsi, sans sortir de l'Algérie, à connaître l'existence de certaines espèces, jusqu'au centre de l'Afrique, sur les bords du lac de Tchad par exemple, et le fait a été confirmé par les relations des voyageurs qui ont visité cette partie du continent.

Ernest Cosson a assigné à chacune des quatre régions qu'il distingue son caractère et ses limites. Dans la région méditerranéenne, par exemple, région de l'olivier, la flore de la province de Constantine rappelle surtout la Sardaigne, la Sicile, l'Italie et Malte ; celle de la province d'Alger, le nord de l'Espagne, les Baléares et le midi de la France ; celle d'Oran, le midi et le sud-est de l'Espagne. C'est à la vaste surface d'évaporation présentée par la Méditerranée, que l'Algérie littorale doit un climat plus tempéré et des productions moins méridionales que si elle était reliée directement au continent.

Ernest Cosson s'était dévoué à la science depuis

son enfance, sans autre ambition que celle de voir et d'étudier la nature ; il avait, sans arrière-pensée et sans ambition, rendu des services de mieux en mieux appréciés. En offrant à l'Académie ses travaux et ses livres, il ne lui avait jamais demandé de récompense, jamais surtout sollicité l'honneur de lui appartenir. C'est nous qui l'avons désiré et appelé. La commission, chargée de présenter des candidats à une place vacante d'académicien libre, proposa spontanément, par une exception très rare, son nom, connu de tous les naturalistes, aux suffrages de l'Académie.

Dès que la candidature lui fut proposée, il s'empressa de réparer le temps perdu ; il fit les démarches commandées par l'usage, et moins d'une année après, il était élu à la place laissée vacante par le décès d'Auguste Duméril.

Lorsque j'allai, très joyeux de la mission qui m'était donnée par mes confrères, promettre pour ainsi dire, à Ernest Cosson, le seul honneur qu'il ait jamais désiré, un hasard me rendit témoin de l'un des mérites bien connus de tous les botanistes qui depuis longtemps l'en rendaient digne.

Dans une rapide excursion en Suisse, j'avais l'année précédente aperçu quelques fleurs d'aspect singulier et, sans aucune préoccupation scientifique, j'en avais cueilli quelques-unes, placées immédiatement dans une enveloppe de lettre. Elles étaient depuis près d'un an dans mon portefeuille. Les vastes collections au milieu desquelles il me reçut me rappelèrent mon petit butin et peut-être, je n'en ai plus souvenir, avec le malicieux espoir de mettre sa science en défaut, je lui montrai mes trois ou quatre fleurs bien éloignées de leur grâce

et de leur fraîcheur premières. Il les regarda un instant ; puis, comme un bibliothécaire qui cherche dans son catalogue, il ouvrit un livre, puis un registre manuscrit, puis une armoire et enfin un carton, dans lequel sans avoir hésité un instant, il me fit voir une fleur toute semblable à la mienne. Elle est très rare, me dit-il ; on la trouve dans deux localités, sur le glacier du Rhône et en Hongrie. Je l'avais cueillie sur le Grimsel.

Une telle épreuve pour Ernest Cosson n'était qu'un jeu. Une magnifique collection, qui s'accroissait chaque année, était à la fois l'instrument de ses profondes études et le témoignage éloquent d'une ardeur qui depuis son enfance ne s'est pas ralentie un seul jour.

Lors du congrès international de botanique tenu à Paris en 1867, l'herbier d'Ernest Cosson excita l'admiration des représentants les plus éminents de la science. Dans l'analyse des travaux du congrès, la description de toutes ces richesses n'occupe pas moins de douze pages. Une année écoulée depuis la mort si imprévue de notre confrère n'a affaibli ni les sentiments de vifs regrets, ni les pieux souvenirs, ni l'estime profonde de l'Académie pour le savant aussi érudit que modeste dont pendant près de vingt ans elle a pu apprécier la science solide, l'excellent esprit et l'affectueuse cordialité. L'adieu que je lui adresse au nom de tous n'est pas dicté par une émotion moins sincère que la tristesse d'une séparation si imprévue.

J. Bertrand.

de l'Académie française,
Secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences.

L'ÉQUATORIAL COUDÉ DE M. LÖWY

LE NOUVEL ÉQUATORIAL DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS

On va inaugurer à l'Observatoire de Paris un grand équatorial, dont l'objectif a 0^m,60 de diamètre, et dont la monture présente la forme proposée, il y a vingt ans, par M. Löwy, aujourd'hui sous-directeur de l'Observatoire.

Avec la monture ordinaire des grands équatoriaux, l'astronome est obligé de se déplacer fréquemment pour suivre l'oculaire, et de prendre des positions parfois très incommodes, ce qui nuit à la précision des observations et entraîne rapidement la fatigue. Obligé, en outre, de manœuvrer constamment des pièces métalliques dont la température est toujours voisine de celle de l'extérieur, ses mains se crispent rapidement en hiver, et il en résulte une interruption forcée des observations.

Ces divers inconvénients sont évités avec l'équatorial coudé, dont l'oculaire est fixe, de sorte que l'observateur reste assis devant son micromètre, à la même position et dans une pièce abritée, à peu près comme le naturaliste devant son microscope.

Avant de décrire cette nouvelle forme d'équatorial, nous allons rappeler d'abord les essais faits antérieurement pour faciliter l'usage des grands instruments.

I

Les premières lunettes avaient un pied et demi (0^m,50) de longueur et se tenaient facilement à la main ; en 1633 Huyghens construisit un objectif de 20 pieds (6^m,50), puis d'autres beaucoup plus puissants encore, et dont l'un avait 210 pieds (68^m) de

foyer pour 8 pouces et demi d'ouverture : on était obligé de donner ces longueurs focales, immenses par rapport au diamètre des lentilles, pour éviter l'irisation des bords de l'image, irisation dont la cause était alors inconnue et qui est due à la dispersion produite par la lentille, agissant à la manière d'un prisme.

On devine quelles difficultés présentait l'usage d'aussi longues lunettes; aussi proposait-on de divers côtés des procédés plus ou moins ingénieux pour éviter l'emploi des tubes mobiles; parmi eux on doit remarquer celui qui fut imaginé par un sieur Boffat ou Bouffart qui laissait la lunette fixe suivant l'axe du monde et lui présentait les




Fig. 1. — Montrant la manœuvre des grandes lunettes employées à la fin du xvi^e siècle : A droite se trouve l'astronome, qui transmet ses ordres à deux aides placés au pied du mât et soulevant la lunette au moyen d'un treuil, pendant qu'un troisième aide guide les cordages au sommet du même mât; enfin, deux autres aides apportent une échelle pour aider à la manœuvre. A côté de l'astronome se voit l'appareil qui maintient l'extrémité oculaire de la lunette et permet de lui imprimer des mouvements lents tant dans le sens horizontal que dans le sens vertical.

On suspendait ces longues lunettes à des mâts plantés en plein air, et on les manœuvrait avec des cordages, comme le montre la figure 1 extraite de la célèbre *Machina Cœlestis* d'Hévélius (1673).

A défaut de mâts assez élevés, J. D. Cassini installait ses objectifs au sommet de l'Observatoire et lui, placé au pied, 27 mètres plus bas, il examinait les images des planètes avec l'oculaire. La hauteur de l'Observatoire étant elle-même insuffisante, Louis XIV y fit transporter une grande tour pyramidale en bois qui servait à Marly pour élever les eaux de la Seine et les conduire à Versailles.

astres au moyen d'un système mobile de miroirs plans¹. Ce projet parut cependant inapplicable et c'est à cette occasion que Cl. Perrault proposa de placer la lunette fixe, horizontale, et de lui renvoyer les rayons des astres à l'aide d'un seul miroir.

Ces idées étaient heureuses, et c'est sans doute à l'imperfection des miroirs plans, tels qu'on les construisait alors, qu'il faut principalement en attribuer l'insuccès.

Déjà, du reste, la découverte des télescopes à

¹ *Journal des Savants* de 1682, p. 221.

réflexion avait offert un autre moyen d'éviter l'emploi d'objectifs si incommodes : Mersenne avait proposé à Descartes de remplacer les objectifs par des miroirs concaves; en 1616, cette idée fut exécutée par le P. Zucchi; en 1663, Gregory publia la description de son télescope, avec petit miroir concave; enfin, en 1672, Newton et Cassegrain firent connaître leurs télescopes, devenus classiques comme celui de Gregory.

plus tard *achromatiques* (c'est-à-dire sans couleur) dans lesquels on corrige l'irisation des bords des images par l'emploi de deux sortes de verres, et dont la longueur focale était de 10 à 15 fois l'ouverture. Toutefois, à cause de la difficulté de se procurer des disques de verre exempts de défauts, les plus grandes lunettes ne dépassèrent guère, avant 1800, 0^m10 à 0^m12 d'ouverture; et l'on continua toujours d'employer des télescopes à réflexion, auxquels les travaux et les découvertes d'Herschel firent redonner une grande vogue.

Au commencement de ce siècle, la construction des objectifs atteignit, avec Fraunhofer, une grande perfection. En même temps, Guinand découvrait le moyen de fondre du verre exempt de stries et produisait les disques qui formèrent le célèbre objectif de 9 pouces de Dorpat. On obtint bientôt après des disques de 0^m38 de diamètre; à l'Exposition Universelle de 1855, figurèrent deux disques de 0^m76, qui furent achetés pour l'Observatoire de Paris; enfin, aujourd'hui, on obtient des disques de plus de 1 mètre de diamètre.

M. le colonel Laussedat a employé avantageusement une lunette fixe et horizontale, avec un seul miroir au-devant, comme l'avait proposé Perrault. Au moyen de son sidérost, Foucault a imprimé à ce miroir un mouvement tel que les rayons lumineux fussent réfléchis dans la même direction. Enfin M. Loëwy a imaginé son équatorial coudé, à deux miroirs, qui rappelle le projet, d'ailleurs incomplètement connu, de Bouffart.

II

Le sidérost de Foucault, qui n'a peut-être pas réalisé toutes les espérances qu'il avait fait naître, évite même l'emploi du tube de lunette et supprime presque complètement les abris mobiles, toujours très coûteux; mais, outre les défauts de tous les instruments dans lesquels interviennent des surfaces réfléchissantes, il a celui de se prêter difficilement aux mesures des positions relatives de deux astres, parce que la direction du mouvement diurne change constamment sur le cercle de position du micromètre; l'angle d'incidence des rayons lumineux sur le miroir est variable, et enfin, grave inconvénient, il ne permet l'examen que d'une partie du ciel, même avec un miroir très grand par rapport à l'objectif.

L'équatorial coudé de M. Loëwy (fig. 2 et 3) exige deux miroirs, mais il évite les inconvénients du sidérost. Voici d'abord par quel artifice il donne toujours aux rayons une direction finale constante :

Considérons un équatorial ordinaire dans une position quelconque, par exemple dans le méridien et dirigé vers le pôle; soient AB (fig. 2) l'axe optique de la lunette, CD l'axe horaire, EF l'axe




Fig. 2. — Montrant la marche comparée des rayons lumineux dans l'équatorial ordinaire et dans l'équatorial coudé.

Tandis qu'avec les objectifs que l'on construisait alors, la longueur des lunettes variait, suivant les grandeurs, de 70 à 400 fois le diamètre, avec les miroirs la longueur n'était plus, pour les mêmes grossissements, que de 8 à 16 fois le diamètre : le télescope donnait donc, en moyenne, les mêmes résultats que des lunettes 20 fois plus longues.

Cependant on ne négligea pas de perfectionner les objectifs, et les travaux d'Euler, de Klingenshierna, de Dollond conduisirent finalement ce dernier à réaliser, en 1758, des objectifs appelés

de déclinaison et G le contre-poids de la lunette. Le faisceau cylindrique KL de rayons incidents est transformé par l'objectif B en un faisceau conique dont le sommet est au foyer A.

On sait que l'axe optique AB et l'axe de déclinaison EF sont perpendiculaires l'un à l'autre : à leur intersection M plaçons un miroir plan NO

le même cercle horaire il suffira de tourner la partie BMO autour du même axe EF, et l'oculaire restera fixe en U. De même, l'équatorial ordinaire étant dirigé vers un point quelconque du ciel, si on le fait tourner autour de l'axe polaire CD, il parcourra le parallèle correspondant, l'oculaire se déplaçant en conséquence, tandis qu'avec l'équato-




Fig. 3. — Montrant la disposition adoptée, dans la pratique, pour l'équatorial coudé : Deux piliers P, P', en maçonnerie supportant l'axe polaire AK; le tube VT, qui sert d'axe de déclinaison, porte le cube terminal dans lequel se trouvent le grand miroir S et l'objectif. En N est le contre-poids du bras TV; Q est la lampe qui sert à l'éclairage du champ; enfin les manettes JM, L, etc., permettent à l'observateur placé en K de manœuvrer l'instrument sans avoir à se déplacer.

dont la normale MP bissecte l'angle droit BMF; le foyer se trouvera ainsi transporté en H, sur le prolongement de l'axe de déclinaison; à l'intersection S de l'axe horaire et de l'axe de déclinaison plaçons en outre un second miroir QR dont la normale ST bissecte l'angle droit formé par l'axe de déclinaison et le prolongement SU de l'axe horaire; on voit que le foyer viendra maintenant se former en U, sur le prolongement de l'axe horaire, dont la direction est fixe.

Faisons tourner l'équatorial ordinaire autour de l'axe de déclinaison EF: son axe optique ira d'un pôle à l'autre, décrivant dans le ciel ce qu'on appelle un cercle horaire et l'oculaire se promènera sur une circonférence de rayon égal à AM; tandis qu'avec l'équatorial à miroir, pour parcourir

rial à miroir, on parcourrait le même parallèle en faisant tourner la partie BMS également autour de l'axe horaire, l'oculaire restant encore fixe en U.

D'ailleurs le bras BM peut être diminué à volonté en portant l'objectif en V, contre le miroir NO, ou peut même être supprimé complètement en plaçant l'objectif en X, après le miroir; de sorte que le tube de la lunette est en quelque sorte complètement supprimé et l'équatorial se trouve réduit à ses deux axes.

La disposition adoptée dans la pratique par M. Levy est celle de la figure 3¹ qui, rapprochée

¹ Cette figure extraite du *Journal de physique* de 1883 représente, à l'échelle de $\frac{1}{50}$, le premier équatorial coudé, construit aux frais de M. Bischoffsheim et installé à l'Observatoire de Paris; sa construction commencée par Eichens en 1882, a été terminée par M. Gautier; l'objectif et les miroirs sont de MM. Henry. L'appareil sera bientôt inauguré.

de la précédente, fait saisir immédiatement la manœuvre de l'équatorial coudé : pour viser successivement tous les points d'un cercle horaire, il suffit de tourner le cube terminal TU, qui porte le premier miroir S, autour de l'axe du bras VR; pour parcourir un parallèle, on fera tourner tout l'instrument autour de l'axe polaire VK.

Il n'entre pas dans le plan de la *Revue* de décrire minutieusement les diverses parties de cet équatorial et de son abri; il suffira de dire que l'observateur, placé dans une pièce abritée, a sous la main tout ce qui est nécessaire pour régler et manœuvrer les diverses parties de l'instrument. Mais nous examinerons plus en détail ses avantages et ses inconvénients, comparés à ceux du sidérostas et à ceux des équatoriaux ordinaires ou droits.

Il a sur le sidérostas de très grands avantages, car il permet de viser un point quelconque du ciel; l'angle d'incidence des rayons lumineux sur les miroirs est constant et égal à 43° ¹; la lecture du parallèle sur le cercle de position du micromètre ne change que lorsqu'on passe d'un parallèle à un autre, et même dans les instruments que l'on construit aujourd'hui, ce changement est évité à l'aide d'un mécanisme assez simple. Par contre, il exige un abri mobile plus développé, plus coûteux que dans le sidérostas; et l'addition d'un second miroir fait perdre un peu plus de lumière, tout en augmentant les inconvénients qui s'attachent aux surfaces réfléchissantes, surfaces dont les déformations exercent sur la qualité des images une influence bien plus grande que les déformations des surfaces réfringentes.

Ces déformations tenaient, en partie, à la faible épaisseur qu'on donnait, jusqu'ici, aux miroirs; d'après des expériences répétées, M. Loewy a été amené à leur donner une épaisseur égale environ à $\frac{2}{5}$ ou $\frac{1}{4}$ de leur diamètre, au lieu de $\frac{1}{5}$ à $\frac{1}{10}$ qu'on ne dépassait guère auparavant.

Comparé à l'équatorial droit, l'équatorial coudé ne présente que des avantages au point de vue du prix, de la facilité de la manœuvre, de la somme de travail qu'il permet à l'observateur de fournir. En effet, le prix d'un équatorial coudé est le même que celui d'un équatorial droit de même ouverture, la valeur des deux miroirs étant compensée par la plus grande simplicité de sa construction; et l'on évite les grandes coupoles mobiles, toujours très coûteuses. La plus grande facilité de manœuvre est évidente; enfin l'observateur, toujours bien abrité et immobile, peut poursuivre beaucoup plus longtemps ses observations.

Au point de vue purement optique, la comparaison de l'équatorial droit et de l'équatorial coudé est plus délicate, et, en l'absence de déterminations numériques comparatives, il paraît impossible de donner définitivement la préférence à l'un ou à l'autre.

Au lieu de 4 surfaces qui interviennent dans l'équatorial droit, il y en a 6 dans l'équatorial coudé; de sorte que, toutes choses égales d'ailleurs, les images doivent être un peu moins parfaites; en outre, les miroirs plans subissent des déformations que M. Loewy est parvenu à réduire, comme nous l'avons dit, mais qu'il est à peu près impossible d'éviter complètement, quelque soin que l'on prenne de maintenir les deux faces des miroirs à la même température. Ces déformations ont également pour effet d'altérer les images focales et, en outre, de rendre la mise au foyer un peu moins stable. Par contre, comme l'équatorial coudé comporte, pour une ouverture donnée, des distances focales beaucoup plus grandes, il reprend ici une véritable supériorité, par suite de la diminution correspondante des aberrations de l'objectif. L'aplanétisme et l'achromatisme étant meilleurs, chaque détail des images gagne de deux manières en visibilité : d'abord parce que son intensité s'accroît de tous les rayons qui reçoivent une meilleure direction, ensuite parce qu'ils se projettent sur un fond moins lumineux formé, d'une manière générale, par les rayons d'aberration. Cet accroissement d'intensité doit compenser la perte de lumière due aux deux réflexions.

Par sa construction, l'équatorial coudé est plus stable que l'équatorial droit et beaucoup moins sujet aux flexions. En outre, quand l'objectif se trouve entre les deux miroirs¹, il reste toujours dans l'équateur et se déplace, par suite, beaucoup moins que dans l'équatorial droit; le glissement remarqué quelquefois des deux verres de l'objectif l'un sur l'autre doit donc être beaucoup plus rare.

Enfin, la fixité de l'oculaire dans l'équatorial coudé permet une installation facile des appareils accessoires, photomètres, spectroscopes, etc., appareils qui reposent presque directement sur le coussinet supérieur de l'axe polaire et qui, par suite, ne modifient pas l'équilibre de l'ensemble de l'instrument.

En résumé, il est possible que, pour des re-

¹ Si avec le sidérostas à lunette horizontale on ne voulait pas dépasser cette incidence de 43° , on ne pourrait viser que la moitié du ciel.

¹ Cette position est la plus favorable à la fixité de l'axe optique, mais en raison des moyens mécaniques perfectionnés dont on dispose aujourd'hui, dans le nouvel équatorial coudé de l'Observatoire de Paris, on a placé l'objectif tout à fait en avant (en V. fig. 2), de sorte que les deux miroirs seront complètement abrités par le tube : la mince couche d'argent des miroirs exposés en plein air s'altère assez rapidement sous l'influence d'émanations sulfureuses, se fissure en temps d'humidité et doit être renouvelée assez fréquemment, ce qui n'a pas lieu quand le miroir est abrité dans le tube.

cherches spéciales, exigeant la perfection optique la plus élevée, l'équatorial droit soit préférable; mais dans le plus grand nombre des observations courantes, l'équatorial coudé présente des avantages incontestables¹, qui lui ont fait donner la préférence par de nombreux astronomes, de sorte qu'on trouve aujourd'hui des équatoriaux coudés de grandes dimensions dans les observatoires suivants : Paris, Alger, Lyon, Vienne (Autriche), Besançon; un autre instrument de ce genre est en construction pour l'Observatoire de Nice.

Le plus grand qui ait été construit jusqu'ici est celui qu'on achève d'installer à l'Observatoire de Paris, dont l'objectif a 0^m,60 d'ouverture et

18 mètres de foyer, de sorte que, monté en équatorial droit, cet énorme instrument exigerait un coupole mobile aussi grande que celle du Panthéon. La partie mécanique est de M. Gautier et la partie optique est de MM. Henry. Outre l'objectif ordinaire, il possède un second objectif, de mêmes dimensions que le premier, achromatisé pour les rayons chimiques et destiné à servir pour la photographie, qui prend une place de plus en plus prépondérante dans l'astronomie, à mesure que s'accroît l'étonnante sensibilité des plaques que l'on prépare aujourd'hui.

G. Bigourdan,

Astronome adjoint à l'Observatoire de Paris

LES BRACHIOPODES

LEUR STRUCTURE ET LEUR PARENTÉ

Le groupe des Brachiopodes, bien que réduit à un nombre fort restreint d'espèces actuellement vivantes, peut être cependant rangé parmi ceux dont l'étude offre le plus de problèmes intéressants à résoudre, non seulement en ce qui concerne leur structure et leur embryogénie, mais aussi en raison de la difficulté que présente la recherche de leurs affinités zoologiques et de la position qu'il convient de leur assigner dans une classification naturelle.

Il faut ajouter encore à ces difficultés celles qui résultent de la petite taille et de la rareté de ces animaux. En dehors, en effet, des quelques genres habitant nos côtes, représentés par des individus fort clairsemés, il n'est guère possible d'en obtenir autrement que par les dragages à grandes profondeurs. Ce sont alors des objets précieux, et il n'est pas toujours facile d'arriver à les regarder de loin à travers une vitrine. Aussi plusieurs types dont l'existence est aujourd'hui bien établie n'ont-ils jamais été observés anatomiquement

I

L'importance des Brachiopodes est fort grande en paléontologie et en stratigraphie. Bon nombre des couches terrestres sont caractérisées par la présence d'espèces spéciales, qui servent même quelquefois à les dénommer, comme par exemple : couche à *Terebratula Janitor*.

¹ Il est essentiel de répéter que ce qui permet à l'équatorial coudé de supporter la comparaison optique avec l'équatorial droit, c'est qu'il comporte, pour la même ouverture d'objectif, une distance focale beaucoup plus grande. Il est, en outre, très important que l'abri de l'instrument empêche la température des miroirs de s'élever beaucoup pendant le jour, afin que le soir, ces organes soient aussitôt que possible en équilibre de température avec l'air extérieur.

Apparus dès l'époque cambrienne, ils comptent parmi les premiers représentants de la faune marine la plus ancienne; ils prennent ensuite pendant l'époque silurienne et dévonienne un développement considérable, et c'est par bancs compacts, d'énorme épaisseur, serrés les uns contre les autres par millions, que nous retrouvons leurs vestiges dans tous les pays du monde.

Peu à peu ils se font plus rares. Combien ils sont aujourd'hui déchés de leur antique prépondérance! Réduits à une soixantaine d'espèces vivantes, ils ne représentent plus pour nous que des jalons isolés, intercalés çà et là dans la longue série de leurs devanciers, nous permettant néanmoins de reconstituer par analogie la structure de leurs ancêtres disparus.

La comparaison des empreintes que nous offrent ces innombrables fossiles, avec ce que nous observons sur les animaux encore actuellement vivants, nous fournit un type de Brachiopode idéal, que des modifications de détail permettent d'appliquer aux formes éteintes. Ce type n'a d'ailleurs pas varié depuis les plus anciens représentants du groupe jusqu'à ceux qui ont survécu de nos jours, et tels Brachiopodes siluriens ont persisté sans changement appréciable à travers la longue série des vicissitudes causées par les modifications fréquentes de la nature des fonds marins pendant les périodes géologiques.

Dès les premiers âges deux formes se montrèrent : l'une caractérisée par une paire de valves articulées entre elles au moyen d'une charnière, l'autre, au contraire, ayant des valves ne s'articulant pas. Ces deux types ressemblent extérieurement aux Mollusques Bivalves, le premier à un *Car-*

dium ou coque (fig. 1), que l'on voit si souvent sur nos marchés, le second à une moule aplatie (fig. 2). Mais ce n'est là qu'une apparence; pour peu que l'on entr'ouvre les valves, on est en présence d'un animal tout différent de celui qui habite les coquilles de la moule. Une première dissemblance est




Fig. 1. — *Magellania flavescens* (Lamarck). — Vue dorsale et frontale (Douville).



Fig. 2. — *Lingula lanatina* (Lamarck). — Valve dorsale (Gratiotet).

due à ce que chez le Mollusque les deux valves sont latérales, l'une étant située à droite de l'animal, l'autre à gauche, et leur ligne de réunion, la charnière sur le dos, dans le sens longitudinal; si l'on suppose un homme portant à chaque bras un grand bouclier, et ces deux armes réunies en arrière, on aura une idée exacte des rapports de l'acéphale avec ses coquilles.

Chez le Brachiope au contraire, pour continuer la comparaison des boucliers, il faut supposer que celui qui les porte est assis dans l'un d'eux posé à terre tandis qu'il tient l'autre par-dessus sa tête comme un couvercle, les deux valves étant alors réunies en arrière, mais dans le sens transversal.



Fig. 3. — *Magellania flavescens*. Intérieur de la valve dorsale.

alors fixés par toute la surface d'une de leurs valves.

La valve inférieure, ou ventrale, est plus longue que la supérieure ou dorsale, et porte un orifice qui donne passage à un pédoncule, organe fort compliqué servant à fixer l'animal aux corps solides du fond de la mer. Quelques Brachiopestes en sont dépourvus et sont

II

Bien qu'il ne rentre pas dans le cadre de cet article d'exposer l'anatomie complète des Brachiopestes il est cependant nécessaire de rappeler très rapidement les principaux traits de leur organisation.

La coquille dorsale porte presque toujours, chez les articulés, des appendices calcaires, en forme de ruban contourné; ils sont extrêmement variables dans leur disposition, passant du tubercule rudimentaire aux formes repliées de la *Magellania* (fig. 3) ou aux spirales les plus régulières du *Spirifer* (fig. 4).




Fig. 4. — *Spirifer striatus*. — A, valve ventrale; B, valve dorsale (Woodward).

Le tissu calcaire qui compose ces valves est creusé d'une foule de canaux cylindriques reliant verticalement une des surfaces à l'autre. Chacun de ces tubes est terminé, extérieurement, par une couronne de poils singuliers venant se mettre en contact avec le vernis naturel, ou *périostacrum* qui recouvre la coquille (fig. 5). On ignore complètement, malgré de nombreuses hypothèses, le rôle de ces petits organes absolument spéciaux au type Brachiope. Ils sont en rapport direct




Fig. 5. — Coupe verticale du test de *Magellania flavescens* (Valenciennes). — Cp, couche int. prismatique; d, couche lamelleuse; p, périostacrum; C, canaux traversant le test; S, filaments (King).

avec le *manteau*, membrane fort mince qui sécrète le calcaire des valves, contient de nombreux canaux sanguins, et sert encore de limite à la cavité viscérale. Le *manteau* est en contact direct avec l'eau de mer, et grâce à sa minceur, les échanges gazeux respiratoires peuvent se faire à travers ses parois; ses bords, souvent garnis de bourrelets sensibles, sont pourvus de soies raides garnies de muscles à leur base comme chez les Annelides; l'animal, en les hérissant s'oppose à l'entrée d'importuns visiteurs.

Au fond de cette vaste chambre respiratoire on trouve dans la paroi de la cavité viscérale, juste sur la ligne médiane, une petite fente; c'est la bouche; ses bords constituent deux lèvres séparées par un sillon, et ces trois parties démesurément étirées s'allongent, se contournent, s'enroulent, et

forment les bras, garnis de cirrhes sur un des bords. Ce sont à la fois des organes tactiles, des organes de préhension des aliments, peut-être des organes respiratoires à cause des nombreuses cavités sanguines dont ils sont creusés; ils servent encore au renouvellement de l'eau dans la cavité palléale par suite de leurs mouvements.

De cette bouche part un tube digestif renflé en un estomac; il se termine en arrière par un simple cul-de-sac chez les articulés, et est au contraire pourvu d'un anus latéral ou dorsal chez les inarticulés. Toujours une grosse glande digestive déverse ses produits dans l'estomac.

Les muscles tiennent encore une place importante dans la cavité du corps; les uns servent à ouvrir les valves; les autres ayant des points d'appui différents, servent à les fermer; chez les Brachiopodes privés de charnière, d'autres muscles servent à faire tourner une des valves sur l'autre. Enfin un groupe de muscles s'attachant sur le pédoncule comme point fixe, peut amener la rotation de tout l'animal sur ce pédoncule.

Tout l'espace de la cavité générale qui n'est point occupé par les viscères est rempli par un liquide sanguin que nous avons vu s'insinuer dans les canaux des bras et les lacunes du manteau. Dans celles-ci serpentent encore de petits cordons cellulaires, les glandes génitales, dont les produits, que ce soient des œufs ou des spermatozoïdes, tombent dans le liquide sanguin. Ils y circulent jusqu'au moment où ils sont recueillis par de petits entonnoirs à épithélium vibratile, au nombre d'une ou deux paires, dont le grand orifice est béant dans la cavité du corps, tandis que le petit s'ouvre au dehors. Ce sont de vrais organes segmentaires d'Annélides.

Le système nerveux est fort réduit; autour de la bouche un mince collier, avec deux renflements dorsal et ventral émet des nerfs qui vont aux bras, au manteau et aux muscles. A part les cirrhes, organes d'une sensibilité tactile fort subtile, il n'existe pas d'organes des sens spécialisés.

Les œufs des Brachiopodes sont pondus et fécondés extérieurement; il arrive quelquefois qu'ils tombent dans une sorte de poche incubatrice formée par le manteau replié de la mère; ils s'y développent attachés à un cirrhe fort long qui pénètre dans cette cavité. Mais le plus souvent la larve nage librement. Elle est formée de trois segments superposés (fig. 6); le premier est destiné à donner naissance aux bras, le second forme une partie des viscères, il est pourvu de soies et sert, par ses bords contractiles, à la natation larvaire; le troisième formera le pédoncule. A un moment donné, le troisième se fixe, et le second, immédiatement, se retrousse par-dessus le premier et forme par ses

bords le manteau avec les soies qui le bordent. On ignore presque entièrement ce qui se passe chez les Brachiopodes inarticulés; on sait seulement que les quelques larves que l'on a observées ressemblent étrangement à des Bryozoaires.

Telle est, rapidement exposée, la structure des Brachiopodes; il resterait, il va sans dire, une foule de faits intéressants à signaler; mais les limites de cet article nous obligent à les passer sous silence.

III

La plupart, sinon la totalité, des anciens auteurs regardaient les Brachiopodes comme des

Mollusques acéphales. Ne tenant compte que de la présence des deux valves, et estimant que ce caractère est suffisant à lui seul, ils les considéraient comme formant la famille la plus dégradée des Mollusques. On a reconnu depuis combien ce caractère est secondaire, puisque même des Crustacés, absolument incontestables, le possèdent eux aussi.

Bien rares sont aujourd'hui les naturalistes restés fidèles à cette opinion.

Mais pour avoir enlevé les Brachiopodes du groupe des Mollusques, il était de toute nécessité de leur rechercher un nouveau voisinage plus conforme à leurs affinités. C'est à quoi n'ont point manqué les zoologistes modernes. Les uns les placèrent parmi les Annélides, très près de beaux vers de nos côtes, à panache spiralé, les Spirographes ou les Serpules. D'autres (c'est déjà la troisième opinion) en firent des parents des Ascidies; un quatrième les rangea parmi les Vers du groupe des Chétognathes; un cinquième y trouva des ressemblances avec les Crustacés, un sixième avec un autre groupe de Vers, les *Phoronis*, un septième avec les Bryozoaires. Enfin, il y a quelques jours à peine, M. Pruvot, a signalé dans une note à l'Académie la ressemblance de la larve des Néoméniens avec celle des Brachiopodes. Parmi toutes ces propositions si diverses à laquelle faut-il s'arrêter?

Nous avons dit qu'il nous est impossible de trouver aux Brachiopodes la moindre ressemblance avec les Mollusques. Leur rapprochement des Crustacés ou des Ascidies est également aban-




Fig. 6. — Embryon de *Cistella Neapolitana* (Seacchi) nageant librement (Kowalewski).

donné. Il reste donc seulement les Vers parmi lesquels on peut les classer; ils en ont en effet tous les caractères fondamentaux, les segments et les organes segmentaires s'ouvrant dans une cavité générale, les muscles, les bras, avec leur squelette, leurs cirrhes et leurs lèvres, les soies, le développement et la larve. Mais ces Vers constituent une classe immense, et c'est, après élimination de divers groupes d'entre eux, dans le voisinage des Annélides qu'il faut les ranger. Ces Vers supérieurs, dont les types peuvent être *Spirographis*, *Sagitta*, *Phoronis* et les Bryozoaires, sont autant de séries convergeant toutes vers un centre commun qui est le type Brachiopode; la série qui s'en rapproche le plus est celle des Bryozoaires, avec lesquels on a même pu les réunir sous le nom de

Vermoides sans porter atteinte aux affinités naturelles des deux groupes. Mais ils sont aussi proches voisins des Annélides supérieures. Il vaut donc mieux les laisser isolés dans la grande famille des Vers, car ils ont encore à eux seuls malgré leurs multiples ressemblances assez de caractères propres pour former un groupe autonome, de valeur égale à celui des Annélides ou des Bryozoaires, avec des traits d'union vers ces deux groupes et d'autres moins évidents vers les *Phoronis*, les *Sagitta* et peut être les *Neoménies* sans se confondre avec aucun d'eux.

L. Joubin,

Docteur des sciences.
Maître de Conférences.
à la Faculté des Sciences de Rennes

LA VISIBILITÉ DES ANNEAUX DE NEWTON

Chaque fois que l'on éclaire une lame suffisamment mince, limitée par deux surfaces réfléchissantes, par exemple une bulle de savon (Hooke), ou bien une lame d'air comprise entre deux lames de verre (Newton), on voit s'y dessiner des bandes vivement colorées. Lorsqu'en particulier les deux lames de verre sont, l'une plane, l'autre convexe, et sont amenées au contact, ces bandes ou franges affectent la forme d'anneaux concentriques, dont le centre est noir. Si l'on substitue à la lumière blanche une lumière indécomposable par le prisme, telle que celle que fournit un bec Bunsen, dans la flamme duquel on introduit un globule de sel marin, les franges, alternativement brillantes et noires, envahissent la totalité de la surface de la lame mince.

L'explication de ces phénomènes a été donnée par Young, en partant du principe des interférences, qui est une conséquence immédiate de la théorie des ondulations de la lumière.

Je n'ai point l'intention, d'ailleurs, de revenir ici sur des faits connus, que l'on trouve exposés en détail dans tous les traités de physique, mais uniquement d'expliquer certaines particularités que la théorie de Young laisse complètement de côté.

Lorsqu'on produit les franges d'interférence au moyen des deux miroirs de Fresnel, il est nécessaire de réduire la source éclairante à la forme soit d'un trou très petit, soit d'une fente parallèle à l'arête commune des miroirs. Dans le cas au contraire d'une lame mince, du moins pour les franges les plus voisines de la tache centrale, on peut employer une source étendue dans toutes les directions. D'autre part, tandis que les franges des miroirs sont parfaitement nettes à toute distance, celles d'une lame mince semblent venir se

peindre dans l'intérieur même de la lame mince. Elles sont localisées.

MM. Sohncke et Wangerin¹, ainsi que M. Feussner² ont cherché à expliquer ce dernier fait, mais, après des calculs extrêmement laborieux, ne sont parvenus, à part un point particulier, qu'à des résultats insuffisants ou inexacts. C'est ainsi que les premiers trouvent que les anneaux de Newton viennent se former sur une surface du troisième degré, le dernier sur une surface du quatrième. Une telle contradiction s'explique aisément, car une pareille surface, lieu des anneaux, n'existe pas en réalité.

I

Supposons, pour un instant, que l'on éclaire la lame mince par un point lumineux unique (ce sera un trou très petit percé dans un écran opaque, en arrière duquel se trouve placée la flamme). Chaque onde issue de ce point se dédouble par réflexion sur les deux faces de la lame mince, et les deux ondes ainsi produites parviennent au bout de temps inégaux en chacun des points de l'espace situés dans la partie commune aux deux faisceaux réfléchis. La différence de marche δ que présentent les deux mouvements vibratoires qui se croisent en ce point varie d'ailleurs nécessairement avec sa position dans l'espace. Si donc l'on reçoit la lumière réfléchie sur un écran, on voit se dessiner sur ce dernier des franges, brillantes en tous les points pour lesquels, λ étant la longueur d'onde et K un nombre entier, on a :

$$\delta = 2K \frac{\lambda}{2}.$$

¹ Annales de Wiedemann, t. XII, p. 1 et 201.

² Ibidem, t. XIV, p. 543, 1881.

et des franges obscures en tous les points pour lesquels on a :

$$\delta = (2K + 1) \frac{\lambda}{2}.$$

On peut affirmer quelque chose de plus. C'est que, quelle que soit la position de cet écran, les franges doivent y présenter une netteté parfaite, pourvu que l'ouverture éclairante soit suffisamment petite.

C'est là une remarque capitale, dont on peut facilement vérifier l'exactitude par l'expérience, en employant un appareil quelconque producteur des anneaux de Newton. Il est possible en effet de voir des franges parfaitement distinctes, en les regardant au moyen d'une loupe, et en se plaçant même à plusieurs mètres en avant de l'appareil. Elles sont encore nettes si on les examine au moyen d'une lunette, quel que soit son tirage, alors même qu'elle est réglée pour viser à l'infini.

Supposons que, dans ces mêmes conditions, on examine les franges au moyen d'une loupe fixée à une distance d'ailleurs quelconque de la lame mince. Si l'on vient à déplacer, même lentement, le trou éclairant dans une direction arbitraire, on voit le plus souvent les franges courir avec une extrême rapidité dans le champ de la loupe, et cela, en restant parallèles à elles-mêmes.

Cette expérience est particulièrement instructive. Supposons en effet que nous éclairions la lame mince au moyen d'une source étendue. Cette dernière peut être assimilée à un assemblage de points lumineux analogues chacun au trou lumineux de l'expérience précédente, dans ses positions successives. A chacun de ces points lumineux correspond sur l'écran (c'est-à-dire, pour le cas actuel, dans le plan focal de la loupe), un système particulier de franges, et le résultat de l'enchevêtrement de tous ces systèmes de franges sera de donner à l'écran un éclat sensiblement uniforme. Les franges seront en général invisibles, à moins de se placer dans des conditions particulières qu'il s'agit de connaître.

Il faudra, pour que les franges soient nettes, que les systèmes de franges dus à tous les points de la source coïncident. En d'autres termes, il faudra que pour tous les couples de rayons aboutissant au même point de l'écran, et provenant des différents points de la source, la différence de marche soit la même. Il suffira d'ailleurs que cette condition soit satisfaite pour un point central de l'écran, car elle le sera sensiblement pour tous les autres¹.

II

Imaginons alors que la source soit une certaine surface Σ (ce sera l'ouverture d'un écran éclairé en arrière par une flamme monochromatique) (fig. 1). Soient M un point central de l'écran sur lequel on




Fig. 1.

reçoit les franges, S un point central de la source, SOM, SOM' les deux rayons qui, provenant de S et aboutissant en M, se sont réfléchis sur les deux faces de la lame mince, l'un en O, l'autre en O'. Ils présentent, en se croisant en M, une certaine différence de marche δ . Si nous considérons de même les deux rayons aboutissant également en M, mais provenant d'un autre point de la source, leur différence de marche sera, en général, différente.

Il est toujours possible, toutefois, de trouver sur la surface Σ , quelle qu'elle soit, une série de points situés sur une certaine courbe S_1, S_2 , et tels que pour tous, la différence de marche soit la même.

Imaginons en effet, pour un instant, que le point M soit un point lumineux isolé et que nous remplaçons la source Σ par un écran de même forme. Sur cet écran viendront se dessiner, comme on l'a vu, des franges parfaitement nettes, et celle d'entre elles qui passe par S a la forme S_1, S_2 . Pour tous les points de cette courbe la différence de marche des couples de rayons partant de M et aboutissant à chacun d'eux est la même. Or, si nous considérons l'une de ces derniers, S par exemple, les deux rayons qui partent de M et aboutissent en S, suivent précisément les mêmes chemins MOS, MO'S, que quand nous supposons le point lumineux en S, le point éclairé en M. On voit par suite que pour tous les points de S_1, S_2 , les couples de rayons qui partent de chacun d'eux et aboutissent en M présentent la même différence de marche.

Supposons dès lors que nous limitons la source par un écran percé d'une fente étroite, curviligne et dirigée précisément suivant la courbe S_1, S_2 que nous venons de définir; la condition de netteté se trouvera par cela même satisfaite et un écran, introduit en M, se recouvrira de franges parfaitement nettes. En pratique, d'ailleurs, on pourra remplacer la fente courbe qu'indique la théorie

¹ Ce principe est d'ailleurs applicable à tous les phénomènes d'interférence. Il est en effet le principe d'une théorie générale, que M. Ch. Fabry et moi-même avons récemment établie (*Comptes-rendus*, 28 avril et 12 mai 1890). Les expériences qui précèdent résultent de cette même collaboration.

par une fente rectiligne tangente en S à la courbe S_1S_2 .

De ce raisonnement en réalité général, car on pourrait l'appliquer à tous les appareils interférentiels, nous pouvons déduire plusieurs conséquences :

1° Pour obtenir sur un écran quelconque des franges parfaitement nettes, il faut, en général, limiter la source par l'introduction d'une fente étroite, convenablement orientée. Un faible déplacement de la fente à partir de cette orientation fait disparaître entièrement les franges.

2° Supposons que l'on transporte l'écran sur lequel on reçoit les franges de M en M' . Il est évident que l'orientation de la courbe S_1S_2 va changer. Si donc nous déplaçons l'écran, en laissant la fente fixe, nous verrons disparaître les franges, et pour les rendre de nouveau distinctes, il faudra modifier l'orientation de la fente.

III

L'étude complète que j'ai faite des conditions de visibilité des anneaux de Newton vient justifier de tous points les lois générales auxquelles nous avons été conduits¹. Je me contenterai ici d'en indiquer les principaux résultats, que l'expérience vérifie complètement.

Nous supposons à cet effet que l'on fasse usage de l'appareil classique de la Provotaye et Desains². Ce dernier consiste essentiellement,




Fig. 2.

comme on sait, en un microscope à long foyer, dont l'oculaire est mobile pour faciliter la mise au point; ce microscope peut tourner autour d'un cercle gradué vertical (fig. 2). L'appareil produc-

teur des anneaux est placé sur le chariot d'une machine à diviser, et peut se déplacer, soit transversalement, c'est-à-dire dans une direction normale au plan d'incidence, soit dans une direction perpendiculaire à la précédente. On emploie une lumière monochromatique.

Dirigeons le microscope vers la région centrale des anneaux. Il est, dans ce cas, inutile d'introduire une fente, et les premiers anneaux sont localisés dans la lame mince.

Déplaçons l'appareil des anneaux transversalement, comme si nous voulions répéter les expériences de la Provotaye et Desains. Même dans la lumière homogène, nous ne tarderons pas à voir les anneaux devenir diffus et même disparaître entièrement. Il est d'ailleurs impossible de les faire réapparaître en modifiant le tirage du microscope.

Introduisons alors une fente (largeur 0^m001 environ), quelque part entre la flamme éclairante et la lunette (pour la plupart des expériences, la disposition la plus simple consiste à fixer la fente contre l'objectif de la lunette). Il suffit de la faire tourner pour qu'à un instant donné les anneaux réapparaissent avec tout leur éclat et leur netteté primitifs. Le champ du microscope semble se nettoyer brusquement. Si l'on continue à faire tourner la fente, on fait disparaître de nouveaux les franges.

Mais laissons la fente ainsi orientée dans une direction complètement défavorable. Il suffit d'enfoncer ou de retirer, suivant le cas, l'oculaire, pour rendre les franges de nouveau visibles et l'on peut de la sorte, les faire disparaître successivement, par le double jeu de la fente et de l'oculaire, en utilisant toute l'étendue du tirage.

Cette expérience réussit de même et est aussi démonstrative lorsqu'on vise une région quelconque de la lame mince, à part un cas tout particulier qui est le suivant.

Déplaçons l'appareil producteur des anneaux, de telle sorte que le plan d'incidence passe par le centre des anneaux, ce que nous reconnaitrons à ce que les franges paraissent dirigées normalement à ce plan, c'est-à-dire de la gauche vers la droite de l'observateur. Nous constaterons que, dans ce cas, la fente est toujours inutile et les franges, localisées, viennent se dessiner au voisinage immédiat d'une droite inclinée sur la lame mince (Hauptgerade de Sohneke et Wangerin), d'un angle variable avec l'angle d'incidence.

Mais ici se produit un phénomène nouveau. Introduisons la fente. Si nous lui donnons une orientation quelconque, la localisation est la même que si la fente n'existait pas. Mais amenons-la à être parallèle aux franges : toute localisation disparaît, et les franges demeurent visibles, quel que soit le tirage de la lunette.

1. *Journal de Physique*, (2), t. IX, p. 121 et 180, 1890.

2. *Annales de Chimie et de Physique*, (3), t. XVII, p. 413.

Ce fait peut d'ailleurs s'expliquer aisément, en parlant de la théorie élémentaire qui a été exposée.

Remarquons à cet effet que le plan d'incidence est dans ce cas un plan de symétrie. Dans la figure 1, les franges que produirait sur l'écran Σ un point lumineux situé en M, seraient normales au plan de symétrie. Quel que soit par suite le point visé M, l'orientation que l'on doit donner à la fente, pour faire apparaître les franges, reste toujours la même, normale au plan de symétrie.

Il importe de remarquer que, par suite de phénomènes de diffraction qui se produisent lorsque la fente est placée sur l'objectif de la lunette, cette dernière expérience ne réussit bien que si la fente est introduite entre la flamme et l'appareil des

anneaux. Il est alors commode de changer de disposition. On place l'appareil des anneaux verticalement sur un support approprié; la fente est portée par un pied, et l'on observe les franges au moyen d'une loupe, que l'on peut placer à une distance quelconque, sans cesser de voir les franges. Avec une lame d'air en forme de coin, comprise entre deux lames de verre légèrement inclinées l'une sur l'autre, l'expérience est encore plus facile, et rappelle alors absolument, par sa disposition générale, l'expérience des miroirs de Fresnel. Ajoutons qu'elle réussit fort bien en projection avec la lumière blanche.

J. Macé de Lépinay,

Professeur de physique
à la Faculté des Sciences de Marseille.

REVUE ANNUELLE DE MÉDECINE

Nous n'avons pas la prétention de rendre compte dans cette Revue de tous les travaux dont la médecine a été l'objet dans le cours de l'année 1890 : certaines questions nous ont semblé plutôt du domaine de la chirurgie, telles que les appendicites sur lesquelles les travaux de Reclus ont attiré l'attention; d'autres ne nous ont pas paru encore suffisamment élucidées : ainsi la théorie parasitaire du cancer, basée sur les recherches de Malassez, Darier, Wickam, dont Borrel (de Montpellier) vient de contester les résultats, etc. Bien que les maladies épidémiques ressortissent plutôt à l'hygiène, nous avons cependant crû devoir dire quelques mots de la grippe, en raison des études nouvelles auxquelles la dernière épidémie a donné lieu.

I

L'attention du monde médical a été presque exclusivement absorbée à la fin de l'année 1889 et au commencement de 1890 par l'épidémie de *grippe* qui s'est répandue sur l'ancien et le nouveau continent. Signalée à Saint-Petersbourg, puis à Berlin, elle apparut peu après à Paris vers le 7 décembre. Son extension rapide, son invasion brusque, se présentaient comme dans les épidémies anciennes de 1580, 1762, 1775, 1782, et celle plus récente de 1837; il en fut de même de ses caractères cliniques, dont nous n'avons pas à nous occuper ici. Les seules études qui doivent nous arrêter comme tout à fait nouvelles sont relatives à la nature de la grippe, qui réapparaissait pour la première fois depuis la révolution apportée en pathologie par les idées pastorienues. Tout d'abord, à Pétersbourg aussi bien qu'à Berlin, à Vienne, à Paris les observateurs ne reconnurent pas le caractère contagieux de la maladie et, dans sa pathogénie, les influences et courants atmos-

phériques jouèrent un rôle prépondérant; mais peu à peu des faits bien nets de contagion apparurent, et dès lors sa nature infectieuse et son origine parasitaire ne firent plus de doute.

On peut même à ce propos se demander si, le contagé étant animé, il n'y a pas eu, dans l'évolution de l'épidémie, exaltation de virulence. On n'a reconnu, en effet, le caractère contagieux de la maladie qu'à peu près au moment où se dessina sa gravité : l'exaltation de virulence, en même temps qu'elle permettait de déceler nettement la contagion, ne rendait-elle pas l'organisme plus favorable au développement des microbes infectieux, reconnus causes des nombreuses complications qui constituèrent la gravité de la grippe? ¹

Quant à l'agent spécifique de la maladie, il a été l'objet de recherches si nombreuses que nous ne pouvons songer à les énumérer. Klebs, Kollmann crurent l'avoir rencontré dans le sang; mais il fut bientôt reconnu par Chantemesse et Widal, par Laveran, etc., que les organismes flagellés de Klebs n'étaient autre chose que des éléments existant normalement dans le sang et considérés comme des globules en voie de formation. Les recherches microbiennes ont surtout porté sur les produits des diverses inflammations observées dans le cours de la maladie : amygdalites, pleurésies, pneumonies, otites, etc.; elles n'ont abouti partout où elles ont été faites, Berlin,

¹ Le nombre des décès à Paris, qui avait été de 982 dans la dernière semaine de décembre 1888 et de 970 dans la première semaine de janvier 1889, s'est élevé à 2.331 et à 2.683 dans les semaines correspondantes de 1889 et 1890 (*Bulletin hebdomadaire de statistique municipale*). Cette gravité ne fut pas spéciale à Paris; à Madrid, par exemple, on compta du 21 décembre 1888 au 10 janvier inclus 1889, 960 décès contre 2.559 dans la période correspondante de 1889-1890. (D^r del Valle, *Médecine moderne*, deuxième année, p. 129.)

Vienne, Bucharest, Paris, etc., qu'à la constatation d'espèces connues : pneumocoque de Talamon-Frankel, microbe capsulé de Friedlander, streptocoque pyogène, staphylococcus aureus et albus; mais aucun observateur n'a pu constater la présence d'un microbe spécifique. L'extrême fréquence du streptocoque dans les complications lui avait fait attribuer ce rôle spécifique par Ribbert (de Berlin) et par Finkler (de Bonn); mais cette opinion n'avait pas sa raison d'être, non plus que celle de Gilles et Jolles (de Vienne), qui avaient attribué ce même rôle au microbe de Friedlander; en somme, malgré les recherches de nombreux savants : Leyden, Weichselbaum, Kirchner, Kowalski, Prior, Babès, Bouchard, G. Sée et Bordas, Vaillard et Vincent, Netter, Chantemesse et Widal, etc., etc., l'étiologie microbienne n'a pu être prouvée; cependant des études auxquelles elle a donné lieu ressort ce fait que son agent pathogène fait de l'organisme qu'il atteint un terrain éminemment favorable aux infections bactériennes secondaires aussi bien dans le domaine de la médecine que dans celui de la chirurgie, comme l'ont démontré les recherches du professeur Verneuil.

A un autre point de vue, on s'est demandé si la grippe n'était pas la dengue des pays chauds modifiée, en raison des points de ressemblance que présentent entre elles ces deux maladies. La plupart des médecins d'Orient ne sont pas de cet avis, entre autres: Mahé (de Constantinople) et l'auteur de l'article DENGUE du *Dictionnaire encyclopédique*, de Brun, professeur à la Faculté de Beyrouth, qui a bien voulu nous transmettre à ce sujet les renseignements les plus affirmatifs, ayant d'autant plus de valeur que lui-même, à quatre mois d'intervalle, avait payé son tribut aux deux maladies. Du reste, si la grippe était la dengue modifiée par le climat, lorsque la grippe est revenue en Orient, elle aurait dû reprendre après quelque temps ses caractères de dengue; or, il n'en a rien été, bien qu'à Beyrouth, par exemple, le thermomètre marquât en moyenne 14°. Mais ce sont là des questions qui seront traitées plus longuement par ailleurs, ainsi, du reste, que le *choléra* qui apparut au mois de mai, en Espagne, alors qu'on l'attendait en Asie-Mineure.

II

La neuropathologie s'est enrichie récemment d'une espèce nouvelle, la *syringomyélie*¹. Ce terme de syringomyélie, dû à Ollivier (d'Angers), sert depuis Simon (1875) à désigner les cavités et productions kystiques que l'on rencontre dans la moelle, indépendamment du canal central; celles-

ci ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire, puisque Mlle Baùmler (1887) a pu en réunir 112 observations, alors que l'attention n'était encore guère attirée de ce côté. C'est à Schultze (de Dorpat) et à Kahler (de Prague) que revient l'honneur d'avoir montré, dans une série d'études publiées de 1882 à 1888, que certains troubles fonctionnels ou organiques correspondent à la lésion syringomyélique. En France, la question était peu connue jusqu'aux observations de Debove et de Déjérine¹ qui furent le point de départ d'un certain nombre d'études consacrées par le Professeur Charcot dans plusieurs cliniques remarquables. La syringomyélie était dès lors admise comme entité morbide, d'autant plus intéressante qu'elle contribuait à combler une lacune de la topographie médullaire. Si, en effet, la pathologie des faisceaux blancs et des cornes antérieures était suffisamment connue, il était loin d'en être de même de celle des cornes postérieures; or, c'est précisément dans cette région qu'évolue le processus syringomyélique.

D'après Déjérine, celui-ci consisterait exclusivement en une tumeur d'origine névroglique, une gliomatose qui, se substituant aux éléments nerveux, les détruit, puis se creuse de cavités par fonte de ses éléments constitutifs; d'après Jeoffroy, il faudrait de plus faire entrer en ligne de compte certaines myélites cavitaires, et c'est aussi l'opinion de Charcot. La lésion a son point de départ habituel au niveau du renflement cervical; elle descend généralement jusqu'au tiers inférieur de la zone dorsale, quelquefois même jusqu'à l'extrémité de la moelle, ainsi que Déjérine l'a observé récemment; on la voit aussi remonter vers la moelle allongée et s'insinuer même sous le plancher du quatrième ventricule: on observe alors des troubles de la déglutition, des nausées, des vomissements, des accès de dyspnée, etc. Nous ferons remarquer tout de suite que ces phénomènes bulbaires ne sont pas très rares; ils existaient, par exemple, sous forme de paralysie faciale, de diminution de l'ouïe, d'abolition du goût dans la moitié gauche de la langue avec conservation de la sensibilité tactile, chez un malade dont l'étude clinique a fourni au Professeur Grasset², l'occasion de publier un chapitre des plus intéressants de « géographie » médullaire.

Du reste, la syringomyélie rentre dans le cadre des autres affections des centres nerveux, en ce sens qu'elle se manifeste toujours par des symptômes en rapport avec le siège et l'étendue de la lésion anatomique; ceux-ci commencent donc par apparaître d'abord aux membres supérieurs, gagnent

¹ Comptes-rendus de la Société médicale des Hôpitaux, 1889.

¹ Voir pour la bibliographie: BRUNT, Thèse de la Faculté de Médecine de Paris, février 1890.

² GRASSET. Leçons sur le syndrome bulbo-médullaire, 1890, Montpellier, Camille Coulet; Paris, Masson, éditeurs.

ensuite le tronc pour ne s'étendre que rarement aux membres inférieurs. Bien que l'atrophie musculaire soit généralement le symptôme qui attire le premier l'attention (témoins certaines observations reconnues plus tard syringomyélie et publiées sous le titre d'atrophies musculaires avec troubles de la sensibilité), le premier en date est l'abolition de la sensibilité à la douleur et à la température avec conservation de la sensibilité au contact et du sens musculaire, la *dissociation syringomyélique* de Charcot. C'est là, en quelque sorte, le signe pathognomonique de l'affection; les autopsies ont démontré qu'il est produit par des lésions des cornes postérieures, ce qui vient corroborer l'opinion de Brown-Séquard relativement au passage, par cette région, des sensibilités thermique et douloureuse.

Que, de son point d'origine dans les cornes postérieures, le processus s'étende en avant et gagne les cornes antérieures, il déterminera de l'atrophie musculaire type Aran-Duchenne; en même temps ou consécutivement apparaitront des troubles trophiques que l'on pourra observer dans les systèmes osseux (scoliose), articulaire (arthropathies), cutané où les manifestations, fréquentes et assez souvent précoces, ont pour la plupart, suivant une expression de Thibierge ¹, cet air de famille, cet aspect particulier aux lésions trophiques qui fait songer à une affection du système nerveux (troubles sécrétoires sudoraux; troubles vasomoteurs: autographie, œdème, urticaire; troubles trophiques: éruptions vésiculeuses, bulleuses, pemphigoïdes, ulcérations, *panaris*, fissures, etc.). Que, plus tard, la substance blanche soit envahie, apparaitront: la parésie avec raideur ou contracture, l'exagération des réflexes (cordons latéraux), des phénomènes tabétiques, des troubles de la sensibilité tactile (cordons postérieurs); ces derniers, quand on les observe, viennent contrarier la dissociation syringomyélique qui repose précisément sur la conservation de la sensibilité tactile; mais, quel que soit le degré de l'anesthésie, on ne trouve pas de proportionnalité entre elle d'une part et l'algésie jointe à la thermanesthésie d'autre part. A ce propos, il est bon de dire que Déjerine ² a constaté des altérations névritiques cutanées dans les régions dissociées: « près de la moitié des tubes larges avait disparu et était remplacée par des gaines vides », ce qui tendrait à montrer que la moelle n'est pas seule en jeu dans la production des symptômes. Déjerine ³ a, en outre,

attiré l'attention sur le rétrécissement constant du champ visuel chez les syringomyéliques qu'il a observés, alors que ce phénomène était considéré comme spécial à l'hystérie et à l'hystéro-traumatisme.

Tous ces phénomènes évoluent lentement, précédant par poussées, à de longs intervalles. Ils commencent généralement à se manifester vers l'âge de 15 à 20 ans, ce qui a fait penser à Charcot que la syringomyélie est une maladie d'évolution, ayant son point de départ dans une anomalie de développement des éléments constitutifs de l'épendyme.

Les études relatives à la syringomyélie ont conduit ceux qui s'y sont livrés à se demander si la « parésie analgésique à panaris », la maladie de Morvan ¹ n'en était pas une variété. Tandis que Roth, Czerny sont de cet avis, que Grasset ² la regarde comme la partie française de l'histoire de la syringomyélie, Morvan, Déjerine ³ soutiennent son autonomie. S'appuyant sur les lésions névritiques constatées par Gombault dans un doigt emputé, lésions de névrites interstitielles et parenchymateuses qui diminuaient d'intensité de la périphérie à la base; sur des lésions analogues constatées par Gombault et Reboul et tout récemment encore par Jeoffroy et Achard ⁴, Déjerine conclut en disant que « la maladie de Morvan apparaît de plus en plus comme relevant non pas de la syringomyélie, mais bien d'une névrite périphérique de nature et de cause encore indéterminée ». Tel n'est pas l'avis de Charcot, qui localise au contraire cette affection dans la moelle, considérant les altérations des nerfs comme secondaires aux lésions médullaires. Du reste, dans les deux seules autopsies pratiquées, on a trouvé des lésions étendues de la moelle. Jeoffroy et Achard, en particulier, ont constaté une syringomyélie bien nette; mais deux examens anatomiques, dont l'un, celui de Gombault et Reboul, peut prêter à controverse en raison de la difficulté qu'il y eut à extraire la moelle de la colonne vertébrale atteinte de scoliose et des dilacérations qui s'en suivirent, ne suffisent pas pour élucider la question.

Si, passant dans le domaine de la clinique, on fait un tableau des symptômes de la syringomyélie comparés à ceux de la maladie de Morvan, on voit une analogie presque complète, les différences portant non pas sur les symptômes, mais sur leur groupement, leur intensité relative et surtout sur

¹ V. pour la Bibliographie détaillée: LOUAZEL, *Thèses de la Faculté de Médecine de Paris*, 1890.

² GRASSET, *Syndrome bulbo-médullaire*.

³ DÉJÉRINE, *Sur un cas de syringomyélie suivi d'autopsie*, Société de biologie, 14 février 1890.

⁴ DÉJÉRINE, *La Médecine moderne*, 1890, p. 685.

³ DÉJÉRINE, *Syringomyélie et maladie de Morvan*, *Médecine moderne*, 1890, p. 563.

⁴ JEOFFROY et ACHARD, *Thèse de Louazel et Archives de médecine expérimentale*.

leur évolution chronologique. Si, par exemple, les malades de Morvan consultent pour leurs panaris, tandis que les syringomyéliques se plaignent surtout de leur atrophie musculaire, il n'en est pas moins vrai que le plus souvent Morvan constatait, en même temps que les panaris, des troubles moteurs depuis la simple maladresse manuelle jusqu'à l'impotence avec atrophie musculaire plus ou moins prononcée; de même, dans la syringomyélie, en même temps que l'atrophie, on constate des fissures, des gerçures, des durillons, des altérations des ongles, des panaris. Quels que soient ces accidents et leur intensité, les commémoratifs apprennent qu'ils avaient toujours été précédés par l'analgésie et la thermanesthésie; il y a donc eu dans tous les cas lésion primitive portant sur les cornes postérieures; d'où cette conclusion que le point de départ anatomique a été le même aussi bien dans la syringomyélie que dans la maladie de Morvan. Ne trouverait-on pas dans cette constatation le moyen d'interpréter les différences symptomatiques qui vont se présenter dans la suite de l'évolution morbide, évolution qui affecte une allure identique dans les deux affections (lenteur, poussées successives)? En effet, on peut très bien admettre que, des cornes postérieures le processus pathologique va s'étendre en suivant des trajets qui différeront en vertu de causes qui nous échappent, remontant peut-être à l'époque du développement fœtal; d'après la voie qu'il prendra les symptômes varieront: s'il envahit de suite les régions dont les lésions donnent lieu aux troubles trophiques, surviendront par exemple des panaris (maladie de Morvan); s'il gagne les cornes antérieures on observera l'atrophie musculaire (syringomyélie); s'il retentit d'abord sur les cordons postérieurs, on aura la diminution de la sensibilité tactile notée dans beaucoup de cas de maladie de Morvan; ce retentissement est-il plus tardif, on rentre dans les faits de syringomyélie; encore devons-nous dire que Morvan lui-même a noté, au début d'un certain nombre de ses observations, l'intégrité de la sensibilité tactile, qui ne fut atteinte que plus tard après bien des années, comme dans la syringomyélie. De la sorte, en analysant les faits publiés, il nous semble que nombre de cas décrits sous le nom de maladie de Morvan peuvent être interprétés comme syringomyélie. Maintenant, qu'il existe une affection spéciale d'origine infectieuse, intéressant primitivement les nerfs périphériques, présentant un ensemble symptomatique analogue à certains cas de Morvan, la chose n'est pas impossible; mais, pour arriver à l'établir, de nombreux examens anatomiques sont encore nécessaires.

Poursuivant ses études sur les *névrites périphé-*

riques, Déjerine¹ attribue à celles-ci les parésies et paralysies survenant au début et dans le cours du tabès, depuis les paralysies oculaires si communes aux premières périodes, jusqu'aux hémiplegies, monoplegies, paraplégies, etc., etc., transitoires et permanentes. A ce propos, il ajoute que « rien ne prouve que la lésion médullaire du tabès soit primitive », l'anatomie pathologique tendant chaque jour à montrer qu'elle est, au contraire, secondaire à une névrite des racines postérieures; et il conclut en disant que « le tabès apparaît de plus en plus comme une maladie des nerfs périphériques sensitifs, sensoriels et moteurs. »

Dans un article précédent² nous avons exposé cette question des névrites périphériques; dans une leçon faite à la Salpêtrière, Babinsky³ vient de déterminer, dans l'état actuel de nos connaissances, quelle part on doit leur attribuer en *neuro-pathologie*. Il refuse toute autonomie à bien des formes auxquelles on tendrait à l'accorder, jusqu'au jour où aux diverses espèces cliniques les observations histologiques auront juxtaposé des lésions spéciales; quant à présent, en effet, on constate que des modalités cliniques très différentes correspondent à des lésions analogues; il est donc vraisemblable « qu'un certain nombre de névrites dites périphériques dépendent en réalité d'altérations superficielles des centres nerveux que l'histologie de l'avenir nous fera peut-être connaître. » A l'appui de ces idées, Gombault⁴ a constaté que les nerfs peuvent être altérés dans leur structure sans troubles apparents pendant la vie; d'autre part, Brissaud⁵ a reconnu l'existence de névrites périaxiales *latentes*, analogues à celles que Pitres et Vaillard avaient déjà signalées.

Depuis 1861, époque à laquelle remontent les premiers travaux de Friederich, il n'existait que neuf autopsies de tabès héréditaire bien déterminé, toutes à l'Étranger. Deux ont pu être faites en France cette année, l'une par Letulle et Vaquez⁶, l'autre par P. Blocq et Marinescu⁷. La première a été pour MM. Letulle et Déjerine⁸ l'occasion d'une étude remarquable sur la nature et l'évolution des lésions médullaires qui caractéri-

¹ DÉJERINE. Des paralysies au cours du tabès, *Médecine moderne*, 1890, p. 13.

² DE LAVARENNE. Névrites périphériques d'après M^{me} Déjerine-Klumpke, dans la *Revue* du 15 avril 1890, page 214.

³ BABINSKY. Anatomie pathologique des névrites périphériques, *Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie*, août 1890.

⁴ GOMBAULT. *Société anatomique*, juillet 1890.

⁵ BRISSAUD, *Société de Biologie*, juillet 1890.

⁶ LETULLE et VAQUEZ. *Société de Biologie*, février 1890.

⁷ P. BLOCC et MARINESCU. *Société de Biologie*, mars 1890.

⁸ DÉJERINE et LETULLE. Étude sur la maladie de Friederich, *Médecine moderne*, n° 17.

sent cette affection. Comme dans les autres autopsies, ils ont constaté une sclérose portant sur la moitié postérieure de la moelle épinière, en arrière de la commissure postérieure, sclérose intéressant toute l'étendue des cordons postérieurs et la partie postérieure seulement des cordons latéraux; mais, le fait important qu'ils ont établi, c'est qu'il fallait différencier totalement la sclérose des cordons latéraux de celle des cordons postérieurs. La première est une sclérose corticale, relevant d'une méningo-myélite par propagation, analogue à celle décrite par Déjerine dans le tabès ataxo-paraplégique; elle est d'origine vasculaire. La seconde, celle des cordons postérieurs, présente une morphologie spéciale: elle est due uniquement à la prolifération du tissu de soutien, la névroglie; c'est une sclérose névroglie pure, indépendante de toute altération vasculaire. Cette constatation a une grande importance au point de vue de la pathogénie des scléroses; elle les divise en deux groupes: l'un, des scléroses vasculaires (sclérose en plaques, tabès, etc., etc.), toujours acquises; l'autre, des scléroses névroglie pures, représenté jusqu'à présent par la seule maladie de Friederich, relevant de l'hérédité et de l'évolution. Ainsi se trouvent confirmées les idées de Friederich, qui dès 1877 regardait l'ataxie héréditaire comme produite par un arrêt de développement de la moelle épinière.

III

L'étude des *myocardites* prend une importance de plus en plus grande à mesure que l'on connaît mieux l'action exercée sur la fibre cardiaque par les intoxications, par les maladies infectieuses, action dont les effets sur le fonctionnement cardiaque peuvent se faire sentir immédiatement ou à plus ou moins longue échéance.

Charrin¹ a étudié les lésions myocardiques consécutives à l'affection produite par l'inoculation au lapin du bacille pyocyanique; il les a trouvées très variées: atrophie, hypertrophie, dilatation, dégénérescence amyloïde, sclérose, inflammation plus ou moins accentuée; dans certains cas même il n'a reconnu aucune lésion. Il attribue ces effets différents, d'une part au mode de réaction individuelle, d'autre part au degré de toxicité, plus ou moins accentué, suivant les cas, des substances élaborées par le microbe. Enfin il ajoute que, pour pouvoir donner des résultats définitifs et complets, il faudrait observer longuement les sujets rendus malades: la toxémie une fois produite, la pathologie cellulaire suit son cours. C'est ainsi qu'en pathologie humaine il arrive de reconnaître des troubles cardiaques auxquels il est impossible

d'attribuer d'autres causes que des infections anciennes comme la fièvre typhoïde, le paludisme.

Le Professeur Renaut² (de Lyon) a décrit une nouvelle affection du cœur qu'il appelle *myocardite segmentaire essentielle chronique*. Le cœur est à peine augmenté de volume; il n'existe pas de dilatation des cavités; les valvules sont normales, l'endocarde intact, les coronaires perméables; le tissu musculaire, se déchirant facilement, a une coloration grisâtre; le processus histologique est caractérisé par la dissociation segmentaire du tissu cardiaque, lésion que Renaut a décrite avec Landouzy, consistant essentiellement dans le ramollissement du ciment qui unit les cellules du myocarde; il n'y a pas de prolifération du tissu conjonctif fasciculaire. Ces altérations se traduisent par des phénomènes locaux consistant dans l'arythmie du cœur et du poulx (poulx faux régulier, poulx multiforme), la disparition du choc précardial localisé, la matité rectangulaire, l'affaiblissement des bruits cardiaques et parfois un souffle systolique médio-cardiaque. Les phénomènes généraux sont plutôt négatifs: il n'y a pas de tuméfaction du foie, pas de veinosité du visage ni de dilatation du cœur droit, pas de diminution notable des urines ni de bruit de galop; on observe généralement un léger œdème pulmonaire et malléolaire, quelquefois un peu d'albumine dans les urines. Les malades atteints de cette forme de myocardite sont excessivement vulnérables: ce sont des vieillards ou des alcooliques ou encore des sujets ayant dans leurs antécédents des fièvres graves infectieuses; ils meurent par asystolie tenant à l'exagération de l'arythmie, par tachycardie avec angoisse, syncope ou rupture du cœur.

IV

Les *pleurésies* ont été l'objet, dans le cours de cette année, d'importantes études et communications à diverses sociétés savantes³. Trois questions surtout ont été traitées: la nature, le traitement des pleurésies purulentes, les causes de la pleurésie en général. La nature microbienne des pleurésies purulentes est aujourd'hui un fait nettement établi; il est reconnu aussi que suivant le ou les microbes qui les produisent, elles affectent une évolution différente; la détermination de ces microbes est donc capitale pour établir un pronostic

¹ Compte rendu de l'Académie de Médecine, mai 1890.

² Voyez: 1^o Neuvième Congrès de médecine interne de Vienne, 15-18 avril 1890. Traitement de l'empyème. *Compte-rendu*. CRITZMANN, *Médecine moderne*, 1890, p. 332.

³ Société médicale des hôpitaux de Paris, séances des 2, 16, 23 mai et 6 juin 1890.

⁴ Société italienne de médecine interne. Causes de la pleurésie. *Compte-rendu*. THIBERGIE, *Gazette hebdomadaire de méd. et ch.*, 1890, p. 547.

¹ CHARRIN. *Communication faite au Congrès de Berlin*, 1890.

et formuler le traitement. Ayant fait des recherches dans 109 cas, Netter a rencontré 11 espèces microbiennes seules, ou le plus souvent associées ; mais, en raison de la rareté de la plupart, il les réduit à quatre qui peuvent être considérées comme caractéristiques de quatre classes de pleurésies : pneumocoque 29 cas, streptocoque 46, bactéries saprogènes de la putridité 23, bacille de Koch 11. Ce sont donc les pleurésies à streptocoques les plus fréquentes ; celles à pneumocoques sont les plus bénignes : elles guérissent facilement après plusieurs ponctions, parfois même après une seule. La clinique avait, du reste, déjà constaté depuis longtemps ces faits de guérison ; la pratique de la ponction s'en était même généralisée, passant à l'état de méthode de traitement ; nous n'avons pas besoin de rappeler combien déplorables étaient les résultats. En effet, lorsque les pleurésies sont à streptocoques ou putrides, la pleurotomie est nécessaire au traitement et doit être pratiquée dès que la présence du pus et sa nature sont reconnues ; quant à la résection costale, les avis sont partagés, les uns la posant en principe, les autres la subordonnant aux indications individuelles. L'opération, aussi aseptique que possible, sera suivie d'un lavage antiseptique de la cavité selon les uns ; selon d'autres, ce lavage peut et doit même être évité souvent ; les pansements rares sont généralement adoptés. Les brillants résultats de cette méthode rationnelle s'accroissent chaque jour, puisque la mortalité qui était de 80 %₀₁ est tombée, grâce à elle, de 10 à 20 %₀₁. (Immermann.)

Récemment le Professeur Kiener ¹ (de Montpellier) a donné sur cette question des aperçus tout nouveaux. Il divise les pleurésies purulentes en fibrino-purulentes et en purulentes proprement dites : il attribue les premières au pneumocoque, au streptocoque, au bacille tuberculeux ou à l'association de 2 ou 3 de ces microbes, réunissant en un même groupe les pleurésies à pneumocoques et à streptocoques, microbes dont il n'a pu saisir en l'espèce la différence pathogénique, mais auxquels il a reconnu, suivant les cas, des virulences très variables ; il considère les pleurésies purulentes proprement dites comme dues au staphylococcus (aureus ou albus) isolé ou associé à d'autres micro-organismes, surtout au bacille tuberculeux. Les pleurésies fibrino-purulentes évoluent en deux périodes, l'une d'exsudation fibrineuse à laquelle succède une période de fonte puriforme pouvant en peu de jours remplir la cavité pleurale, survenant six semaines à deux mois après le début de l'affection. C'est lorsque l'entrée dans cette seconde

période est constatée, qu'il faut de suite pratiquer la pleurotomie aseptique ; les lavages antiseptiques consécutifs ne pourraient que contrarier le processus de réparation naturelle qui s'opère et que ne gênent nullement, en vertu d'une sorte d'immunité acquise, les microbes restés à la surface de la plèvre. Par tous les moyens possibles, aussi bien pendant l'opération que dans la suite, il faut éviter, avant tout, d'introduire dans la plèvre des micro-organismes du dehors, car c'est à ceux-ci que Kiener attribue les pleurésies purulentes proprement dites. En effet, il a toujours trouvé dans le pus qui en provenait, le staphylococcus aureus avec son action pyogénique rapide et intense, tandis qu'il ne l'a jamais rencontré dans le pus des pleurésies fibrino-purulentes, à moins qu'il y ait eu communication avec l'air extérieur par pleurotomie ou fistule bronchique. Il semble donc qu'introduit par des voies accidentelles, il devient la cause de ces pleurésies à marche irrégulière, récidivantes, sans tendance à la guérison, dont on ne pouvait s'expliquer l'évolution.

Deux causes nouvelles de pleurésie ont été signalées : le Professeur Potain ¹ a décrit chez les gouteux des épanchements pleurétiques peu étendus, fugaces, mobiles ; MM. Chantemesse et Vidal ² ont observé deux cas de pleurésies syphilitiques secondaires, dont l'évolution, parallèle à celle d'une roséole, ne leur a laissé aucun doute sur le diagnostic. Ainsi, de nouveaux faits viennent peu à peu éclaircir la pathogénie de la pleurésie, qui apparaît de plus en plus comme une affection dépendant de maladies générales presque toujours infectieuses. L'influence *pathogénique* du froid, auquel Landouzy ³, dès 1883, réservait seulement le rôle de *cause occasionnelle*, perd chaque jour de son importance, d'autant mieux que de toutes les maladies rapportées aux vicissitudes atmosphériques elle est certainement, d'après Kelsch ⁴, celle qui se subordonne le moins à leur influence ; par contre, les études bactériologiques viennent chaque jour confirmer cette autre idée, émise par Landouzy, que la pleurésie dite à *frigore* est toujours *fonction* de maladie infectieuse, et que, dans la grande majorité des cas, cette maladie infectieuse est la tuberculose.

V

Jusqu'à ces derniers temps, on considérait les *varices de l'œsophage* comme intimement liées à

¹ POTAIN. Clinique médicale de la Charité. *Semaine médicale*, 1890, p. 41.

² CHANTEMESSE et VIDAL. *Société médicale des hôpitaux*, 18 avril 1890.

³ LANDOUZY. Clinique de la Charité (cours de vacances), 1883. Cours auxiliaire de la Faculté, 1883-84. *Gazette des hôpitaux*, 1884.

⁴ KELSCH. De la nature de la pleurésie. *Gazette heb. de méd. et chir.*, 1890, p. 481.

¹ KIENER. Pleurésies purulentes, *Revue de médecine*, 1890 n° 41, p. 881.

l'alcoolisme et à la sclérose hépatique. Ayant observé pendant trois années consécutives (de 1887 à 1890) un malade alcoolique sans cirrhose hépatique, atteint d'œsophagorrhagies répétées, dont la dernière fut mortelle, de plus ayant analysé les observations publiées depuis la thèse d'agrégation de Gubler (1853), Letulle¹ a montré comment il fallait comprendre la pathogénie de ces varices. D'après lui, il est hors de doute que la lésion veineuse relève presque toujours de l'alcoolisme chronique, car il n'a guère trouvé que cinq cas où l'on a pu invoquer d'autres causes : d'autre part, il est non moins certain que dans la grande majorité des cas d'alcoolisme, la cirrhose hépatique est la cause des modifications circulatoires qui entraînent « l'ectasie des veines sous-muqueuses de l'appareil gastro-œsophagien ». Cependant, quelques observateurs (Le Diberder, Hanot, Millard et Dussaussey, Glover, Four) ont noté la disproportion qui existe parfois entre le peu d'altération du foie et l'état variqueux énorme de l'œsophage; la glande hépatique peut même rester normale, témoin le malade de Letulle dont le foie « légèrement gras était indemne de cirrhose ». Quelle est ou quelles sont alors les causes de l'ectasie? Letulle les a trouvées : 1^o dans le processus inflammatoire chronique déterminé par l'action toxique directe de l'alcool sur les parois veineuses, depuis le système porte jusqu'aux veines œsophagiennes; 2^o dans ce fait que l'alcool produit sur le péritoine sus-ombilical, dans ses régions péri-gastrique et péri-pancréatique, des lésions inflammatoires qui entourent, immobilisent les veines d'origine de la veine-porte et la veine-porte elle-même. De ce double concours il résulte une stase passive dans tout le système porte, qui amène secondairement l'ectasie veineuse gastrique et œsophagienne. Naturellement si, en outre, il existe des lésions hépatiques, la stase en est accrue; mais, et c'est là le fait important mis en relief par Letulle, ces lésions ne sont pas nécessaires pour que des varices œsophagiennes se produisent; les lésions inflammatoires adhésives péritonéales suffisent à elles seules.

La *pathologie de l'estomac* a été l'objet de nombreux travaux; depuis plusieurs années déjà les savants allemands avaient demandé à la chimie stomacale l'explication des diverses dyspepsies. Les recherches de Boas, Ewald, Gawoski et autres ont abouti à des procédés d'analyse peu utilisables en clinique, et à une classification en hyper et hypoacidité basée sur l'acidité totale du suc gastrique. En France nous sommes redevables des

premiers travaux publiés sur le même sujet à G. Sée et à ses élèves Mathieu, Ray, Durand-Fardel¹. Ces travaux, basés sur le dosage clinique de l'acide chlorhydrique libre par l'emploi des méthodes colorantes, ont conduit à la classification en hyper et hypochlorhydrie et par conséquent à la détermination des affections dans lesquelles l'HCl se trouvait en quantité insuffisante ou en excès; c'est ainsi que les auteurs précités ont pu décrire des hyperchlorhydries aiguës et chroniques et même une affection spéciale qu'on pourrait désigner sous le nom d'hyperchlorhydrie chronique dont Lyon a donné une excellente idée dans sa thèse et qui se rencontre le plus souvent avec des estomacs dilatés.

Le Professeur Hayem et M. Winter² ont poursuivi des recherches sur le même sujet; ils considèrent que le dosage du seul HCl libre est insuffisant pour apprécier le chimisme stomacal, qu'il faut doser le chlore sous ses diverses formes et combinaisons organiques et inorganiques, et tenir compte de toutes les conditions chimiques de la digestion. Ils arrivent ainsi à une classification clinique en hyperpepsie où il y a irritation des fonctions chimiques de l'estomac, hypo-pepsie où il y a atténuation et même annihilation de ces fonctions et dyspepsies simples sous l'influence de troubles mécaniques et nerveux survenant sans modifications du chimisme stomacal.

Enfin, récemment, Mathieu et A. Rémond ont communiqué à la Société de Biologie un procédé d'analyse du suc gastrique permettant d'obtenir par des opérations assez simples : l'évaluation de l'acidité totale, l'acidité due aux acides organiques, l'acidité minérale totale, l'acidité due à l'HCl libre et à l'HCl en combinaison organique. Ces divers travaux ont eu pour résultat de donner aux cliniciens le moyen de diriger d'une façon plus rationnelle le traitement si délicat des dyspepsies.

Cirrhose alcoolique éveille naturellement l'idée de cirrhose atrophique. MM. Hanot et Gilbert³ ont montré que dans certains cas cette cirrhose peut être hypertrophique avec sclérose annulaire et péri-veineuse. L'alcoolisme peut donc conduire soit à l'atrophie, soit à l'hypertrophie scléreuse du foie; dans les diagnostics on devra tenir compte de cette notion qui a surtout de l'importance au point de vue du pronostic; en effet, dans la forme hypertrophique, la perméabilité du foie est beaucoup plus grande, les troubles circulatoires bien moindres et elle est susceptible d'amélioration lorsque cesse l'intoxication alcoolique.

¹ Voir pour la bibliographie, G. LYON, analyse du suc gastrique. *Thèse*, Paris, 1890.

² HAYEM et WINTER. *Chimisme stomacal*. Paris, Masson, 1891.

³ HANOT et GILBERT. De la cirrhose alcoolique hypertrophique, *Société médicale des hôpitaux*, 23 mai 1890.

¹ LETULLE. Varices de l'œsophage, *Médecine moderne*, nov. 1890.

VI

L'absence du corps thyroïde, son ablation chirurgicale, ses altérations morbides produisent un ensemble de troubles de la nutrition auxquels on a donné, depuis une communication du D^r Ord à la Société clinique de Londres, le nom de *myxœdème*¹, et comprenant : 1^o le myxœdème opératoire de Reverdin ou cachexie strumipriva de Kocher; 2^o l'idiotie pachydermique ou crétinisme sporadique; 3^o le myxœdème des adultes ou cachexie pachydermique de Charcot.

Interprétant les expériences de Schiff² sur la greffe thyroïdienne et celles toutes récentes de von Eiselsberg (de Vienne), Horsley³ s'est demandé si, comme traitement du myxœdème, on ne pourrait pas essayer cette greffe chez l'homme, en se servant du corps thyroïde du mouton, par exemple. Des tentatives ont été faites dans ce sens par Bischer (d'Aarau) qui transplanta par deux fois, à trois mois d'intervalle, une partie saine de corps thyroïde goitreux qu'il venait d'extirper, et par Köcher⁴ pour le myxœdème opératoire. Lannelongue et Legroux⁵ ont transplanté un corps thyroïde de mouton pour une idiotie avec cachexie pachydermique; les résultats sur l'évolution de la maladie n'ont pas encore été publiés. Bettencourt et Serrano⁶ ont fait la même opération pour le myxœdème des adultes; l'amélioration se fit sentir dès le lendemain de l'opération. Enfin, Merklen et Walther⁷ ont publié récemment un cas des plus intéressants. Le 3 septembre 1890 ils ont transplanté un des lobes d'un corps thyroïde de mouton, enlevé séance tenante, dans la région sous-mammaire droite d'une myxœdémateuse âgée de 41 ans. Dès le 6 septembre l'amélioration se faisait sentir; un mois après elle était frappante : la parole traînante, embarrassée était devenue nette, la marche était facile, la bouffissure de la face avait diminué, l'infiltration des régions sous-claviculaires et mammaires était moindre et surtout des hémorrhagies qui duraient depuis plusieurs mois avaient complètement cessé et n'avaient pas reparu 72 jours après l'opération. Cette action sur les hémorrhagies, très nette aussi dans le cas de Bettencourt et

Serrano, est à rapprocher de l'action hématopoïétique de la glande thyroïde. En somme, ces diverses tentatives ont démontré que l'on pouvait sans danger transplanter le corps thyroïde d'un animal à l'homme et que cette transplantation déterminait une amélioration dans l'état des myxœdémateux. Cette amélioration sera-t-elle durable ou passagère? C'est déjà beaucoup de l'avoir obtenue.

VII

A la suite d'études méthodiquement poursuivies depuis 1879, Laveran¹ a fixé définitivement la nature de la *fièvre paludéenne* en déterminant d'une façon désormais incontestable quel en est l'agent pathogène; au moment où il commença ses recherches, on était fort enclin à assigner, par hypothèse, une constitution bactérienne à cet agent. Laveran a démontré que c'est un sporozoaire vivant aux dépens des éléments du sang, un hématozoaire. Sur du sang pris au début d'un accès et avec un grossissement de 300 à 400 diamètres, les hématozoaires se présentent sous des formes variées que Laveran ramène à 4 types : 1^o des corps sphériques du diamètre de 1 μ à celui d'un globule sanguin, pourvus de granulations pigmentaires plus ou moins abondantes, doués de mouvements amiboïdes, attachés aux hématies aux dépens desquelles ils se développent et qui, une fois envahies, pâlisent de plus en plus, leurs contours finissant même par disparaître; 2^o beaucoup d'entre eux ont sur leurs bords des filaments mobiles, des flagella, qui peuvent se détacher; 3^o des corps en croissant, probablement des organismes en involution; 4^o des corps en rosace, aspect dû à la segmentation qui semble être un mode de développement. Ces diverses formes de l'hématozoaire paludique en ont imposé à certains observateurs qui se sont demandé s'il n'y aurait pas là plusieurs parasites différents. Ainsi, d'après Golgi et Autolizei, les fièvres tierce, quarte et irrégulière auraient chacune son organisme, ce qui ferait trois variétés; d'après Peletti et Grassi, il y en aurait seulement deux; s'il en était ainsi, en injectant du sang de paludiques tierce, quarte, etc., à des individus sains, on devrait reproduire des types tierce, quarte, etc. Or les expériences de Gualdi et Autolizei, faites dans ce sens, n'ont réussi qu'une seule fois à transmettre le type analogue; toutes les autres ont bien reproduit le paludisme, mais sans la forme correspondante; aussi Laveran rejette-t-il ces opinions, considérant que la facilité et la rapidité avec lesquelles les diverses variétés de sporozoaires chan-

¹ Voir pour la Bibliographie : LANNOIS. Cachexie pachydermique et ses rapports avec les affections de la glande thyroïde (*Archives de méd. expér. et d'anat. path.*, t. I, 1889, p. 470).

² Voir FREDERICK. *Revue annuelle de Physiologie dans Revue générale des Sciences*, p. 644.

³ HORSLEY. *The Brit. méd. Journ.*, 8 février 1890 et 26 juillet 1890.

⁴ Cas cités par Horsley.

⁵ LANNELONGUE et LEGOUX. *Société de biologie*, 8 mars 1890.

⁶ BETTENCOURT et SERRANO. *Congrès de Limoges*, 1870 et *Progrès médical*, 1890, p. 170.

⁷ MERKLEN et WALTHER. *Société médicale des hôpitaux*, 14 nov. 1890.

¹ LAVERAN. Des Hématozoaires du paludisme. *Archives de médecine expérimentale*, nov. 1889, janv. 1890.

gent de forme suffisent amplement à expliquer le polymorphisme qu'il a constaté.

Bien qu'on n'ait pas encore pu cultiver l'hématozoaire de Laveran, bien qu'on ne sache pas d'où il vient ni quelle forme il affecte dans les milieux extérieurs, on l'a trouvé partout en Europe, en Afrique, en Amérique (Machiafa et Celli, Golzi, Stemberg, Councilman, Osler, Evans, Metchnikoff, Tomo Coronado), avec ses mêmes caractères, dans le sang de tous les paludiques; on l'a reconnu partout comme l'agent de développement de la mélanémie caractéristique du paludisme; jamais on ne l'a rencontré chez un sujet non paludique.

La nature parasitaire du paludisme est donc désormais hors de doute, et l'objection que l'on avait tirée de sa non-contagiosité tombe d'elle-même en présence des résultats positifs obtenus en injectant du sang d'un malade infecté à un individu sain. Mais, d'où viennent les hématozoaires et comment pénètrent-ils dans l'organisme? Comment agissent-ils? à quoi est due l'intermittence? Ces questions restent encore à élucider.

C'est pour contribuer à leur solution, en s'inspirant vraisemblablement d'une idée exprimée à ce sujet par Laveran¹, que MM. Roque et G. Lemoine (de Lyon)² ont étudié la toxicité urinaire avant un accès de fièvre intermittente, pendant et après. Ils ont ainsi reconnu que, pendant l'accès, il y avait une production énorme de toxines, s'élevant dans la proportion de 1 à 5 environ, que celles-ci s'éliminaient après l'accès d'une façon décroissante pendant 12, 18 à 24 heures. Soumettant le malade au sulfate de quinine, ils ont vu l'élimination augmenter considérablement. De ces observations il résulte que de grandes quantités de toxines sont élaborées par les hématozoaires, que celles-ci s'éliminent en grande partie par le rein, que, par suite, le bon fonctionnement du rein est d'une importance capitale chez les paludiques. Son insuffisance, entravant l'élimination des toxines, en favorise l'accumulation; cette accumulation devient l'origine d'accès graves et même pernicieux. Ainsi se trouve singulièrement éclaircie la pathogénie de certains accès pernicieux que nous observions sans pouvoir en déterminer la cause.

On voit assez fréquemment dans le cours de la scarlatine apparaître des angines pseudo-membraneuses affectant tous les caractères objectifs de l'angine diphthérique; les cliniciens se sont toujours montrés très partagés à l'égard de leur origine : scarlatineuse ou diphthérique. Relativement à la direction à donner au traitement et aux me-

sures prophylactiques à prendre, la solution de ce problème était d'un grand intérêt. Déjà, d'après les travaux de Löffler (1884), de Crooke (1885) de Marie Raskin (1888), de Prudden (1889), on savait que certaines pseudo-membranes scarlatineuses contiennent et que d'autres ne contiennent pas le bacille de Löffler; MM. Würtz et Bourges¹, reprenant la question, semblent l'avoir définitivement éclaircie. En étudiant de fausses membranes recueillies dans la gorge d'enfants scarlatineux observés à l'hôpital Trousseau, ils ont reconnu le bacille de Löffler dans celles qui provenaient d'angines tardives, tandis qu'ils ne l'ont jamais rencontré dans celles provenant d'angines précoces; celles-ci se caractérisaient par la présence constante d'un streptocoque accompagné du *Staphylococcus pyogenes aureus* (5 cas), *albus* (1 cas). Ce streptocoque, inoculé au pigeon, a toujours déterminé des fausses membranes diphthéroïdes. Aussi MM. Würtz et Bourges lui attribuent-ils une part prépondérante dans la production des angines pseudo-membraneuses de la scarlatine; il est, du reste, très analogue à celui de l'érysipèle qui peut aussi, dans certains cas, produire des fausses membranes, comme l'a montré Vidal. De ces observations il résulte que, malgré des caractères objectifs d'une analogie parfois frappante entre elles d'une part, entre elles et l'angine diphthérique d'autre part, il existe deux formes d'angines scarlatineuses pseudo-membraneuses : l'une précoce, bénigne, due à un streptocoque; l'autre tardive, maligne, d'origine vraiment diphthérique.

On s'étonnera peut-être que nous ne parlions pas ici de la découverte de Koch; étant donné l'état actuel de la question, nous avons pensé que son étude ne rentrerait pas dans le cadre de cette Revue de médecine. On en est encore à la période des expériences, qui se font dans ces conditions particulières qu'on ne sait pas avec quoi on expérimente; il est donc bien difficile de se prononcer. On peut dire néanmoins que la lymphé de Koch, lancée de Berlin comme remède et comme critérium de diagnostic, n'a encore guéri personne jusqu'à ce jour, et s'est montrée parfois infidèle dans son rôle révélateur. Cependant, des observations faites dans les hôpitaux de Paris par de savants maîtres, poursuivies avec la plus grande rigueur scientifique, permettront, sans doute, de porter bientôt un jugement certain; les lecteurs de la Revue trouveront alors dans ces colonnes un exposé complet de cette délicate question.

D^r E. De Lavarenne.

¹ Laveran. *Loc. cit.*, p. 19, note.

² Roque et G. Lemoine. Recherches sur la toxicité urinaire dans l'impaludisme. *Revue de médecine*, 1890, n° 11.

¹ Würtz et Bourges. *Archives de médecine expérimentale*, mai 1890, p. 341.

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1^{re} Sciences mathématiques.

Maleyx (L.), *Professeur au Collège Stanislas. — Leçons d'Arithmétique*. Gauthier-Villars et fils, Paris, 1890.

Sous ce titre, M. L. Maleyx vient de publier les leçons d'Arithmétique qu'il professe depuis de longues années au collège Stanislas. Son ouvrage, bien fait, sera aussi utile aux professeurs qu'aux élèves. Nous voyons surtout à signaler la séparation des théorèmes sur les nombres premiers entre eux de ceux relatifs aux nombres premiers absolus, l'introduction des théorèmes élémentaires sur les restes, dont l'application se trouve dans les développements des fractions ordinaires en fractions décimales, l'exposition très soignée des opérations abrégées, les perfectionnements indiqués pour l'extraction de la racine d'indice *m*. L'ouvrage est terminé par des applications élémentaires bien choisies et intéressantes sur la théorie des nombres.

A. SOLDÉ.

Demoulin (Maurice), *Ing. des arts et manufactures. — Les machines à vapeur à triple et quadruple expansion*. Baudry et Cie, Paris, 1890.

Dans un opuscule, très intéressant et contenant de nombreux résultats d'expériences, l'auteur insiste sur les progrès et les règles consacrés par l'expérience dans ces dernières années sur les machines à expansion multiple. Il donne les dimensions et même les détails d'un grand nombre de machines réalisées depuis 1885.

Cet ouvrage met hors de doute les points fondamentaux suivants. L'emploi des hautes pressions et des grandes détenteurs n'est pas nécessairement économique; il y a une limite de détente correspondant à chaque pression. Les condensations à l'admission perdent de leur importance dans les machines à expansion multiple et les expansions doivent être d'autant plus nombreuses que la température et, par suite, la pression initiales sont plus élevées. L'eau de condensation initiale au petit cylindre agit, après réévaporation, sur les pistons des cylindres d'expansion pendant toute la course et avec une détente qui lui est propre, puisque l'introduction est limitée à une partie de la course. L'appareil de détente est moins compliqué, en somme, dans les machines à expansion multiple.

A. GOULLEY.

Thurston (R. H.), *Directeur du Laboratoire de Mécanique appliquée de Sibley College. — On the permanent effects of strain in metals; on their self-registration and mutual interactions*. American Society of Civil Engineers, 1890.

Depuis une quinzaine d'années M. Thurston a poursuivi avec persévérance des études expérimentales sur les divers phénomènes qui mettent en lumière la disposition moléculaire des métaux quand ils sont soumis à des tensions dépassant leur limite d'élasticité et correspondant ainsi à des déformations permanentes. Le mémoire qu'il vient de publier dans les Transactions de la société américaine des Ingénieurs civils, expose, d'une façon très concise, de nouvelles expériences faites sur ce sujet par M. Georges W. Bissell au laboratoire de Sibley College.

Les résultats obtenus peuvent s'énoncer comme suit: Si un métal a été préalablement soumis à un effort de genre et de direction quelconques, mais suffisant pour produire une déformation permanente, sa résistance ultime à cet effort ou à tout autre est notablement accrue et ce, dans toutes les directions, quelle

que soit la ligne d'action de l'effort déformateur. Les expériences de M. Bissell ont porté uniquement sur le fer; mais, pendant que M. Thurston en préparait l'exposé, une expérience faite sur le cuivre a semblé indiquer que ce métal se comporte comme le premier à ce point de vue; de nouveaux essais vont être entrepris à ce sujet.

J. POULET.

Tissandier* (G.), *Directeur du journal La Nature. Souvenirs et récits d'un aérostier militaire de l'armée de la Loire, 1870-1871, avec une lettre autographe du Général Chanzy, et de nombreuses illustrations de V. A. Poirson*. 1 vol. in-4°, de 350 pages, Maurice Dreyfous, Paris, 1891.

Ce magnifique ouvrage n'intéresse pas seulement le patriotisme des Français. Le lecteur y trouvera l'exposition magistrale des applications de la science à la navigation aérienne. C'est à ce titre surtout que nous devons signaler ici le livre de M. Gaston Tissandier. Mais comment ne pas dire, — au risque de sortir pour une fois de notre cadre exclusivement scientifique, — la conduite héroïque de l'auteur pendant la guerre néfaste de 1870-1871, le dévouement absolu avec lequel il mit au service de la Patrie en danger son savoir et son courage? C'est à lui surtout que Paris investi dut de pouvoir communiquer avec la Province.

M. Tissandier raconte avec émotion les scènes douloureuses dont ses fonctions d'aérostier militaire l'ont rendu témoin. Le lecteur se sentira à la fois instruit et touché par ses récits, car ils ont été écrits par un homme de science, doublé d'un homme de cœur.

L. O.

Langley (S. P.). — *La température de la Lune, d'après les études faites à l'Observatoire d'Allegheny, avec la collaboration de M. F. W. Verry*. (American Journal, t. XXXVIII, p. 421, décembre 1889).

On a cru longtemps que le sol de la lune, soumis à l'action des rayons solaires, pouvait arriver à une température de plus de 100°: si la chaleur rayonnée par la lune était insensible à nos appareils ordinaires, on en concluait simplement que cette chaleur était complètement absorbée par l'atmosphère terrestre.

M. Langley a étudié au bolomètre le spectre infrarouge donné par les rayons lunaires; ce spectre présente deux maximum d'intensité, l'un correspondant à la chaleur envoyée par le soleil et réfléchi par la lune, l'autre à la chaleur absorbée par la lune et émise ensuite: l'examen de la région du spectre où se trouve ce maximum prouve que le corps rayonnant est à une température voisine de — 10°.

L'absorption tellurique constitue une difficulté très sérieuse; mais cette absorption n'est que partielle, et M. Langley l'a prouvée en observant les indications du bolomètre pendant une éclipse de lune. Au moment où la lune entre dans le cône d'ombre, l'appareil indique un très notable abaissement de température et une élévation correspondante à la fin de l'éclipse: il ressort de cette observation que, dans cet espace de quelques heures, les conditions climatiques à la surface de la lune éprouvent des modifications plus profondes que celles qui résulteraient du passage de notre zone torride aux plus grands froids de l'hiver arctique. La conclusion générale est que la température du sol de la lune éclairé par le soleil doit toujours être au-dessous de zéro.

Bernard BRUNHES.

2° Sciences physiques.

Knut Angström. — Beobachtungen über die Strahlung der Sonne. — Beiträge zur Kenntniss der Absorption der Wärmestrahlen durch die verschiedenen Bestandtheile der Atmosphäre. — (Etude sur les spectres infra-rouges de l'acide carbonique et de l'oxyde de carbone). Ann. Phys. und Chemie, XXXIX, 1890, J.-A. Barth, Leipzig.

Depuis plusieurs années, M. Knut Angström poursuit d'importantes recherches sur l'absorption des radiations calorifiques par divers corps. Citons, parmi les résultats les plus saillants de ses précédentes expériences, la démonstration de l'exactitude de la loi exponentielle d'absorption pour des corps peu diffusants (noir de fumée), et les écarts de cette loi pour les poussières qui présentent des phénomènes de réflexion irrégulière (magnésie, oxyde de zinc).

Dans les nouveaux mémoires qu'il vient de publier dans les *Annales de Wiedemann* et les recueils de l'Académie des Sciences de Stockholm, M. Angström décrit des expériences bolométriques entreprises pour déterminer la quantité de chaleur absorbée par les gaz de l'atmosphère, et pour en déduire une valeur correcte de la constante solaire (quantité de chaleur solaire en petites calories, qui, à la distance de la terre, traverse en une seconde une surface de 1 centimètre carré, normale à la direction de sa propagation).

1. Deux tubes de verre de 152/4, 1^m, fermés par des plaques de sel gemme et pourvus à l'intérieur de tubes de laiton noircis et diaphragmés, peuvent être échangés sur le parcours des radiations entre un brûleur Argand et un bolomètre. L'un des tubes reste vide, tandis que l'autre est destiné à renfermer les gaz sur lesquels on opère. Dans une recherche préliminaire, l'auteur a étudié la radiation du brûleur, et des radiations partiellement absorbées. La figure 1 se rapporte à l'énergie




Fig. 1.

décélée par le bolomètre dans les différentes parties du spectre ; les déviations à travers un prisme de sel gemme sont portées en abscisses, les intensités en ordonnées. Les longueurs d'onde en μ sont marquées sur l'axe des abscisses.

La courbe L correspond à l'énergie reçue directement, tandis que les courbes W, M, C sont obtenues après que les radiations ont traversé respectivement une cuve d'eau, et des couches de magnésie de 0^m, 1 et de 0^m, 2 d'épaisseur. On voit que cette dernière poussière laisse passer intégralement les radiations de grande longueur d'onde ; les anciennes expériences de M. Angström, d'accord avec la théorie, avaient déjà mis ce fait en évidence. En revanche, l'eau absorbe complètement les radiations peu réfringibles, à partir de $\lambda = 2\mu$ environ.

Les radiations totales L, M, et C, ont ensuite été examinées après leur passage à travers une colonne d'acide carbonique sous des pressions comprises entre 0 et 771^m, 5. Les résultats de ces expériences sont résumés dans la figure 2. La pression du gaz est portée en abscisses, la quantité d'énergie absorbée, en ordonnées ; les chiffres indiquent les fractions de la radiation totale.

On voit d'après cela que l'absorption est presque complète pour des pressions relativement basses, et n'augmente plus que très peu à partir d'une demi-atmosphère ; on peut en conclure que l'acide carbonique absorbe complètement une partie limitée du spectre, et qu'il est transparent pour le reste de la radiation ; la relation entre les ordonnées des courbes M₁, M₂, et L conduit




Fig. 2.

à admettre que cette portion du spectre est plus près du maximum des premières que de la radiation de la lampe. L'auteur va plus loin, il évalue les quantités relatives des radiations absorbées dans les trois cas, et recherche l'endroit du premier diagramme où les ordonnées des courbes sont dans le rapport trouvé ; c'est le lieu d'abscisses 1^m, 5, en $\lambda = 3,5 \mu$. Les expériences de détail ont donné, pour un tube de 0^m, 120, et une pression de 0^m, 739, la courbe C, qui présente deux maxima, à $\lambda = 2,60$ et $4,36 \mu$.

La même méthode appliquée à la vapeur d'eau pour des tensions maxima de 0^m, 010 montre que l'absorption n'est pas limitée à une bande étroite ; elle augmente lorsqu'on passe de la courbe L à la courbe M₁, et dépasse 3 %, dans le dernier cas. Si l'on remplace le tube plein de vapeur par une couche d'eau de même masse, l'absorption est près de sept fois plus forte.

Les expériences avec l'air sec montrent une absorption si faible qu'elle pourrait être attribuée à des erreurs de mesures ou à des impuretés de l'air.

La comparaison de ces résultats avec le spectre solaire de Langley montre une coïncidence frappante entre la courbe C et les grandes bandes X et Y, dont les abscisses sont $\lambda = 2,7 \mu$ et $\lambda = 4 \text{ à } 4,5 \mu$. Il paraît donc évident qu'elles sont dues à l'absorption par l'acide carbonique de l'atmosphère. Pour $\lambda = 4,2$, et une couche d'air traversée égale à 3,58 fois l'épaisseur de la couche au zénith, on ne trouve plus trace de chaleur dans le spectre solaire. On en trouve pour une épaisseur de 2,08. L'absorption étant très forte en cette région, il en résulte que, en dehors de l'atmosphère, l'intensité des radiations solaires pour $\lambda = 4 \mu$ environ doit être extrêmement forte, et que certaines radiations plus faibles n'arrivent jamais à la terre.

2. Pour déterminer la radiation solaire totale, M. Angström emploie une méthode d'enregistrement dont le principe est le suivant :

Deux plaques identiques de cuivre noirci contiennent respectivement les deux soudures d'un couple thermoélectrique. Lorsque la plaque A, exposée au soleil, possède un excès de température δ sur B, on la protège par un écran, tandis que la plaque B est mise à nu. Au bout d'un temps t , l'excès δ a changé de signe. En désignant par W la valeur en eau des plaques, par ϵ leur coefficient d'absorption, la quantité de chaleur absorbée par unité de temps est :

$$Q = \frac{2W\delta}{\epsilon t}$$

Pour appliquer cette méthode à l'enregistrement, les plaques sont remplacées par des sphères creuses communiquant entre elles par un tube de verre dans lequel un index de mercure se meut par l'effet de la dilatation en s'écartant de la boule échauffée. A un certain moment il ferme un circuit, un mouvement d'horloge-

rie est mis en marche, et les boules tournant autour d'un axe vertical changent de position; la première vient se placer derrière un écran, tandis que la boule froide est exposée au soleil. L'appareil enregistre la fréquence des inversions par la chute du poids moteur devant un cylindre tournant. La constante de l'appareil se détermine par comparaison avec les plaques.

Les observations faites au moyen de cet appareil sur la côte de Suède ont été rassemblées dans la formule

$$i = 1,56, 0,786d + 2,45, 0,134d$$

(d = épaisseur de la couche traversée) qui représente parfaitement bien les résultats. Le premier terme correspond à la faible absorption par divers gaz, et se détermine au moyen des parties de la courbe, obtenues au lever et au coucher du soleil, lorsque l'absorption par l'acide carbonique est complète. Le second terme correspond à l'absorption par ce dernier gaz. La constante solaire s'en déduit en faisant $d = 0$, d'où résulterait $i = 4$. Pouillet avait trouvé 1,8, M. Violle 2,5, M. Langley 3. M. Angström pense que la véritable constante est probablement plus grande que 4, puisque certaines régions du spectre sont complètement absorbées même au zénith. CH. EP. GUILLAUME.

Lacouture (Ch.). — Répertoire chromatique, solution raisonnée et pratique des problèmes les plus usuels dans l'étude et l'emploi des couleurs. Un vol. in-4° avec 29 tableaux en chromo. Gauthier-Villars et fils, Paris, 1890.

Cet ouvrage, magnifiquement édité, renferme un atlas qui sera précieux aux savants et aux industriels. L'auteur y a réuni tous les types usuels des couleurs, groupés en 600 gammes qui comprennent 952 teintes différentes. S'inspirant des travaux de Chevreul, il s'est efforcé d'en simplifier la notation. Les principes de classification rationnelle exposés à ce sujet semblent passibles de quelques critiques. Les définitions données des couleurs en général, des couleurs principales et des couleurs auxiliaires, des couleurs primitives et des couleurs dérivées, des tons et des nuances, de la teinte, de l'intensité chromatique, etc., sont en général arbitraires. Leur origine est tout empirique. Pour leur donner un sens rigoureux, il eût fallu, croyons-nous, les rattacher aux notions scientifiques d'amplitude, de fréquence et de forme des vibrations, qui déterminent les qualités de la lumière : son intensité, sa couleur et, en quelque sorte, son timbre. A ce point de vue il nous paraît difficile d'admettre plusieurs propositions que l'auteur nous présente comme des « théorèmes », [par exemple celle-ci : Toutes les couleurs « sont uniformément espacées sur la circonférence d'un cercle ». C'est confondre une loi physique avec un procédé de description. Reconnaissons toutefois l'intérêt pratique du procédé, qui devient utile, si, au lieu d'une vérité de la Nature, on n'y cherche qu'un système commode de repère.

L'ouvrage de M. Lacouture rendra donc service, — sinon « au savant... et à la modiste », comme il en exprime l'espoir dans une préface un peu lyrique, — du moins à beaucoup d'industries fondées sur l'emploi raisonné des couleurs. Les admirables planches qui l'accompagnent le recommandent à l'attention des spécialistes, — fabricants de nouveautés pour vêtements et pour meubles, de papiers peints, de couleurs et de pastels, teinturiers, apprêteurs de tissus et de fils. Il y trouveront la représentation typique d'une grande variété de teintes, échelonnées à la fois selon le ton et la nuance, et disposées de façon à révéler immédiatement leur dérivation, leur composition et leurs parentés harmoniques. L. O.

Mendelejeff, *Professeur de Chimie à l'Université de Saint-Petersbourg, Osnovy Chimii.* — (Les Principes de la Chimie), 3^e édit. (russe), Saint-Petersbourg, 1890.

La cinquième édition du traité de chimie de M. Mendelejeff est une réédition complétée et corrigée d'un

ouvrage qui a paru pour la première fois il y a déjà une vingtaine d'années. Parmi les nombreux traités de chimie générale, destinés à l'enseignement supérieur, celui de M. Mendelejeff occupe une place à part. Ce qui lui donne une physionomie originale, c'est l'esprit philosophique dont il est pénétré.

« Le but principal de cet ouvrage, dit l'auteur, c'est de mettre en lumière les principes philosophiques de la chimie; c'est de diriger tous ceux qui cherchent la vérité vers la source pure de la science des forces de la Nature. » Voilà comment l'auteur définit lui-même le but de son ouvrage. Il ne faut pas pourtant croire que sa « philosophie » est un exposé des généralités ou des doctrines plus ou moins hypothétiques qui se disputent le champ théorique de la science chimique.

L'auteur ne s'écarte pas du domaine des faits; mais il les expose au point de vue critique et historique, de sorte que le lecteur assiste à chaque instant au travail compliqué et souvent pénible qui a présidé à l'établissement des faits principaux de la chimie. Guidé par une main de maître, il s'assimile ainsi facilement l'esprit même de la science, développe son jugement critique, se pénètre de l'idée de l'évolution de la vérité scientifique, voit naître, pour ainsi dire, sous ses yeux l'édifice de la science et comprend mieux ses parties faibles et achevées.

Une telle exposition répond plus au but de l'enseignement supérieur, que la méthode dogmatique, qui laisse souvent l'impression fautive d'une perfection là où il y a encore tant de choses à faire. Le style de l'ouvrage de M. Mendelejeff correspond au but proposé : tout en restant sobre et clair, il a quelque chose de passionné, nous dirions même de prophétique. On voit que l'auteur aime sa science et qu'il sait communiquer ses sentiments à ses lecteurs. Cette forme du style s'explique, en partie, par le talent même de l'auteur et, en partie, par le rôle que la science joue en Russie. Depuis longtemps elle y est devenue un élément réformateur, et les savants, des luttteurs contre les ténèbres qui enveloppent encore d'un manteau épais un peuple d'un grand avenir.

Le système périodique de M. Mendelejeff joue naturellement un grand rôle dans son traité.

Il divise les corps simples en huit groupes, et chaque groupe en douze séries. Il fait ressortir toutes les analogies qui semblent donner un appui à son système et insiste sur les découvertes auxquelles il a mené des chimistes comme Roscoe, Lecocq-de-Boisbaudran, Nilson, Winckler, etc.

L'ouvrage est illustré de 12 portraits des chimistes les plus célèbres; celui de Lavoisier est à la place d'honneur. Les portraits de Lavoisier, Dalton, Berthollet, Gay-Lussac, Davy, Gehard et Graham ont été faits par Mme Mendelejeff, d'après des portraits originaux et authentiques; celui de Henry Sainte-Clair Deville, d'après une photographie communiquée par M. Troost. E. RUBANOVITCH.

Knab (Louis) *Répétiteur du Cours de métallurgie à l'Ecole centrale, ancien Directeur d'usines métallurgiques.* — *Traité de métallurgie des métaux autres que le fer : cuivre, plomb, argent, or, platine, mercure, zinc, cadmium, étain, arsenic, antimoine, bismuth, cobalt, nickel, aluminium, grand in-4° de 644 pages avec 164 figures dans le texte.* G. Steinheil, 1891.

Voici un ouvrage très complet qui, ainsi que le dit l'auteur dans sa préface, fait connaître l'histoire de chaque métal, sa fabrication, les conditions de sa production dans les divers pays, ses applications industrielles; il rendra certainement de grands services à tous ceux qu'intéresse l'industrie métallurgique et nous ne doutons pas qu'à ce titre il n'obtienne un réel et légitime succès.

S'il nous était permis de signaler une petite lacune, nous demanderions pourquoi, dans un livre daté de 1891, il n'est pas parlé, à propos du cuivre, du procédé Elmor qui paraît, en ce moment même, appelé à

jouer un rôle d'une certaine importance. Peut-être M. Knab a-t-il pensé que ce procédé avait moins d'avenir que certains intéressés affectaient de le croire? En tout cas, l'oubli, volontaire ou non, n'est pas grave et ne touche pas à la valeur d'un ouvrage que tous les métallurgistes consulteront avec fruit. J. POULET.

Guye (Ph. A.). — A propos du covolume de l'équation des fluides. — Le coefficient critique et le poids moléculaire des corps au point critique. — Ann. de chimie et de physique, Octobre 1890, (6), t. XXI, Comptes rendus, t. CX, p. 141 et 1128. — Arch. de Genève, (3), XXIII, p. 197. Bull. Soc. chim., t. III, p. 51.

M. Guye a exposé dans cette *Revue*¹ les idées qui ont conduit à établir l'équation fondamentale des fluides, sous les différentes formes qui lui ont été données par MM. Van der Waals, Sarrau et Clausius. Cette équation, donnant avec les résultats expérimentaux qu'ont fournis les belles recherches de M. Amagat, une concordance des plus remarquables, on peut dès maintenant songer à l'appliquer à des phénomènes plus complexes; en particulier, à l'étude des équilibres chimiques. C'est en travaillant dans cette voie, que M. Guye a été arrêté par la difficulté d'obtenir, pour tous les corps considérés, la température critique et la pression critique, grandeurs qui entrent dans l'équation des fluides. Par une série de déductions des plus ingénieuses, l'auteur est parvenu à rattacher ces paramètres à une grandeur plus facilement accessible aux mesures.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de cette démonstration; énonçons seulement le résultat obtenu :

Le pouvoir réfringent moléculaire est proportionnel au volume vrai d'une molécule supposée sphérique, et, par suite, est proportionnel au covolume de l'équation des fluides.

Or, on déduit de l'équation de Van der Waals, que le covolume est proportionnel au coefficient critique, c'est-à-dire au rapport de la température critique absolue à la pression critique. Donc :

Le coefficient critique est proportionnel au pouvoir réfringent moléculaire.

Il faut remarquer seulement que, d'après les hypothèses introduites dans le calcul, le pouvoir réfringent moléculaire doit être déterminé pour une radiation de longueur d'onde infinie. Si l'on opère sur des corps ne présentant pas une trop grande dispersion, on peut représenter l'indice de réfraction par la formule de Cauchy :

$$n = A + \frac{B}{\lambda} + \frac{C}{\lambda^2}$$

et adopter par suite la valeur A pour une longueur d'onde infinie.

Le mémoire de M. Guye comprend un grand nombre de vérifications de cette formule, d'après les expériences de différents observateurs. Les pouvoirs réfringents moléculaires variant dans le rapport de 1 à 8, leur rapport au coefficient critique ne varie que de 1 à 1,25. Il y a donc là une loi approchée nettement établie.

Outre la confirmation des formules de Clausius et de Maxwell, qui résulte de cette vérification d'une de leurs conséquences, les faits rappelés ci-dessus conduisent à plusieurs résultats importants. Le plus intéressant est, sans contredit, la possibilité de calculer le poids moléculaire d'un corps au point critique, en fonction du coefficient critique et de la réfraction spécifique. C'est là une acquisition des plus utiles pour la chimie. On s'habitue trop facilement, en général, à considérer le poids moléculaire d'un corps comme une constante absolue. Il est infiniment probable, au contraire, que, dans nombre de cas, le poids moléculaire d'un corps varie avec les conditions extérieures, tout comme la

densité gazeuse; et ces modifications peuvent entraîner d'autres dans les réactions chimiques auxquelles donne naissance le corps considéré. Il est donc très important pour la théorie des phénomènes chimiques, de pouvoir déterminer le poids moléculaire des corps dans des conditions très différentes, et, à ce point de vue, les résultats de M. Guye viennent fournir un complément utile à ceux obtenus par M. Raoult dans ses recherches sur les dissolutions.

Georges CHARPY.

3° Sciences naturelles.

Bigot (A.). — L'Archéen et le Cambrien dans le nord du massif Breton et leurs équivalents dans le nord du Pays de Galles. Thèse de doctorat présentée à la Faculté des Sciences de Paris. Le Maout, Cherbourg, 1890.

La thèse de M. Bigot qui comprend surtout la description détaillée des assises sédimentaires les plus anciennes du massif armoricain, a spécialement pour objet l'étude d'une question dont la solution pouvait réaliser un grand progrès. A l'époque où il entreprenait ses études, de vives discussions restaient engagées pour savoir si ces assises, qui comprennent une puissante et très uniforme série de phyllades, dites de Saint-Lô, surmontées de poudingues avec schistes rouges associés, bien connus sous le nom de conglomérats pourprés, devaient former un ensemble soudé, rattaché au Cambrien, ou s'il importait d'attribuer aux phénomènes de transgression et de discordance signalés entre ces deux assises, un caractère de généralité permettant de constituer avec les phyllades un étage à part : précambrien. Or c'est à cette dernière opinion, depuis longtemps soutenue avec une grande autorité par M. Hébert, qu'on doit se rallier. Les observations suivies et détaillées de M. Bigot permettent en effet de considérer désormais comme un fait acquis non seulement que les conglomérats cambriens, dans toute l'étendue de l'Armorique septentrionale, s'étendent en couches horizontales sur la tranche des phyllades archéennes redressées, mais que leur distribution vient attester l'existence, au moment de leur dépôt, d'une terre émergée, occupant un vaste espace dans l'est du massif Breton.

Ces données fort importantes, une fois établies avec un soin minutieux, et non sans difficulté, dans des régions où la rareté, la dispersion, parfois le manque absolu desaffleurements compliquent singulièrement la tâche d'un observateur consciencieux, M. Bigot, franchissant la Manche, s'est appliqué à montrer que, dans le Pays de Galles qui devient, de l'autre côté du détroit, l'exacte contrepartie de notre vieille terre bretonne, des faits nombreux permettent d'établir un synchronisme rigoureux entre les phyllades de Saint-Lô et les couches pébidiennes plus complexes, qui se développent entre les gneiss et les conglomérats pourprés du cambrien inférieur; de plus, une discordance tranchée introduit de même une séparation, bien marquée entre ces deux sortes de dépôts. Ainsi se vérifie et s'impose, sans contestation possible, l'indivisibilité d'un terrain Archéen, tel que l'avait déjà défini M. Hébert (*Bull. de la Soc. géol.*, 3^e sér., t. xiv, p. 713) et qui devient le premier terme de la série sédimentaire.

Si maintenant à ces résultats déjà très importants on joint ce fait que M. Bigot, complétant cette fois les observations des géologues anglais, nous a fourni cette notion fort intéressante que la présence de galets de porphyres microgranulitiques et pétrosiliceux dans les conglomérats pourprés de la Hague et des îles d'Aurigny, venait attester la présence sur notre territoire de coulées précambriennes de cette nature, coulées dont lesaffleurements sont aujourd'hui masqués sous la Manche; de plus, qu'en déterminant l'âge dévonien du granite de Flamanville, il a pu compléter les données précédemment acquises sur les diverses phases d'émis-

¹ Voyez : Ph. A. Guye : *L'équation fondamentale des fluides* dans la *Revue*, n° 12, 30 juin 1890.

sion des granites en Bretagne, on verra que ce travail, dont nous n'avons pu donner ici qu'une très courte analyse, aura largement contribué à accroître nos connaissances sur la géologie du massif armoricain.

Ch. VÉLAUX.

Flahault (Ch.) *Professeur de l'Université de Montpellier. — L'Institut botanique de Montpellier. Notice accompagnée de plans et d'une photographie. Impr. G. Firmin et Montane, Montpellier, 1890.*

Tous ceux qui ont eu l'occasion de faire des recherches de botanique au Muséum d'histoire naturelle de Paris savent quels sont les multiples inconvénients de la séparation absolue des chaires et des locaux. Pour ne citer qu'un exemple, je connais telle publication très coûteuse qui existe à la fois à la bibliothèque générale du Muséum et dans les bibliothèques spéciales de plusieurs laboratoires. Mais une telle organisation n'entraîne pas seulement des dépenses inutiles : elle sépare trop nettement les diverses branches de la botanique par une localisation étroite des moyens d'étude.

L'administration supérieure a eu l'heureuse idée de réunir sous le nom d'Institut botanique les divers services de botanique de la Faculté des Sciences, de la Faculté de Médecine et de l'Ecole de Pharmacie de Montpellier; et cette réunion n'est pas seulement nominale, car les laboratoires, les bibliothèques, les collections, en un mot tous les moyens d'étude sont venus s'ajouter et se fusionner dans l'installation nouvelle que M. Flahault nous décrit et qui s'élève aujourd'hui au milieu du Jardin botanique de la ville.

L'Institut botanique comprend trois bâtiments très rapprochés : l'un est consacré à l'enseignement; le second est occupé par les laboratoires de recherches et les cabinets d'études des professeurs; enfin le troisième est occupé par les collections qui se trouvent ainsi centralisées sous la main des travailleurs appartenant aux trois Facultés. L'aménagement des locaux ne paraît rien laisser à désirer, car l'Institut botanique a été édifié directement sur les plans dressés par les professeurs intéressés sous l'intervention des architectes officiels; résultat : les dépenses d'installation et de construction ont été réduites au minimum. M. Flahault, le principal organisateur de l'Institut botanique, a eu la modestie de taire ces détails, qui ont bien leur importance et qui lui font grand honneur.

Henri LECOMTE.

Ville (Georges) *Professeur au Muséum. — La production végétale et les engrais chimiques. Conférences agricoles faites au champ d'expériences de Vincennes. 3^e édition. Un vol. gr. in-8° avec planches et figures dans le texte, G. Masson, Paris, 1891.*

M. Georges Ville donne une troisième édition des conférences qu'il a faites à Vincennes en 1864; cette publication est intéressante et mérite qu'on s'y arrête.

M. Georges Ville a consacré sa vie scientifique à établir que les plantes assimilent l'azote libre de l'atmosphère et à montrer que l'agriculture peut tirer grand profit des matières salines, sels ammoniacaux, nitrates, phosphates, sels de potasse, qui ont reçu le nom d'engrais chimiques; la suite lui a donné raison : nous savons aujourd'hui que certaines plantes assimilent, en effet, de l'azote libre; l'agriculture utilise les engrais chimiques; par conséquent le temps a justifié les idées émises par M. Georges Ville, il y a trente ans; et cependant, son œuvre est encore contestée; il est intéressant d'en chercher la cause; la publication de la *production végétale* peut nous y aider.

La fixation de l'azote atmosphérique par les végétaux, signalée par M. Georges Ville dès le début de ses études, a été niée partout pendant de longues années; elle n'a été admise qu'après les expériences récentes de M. Hellriegel et Willarth.

C'est qu'en effet M. Georges Ville n'a pas su établir les conditions dans lesquelles les Légumineuses fixent cet azote; il n'a pas montré que cette propriété n'apparait

paraît clairement que dans cette seule famille, de telle sorte que toutes les expériences de vérification qu'on a tentées en s'adressant, comme l'avait fait M. Georges Ville lui-même, à des plantes quelconques, échouaient, et l'opinion se rangeait du côté de Boussingault qui avait essayé à bien des reprises différentes de répéter les cultures de M. G. Ville sans pouvoir en obtenir les résultats qu'il avait signalés. On en conçoit facilement la raison aujourd'hui; il est manifeste que Boussingault avait stérilisé avec grand soin ses sols, ses graines; et dans ces conditions l'azote atmosphérique, en effet, n'intervient pas. Il est probable que M. Georges Ville n'avait pas opéré avec les mêmes précautions, et que la chance a voulu que, plusieurs fois, dans ses expériences sur les lupins, les germes des microbes fixateurs d'azote qui déterminent sur les racines l'apparition des nodosités, aient pénétré dans ses appareils et y aient déterminé les effets que nous savons reproduire aujourd'hui à volonté.

M. Georges Ville croyait que l'assimilation de l'azote a lieu par les feuilles; nous savons aujourd'hui qu'elle se fait, dans les cas où elle est nettement établie, par la racine; si donc M. Georges Ville a vu cette fixation, s'il a décrit avec soin et exactitude les plantes, passant par la période de *faim d'azote*, chétives, à tige mince et grêle, montrant tout à coup une vigueur inattendue, devenant luxuriante, portant fleurs et fruits, — il n'a jamais su obtenir ce résultat à volonté et n'a même pas nettement séparé, au moins dans la publication actuelle, les plantes fixatrices d'azote, de celles qui paraissent emprunter tout leur azote aux combinaisons qu'elles rencontrent dans le sol, et l'on conçoit comment l'opinion lui a été si longtemps contraire.

Si tous les agronomes de la première moitié du siècle, Liebig, Boussingault, Kuhlmann, Lawes et Gilbert ont montré l'influence décisive qu'ont sur la croissance des végétaux les matières salines, M. Georges Ville a plus que tout autre contribué à les faire employer par les praticiens; déjà dans le volume qu'il réimprime aujourd'hui on voit des rendements considérables obtenus par les agriculteurs avisés qui avaient dès le début suivi M. Georges Ville et utilisé ses formules d'engrais.

Mais à cette époque les échecs ont été aussi très nombreux; on ignorait que les engrais chimiques, répandus à profusion sur certains sols, y exercent une influence physique fâcheuse; employés sans discernement, ils étaient bien loin de toujours réussir; aussi il y a vingt ans, n'étaient-ils pas utilisés couramment comme ils le sont aujourd'hui; on n'avait pas vu à cette époque qu'il convient de les employer concurremment avec le fumier de ferme, et que c'est seulement par l'association de ces fumures variées que la réussite est assurée.

Les cultivateurs de 1890 sont autrement actifs, instruits que ceux de 1860; pour décider ceux-ci à essayer quelque chose de nouveau, il fallait parler haut et fort; c'est à cela qu'excellait M. Georges Ville; ses conférences du champ d'expériences de Vincennes ont puissamment aidé à cette propagande; débarrassée des exagérations qui avaient suscité des polémiques violentes, cette propagande a été utile; si aujourd'hui il n'est guère de grande culture où n'entrent les nitrates, les sels ammoniacaux et les superphosphates, cela est dû sans doute aux efforts récents des agronomes tels que MM. Lawes et Gilbert, Wagner, Muntz, Grandea, Joulie et autres, mais surtout aux écrits de M. Georges Ville; il serait injuste de ne pas le reconnaître, et la publication des conférences de Vincennes est là pour le rappeler.

W. II.

Girard (Aimé) *Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et à l'Institut agronomique. — Recherches sur la culture de la Pomme de terre industrielle et fourragère. — Annales agronomiques, Tome XVI, p. 143.*

Les distilleries d'outre-Rhin font un usage presque exclusif, pour la fabrication de l'alcool, de pommes de

erre à grands rendements et riches en fécule, tandis qu'en France, leur emploi est presque nul. M. Aimé Girard a reconnu que ces différences sont dues à l'infériorité de la culture de la pomme de terre dans notre pays; ému à juste titre de la mauvaise situation ainsi créée à nos distilleries par la concurrence allemande, l'éminent professeur du Conservatoire s'est occupé de chercher un remède à cet état de choses. Le but qu'il a poursuivi est la production sur une surface donnée de la quantité maxima de fécule que la pomme de terre peut produire. Ces recherches s'appliquent à la fois aux pommes de terre de distillerie, de féculerie et à celles destinées à l'alimentation du bétail. La variété dont s'est surtout occupé M. A. Girard comme donnant les meilleurs résultats dans ce sens est la « Richter's Imperator » dont les rendements moyens en Allemagne sont de 35.000 à 40.000 kilogr. à l'hectare avec une richesse de 18 à 20 % de fécule, tandis que les meilleures récoltes des espèces cultivées dans notre pays ne dépassent généralement pas 18.000 kilogr. Le Mémoire de M. Aimé Girard contient, non seulement les résultats qu'il a constatés à Joinville-le-Pont et à Clichy-sous-Bois, mais encore ceux obtenus par une quarantaine d'agriculteurs de divers points de la France. Dans une série de chapitres fort intéressants à consulter, il passe successivement en revue l'influence des facteurs suivants : nature du terrain, labours, engrais, régularité de la plantation, date de la plantation, espacement du plant et choix, fragmentation des tubercules, date de la récolte.

La nature du terrain influe fort peu sur les rendements; d'excellentes récoltes de 30.000 à 40.000 kilogr. à l'hectare ont été obtenues sur des terres absolument différentes; la seule condition importante est d'avoir un sol bien aménagé.

M. Aimé Girard a signalé depuis longtemps l'importance des labours profonds pour la culture intensive de la pomme de terre; de nouveaux faits viennent à l'appui de cette assertion; c'est ainsi qu'une terre défoncée à 0^m, 50 a donné 44.000 kilogr. de tubercules à l'hectare tandis qu'un sol labouré à 0^m, 18 n'en a donné que 20.000 kilogr.

Contrairement aux faits constatés par M. Dehérain à Grignon, l'auteur croit que les engrais employés abondamment sur une culture de pommes de terre sont rémunérateurs et cite plusieurs exemples à l'appui.

La régularité de la plantation influe très notablement sur les résultats; quant à l'espacement du plant, à la suite d'essais nombreux effectués par M. A. Girard et par ses collaborateurs, le nombre de 330 paquets à l'are paraît être celui qui donne les meilleurs rendements.

Pour le choix du plant, l'auteur renvoie à l'étude qu'il en a faite dans ses *Recherches sur la culture de la pomme de terre* et rappelle que pour la variété « Richter's Imperator », la grosseur moyenne du plant doit être de 100 grammes environ.

Quant à la fragmentation des tubercules de plant, M. A. Girard s'élève avec force contre l'abus que font de cette pratique certains cultivateurs et ne l'admet que dans le cas où, sans se préoccuper de l'intensité de la récolte proportionnellement à la surface, on recherche la production d'une quantité de plant considérable. M. Pagnoul, à Arras, a exécuté à ce sujet des expériences comparatives qui montrent combien sont justes les observations de M. Girard : tandis qu'une parcelle ayant reçu des tubercules entiers donne 30.000 kilogr. à l'hectare, une parcelle voisine ayant reçu des tubercules coupés ne donne que 20.000 kilogr.

La meilleure époque pour la plantation est le commencement d'avril. L'auteur conseille enfin de reculer la date de la récolte jusqu'à la dernière limite; c'est ainsi que des récoltes précoces dans d'excellents terrains n'ont donné que 28.000 à 30.000 kilogr. de tubercules à l'hectare tandis que l'arrachage tardif fait à Joinville-le-Pont a fourni à M. Aimé Girard 39.000 kilogr. à l'hectare.

A. HÉBERT.

Perrier (Edmond), Professeur au Muséum. — *Traité de Zoologie* (premier fascicule, *Zoologie générale*, 411 pages, 438 fig.). Paris, Savy, 1890.

Le *Traité de zoologie* de M. E. Perrier, dont la librairie Savy vient de publier le premier fascicule, est destiné à remplacer pour les lecteurs français le *Traité classique* de Claus, dont les éditions françaises sont faites sur un texte allemand datant déjà de 1881.

En raison de l'étendue de cette entreprise, c'est seulement une première partie de l'ouvrage qui est publiée aujourd'hui, celle qui a trait aux faits généraux de la zoologie.

M. Perrier se propose de mettre en pratique la méthode des sciences physiques qui consiste à décrire les phénomènes en partant des faits élémentaires pour arriver aux plus compliqués. Il s'élève contre la méthode inverse, consistant à rapporter les animaux aux plus élevés d'entre eux, comme étant les mieux connus.

Dans le premier chapitre, sont étudiés les protoplasmes et les éléments anatomiques en général, que M. Perrier, avec Haeckel, appelle *plastides*, réservant le nom de *cellules* aux éléments nucléés, « également développés dans toutes les directions et pouvant être sphériques, polyédriques ou étoilés ». L'attention est appelée spécialement sur les phénomènes de multiplication des plastides et sur l'indépendance des éléments anatomiques associés chez les animaux, fait qui explique tant de particularités des animaux inférieurs.

Les animaux, considérés dans leur forme extérieure, indépendamment de toute idée de parenté, peuvent être construits suivant trois types de structure : les *Protozoaires*, formés d'une seule plastide ou de colonies de plastides toutes semblables; les *Phytozoaires* (les anciens Zoophytes), fondamentalement fixés, qui sont ramifiés ou rayonnés; les *Artiozoaires* (Arthropodes, Vers, Mollusques, Vertébrés), fondamentalement libres et à symétrie bilatérale. Les modifications, que des adaptations secondaires font subir aux formes appartenant à ces trois groupes, sont examinées.

Le troisième chapitre montre un travail d'analyse analogue portant sur les parties *internes* du corps, les caractères les plus généraux des divers types de chaque appareil, les relations et les différences qui existent entre ces types.

Comme suite naturelle à cet examen général de l'organisation des adultes, une étude semblable du développement embryogénique était nécessaire.

Après la description des éléments reproducteurs, des phénomènes intimes de la fécondation, des différents types de segmentation, des premières formes de l'embryon (*blastula*, *gastrula*, etc.), interviennent pour la première fois les principes de la doctrine transformiste, principes fondés pour une grande part sur les recherches embryogéniques. M. Perrier montre ce qu'on entend par embryogénie normale, condensée ou dilatée, et fait voir les modifications introduites dans le développement par l'adaptation à la vie sédentaire ou l'apparition des enveloppes de l'œuf.

Les tissus sont étudiés à un point de vue général, l'histologie devant entrer pour une grande part dans l'étude ultérieure des groupes.

Après l'étude de la forme et de la structure des organes, vient l'examen de leurs fonctions. Cette incursion obligée dans le domaine de la physiologie comprend : 1^o l'étude chimique des substances existant dans l'organisme; 2^o l'histoire de l'action des radiations calorifiques et lumineuses sur les êtres vivants, et celle de la production de chaleur et de lumière dans l'organisme; 3^o l'électricité animale; 4^o l'influx nerveux.

Le chapitre relatif à la question de l'Espèce doit attirer spécialement l'attention. Toute la théorie transformiste est naturellement exposée dans ce chapitre, où sont particulièrement développés les exemples d'adaptation. La variabilité des espèces étant établie, on peut rechercher comment un type, une fois constitué, se modifie par changement de milieu, par

perte de fonction de certains organes, par parasitisme. La sélection sexuelle, la castration parasitaire trouvent leur place naturelle dans cet exposé, qui se termine par l'étude rapide de l'instinct et de l'intelligence et des données fournies par la paléontologie.

Il était impossible d'indiquer en détail toutes les classifications qui ont été présentées pour l'ensemble du règne animal. M. Perrier expose et discute les plus célèbres. Il en propose une nouvelle fondée sur divers principes. En première ligne intervient le degré de complication organique (Protozoaires, Mésozoaires, Métazoaires). Ces derniers se divisent en cinq séries sans rapport de parenté les unes avec les autres, mais telles que les divers membres de chacune d'elles peuvent être considérés comme dérivant de formes larvaires simples et irréductibles; ce sont : les *Eponges*, les *Polypes*, les *Echinodermes*, les *Chitino-phores*, les *Nephridés*.

Une part très large sera faite dans les fascicules suivants aux figures prises dans les mémoires les plus récents : le but de l'auteur est, en effet, de donner le plus possible un aperçu de l'état actuel d'une science qui progresse avec la plus grande rapidité.

Félix BERNARD.

4° Sciences médicales.

Hallopeau (H.). — Traité élémentaire de pathologie générale. 1 vol. in-8° J.-B. Baillière et fils, Paris, 3^e édition revue et augmentée, 1890.

Voilà déjà la troisième fois en cinq années que j'ai l'occasion de dire du livre de M. Hallopeau tout le bien que j'en pense. Trois éditions en un laps de temps si court, constituent certainement le meilleur éloge qu'on pourrait faire d'un ouvrage; un pareil succès n'est réservé qu'aux œuvres véritablement bonnes; l'éloquence du fait matériel dispense de commentaires. Je n'aurais donc qu'à louer l'auteur et à le féliciter de nouveau de son succès, si je n'avais pas aussi pour mission de renseigner le lecteur sur les additions et les nouveautés qui font le mérite personnel de cette troisième édition.

Dans une analyse de la deuxième édition, présentée à une autre place, je faisais remarquer que M. Hallopeau n'adoptait les idées microbiennes et les doctrines de Pasteur qu'avec quelques réticences et en quelque sorte avec une arrière-pensée. Ce défaut a disparu entièrement de la troisième édition, et certes les chapitres consacrés à l'étude des maladies infectieuses sont aussi étendus qu'on peut le souhaiter. Les idées doctrinales y sont exposées clairement et discutées avec un sens critique parfait, aussi éloigné des enthousiasmes naïfs que du dénigrement systématique, en somme au moyen du véritable esprit scientifique. Et certes ce n'a pas dû être une mince difficulté pour l'auteur de condenser d'une façon aussi parfaite un nombre de faits si considérable.

L'histoire des lésions causées par les microzoaires a donné aussi lieu à d'amples développements soit en ce qui concerne les parasites impudiques de Laveran soit pour les organismes encore mal déterminés, infusoires, psorospermies ou autres qui vraisemblablement donnent naissance à certaines formes de cancer.

Dans les autres branches de la science clinique, M. Hallopeau n'a rien négligé pour mettre son ouvrage au courant des dernières découvertes. Les principales additions concernent surtout la neuro-pathologie, la chimie biologique et l'ophthalmologie clinique. Tous ces sujets sont traités complètement, mais avec la sobriété de développements nécessaire pour ne pas transformer l'ouvrage en un traité de pathologie ordinaire : on se sent toujours en pleine pathologie générale et le profit qu'en retire le lecteur est d'autant plus grand.

L'auteur m'en voudrait de me livrer ici à un panégyrique de son livre; je résumerai mon impression générale en disant que son ouvrage est bien fait, agréable et surtout utile à lire; on ne saurait, je pense, en faire un meilleur éloge.

D^r R. DUBIEF.

Astley Greswell (D^r). — Contribution à l'histoire de la scarlatine d'après les observations prises pendant l'épidémie de Londres (1887-1888). Oxford at the Clarendon Press, 1890.

L'auteur, après une intéressante revue historique sur les précédentes épidémies de scarlatine qui ont sévi en Angleterre, expose les traits principaux de l'épidémie de 1887-1888 relativement au nombre, à l'âge et aux autres conditions personnelles des malades observés ainsi qu'à leur hospitalisation et au traitement qu'ils ont suivi. M. Astley Greswell s'est ensuite étendu avec beaucoup de détails intéressants sur les divers symptômes de la maladie, principalement sur l'albuminurie, mais en insistant beaucoup sur les variations qui survenaient dans ces différents signes paraissant en rapport avec les vicissitudes des saisons. Ces observations ont conduit l'auteur à émettre certaines hypothèses curieuses sur les relations qui pourraient exister entre la variation des saisons et les changements survenus dans l'évolution normale de la maladie. C'est en somme une étude patiente et attentive d'une épidémie de scarlatine qui apportera une importante contribution à la connaissance de la maladie.

D^r H. DUBIEF.

Tarnier et Vignal (W.). — Recherches expérimentales sur l'action de quelques antiseptiques sur le Streptococcus et le Staphylococcus pyogenes aureus. Arch. de médecine expérimentale, 1890, n° 4, p. 469.

MM. Tarnier et Vignal ont institué 8 séries d'expériences pour étudier l'action d'un grand nombre d'antiseptiques sur le streptococcus pyogenes et le staphylococcus pyogenes aureus. Les sept premières séries sont des expériences de laboratoire dans lesquelles ils ont étudié *in vitro*, de la façon la plus complète, les différentes substances employées ou préconisées en obstétrique, pour assurer l'asepsie de la plaie utérine. Le dispositif de ces différentes expériences a été varié, de façon à se rapprocher le plus possible des données de la pratique. C'est ainsi que l'expérience classique de Koch, faite à l'aide de fils de soie imbibés d'une culture charbonneuse, puis portés dans les différents milieux antiseptiques, a été répétée, puis modifiée d'une façon très ingénieuse. Au lieu de fils de soie, MM. Tarnier et Vignal ont employé des morceaux de flanelle imbibés ou non de substances albumineuses et dans les anfractuosités desquels les microbes peuvent résister à la destruction mieux qu'à la surface d'un corps imperméable. La 8^e série porte sur la valeur pratique de quelques-uns des antiseptiques que les précédentes recherches avaient montré être les meilleurs et qui ne présentaient pas d'inconvénients. On recueillait sur un petit tampon d'ouate stérilisée des lochies dans le col de l'utérus, aussitôt après l'injection intra-utérine, qui est de règle, à la Clinique d'accouchements, immédiatement après la délivrance. Ce tampon d'ouate était enssemencé dans du bouillon. Si ce bouillon restait clair, les lochies étaient stériles.

Les conclusions d'une importance pratique extrême auxquelles sont arrivés MM. Tarnier et Vignal sont les suivantes : « Le plus puissant antiseptique à une dose faible et par conséquent très peu dangereuse est le bichlorure de mercure; viennent ensuite l'acide phénique et le sulfate de cuivre, puis le biiodure de mercure, enfin le permanganate de potasse. L'antiseptie presque parfaite ne peut s'obtenir qu'en pratiquant au moins une injection intra-utérine après la délivrance; si on se contente d'injections vaginales, l'antiseptie est aléatoire. » Ces intéressantes recherches sont la consécration expérimentale de l'excellence des pratiques antiseptiques que M. le Professeur Tarnier a inaugurées depuis longtemps en obstétrique et qui ont fait disparaître presque complètement dans les Maternités la mort par infection puerpérale.

D^r R. WURTZ.

ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 8 décembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Sylvester : Preuve que π ne peut pas être racine d'une équation algébrique à coefficients entiers. — M. Jules Cels : Sur une classe d'équations différentielles linéaires ordinaires. — M. Dautheville : Sur une transformation de mouvement. — M. Mouchez : Observations des petites planètes, faites au grand instrument méridien de l'Observatoire de Paris, du 1^{er} octobre 1889 au 28 mars 1890, par MM. Callandreaux, Barré et Boquet. — M. L. Piccart et Courty : Observations de la comète Zona faites au grand équatorial de l'Observatoire de Bordeaux. — M. Ch. André : observations de passage des satellites de Jupiter et d'occultations d'étoiles, faites au pic du Midi, pour étudier les modifications que subissent à cette altitude les phénomènes du ligament lumineux et de la visibilité apparente à travers Jupiter ou la Lune.

2^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Amagat décrit sommairement l'appareil dont il se sert pour l'étude de la compressibilité et de la dilatation du gaz dans le cas des températures élevées. Il donne les résultats pour les gaz : hydrogène, oxygène, azote et air. — M. Mascart présente un travail de M. A. de Tillo intitulé : Répartition de la pression atmosphérique sur le territoire de l'empire de Russie et sur le continent asiatique, d'après les observations depuis 1836 jusqu'à 1885. — M. H. Meslans a obtenu le fluorure d'allyle par l'action de l'iodure d'allyle sur le fluorure d'argent sec ; il étudie quelques-unes des propriétés de ce corps qui est gazeux à la température ordinaire. — M. A. Colson : Sur diverses réactions endothermiques et exothermiques des alcalis organiques. — M. Ch. Lauth en oxydant la diméthylaniline par le bioxyde de plomb a obtenu non le violet de Paris, mais la tétraméthylbenzidine, qui, sous l'action d'oxydants divers, donne une matière colorante verte, instable, qui se redécoupe facilement et même spontanément en tétraméthylbenzidine et oxygène actif. — M. Balland a constaté que les extraits de viande attaquent le plomb des boîtes de conserve, quelle que soit la proportion de ce métal dans l'alliage.

3^{re} SCIENCES NATURELLES. — M. Joannès Chatin : Contribution à l'étude du noyau chez les Spongiaires. — M. Ranvier en étudiant la membrane du sac lymphatique qui entoure l'œsophage de la grenouille, a pu faire des observations nouvelles sur les cellules endothéliales, les cellules conjonctives proprement dites, qui s'anastomosent entre elles, les clasmatoctes, les terminaisons nerveuses, qui affectent la forme d'anses fermées passant peu à peu à celle d'un bouton imperforé. — MM. Toppent et Trouessart : Sur un nouveau genre d'Acarien sauteur (*Nanorchestes amphibiis*). — M. Daubrée généralise la théorie des diatrèmes. (Voir *Comptes-rendus* du 24 novembre, n° 23 de cette Revue.) La formation des cheminées des volcans qui sont généralement disposés suivant des lignes de failles, ne s'expliquent bien que par l'action érosive du gaz, séchant des profondeurs sous forte pression ; les matières rejetées par ces diatrèmes ont ensuite donné naissance aux cônes volcaniques. Bien souvent des coulées de roches éruptives, telles que le basalte, sont superposées à un cylindre vertical de la même roche ; on doit admettre que ce cylindre représente le moulage d'un diatrème par où est montée la substance fondue. D'autres fois, des colonnes de brèches isolées par le ravinement des couches stratifiées qui les entouraient, représentent exactement le remplissage

d'une cheminée diamantifère du Cap ; telles sont les roches des environs du Puy. Le phénomène est donc général ; il résulte d'une action verticale ascendante, s'opposant ainsi aux phénomènes orogéniques ordinaires, qui sont linéaires et résultent de pressions horizontales. — M. Ch. Déperret et V. Leenhardt ont fixé l'âge des sables et argiles bigarrés du Dauphiné ; ces couches que les auteurs proposent de nommer horizon de *Merindal*, sont, au sud de la Durance, interposées entre le calcaire de Rognac (danien sup.) et le calcaire à *Bulimus Hapci* (éocène moy.) ; elles représentent donc l'éocène inférieur.

Séance du 15 décembre 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Trouvé : Sur une modification du gyroscope électrique destiné à la rectification des boussoles marines. — M. E. Levasseur : Relation générale de l'état et du mouvement de la population.

2^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — M. Gouy, qui a étudié la propagation anormale des ondes lumineuses, montre que cette notion doit être étendue aux ondes sonores. Si l'on traite la question théoriquement en partant des expressions générales des ondes sphériques isotropes, on voit que la propagation de ces ondes n'est normale que lorsque le rayon est suffisamment grand, et que très près des centres d'ébranlement, il y a une vitesse de propagation dépassant la normale de $\frac{\lambda}{4}$. Il se propose de vérifier expérimentalement ce point pour les ondes sonores. — M. A. Carnot indique un procédé pour la recherche de très petites quantités d'aluminium dans les fontes et les aciers ; l'alumine peut être précipitée intégralement à l'état de phosphate neutre, par ébullition dans une liqueur faiblement acétique, même en présence d'une grande quantité de fer qui n'est pas précipité, s'il a été réduit à l'état de sel ferreux. — M. A. de Schulten : Sur la synthèse de la kainite et de la tachydrile de Stassfurt.

3^{re} SCIENCES NATURELLES. — M. F. Vialat a constaté dans une station des Andes située à près de 4.400 mètres d'altitude que les habitants possèdent dans leur sang une proportion de globules rouges supérieure de moitié à la normale ; l'acclimatation produit très rapidement la même augmentation chez les voyageurs qui séjournent à la station. — M. E. Canu décrit le développement des Copépodes ascidicoles : les *Notadelpheides* présentent les stades *Nauplius*, *Mutanauplius* et *Cyclopoïde* ; à la fin de ce stade, ils pénètrent chez leurs hôtes et subissent la régression de la vie sédentaire. Chez les *Enterocéphales*, le développement est très abrégé ; on ne trouve même pas le stade *Mutanauplius* ; il y a des différences sexuelles considérables signalées par l'auteur dans une note précédente (*Comptes-Rendus* séance du 17 novembre). — M. Guignard indique la distribution du myronate de potasse et de la myrosine dans la graine, pour l'ensemble de la famille des Crucifères. Le ferment et le glucoside sont en général contenus dans des cellules distinctes de l'embryon, affectant les mêmes rapports que dans les tissus de l'adulte ; quelquefois le ferment est localisé exclusivement dans le tégument séminal. Il est toujours en grand excès sur le glucoside, qui manque dans quelques cas ; chez le *Lepidium sativum*, il est remplacé par un autre glucoside dont le dédoublement donne naissance, au lieu du sulfocyanate d'allyle, au nitrile de l'acide α -toluïque. — M. L. Mangin, étudiant la structure de la membrane cellulaire des *Peronospora* a reconnu que les organes

contenus dans les tissus de l'hôte ont une membrane formée de cellulose et de callose, tandis que celle des organes aériens est formée de cellulose pure. — **M. Prillieux** rappelle que, dès 1879, il avait, dans une note communiquée à la Société botanique signalé à propos des tubercules radiculaires des Légumineuses, diverses particularités qui ont été confirmées depuis. — **M. Venukoff** annonce que les chiffres obtenus dans les sondages effectués dans la mer Noire en 1890 par une mission russe permettent de lui attribuer la forme générale d'un bassin à fond plat, avec une profondeur maxima de 2,200 mètres correspondant à peu près au centre géométrique.

M. Mallard est élu membre de la section de Minéralogie.

Séance du 22 décembre 1890

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — **M. G. Humbert** : Sur les normales aux quadratiques. — **M. Félix Lucas** : Résolution électro-magnétique des équations. — **M. A. Cayley** : Sur les surfaces minima. — **P. F. Denza** : Période météorique du mois de novembre 1890.

2^{de} SCIENCES PHYSIQUES. — **M. A. Cornu** a étudié les photographies du spectre solaire obtenu par **M. O. Simony** au pic de Ténériffe (3700 m) au point de vue de la portion ultra-violet; comme les expériences antérieures de **M. Cornu** le lui faisaient prévoir, la limite ne recule que très lentement à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère terrestre; néanmoins, ces clichés donnent nettement la région comprise entre *t* et *U*, et permettent de dépasser un peu *U*; pour réparer ces photographies, **M. Cornu** s'est servi des raies de fer volatilisé dans l'arc électrique. — **M. F. L. Perrot** : sur la réfraction et la dispersion dans les cristaux des sulfates doubles du zinc avec K, Rb, Cs, Tl et Ac H³. — **M. Berthelot** montre d'après divers textes que les orfèvres du moyen âge calculaient le titre des alliages d'or et d'argent d'après la densité déterminée par la balance hydrostatique; cette méthode remonte probablement à l'antiquité grecque; la notion précise de densité n'existait pas, on avait pourtant fixé les poids des divers métaux et alliages qui prenaient la place d'un poids donné de cire; ces densités par rapport à la cire sont assez exactes. — **M. A. Joly** a étudié une nouvelle série des combinaisons ammoniacales du ruthénium dérivées du chlorure nitrosé. — **M. A. Besson** rectifie la formule de la combinaison du gaz ammoniac avec le trichlorure de phosphore en $\text{PCl}_3 \cdot 5\text{AzH}_3$; il a formé et déterminé les combinaisons $\text{PCl}_3 \cdot 8\text{AzH}_3$ et $\text{P. Br}_3 \cdot 9 \text{AzH}_3$. — **M. M. Nicolas** indique que pour la préparation de l'acide phosphorique, il est avantageux d'employer l'acide fluorhydrique ou l'acide sulfurique pour l'attaque des phosphates de chaux. — **M. Ch. Lauth** a reconnu que la plupart des amines aromatiques donnent par l'action du bioxyde de plomb une réaction colorée analogue à celle qu'il a signalée pour la diméthylaniline; ces réactions peuvent servir à caractériser de très petites quantités de ces amines. — **M. R. Brullé** : une solution alcoolique de nitrate d'argent donne avec les différentes huiles une coloration caractéristique pour chacune d'elles. — **D. Pedro Augusto de Saxe-Cobourg-Gotha** signale la présence du nickel à l'état de sulfure (millérite) dans un minéral du Brésil. — **M. F. Gonnard** a reconnu dans la basalte des environs de Montbrison une nouvelle zéolithe pour laquelle il propose le nom d'*Offretite*. — **M. A. Lacroix** : sur les enclaves du trachyte de Menet (Cantal), leurs modifications et leur origine. — **M. G. Jeannel** décrit un tornado, qui a eu lieu le 18 août 1890 en Bretagne et qui est remarquable surtout par l'intensité des phénomènes électriques.

3^{de} SCIENCES NATURELLES. — **MM. Straus, Chambon et Ménard** : recherches expérimentales sur la vaccine chez le veau. — **M. Chauveau** fait remarquer qu'au point de vue de la détermination de la nature du virus, ces recherches laissent la question au point où il l'avait laissée en 1867; on sait simplement que l'agent infec-

tieux est de nature corpusculaire. — **M. L. Guinard** : sur le chat, la morphine n'a nullement une action stupéfiante, mais bien une action excitante. — **M. Milne-Edwards** rapporte avoir observé cette action sur les grands félins du Muséum. — **M. N. Wedensky** : De l'action excitatrice et inhibitrice du nerf en dessèchement sur le muscle. — **M. J. Bonnier** ramène les deux formes mâles constatées chez divers crustacés amphipodes, à deux stades successifs du développement. — **M. A. Malaquin** a étudié la formation des stolons chez les *autolytes* (annelides). — **M. J. Perez**, en comparant la faune apidologique du Sud-Ouest de la France avec celle des régions voisines, conclut que ce sont surtout les conditions accidentelles qui déterminent la localisation des diverses espèces d'Hyménoptères mellifères. — **M. A. Chatin** étudie les différentes espèces des truffes comestibles de la France. — **M. A. Romieux** : Relations entre la déformation actuelle de la croûte terrestre et les densités moyennes des terres et des mers. — **M. G. Rolland** présente un essai de carte géologique du Sahara. — **MM. A. Delebecq et L. Legay** ont déterminé par un grand nombre de sondages la topographie du fond du lac d'Annecy. — **M. E. Durégné** : Sur la distinction de deux âges dans la formation des dunes de Gascogne.

L. LAPICQUE.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 9 décembre 1890.

M. Moissan a toujours trouvé dans les échantillons d'eau de Seltz qu'il a analysés des quantités de plomb variant de 0,0009 à 0,0028, qu'il attribue au mauvais étamage des appareils et à la qualité de l'alliage des têtes de syphon qui est trop chargé en plomb. — **M. Motais** (d'Angers) a constaté que les grands fauves qui naissent dans les ménageries ou y vivent après avoir été capturés peu après leur naissance sont myopes en raison de la continuité d'une vision rapprochée, conséquence de la loi générale d'adaptation des organes à leurs fonctions habituelles. — **M. Boisseau du Rocher** présente une note sur un nouveau procédé d'électrisation interne de l'estomac qui lui a donné de bons résultats dans le traitement de la dilatation de cet organe. — **M. Roussel** au sujet de la dépopulation de la France compte beaucoup sur un mouvement de réaction morale, et sur les progrès de l'éducation. La loi de 1874, qui porte son nom, a donné là où elle est appliquée d'excellents résultats par la protection de l'enfance. Les dépenses nécessitées par l'exécution devraient être obligatoires. — **M. Lagneau** ne croit pas que notre infécondité tienne à notre race comme l'a dit **M. Hardy**; contrairement à l'opinion de **M. Brouardel**, il pense que le gouvernement pourrait prendre des mesures efficaces. — **M. Dieulafoy** est élu membre titulaire dans la section de pathologie médicale.

D^r Ed. DE LAVARENNE.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 13 décembre 1890

M. A. Pilliet a étudié la structure du foie des Séla-ciens, les cordons de cellules hépatiques sont plus longs que chez les mammifères; ils sont flexueux et entourés d'une trame conjonctive épaisse; les cellules subissent progressivement la dégénérescence graisseuse. — **M. N. Gamaleia** a constaté que l'organisme du lapin détruit les toxines secrétées par le vibron de Metchnikoff; injectées dans le sang à l'état de cultures stérilisées, ces toxines ne se retrouvent pas dans les urines; la pulpe splénique, fraîche, ou tuée par une chaleur de 60° les détruit; le sérum jouit à un degré moindre de cette propriété. — **MM. J. Héricourt et Ch. Richet** étudient la toxicité des différents tissus des animaux; ils ont déjà déterminé la toxicité du sang; ils viennent de constater que l'extrait alcoolique, soit du sang soit des autres tissus, n'est pas toxique. — **A**

propos de cette communication M. Charria, communique le résultat d'expériences non encore terminées sur la toxicité du sang urémique; cette toxicité ne réside pas dans les matières solubles dans l'alcool, mais dans celles que l'alcool coagule et qui ne sont pas dialysables. — M. Mathias Duval a vu l'épithélium des cornes utérines, chez les souris, se régénérer après le part aux dépens des cellules conjonctives sous-jacentes; le fait n'est nullement paradoxal, si l'on considère que l'épithélium de l'utérus est d'origine mésodermique. — MM. Mairet et Bosc ont repris la question de la toxicité de l'urine; ils ont constaté à peu près les mêmes faits que M. Bouchard, mais avec des doses plus fortes, parce qu'ils ont fait leurs injections plus lentement. — MM. Gilles de la Tourette et Cathelineau contestent que les recherches de MM. Voisin et Horant sur la composition des urines dans l'hygiène infirmité les leurs; en particulier, ils retrouvent dans ces recherches l'inversion de la formule des phosphates. — M. Laborde, a vérifié que les sels de strontiane ne sont pas toxiques et sont très diurétiques; il semble que la strontiane préserve de la putréfaction les tissus des animaux qui en ont absorbé des quantités considérables. — M. Montani: Des lésions vasculaires dans le carcinome et des rapports des alvéoles cancéreux avec les lymphatiques.

Séance du 20 décembre 1890.

M. Brown-Séquard: il résulte de diverses expériences que le liquide testiculaire ingéré par la bouche est dépourvu de toute activité: l'action de cette substance dans la phthisie pulmonaire doit s'expliquer par une dynamogénie générale et nullement par un pouvoir spécifique. — MM. Laborde et Meillière ont retiré du curare une substance cristallisée qui jouit des propriétés physiologiques caractéristiques du curare; c'est un alcaloïde; cette curarine est accompagnée de deux alcaloïdes très voisins, mais physiologiquement inactifs, qu'on ne peut séparer par la dialyse, la curarine traversant plus vite les membranes. — M. Straus a fait avec MM. Chambon et Ménard une longue série d'expériences sur le virus du cow-pox; en aucun cas, ni par aucun procédé, ils n'ont pu déceler de microbes. Le sujet a constamment été le veau. Le vaccin inoculé sur la cornée donne lieu à une tache laiteuse qui dure une quinzaine de jours; l'immunité n'est acquise qu'après 20 jours; elle survient au contraire rapidement à la suite de l'inoculation dans la chambre antérieure de l'œil. L'injection sous-cutanée du virus confère une immunité rapide, comme l'avait vu M. Chauveau. Entre les mains de cet auteur, le vaccin injecté directement dans le sang, qui donnait sûrement ainsi l'immunité au cheval, avec ou sans éruption, n'avait jamais produit d'effet chez la vache. Les veaux traités ainsi par M. Straus ont été vaccinés. Le sang d'un veau en pleine éruption vaccinale, transfusé à un veau sain, peut lui conférer l'immunité à condition que la quantité de sang transfusée soit considérable (plusieurs kilogrammes); le sang d'un veau jouissant de l'immunité, mais guéri de son vaccin, ne peut transmettre l'immunité à un autre, quelle que soit la quantité transfusée. Enfin, le vaccin filtré, injecté sous la peau à la dose de plusieurs centimètres cubes, reste absolument sans effets. — M. A. Treille: technique de l'examen du sang dans l'impaludisme, objections à la théorie des hématozoaires. — MM. Bertin et Pic communiquent des expériences commencées par eux il y a longtemps sur la transfusion du sang de chèvre comme moyen de donner aux lapins l'immunité contre la tuberculose; les résultats ayant été positifs, ils ont dans un cas injecté du sang de chèvre dans le tissu cellulaire sous-cutané d'un phthisique, et obtenu une amélioration. L'immunité naturelle de la chèvre contre la tuberculose la recommande comme sujet vaccinifère. — M. Suarez Mendoza dépose un travail dans lequel il a rassemblé un très grand nombre de cas d'audition colorée.

L. LAPICQUE.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 19 décembre 1890.

M. d'Arsonval regrette de n'avoir pu assister à la dernière séance: il aurait fait immédiatement remarquer qu'il se sert, depuis 1883, pour produire l'oxygène nécessaire à ses expériences sur la respiration, d'un voltamètre en tôle tout à fait semblable à celui qu'a décrit M. le commandant Renard. Si M. d'Arsonval n'a pas communiqué son procédé à la Société, c'est qu'il apprît, quelque temps après l'avoir imaginé, qu'il avait lui-même été devancé par M. Latchinoff. — M. Cailletet indique le procédé qu'il emploie pour souder aux garnitures métalliques les tubes de verre des appareils destinés à supporter de fortes pressions. Sur le verre chauffé à 50°, il dépose avec un pinceau une couche d'une solution de chlorure de platine bien neutre dans l'huile de camomille; en chauffant ensuite au rouge sombre, on obtient sur le verre un dépôt très adhérent de platine que l'on peut ensuite recouvrir de cuivre par voie électrolytique. On a alors affaire à un véritable tube de cuivre que l'on peut souder à la manière ordinaire. La soudure ainsi obtenue est d'une solidité remarquable: elle résiste aisément à des pressions de 400 atmosphères. — M. With-Schmidt présente un chronomètre qui donne le millième de seconde: une aiguille marque le $\frac{1}{5}$ de seconde, un autre tourne en $\frac{1}{5}$ de seconde sur un cadran spécial divisé en 200 parties. Le balancier de cet appareil décrit une oscillation circulaire. M. Caspari fait remarquer que ce dispositif est sujet à des causes d'erreurs que ne comporte pas l'emploi d'un balancier pendulaire et l'on ne peut songer à mesurer un intervalle de temps un peu considérable, au $\frac{1}{1000}$ de seconde, avec l'appareil de M. Schmidt, qui cependant, rendra certainement de grands services dans la mesure des courtes durées. — M. Dufet explique comment il est arrivé, à l'aide de son microscope polarisant, à mesurer les constantes optiques d'un cristal trichlinique: il a obtenu la position des axes avec une précision au moins dix fois plus grande que les précédents expérimentateurs, à 2 ou 3 minutes près. En particulier, il a étudié le bichromate de potasse dont il a reconnu la transparence absolue pour tout le spectre jusqu'à une raie déterminée, à partir de laquelle le cristal est absolument opaque. — M. Bouasse présente un appareil de M. Mascart destiné à mesurer, sur un même bloc de verre, les constantes élastiques de ce corps et les constantes de la double refraction qu'il acquiert sous l'influence d'une compression.

Lucien POINCARÉ.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 12 décembre 1890.

MM. A. Pictet et Ankersmit ont obtenu la phénanthridine $C^{10}H^8 - CH$ dans l'action de la chaleur sur la $C^8H^8 - Az$ benzylidène-aniline. Ils ont pu en réaliser la synthèse par la réduction de l'acide orthonitrophénylbenzoïque. — M. Ch. Lauth a fait réagir l'oxyde de plomb sur une solution acétique des amines aromatiques. On obtient ainsi des réactions colorées qui permettent de les caractériser. Avec la diméthylaniline, on obtient la tétraméthylbenzidine. — M. Colson expose diverses considérations sur les lois de Berthollet. — M. Linbarger a obtenu un hydruure de phénylanthrène dans l'action du chloroforme sur le triphénylméthane. — M. Tissier décrit divers butyl et isopropylbenzines obtenues par l'action des chlorures correspondants sur la benzine. — M. Lebel continue ses travaux sur le pouvoir rotatoire des chlorures ammoniques substitués. Il cite des expériences relatives à 3 de ces corps renfermant deux radicaux égaux et indécomposables par les moisissures.

M. HANRIOT.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 11 décembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. W. D. Niven : Sur les harmoniques ellipsoïdaux. — M. R. A. Sambson : Sur les fonctions de Stokes.

2^{es} SCIENCES PHYSIQUES. — M. W. Brennand communique ses observations photométriques sur le soleil et le ciel. Il a essayé de déterminer pour les diverses hauteurs du soleil l'action exercée par lui sur du papier sensibilisé exposé sous des angles droits aux rayons solaires; il a essayé aussi de déterminer les lois de distribution du pouvoir actinique dans le ciel. Il a constaté que l'action chimique du soleil est la même à toutes les heures du jour et dans toutes les saisons de l'année; il a obtenu les mêmes résultats en Angleterre qu'à Dacca, Bengale Oriental. Des observations faites avec un instrument construit spécialement à cet effet montrent qu'il y a dans le ciel un point d'intensité minima à 90° du soleil dans le plan de symétrie. (Un plan vertical passant par le soleil partage toujours le ciel visible en deux portions exactement semblables. L'auteur appelle ce plan plan de symétrie.) On a pu aussi établir que si a est la hauteur du soleil et que $i_x = 0,12$, l'intensité lumineuse du ciel à un point α du soleil sera donnée par la formule $i_x \cos \alpha$. La valeur $i_x \cos \alpha$ donne très exactement l'intensité lumineuse de tout point de tout grand cercle dont la distance au soleil est de 0° mesurée sur ce cercle. Pour toutes les hauteurs du soleil, l'action chimique du ciel est minima à tous les points d'un grand cercle dont le plan est à angle droit avec la ligne qui joint son centre à celui du soleil. — M. P. U. Pickering, a déterminé la chaleur spécifique et la chaleur de fusion de quelques substances pour éprouver l'exactitude du zéro absolu de Person. Person a montré que la chaleur de fusion doit diminuer à mesure que la température s'abaisse, l'abaissement par degré étant égal à la différence entre les chaleurs spécifiques du corps liquide et du corps solide, et que par conséquent il doit y avoir une certaine température à laquelle la chaleur de fusion est nulle (*Ann. chim. phys.* III vol. 21, p. 315, 1847.) Cette température est

donnée par la formule $t = \frac{l}{C-c}$ dans laquelle t est le point de fusion de la substance, l sa chaleur de fusion à t , et C et c sa chaleur spécifique à l'état liquide et à l'état solide. A cette température un liquide ne pourrait geler, puisqu'il n'y aurait pas de différence entre lui et le solide, et Person conclut qu'il n'y aurait pas en lui de chaleur et que cette température serait le zéro absolu. Les déterminations ont porté sur diverses substances, et montré que cette température serait la même pour tous les corps, et qu'elle serait probablement de -160° C. L'auteur appelle cette valeur, température de non cristallisation. Il a étudié à ce point de vue l'acide sulfurique, l'acide sulfurique monohydraté, le nitrate de calcium tétrahydraté, la benzine et la naphthaline. La table suivante indique les valeurs de $t = \frac{l}{C-c}$ déterminées par plusieurs séries d'observations :

Acide sulfurique monohydraté	$-177^\circ \pm 2$
Naphthaline	$-214^\circ \pm 50$
Nitrate de calcium tétrahydraté	$-234^\circ \pm 9$
Acide sulfurique	$-369^\circ \pm 47$

Dans le cas de la benzine, la chaleur spécifique est plus grande à l'état solide qu'à l'état liquide; aussi $C - c$ est-il une quantité négative. Il semble donc que l'idée de Person que la température de non cristallisation est de -160° pour toutes les substances ne se vérifie pas. — M. et M^{me} W. Huggins, communiquent leurs recherches sur les étoiles à raies brillantes de Wolf et Hayet. Ils ont observé les spectres des trois étoiles, B. D. + 36°, n° 4001, B. D. + 33°, n° 4013 et

B. D. + 36°, n° 3036 dans lesquels MM. Wolf et Hayet ont découvert des raies brillantes au milieu d'un spectre continu (*Comptes-rendus*, vol. 63, p. 292), et celui d'une étoile découverte par le Dr Copeland en 1884. D. M. + 37°, 3821 dont le spectre est semblable à celui des étoiles Wolf-Hayet. (*Month. Not. de la Roy. Astr. Soc.* vol. 45, p. 91). Ils ont constaté que pour l'étoile 4001, la bande brillante de la partie bleue du spectre va de λ 463,5 à λ 471,5; la partie la plus brillante de la bande va de λ 468 à λ 469 et l'éclat diminue presque soudainement à partir de cette longueur d'onde. Pour le n° 4013, la bande se compose de deux parties, l'une très brillante qui va de λ 464 à λ 466, et dont le maximum d'éclat est environ à λ 464, l'autre très pâle de λ 468,5 à λ 470,5. Cette bande d'éclat faible a son maximum d'intensité à son extrémité la plus réfrangible où elle se termine brusquement. L'étoile n° 3966 a son maximum d'éclat entre λ 464 et λ 465. La bande secondaire qui va de λ 468,5 à λ 470,5 est plus faible encore d'éclat que celle du n° 4013. La bande bleue brillante du spectre de l'étoile découverte par le Dr Copeland commence environ à λ 467 et va à peu près jusqu'à λ 470,5. Elle ne semble pas s'étendre vers le rouge tout à fait aussi loin que la bande du n° 4001. Il y a aussi une faible bande brillante de λ 464 environ à λ 467. En examinant à nouveau le spectre du n° 4001, on voit qu'un faible éclat se montre à la même place que pour l'étoile précédente, c'est-à-dire dans la partie la plus réfrangible de la bande bleue des étoiles n° 4013 et n° 3956.

RICHARD A. GRÉGORY.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 28 novembre 1890

MM. le Dr Gladstone et W. Hibbert : Note complémentaire sur les piles secondaires. Après avoir rappelé les points controversés relativement aux réactions qui se produisent pendant la charge et la décharge des accumulateurs, les auteurs font connaître les résultats de l'examen qu'ils ont fait de la substance rouge formée par l'action de l'acide sulfurique dilué sur le minium; le Dr Frankland pense que cette substance est un composé répondant à la formule $Pb^3S^2O^{10}$. L'analyse brute montre que ce corps renferme 72 % de plomb. Une partie de la substance est traitée par une solution d'acétate d'ammonium à 3 %, qui dissout le sulfate normal qu'elle peut contenir; il reste alors un résidu plus foncé que la substance primitive et contenant 82 % de plomb; PbO^2 contient 86,6 % de plomb. La solution présente un rapport entre la quantité de Pb et celle de SO^1 qu'elle contient variant entre 2 et 2,15; $PbSO^4$ pur répond à un rapport 2,16, et le composé du Dr Frankland à un rapport 3,23. Les auteurs concluent que la portion dissoute n'était pas un sulfate basique, et que, vraisemblablement, la substance primitive n'était pas un composé chimique défini. Ils ont ensuite fait des études comparatives sur l'action de l'acide sulfurique dilué sur du plomb spongieux quand l'un et l'autre sont purs, ou contiennent une petite quantité de sulfate de soude. L'acide pur produit 82 % de sulfate de plomb et 18 % de plomb métallique; l'acide mêlé de sulfate de soude donne 82 % de sulfate de plomb et 11 % de plomb; ainsi, quoique l'action de l'acide sur le plomb soit tout d'abord ralentie par la présence du sulfate de soude, le résultat final est meilleur. — Cette communication donne lieu à une discussion à laquelle prennent part MM. Robertson, Swinburne, S. Thompson, Hibbert et le président M. Ayrton; il en résulte que les conclusions des auteurs ne prouvent pas l'impossibilité de la formation dans l'accumulateur d'un sulfate basique; diverses expériences semblent au contraire rendre probable cette formation; n'est-il pas d'ailleurs possible que l'acétate d'ammonium décompose le sous-sel $Pb^3S^2O^{10}$? Pour trancher la question, il importerait de produire l'action de l'acétate d'ammonium, d'une part sur le produit recueilli

dans l'accumulateur, d'autre part sur un mélange $\text{PbO}_2 + 2\text{PbSO}_4$, dans le sein d'un calorimètre, et de comparer les quantités de chaleur mises en jeu dans les deux actions. — **M. S. P. Thompson** : *Expériences relatives à la théorie du magnétisme d'Ewing*¹. En prenant un grand nombre de petites boussoles placées sur le plan de verre d'une lanterne de projection; puis disposant un fort aimant de façon à neutraliser l'action du champ terrestre, et faisant agir sur les aiguilles et dans le plan qui les contient une force magnétisante produite par une bobine convenablement placée, on réalise les conditions théoriques conçues par Ewing, et l'on peut projeter devant tout un auditoire les phénomènes divers qu'il a décrit. M. Thompson tire des expériences qu'il a ainsi effectuées des conséquences relativement 1° aux groupements moléculaires dans les aimants naturels cristallisés ou amorphes, et 2° à ce fait que les derniers présentent un magnétisme rémanent, tandis que les premiers n'en présentent jamais. — **M. Swinburne** fait remarquer que, d'après la théorie d'Ewing, la susceptibilité magnétique du fer aux hautes températures doit être considérée comme négative. — Le président observe que M. Lodge et lui-même avaient déjà envisagé cette idée dans ses rapports avec la théorie des dynamos. — **M. Tomlinson** dit qu'il a recherché expérimentalement si le nickel a une susceptibilité magnétique négative au delà de son point critique; mais, quoique son appareil fût particulièrement sensible, il n'a pu rien observer. — **M. Thomas H. Blakesley** : *Solution d'un problème géométrique de magnétisme*. Etant donnés les deux pôles d'un aimant let une ligne droite perpendiculaire à la ligne des pôles, on se propose de déterminer le point de la ligne où cette ligne est parallèle au champ. Si l'on trouve ce point expérimentalement, on pourra déterminer la distance entre les deux pôles d'un aimant. L'auteur montre que, si l'on appelle m et n les pôles, P le point cherché et O l'intersection de la droite donnée avec l'axe mn , on a la relation :

$$\frac{m}{(d^2 + m^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{n}{(d^2 + n^2)^{\frac{3}{2}}}$$

où $m = om$, $n = on$ et $d = op$; on résoudra cette équation au moyen de la trigonométrie; on pourra aussi exprimer aisément la distance $2o$ des pôles m et n en fonction de d , et par suite connaître cette distance, si l'on a déterminé expérimentalement d .

Séance du 12 décembre 1890.

La variété cristalline de sélénium présente un grand intérêt pour les physiciens à cause de la propriété qu'elle possède d'avoir une résistance qui diminue quand on l'expose à la lumière. **M. Shelford-Bidwell** montre que l'on peut construire des piles fondées sur les propriétés électriques de ce corps. Deux fils de cuivre sont enroulés autour de deux feuilles de mica et l'espace qui sépare les deux feuilles est pleine de sélénium. Des piles ainsi constituées, construites en 1880 et 1881, sont restées très sensibles à l'action de la lumière jusqu'en 1882, mais depuis lors elles n'ont cessé de diminuer en sensibilité. L'auteur attribue ce fait à la formation du sélénure de cuivre, il faut une faible proportion de ce corps pour que l'appareil marche mais il ne faut pas que cette proportion devienne par trop considérable. Il se forme aussi une substance blanche semblable au chlorure de calcium et qui est sans doute de l'oxyde de sélénium. Pour obtenir avec la pile des effets plus considérables, il suffit de se servir d'un relai. On constate que les rayons les plus actifs sont les rouges et les jaunes. — **M. Minchin** a récemment construit des piles donnant une force électro-motrice très sensible, de 0,25 par exemple, quand on les expose à la lumière, et construite, très

aisément avec d'autres substances que le sélénium. Ces piles gardent leur force électro-motrice en circuit ouvert, mais se conservent mal en circuit fermé. — **M. S. P. Thompson** attire l'attention sur l'usage que l'on pourrait faire des expériences de M. Shelford pour la vision à distance. — **M. Forbes** dit que l'on obtient des effets analogues avec le sulfure d'argent. — **M. J. Swinburne** fait une communication sur les condensateurs pour courants alternatifs. On suppose généralement qu'il n'y a pas de difficulté à fabriquer des condensateurs pour les courants alternatifs à hautes tensions. Mais on rencontre au contraire, dans leur construction, de grandes difficultés d'isolement, le diélectrique doit être très mince pour que le condensateur n'ait pas de dimensions trop exagérées. Pour de petits condensateurs, on arrive à maintenir des différences de potentiel de 8.000 volts avec des épaisseurs de 0^m 2; mais ce résultat ne saurait être atteint avec de grandes pièces. Une autre difficulté résulte de l'absorption électrique dans le diélectrique. On constate que le diélectrique des condensateurs supportant des tensions considérables s'échauffe considérablement, ainsi, même du papier que l'on a fait bouillir dans l'ozokérite devient rapidement très chaud. On peut attribuer cet échauffement à une conductibilité par des particules conduisant métalliquement noyées, dans l'isolant, ou à une décharge disruptive, on a une conductibilité électrolytique du diélectrique. De ce chef, la perte électrique dans un câble peut être considérable. Dans les expériences faites à Deptford, on a constaté des pertes énormes. — **Sir W. Thomson** estime que le calcul fait par M. Swinburne relativement à la perte d'énergie dans les câbles de Deptford, l'a conduit à une valeur exagérée. Il lui a semblé, d'autre part, singulier que le verre pût laisser, passer un courant suffisant pour l'échauffer, il se demande si ce courant ne serait pas dû aux effluves qui se produisent entre le verre et les armatures. L'absorption dans le verre même est faible. Il y a plusieurs années déjà il a fait quelques expériences sur des bouteilles de Leyde pleines d'acide sulfurique, il a constaté que ces bouteilles sont complètement déchargées par un contact, dont la durée, d'après le beau calcul fait par M. Hertz en 1882 est inférieur à 0,0004 seconde. Des bouteilles faites avec des feuilles d'étain manifestent au contraire une absorption considérable due au manque de contact entre les armatures et le verre. — Une discussion s'engage entre MM. Swinburne, Forbes, S. Thompson, Blakesley et Kapp sur des phénomènes produits dans le câble établi entre Deptford et Londres avec une distribution par transformateurs.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 4 décembre 1890.

M. Norman Collie : *Action de la chaleur sur le β-amido-crotonate d'éthyle*. — **MM. Sudborough et Miller** : *Action de la chaleur sur le chlorure de nitrosyle*. L'étude des densités de vapeur à différentes températures montre que le chlorure de nitrosyle ne commence à se dissocier qu'à partir de 700° environ. — **M. Brauner** : *Dosage volumétrique du tellure*. L'auteur propose deux procédés de dosage volumétrique et recommande surtout le suivant basé sur la réduction des solutions de bioxyde de tellure par le chlorure stanneux. Le composé de tellure additionné d'acide chlorhydrique est mis en digestion avec un excès de chlorure stanneux. On détermine ensuite l'excès de ce dernier corps au moyen de l'iodé et de l'hyposulfite de soude.

SOCIÉTÉ ROYALE D'ÉDIMBOURG

Séance du 15 décembre 1890.

1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — Le professeur Tait communique un mémoire du D^r E. Sang sur une extension de la méthode de Brouncker à la comparaison de diverses grandeurs; la méthode employée est essentiellement une application des fractions continues. — Le professeur Tait communique ensuite un

¹ Voici ci-dessous le compte rendu de la séance du 15 décembre de la Société royale d'Édimbourg, p. 794.

mémoire de M. A. M'Aulay sur une extension proposée des quaternions et la différenciation de leurs fonctions. L'auteur discute dans ce mémoire une modification proposée de la notation des quaternions qui conduit directement à des extensions remarquables dans les théories mathématiques de l'élasticité et de l'électricité. Son but, en communiquant ce mémoire à la Société, est de faire adopter par les savants cette notation modifiée qui est entièrement opposée aux conventions ordinaires.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — Le professeur Ewing expose un mode de représentation d'une théorie moléculaire du magnétisme. On considère un certain nombre de petits aimants montés sur pivots et qui sont rangés en files parallèles. Ces aimants sont placés à l'intérieur d'une bobine rectangulaire de fils de cuivre, dans lesquels on peut faire circuler un courant électrique. Tant que le courant ne passe pas dans les fils, chacun des aimants prend respectivement une position d'équilibre stable sous l'influence des actions mutuelles qui s'exercent entre eux; les uns sont dirigés d'une certaine façon, les autres d'une manière différente. On peut voir dans cet état la représentation de l'état où se trouve un barreau d'acier non aimanté. Vient-on à lancer un faible courant dans la bobine, chaque aimant est légèrement dévié de sa position initiale et il revient d'ailleurs à cette position si l'on interrompt le courant. C'est l'image de la première phase dans le processus de l'aimantation. Un courant plus fort produit ensuite l'instabilité de ceux des aimants qui étaient primitivement dans l'état le moins stable, de sorte que les aimants composant ce groupe oscillent autour d'une nouvelle position stable. Au fur et à mesure qu'augmente l'intensité du courant, ces groupes deviennent plus nombreux, jusqu'à ce que tous les aimants aient pris une nouvelle position d'équilibre sous l'influence de leurs actions mutuelles et de la force directrice intérieure. C'est l'image de la seconde phase de l'aimantation, où le rapport de l'aimantation à la force magnétisante augmente très rapidement. La troisième phase, dans laquelle ce rapport est pratiquement constant s'explique par ce fait qu'une force infinie serait maintenant nécessaire pour que les aimants se dirigassent exactement dans la direction des lignes de force dues au champ extérieur. Si, maintenant, l'on vient à interrompre le courant, une grande partie des aimants restera dans cette position finale d'équilibre; en d'autres termes, il existe un magnétisme rémanent dont ce fait est l'interprétation. La représentation que l'on vient d'indiquer peut aussi servir à démontrer les effets de la compression sur les propriétés magnétiques. On place, dans ce but, les aimants sur une feuille de caoutchouc: si le caoutchouc est étiré, les aimants s'éloignent les uns par rapport aux autres dans une direction, tandis qu'ils se rapprochent au contraire dans la direction perpendiculaire. La perméabilité magnétique est augmentée ou diminuée suivant que la stabilité des aimants est diminuée ou augmentée par le changement de leurs positions relatives. De même, l'augmentation de la perméabilité du fer quand la température croît, s'explique par la diminution de l'influence magnétique mutuelle, résultant de l'accroissement des distances des aimants. Le professeur Ewing émet l'idée que la disparition complète de l'aimantation, qui se produit à une haute température, est due à ce fait que les molécules magnétiques sont alors dans un mouvement continu; la perte d'énergie qui se produit dans le cas de l'hystérésis serait due aux courants induits provoqués par les mouvements angulaires des aimants.

3° SCIENCES NATURELLES. — Le Dr Gulland lit un mémoire sur le développement du tissu adénoïde. Il croit que l'accroissement de l'épithélium (par exemple dans le développement des tonsilles) comprime le tissu conjonctif, et rend difficile le passage des leucocytes. Par suite les leucocytes croissent en nombre dans cette partie et nourrissent le tissu condensé.

W. PEDDIE, Docteur de l'Université d'Edimbourg.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BERLIN

Séance du 20 novembre 1890.

SCIENCES PHYSIQUES. — M. de Helmholtz présente un travail de M. F. Braun de Tübingen: Observations électrolytiques. Grothuss avait observé en 1839 que, si l'on plonge un tube en verre fendu et rempli d'une solution de nitrate d'argent dans un gobelet contenant la même solution et que l'on joint la solution du gobelet au pôle positif, celle du tube au pôle négatif d'une batterie, l'anode se couvre de peroxyde d'argent; à la surface extérieure de la fente du tube on observe un dépôt d'argent métallique tandis qu'à la surface intérieure un gaz se développe. M. Braun a répété cette expérience avec le même succès avec une solution presque saturée de nitrate d'argent et le courant de cinq accumulateurs. Des solutions de sulfate ou de nitrate de cuivre ne réagissent pas de la même façon, ni non plus une solution de nitrate d'argent acidulée par de l'acide nitrique ou diluée avec de l'eau. La dernière ne réagit pas même sous l'influence du courant de douze accumulateurs. Après des expériences variées avec les solutions de beaucoup de sels, M. Braun trouva que pour chaque sel, pour chaque concentration de sa solution et pour chaque dimension de la fente il y a une intensité minimum du courant où le phénomène s'observe. Ainsi il trouva pour le sulfate de fer:

Intensité du courant	Observations
132	} Rien
217	
360	
260	
	Développement de gaz à la fente
	Développement de gaz et dépôt métallique à la fente.

La fente montre des pulsations, des bulles de gaz, qui s'échappent, l'élargissent et elle se rétrécit ensuite avec un bruit caractéristique. Dans une solution de nitrate d'argent on observe de petites étincelles partout où une bulle de gaz disparaît. Des expériences avec des fentes coupées dans des feuilles de mica prouvent que le phénomène cesse dès que la largeur de la fente est trop grande. La densité de courant minimum pour observer le phénomène dans une solution de nitrate d'argent avec une fente de 3,6 mm. de longueur et 0,017 mm. de largeur sont:

% de sel dissout	Densité minimum	$\frac{p}{d}$
p	d	Amp. $\frac{Mm^2}{Mm^2}$
50	11,48	
20	6,88	0.021
10	3,44	0.021
5	1,80	0.012
2	0,524	0.016

On peut donc dire qu'en première approximation les densités minima sont proportionnelles à la concentration de la solution. Les leurs qui s'observent dans la fente doivent être attribuées à la combinaison chimique des ions qui se rencontrent. M. Braun ne donne pas encore de théorie de ce phénomène; ses expériences ont seulement prouvé qu'une couche de peroxyde qui conduirait le courant comme un métal n'en peut pas être la cause.

Séance du 27 novembre 1890.


1° SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Kronecker lit une note sur la réduction algébrique de formes bilinéaires.

2° SCIENCES PHYSIQUES. — M. Landolt présente un travail de M. Liebreich sur l'espace mort (Tote Raum) en chimie. M. Liebreich a fait, il y a quelques années, la découverte que la décomposition de l'hydrate de chloral par le carbonate de soude ou de l'acide iodique par l'acide sulfureux ne se fait pas également dans toutes les parties de l'espace, mais qu'il y a toujours des parties où les liquides restent limpides: des espaces morts. Des expériences nombreuses avec des vases de toute forme ont montré que les conditions importantes pour ce phénomène consistent dans les qualités physiques et chimiques des parois des vases et de la


surface libre du liquide. La surface libre agit comme une paroi. Des expériences ingénieuses, communiquées dans le présent travail, prouvent qu'un petit nageur qui a approximativement le poids spécifique du liquide, de sorte que la poussée du dernier n'est pas trop grande, s'arrête toujours quelques millimètres au-dessous de la surface libre comme si une paroi fixe l'arrêtait. Ce phénomène s'observe dans l'eau, l'alcool, l'éther, l'alcool amylique, le sulfure de carbone, etc. Si l'on fait monter un liquide coloré dans un liquide incolore d'une densité un peu plus grande, on observe toujours un ralentissement près du ménisque et les fils montant du liquide coloré montrent les mêmes formes que les espaces morts. M. Liebreich croit que les mêmes obstacles, qui ralentissent les fils, empêchent aussi les molécules de réagir chimiquement les unes sur les autres.

Séance du 4 décembre 1890.

SCIENCES PHYSIQUES. — M. de Hofmann communique les résultats de ses nouvelles recherches sur les bases éthyliques. L'illustre chimiste avait décrit, il y a trente ans, une diamine diéthylienne :




dont il a repris l'étude à cause de la ressemblance que cette base offre avec la spermine préparée par la fabrique ci-devant Schering à Berlin. La base est cristalline; son point de fusion se trouve à 104°; son point d'ébullition à 145-146°. Elle se dissout facilement dans l'eau et dans l'alcool absolu, mais non dans l'éther absolu. La densité de sa vapeur est égale à 40,3; la formule demande 43. Cette base est identique à la spermine, comme l'a prouvé une étude approfondie des bases libres des sels et des combinaisons benzoïliques. A l'occasion de ces expériences, M. de Hofmann a préparé aussi une triamine diéthylienne et surtout la tétramine triéthylienne :



Cette base bout à 266-268°; à -18° elle devient solide; à 15° elle a la densité 0,9817. Elle se dissout dans l'eau avec un fort développement de chaleur, et attire l'acide carbonique de l'air. La formule de cette base a été fixée par l'analyse des sels, des sels doubles de platine et d'or et des combinaisons benzoïliques, préparées d'après la méthode de M. Schotten. — M. de Hofmann présente un travail de M. S. Gabriel : Sur les amines bromées de la série aliphatique. La méthode découverte il y a deux ans par M. Gabriel pour la préparation d'amines primaires qui est basée sur la réaction du sel de potassium du phthalimide sur les chlorures ou bromures organiques, est d'une application générale. Parmi les combinaisons préparées à l'aide de cette méthode élégante et féconde, il faut signaler surtout comme d'un intérêt particulier celles qu'on obtient par la réaction d'un excès de bromure d'éthylène ou de triméthylène sur le sel de potassium mentionné. Ce sont les bases :




Ces bases se prêtent, à cause de la mobilité du brome qu'elles contiennent, à des réactions intéressantes. Avec le sulfhydrate de potassium on obtient des mercaptans amidés, par exemple :



L'aniline donne :




bases excessivement fortes. On a remplacé aussi l'hydrogène du groupe AzH_3 par les restes :



Le chlorure de benzoyle fournit :




En le dissolvant dans de l'eau chaude, ce corps se convertit en bromhydrate d'une nouvelle base :




Le rhodanate de potassium donne le corps :




Cette combinaison cependant n'est pas une urée bromée; mais c'est le bromhydrate d'une base $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_3\text{S}$. — Par l'oxydation à l'aide du brome cette base se change en acide tauro-carbimique.




La base a donc la constitution



En la traitant par l'iode de méthyle, on obtient une base méthylée qui donne par l'oxydation la taurine méthylée, qui a donc la constitution :



La base propylique donne des réactions analogues. La base bromée donne avec le bisulfure de carbone une thiazoline amidé :



qui se change par oxydation en ammoniacque, acide sulfurique et taurine. — M. de Bezdol public une théorie des cyclones.

D^r HANS JAHN.

ACADEMIE DES SCIENCES DE SAINT-PETERSBOURG

Séance du 2 décembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Bergmann : « Sur les écarts de température et de la quantité normale d'eau tombée, par rapport à la normale, observés en Russie pendant le printemps et l'été 1890. » Le fait saillant résultant des observations de l'auteur est la coïncidence des régions à température trop élevée avec les zones de sécheresse (juillet et août.) Ce fait est général sauf dans l'Est où l'on trouve pour juin et juillet une quantité de dépôts atmosphériques supérieure à la normale, coïncident avec les périodes de température au-dessous de la normale. La température supérieure à la normale se transporte de mars à mai du sud-est vers le nord-ouest; en juin et juillet vers l'est, et en août vers le sud-ouest. Le plus grand écart de température a été observé à Samara en mars. Le foyer de sécheresse observé en mars, en Pologne, s'est étendu en avril et mai vers le sud-est et l'est en envahissant les provinces centrales de la Russie. La période de sécheresse a été suivie de pluies abondantes (65^{mm}) ce qui a sauvé les récoltes. — M. Berg : Observations sur la nappe de neige en Russie pendant le premier semestre 1890. — M. Wild : Sur un inclinatoire à induction, de construction nouvelle, et la détermination de l'inclinaison absolue à Pavlovsk, à l'aide de cet instrument. Nouveaux faits sur la relation entre la variation du magnétisme terrestre et les phénomènes observés sur le Soleil.

2^{re} SCIENCES NATURELLES. — M. Karpinski : Sur la fame des Ammonées des couches d'Artinsk. Ce mémoire est le résultat des études faites sur la collection recueillie par MM. Stuckenberg et Fedoroff. Il complète et confirme les conclusions formulées par l'auteur dans le tome XXXVII (2^e fasc.) des *Mémoires de l'Académie*.

O. BACKLUND, Membre de l'Académie.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 20 novembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Weiss annonce que les observations faites à Vienne et les observations obligamment communiquées par les Observatoires de Kiel, Palerme, Padoue et Milan, ont permis de calculer les éléments de la trajectoire de la comète télescopique découverte le 15 de ce mois par le Dr Zona à Palerme dans la constellation du Cocher. Les calculs ont été faits par M. Bidschof; voici les éléments pour Palerme et Vienne:

Temps moyen				
Lieu	1890	du lieu	R appar.	D. appar.
Palerme	nov. 15	10 ^h 24 ^m 1 ^s	5 ^h 33 ^m 54 ^s .80	+33 ^h 23 ^m 00 ^s .0
Vienne..	» 16	15.10.6	5.29.19.39	33.40.30.1
Vienne..	» 19	8.30.9	5.13.50.35	34.15.53.2
				Spitaler

2^o SCIENCES NATURELLES. — M. Rolett: *Recherches sur la contraction et la double refraction des fibres transversales des muscles*. L'auteur examine les divers mouvements qui peuvent se produire dans les muscles des insectes, les mouvements de larves vivantes de *Corethra plumicornis*; la façon dont ils se contractent et la vitesse de propagation de cette contraction. Il étudie au moyen de l'analyse spectral, en lumière polarisée les muscles en repos et en action; son appareil est l'appareil ordinaire de polarisation modifié en quelques points. — M. Rolett communique aussi un travail analogue de M. Goth sur la structure des fibres musculaires. M. Goth montre que, si l'on peut appliquer la méthode de Ranvier à l'étude des lamelles de muscles ou de minces muscles vivants, on peut de même appliquer le procédé d'Abbe à l'étude de muscles entiers. Il a par, ce procédé, étudié l'influence de la contraction et de la dilatation des muscles sur les propriétés optiques. — M. le docteur A. Adamkiewicz: *Observations physiologiques sur le virus des ulcères malins (cancers)*. L'auteur a montré précédemment qu'il existait un véritable virus dans les ulcères malins; il a cherché l'action que produit ce virus; dans l'action d'empoisonnement sur les animaux qu'il produit, on peut distinguer deux périodes. Dans la première, les phénomènes sont très intenses, et consistent en un accroissement de respiration, battements de cœur accélérés, contraction des pupilles et convulsions; puis l'animal se couche sur le flanc, respire vite et ne peut se lever. Dans le second état survient petit à petit des phénomènes de paralysies; tout d'abord l'animal se réveille de son engourdissement, montre une tendance à tourner en rond, puis s'appuyer sur les objets qu'il rencontre et finalement meurt paralysé; ces faits prouvent que la moelle allongée est intéressée dans l'action du virus. — M. E. Suess. *Sur divers micaschistes*.

Séance du 4 décembre 1890

1^{re} SCIENCES PHYSIQUES. — MM. J. Elster et H. Geitel: *Observations électriques au sommet du Somblick (3100 mètres au-dessus du niveau de la mer)*. Du 8 au 24 juillet de cette année, les auteurs ont procédé à une série d'observations faites simultanément au sommet et au pied de la montagne. Ils ont, en premier lieu, effectué des mesures photométriques, pour connaître l'intensité des diverses radiations solaires à des hauteurs différentes au-dessus du niveau de la mer, et déduire de là la loi d'absorption par l'atmosphère. En second lieu, ils ont étudié la marche journalière de la chute du potentiel électrique aux diverses altitudes et ont pu suivre les variations de cette chute pendant les temps orageux. — M. Gustave Zager. *Relations entre les volumes spécifiques des vapeurs saturantes et les volumes spécifiques des liquides aux mêmes températures*. — M. J. Hann: *La variation de la température en Autriche*. En avril 1875, l'auteur avait présenté à l'Académie des recherches sur les variations de la température moyenne du jour, d'un jour à l'autre à la surface de la terre. Les observations complètes ne se rapportaient qu'à la station de Vienne; depuis lors le Dr Döring pour l'Amérique du Sud, Kremsier pour l'Allemagne du Nord, Wahlen pour la Russie,

Scott pour les Îles britanniques, Knippiory pour le Japon, ont effectué des recherches analogues et obtenu des résultats qui ont déterminé l'auteur à reprendre cette étude pour cinquante-trois stations situées en Autriche. Le mémoire qu'il présente aujourd'hui renferme les résultats qu'il a ainsi obtenus et calculés; il donne la différence des températures extrêmes d'un même jour pour tous les endroits: en général la variation moyenne présente un maximum en décembre et un minimum en septembre: il fait aussi connaître les maxima et minima de température et les variations avec la hauteur des stations météorologiques. Pour la station de Vienne, les observations qui ont pu être utilisées remontent jusqu'en 1800; et l'on peut conclure des nombres calculés que, durant les 90 années qui se sont écoulées depuis cette époque, il n'y a pas eu d'influence appréciable des périodes des taches solaires sur la grandeur de la variation de température. — M. F. Schardinger: *Sur une nouvelle modification optiquement active de l'acide lactique obtenu par la fermentation du sucre de canne*. L'auteur a découvert dans une eau impure un ferment capable de se développer dans les hydrates de carbone et qu'il a soigneusement étudié. Le ferment se développe en bâtonnets ayant sensiblement la même grandeur que les bacilles ordinaires qui produisent l'acide lactique. On voit presque toujours deux individus ensemble ou même toute une file d'individus. Introduit dans du sucre de canne ou de raisin, ces ferments produisent un acide lactique; cet acide a toutes les propriétés chimiques de l'acide connu sous le nom de paralactique ou sarcolactique; les sels auxquels il donne naissance sont tout à fait semblables aux sels de cet acide paralactique: ainsi le sel de zinc $(C^3H_5O_3)_2Zn$ cristallisé avec 2 molécules d'eau et le sel de calcium avec 4 mol. $\frac{1}{2}$; mais ces acides présentent au point de vue optique des différences absolues; tandis que l'acide précédemment connu fait tourner à droite et que l'anhydride et les sels de cet acide font tourner à gauche le plan de polarisation de la lumière, l'acide découvert par l'auteur produit l'effet inverse. L'auteur propose en conséquence de l'appeler acide lactique lévogyre.

2^o SCIENCES NATURELLES. — M. Hans Reusch: *Sur de très anciennes formations de glaciers*. Le mémoire envoyé par l'auteur a rapport à des observations géologiques faites dans les fjords du Nord de Bergen. — M. Aug. Freund: *Sur le suc des sorbiers et la formation de la sorbose*. — M. C. Grobben: *Sur les glandes des antennes du Lucifer Reynaudii M. Edw.* Les glandes des antennes du *Lucifer* consistent en sacs terminaux, canaux et courts conduits urinaires. Ce résultat confirme les faits connus sur la relation des glandes et de canaux urinaires. Au point de vue histologique, il est à remarquer que le protoplasma des cellules du canal urinaire s'étend en plaque perpendiculairement à la surface; cette formation en plaque découle de la structure en bâtonnets si fréquemment observée pour les cellules des reins. — M. Risbown Wetstein: Les pins de l'espèce *Picea Ammorica* se rencontrent en deux endroits, dans la Serbie occidentale et en Roumélie, ils ont quelques rapports avec les pins de l'Asie, P. Azaniensis et P. Gleditii ou de l'Amérique du Nord, P. Sitkaensis; ils se rencontrent à l'état fossile en Europe à l'époque tertiaire.

Séance du 11 décembre 1890.

1^{re} SCIENCES MATHÉMATIQUES. — M. Giana: *Formules théoriques pour la marche des régulateurs astronomiques*. — M. Emile Weyr: *Sur les courbes gauches du sixième ordre et de genre un*. — M. Schmid: *Sur les courbes de contact et les enveloppes des hélicoïdes*.

2^o SCIENCES PHYSIQUES. — M. Litznar communique des déterminations magnétiques qu'il a effectuées cette année dans 22 stations du territoire autrichien.

3^o SCIENCES NATURELLES. — M. J. Hinsch kron: *Traitément de l'amblyopie et de l'amaurose*.

Emile WEYR,
Membre de l'Académie.

CHRONIQUE

SUR LE MODE D'ACTION DE LA LYMPHE DE KOCH

Du jour où la nature microbienne des maladies infectieuses a été reconnue, on a cherché à les combattre en tuant les microbes par les antiseptiques ou en mettant l'organisme à l'abri de ses attaques par la vaccination.

La vaccination pastoriennne (disons ainsi pour exclure la vaccine, qui a une histoire à part et dont le principe est un peu différent) consiste à inoculer un microbe semblable à celui qui produit la maladie elle-même, mais rendu par le mode d'inoculation ou par des procédés d'atténuation particuliers, moins actif et capable de conférer l'immunité sans tuer le malade.

En étudiant les moyens par lesquels la maladie virulente produit l'immunité, on est arrivé à penser que les microbes donnent naissance à des produits, les uns toxiques et causant le mal, les autres (et peut-être ne sont-ils pas distincts des premiers) vaccinants, c'est-à-dire produisant dans l'organisme une modification durable qui rend ses humeurs inhabitables pour les bacilles ou ses éléments figurés victorieux contre leurs attaques. De là l'idée d'un nouveau mode de vaccination qui consiste à recueillir les substances spéciales fabriquées par les microbes dans un milieu ordinairement artificiel et à les injecter dans l'organisme, en excluant les microbes eux-mêmes. Cette vaccination chimique offre l'avantage d'un dosage précis et d'une action immédiate.

Aussi lorsqu'on annonça que M. Koch avait extrait d'une culture de bacilles de la tuberculose un produit spécifique que l'on administrait en injections sous-cutanées, bien des gens pensèrent qu'il s'agissait d'un véritable vaccin chimique et le mot de *lymphe vaccinale* a été prononcé et écrit.

Les savants au courant des questions bactériologiques et les médecins qui ont suivi les expériences cliniques savent certainement à quoi s'en tenir ; mais il n'en est pas ainsi du public, je dirai même de bien des gens instruits, que l'on entend tous les jours parler de vaccination anti-tuberculeuse ou de cultures atténuées du bacille de Koch. Il n'est donc peut-être pas inutile d'insister un peu sur ce point et de montrer que la lymphe de Koch n'est pas, on pourrait presque dire, ne peut pas être un vaccin.

Dans les maladies virulentes qui ne récidivent pas, les microbes pathogènes produisent les matières vaccinantes et laissent derrière eux une immunité plus ou moins durable. Mais dans les maladies à récurrence, cela n'a pas lieu et il est certain à priori qu'un liquide contenant la totalité des substances élaborées par leurs microbes ne saurait constituer un vaccin. C'est le cas pour la tuberculose. Le nombre est grand des malades ayant été certainement tuberculeux, ayant guéri et il n'est pas un médecin qui les considère comme mis par cela à l'abri d'une nouvelle atteinte. La chose a d'ailleurs été démontrée expérimentalement chez les animaux. La tuberculose semblerait plutôt appartenir à ce petit groupe de maladies qui exagèrent la réceptivité au lieu de la diminuer.

Donc un liquide contenant tous les produits excrétés par le bacille de Koch et *eux seuls* ne saurait constituer un vaccin de la tuberculose, parce que la tuberculose est une maladie à récurrence.

De ce que la tuberculose ne vaccine pas contre elle-même, il ne s'ensuit pas qu'un vaccin de cette maladie ne puisse exister. Rien ne s'oppose à ce qu'il y ait quelque part une substance capable de produire dans les humeurs ou les éléments figurés la modification nécessaire pour établir l'immunité. Mais il n'y a aucune raison de croire que cette substance se trouve dans les cultures du bacille de Koch plutôt qu'ailleurs. Cela

n'est cependant pas impossible ; elle peut s'y trouver incomplète ou en présence d'autres substances qui annihilent son action et c'est pour cela que nous avons souligné plus haut les mots *tous les produits et eux seuls* ; mais je le répète rien ne nous autorise à penser qu'il en est ainsi.

A priori, on a donc le droit, jusqu'à preuve du contraire, de contester la nature vaccinale du remède de Koch. L'observation des faits nous fournit-elle cette preuve ? Nullement. Lorsque l'on examine les effets physiologiques et cliniques du remède, on voit qu'il n'agit nullement à la manière d'un vaccin et il n'y a pas un seul fait qui nous permette de croire qu'un malade guéri (si tant est qu'il y en ait) par l'application du remède, puisse subir impunément l'inoculation de la tuberculose.

Le remède de Koch, s'il n'est pas un vaccin, n'en est pas moins extrêmement intéressant. Autant qu'on en peut juger par le peu qui a transpiré de la fabrication du remède secret, M. Koch utilise non des substances vaccinantes vraisemblablement absentes dans ses cultures, mais les substances toxiques elles-mêmes, agissant non sur les bacilles, comme les antiseptiques, ni sur les tumeurs générales comme un vaccin, mais sur des points déterminés à la manière de certains poisons spécifiques comme le curare ou la strychnine. La particularité remarquable de ce remède, ce qui lui donne une importance capitale, c'est qu'il est en quelque sorte incomplet, à la manière d'un ferment séparé de la substance fermentescible, et que son énergie est considérablement augmentée par le contact des sucres tuberculeux naturels. De là son inactivité à faible dose sur l'homme sain et son action énergique locale s'exerçant sur les tissus tuberculeux et provoquant la réaction générale souvent décrite ; de là aussi sa valeur pour le diagnostic des lésions tuberculeuses douteuses ou latentes.

Quelle que soit sa valeur thérapeutique, quelles que soient les restrictions à apporter à son action ni tout à fait générale ni rigoureusement exclusive sur les tissus tuberculeux, il n'y en a pas moins là un fait tout nouveau et inattendu et il faut avoir le courage de reconnaître qu'il ne dérive pas, au moins directement, des théories pastoriennes sur les maladies virulentes¹. M. Koch l'a-t-il rencontré sur sa route au cours de ses recherches ou l'a-t-il cherché guidé par une idée nouvelle ? Nous le saurons sans doute lorsqu'il aura parlé.

YVES DELAGE,

Professeur de zoologie
à la Faculté des Sciences de Paris.

¹ Nous demandons à notre distingué collaborateur, M. Delage, la permission de présenter à ce sujet la remarque suivante, qui, loin de contester son opinion, nous paraît plutôt la préciser.

Il est possible que le procédé curatif, ou prétendu tel, de M. R. Koch diffère totalement de la vaccination pastoriennne. Même s'il en était ainsi, la découverte du savant de Berlin resterait, dans une large mesure, tributaire des théories de M. Pasteur sur la fermentation et la virulence. Ce sont en effet ces théories qui ont conduit à soupçonner la nature parasitaire de la tuberculose, à en chercher, puis à en étudier l'agent microbien. Ce l'on essaie de combattre cet ennemi directement ou indirectement, en copiant les procédés connus ou en en inventant de nouveaux, quels que puissent être l'éclat et le succès de cette entreprise, c'est à la seule doctrine du contagion animé qu'il convient d'en attribuer la première inspiration.

NOUVELLES

LA TRANSMISSION INSTANTANÉE DES IMAGES PAR L'ÉLECTRICITÉ

Une grande entreprise excite en ce moment la sagacité des inventeurs. Il s'agit du problème consistant à transmettre les images à grande distance au moyen d'un courant électrique. Bien que ce résultat n'ait pas encore été obtenu, il nous paraît intéressant d'indiquer à ce sujet les tentatives et récents projets des physiciens.

L'électricité permet de transmettre et de reproduire fidèlement, par l'intermédiaire d'un fil télégraphique, les vibrations sonores les plus compliquées, celles qui résultent, par exemple, de la parole articulée ou d'un orchestre. Si les idées que les physiciens se font de la lumière sont exactes, celle-ci est le résultat d'un mouvement vibratoire des corps beaucoup plus rapide que celui du son et doué d'une vitesse de propagation énorme. Mais ce n'est là qu'une différence dans l'ordre de grandeur, et du moment où l'électricité permet la reproduction à distance des vibrations sonores, la possibilité d'en faire autant pour les vibrations lumineuses s'impose naturellement à l'esprit. Au téléphone correspondrait ainsi le *téléphone* (ou *diaphone*) qui résoudrait le problème de la *vision à distance* en reproduisant à l'une des extrémités d'un fil conducteur une image lumineuse placée à l'autre extrémité. La combinaison du téléphone et du nouvel appareil permettrait, par exemple, de voir et d'entendre son interlocuteur, d'assister de *visu* et de *audit*, sans se déranger, à une représentation théâtrale, etc. On est en présence d'un de ces problèmes passionnants qui sembleraient extravagants, si la raison ne démontrait leur possibilité, et si des hommes de la valeur de G. Bell et d'Edison ne la prenaient en considération et ne craignaient d'y consacrer les efforts de leur haute intelligence.

Chose remarquable, c'est un de nos compatriotes, M. Senlecq, d'Ardres (Pas-de-Calais), qui paraît s'être occupé le premier de la *vision à distance*; quelques mois après l'apparition du téléphone de Bell¹, dès le commencement de 1877, M. Senlecq apporta un commencement de solution au problème en inventant un appareil, appelé par lui *télescope*, dont il publia le plan en novembre 1878. Avec un instrument rudimentaire, fondé sur le principe des appareils autographiques, et dans lequel il utilisait la propriété du sélénium d'augmenter de conductibilité sous l'influence de la lumière, il obtint, avec toutes ses gradations de teintes, la reproduction d'une surface ombrée (du noir au clair)².

Après lui, de nombreuses solutions de la vision à distance, toutes théoriques d'ailleurs, et où la propriété photo-électrique du sélénium était appliquée, furent proposées de tous côtés, notamment par MM. de Paiva, G. Bell, Carey, Sawyer, Perosino. A côté de ces pures spéculations, il convient de mentionner particulièrement les recherches expérimentales de MM. Ayrton et Perry qui remontent à 1877. Leur appareil comprenait un *transmetteur* et un *illuminateur*. Le transmetteur se composait de petites plaques de sélénium (éléments du transmetteur) disposées en damier et réunies chacune par un fil à l'illuminateur. Celui-ci était constitué par des systèmes électro-magnétiques; le courant qui les actionnait commandait de petites fenêtres à travers lesquelles on projetait sur une feuille de verre dépoli des rayons lumineux. L'intensité des teintes, sur l'écran,

était évidemment proportionnelle à l'impression lumineuse reçue par chaque élément de transmetteur, et l'on avait comme reproduction une sorte de canevas de l'image première.

Dans une autre disposition plus facile à réaliser, mais qui se complique du synchronisme de deux mouvements, les mêmes physiciens utilisèrent la persistance des impressions lumineuses sur la rétine et purent projeter sur son écran cylindrique la reproduction d'un système de raies alternativement blanches et noires.

Les résultats obtenus par MM. Ayrton et Perry étaient certainement intéressants, mais ils étaient insuffisants, et la première solution sérieuse du problème en question a été donnée par M. Shelford Bidwell, qui a présenté en 1880 son appareil à la Société de Physique de Londres et l'a fait fonctionner devant elle. Dans ce système, il n'y a rien de nouveau comme principe: la reproduction des images est obtenue, comme dans l'appareil de M. Senlecq, par la combinaison de l'emploi du sélénium avec celui d'organes traçants autographiques.

L'appareil transmetteur (fig. 1) est une boîte cylindrique de cuivre H montée sur un pivot composé de deux pièces métalliques séparées par un disque de bois; l'une de ces parties est munie d'un pas de vis, ce qui donne à l'appareil un mouvement hélicoïdal. En un point O de la surface de la boîte est percé un trou devant lequel est fixée, en dedans du cylindre, une plaque de sélénium; deux des bords opposés de celle-ci sont reliés métalliquement aux deux pièces du pivot, qui font partie du circuit d'une pile. De cette façon, pendant le mouvement du cylindre, la plaque de sélénium se trouve constamment dans le circuit :




Fig. 1.

Le récepteur D est disposé à peu près comme le transmetteur, sauf la partie relative à la plaque de sélénium, et tourne synchroniquement avec lui. Sur la surface cylindrique de la boîte est tendue une feuille de papier imprégnée d'iode de potassium, et un style de platine P appuie sur elle. Supposons que le synchronisme soit parfait, et qu'on projette une image lumineuse sur l'ouverture O supposée fermée par un diaphragme percé d'un petit trou; chaque fois que le petit trou passe devant la plaque de sélénium, le courant qui traverse le sélénium est modifié suivant l'intensité de l'image, ce qui se traduit en D par une coloration variée de même longueur. Après un certain nombre de tours, le trou est passé devant toutes les parties de l'image, et il en résulte, sur le récepteur, une figure blanche représentant l'image projetée, au milieu d'un fond de hachures brunes déterminées par le style traceur³. Dans les expériences

¹ Les demandes de brevets de Graham Bell et de Elisha Gray pour les téléphones articulés datent du même jour: 14 février 1876.

² Ce sont les termes mêmes dont M. Senlecq se sert dans une lettre adressée à la *Lumière électrique*. Voir t. II, p. 447.

³ Voir Th. du Moncel, *Lumière électrique*, t. III, p. 209; 1881. — La lumière augmente la conductibilité du sélénium, donc aussi l'intensité du courant; on devrait obtenir un *negatif*, c'est-à-dire en noir sur un fond blanc; un dispositif convenable, représenté par le circuit dérivé RGB dans la figure 1, permet de renverser l'effet. Il suffit, pour cela, que le courant dérivé de la pile auxiliaire B qui passe à travers le papier chimique soit supérieur et de signe contraire à celui qui vient de la pile B.

qui ont été faites, les images étaient des dessins géométriques découpés dans des feuilles d'étain et projetés par une lanterne magique. Il y a certainement un abîme entre la reproduction d'images lumineuses à contours arrêtés et celle des images de la nature; quoi qu'il en soit, les expériences que nous venons de citer démontrent la possibilité de la transmission électrique des images à distance.

M. Sh. Bidwell avait fait avancer sérieusement la question; cependant elle cessa brusquement d'attirer l'attention au point que toutes les études qui suivirent ne furent que des études théoriques; nous sommes donc obligé, dans ce court exposé, de quitter la vraie voie, la voie expérimentale, et d'entrer dans celle des expériences à faire.

C'est dans cet ordre d'idées qu'en 1885 M. Nipkow publia dans l'*Electrotechnische Zeitschrift* une nouvelle solution du problème. L'appareil de M. Nipkow, très bien conçu, se compose de deux mouvements synchroniques, l'un au transmetteur, l'autre au récepteur; leur synchronisme est réglé automatiquement par le courant d'une pile constante¹.

On décompose l'image à transmettre en petites surfaces au moyen d'un disque S (fig. 2) monté sur l'arbre horizontal A. Ce disque est percé de 24 trous équidistants disposés suivant une spirale, de telle sorte que la circonférence de centre A, tangente intérieurement au n^{me} trou, soit tangente extérieurement au $n + 1^{\text{me}}$. Si donc avec une lentille P on projette sur le disque une image lumineuse de dimensions convenables, toute la surface passera point par point devant les trous et l'image sera visible pour un observateur placé derrière le disque, pourvu qu'entre le passage de deux trous consécutifs s'écoule un temps inférieur à $\frac{1}{10}$ de seconde. Au poste de réception est un disque identique au premier et qui tourne synchroniquement avec lui.




Fig. 2.

Cela étant, les rayons lumineux concentrés par la lentille P tombent sur une sorte de microphone M dont la plaque tournée vers le disque est en verre, tandis que l'autre est une membrane où deux contacts en charbon, O, ont été disposés. Ceux-ci ferment le circuit primaire d'une bobine d'induction J. La variation d'éclat de la lumière produit des mouvements microphoniques qui agissent sur les contacts O, et, par suite, sur le courant du circuit primaire de la bobine. Ces variations se reproduisent dans le circuit secondaire (ligne) et font vibrer la plaque du téléphone T.

Celle-ci est constituée par un petit miroir plan qui, au repos, réfléchit sur la partie trouée du disque récepteur les rayons émanés d'une source lumineuse Q. Lorsque la plaque vibre, elle se transforme en miroir concave ou convexe, et par suite l'éclat de l'image augmente ou diminue. Ces variations d'éclat sont proportionnelles à celles des rayons issus de la lentille P. Comme les disques sont synchrones, les trous affectés des mêmes numéros passent simultanément devant l'image et devant l'œil, et celui-ci éprouve, quoique un peu affaibli, la sensation lumineuse de l'image. Comme

on le voit, la partie originale de ce système est la transformation de l'énergie électrique en énergie lumineuse au moyen du téléphone à plaque réfléchissante. Cependant on peut craindre que la variation du rayon de courbure de la plaque vibrante du téléphone soit assez faible pour que la variation d'éclat correspondante du rayon réfléchi soit insensible. Tout l'intérêt de la conception de M. Nipkow est là, et il est vivement à désirer que cette question soit tranchée par l'expérience.

Un récent travail de M. L. Weiller sur le même sujet, publié en octobre 1889 dans le *Génie civil*, et auquel nous empruntons ce qui suit, en donne la solution théorique au moyen d'une modification, aussi heureuse que simple, du téléphone.

M. Weiller commence par remarquer que, pour avoir l'impression d'un objet ou d'un ensemble de plusieurs objets, il n'est pas nécessaire que l'œil reçoive tous les rayons lumineux qui en émanent. Il suffit, pour s'en rendre compte, de remarquer qu'un tissu à mailles suffisamment lâches permet de voir distinctement des objets placés derrière lui, et qu'il est possible d'avoir la perception d'une image par la vision d'un système de lignes formant par leur ensemble une sorte de patron. De plus, pour que l'impression d'une image se produise, il suffit, en vertu de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine, que les rayons arrivent successivement à l'œil dans un intervalle de temps suffisamment court.

Comment réaliser le patron que l'on peut, au point de vue de l'impression définitive, substituer à l'objet? Pour cela, M. Weiller imagine un disque tournant (fig. 3 et 4) autour d'un axe passant par son centre et per-




Fig. 3.

pendiculaire à son plan; il place sur lui des miroirs argentés faisant avec son plan des angles différents, quoique voisins de 90°.

Les miroirs sont petits, d'égales dimensions, et tournent devant une image figurée, par exemple, sur un tableau. Dans son mouvement, chacun de ces miroirs enverrait à un œil fixe, convenablement placé, tous les rayons issus d'une certaine courbe située sur l'image; avec un ensemble de miroirs il est donc possible d'amener en un même point tous les rayons lumineux provenant d'une série de courbes réparties sur toutes les régions de l'image et formant un patron. Le patron que l'on substitue ainsi à l'image du tableau dépend évidemment du système de miroirs que l'on emploie. Pratiquement, M. Weiller propose de coller 360 verres argentés sur le tour du disque représenté (fig. 3 et 4) et auquel on communiquerait une vitesse de rotation de 30 à 40 tours par seconde.




Fig. 4.

Les lignes formant patron sont reçues dans une cellule de sélénium (fig. 5) dont la plaque fait partie du circuit de la ligne; sous l'influence de la lumière, l'intensité du courant de la ligne est modifiée. Ce courant est reçu dans un téléphone modifié de la manière

¹ Voir P. Clémenceau, *Lumière électrique*, t. XVIII, p. 437

suivante (fig. 6) : le milieu de la plaque vibrante est percé d'un trou très petit, et l'âme du téléphone est




Fig. 5.

mise en communication par un trou latéral avec un tuyau à gaz d'éclairage, dont l'arrivée est commandée par un robinet. On allume le gaz sur la plaque en produisant une petite flamme ; toute vibration de la




Fig. 6.

plaque, si petite qu'elle soit, produira une variation d'éclat de la flamme en rapport avec la variation du courant et reproduisant la variation d'éclat du poste de départ. La modification du téléphone proposée par M. Weiller revient, comme on le voit, à lui adapter une véritable capsule manométrique de König.

Enfin, les successions d'intensités lumineuses ainsi superposées sont placées à côté les unes des autres, par la persistance des impressions lumineuses sur la rétine, au moyen d'un appareil à miroirs identique au premier et synchrone avec lui¹. Tel est l'appareil que propose M. Weiller sous le nom de *phoroscope*, et qui, jusqu'ici, n'a pas été réalisé, du moins à notre connaissance.

Plus récemment encore, M. H. Sutton a indiqué une autre solution théorique du problème. La disposition générale de l'appareil est encore celle de M. Nipkow (fig. 2) ; le téléphone T est remplacé par deux nicols à l'extinction entre lesquels est placée une cuve à sulfure de carbone. Les courants secondaires de la bobine J animent deux excitateurs entourant la cuve, et créent un champ magnétique qui fait tourner d'une quantité proportionnelle à leur intensité le plan de polarisation de la lumière². Par suite la lumière reparait, et les éclats variables dans les trous du disque récepteur, synchrone avec le disque transmetteur, reproduisent l'image primitive, malheureusement avec une intensité voisine du zéro, à cause de la faiblesse des courants secondaires. Les variations d'intensité du courant primaires sont produits par le procédé employé dans l'appareil de M. Sheldford Bidwell (p. 798).

Les travaux que nous venons d'exposer montrent

¹ Il est inutile d'insister sur l'analogie qui existe entre cette disposition et celle de M. Nipkow ; que le lecteur recueille bien se reporter à la figure 2.

² Variation elle-même proportionnelle à celle du courant primaire et par suite à celle de la lumière incidente. — Voir *Lumière électrique*, 15 déc. 1890.

qu'on est en droit de s'attendre à quelques succès de la part des physiiciens qui s'occuperont de la vision à distance ; les théoriciens ont fait assez ; que les expérimentateurs fassent le reste.

E. MATHIAS.
Docteur ès Sciences.

M. Heude, qui vient d'étudier l'*Hyracodontotherium* et le *Prosyrotherium*, nous prie d'insérer à ce sujet la note suivante :

« M. R. Lydekker a publié en février 1889¹ un fragment de maxillaire supérieur droit provenant des phosphorites de Bach (Lot), et il pense qu'il « appartient évidemment au genre *Hyracodontotherium* ». C'est une évidence qui s'obscurcira après l'étude que je soumetts aux paléontologistes. Le type du Dr H. Filhol Phosph. Quercy, (fig. 283-284) appartient fort probablement au grand groupe des Anoplotheriids ; le maxillaire publié par M. R. Lydekker est celui d'un suillidé². Ces conclusions sont loin de celles de l'auteur qui fait de ce fossile l'*H. Filholi*. Il suffirait pour établir l'exclusion que nous affirmons de faire remarquer la présence d'un conule auxiliaire postérieur à la quatrième prémaxillaire de l'*H. Filholi*, caractère suillien et non anoplotherien.

« Si, à des considérations fondées sur la manière dont les plans dentaires généraux ont été modifiés dans les prémolaires, nous joignons la disposition elle-même des dents, la taille relative des prémolaires qui décroissent plus également chez l'*H. Filholi* que chez l'*H. primævum* ; la forme des intermaxillaires, tout nous amènera à conclure que l'animal dont le maxillaire a été figuré par M. R. Lydekker n'a rien de l'*Hyracodontotherium*. De même d'ailleurs que celui-ci, au point de vue odontologique, n'a rien de l'*Hyrax*, non plus que l'*Hyracodontotherium*. Nous proposons donc à M. R. Lydekker d'accepter un autre nom, soit *Prosyrotherium*. Ce nom indique un type comparable à celui qui nous est figuré. Non pas que nous prétendions indiquer un passage phylogénique aux suilliens futurs, mais simplement une relation zootaxique. La première idée serait un non-sens pour un évolutionniste logique. Car le *Prosyrotherium*, contemporain, ou à peu près, du *Cheropotamus*, est un animal dont les prémolaires sont à la limite possible de réduction. Or nous savons qu'on ne réacquiert pas, en évolution logique, ce qui a été une fois perdu, sous peine de s'enfermer dans un cercle vicieux.

P. M. HEUDE, S. J.

Musée de Zikawei, Chine, 19 février 1890. »

Nous recevons de M. Lesage, la lettre suivante :

« Monsieur le Directeur, En lisant les critiques que vous avez adressées à ma thèse (Influence du bord de la mer sur la structure des feuilles), dans votre numéro du 15 novembre 1890, je suis surpris d'y trouver une réplique aux commentaires bienveillants dont mon travail a été l'objet ailleurs. Ces commentaires, auxquels je suis demeuré étranger, semblent avoir déterminé l'appréciation que vous avez donnée de mes recherches et votre insistance à les critiquer. Je ne puis pourtant être responsable que de ce que j'ai écrit et me permets d'en appeler à votre impartialité mieux informée.

« Agréé, etc... »

LESAGE. »

Nous donnons bien volontiers à M. Lesage acte de sa déclaration. Puisqu'il est demeuré étranger aux commentaires auxquels nous avons fait allusion, il serait injuste de confondre sa thèse avec ces commentaires eux-mêmes. Nous nous plaisons à en distinguer son travail, qui lui a valu le grade de docteur ès sciences avec toutes boules blanches et les félicitations de son jury.

L. O.

¹ P. Z. S. 1889. « On an apparently new species of *Hyracodontotherium*. »

25/-/-

11/-/- 25

1/26

MBL WHOI Library - Serials



5 WHSE 04464

